



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

47 B

LANE




MEDICAL

LIBRARY

LEVI COOPER LANE FUND









L e h r b u c h
der
Chirurgie und Operationslehre.

Zweiter Band.



Lehrbuch

der

Chirurgie und Operationslehre,

besonders für das Bedürfniss der Studirenden,

von

Dr. Adolf Bardeleben,

ordentlichem Professor der Chirurgie an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, Director der chirurgischen Klinik und dirigirendem Arzt am Charité-Krankenhaus, Mitglied der wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen, Geheimen Medicinal-Rath, General-Arzt à la suite des Sanitätscorps, Ritter des eisernen Kreuzes erster Klasse, des Rothen Adler-Ordens zweiter Klasse mit Eichenlaub und des Kronenordens dritter Klasse am weiss und schwarzen Bande.

Mit zahlreichen, in den Text gedruckten Holzschnitten.



Zweiter Band.

Siebente Ausgabe.



Berlin.

Druck und Verlag von Georg Reimer.

1874.

Ka

YASUJI MAI

•

1874
B 24
v. 2
1874

Inhalts-Verzeichniss zum zweiten Bande.

Zweites Buch.

Von den chirurgischen Krankheiten der einzelnen Gewebe.

	Seite
Erster Abschnitt. Von den chirurgischen Krankheiten der Haut . . .	3—41
Erstes Capitel. Entzündung der Haut und deren Ausgänge.	
I. Erythem und Intertrigo	3
II. Rose, Rotblauf, Erysipelas	5
III. Gürtelrose, Gürtel, Zona, Zoster, Herpes Zoster	14
IV. Blutschwär, Furunkel, Furunculus	18
V. Brandschwar, Anthrax, Carbunkel, Carbunculus benignus	21
VI. Brand der Haut	24
Zweites Capitel. Verletzungen der Haut	26
A. Wunden	26
B. Fremde Körper	27
Drittes Capitel. Organisirte Neubildungen in der Haut	28
Lupus, fressende Flechte, Herpes exedens	29
Zweiter Abschnitt. Von den Krankheiten des Bindegewebes	42—63
Erstes Capitel. Entzündung des Bindegewebes und deren Ausgänge . . .	42
I. Von der Bindegewebs-Entzündung, Phlegmone, im Allgemeinen	42
II. Phlegmonöses Erysipelas. Pseudo-Erysipelas. Entzündung des Unterhautbindegewebes. Phlegmone diffusa. Serös-purulentes Oedem	45
III. Wasser-Erguss im Bindegewebe. Oedema	51
Zweites Capitel. Verletzungen des Bindegewebes	56
I. Traumatisches Emphysem	57
II. Spontanes Emphysem	62
Dritter Abschnitt. Von den Krankheiten der Arterien	64—227
Erste Abtheilung. Von den Krankheiten der Arterien im Allgemeinen . . .	64
Erstes Capitel. Wunden der Arterien	64
I. Arterielle Blutungen	71
II. Traumatisches Aneurysma	75
A. Primäres traumatisches Aneurysma	76
B. Secundäres traumatisches Aneurysma	78
C. Arteriell-venöses Aneurysma	79
Zweites Capitel. Entzündung, Atherom und Verstopfung der Arterien . .	86
Drittes Capitel. Pulsadergeschwülste, Aneurysmata	92

	Seite
Viertes Capitel. Therapie der Arterienwunden und der Aneurysmen.	
Blutstillungsmittel	106
I. Blutstillungsmittel, welche mechanisch den Blutstrom hemmen und dadurch die Bildung des Thrombus herbeiführen	109
A. Druck, Compression	109
B. Unterbindung, Ligatura	114
1. Von der Unterbindung blutender Gefäß-Enden	114
2. Von der Unterbindung in der Continuität der Arterien Heilungsvorgang und üble Zufälle nach der Unter- bindung in der Continuität einer Arterie	125
Anwendung der Ligatur zur Heilung von Aneurysmen Varianten der Unterbindung	131
C. Umstechung und Acupressur	137
D. Drehung der Arterien, Torsio arteriarum	141
E. Einbringen fremder Körper. Acupunctur	144
II. Blutstillungsmittel, welche vorzugsweise auf chemischem Wege Gerinnung des Blutes und dadurch Verschluss des Gefässes be- dingen	145
A. Medicamenta styptica	145
B. Kauterisation. Ferrum candens	147
C. Electropunctur, Galvanopunctur	148
III. Blutstillungsmittel, welche wesentlich durch Erregung der Con- traction der Gefässe wirken	151
Specielle Behandlung der Pulsadergeschwülste	152
Zweite Abtheilung. Von den Krankheiten und der Unterbindung der ein- zelnen Arterienstämme	157
Erstes Capitel. Truncus anonymus seu brachiocephalicus seu cleido- caroticus	157
I. Anatomie.	157
II. Krankheiten des Truncus anonymus	158
III. Unterbindung des Truncus anonymus	160
Zweites Capitel. Arteria carotis und deren Hauptäste	161
I. Anatomie.	161
II. Krankheiten der Carotiden	162
III. Unterbindung der Carotis communis und ihrer wichtigsten Aeste 1. Carotis communis	164
A. Verfahren von Asthley Cooper	166
B. Unterbindung der Carotis in der Nähe des Schlüsselbeins a) Verfahren von Zang	168
b) Verfahren von Allan Burns	169
c) Verfahren von Malgaigne	169
2. Unterbindung der Arteria carotis externa	170
3. Unterbindung der Arteria thyreoidea superior	173
4. Unterbindung der Arteria lingualis	173
5. Unterbindung der Arteria maxillaris externa seu facialis	174
6. Unterbindung der Arteria temporalis	174
Drittes Capitel. Arteria subclavia	174
I. Anatomie	174
II. Krankheiten der Arteria subclavia	175
III. Unterbindung der Arteria subclavia	179
A. Unterbindung zwischen den Mm. scaleni	179
B. Unterbindung an der äusseren Seite der Mm. scaleni, in der Furche der ersten Rippe	179
Unterbindung der Arteria vertebralis	180

	Seite
Viertes Capitel. Arteria axillaris	181
I. Anatomie	181
II. Krankheiten der Arteria axillaris	182
III. Unterbindung der Arteria axillaris	186
A. Unterbindung hinter dem Musc. pectoralis major	186
B. Unterbindung in der Achselhöhle	187
Fünftes Capitel. Arterien des Armes und der Hand	187
I. Anatomie	187
II. Krankheiten der Arterien des Armes und der Hand	189
III. Unterbindung der Arterien des Armes und der Hand	194
A. Arteria brachialis	194
a) Unterbindung in der Mitte des Oberarmes	194
b) Unterbindung in der Armbeuge	195
B. Arteria ulnaris	196
a) Unterbindung in der oberen Hälfte des Vorderarmes	196
b) In untern Drittheil des Vorderarmes	196
c) An der Radialseite des Os pisiforme	196
C. Arteria radialis	196
a) Unterbindung in der oberen Hälfte des Vorderarmes	196
b) Unterbindung in der untern Hälfte des Vorderarmes	197
c) Unterbindung an der Rückenseite der Hand	197
D. Arcus volaris superficialis	197
Sechstes Capitel. Arteriae iliacae	198
I. Anatomie	199
II. Krankheiten der Arteriae iliacae	199
Unterbindung der Aorta	202
III. Unterbindung der Arteriae iliacae	203
Siebentes Capitel. Arteria glutea, ischiadica, pudenda interna	206
I. Anatomie	206
II. Krankheiten der Arterien des Gesässes	206
III. Unterbindung der Arterien am Gesäss	209
A. Aelteres Verfahren	209
B. Verfahren von Diday	210
C. Verfahren von Champenois	210
Achstes Capitel. Arteria femoralis	210
I. Anatomie	210
II. Krankheiten der Arteria femoralis	212
III. Unterbindung der Arteria femoralis	216
A. Unterbindung dicht am Fallopi'schen Bande	216
B. Unterbindung unterhalb des Abgangs der Profunda	217
a) Unterbindung an der Grenze zwischen dem oberen und mittleren Drittel des Schenkels (Scarpa)	217
b) Unterbindung in der Mitte des Schenkels (Hunter)	217
c) Unterbindung im untern Drittel des Schenkels, an der Stelle, wo die Arterie in den Adductor magnus eintritt	218
Neuntes Capitel. Arteria poplitea	218
I. Anatomie	218
II. Krankheiten der Arteria poplitea	219
III. Unterbindung der Arteria poplitea	222
Zehntes Capitel. Arterien des Unterschenkels	222
I. Anatomie	222
II. Krankheiten der Arterien des Unterschenkels	224

	Seite
III. Unterbindung der Unterschenkel-Arterien	225
1) Arteria tibialis antica	225
2) Arteria tibialis postica	225
3) Arteria peronea	226
Tabellarische Uebersicht des Collateralkreislaufes nach der Unterbin-	
dung der grösseren Arterien	226
Vierter Abschnitt. Von den Krankheiten der Venen	228—259
Erstes Capitel. Verletzungen der Venen	228
Zweites Capitel. Entzündung und Thrombosis in den Venen	232
Drittes Capitel. Neubildungen. — Erweiterung der Venen	237
Krampfadern. Varices	237
Varicöse Geschwüre und Venen fisteln	243
Behandlung der Varices	245
Anhang zum vierten Abschnitt. Infusion, hypodermatische Injec-	
tion, Transfusion	250
Fünfter Abschnitt. Von den Krankheiten der Lymphgefässe und Lymph-	
drüsen	260—283
Erstes Capitel. Wunden der Lymphgefässe	260
Zweites Capitel. Entzündung und Thrombosis der Lymphgefässe . .	262
A. Acute Lymphangitis	262
B. Lymphangitis chronica, Elephantiasis Arabum, Pachydermia	268
Drittes Capitel. Entzündung der Lymphdrüsen, Lymphadenitis . . .	274
Viertes Capitel. Organisirte Neubildungen in den Lymphdrüsen . .	277
Operationen an den Lymphdrüsen	281
Sechster Abschnitt. Von den Krankheiten der Nerven	284—310
Erstes Capitel. Verletzungen der Nerven	284
Zweites Capitel. Wund-Starrkrampf, Tetanus traumaticus	288
Drittes Capitel. Neuralgien	296
A. Von den Neuralgien im Allgemeinen	296
B. Von den wichtigsten äusseren Neuralgien im Besonderen	300
I. Gesichtsschmerz, Prosopalgie, Neuralgia facialis, Tic douloureux	300
1) Neuralgia frontalis	300
2) Neuralgia infraorbitalis	301
3) Neuralgia maxillaris	304
II. Hüftweh, Neuralgia ischiadica, Ischias (nervosa Contugni) . .	307
Viertes Capitel. Entzündung der Nerven, Neuritis	308
Siebenter Abschnitt. Von den Krankheiten der Knochen	311—595
Erstes Capitel. Verletzungen, Continuitätstrennungen der Knochen . .	311
A. Von den Verletzungen der Knochen im Allgemeinen	311
I. Knochenbrüche, Fracturae	312
Verschiedenheiten der Knochenbrüche	312
Einfache und complicirte Fracturen	318
Sectionsbefund	319
Aetiologie	320
Diagnose	323
Verlauf, Heilungsvorgang, Callusbildung	326
Verhältnisse, welche die Callusbildung begünstigen oder be-	
einträchtigen	330
Pseudarthrosis, falsches Gelenk	332
Prognose der Knochenbrüche	333
Behandlung	335

	Seite
Complicirte Knochenbrüche und deren Behandlung	351
Nachbehandlung	360
Behandlung des difformen Callus	361
Behandlung der Pseudarthrosen	363
II. Knochenwunden, Vulnere ossium	368
A. Hiebwunden der Knochen	368
B. Schusswunden der Knochen	370
III. Traumatische Epiphysenlösung, Absprennung der Epiphysen, Di- vulsio s. Diastasis epiphysium	371
B. Von den Verletzungen der einzelnen Knochen im Besonderen	373
a) Knochenbrüche am Kopfe	373
1) Brüche der Nasenbeine	373
2) Brüche des Jochbogens	375
3) Brüche des Oberkiefers	376
4) Brüche mehrerer der unbeweglich verbundenen Gesichts- knochen	377
5) Brüche des Unterkiefers	377
b) Knochenbrüche am Rumpf	383
1) Brüche der Wirbel	383
2) Brüche des Kreuzbeins	389
3) Brüche des Steissbeins	390
4) Brüche des Brustbeins	390
5) Brüche der Rippen	392
6) Brüche der Rippenknorpel	395
7) Brüche der Beckenknochen	396
a) Brüche des Darmbeins	396
b) Brüche des Schoossbeins	397
c) Brüche des Sitzbeins	398
d) Bruch der Pfanne	399
c) Brüche der oberen Extremität	400
1) Brüche des Schulterblatts	400
2) Brüche des Schlüsselbeins	404
3) Brüche des Oberarmbeins	411
A. Brüche des Mittelstücks des Oberarmbeins	412
B. Brüche am oberen Ende des Humerus	414
C. Brüche am unteren Ende des Humerus	420
4) Brüche der Vorderarmknochen	424
A. Brüche beider Vorderarmknochen	424
B. Brüche des Radius	426
C. Brüche der Ulna	439
5) Brüche an der Hand	446
d) Brüche der unteren Extremität	448
1) Brüche des Oberschenkelbeins	448
A. Brüche des Mittelstücks des Oberschenkelbeins	448
B. Brüche am oberen Ende des Oberschenkelbeins	462
C. Brüche des unteren Endes des Oberschenkelbeins	481
2) Brüche am Unterschenkel	485
A. Brüche der Kniescheibe	485
B. Brüche der Tibia und Fibula	493
C. Brüche der Tibia	502
D. Brüche der Fibula	504
3) Brüche am Fuss. Brüche des Fersenbeins	509
Zweites Capitel. Entzündliche und destructive Processe an den Knochen	513
I. Entzündung der Knochensubstanz. Osteitis, Ostitis	513
II. Entzündung der Knochenhaut. Periostitis	522
III. Entzündung des Knochenmarks. Osteomyelitis	526

	Seite
IV. Knochenentzündungen vor Vollendung des Wachsthums	530
V. Knochenabscess	535
VI. Knochenfrass, Knochenverschwärung. Caries	538
VII. Knochenbrand. Necrosis	544
VIII. Knochen-Brüchigkeit und Knochen-Erweichung. Osteopsathyrosis, Fragilitas, Mollities, Curvaturae ossium	558
A. Osteomalacie. Osteomalacia, Malacosteon s. Rachitis adultorum	560
B. Rachitis, Englische Krankheit	563
Drittes Capitel. Neubildungen an und in den Knochen	574
I. Fasergeschwulst, Fibroma	576
II. Cysten	576
Blasenwürmer. Hydatiden. Echinococcen	578
III. Knochen-Aneurysma, pulsirende Knochengeschwulst, Knochen- Haematom. Aneurysma ossium, Osteo-Aneurysma	580
IV. Krebs der Knochen. Osteocarcinoma	584
V. Sarcom der Knochen. Osteosarcoma	590
VI. Knochentuberkeln	591
Achter Abschnitt. Von den Krankheiten der Gelenke	596—840
Erstes Capitel. Von der Gelenk-Entzündung und deren Folgen	596
I. Gelenk-Entzündung. Arthrophlogosis	596
A. Anatomische Untersuchung	596
B. Aetiologie	602
C. Verlauf und Ausgänge	605
1. Acute Gelenk-Entzündung	605
2. Chronische Gelenk-Entzündung	609
a) Destructive Gelenk-Entzündung. Tumor albus. Arthrocaec	609
b) Deformirende Gelenk-Entzündung. Arthrophlogosis defor-	611
mans. Polyarthritus deformans	611
D. Prognose	612
E. Behandlung der Gelenk-Entzündung	613
II. Gelenkwassersucht, Gliedwasser, Hydrops articuli, Hydarthros	619
III. Gelenksteifigkeit, Ankylosis	628
IV. Bewegliche Körper in den Gelenken, Gelenkkörper, Gelenkmäuse	636
Zweites Capitel. Neurosen der Gelenke	645
Drittes Capitel. Verletzungen der Gelenke, Laesiones articularum	649
I. Gelenkwunden	649
1. Schnitt-, Hieb- und Stichwunden der Gelenke	649
2. Schusswunden der Gelenke	653
II. Gelenkbrüche. Fracturen der Gelenk-Enden	657
III. Quetschung und Verstauchung	659
1. Quetschung. Contusio articuli	659
2. Verstauchung. Contorsio, Distorsio	660
IV. Verrenkungen. Luxationes	663
A. Von den Verrenkungen im Allgemeinen	663
1. Traumatische Verrenkung. Luxatio violenta	664
Aetiologie	664
Varietäten	667
Benennung der Verrenkungen	668
Anatomische Veränderungen	669
Heilungsvorgang	672
Symptome	673

	Seite
Differentielle Diagnose	675
Prognose. Behandlung	676
Complicationen	682
2. Angeborene Verrenkung. Luxatio congenita	685
B. Von den Verrenkungen der einzelnen Gelenke im Besonderen	689
a) Verrenkungen am Kopfe	689
1. Verrenkungen des Unterkiefers	689
b) Verrenkungen am Rumpfe	695
1. Verrenkungen der Wirbel	695
2. Verrenkungen des Brustbeins	702
3. Verrenkungen der Rippen und Rippenknorpel	704
4. Trennungen der Beckensymphysen, Verrenkungen der Beckenknochen	705
c) Verrenkungen an der oberen Extremität	707
1. Verrenkungen des Schlüsselbeins, Verrenkungen des Sternalendes des Schlüsselbeins	707
2. Verrenkungen des Schulterblatts, Verrenkungen des Acromion, Verrenkungen des äusseren oder Acromial-Endes des Schlüsselbeins	712
3. Verrenkungen im Schultergelenk, Verrenkungen des Oberarms. Luxationes humeri	719
I. nach Vorn	722
II. nach Hinten	728
4. Ellenbogen-Verrenkungen, Verrenkungen des Vorderarms. Luxationes antibrachii	742
A. Verrenkungen beider Vorderarmknochen	744
a) Verrenkungen beider Vorderarmknochen nach Hinten	744
b) Verrenkungen beider Vorderarmknochen nach Vorn	749
c) Seitliche Verrenkungen beider Vorderarmknochen	753
d) Verrenkungen beider Vorderarmknochen nach verschiedenen Richtungen. Divergirende Ellenbogen-Verrenkungen	758
B. Verrenkungen eines der beiden Vorderarmknochen im Ellenbogengelenk	761
a) Verrenkungen der Ulna (nach Hinten)	761
b) Verrenkungen des Radius im Ellenbogengelenk	762
α) Verrenkungen des Radiusköpfchens nach Vorn	762
β) Verrenkungen des Radiusköpfchens nach Hinten	769
γ) Verrenkungen des Radiusköpfchens nach Aussen	770
5. Verrenkungen im unteren Cubito-Radial-Gelenk, Verrenkungen des Köpfchens der Ulna	771
6. Verrenkungen der Hand (des Carpus)	772
7. Verrenkungen einzelner Handwurzelknochen	777
8. Verrenkungen des Mittelbandknochens des Daumen	778
9. Verrenkungen der ersten Phalanx der Finger	779
Verrenkungen der ersten Phalanx des Daumen	780
10. Verrenkungen der zweiten und dritten Phalanx	786
d) Verrenkungen an der unteren Extremität	786
1. Verrenkungen des Oberschenkels, Verrenkungen im Hüftgelenk. Luxationes femoris s. coxae	786
2. Verrenkungen der Kniescheibe	810
3. Verrenkungen des Unterschenkels	814
Unvollkommene Verrenkung des halbmondförmigen Zwischengelenk-Knorpels	819

	Seite
4. Verrenkungen des Wadenbeins	820
5. Verrenkungen des Fusses, der Fusswurzel vom Unterschenkel, des Unterschenkels gegen den Fuss, Bruchverrenkungen im Fussgelenk	821
6. Verrenkungen des Talus	826
7. Verrenkungen des Fersenbeins, — zwischen dem Talus und dem übrigen Fuss. Luxationes sub talo	833
8. Verrenkungen der übrigen Fusswurzelknochen	835
9. Verrenkungen des Mittelfusses von der Fusswurzel	836
10. Verrenkungen der Zehen	838
Neunter Abschnitt. Von den Krankheiten der Sehnscheiden und Schleimbeutel	841—857
Erstes Capitel. Krankheiten der Sehnscheiden	841
1. Entzündungen der Sehnscheiden	841
2. Chronische Ausdehnung der Sehnscheiden, Ueberbein	845
3. Fungus der Sehnscheiden	851
Zweites Capitel. Krankheiten der Schleimbeutel	852
1. Verletzungen der Schleimbeutel	852
2. Entzündungen der Schleimbeutel und deren Folgen	853
Hygroma	854
Zehnter Abschnitt. Von den Krankheiten der Muskeln und Sehnen	858—916
Erstes Capitel. Von den Verletzungen der Muskeln und Sehnen	858
I. Wunden der Muskeln und Sehnen	858
II. Verrenkungen der Muskeln und Sehnen	865
Zweites Capitel. Von der Entzündung der Muskeln und Sehnen	866
Drittes Capitel. Von der Verkürzung der Muskeln. Contractura	870
Viertes Capitel. Von dem Krampf der Muskeln. Spasmus	878
I. Mimischer Gesichtskrampf. Spasmus facialis. Tic convulsif	878
II. Halsmuskelkrampf	881
III. Schreibekrampf und ähnliche Krampf-Formen	882
Fünftes Capitel. Von den Lähmungen der Muskeln. Paralyse	884
I. Die spinale Lähmung der Kinder	884
II. Peripherische Lähmungen	894
1. Lähmungen durch mechanische Behinderung der Muskelthätigkeit	894
2. Traumatische Lähmungen	896
3. Lähmungen durch Unterbrechung der Circulation	901
4. Rheumatische Lähmungen	902
5. Bleilähmungen	904
6. Hysterische Lähmungen	907
Sechstes Capitel. Von der progressiven fettigen Muskelatrophie	911
Siebentes Capitel. Von den Neubildungen in den Muskeln	915

Zweites Buch.

**Von den chirurgischen Krankheiten
der einzelnen Gewebe.**



Erster Abschnitt.

Von den chirurgischen Krankheiten der Haut¹⁾.

Erstes Capitel.

Entzündungen der Haut und deren Ausgänge.

I. Erythem und Intertrigo.

Während von der Hautentzündung (Dermatitis) im Allgemeinen Alles gilt, was von der Entzündung überhaupt, und besonders von den Verbrennungen gelehrt wurde, verdient die oberflächliche Hautentzündung aus äusseren Ursachen (Erythema) wegen ihrer häufigen Verwechslung mit der Rose (Erysipelas) eine besondere Erwähnung. Das Erythem charakterisirt sich durch eine oberflächliche Röthe, eine dem Grade der Entzündung entsprechende Schmerzhaftigkeit und das Fehlen jeglicher Störung des Allgemeinbefindens, wenn diese nicht durch seine zu grosse Ausdehnung bedingt wird. Es fehlen bei ihm die Anschwellung, der eigenthümliche Schmerz und das Fieber, welche bei der Rose auftreten. Der Verlauf des Erythems ist meist schnell, immer gutartig.

Eine nicht selten auftretende Varietät des Erythems ist

das Wundsein, Frattsein, Intertrigo.

* **Aetiologie.** Intertrigo entsteht vor Allem, wenn zwei Hautflächen in andauernde oder doch häufige Berührung mit einander treten.

¹⁾ Als der Untersuchung durch den Gesichts- und Tastsinn zugänglich, sollten die Hautkrankheiten eigentlich sämmtlich in das Gebiet der Chirurgie gehören. Jedoch werden, hergebrachter Maassen, nicht blos alle fieberhaften, mit Ausnahme des Erysipelas, sondern auch die chronischen Hautausschläge, obgleich zu ihrer Behandlung doch wesentlich äussere Mittel nothwendig sind, der inneren Therapie zugetheilt. — Vergl. Hebra's Bearbeitung der „acuten Exantheme und Hautkrankheiten“ in Virchow's specieller Pathologie und Therapie, Bd. III. (Erlangen, 1860), auf welche wir ein für alle Mal verweisen.

Vorzugsweise sieht man es bei Kindern und bei Fettleibigen: unterhalb der weiblichen Brust, in der Achselhöhle, in der Leistengegend, an dem oberen Theile der Schenkel, an den Hinterbacken. Die verschiedenen Arten der Schleim- und Eiterflüsse, auch Harn, Fäces, Thränen, Cataplasmata und andere feuchte Umschläge verursachen Erythem, wenn sie längere Zeit mit der Haut in Berührung bleiben; ebenso Reibungen der Haut (beim Marschiren besonders in warmer Jahreszeit, beim Reiten), Druck durch längeres Liegen in derselben Stellung, auch dauernde Anspannung der Haut.

Symptome. Eine serös-eitrige, schwach riechende Flüssigkeit wird von der gerötheten Fläche abgeschieden, und es stellt sich lebhaftes Jucken ein. Dauern die Ursachen fort, so bilden sich Risse in der Epidermis, Schrunden (Rhagades), welche vorzugsweise zwischen den Zehen, neben den grossen Schaamlippen, an der Vorhaut, am Halse, an der Brustwarze zum Vorschein kommen. Mitunter macht sich eine geringfügige Erhebung der Epidermis bemerkbar (Hitzblatter), was dazu geführt hat, ein Erythema tuberculatum und nodosum anzunehmen. Das Erythem kann chronisch werden bei Arbeitern, welche mit faulendem Harne wollene Zeuge von Fett reinigen, bei Maurern, Bergleuten, Schmieden, deren Anfangs rothe Hände späterhin trocken werden, sich abschilfern und bersten. An schlecht beschuhten Flüssen, an dicken Lippen, die der Kälte ausgesetzt sind, an den Brustwarzen der Frauen, welche zum ersten Male säugen, am Afterrande nimmt das Erythem oft die chronische Form an, verbindet sich hier alsbald mit kleinen Schrunden, und allmählig gehen daraus längliche Geschwüre hervor, welche lebhafte Schmerzen verursachen.

Die **Prognose** ist im Allgemeinen günstig. Selbst wenn das Erythem zu Oedem oder zu anderen bedeutenderen Krankheiten hinzutritt, bleibt die Bedeutung desselben an sich eine geringfügige. Das acute Erythem ohne Complication, welches ohne Fieber auftritt, heilt von selbst vor Ablauf der zweiten Woche, ja nicht selten in 8 Tagen. Dagegen werden Intertrigo und Schrunden an manchen Stellen, namentlich an der Brustwarze und am Afterrande, zu höchst lästigen und schwer heilbaren Uebeln.

Die **Behandlung** des Erythems muss vor Allem das ätiologische Moment berücksichtigen, d. h. die Haut vor denjenigen Schädlichkeiten bewahren, welche das Erythem hervorgerufen haben und unterhalten; aber leider ist dies nicht immer möglich. Zur Linderung der Schmerzen dienen kalte Umschläge oder indifferente Bedeckungen, wie bei Verbrennungen.

Bei Intertrigo muss man die Berührung der leidenden Haut-

stellen mit einander hindern. Zu diesem Behuf bringt man indifferente Substanzen zwischen sie, die jedoch keinen Druck verursachen dürfen. Das Aufstreuen von Semen Lycopodii, Stärkemehl (*poudre de riz*) u. dgl., das Aufstreichen von Zinksalbe, das Einlegen von Watte, von Leinwandläppchen oder Charpie, die mit Ung. Zinci bestrichen sind, Umschläge mit Bleiwasser oder Lösungen des schwefelsauren Zinks u. s. f. sind zu empfehlen, vor Allem aber grösste Reinlichkeit.

II. Rose, Rothlauf, Erysipelas.

Viele Entzündungen haben Neigung, sich zu begrenzen, andere dringen in die Tiefe, befallen die Organe vorzugsweise ihrer Dicke nach, und verursachen, indem sie dieselben durchdringen, tief greifende Verschwärungen; andere wiederum haben eine ausgesprochene Tendenz, sich nach der Fläche zu verbreiten. Die Rose ist der Typus dieser letzteren. Wenn solche diffuse Entzündungen blos die äussere Haut befallen, so ist ihre Bedeutung wesentlich von der Ausbreitung abhängig, dagegen werden sie schnell verderblich, sobald sie sich auf den serösen oder mucösen Häuten entwickeln, oder wenn sie das Bindegewebe ergreifen; in diesem letzteren Falle werden sie mit besonderen Namen, als phlegmonöses Erysipelas, Pseudoerysipelas, Phlegmone diffusa benannt.

Nächst der Neigung, sich auf der Hautoberfläche weiter zu verbreiten, sind für Erysipelas charakteristisch: die rosige Röthe, welche unter dem Fingerdrucke verschwindet, ein leichtes Anschwellen des subcutanen Bindegewebes, der cyclische Verlauf mit meist lebhaftem Fieber und mit dem gewöhnlichen Ausgang in Zertheilung unter Abschuppung der Epidermis.

Da die Rose oft zu Wunden, sowohl zufälligen, als absichtlich durch operative Eingriffe veranlassten, hinzutritt, so muss der Chirurg besonders genau mit ihr vertraut sein.

Aetiologie. In jedem Lebensalter, bei jedem Temperament, an allen Theilen der Körperoberfläche kommt Erysipelas vor; jedoch befällt es am Häufigsten den Kopf, so dass auf 20 Fälle von Kopfrosee etwa ein Fall von Erysipelas an anderen Körpertheilen kommt. Alle directen Ursachen der Hautentzündung können Erysipelas hervorrufen; aber niemals wird es durch sie allein bedingt: es gehören dazu noch jene eigenthümlichen Einflüsse, welche man als „prädisponirende Ursachen“ oder „Krankheitsanlagen“ bezeichnet hat, und die häufig als Complication der Wunden und Eiterungen auftreten. Ob in Fällen der letzteren Art eine septische oder purulente Infection als Grund

des Erysipelas anzusehen sei, ist nicht sicher erwiesen. Jedenfalls lassen sich die nicht ganz seltenen Fälle von Erysipelas habituale in dieser Weise nicht erklären.

Rein localen Ursprungs scheint die Zahnrose (*Erysipelas odontalgicum*) und die ihr analoge Ohrrose (*Erysipelas otalgicum*) zu sein, von denen erstere bei Entzündung und Caries der Zähne und ihrer Umgebungen, letztere bei Entzündungen des äusseren Gehörganges vorkommt.

Am Häufigsten tritt das Erysipelas auf im Frñhjahre und im Herbst; diese Thatsache allein weist schon darauf hin, dass gewisse atmosphärische Verhältnisse die Entwicklung desselben begünstigen. Noch andere Zustände, — ein eigenthümlicher zeitweise herrschender Krankheitscharakter — lassen die Rose häufig in einer so grossen Anzahl von Fällen gleichzeitig auftreten, dass sie zu einer epidemischen Krankheit wird. Zu solchen Zeiten und unter solchen Umständen kann die unbedeutendste Operation, der Stich eines Blutegeks, Veranlassung zum Erysipelas geben. In Hospitälern kann eine solche Epidemie die furchtbarsten Verheerungen anrichten. Zuweilen tritt es mehr oder weniger häufig auch in der Stadt auf, wenn es in einem der grossen Krankenhäuser herrscht; es kommt aber auch vor, dass es auf ein Krankenhaus beschränkt bleibt und somit fast einen endemischen Charakter anzunehmen scheint.

Die Ansicht, dass das Erysipelas ansteckend sei, zählt ihre Anhänger in England (Arnolt, Gibson, Bury, Lawrence). Sie wird bekämpft durch Alibert, Bayer, Biet, Chomel und unzählige Andere. Die Vertheidiger eines Contagiums bringen hier ebenso wenig, wie bei anderen Fragen über die contagiöse Verbreitung einer Krankheit in Anschlag, dass Personen, welche gleichzeitig von einer und derselben Krankheit befallen werden, sich in der Regel auch unter gleichen äusseren Einflüssen befinden.

Dass verschiedene psychische Affecte (namentlich Schreck) auf die Entstehung des Erysipelas Einfluss haben, wird allerdings zuversichtlich behauptet, ist aber nicht erwiesen.

Zu allen Zeiten hat man ferner den Verdauungsapparat als Sitz des „Fermentes“ dieser Krankheit bezeichnet. Bald sollte eine Reizung dieses Apparates an irgend einem Punkte der Haut sich reflectiren, bald die „Saburra“ sich mit dem Blute mischen und so die Veranlassung geben zu der erysipelatösen Entzündung u. dgl. m. Sicher ist nur, dass der Verdauungsapparat oft leidet, sowohl vor, als während der Krankheit, aber nicht mehr und nicht minder, als bei anderen fieberhaften Leiden. Daher hat man denn auch schwer verdauliche Nahrungsmittel, in Zersetzung begriffenes Fleisch, verdorbene Fische und Muscheln, Gewürze, geistige Getränke u. dgl. m. als Veranlassung bezeichnet.

Dysmenorrhöe und Amenorrhöe treten mitunter* gleichzeitig mit Erysipelas auf; unter solchen Verhältnissen sieht man namentlich die Gesichtsrose in manchen Fällen fast regelmässig sich in jedem Monate wiederholen. Beobachtungen dieser Art führten zu der Annahme eines periodisch auftretenden Erysipelas.

Rayer erwähnt eines intermittirenden Erysipelas, welches mit neuralgischen Schmerzen im Gesichte wiederkehrte; aber weder Zahl noch Genauigkeit der vorliegenden Beobachtungen berechtigten zu der Aufstellung eines solchen. Die wandernde Rose (vgl. pag. 8) hat hier wohl eine Täuschung veranlasst, indem man eine Verletzung des Uebels für intermittirendes Auftreten genommen hat.

Symptome. Ausgang. Sehr constant gehen dem Erysipelas allgemeine Störungen voraus. Bei Abwesenheit derselben darf man schliessen, dass das Erysipelas in geringer Ausdehnung auftreten werde oder ein habituelles sei. Die Gruppe dieser Erscheinungen ist schon von Hoffmann als „Rothlauffieber“ bezeichnet worden; sie weichen übrigens nicht ab von denen des Stadium prodromorum vieler anderer acuter Krankheiten, nur dass bei der Rose im Allgemeinen gastrische Symptome vorherrschen. Schüttelfrost, heftiger Kopfschmerz, bitterer Geschmack, belegte Zunge, Neigung zum Erbrechen, auch wirkliches Erbrechen, Schmerz in der Magengegend, Gliederschmerzen, grosse Mattigkeit, frequenter Puls, erhöhte Temperatur (bis über 41° C.) gehen jedem irgend erheblichen Erysipelas voraus. Als Vorläufer zeigen sich ferner Empfindungen des Brennens oder der Steifigkeit an der Stelle der Haut, die ergriffen wird, oder in der Nähe derselben auch schmerzhaftes Anschwellen der Lymphdrüsen am Halse, in der Achsel, in der Leistengegend, je nach der Localisation der Rose.

Zwei, seltener drei oder gar vier Tage nach dem Beginne dieser Vorboten treten Symptome auf, welche den Charakter der Krankheit nicht mehr zweifelhaft lassen. Die Anschwellung ist besonders stark ausgeprägt, wenn das Erysipel die Augenlider oder das Scrotum ergriffen hat. In allen Fällen sind die Grenzen derselben weniger vermittelt des Gesichtssinnes, als durch das Gefühl zu erkennen. Sie tritt vorwiegend stark an derjenigen Seite auf, gegen welche das Erysipel später fortschreitet. Die Röthe spielt etwas in's Gelbliche, seltener ist sie bläulich, sie verschwindet unter dem Drucke, um nach Aufhebung desselben sogleich wieder zu erscheinen. Das Gefühl einer brennenden, kochenden Hitze macht den Schmerz lebhaft und stechend, wodurch er sich leicht von den Schmerzen unterscheidet, die durch eine andere Entzündung verursacht werden. Die Symptome steigern sich bis zum dritten oder vierten Tage, und bleiben fast ebenso lange auf der Höhe ihrer grössten Entwicklung stehen.

In Folge der Entzündung der Haut treten sofort Veränderungen der Epidermis und aller zu ihr gehörigen Gebilde (namentlich auch der Haare) auf; ihre Ernährung (Neubildung) wird schon mit dem Beginn der Krankheit unterbrochen; daher das glänzende, runzelige Ansehen derselben, zuletzt ihre Abstossung und, wo es sich um behaarte Theile handelte, namentlich im Bereich des Schädels, Ausfallen der Haare, — mit regelmässiger Reproduction. Wenn bei grosser Heftigkeit des Processes zwischen Cutis und Epidermis seröse Flüssigkeit ergossen wird, so erheben sich kleinere oder grössere Blasen; diese vervielfachen sich, verschmelzen zuweilen und brechen bald auf; die aussickernde Flüssigkeit trocknet ein zu harten Krusten, die Anfangs gelblich, später braun werden und oft mehrere Millimeter dick sind, — Blasenrose, Blatterrose, *Erysipelas bullosum*.

Der Uebergang in Eiterung oder in Brand ist selten. Der gewöhnliche Ausgang ist in Zertheilung; man kann diesen vorher sagen, wenn die Symptome in ihrer höchsten Entwicklung nicht über den vierten Tag hinaus bestehen bleiben. Allmählig verschwinden Schmerz, Röthe und Hitze; die Geschwulst bleibt länger, ja ist zuweilen sehr hartnäckig. In solchen Fällen darf man eine begleitende Entzündung des darunter liegenden Bindegewebes voraussetzen, und eine beschränkte Eiterung erwarten. Solche leichte Eiterungen, wie sie bei *Erysipelas verum* an einzelnen begrenzten Stellen, namentlich an den Augenlidern aber auch an der behaarten Kopfhaut ohne weitere Zufälle vorkommen, darf man nicht mit *Phlegmone diffusa* verwechseln. Vgl. d. folgd. Abschnitt.

Häufig verbreitet sich das *Erysipelas* von der zuerst ergriffenen Stelle aus über einen mehr oder weniger grossen Theil der Körperoberfläche, bald in der Art, dass mit dem Nachlass an der einen Stelle die weitere Verbreitung gegen die Nachbarschaft gleichen Schritt hält, bald auch stetig fortschreitend. Man nennt dies die wandernde oder Wander-Rose, *Erysipelas ambulans, migratorium, repens*.

Wenn die am Meisten hervorstechenden, örtlichen Erscheinungen nach ihrem ersten Auftreten sogleich wieder verschwinden, ohne an anderen Stellen der Haut sich von Neuem zu zeigen, so nennt man dies „Zurücktreten“. War das *Erysipel* nur wenig entwickelt, so hinterlässt es nach dem Zurücktreten ein hartnäckiges Oedem. Bei grosser Heftigkeit der Krankheit hat man, wenn der Process auf der Haut plötzlich erlosch, oft eine Entzündung innerer Organe, namentlich des Gehirns beim Zurücktreten der Kopfrose beobachtet. Da aber innere Entzündungen, namentlich Meningitis — ganz abgesehen

von localen Veranlassungen — im Verlauf des Erysipels vorkommen, ohne dass die Erkrankung der Haut plötzlich aufhört, so bleibt es zweifelhaft, ob in solchen Fällen wirklich von einer Metastase im Sinne der älteren Pathologie die Rede sein kann. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die innere Entzündung durch den von ihr abhängigen Collapsus erst das Erysipelas zum Schwinden bringt.

Die Fiebersymptome, welche das Herannahen des Erysipelas anzeigt haben, begleiten es auch; sie treten in dem Maasse stärker hervor, als die Entzündung fortschreitet, und verschwinden nach Ablauf derselben. Hiernach leuchtet ein, dass von einer bestimmten Zeitdauer der Rose im Allgemeinen nicht gesprochen werden kann. An der zuerst befallenen Hautstelle dauert der Process in der Regel nur bis zum 4. Tage; da aber ganz gewöhnlich mehrmals neue Bezirke befallen werden, so verlängert sich der Gesamtverlauf um ebensoviel mal 4 Tage, als neue Ausbrüche erfolgt sind. Die sehr verbreitete Annahme, dass die Rose 7 oder 14 Tage dauere, hat ihren Grund darin, dass die örtliche Verbreitung ganz gewöhnlich nur dreimal 24 Stunden ohne Unterbrechung fortschreitet und weitere Nachschübe, wenn überhaupt, erst nach 3 bis 4 Tagen erfolgen. Das Erlöschen der Rose wird örtlich durch deutliche Abschuppung der Epidermis bezeichnet.

Anatomische Veränderungen. Bei Subjecten, welche den Folgen eines Erysipelas erlagen, fand Louis die Haut hart, dick und zerreiblich¹⁾. Nach Chomel und Blache löst sich die Epidermis an der ergriffenen Stelle leicht ab; der Fingerdruck bewirkt auf derselben eine mehr oder weniger deutliche Vertiefung; eine braune Farbe ist an die Stelle der rothen getreten, welche man bei dem Lebenden wahrnahm. Ribes giebt an, dass die kleinen Venen der Haut mehr entzündet seien, als die kleinen Arterien und Lymphgefäße: die Folge davon wäre endlich Phlebitis suppurativa²⁾. Rayet konnte bei seinen Untersuchungen diese Veränderungen nicht finden, und meint, dass sie nur in den Gefässen, die unter der Haut liegen, wahrnehmbar sein könnten, denn die im Papillarkörper verlaufenden seien zu fein, als dass an ihnen die Entzündung (mit blossem Auge) nachgewiesen werden könne. Die „Mitleidenschaft der Venen des Unterhautzellgewebes,“ sagt Rayet, „findet nicht immer Statt, und der in ihnen enthaltene Eiter kann von ihnen aufgesogen worden sein.“ Wahrscheinlich ist es, dass Ribes seine Beobachtungen an Subjecten gemacht hat, welche in Folge eines in dem Bindegewebe

¹⁾ Vgl. Lepelletier, *Traité de l'Erysipèle*, Paris 1836.

²⁾ *Mémoires de la Société médicale d'émulation*, Bd. VIII.

verbreiteten Erysipelas gestorben waren. — Nach Blandin wäre das Erysipelas eine zusammengesetzte Entzündung der Haut und der Lymphgefäße der ergriffenen Stelle: Entzündung der Haut ohne eine entsprechende Lymphgefäßentzündung wäre Erythem. Die traumatische Rose ist, nach ihm, charakterisirt durch das Vorherrschen der Lymphgefäßentzündung. Das Auftreten des Erysipels ist, nach Blandin, örtlich bezeichnet durch Anschwellung derjenigen Lymphdrüsen, in welche die Lymphgefäße des Theiles eintreten, der kurz darauf geröthet erscheint, im Allgemeinbefinden aber durch eine eigenthümliche Störung des Gemeingefühls. Das Erysipelas würde demnach nur durch die Entzündung der Lymphgefäße gefährlich sein. Wenn es nicht schnell in Zertheilung ende, so würden typhusartige Zufälle, wie bei anderen Lymphgefäßentzündungen, auftreten. Das Erysipelas breite sich aus, indem es den Lymphgefäßnetzen der Haut und des Unterhautzellgewebes folge, es sei seinem Wesen nach wandernd, weil es eine Eigenthümlichkeit der Gefäßentzündungen ist, sich auszubreiten. Die Verbreitung des Erysipelas erfolge in den meisten Fällen gegen die Mitte des Körpers hin, weil auf diesem Wege die Lymphgefäßentzündung gemeiniglich fortschreitet. — Es unterliegt gewiss keinem Zweifel, dass mit dem ganzen Gewebe der Lederhaut beim Erysipel auch die in demselben verlaufenden Lymphgefäße erkranken; aber eine spezifische Beziehung der Rose zu den Lymphgefäßen ist nicht erwiesen.

Mikroskopische Untersuchungen der von Erysipelas befallenen Theile sind erst in neuester Zeit von R. Volkmann und Steudener bekannt gemacht worden. Dieselben berichten darüber Folgendes¹⁾. „Es tritt eine acute, massenhafte und sehr ausgebreitete Emigration weisser Blutkörperchen ein, so dass Cutis und subcutanes Zellgewebe, auf der Höhe der erysipelatösen Entzündung untersucht, eine exquisite kleinzellige Infiltration darbieten, und trotz der Flüchtigkeit der Affection und der Schnelligkeit, mit welcher local die Störung wieder ausgeglichen zu werden pflegt, das mikroskopische Verhalten der erysipelatösen Hautpartien fast genau dasselbe ist, wie bei den bösarigsten Formen acuter progredienter Bindegewebeiterungen, z. B. Pirogoff's acut-purulentem Oedem.“

„Erhärtet man Erysipelas-Haut in Alkohol und fertigt feine senkrechte Durchschnitte, so fällt allerdings in den obersten Schichten der Cutis die starke Dilatation der Gefäße sehr in die Augen. Die natürliche Injection lässt sie ganz in den Vordergrund treten. Die Papillen werden von den in ihnen aufsteigenden Capillarschlingen fast

¹⁾ Centralblatt der med. Wissensch., 1866, No. 36.

ganz erfüllt. Aber bei genauer Betrachtung sieht man schon diese Gefässe von einer reichlichen Zahl feiner granulirter Zellen begleitet, die vollkommen das Aussehen von weissen Blutzellen oder Eiterkörperchen haben, oft deutlich reihenweis zu den Seiten des Gefässes angeordnet sind, und sich bald vereinzelt, bald dichter gedrängt von hier aus in das Gewebe der Cutis vorschieben. Immerhin ist in den oberen Lagen der Cutis die kleinzellige Infiltration nur eine spärliche. Je mehr man aber bei der Untersuchung in die Tiefe vordringt, desto reichlicher wird sie. Schon in den tieferen Schichten noch der Cutis selbst, deren Cohärenz hier eine viel geringere ist, stösst man auf grosse compacte Lager oder breite, die Gefässe verdeckende Bänder von weissen Blutzellen, und nicht selten auf grosse Strecken, wo die kleinen granulirten Elemente, dicht aneinander gedrängt, das ganze Gesichtsfeld bedecken. Zuweilen bilden sie auch ei- oder spindelförmige Gruppen, die an eine Proliferation der Bindegewebskörperchen denken lassen könnten. Doch erkennt man in ihrem Centrum hie und da deutlich den Querschnitt eines Gefässes, und zeigen die Bindegewebskörperchen selbst nirgend wesentliche Veränderungen und namentlich keine Kerntheilungen, höchstens dass einmal das eine oder das andere eine leichte feinkörnige Trübung darbietet. So sehr man aber bisher das Erysipelas als eine ganz an der Oberfläche verlaufende Entzündung zu betrachten gewohnt war, so finden sich doch die stärksten Veränderungen erst im subcutanen Zell- und Fettgewebe. Hier sind die Gefässe überall von den kleinzelligen Elementen vollkommen verdeckt und statt der zwischen den einzelnen Fettzellengruppen sich hindurchziehenden Bindegewebssepta zeigt sich nur ein breites Netzwerk aus granulirten Zellen, die sich noch überall zwischen die einzelnen Fettzellen hineinschieben.“

„Allein sobald die Haut am 2. oder 3. Tage erblasst, beginnt ein rascher Zerfall der ausgewanderten Elemente. Namentlich im Unterhautzellgewebe findet man dann sehr rasch weiter nichts, als in feinkörnigem Zerfall begriffene Zellenmassen; wenige Stunden darauf vielleicht nur noch feinkörnigen Detritus. Nur in den oberen Schichten der Cutis stösst man zuweilen auch auf Lymphgefässe, die dicht gedrängt mit den gleichen granulirten Zellen erfüllt sind oder in deren Umgebung sich diese Zellen anzuhäufen beginnen. Es mag daher sein, dass vielleicht zu einem kleinen Theile die ausgewanderten Elemente wieder durch die Lymphwege aufgenommen werden. Aber die Mehrzahl geht zu Grunde, und am Auffallendsten ist die Rapidität des Processes. Am 3. oder 4. Tage schon kann an den erkrankt gewesenen Hautpartien kaum noch irgend etwas aufzufinden sein, was auf

die lebendige Action der jüngst verflossenen Stunden hindeutete. Und wahrscheinlich besteht der Hauptunterschied dieses Processes von der Eiterung nur darin, dass es sich hier nur um einen einzigen, ganz acuten Zellenschub handelt. Als anatomische Unterschiede von der beginnenden diffusen Bindegewebeiteirung wüssten wir nur die gänzliche Integrität des eigentlichen Parenchyms der Gewebe, das Fehlen des Zerfalls der Fettzellen und der Schmelzung der Intercellularsubstanz anzugeben.“

Ein ähnlicher Befund wird durch das Mikroskop vielleicht bei jeder Hautentzündung zu gewinnen sein. Jedenfalls dürfte er für Erysipelas nicht specifisch sein, wodurch freilich seine Bedeutung für das Verständniss der entzündlichen Vorgänge in den betreffenden Gebilden im Allgemeinen nicht geschmälert wird.

Die **Prognose** ist abhängig von der Ausbreitung und dem Sitz der Krankheit, auch von dem Charakter der Epidemie, sofern es sich um epidemisches Erysipelas handelt. Je grösser die befallene Hautoberfläche, je näher dem Gehirn, desto übler die Prognose. Bedenklich ist es immer, wenn bei dem von Erysipelas Ergriffenen zugleich eine andere Krankheit besteht; alsdann hängt freilich der Grad der Gefahr wesentlich von dieser begleitenden Krankheit ab. Ein in dem letzten Stadium der Schwindsucht auftretendes Erysipelas ist der Vorbote baldiger Auflösung. Tritt es zu einer Wunde, so ist es niemals leicht zu nehmen; die Heilung per primam wird jedenfalls dadurch gestört, eine schon bestehende Eiterung verschlechtert, indem die Granulationen ödematös werden und zum Theil absterben. Daraus gehen dann, ganz abgesehen von den Gefahren des Fiebers, bei grossen Verletzungen neue Gefahren hervor.

Behandlung. Erysipelas kann ohne Kunsthülfe heilen. Der Beweis hierfür wird nicht nur von Aerzten geliefert, welche diese Krankheit rein expectativ behandeln, sondern auch durch die grosse Zahl von Heilungen, welche unter dem Einfluss der verschiedensten Mittel ohne wesentliche Differenz der Krankheitsdauer erzielt werden.

Da das Erysipelas unter gastrischen Störungen beginnt und die Kranken in allen bedeutenderen Fällen eine entschiedene Neigung zum Erbrechen haben, so wurde bis auf die neueste Zeit fast allgemein im Beginne des Rothlaufs ein Emeticum, späterhin aber ein kühlendes, säuerliches Purganz gegeben. Bei einer solchen Behandlung fühlen die Kranken sich in der Regel erleichtert; aber einen weiteren Einfluss auf den Verlauf der Krankheit kann ich dieser Behandlungsweise, die ich selbst früher viele Jahre geübt und empfohlen habe, nach zahlreichen Erfahrungen, nicht zugestehen.

Diejenigen, welche das Wesen der Krankheit in einer von ande-

ren Störungen ganz unabhängigen Entzündung suchen, empfehlen entweder mit Blandin, im Anschluss an seine oben entwickelte Theorie, die Application zahlreicher Blutegel in der Gegend der Lymphdrüsen, zu welchen die Lymphgefäße des von der Rose befallenen Theils verlaufen, oder die Anwendung von Blutentziehungen aus dem ergriffenen Hautstücke, auch Aderlässe, oder endlich die Anwendung kühlender, adstringirender, comprimirender Mittel auf den leidenden Theil. Unter den letzteren haben sich besonders die Auflösung des schwefelsauren Eisens ¹⁾ und das Collodium ²⁾ eines mehrseitigen Beifalls zu erfreuen gehabt. Wenige mögen wohl noch daran glauben, dass man der wandernden Rose durch einen mit Höllenstein gezogenen Strich ein unüberwindliches Hinderniss entgegensetzen könne ³⁾. Auch das von Lücke ⁴⁾, in der Idee, die in die Cutis eingedrungenen infectiösen Stoffe unschädlich zu machen empfohlene Aufstreichen von Terpenthinöl auf die von der Rose ergriffenen Hautflächen hat sich nur in leichteren Fällen bewährt, in denen die Rose vielleicht überhaupt keine Neigung zu grösserer Ausbreitung hatte.

Am Besten möchte es sein, aller eingreifenden örtlichen Mittel sich gänzlich zu enthalten und den ergriffenen Theil nur durch Einhüllen in indifferente Stoffe (Watte, Bestreichen mit einer Mischung von Collodium und Mandelöl oder Collodium und Glycerin) vor Insultationen zu schützen. Die kühlenden und adstringirenden Mittel, namentlich das (von Hebra zuerst empfohlene) Auflegen von Eis und eiskalten Compressen, das (vom Vf. vielfach angewandte) Begiessen und Besprengen mit Aether vermögen den Krankheitsverlauf nicht abzukürzen, aber doch, wie mir scheint, die Intensität des Processes zu mindern und die Schmerzen erheblich zu besänftigen. Jedenfalls entbehrt die ältere Ansicht, dass durch sie ein Zurücktreten der Rose veranlasst werden könnte, jeder thatsächlichen Begründung. — Weniger empfehlenswerth sind starke und besondes allgemeine Blutentziehungen. Man entfärbt durch solche wohl die geröthete Haut, man verringert etwas die Anschwellung; aber dadurch geschieht der erysipelatösen Erkrankung selbst kein Einhalt und die Reconvalescenz des ohnehin

¹⁾ Nach Velpeau sollte eine Auflösung von 60 Grammen Ferrum sulphuricum auf 1 Kilogramm Wasser, als Umschlag auf die erysipelatöse Stelle zu Anfang angewandt, die Entzündung in 2 Tagen beseitigen.

²⁾ Zuerst von Spengler empfohlen, Deutsche Klinik 1850, pag. 395.

³⁾ Ich habe diesen unschuldigen Versuch vielmals ohne allen Erfolg wiederholt. Allerdings können aber einem Beobachter zufällig viele Fälle von Erysipelas ohne Neigung zur Ausbreitung schnell nacheinander vorkommen, in denen dies Mittel dann, wie viele andere (auch das sogenannte „Besprechen“) wirksam erscheint.

⁴⁾ Berlin. klin. Wochenschrift. 1868. No. 45.

durch das Fieber immer sehr geschwächten Kranken wird in bedenklicher Weise verzögert. — Ebensowenig ist für die gewöhnlichen Fälle von Erysipelas die Anwendung erregender Mittel (Kampher, nach Pirogoff) passend, während sie bei sehr elenden, schon anderweitig geschwächten Kranken nützlich und namentlich bei dem die wandernde Rose begleitenden schleichenden Fieber sogar dringend erforderlich sind. Solche Fälle erheischen denn auch Chinin und alkoholische Getränke und rechtfertigen die Portweinkuren der Englischen Aerzte. Im Uebrigen hat man in Betreff der zu gestattenden Speisen und Getränke die bei acuten entzündlichen Krankheiten vorgeschriebenen diätetischen Regeln zu befolgen. Den Durst lindert man durch säuerliche Getränke. Niemals darf man verabsäumen, für Darmausleerungen zu sorgen, besonders wenn das Erysipelas am Kopf sitzt.

Lässt sich eine versteckte Eiterung (sogen. Eiterverhaltung) als Quelle des Erysipelas entdecken, so muss man dem Eiter (nach den schon bekannten, allgemeinen Regeln) freien Abfluss verschaffen.

III. Gürtelrose, Gürtel, Zona, Zoster, Herpes Zoster.

Den Namen Zoster giebt man einer Entzündung der Haut, welche sich durch mehrere Gruppen oft in einander laufender Bläschen auszeichnet, die zusammen gleichsam einen Gürtel bilden, welcher meist halbkreisförmig, immer aber der Ausbreitung eines Gefühlsnerven folgend¹⁾, einen Theil des Körpers befällt.

Symptome. Verlauf. Ausgänge. Alle Körperstellen können der Sitz des Zoster werden; doch beobachtet man ihn meist am Rumpfe. Und nur am Rumpfe ist dem Zoster die Gürtelform eigenthümlich; am Kopf, am Halse und an den Extremitäten bildet er keinen Gürtel, weil an diesen Theilen die Bahnen der cerebrospinalen Nerven, denen er genau folgt, nicht halbkreisförmig verlaufen, wie am Rumpf. Im Gesicht ist die Eruption auf eine Gesichtshälfte beschränkt und entspricht den Verästelungen des Trigemini sowohl im Bereiche der äusseren Haut als auch der Schleimhäute, — Zoster facialis. Viele Fälle von sogen. Herpes labialis gehören hierher. Entspricht die Eruption den Hautästen des dritten Cervicalnerven, so entsteht der Zoster occipito-collaris, welcher sich über die eine Hälfte des Hinterhaupts, die hintere Fläche der Ohrmuschel und die

¹⁾ Vgl. v. Bärensprung, „die Gürtelkrankheit“. Annalen des Charité-Krankenhauses Bd. IX. (1860) pag. 40 und „Fernere Beiträge zur Kenntniss des Zoster“, ibid. Bd. X. (1862) pag. 37.

entsprechende Seite des Halses erstreckt. Als *Zoster cervico-subclavicularis* bezeichnen wir, nach v. Bärensprung, die der peripherischen Verbreitung des vierten Cervicalnerven entsprechende Eruption, welche im Nacken an der Grenze des Haarwuchses beginnt, an der Seite des Halses abwärts steigt und sich zur Schulter, zum oberen Theil der Brust, zuweilen auch zum unteren vorderen Theile des Halses ausbreitet. Im Bereich der vier unteren Hals- und des ersten Brustnerven erscheint der *Zoster cervico-brachialis*, der am Arm (als *Z. brachialis*) den Verbreitungen der Hautäste des Plexus brachialis folgt und somit keineswegs den Arm an irgend einer Stelle wie ein Armband umfasst, wie man dies früher irrthümlich nach Analogie des Verhaltens am Rumpf beschrieben hat. Hier ist nämlich, dem Verlaufe der Intercostalnerven entsprechend, die Form des Zoster regelmässig diejenige eines Halbkreises: *Zoster dorso-pectoralis* und *dorso-abdominalis* (nach v. Bärensprung). Folgt der Ausbruch den Verästelungen des zwölften Intercostal- und des ersten Lumbalnerven, so erstreckt er sich als *Zoster lumbo-inguinalis* vom Lendentheil der Wirbelsäule theils gegen die *Linea alba* schräg abwärts bis zu den Genitalien, theils gerade abwärts über das Gesäss und die äussere Seite des Oberschenkels (nach der Ausbreitung des *Ramus gluteus*). Der *Zoster lumbo-femoralis* folgt den Hautästen des zweiten bis vierten Lumbalnerven, verläuft also von der Wirbelsäule schräg über das Gesäss zur vorderen Fläche des Oberschenkels und von da bis zur inneren Seite der Wade. Seltener hat er nur im Bereich einzelner Hautäste des Schenkels seinen Sitz (*Z. femoralis*). Den Ausbreitungen der Sacralnerven endlich entspricht der *Zoster sacro-ischiadicus* und *sacro-genitalis*, deren Gebiet namentlich die Verästelungen des *N. pudendus* (*Z. genitalis*), des *N. cutaneus post. magn.* und die Hautäste des *Ischiadicus* bestimmen.

In einigen Fällen gehen dem Erscheinen des Zoster allgemeine Symptome voraus, ähnlich wie sie vor dem Auftreten des Erysipelas wahrgenommen werden; öfter fehlen diese, und der Ausschlag wird nur durch prickelnde, oft recht brennende, heftige Schmerzen angekündigt. Unregelmässige, ziemlich lebhaft geröthete Flecke treten bald an den Endpunkten auf, um sich durch zwischenliegende Flecke mit einander zu verbinden, bald verbreiten sie sich von einem Punkte der Mitte aus nach Vorn und nach Hinten. Auf den Flecken zeigen sich bald kleine, weisse Bläschen, die wie versilbert, durchsichtig sind, und innerhalb 3—4 Tagen fast den Umfang einer Erbse erreichen. Die Flecke röthen sich mehr, die Röthe erstreckt sich selbst einige

Millimeter über den Umfang der Bläschengruppen hinaus; nach 5 oder 6 Tagen scheint die in ihnen enthaltene Flüssigkeit sich einzudicken, und kann sogar, wenn die Entzündung heftig wird, das Aussehen wirklichen Eiters annehmen. Wenn die Bläschen von selbst nach dem zweiten bis zum vierten Tage aufbrechen, so sickert eine helle, geruchlose, seröse Flüssigkeit aus; die Epidermis löst sich ab, und die oberste Schicht der Cutis wird benetzt. Doch die Mehrzahl der Bläschen trocknet ein, und bedeckt sich mit kleinen braunen oder gelblichen Krusten, die in der Regel flach aufliegen, zuweilen auch hervorragend. Manche Bläschen gehen vor der Zeit zu Grunde, indem sie einsinken und verwehen, nachdem ihr Inhalt aufgesogen worden ist. Die verschiedenen Gruppen von Bläschen treten nicht gleichzeitig auf; während die älteren austrocknen, zeigen sich neue in den von ihnen offen gelassenen Zwischenräumen. Dies mag zur Annahme eines chronischen Zoster Veranlassung gegeben haben. Nach dem achten bis zum zwanzigsten Tage sind gewöhnlich alle Krusten abgelöst. Es bleiben dann nur Flecke von einem mehr oder weniger dunklen Roth übrig, die gleichfalls nach und nach verschwinden und selten Narben hinterlassen.

Wenn die Bläschen einer lebhaft entwickelten Zona zusammenfließen, so tritt die Beendigung nicht so rasch ein. Die Haut unter den Krusten geht in Verschwärung über, und die Vernarbung schreitet langsam vor. Am hinteren Theile des Rumpfes stirbt die Haut zuweilen in grösserer Ausdehnung ab, sei es in Folge der Entzündung, sei es in Folge des Druckes durch das längere Liegen; es bilden sich Schorfe, die zwar bei Weitem nicht immer die ganze Lederhaut durchdringen, jedoch erst nach mehr oder weniger langer Zeit abfallen. Die Narben dieser Verschwärungen sind unutilgar, wie die nach Verbrennungen dritten Grades.

Gewöhnlich lassen die allgemeinen Symptome bald nach; mitunter fehlen sie ganz. Ein stechender Schmerz hält bis gegen Ende der Krankheit an, bleibt wohl auch noch einige Wochen lang nach dem Verschwinden der Entzündung bestehen. Oft schwellen die zu dem leidenden Theile gehörigen Lymphdrüsen an. In einigen Fällen soll zugleich mit dem Zoster eine acute Entzündung derjenigen Eingeweide auftreten, welche unter der von der Zona eingenommenen Wandung liegen. Eine Combination mit Entzündung der Pleura wäre besonders zu beachten, da man den stechenden Schmerz der Zona zuschreiben und somit die Pleuritis übersehen könnte.

Sehr häufig macht sich eine ausgedehntere Neuralgie an der von der Gürtelrose ergriffenen Stelle bemerklich. So schmerzen z. B.

an der Brust die Intercostalnerven, am Bauche die Lumbalnerven; ist eine Extremität Sitz des Zoster, so werden verschiedene Hautäste derselben in Mitleidenschaft gezogen. Häufig besteht, nach Rayer, zugleich eine Affection des Magens und des Dünndarms. — Recidive des Zoster sind keineswegs selten.

Pathologische Anatomie. Eine genauere Untersuchung der Bläschen lässt sich ohne Nachtheil am Lebenden ausführen. Nach Entleerung der in ihnen enthaltenen serösen Flüssigkeit findet man, nach Rayer, eine an der Oberfläche des Gefässnetzes der Haut fest haftende Pseudomembran, welche nur bei eitriger Füllung der Bläschen fehlen soll. Diese sogen. Pseudomembran besteht aber in der That nur aus den aufgequollenen Zellen des Rete Malpighii. Sind diese abgelöst und in der Flüssigkeit suspendirt, so erscheint diese milchig, selbst eitrig. Die kleinen Gefässe, welche die Maschen der Lederhaut durchdringen, sind an Stellen, welche dem Sitz der entwickelten Bläschen entsprechen, stark injicirt. Unter den brandig gewordenen oder in Verschwärung übergegangenen Bläschen zeigt die Haut eine andere Beschaffenheit: sie ist erweicht und in verschiedener Tiefe und zuweilen in grosser Ausdehnung zerstört.

Aetiologie. Ein bestimmter Einfluss der Jahreszeiten auf das Vorkommen des Zoster lässt sich nicht nachweisen. Er ist weder contagiös, noch epidemisch.

Die Thatsache, dass der Zoster stets genau der Verbreitung bestimmter sensitiver (centripetaler) Nerven folgt, berechtigt zu der Annahme, dass in diesen auch der Grund für die Hautaffection selbst zu suchen sei. Wahrscheinlich handelt es sich (nach v. Bärensprung) um Reizungszustände des Ganglion der hinteren Wurzel eines Rückenmarksnerven (oder des Ganglion Gasseri), welche sich wesentlich im Gebiet der von diesen Ganglien ausgehenden trophischen Nerven geltend machen und auf diesem Wege die Hautentzündung erregen, andererseits aber auch, wenn die Reizung sich bis auf die hintere Wurzel selbst erstreckt, zu den bei Zoster so häufig beobachteten Neuralgien Veranlassung geben.

Diagnose. Zoster unterscheidet sich von Herpes durch die bedeutendere Grösse der Bläschen, die Tendenz zur Verschwärung (Rayer), am Meisten — durch die Anordnung der Bläschen. Nicht leicht möglich wäre eine Verwechslung des Gürtels mit Erysipelas. Die Bläschen-Gruppen des Gürtels sind scharf begrenzt und durch gesunde Hautstellen von einander getrennt, was bei dem Erysipelas bullosum nicht der Fall ist. Kaum denkbar (und doch vorgekommen) ist eine Verwechslung des Zoster mit Masern.

Prognose. Die Krankheit ist niemals von grosser Bedeutung; jedoch können bei alten Leuten Schrunden und gangränöse Zerstörungen folgen, welche Beachtung verdienen.

Behandlung. Wie bei der Rose, so hat man auch hier die antiphlogistische und ausleerende Methode angerathen. Das expectative Kurverfahren ist aber fast durchgängig vorzuziehen.

Narkotische Cataplasmata lindern vielleicht die Schmerzen, hindern aber die Eintrocknung der Bläschen, und begünstigen die Verschwärung. Beim Zusammenfliessen der Bläschen lässt die abgelöste Epidermis die Haut unbedeckt; dann muss man durch die geeigneten Mittel diese vor Reibungen schützen, wie bei Verbrennungen. Alten Leuten muss man besonders empfehlen, auf der gesunden Seite zu liegen, um Verschwärungen zu verhüten.

Unter allen örtlichen Mitteln ist das Betupfen mit Höllenstein am Meisten empfohlen (Serres). Das Betupfen selbst macht aber lebhaftere Schmerzen.

Die Heftigkeit der begleitenden Neuralgie kann zur Anwendung schmerzlindernder Mittel auffordern, die aber eben nur gegen diese gerichtet sind. Vgl. Krankheiten der Nerven.

IV. Blutschwär, Furunkel, Furunculus¹⁾

Der festeste Theil der Haut, die eigentliche Lederhaut, ist von Maschen durchsetzt, in welche kleine Fortsätze des Unterhautbindegewebes eindringen. Wenn diese letzteren sich entzünden, so werden sie an ihrer Ausdehnung gehindert, indem die Lederhaut Widerstand leistet; es entsteht auf diese Weise eine Einschnürung, in Folge deren die kleinen Bindegewebs-Kegel absterben²⁾. Wenn ein einziger derselben entzündet ist, so nennt man die Geschwulst „Blutschwär“, eine Gruppe solcher entzündeter Bindegewebs-Kegelchen heisst „Brandeschwär, Carbunculus“. Vgl. pag. 21.

Ursachen. Mit der Prädisposition zu Furunkeln soll es sich wie bei dem Erysipelas verhalten: Störungen in den Verdauungsorganen, schlechte Beschaffenheit der Nahrungsmittel u. dgl. m. werden vorzugsweise angeschuldigt, — hier, wie dort, ohne zureichenden Grund.

¹⁾ Bei den Franzosen „*clou*“, bei den Engländern „*boil*“.

²⁾ Es darf gewiss nicht in Abrede gestellt werden, dass Blutschwär auch von den Hauttalgdrüsen ausgehen können; dass sie aber immer in einer Entzündung dieser letzteren bestehen sollen (was Chelius behauptet), ist, wie die anatomischen Untersuchungen lehren, nicht richtig.

Reizende Salben, Unreinlichkeit, übermässige Reizung der Haut durch Bäder, namentlich Seebäder, so wie durch sogenannte Wasserkuren, Vesicatore, Haarseile, gewisse Ausschläge, wie z. B. Blattern, Krätze, können die Entwicklung der Blutschwäre begünstigen. Oft brechen sie hervor, ohne dass man die geringste Ursache für ihr Entstehen auffinden könnte. In einigen Fällen treten sie als Symptom einer inneren Krankheit auf; namentlich gegen Ende des Typhus, nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, als Krise, bei Pyämie, im Verlauf des Diabetes mellitus. Ohne nachweisbare Ursache erscheinen Blutschwäre besonders im Frühjahr und im Herbst. Sie sind in sumpfigen Gegenden häufiger, als in trockenen. Ob sie als ein Product der Sumpfluft und somit als in die Reihe der Malariakrankheiten gehörig zu betrachten seien, ist zweifelhaft. Sie kommen in jedem Lebensalter vor, und jede Constitution ist ihnen ausgesetzt.

Symptome. Verlauf. Ausgänge. Hinterbacken, Schenkel, Rücken, Nacken, die Seitenwandungen des Unterleibes sind vor anderen Stellen des Körpers häufig Sitz der Furunkel. Ein einziger kommt selten vor; in der Umgegend eines grösseren entwickeln sich gewöhnlich kleinere, oft in sehr grosser Anzahl. In manchen Fällen ist die Anzahl der Furunkel so gross, dass die Kranken kaum eine Stelle finden, auf der sie liegen und ausruhen könnten¹⁾. Ihre Grösse ist verschieden, übersteigt jedoch selten die eines Taubeneies. Boyer giebt an, dass einzeln auftretende Furunkel einen verhältnissmässig grösseren Umfang haben, bis zur Grösse eines Hühnereies. Sind mehrere Blutschwäre vorhanden, so ist einer immer viel grösser als die andern. — Nur wenn eine Anzahl grosser Furunkel auftritt, geht dem Ausbruch derselben schon Fieber vorher; dagegen fehlt es selten während der Entwicklung des Blutschwärs. Anschwellung der Lymphdrüsen (am Halse, in der Achselgrube, in der Leistenengegend) wird in der Regel beobachtet.

Wichtige Functionen können durch sie erschwert oder gehindert werden; so bedingt z. B. ein zwischen dem After und Hodensacke liegender stark entwickelter Furunkel Beschwerden bei der Harnentleerung; im äusseren Gehörgang sitzend, bewirkt er Taubheit und Ohrensausen; am Hals hindert er das Schlingen u. s. f.

Die Geschwulst fühlt sich hart und heiss an und hat die Gestalt eines Kegels; ihre Basis liegt tief unter dem Niveau der Haut, welche dagegen von der Spitze nur wenig überragt wird, weil die oberste Schicht der Lederhaut die festeste ist. Die Röthe ist hell oder spielt

¹⁾ Boyer, *Traité des maladies chirurgicales*. Tom. II. pag. 44. — Bis zu 300 auf ein Mal habe ich selbst beobachtet.

in's Violette; der Schmerz ist bohrend, aber, je nach dem Grade der Empfindlichkeit des Kranken und dem Sitze des Uebels, verschieden; Boyer versichert, dass Furunkel der Bauchwand die schmerzhaftesten seien.

Zwischen dem achten und zehnten Tage nach dem Beginne des Uebels spitzt sich gewöhnlich der höchste Punkt des Kegels zu, wird weich und berstet; eine serös-blutige Feuchtigkeit tritt aus, und die obere Fläche eines festen gelben Pfropfes wird sichtbar. Dieser Pfropf (Pflock) besteht, nach der älteren Ansicht, aus abgestorbenem Bindegewebe; neuere Autoren (Gendrin, Rokitansky) fanden ihn den Pseudomembranen gleich zusammengesetzt und bezeichnen ihn daher als einen Exsudatpfropf. Beide Ansichten haben ihr Recht; denn mit Hilfe des Mikroskops kann man darin ausser Eiterkörperchen immer ein amorphes fibrinöses Exsudat, gewöhnlich aber auch nekrotisches Bindegewebe nachweisen. Nach der ersten Durchbrechung der Haut zeigt sich eine kleine Oeffnung, welche mit einem sehr feinen Stilet gemacht zu sein scheint. In der Regel folgt sehr bald der Austritt des Pfropfes, worauf dann die Oeffnung das Aussehn bekommt, als wäre mit einem Locheisen ein Stück ausgeschlagen. Demnächst hört der Schmerz bald auf, die Haut legt sich wieder an, die Höhlung füllt sich aus, bei der Heilung bleibt eine kleine Vertiefung, eine unbedeutende, unregelmässige Narbe, welche bald die Farbe der Haut annimmt. — Statt des zugespitzten Gipfels bildet sich auf manchen Furunkeln ein grosses, mit trüber Flüssigkeit gefülltes Bläschen.

Diagnose. Verwechslung wäre möglich mit Ecthyma-Pusteln von bedeutender Grösse, die jedoch von Anfang an stärker zugespitzt und ohne Schwellung der Umgebungen auftreten. Furunkelartige Ausbrüche kommen bei Pyämie und bei Brand vor, wahrscheinlich unter denselben anatomischen Verhältnissen, wie der gewöhnliche solitäre Furunkel, durch Nekrose zahlreicher Bindegewebskegel an verschiedenen Stellen der Körperoberfläche. Die Bedeutung der Krankheit ergibt sich jedoch unter solchen Verhältnissen aus den übrigen Erscheinungen ohne Schwierigkeit. In Betreff der Verwechslung mit Milzbrand vgl. diesen, Bd. I. Die Unterscheidung des Furunkels von dem Brandschwär wird sich aus der Beschreibung des letzteren ergeben.

Prognose. Furunkel gewinnen eine grössere Bedeutung, wenn sie bei alten und sehr geschwächten Subjecten sich oft wiederholen. In neuerer Zeit sind mehrere Fälle beobachtet worden, in denen unzweifelhafte Furunkel, namentlich im Gesicht, bei sonst gesunden und

kräftigen Individuen, durch Vermittlung einer von der Anschwellung abhängigen venösen Stase, purulente Infection bedingten¹⁾.

Behandlung. Man kann versuchen, durch eine Incision die Entwicklung des Furunkels zu unterdrücken; auch die Aetzung mit Lapis infernalis ist als Abortivmethode in Gebrauch, von mir jedoch noch nie bewährt gefunden. Einschneiden sollte man immer, wenn die Stauung in den benachbarten Venen bedenklich oder der Schmerz sehr heftig ist. Der Verlauf wird durch die Incision nicht abgekürzt, wohl aber der Schmerz und die Gefahr. Baden in lauwarmem Wasser, Cataplasmata und das Emplastrum Lithargyri compositum (Ph. Genu.) sind weiterhin die zweckmässigsten Mittel. Mit letzterem allein (dick auf Leder gestrichen) kann man vollkommen auskommen, wenn auch gar keine Incision gemacht wird. Kleine Einstiche nutzen gar nichts. Reizende Kataplasmen, Pflaster (z. B. Pechpflaster), Salben und Teige (Honig mit Roggenmehl) sind mindestens nutzlos, oft nachtheilig.

Furunkel recidiviren häufig, oft mit grosser Hartnäckigkeit. In solchen Fällen soll man, nach der Ansicht älterer Aerzte, Brech- und Abführmittel nehmen lassen. Foszböke empfahl grosse Dosen von Acid. sulph. dilut. als das wirksamste Mittel, um dem Schmerze und neuen Ausbrüchen vorzubeugen²⁾. Auch der Gebrauch kleiner Dosen Arsenik (Solut. Fowleri) dürfte in hartnäckigen Fällen wohl erlaubt und des Versuches werth sein. Aber trotz der Anwendung dieser Mittel kehren die Furunkel zuweilen wieder. Auch eine wohlgeordnete Diät, eine Milchkur, der Gebrauch des Zittmannschen Decoets werden oft vergeblich angewandt. Bei Schwächlichen erreicht man die relativ besten Resultate durch gute Ernährung und Begünstigung derselben durch den Aufenthalt in freier Luft, Eisenpräparate, auch wohl Seebäder, obgleich diese grade anderer Seits oft genug den Ausbruch der Furunkel begünstigen.

V. Brandschwär, Anthrax, Carbunkel, Carbunculus benignus³⁾.

Während der Furunkel in einer nekrotisirenden Entzündung eines der in die Cutis hineinragenden Bindegewebskegel besteht, erstreckt

¹⁾ Vgl. Günther, die Furunkel- und Carbunkelartige Entzündung im Gesicht, Oestr. Zeitschr. f. praktische Heilkunde, 1862 — Poor, die Fieberdyskrasie etc. Prager Vierteljahrschrift, 1863. Bd. I.

²⁾ Vgl. Rayer, Traité des maladies de la peau. II. pag. 267.

³⁾ Eine Verwechslung mit dem Milzbrandcarbunkel, Carbunculus malignus, ist nur dem Namen nach möglich. Vgl. Bd. I. „Milzbrand.“ Die Benennung „Carbunculus benignus“ darf aber nicht zu der Ansicht verleiten, als sei der hier in Frage stehende Carbunkel eine gutartige Krankheit.

sich dieser Process beim Carbunkel auf eine grössere Anzahl derselben. Nicht blos das ursprünglich erkrankte, sondern auch das zwischen den einzelnen Heerden gelegene Haut- und Bindegewebe wird nekrotisch. Wir haben eine Gruppe von Furunkeln, welche zusammenfliessen.

Ursachen. Der Carbunkel tritt in der Regel vereinzelt auf; beim Furunkel sehen wir eher das Gegentheil. Dieser kommt fast in jedem Lebensalter vor, während der Carbunkel selten bei Kindern gefunden wird, viel häufiger bei Erwachsenen, und vorzüglich bei älteren Leuten auftritt, die in Folge dyskrasischer Leiden, durch Trunksucht, Herzfehler u. dgl. m. schon erhebliche Ernährungsstörungen erfahren haben. Sommer und Frühjahr sind relativ reicher an Carbunkeln.

Die anderen direct und indirect wirkenden Einflüsse sind dieselben, wie bei Erysipelas und Furunkel. Der Carbunkel wählt dieselben Stellen, die für die Entwicklung des Furunkels sich günstig zeigen; indess sieht man ihn häufiger, besonders bei alten Leuten, auf dem Rücken, in der Gegend der Schulterblätter und im Nacken.

Symptome. Verlauf. Ausgänge. Fieber geht dem Carbunkel oft vorher und begleitet ihn stets. Gewöhnlich hat dasselbe von Anfang an einen adynamischen Charakter. Im Anfange zeigt sich eine kleine Geschwulst, eine Art Knoten in der Haut, bei dem man aber keine Ahnung von dem Umfange hat, welchen er später erlangen kann. So lange die Geschwulst noch klein ist, hat sie Aehnlichkeit mit einem Furunkel, namentlich ist der höchste Punkt weich und öffnet sich zuweilen wie beim Blutschwär. Alsbald aber wächst sie durch neue Nachschübe und gewinnt binnen Kurzem den Umfang eines Gänseeies und darüber. Wenn der Carbunkel als eine Geschwulst mit breiter Basis beginnt, so macht er sicher noch erhebliche Fortschritte; innerhalb 8 Tagen kann der Durchmesser an 25 Centm. betragen. Bei geringer Hervorragung über das Niveau der Haut breitet sich die Basis dann weit im Unterhautbindegewebe aus. Lange bleibt der Carbunkel hart; seine Erweichung zeigt an, dass in der Tiefe bereits Brand eingetreten ist. Die Röthe ist sehr dunkel. Hitze ist besonders im Mittelpunkte vorhanden; sie ist heftig und brennend. Der Schmerz ist bei Weitem heftiger und von längerer Dauer, als beim Furunkel; er ist immer spannend und lässt erst nach, wenn die Haut aufbricht. Dies geschieht gewöhnlich an mehreren Stellen; die Haut erscheint alsdann siebartig durchlöchert; etwas blutiger Eiter und einige Fetzen abgestorbenen Bindegewebes dringen aus den Oeffnungen hervor. Die Haut kann aber auch in der ganzen Ausdehnung, so weit sie die Geschwulst bedeckt, brandig werden. Tritt dieser Fall ein, so stirbt auch das Unterhautbindegewebe unter ekelhaftem Gestank ab. Die

durch den Carbunkel bedingten Zerstörungen sind daher oft beträchtlich: die Haut ist abgelöst, die Aponeurosen, selbst die Muskeln, liegen bloss, und es bedarf einer sehr langen Eiterung, bis alle abgestorbenen Gewebe ausgestossen werden. Dadurch ist die Gefahr der Pyämie und bei schon sehr geschwächten Individuen auch die des Todes durch Entkräftung bedingt. Tritt Heilung ein, so behält die Narbe lange Zeit hindurch eine braune Färbung; sie bleibt vertieft, uneben und zeigt zuweilen strangartige Wurzeln, welche nicht nur Entstellungen, sondern auch Functionsstörungen veranlassen können.

Nicht immer tritt der Carbunkel in so unheilvoller Weise auf. Die Haut, wenn auch an einigen Stellen perforirt, kann erhalten bleiben; die Oeffnungen erweitern sich etwas, so dass die nekrotischen Pfröpfe austreten können, darauf entleert sich ein mehr oder weniger blutiger Eiter, da immer einige kleine Gefässe zerstört sind; aber endlich entsteht eine gutartige Eiterung und die Haut legt sich wieder an. Die Narben bleiben freilich lange Zeit roth, sind aber nicht sehr entstellend.

Neben dem Carbunkel können auch Furunkel auftreten; diese gehen ihm zuweilen voraus, oft umgeben sie ihn wie Trabanten.

Prognose. Die Prognose ist bedenklich, wenn die Geschwulst eine beträchtliche Grösse hat, zumal bei einem hoch bejahrten oder sehr heruntergekommenen Subjecte; aber auch kleine Carbunkel bei jüngeren und gesunden Menschen können in derselben Weise und in höherem Maasse gefährlich werden, wie Furunkel¹⁾.

Behandlung. Da in der Tiefe des Carbunkels stets Gangrän zu erwarten steht, so giebt man ganz allgemein den Rath, weder mit allgemeiner, noch mit örtlicher Antiphlogose Zeit zu verlieren, sondern sofort zur Spaltung und zwar zur vielfachen Spaltung des Brandschwärs zu schreiten. Jedoch geht die Wirkung dieses Mittels nicht so weit, dass es den Carbunkel plötzlich vernichten oder auch nur seine weiteren Fortschritte sicher verhindern könnte, wie viele Chirurgen zu glauben scheinen. Es beschleunigt den Verlauf und lindert die Schmerzen, — was schon viel ist. Nur glaube man nicht, dass der Schmerz im Augenblicke des Einschneidens, wie auf einen Zauberschlag, verschwinde. Damit die Entspannung vollkommen sei, sollen die Einschnitte nach allen Richtungen über die Grenzen der Geschwulst hinaus geführt werden. Hierbei treten zuweilen recht erhebliche Blutungen auf; denn, so wenig auch die harte Carbunkelgeschwulst selbst blutet, die umgebenden, dem Brande nicht verfallenen Theile

¹⁾ Fälle der Art sind so häufig, dass es kaum eines Citats bedarf. Vgl. pag. 21 und die Dissertation von Paul Vogt, Gryphiswaldiae, 1865.

liefern aus noch verengerten Gefässen meist beträchtliche Blutmengen. Solche Blutungen können recht bedenklich sein.

Die Wirkungen der Carbunkel sind im Vorstehenden keineswegs übertrieben ausgedrückt. J. Paget (Lancet, 1869, Januar) geht aber meines Erachtens zu weit, wenn er die Einschnitte ganz verwirft und die Behandlung auf ein deckendes Pflaster oder ein gutes Cataplasma, bei gewöhnlicher, nahrhafter Kost und reichlichem Genuß der frischen Luft beschränken will.

Die weitere Behandlung sei antiseptisch und tonisirend. Die beste Antisepsis besteht in vernachlässigten Fällen oft in der Anwendung von Aetzmitteln, durch welche es am Schnellsten gelingt, die nekrotischen Gewebe chemisch zu zerstören und dadurch unschädlich zu machen.

VI. Brand der Haut.

Bei der Beschreibung der Quetschung, der gequetschten Wunden, der Verbrennung und Erfrierung, des Brandes im Allgemeinen, der Rose, des Milzbrandes, der Neubildungen etc. war bereits wiederholt die Rede von dem Brande der Haut. Alles, was die auf der äusseren und inneren Fläche der Cutis verlaufenden Gefässe verstopft oder zerstört, kann als Ursache des Hautbrandes angesehen werden. Nicht immer wird die Haut in ihrer ganzen Dicke vom Brande ergriffen. Mit concentrirten Säuren oder Alkalien kann man die Haut in verschiedener Dicke ertöden. Wenn man nur oberflächlich kauterisirt, so wird blos das sogenannte Rete Malpighii zerstört, man veranlasst auf diese Weise einen Substanzverlust, in dem kein fremder Körper eine bleibende Stätte findet, dessen Streben zur Vernarbung aber sehr gross ist. In schweren Krankheiten beobachtet man oft, dass die Haut an den Stellen, wo sie zwischen Knochen und den Stützpunkten des Körpers gedrückt wird, abstirbt (vgl. Decubitus). Werden nur die oberflächlichsten Schichten der Haut gangränös, so findet man sie nimmer zu trocknen Schorfen umgewandelt, welche von den unterliegenden Theilen nicht durch Eiter getrennt werden, sondern durch feuchte, zähe Fasern von gelblichgrauer Farbe verbunden bleiben — Wenn die verschiedenen Schichten der Haut nach einander von der Oberfläche gegen die Tiefe absterben, so findet man bei der Section die Haut siebartig durchlöchert; je mehr Schichten brandig geworden sind, desto grösser erscheinen die Löcher. Schneidet man mit einem sehr scharten Messer Hautschichten in paralleler Richtung mit der Oberfläche ab, so werden die Öffnungen in der Cutis um so weiter, je tiefer die Schichte geführt werden, weil man gegen die Basis der Wundhöhle Höhlen, welche nach Zerstörung des lockeren Binde-

und Fettgewebes übrig bleiben, weiter vordringt. — Die anatomische Beschaffenheit macht die Schnelligkeit erklärlich, mit der einzelne Zerstörungen in der Haut um sich greifen, wenn sie einmal erst die oberste festeste Schicht der Cutis überwunden haben. In dem Maasse, als sie gegen die innere Fläche der Lederhaut vorschreiten, finden sie geringeren Widerstand, weil das Gewebe hier weniger dicht ist; die Cutis hat hier nicht mehr die fibröse Beschaffenheit, und die Drüsen sind gleichsam schon existirende Substanzverluste, die dem Brande Vorstüb leisten. — Wichtig ist es, dass die Haut deshalb nicht durchaus verloren geht, wenn eine ihrer äusseren Schichten abgestorben ist. Anders verhält es sich mit dem Brande, welcher in entgegengesetzter Richtung vorschreitet, so dass er zuerst die tiefen Schichten ergreift. Dort befinden sich die Wurzeln der Gefässstämme, welche den Hautbedeckungen Lebensmaterial zuführen; sind diese einmal zerstört oder unterbrochen, so steht das Absterben der Haut in ihrer ganzen Dicke zu befürchten. Die Ernährung der Haut ist gefährdet, sobald das Unterhautbindegewebe abgestorben oder von weit verbreiteter Eiterung ergriffen ist, weil höchst wahrscheinlich dann die zur Haut verlaufenden Gefässe zerstört oder verschlossen werden. — Die Ausdehnung, welche der Hautbrand, der von Innen nach Aussen vorschreitet, erlangt hat, bleibt oft eine geraume Zeit hindurch unerkannt; hat man sich aber einmal von seinem Vorhandensein überzeugt, so erstaut man über die raschen Fortschritte, welche er macht. Wenn die Ursache von der Epidermis aus nach der Tiefe hin wirkt, so ist man leichter im Stande, den Verlauf und die Bedeutsamkeit des Uebels zu würdigen, indem dann der ganze Vorgang vor Augen liegt. Wird die Haut zuerst in ihrer tieferen Schicht ergriffen, so wird sie welk, runzelig, verliert an Haltbarkeit, bevor noch eine Veränderung der Farbe bemerkbar geworden ist; die Epidermis löst sich fast wie an einem Leichnam ab.

Die Haut erträgt bei Weitem besser einen von Aussen, als einen von Innen wirkenden Druck. So ist es hinlänglich erwiesen, dass der Grad der Spannung, durch welchen unter der Haut liegende Geschwülste Brand der Haut veranlassen, diese Wirkung gar nicht oder doch erst viel später haben würde, wenn derselbe Druck von Aussen statt fände. So hat namentlich die Leichtigkeit, mit welcher auf dem ursprünglichen Winkel der Tibia nach Amputation des Unterschenkels die anliegende Haut brandig wird, eine traurige Berühmtheit erlangt. Offenbar hängt dieser Unterschied davon ab, dass der von Innen wirkende Druck direct die in die Haut eintretenden Gefässstämmchen comprimiirt und daher schneller zum Verschluss bringt.

Zweites Capitel.

Verletzungen der Haut.

A. Wunden.

Die Hautwunden sind wohl die schmerzhaftesten; daher die Vorschrift, dass man die Durchschneidung der Haut bei Operationen möglichst schnell vollenden solle.

Schnittwunden. Selbst die einfachste Schnittwunde bleibt selten gradlinig. Dazu ist nöthig, dass die Haut sehr schlaff oder dünn ist, dass sie eine concave Fläche überzieht, oder dass sie fest an dem unterliegenden Bindegewebe haftet. Wenn sie weiter ist, als die Theile es erfordern, welche sie bedecken und schützen soll, so fällt das Klaffen fort, die Hautwunde wirft selbst Falten, und die Ränder berühren sich an der Trennungsstelle nur mit ihrer von Epidermis überzogenen Seite. Man sieht dies an dem Scrotum nach der Exstirpation des Hodens, oder nach Schnitten in die Hautbedeckung der Achselhöhle. In den meisten Fällen klaffen Hautwunden in der Form einer Ellipse. Dies Klaffen beruht auf der Spannung der Haut vermöge ihrer Elasticität, der Schlaffheit des unter ihr liegenden Bindegewebes und der Wölbung der unter ihr liegenden Theile¹⁾. Um das Klaffen der Ränder einer Schnittwunde zu erklären, muss man noch den Einfluss berücksichtigen, welcher durch die Bewegungen des betreffenden Theiles ausgelibt wird: man findet dann, dass die Wundränder weit mehr auseinander weichen, wenn der Schnitt in einer, den Bewegungen des Theils entgegengesetzten Richtung verläuft, als umgekehrt. Die Blutung ist nur bei der Verletzung solcher Hautstellen von Bedeutung, wo grössere Arterien in der Haut selbst oder dicht unter ihr liegen, z. B. im Gesicht und am Schädel.

Stichwunden haben nicht immer die Form der spitzen Instrumente, mit denen sie gemacht sind. Dies geht besonders aus den von Filhos angestellten Versuchen hervor²⁾. Derselbe bediente sich eines fast 3 Zoll langen, kegelförmigen Grabstichels, welcher an der breitesten Stelle nicht mehr als 3 Linien mass. Vermittelt dieses Instrumentes erhielt er immer längliche Wunden mit zwei gleichen Bändern, die in sehr spitzen Winkeln zusammenstiessen. Die Wunden waren um so länger, je tiefer das Instrument eingestossen war. Wenn die Wundränder klafften, so genügte zu ihrer genaueren Vereinigung eine leise Anspannung der Haut in einer bestimmten Richtung; auch es ergab sich, dass der Grabstichel nur die Hautfasern auseinander gedrängt hatte. Stiche an gleichnamigen Körperstellen klafften immer in derselben Richtung: am Hals und an dem vordere Theile der Achselgrube, von oben nach unten; am

¹⁾ Vgl. Martel, in d. Theses de la Faculté de Paris, 1836. No. 354.

²⁾ Dupuytren, Traité des blessures par armes de guerre. Tom. I. pag. 61.

Rumpfe, mit den Rippen oder den Intercostalräumen parallel; auf der vorderen Seite des Bauches, schräg von Oben nach Unten, ungefähr dem Laufe der Muskelfasern des *Obliquus externus* entsprechend; nahe der Mittellinie, von Oben nach Unten; an den Extremitäten, parallel mit der Axe derselben. — Malgaigne (*Anatomie chirurgicale*, T. I. pag. 66) fand die Richtung der kleinen spaltförmigen Wunden ganz anders und in denselben Körpergegenden bei verschiedenen Subjecten oft verschieden.

Zerreissungen. Die Haut weicht, vermöge ihrer Dehnbarkeit, manchen Verwundungen aus. Dies ist in Betreff der tiefen Quetschungen, die ohne Verletzung der Haut eintreten können, allgemein bekannt. Die traumatische Ablösung der Haut, bei welcher sie eine schwach mit Serum gefüllte schlaife Tasche bildet (vgl. Bd. I.) liefert das grossartigste Beispiel dafür. Wenn vollständige Abreissung irgend eines Körpertheiles Statt findet, so zerreist, aus demselben Grunde, von allen Geweben die Haut zuletzt und nimmt gleich nach der Zerreissung ihre frühere Ausdehnung wieder an. Hat aber auch die Haut der von Aussen einwirkenden Gewalt getrotzt, so ist sie darum doch nicht immer ausser Gefahr; im Gegentheile stirbt sie nicht selten bei dem Eintritte der Reaction ab.

Die **Prognose** der Hautwunden ist eigentlich nicht bedenklich; indess darf man nicht vergessen, dass die Function der Haut in mehrfacher Beziehung von Bedeutung ist. Zahlreiche Wunden oder Lappenwunden mit ausgedehnter Ablösung können zu bedenklichen nervösen Zufällen Anlass geben.

Die Vereinigung der reinen Hautwunden erfolgt sehr leicht, besonders wo die Haut eng mit den von ihr bedeckten Geweben verbunden und reichlich mit Gefässen versehen ist, so z. B. an den Fingern, im Gesichte. Hier verwachsen selbst abgerissene Lappen, wenn nur der kleinste Zusammenhang mit den nicht verletzten Geweben bestehen blieb. Wiedervereinigung ist selbst nach vollständiger Ablösung noch zu erzielen.

Diese Verhältnisse wurden unter „Plastische Operationen“, im 1. Bande bereits erwähnt. Eine grosse Reihe von interessanten Versuchen an Thieren und eine Zusammenstellung von Beobachtungen über das Wiederanheilen ganz abgetrennter Hautlappen bei Menschen liefert W. Hauff in seiner Dissertation „über Wiederanheilung vollständig vom Körper getrennter Hautstücke“. Berlin, 1870.

B. Fremde Körper.

Nicht ganz selten findet man in der Haut fremde Körper. Bei einem Falle auf die Hand z. B. können kleine scharfe Steinchen fest in sie eingekleilt werden; Pulverkörner, Schrot, Glassplitter u. dgl. m. sind nicht selten in ihr beobachtet worden und bleiben oft lange

ohne weitere nachtheilige Folgen in der Haut stecken. Besonders lange unschädlich bleibt Schrot, wenn es aus der Entfernung hineingeschossen wurde; es scheint dann gleichsam in kleinen Höhlen der Lederhaut eingekapselt zu sein. Pulverkörner bleiben ebenfalls sitzen und veranlassen blaugraue Flecke. (Vgl. „Schusswunden,“ Bd. I.)

Nicht alle fremden Körper sind da, wo man sie findet, einge-
drungen, manche sind vorher gewandert. Vgl. Bd. I.

In den Talgdrüsen findet man mitunter steinige Concretionen. Meckel sah bei einem Knaben alle Talgdrüsen der Hüfte mit kleinen Steinchen angefüllt. Rayer fand bei zwei Kindern ähnliche Steinchen in der Haut der Stirn und der Nasenwurzel.

In den meisten Fällen veranlassen die fremden Körper, besonders wenn sie zahlreich und nicht allzu klein sind, in der Haut, wie in anderen Geweben, Verschwärung. In anderen Fällen erregen sie, ohne dass in ihrer Umgebung Veränderungen auftreten, heftige Schmerzen, die durch ihre Entfernung (nöthigen Falls Excision des Hautstücks, in welchem sie sitzen) beseitigt werden.

Drittes Capitel.

Organisirte Neubildungen in der Haut.

Die grosse Mehrzahl der im ersten Buche beschriebenen organisirten Neubildungen kommt auch im Gewebe der Haut vor. Namentlich gilt dies für Fasergeschwülste, Balggeschwülste, Krebse und Sarcome. Dieselben nehmen bald in der Haut selbst ihren Ursprung, bald wachsen sie aus der Tiefe, also zunächst von dem Unterhaut-Bindewebe her, in dieselbe hinein. Viele Neubildungen sind der Haut eigenthümlich, indem sie in einer hypertrophischen Entwicklung einzelner Gewebelemente der Haut, besonders der Epidermis und des Papillarkörpers, bestehen. Hierher gehören die Schwielen, Hühneraugen, Hauthörner, Warzen, Condylome, welche wir Bd. I. unter den Neubildungen beschrieben haben. Auch die rothen Muttermaler (Teleangiectasiae) werden von Einigen hierher gerechnet; sie kommen aber auch in Schleimhäuten vor.

Die in der Haut vorkommenden **Balggeschwülste** beruhen zum Theil auf einer Ausdehnung der Hautschmeerbälge durch, in ihnen angesammeltes und zum Theil verändertes Secret, welchem durch Verstopfung des Ausführungsganges der Ausweg versperrt ist, — *Atheroma folliculare*, zum Theil sind es *Dermoidcysten*, wie wir dies bereits Bd. I. bei den Cysten erläutert haben.

Als die gelindeste Form der folliculären Cysten sind die **Mitesser** (*comedones, tannes*) zu betrachten, welche auf Ausdehnung eines Haarbalges oder einer Talgdrüse

durch angesammeltes Secret beruhen. Der eingedickte Theil des Secrets, welcher den Ausführungsgang verstopft, bekommt, indem Staub und Schmutz darauf haften, eine braune oder schwarze Farbe. Indem man auf die Umgegend eines Comedo drückt, kann man seinen ganzen Inhalt in wurmförmiger Gestalt herausdrücken. Simon und Andere haben in den Comedonen eine eigene Milbenart (*Macroaster folliculorum*) gefunden (vgl. Landois, Ueber den Haarbalgparasiten des Menschen, in d. Greifswalder medicinischen Beiträgen, 1863. Bd. I. pag. 17 u. f.). Am Häufigsten sieht man die Comedonen auf der Nase, demnächst in anderen Gegenden des Gesichts, ferner auf der Brust, zuweilen aber auch in reichlicher Menge auf dem Rücken und an anderen Körpertheilen. Zur Beseitigung der Mitesser ist die Entleerung der einzelnen Bälge nothwendig, welche in der Regel durch Ausdrücken leicht gelingt, aber auch durch Erregung einer lebhaften Entzündung mittelst Aufpinseln einer alkoholischen Sublimatlösung (1 Sublimat auf 50 Alkohol) oder dgl. erzielt werden kann. Zur Verhütung ihrer Wiederkehr möchten häufige Waschungen mit adstringirenden Flüssigkeiten zu empfehlen sein.

Als eine der Haut, mit wenigen Ausnahmen, ausschliesslich zukommende Neubildung haben wir hier diejenige zu beschreiben, welche unter den Namen

Lupus, fressende Flechte, Herpes exedens,

in dem System der Hautkrankheiten lange Zeit eine zweifelhafte Stellung eingenommen hat, da die verschiedenen Erscheinungen derselben eine allgemein passende Beschreibung nicht aufkommen liessen. Man hielt sich deshalb bei der Erörterung des Lupus mehr an die mit blossem Auge wahrzunehmenden Symptome dieses eigenthümlichen Hautübel. Selbst Hebra¹⁾ vermochte vor Kurzem nur Bilder zu entwerfen, unter welchen dieses Uebel aufzutreten pflegt, Krankheitsbilder, die er keineswegs als ebenso viele Krankheitsarten (*Species*) angesehen wissen will. Alle diese Mängel in der Erörterung dieser Krankheit hatten ihren Grund in dem Mangel genauer anatomischer und besonders mikroskopischer Untersuchungen²⁾

Im Allgemeinen ist der Lupus als eine unter den Erscheinungen chronischer Entzündung der Haut sich entwickelnde Neubildung zu betrachten, in welcher es bald nur zur Entwicklung von Zellen (Granulationsgewebe), bald auch von

¹⁾ Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien. VI. Jahrgang, I. Band.

²⁾ In einer, unter der Leitung Eichstedt's, von E. Berger verfassten Dissertation (*De Lupo. Dissertat. inaug. Grypsiae 1849*) sind die ersten anatomischen Untersuchungen über Lupus enthalten. Die nachstehende Darstellung gründet sich zum Theil auf eigenen Anschauungen, wie sie in Pohl's Abhandlung über Lupus (*Virchow's Archiv 1853*) erläutert sind; neuerdings ist die umfassende Beschreibung der anatomischen Verhältnisse von Virchow (*Geschwülste, Bd. II. pag. 482 u. f.*) wesentlich benutzt worden.

Bindegewebe kommt, und deren Ausgänge zuletzt fast immer Verschwärung, partielle brandige Abstossung oder auch Nekrose grösserer Gewebstücke sind. Vor dem Eintritt dieser Ausgänge kann jedoch das befallene Hautstück bald die Zeichen einer örtlichen Hyperämie unter gleichzeitig vermehrter Neubildung und Abstossung (Abschilferung) von Epidermis, oder gleichzeitiger Bläschen- und Pustelbildung (also eine mehr oberflächliche, gewöhnlich an mehreren distincten Punkten auftretende Hautentzündung) darbieten, bald eine Volumzunahme zeigen, welche theils durch isolirte oder zusammenfliessende Knotenbildung, theils durch eine nach allen Seiten hin sich ausbreitende (diffuse) Infiltration bedingt ist.

Die begleitende Hyperämie sowohl, wie die Infiltration mit neugebildeten Elementartheilen beginnt in der Haut, erstreckt sich aber weiterhin oft auch auf die unterliegenden Gewebe: Panniculus adiposus, Muskeln u. s. f., z. B. von der Gesichtshaut her durch die ganze Dicke der Wange bis auf die Schleimhaut der Mundhöhle.

Die verschiedenen **Formen** des Lupus sind bald mehr nach den späteren Umwandlungen der Neubildung (den Ausgängen der chronischen Entzündung), bald mehr nach den im Beginne der Krankheit am Meisten in die Augen fallenden Erscheinungen beschrieben worden. So stellte Rayer einen Lupus exedens und einen Lupus non exedens auf; Blasius ¹⁾ unterscheidet 3 Fortgangsformen: den ulcerativen, den exfoliativen und den hypertrophischen Lupus, und 3 Grund- oder Anfangsformen; die tuberculöse, pustulöse und maculöse; Hebra: 1) den mit dem Niveau der Haut gleichbleibenden, trockenen und sich abschuppenden Lupus exfoliatus, 2) den mit seinen Knoten über die Haut sich erhebenden, später verschwärenden Lupus hypertrophicus und exulcerans und 3) den wegen seiner eigenthümlichen Ausbreitungs- und Heilungsweise kreis- oder halbkreisförmige Zeichnungen darbietenden Lupus serpiginosus.

Anatomische Untersuchung. Die lupösen Hautstellen selbst und ihre nächste Umgebung sind immer hyperämisch, die Capillargefässe, je nach der Tiefe der Erkrankung, in den Hautpapillen, im Panniculus etc. erweitert; gleichzeitung trinkt ein weissgelbliches, fadenziehendes, glänzendes Exsudat, welches beim Zusatz von verdünnter Essigsäure in moleculärer Form gerinnt, die Gewebe.

Die Volumzunahme der noch nicht aufgebrochenen kranken Stelle, die in der Haut sitzende Verdickung (Tuber) wird beim Lupus tuberculosus durch eine Anhäufung von Kernen und Zellen be-

¹⁾ Rust's theoret.-pract. Handbuch der Chirurgie. Bd. XI.

dingt, welche nach Berger¹⁾ am Meisten denen des normalen Rete Malpighii gleichen und bisweilen eine mehr ovale Form mit einem Durchmesser von etwa 0,001 Millm. haben. Für den Ausgangspunkt der Erkrankung ist immer die eigentliche Cutis anzusehen; die Anschwellung wird viel weniger durch Anhäufung junger Epithelialzellen, als durch ein dichtes Lager meist runder, seltener ovaler, grob granulirter, dickwandiger Kerne und indifferenter Zellen erzeugt. Nur nach der Peripherie zu, oder auch in dem gelben, später zu Krusten vertrocknenden Secret sieht man runde junge Epithelialzellen, die, je nach der Beschaffenheit der Geschwürsfläche, verschiedene Veränderungen bezüglich ihrer Wandungen und ihres Inhaltes darbieten. Hier sind sie (wie alte Zellen) mit kleinen Fetttropfchen erfüllt, ohne dabei durch Grösse ausgezeichnet zu sein. Durch die Anhäufung dieser Kerne und Zellen werden die benachbarten Gewebe in der Art gedrückt, dass nicht allein der Papillarkörper der Haut, sondern auch Muskeln, Knorpel und Knochen atrophisch werden. Enorme Capillargefässe, die in dicken isolirten Stämmen aus der Tiefe hervordringen, breiten sich in weiten peripherischen Schlingen oder Bögen nahe der Oberfläche aus²⁾, inmitten eines Lagers grob granulirter Kerne und Zellen. Dieses schiebt sich, ganz so wie andere Neubildungen, zwischen die vorhandenen Gewebe, und erreicht z. B. die Muskelschicht lange vor dem Aufbruch.

Beim hypertrophischen Lupus sind die anatomischen Verhältnisse verwickelter. Berger deutet die Anschwellung nur als eine Hypertrophie des Rete Malpighii mit Erhaltung der eigentlichen Epidermisschicht. Nach unseren Untersuchungen tritt die Hypertrophie des Rete gegen die in der Tiefe vorhandenen Veränderungen vollständig zurück³⁾; die ganze, über den angeschwollenen Theil hingegespante Haut ist im Gegentheil verdünnt. Auf dem Durchschnitt erscheint eine durchaus ebene grau-weisslich glänzende Fläche, ähnlich durchschnittenem Speck; Muskeln, Panniculus adiposus etc. sind nicht zu unterscheiden, ausserdem wird die Masse von weissen homogenen Strängen von festerer Consistenz durchzogen. Das Messer findet einen ziemlich bedeutenden Widerstand beim Durchschneiden und kreischt

¹⁾ l. c. pag. 9.

²⁾ J. Hoppe (Zur Behandlung der fressenden Flechten, pag. 22) erwähnt „einer Gefässerweiterung, die, wie die Operation ergab, an Blutreichthum den stärksten Teleangiectasien nicht nachstand.“ Offenbar handelt es sich nicht blos um „Gefässerweiterung“, sondern um reichliche Neubildung kleiner Capillargefässe.

³⁾ Diese Angabe, welche von manchen Seiten übersehen ist, findet sich bereits in der ersten Auflage dieses Lehrbuchs (1852).

beim Schaben über die Schnittfläche; selbst sehr dünne Durchschnitte sind mit der Nadel nur in kleine Plättchen zu zerreißen. Das Ganze besteht, mikroskopisch untersucht, fast nur aus festem, dicht an einander gedrängtem Bindegewebe, in welches stellenweis eng unter einander verfilzte dünne Kernfasern oder auch dicke, elastische, verzweigte Fasern in langen, einander kreuzenden Zügen eingesprengt sind. Die nur spärlich vorhandenen Muskelbündel sind sehr blass, durchsichtig, aber noch deutlich quergestreift. Ausserdem sind noch junge, blasse, mit homogenem Inhalts gefüllte, sehr dünnwandige runde Zellen von der Grösse der Eiterzellen (junge Bindegewebszellen) eingestreut. Diese neoplastischen Gewebe ziehen sich bis an die Cutis heran, welche an dieselben unbeweglich angeheftet ist.

Regelmässig werden die Haarbälge und Hautdrüsen von der lupösen Erkrankung mit ergriffen, wie schon Berger und später Virchow gezeigt haben. Die erweiterten Haarbälge und Talgdrüsen, wegen frühzeitiger Obliteration ihrer Oeffnungen, mit eingedicktem Secret gefüllt, stellen weisse Körperchen dar, welche sich auf Durchschnitten schon mit blossem Auge erkennen lassen. — Auf Grund der pathologischen Zellenwucherung im Haarbälge degeneriren dann auch die Haare und fallen in der Regel frühzeitig aus. — Die unter der Schleimhaut der Unterlippe liegenden traubenförmigen Drüsen sahen wir in der Nähe lupöser Hautstellen geschwollen und injicirt.

Man kann somit die unter dem Namen Lupus zusammengefassten Hautkrankheiten am Besten in zwei Formen unterscheiden. Für die eine ist die Neubildung von Bindegewebe, für die andere die Neubildung von jungen Zellen charakteristisch. Beide gehören für die anatomische Betrachtung in die Reihe der Granulationsgewebe. Die Ulceration ist beiden gemeinschaftlich; sie ist nur ein accessorisches, allerdings aber sehr häufig auftretendes Symptom.

Sitz. Am Häufigsten wird der Lupus im Gesicht, und zwar besonders an der Nase beobachtet, demnächst an den Lippen, Wangen, dem Kinn und der Stirn, im inneren Augenwinkel, in der Nähe der Augenbrauen, an den Ohren; von dem Gesicht aus verbreitet sich derselbe auch nach der vorderen oder hinteren Seite des Halses. Auch von der Schleimhaut der Nase, des Gaumensegels (namentlich der Uvula), der Lippen, vom Zahnfleisch und von der Conjunctiva kann er ausgehen. Am Rumpf sah man ihn auf der Brust und Schulter, an den grossen Labien; an den Extremitäten auf dem Hand- und Fussrücken, an der äusseren Seite des Vorderarms, an den Zehen, in der Umgebung mancher Gelenke.

Verlauf. Der Lupus kann, wie schon früher erwähnt wurde, im

Beginn der Entwicklung alle Symptome der Hautentzündung darbieten; zumeist jedoch beginnt die Erkrankung mit der Bildung eines dunkelrothen, etwas erhabenen, härtlichen, linsen- bis bohngrossen Knötchens, das entweder isolirt in irgend einer Hautstelle sitzt, oder auch vielfach vorhanden, die Haut höckrig und warzig erscheinen lässt. Diese Erhebungen sind gefässreicher als die Umgegend, von einer livid-rothen Farbe, meist schmerzlos. Die Epidermis über diesen Erhebungen stösst sich gewöhnlich in weissen trocknen Schuppen ab, bis, durch die immer mehr nach Aussen vordringende Neubildung, die Epithelialschicht, ähnlich einer feinen rothen Narbe, im höchsten Grade verdünnt und ausgedehnt, endlich nach einer höchst verschiedenen langen Zeit durchbrochen und diese Stelle der Sitz einer in die Tiefe greifenden Ulceration wird. Nach Blasius¹⁾ beginnt der Lupus ebenso oft mit der Bildung von Impetigo- oder Ekthymapusteln, die „bald einzeln, bisweilen jedoch auch gruppiert stehen, auf dunkeln, rothen Stellen sich entwickeln, bald bersten und sich mit braunen, meistens dunkeln, immer sehr fest sitzenden Borken bedecken, nach deren Ablösung man eine oft tief gehende Ulceration findet, die sich wieder mit einem Grunde bedeckt und darunter weiter frisst“²⁾. Im Umfange der Pusteln besteht die dem Lupus überhaupt eigene Röthe, die mit einer geringen Anschwellung der Haut, manchmal auch mit Bildung von Tuberkeln verbunden ist, welche letztere zwar in Ulceration, aber zuvor nicht in Pustelbildung übergehen.“ In anderen Fällen sind Anfangs nur livid-rothe Flecke von verschiedener Grösse vorhanden, die zerstreut auf einem wenig geschwollenen Grunde stehen und ihren Sitz besonders an der Nasenspitze haben (Cazenave, Blasius). Auch bei dieser Form wird nach einer Dauer von oft mehreren Monaten die Röthe saturirter, die vorgängige Epidermis-Abschuppung durch eine nässende Absonderung ersetzt, bis auch diese durch eine oberflächliche Ulceration verdrängt wird, welche bald dicke Krusten bildet. Unter diesen Krusten sammelt sich ein gelblicher, dicker, oft durch Hämorrhagieen bräunlich gefärbter Eiter an. — Die livide Färbung lupöser Hautstellen kann jedoch auch längere Zeit hindurch fortbestehen, ohne in Ulceration überzugehen, oder mit einer Volumzunahme ihrer Umgebung verbunden zu sein; man bemerkt nur, dass sich die Haut allmählig zu einer feinen, livid gerötheten, narbenähnlichen Oberfläche verdünnt, und der Sitz einer zeitweisen, fast unmerklichen Abschuppung wird.

¹⁾ Theoretisch-praktisches Handbuch der Chirurgie von Rust. XI. Bd. pag. 397.

²⁾ Einen exquisiten Fall dieser Art, der später zu Lupus hypertrophicus wurde, habe ich vor vielen Jahren beobachtet.

Hardenheim, Chirurgie. 7. Aufl. II.

Hat der Lupus seinen primären Sitz in der Schleimhaut der Nase, so erscheint dieselbe dunkel geröthet, angeschwollen, sondert eine eiterähnliche, zu Krusten erhärtende Flüssigkeit ab, während gleichzeitig die ganze Nase geschwollen und hyperämisch ist. Die Ulcerationen auf der Nasenschleimhaut dringen oft schon tief ein, ehe auf der Oberfläche der Nase Veränderungen entstehen. Am Gaumensegel führt Lupus nicht selten zu Substanzverlusten, namentlich an den Rändern, am Deutlichsten daher am Zäpfchen.

Breiten sich die oben beschriebenen, an ihrer Oberfläche entweder exfolirenden oder auch mit seichten Exulcerationen und Krusten bedeckten Knötchen in die Tiefe und in die Umgebung weiter aus, verwachsen gleichsam zu einem Ganzen, indem auch die nächstliegenden Gewebe eine diffuse Anschwellung darbieten, so sind damit die Hauptmerkmale des seltneren Lupus hypertrophicus gegeben. Die Geschwulst fühlt sich härtlich an und lässt sich durch das Gefühl der Hand leichter von der weichen, mit erweiterten Gefässen bedeckten, vielleicht auch ödematösen Umgebung (z. B. Augenlider, Schläfe etc.) abgrenzen, als vermittelst des Auges, da ein vom Lupus hypertrophicus befallenes Gesicht weithin gedunsen, geschwollen erscheint. Nächst der auf der dunkel gerötheten glatten Oberfläche fortdauernd stattfindenden Epidermis-Abschilferung wurde schon von Cazenave und Schedel die dieser Form eigenthümliche Bildung von weisslichen Narben hervorgehoben, welche an die Stelle der einzelnen alten Knoten ohne vorangegangene Ulceration oder Krustenbildung treten können. Zwischen diesen Narbenflecken liegen dunkelrothe Punkte von verschiedener Grösse, welche die Spitzen der alsdann im Niveau mit dem ganzen angeschwollenen Hautstück stehenden einzelnen Knoten bezeichnen.

Das Gesicht kann durch die hypertrophische Form des Lupus den höchsten Grad der Unförmigkeit erreichen. Die Augen werden durch die entweder selbst hypertrophisch entarteten oder auch nur ödematösen Wülste beider Augenlider verdeckt, die Nase erscheint als ein grosser, runder, mit Comedonen besetzter rother Fleischklumpen, die unbeweglichen Lippen sind dick aufgewulstet und von ödematösen, nach Aussen gerollten Schleimhautsäumen umgrenzt. Auch die Ohren (Ohrfläppchen, Tragus etc.) werden, wie das Gesicht, hypertrophisch. Wird die hypertrophische Anschwellung rückgängig, so soll die erkrankte Hautstelle das Ansehen des Lupus exfoliatus annehmen. Gewöhnlich ist aber der hypertrophische Lupus zugleich ulcerativ (besonders an den Nasenflügeln oder der Schleimhaut der Nase), kann sogar einer tiefer gehenden brandigen Zerstörung verfallen.

Die ulcerative Form des Lupus theilt Bielt in die oberfläch-

lich zerstörende und die tiefer zerstörende; zu jener zählt er den unten zu erörternden Lupus exfoliatus und serpiginosus. Letzteres ist unrichtig, die Eintheilung unwesentlich.

Der ulcerative Lupus ist der häufigste. — Nachdem die primären Formen (die Pusteln, Knötchen oder Flecke etc.) eine Zeit lang bestanden haben, vervielfältigen sich dieselben entweder unter entzündlichen Erscheinungen, oder die kranke Haut oder Schleimhaut wird von einer dunkleren, sich weiter ausbreitenden Röthe bedeckt, schwillt auch ödematös an, und an einzelnen Stellen wird die dünne Epithelialschicht durchbrochen. Die zuerst kleinen, rundlichen, nur wenig oder gar nicht schmerzhaften Geschwüre breiten sich entweder in die Breite oder in die Tiefe aus, fliessen allseitig zusammen, haben dann ungleiche zernagte Ränder, und sind mit braunen fest adhären- den Krusten bedeckt, unter welchen sich eine gelbliche, dicke, oder auch bräunliche, dünne Masse unaufhörlich ansammelt. Werden die gewöhnlich fest angetrockneten, über einander geschichteten Schorfe entfernt, so entsteht leicht eine Blutung aus den Anheftungsstellen derselben, den hyperämischen, nässenden Geschwürsrändern. Die Krusten werden mit der zunehmenden Tiefe der Ulceration immer dicker, bis denn, wie z. B. an der Nase, nicht allein Haut und Muskeln, sondern auch Knorpel und Knochen zerstört sind.

Der oberflächlich zerstörende Lupus sowohl wie der tiefer greifende können spontan unter Abnahme der hyperämischen Erscheinungen vernarben. Die Narben sind den Brandnarben ähnlich: weisse, mehr oder weniger erhabene, gefaltete Stränge mit grosser Neigung zur Verkürzung. Oft brechen sie, wenn die im Umkreis vorhandenen Pusteln oder Knoten exulceriren, von Neuem auf.

Wir sahen bei einem Lupus hypertrophicus des ganzen Gesichts die Zerstörung in einer ganz eigenthümlichen, furchtbaren Weise fortschreiten. Die einzelnen, für die Abstossung sich vorbereitenden, angeschwollenen Hautstellen bedeckten sich nicht mit dicken Schorfen, sondern stellten ein schmutzig braunroth gefärbtes sinuöses Geschwür dar, dessen Grund von missfarbigen krümligen Massen bedeckt war, die sich leicht abschaben liessen. Nach einiger Zeit wird die Abgrenzung der missfarbigen Stelle gegen die Umgebung deutlicher, sie löst sich durch einen Demarcationsgraben vom Gesunden los, verliert an Consistenz, wird schlaffer, fetziger, schmutzig grau oder graugelblich; die oberflächlichen Fetzen lassen sich, wenn auch schwierig, losreissen, ohne die geringste Blutung zu verursachen. Wartet man wegen des enormen Gestankes, welcher in den bisweilen über 1 Ctm. dicken nekrotischen Stellen sich entwickelt, die Abstossung nicht ab, so kann man mit der Scheere oder dem Messer an der Peripherie zwischen dem Brandigen und dem relativ Gesunden leicht eindringen und innerhalb der Demarcationslinie, ohne die geringste Blutung, ein völlig nekrotisches Gewebsstück abtragen. So ausgedehnter Brand beim Lupus ist von früheren Autoren nicht erwähnt und von mir auch nur noch in einem Falle beobachtet worden.

Der weniger in die Tiefe greifende, verschwärende Lupus nimmt gewöhnlich grössere Flächen ein. Sein primärer Sitz ist seltener die Nase, häufiger ein anderer Theil des Gesichts oder eine der oben erwähnten Stellen des Rumpfes und der Extremitäten, während der tiefer zerstörende Lupus fast ausschliesslich die Nase, und zwar die Nasenflügel oder Nasenspitze ergreift, oder doch von hier ausgeht.

Hebra trennt den Lupus exfoliatus und serpiginosus von einander, und hält den Lupus serpiginosus, sowie den Lupus hypertrophicus für den Ausdruck eines Allgemeinleidens.

Die ersten Anfänge des Lupus exfoliatus werden verschieden angegeben; bald soll er nur mit einer dunklen Röthe der Haut, bald aber auch mit Tuberkelbildung beginnen. Der weitere Verlauf charakterisirt sich vor den anderen Formen dadurch, dass sich keine Krusten bilden und die Cutis nicht zerstört wird. Während die Epithelialzellen der Haut in kleineren oder grösseren, weisslichen, kleienartigen Schuppen fortwährend losgestossen werden, verdünnt sich die darunter liegende hochrothe Cutis allmählig, wird glatt und glänzend; auch das subcutane Bindegewebe kann im Verlauf dieser Abschuppung schrumpfen. Lässt dann die Hyperämie nach, so erscheinen die erkrankten Stellen gegen die Umgebung etwas vertieft, auf ihrer Unterlage fester anliegend, ziehen narbenartig die Umgegend an sich heran, werden gefaltet und erhalten eine weisslich glänzende Farbe (die öfter erwähnte Aehnlichkeit mit Brandnarben).

Cazenave und Schedel¹⁾ erwähnen noch eine Varietät des Lupus, welche mit violetten Flecken oder Tuberkeln beginnt, deren Ulcerationen mit kleinen, rothen, weichen, schwammigen, sehr hervorragenden Geschwülsten bedeckt werden. Diese Varietät soll gewöhnlich von bedenklicher Prognose sein. Ich habe mehrere Fälle gesehen, welche dieser Beschreibung entsprechen. In dem am Stärksten ausgeprägten Falle war die in weiterer Ausdehnung angeschwollene, geröthete Backe mit dicken Krusten an verschiedenen Stellen und in verschiedener Ausdehnung bedeckt; rings um diese Krusten fand sich eine immerwährende Abschilferung der Epidermis in grösseren oder kleineren Fetzen von einer gerötheten Unterlage aus. Hob man die gewöhnlich fest anhaftenden Krusten ab, so fand man, mit einer dicken gelben Eiterschicht bedeckte, intensiv rothe, warzige Auswüchse, die mit Condylomen die vollständigste Aehnlichkeit hatten und auch bei genauerer Untersuchung sich als concentrische Anhäufungen junger Zellen um dicke Gefässschlingen erwiesen. Am Lippen-saum der Unterlippe waren diese rothen condylomatösen Auswüchse

¹⁾ l. c. pag. 426.

frei von Krustenbildung, wegen der fortwährend über sie hinweg streichenden feuchten Luft, zumal die Kranke durch die, von Ulcerationen erfüllte Nase nicht athmen konnte.

Alle verschiedenen Formen des Lupus können an demselben Individuum gleichzeitig oder nach einander auftreten.

Die durch den Lupus hervorgebrachten Verunstaltungen sind theils die aller weiterschreitenden Ulcerationen überhaupt, theils sind sie eigenthümlicher Art. Wir erwähnten schon früher der oberflächlichen sowohl wie der tiefer gehenden spontanen Narbenbildung; eine Folge davon sind Ektropien der Augenlider und Lippen, Verwachsungen der Nasenlöcher und Verengung des Mundes (wenn der ulcerative Lupus an den Mundwinkeln zur Vernarbung sich anschickt).

Die begleitenden Zufälle sind: Oedeme der dem Lupus benachbarten Stellen, Anschwellungen der zunächst liegenden Lymphdrüsen und grosse Geneigtheit zu Erysipelen in der Umgegend der vom Lupus ergriffenen Hautstellen. Cazenave und Schedel haben einen günstigen Einfluss des Erysipels auf den Verlauf des Lupus beobachtet; „unter dem Einflusse dieser zufälligen Entzündung bekamen die afficirten Oberflächen (eines Lupus mit Hypertrophie) ein anderes Aussehen, die Vitalität der Haut wurde grösser, die Zertheilung activer, und die Krankheit endigte sich auf eine ebenso schnelle, glückliche, als unerwartete Weise.“ Ich habe unter Hunderten von Lupusfällen unter erysipelatösen Erscheinungen immer nur Fortschreiten des Uebels beobachtet.

Am Uebelsten sind die durch hypertrophischen oder verschwärenden Lupus verursachten Hindernisse beim Kauen und Schlucken, die zuweilen so weit sich steigern, dass nur durch das Schlundrohr die Ernährung bewerkstelligt werden kann. Selbst dieser letzte Weg kann durch die eng aneinander gepressten Zahnreihen verschlossen werden, so dass erst nach Entfernung der Zähne die Einführung eines (doch nur für flüssige Speisen durchgängigen) Schlundrohrs möglich wird. Durch diese Schwierigkeiten und Beschränkungen in der Ernährung sowohl, als vielleicht durch die der eingeathmeten Luft beigemischten stinkenden Gase und durch die verschluckten nekrotischen Massen entstehen allmählig sichtbare Ernährungsstörungen: Abmagerung, Blässe, frequenter, kleiner Puls, reichliche Ausscheidung harnsaurer Salze im Urin, profuse Schweisse, „die Kranken zeigen zuletzt die Symptome einer chronischen Gastro-Enteritis und sterben an einem schleichenden Fieber, welches von einer colliquativen Diarrhöe begleitet ist“ (Cazenave und Schedel). Ehe diese durch den Lupus hervorgebrachten mechanischen Störungen in der Ernährung und Re-

spiration nicht eintreten, sind durchaus keine den Lupus constant begleitenden, allgemeinen Krankheitszustände wahrzunehmen. Wohl aber vermag ich aus einer grossen Reihe von Erfahrungen zu bestätigen, dass die Mehrzahl der geheilten Lupuskranken später und zwar meist vor Ablauf des 30sten Jahres an Lungenschwindsucht stirbt.

Aetiologie. Lupus befällt vorzugsweise jugendliche Individuen von 10—20 Jahren, sehr selten Leute über 40 Jahre. Am Häufigsten sieht man ihn bei scrophulösen Kindern gegen die Zeit der Pubertäts-Entwicklung zum Ausbruch kommen. Aber es giebt auch viele Lupuskranken, an denen keinerlei Erscheinungen der Scrophelkrankheit nachweisbar sind. Ebensowenig haltbar ist die Ansicht, dass Syphilis als ein ätiologisches Moment für Lupus anzusehen sei. Der Umstand, dass viele knotige und serpiginöse Syphilide (sog. Radesyge) eine grosse Aehnlichkeit mit Lupus darbieten, hat in dieser Beziehung grosse Verwirrung angerichtet. Jedenfalls steht aber fest, dass bei der Section von Lupuskranken noch nie syphilitische Erkrankungen innerer Organe gefunden sind (Virchow) und dass daher die acquisite Syphilis nicht als Grund des Lupus angesehen werden kann. Sollte die hereditäre Syphilis Lupus erzeugen, so wäre wohl ein viel früheres Auftreten (bald nach der Geburt) zu erwarten, welches bisher noch von Niemand beobachtet ist. — Viele geben an, dass der Lupus in ganz gleichem Verhältnisse das männliche wie das weibliche Geschlecht ergreife; ich fand ihn bei letzterem häufiger. Es scheint ferner mehr eine Krankheit der Landbewohner als der Städter zu sein, — und unter den letzteren gewöhnlich (nicht immer) die höheren Stände zu verschonen. — Abgesehen von diesen wenigen Thatsachen sind die ursächlichen Verhältnisse des Lupus mit denen der übrigen Neubildungen in dasselbe Dunkel gehüllt.

Diagnose. Der Lupus hat in seinem Verlaufe so bestimmte Eigenthümlichkeiten, dass derselbe auch ohne Hülfe des Mikroskopes in den meisten Fällen bald erkannt wird, während die ersten Anfänge manche Schwierigkeiten für die Diagnose darbieten.

Leicht ist gewöhnlich die Unterscheidung der dunkel gerötheten prominirenden Knoten der Acne rosacea (Gutta rosacea) von denen des beginnenden Lupus. Die Hautverdickungen und die Gefässausdehnung bei der Acne hängt, wie G. Simon¹⁾ gezeigt hat, von dem den Rückfluss des Blutes erschwerenden Drucke ab, welche die (durch Anhäufung von Fett und Epithelialzellen) vergrösserten Hautbälge auf die Cutis ausüben. Weiterhin entstehen dann jene Verdickungen der

¹⁾ Die Hautkrankheiten etc., Berlin, 1848, pag. 336.

Haut, die Hebra¹⁾ zuerst richtig von einer Neubildung von Bindegewebe mit gleichzeitiger Gefässneubildung herleitete. Auf der Spitze der Acne-Knoten befinden sich gewöhnlich die schwarzen Punkte der Comedonen, während wir beim beginnenden Lupus gerade eine Obliteration jener Bälge beobachten. Die Eiterung der Acne-Knoten tritt nur an ihrer Spitze zwischen Corium und Epidermis oder innerhalb des Gewebes der Lederhaut auf, und hat durchaus nicht die Tendenz zur Verschwärung, wie beim Lupus. Die Acne-Knoten sind, im Gegensatz zu den lupösen Verdickungen, schmerzhaft und fliessen nicht, wie diese, zusammen.

Auch auf die Aehnlichkeit der Elephantiasis Graecorum mit Lupus hypertrophicus und die Verwechslung des ulcerirenden Lupus mit den impetiginösen Hautkrankheiten, deren differentielle Diagnose wir übergehen, wird hingewiesen. Wo es sich um nähere Bestimmung der Bedeutung ulcerirender Hautstellen handelt, wird, nächst den durch den Verlauf des Uebels gegebenen Anhaltspunkten, das Mikroskop am Sichersten den Ausschlag geben.

Von vielen Seiten²⁾ ist auf die grosse Aehnlichkeit des Lupus mit syphilitischen Hautkrankheiten mit Recht aufmerksam gemacht worden (vgl. pag. 38). Die in der Haut unter dem Einfluss der syphilitischen Dyskrasie sich bildenden Knötchen oder Tuberkeln sind, nach Cazenave, voluminöser, runder, haben die oft erwähnte kupferrothe Färbung und sind nicht, wie die des Lupus, mit weisslichen, sich immer wieder von Neuem abstossenden Epidermisschuppen bedeckt. Der syphilitische Tuberkel kommt ferner, im Gegensatze zum Lupus, gewöhnlich nur bei älteren Personen vor. Der ulcerirende syphilitische Tuberkel hat angeschwollene, geröthete, zackige Ränder, verbreitet sich in die Tiefe oder nach den Seiten in sinuösen Ausbuchtungen, bildet auch wohl im Verlauf der Verschwärung fistulöse Gänge unter der Haut; die Verschwärung des Lupus dagegen beginnt immer von der Oberfläche her und tritt auch viel eher ein, als beim syphilitischen Tuberkel. Die benachbarten Knochen, z. B. der Unterkiefer, Ossa nasalia, werden vom Lupus nur blossgelegt, so dass sie glatt, ohne augenscheinliche Veränderungen, im Grunde der Geschwürsfläche liegen, während die syphilitische Verschwärung auf dieselben übergreift. Ausserdem werden die übrigen, am Körper durch die Syphilis verursachten Krankheitszustände immer wesentliche Unter-

¹⁾ Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 1845. Mai. pag. 115.

²⁾ Vgl. Cazenave, Praktische Darstellung der Hautkrankheiten, pag. 431, — Virchow, Geschwülste, Bd. II. pag. 491.

scheidungsmerkmale abgeben. In vielen Fällen wird aber auch nur auf Grund dieser letzteren die Unterscheidung möglich sein.

Die **Prognose** des Lupus im einzelnen Falle bestimmt stellen zu wollen, ist immer gewagt. Tödlich ist er an sich (vgl. pag. 38) nur in den Fällen, wo er durch seine Localität die Ernährung des Kranken beeinträchtigt. Um so mehr sind die örtlichen Zerstörungen zu fürchten, die er selbst im Fall einer Heilung (vgl. Narben und ihre Folgen) zurücklässt. Schon oben (pag. 34) erwähnten wir die prognostische Bedeutung der einzelnen Formen des Lupus, nach den reichen Erfahrungen von Hebra. Nach unseren Erfahrungen ist der Lupus hypertrophicus (mit dem oben beschriebenen Ausgange) die schlimmste Form¹⁾. Der Lupus vernarbt bisweilen nur scheinbar, d. h. er tritt unter den Narben wieder auf. Diese sind dann gewöhnlich etwas geschwollen, weich, mit erweiterten Gefässen durchzogen, bläulichroth gefärbt, und gewähren, nach Bielt, das Gefühl von Fluctuation. Sind in der Umgegend von Lupusnarben noch vereinzelt Knoten vorhanden, dann ist der Wiederaufbruch derselben sehr zu befürchten.

In Bezug auf die **Therapie** des Lupus sind die Ansichten der Aerzte ebenso verschieden, wie in Betreff seiner Aetiologie, indem die Einen der antidyskrasischen²⁾, die Andern der bloß örtlichen Behandlung, — entweder einer sogenannten umstimmenden³⁾ oder

¹⁾ Ein, lange Zeit in meiner Klinik behandelter, 27jähriger Kranker gewährte ein fürchtbares Bild dieser Verwüstung. Ober- und Unterkiefer war bis nahe an den Angulus maxillae infer. und den Zahnbogen entblösst, die Knochen lagen glatt und trocken zu Tage, die Nase war bis über die Nasenbeine hinaus zerstört, das rechte Auge durch einen der Gangrän entgegenstehenden dicken Wulst gänzlich verschlossen, das linke noch etwas geöffnet und entzündet, rings um die Zunge lagen im Munde ulcerirende Wülste, vor ihnen pallisadenförmig die schwärzlich gefärbten, gelockerten Zähne, von denen schon einzelne ausgefallen; die Ernährung nur mittelst eines Rohres möglich. Alle innerlichen und äusseren Mittel, der wiederholte Gebrauch des Messers (plastischer Ersatz der ganzen Ober- und Unterlippe), waren fruchtlos. — Aehnliche Fälle, jedoch meist ohne genügende Anamnese, finden sich hie und da in anatomischen Sammlungen.

²⁾ Gegen den scrophulösen Lupus wird die ganze Reihe der Antiscrophulosa empfohlen, besonders aber der Leberthran (Hebra) und die Jodpräparate, namentlich Hydrargyrum bijodatum rubrum (Wernher). Bei Syphilitischen hat meist schon ein reichlicher Quecksilbergebrauch früher Statt gefunden, und es sind daher auch hier die Jodpräparate, ausserdem aber und vorzüglich das Zittmann'sche Decoct empfohlen worden.

³⁾ Eine solche umstimmende Wirkung sollen besonders haben: Jodschwefelsalben (etwa 1 Sulphur jodatum auf 25 Fett) nach Bielt, oder auch schwache Jodquecksilbersalben (1 bis 2 Jodum purum auf 25 graue Quecksilbersalbe) nach Blasius und Wernher. — Ich habe von diesen Mitteln keinen anderen Erfolg als den einer oberflächlichen Aetzung beobachtet.

aber der Zerstörung der lupösen Theile durch Aetzmittel¹⁾ oder Ausschneiden und Ausschälen (Auslöffeln) derselben, — das Wort reden. Die Ergebnisse der zerstörenden Localtherapie sind immer noch die erfreulichsten. Natürlich wird dies kein Grund sein die antidyskrasische Behandlung zu vernachlässigen, sobald eine bestimmte Dyskrasie (Scrophulosis, Syphilis) bei dem vom Lupus befallenen Individuum besteht. Ob es aber innere Mittel giebt, welche gegen den Lupus selbst (d. h. also gegen diese eigenthümliche Neubildung in der Haut) eine spezifische Wirksamkeit besitzen, bleibt ebenso problematisch, wie die Annahme einer lupösen Dyskrasie.

Gegen den Lupus exfoliatus wendet Hebra, welcher diese Form für eine örtliche, idiopathische Krankheit hält, auch nur örtliche Mittel (Aetzmittel) mit dem besten Erfolge an; innere Mittel blieben, nach seinen Erfahrungen, gänzlich fruchtlos. Der Lupus serpiginosus, sowie der Lupus hypertrophicus und exulcerans sind, nach demselben Autor, der Ausdruck eines Allgemeinleidens, gegen welches von ihm „die verschiedensten Arzeneien innerlich und äusserlich angewandt wurden, doch immer, und selbst bei andauernder und örtlich sehr schmerzhafter Einwirkung, mit einem höchst zweifelhaften und selten bleibenden Erfolge²⁾.“ Ich habe gegen keinerlei Form des Lupus (mit Ausschluss der lupusähnlichen Syphiliden) von irgend einem inneren Mittel einen günstigen Erfolg gesehen, wohl aber von einer Verbesserung der gesammten Ernährung, — immer freilich bei gleichzeitiger Anwendung einer möglichst gründlich zerstörenden Localtherapie.

¹⁾ Die Wahl des Aetzmittels ist wohl gleichgültig. Am Schnellsten, Sichersten und Gefährlosesten möchte das Chlorzink (vgl. Bd. I. pag. 110) wirken. Chlorgold ist allerdings mindestens ebenso wirksam, aber zu kostspielig. Auch das Einbohren von Stückchen Aetzkali in die lupösen Gewebe führt zu einer gründlichen Zerstörung. Die Anwendung des Höllensteins (Hebra) ist zeitraubender und schmerzhafter. Die Galvanokaustik lässt auch hier alle Aetzmittel weit hinter sich. Das Glüheisen ist wegen der unvermeidlichen strahlenden Wärme namentlich im Gesicht, selten gut anzuwenden. Wo es die Localität zulässt, verdient das Messer den Vorzug, zumal wenn sofort plastischer Wiederersatz des entfernten Theils möglich ist. Zu plastischen Operationen wird man sich aber, so lange die benachbarten Theile noch Spuren von Lupus zeigen, wegen der Gefahr der Recidive, nicht entschliessen.

²⁾ Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte. VI. Jahrgang.

Zweiter Abschnitt.

Von den Krankheiten des Binde- gewebes.

Erstes Capitel.

Entzündung des Bindegewebes und deren Ausgänge.

I. Von der Bindegewebs-Entzündung, Phlegmone, im Allgemeinen.

Ursachen. Die Entzündung des Bindegewebes ist von Alters her als der Typus aller Entzündungen betrachtet worden. Der grösste Theil der Ursachen, welche bei der Entzündung im Allgemeinen aufgeführt sind, vermögen dieselbe zu erregen. Entzündung des Bindegewebes kann wegen der Verbreitung desselben fast an allen Stellen des Körpers auftreten. Mit allen ihren Eigenthümlichkeiten beobachtet man dieselbe indess vorzugsweise an den Stellen, wo dasselbe reichlich angehäuft ist, daher: in der Achselgrube, am Halse, an der Brustdrüse der Frauen, in der Umgegend des Afters, in der Leistengegend, an den Gliedmaassen. Die gewöhnlichsten Ursachen einer Entzündung des Bindegewebes sind: fremde Körper, Wunden (besonders Stich- und Schusswunden), Fracturen mit Splitterung der Knochen, tiefe Verbrennungen. Es giebt aber auch „spontane Phlegmonen“, die aus innerem Grunde entstehen, oder die sich unter dem Einfluss einer sehr unbedeutenden Ursache entwickeln. Eine Entzündung der Art zeigt ganz eigenthümliche Charaktere: fieberhafte Erscheinungen gehen ihr voraus, während bei der örtlich erregten Phlegmone allgemeine Erscheinungen erst nachfolgen, auch ganz fehlen können.

Symptome. Die „phlegmonöse Geschwulst“ ist mehr oder weniger umfangreich, umschrieben, hart, resistent, tief geröthet, besonders im Mittelpunkte, und so, dass die Röthe auf Druck entweder durchaus nicht verschwindet oder doch aus der Tiefe schnell zurückkehrt. Der Schmerz ist stechend oder mit einer Empfindung von Pulsation verbunden. Der kranke Theil scheint dem Kranken schwerer ge-

worden zu sein. Die zwar lebhaftere Hitze hat nicht das eigenthümlich Brennende, wie bei der Rose; sie steigert sich aber und nimmt auch diesen letzten Charakter an, sobald die Entzündung sich gegen die Haut hin ausbreitet. Zuweilen ist die Hitze nur unbedeutend, namentlich, wenn die Phlegmone in der Tiefe sitzt. Geschwulst, Farbe, Hitze sind veränderlich, je nach den Stellen, an welchen das Bindegewebe ergriffen ist; auch kann jedes dieser Symptome zu verschiedenen Zeiten auftreten. Während beim Furunkel z. B. die Entzündungsgeschwulst sich schnell zuspitzt, dehnt sie sich bei der Phlegmone des Unterhautbindegewebes mit der grössten Leichtigkeit in der Tiefe weiter aus, während sie an der Oberfläche sich in kaum merklicher Weise erhebt. In den Scheiden der Sehnen und Muskeln verbreitet sich die Entzündung mit grosser Geschwindigkeit nach der Längsrichtung dieser Organe, während sie in der entgegengesetzten Richtung in ihrer Ausbreitung gehemmt und gleichsam eingeklemmt wird. Besonders deutlich ist die Einklemmung der Entzündungsgeschwulst unter den grossen Aponeurosen der Gliedmaassen; das grossartigste Beispiel hierfür liefert eine tiefe Phlegmone am Schenkel. Man darf jedoch den Einfluss, welchen der Sitz der Entzündung haben kann, nicht übertreiben. Es ist ausgemacht, dass eine Entzündung des tiefer gelegenen Bindegewebes, unter übrigens gleichen Umständen, immer ernster zu nehmen ist, als eine oberflächliche Phlegmone; war aber die Ursache eine unmittelbare, von Aussen her einwirkende, wirkt sie nicht weiter fort oder lässt sich entfernen, und ist der Gesundheitszustand im Uebrigen befriedigend, so werden sich, in welcher Tiefe auch die Phlegmone sitze, doch immer zwei Bestrebungen geltend machen: Begrenzung des Herdes und Vordringen des Eiters gegen die Oberfläche. Dagegen kann die oberflächlichste Entzündung des subcutanen Bindegewebes gerade das entgegengesetzte Bestreben zeigen, wenn sie sich unter dem Einflusse mittelbar wirkender, innerer Ursachen oder in Folge einer gewaltigen Erschütterung (als sogen. serös-purulenten Oedem) entwickelt. Eine „Phlegmone diffusa“ kann auf das Polster der Haut beschränkt bleiben und nichtsdestoweniger den Tod herbeiführen, während eine in der Tiefe bestehende Phlegmone, die aus äusseren Ursachen hervorgegangen ist, sich begrenzt und häufig einen günstigen Ausgang nimmt. Es liegt also im Wesen mancher Bindegewebs-Entzündungen diffus aufzutreten, während andere umschrieben bleiben, wenn auch die localen Verhältnisse ihre Verbreitung noch so sehr begünstigen. Die letzteren treten mit fibrinreichem Exsudat auf, während jene ein dünnflüssiges oder doch schnell zerfallendes Exsudat liefern.

Der Verlauf der Bindegewebs-Entzündung ist mitunter ein äusserst rascher, da sie innerhalb fünf Tagen, und selbst noch eher, in Eiterung übergehen kann. Diese ist der gewöhnliche Ausgang, zumal wenn die Entzündung lebhaft war, und wenn sie eine Stelle befallen hat, an welcher viel Fettgewebe vorhanden ist. Dagegen stellt sich unter den entgegengesetzten Verhältnissen die Eiterung erst am 15. oder gar 20. Tage ein. Bei noch langsamem Verlaufe geht die Bindegewebs-Entzündung gewöhnlich in Verhärtung über. — Brand ist zu fürchten, wenn die Entzündungsgeschwulst in ihrer Entwicklung durch fibröse Häute gehemmt wird, oder wenn die entzündeten Gewebe mit Excrementen (Harn, Fäces) in Berührung kommen. Eine schwache Constitution, eine bereits zerrüttete Gesundheit erhöhen die Wirksamkeit dieser Ursachen. Bleibt der Brand auf einen kleinen Raum beschränkt, so ist er nicht gefährlich. Oftmals beschleunigt er die Beendigung der Krankheit, indem er die einklemmenden Gewebe zerstört und so dem Eiter freien Abfluss verschafft. Mit Recht fürchtet man aber den weit verbreiteten und fortschreitenden Brand, wie er nach schweren Verletzungen im Gefolge der Phlegmone auftritt. — Der günstigste Ausgang ist die Zertheilung. Sie tritt ein, wenn die Entzündung nicht sehr heftig war und an einer Stelle auftrat, wo wenig Fett liegt. Die Rückkehr des ergriffenen Theiles in den normalen Zustand wird durch die gleichmässige Abnahme aller Symptome bezeichnet. War das Unterhaut-Bindegewebe ergriffen, so schuppt sich beim Ausgange in Zertheilung die Epidermis ab, da die Ernährung der Cutis unter solchen Verhältnissen immer leidet.

Anatomische Veränderungen. Das entzündete Bindegewebe ist von der exsudirten Blutflüssigkeit, die zum Theil fest geworden, oft ganz geronnen ist, erfüllt und durchdrungen. Seine Maschen sind dichter, sein Gewebe leichter zu zerreißen und zu durchschneiden. Im Anfange der Krankheit zeigt es eine geröthete Schnittfläche und ein Gefüge, welches einigermaassen dem der Milz ähnlich ist; Blut mit Eitertröpfchen vermischt dringt daraus hervor. Nach längerer Dauer findet man den Eiter an einzelnen Stellen in grösserer Menge angehäuft, und endlich zu mehr oder weniger grossen Abscessen vereinigt.

Die **Prognose** ist nicht bedenklich, wenn die Entzündung oberflächlich, wenig ausgebreitet und aus einer äusseren Ursache hervorgegangen ist; anders verhält es sich, sobald das Bindegewebe in der Tiefe ergriffen ist, wenn die Entzündung unter dem Einflusse einer inneren oder allgemeinen Ursache steht, wenn sie in grosser Ausdehnung oder in der Nähe eines wichtigen Organs auftritt, dessen Function durch sie beeinträchtigt werden könnte,

Behandlung. Topische Blutentziehungen und Anwendung der Kälte sind diejenigen Mittel, durch welche man Zertheilung einer Phlegmone zu erzielen hofft. Freilich gelingt dies nicht oft und immer nur in den relativ günstigen Fällen. Jedoch möchte dadurch jedenfalls die demnächst eintretende Eiterung weniger umfangreich und oberflächlicher werden, was schon ein grosser Vortheil ist. Dass die von vielen Seiten empfohlenen Einreibungen von grauer Quecksilber-Salbe oder irgend welche innere Mittel einen günstigen Einfluss hätten, habe ich nie beobachten können. Ist das entzündete Bindegewebe dem Messer zugänglich, so leistet eine bis in dasselbe eindringende Incision bei Weitem mehr als alle anderen Mittel, indem dadurch Blutentziehung und Entspannung zugleich bewirkt und, im Falle des (meist wahrscheinlichen) Ausganges in Eiterung von vornherein dem Eiter freier Abfluss verschafft wird. Man sollte sie daher niemals unterlassen, wenn durch Kälte und Bluteigel nicht schnell Besserung erreicht wird. Fortgesetzte Eisumschläge lindern auch später die Schmerzen und begünstigen augenscheinlich entweder die Zertheilung, welche immer erwünscht ist, oder beschränken doch die Eiterung. (Im Uebrigen vgl. „Entzündung“ und „Eiterung“, Bd. I.)

II. Phlegmonöses Erysipelas. Pseudo-Erysipelas. Entzündung des Unterhaut-Bindegewebes. Phlegmone diffusa. Serös-purulentes Oedem.

Man unterschied früher „phlegmonöses Erysipelas“ und „erysipelatöse Phlegmone“, je nachdem eine Entzündung, unter Erscheinungen, welche einem Erysipelas anzugehören schienen, von der Haut auf das subcutane Bindegewebe, oder aber von letzterem auf erstere sich verbreitet hatte. Dupuytren hat diese Entzündungen mit Recht als Phlegmone diffusa zusammengefasst und Rust für dieselben, um die scheinbare Aehnlichkeit mit Erysipelas auszudrücken, den Namen Pseudoerysipelas empfohlen. Das überaus schnelle Auftreten einer citrig-serösen Infiltration des Bindegewebes, welches diese Erkrankung auszeichnet, hat Pirogoff¹⁾ veranlasst, sie unter die von ihm aufgestellte Rubrik „serös-purulentes Oedem“ zu subsumiren.

Ursachen. Diese Krankheit kann auf Grund eines Allgemeinleidens ohne Intercurrenz einer äusseren Veranlassung entstehen. Wenn sie nach einem Erysipelas auftritt, so scheint die Krankheits-Ursache,

¹⁾ Grundzüge der allgem. Kriegschirurgie. Leipzig, 1864, pag. 836 u. f.

welche sich in der Haut nicht erschöpft hatte, auf das benachbarte Bindegewebe gleichsam überzugreifen. Besteht in der Haut keine Continuitätstrennung, so bewahrt sie in der Regel ihre isolirende Eigenschaft, und die erysipelatöse Entzündung dringt daher selten in die Tiefe. Das Vorhandensein einer Wunde begünstigt die Fortpflanzung der Entzündung auf das subcutane Bindegewebe. Stichwunden, manchmal auch unbedeutende Excoriationen können diffuse Phlegmonen nach sich ziehen, namentlich wenn der verletzte Theil zugleich heftig erschüttert wurde. Besonders zu fürchten ist dasselbe auch, wenn die Wunde auf irgend eine Weise verunreinigt oder vergiftet wurde. Die Berührung mit faulenden Stoffen, unreinen Instrumenten, schmutzigen Verbandstücken, das Reiben der Kleider an einer vernachlässigten Wunde u. dgl. m. begünstigen die Entwicklung dieser Krankheit. Jedoch scheint, wie für das Erysipelas, eine gewisse Diathese oder die Einwirkung eines bestimmenden Genius epidemicus erforderlich zu sein.

Symptome. Als Vorboten der diffusen Phlegmone beobachtet man gewöhnlich einen Frostanfall, welcher sich nicht selten in regelmässigen Intervallen, ähnlich wie bei einem kalten Fieber, wiederholt. Gleichzeitig erhebt sich die Körpertemperatur bedeutend. Verdauungsstörungen finden sich, wie bei der Rose, gewöhnlich von Anfang an und bleiben oft während des ganzen Verlaufs der Krankheit bestehen. Später nimmt das Fieber häufig einen typhösen Charakter an, ohne dass deshalb immer ein tödtlicher Ausgang zu erwarten wäre. Immerhin ist aber unter solchen Verhältnissen purulente Infection zu fürchten.

Das sorgfältige Studium der örtlichen Symptome ist sehr zu empfehlen, damit man die Krankheit möglichst frühzeitig erkenne; denn nur frühzeitige Hülfe ist von wahren Nutzen. War ursprünglich die Haut ergriffen, so wird die Aufmerksamkeit des Arztes auf diese hin abgelenkt und leicht irre geführt. Geht die Entzündung vom Unterhaut-Bindegewebe aus, so tritt oft die Röthe der Haut erst auf, wenn die Krankheit schon bedeutende Fortschritte gemacht hat.

Die localen Erscheinungen lassen sich, nach Patissier¹⁾, als drei verschiedene Grade oder Stadien der Krankheit darstellen.

Erstes Stadium (Stadium inflammationis). Der zufühlende Finger macht einen leichten Eindruck auf der gerötheten Haut, deren Röthe auf dieser Stelle verschwindet und dann nur langsam wieder erscheint. Vorher hat sich schon an der betreffenden Stelle das Gefühl von Schwere, Jucken und eine Empfindung bemerklich gemacht, als bestände in der Tiefe eine Schwellung der Theile. Die Röthe

¹⁾ Thèse de la Faculté de Paris, 1815.

wird stärker; sie ist gegen die Mitte hin dunkel, im Umkreise kann sie blass und rosig gefärbt sein. Bald lässt sich die Haut nicht mehr in gleicher Weise eindrücken, sie leistet Widerstand, als läge sie unmittelbar auf einem Brette; die Hitze ist brennend, der Schmerz stechend, Phlyctänen erheben sich an einzelnen Stellen. Fieber tritt jetzt auf, wenn es nicht schon vorher bestanden hat.

Im zweiten Stadium (Stadium suppurationis) breitet sich die Entzündung (Infiltration) über die benachbarten Theile aus; die Anschwellung ist beträchtlicher, der Schmerz lebhafter, — Spannung und Gefühl der Einschnürung an der kranken Stelle, gastrische und nervöse Symptome treten schärfer hervor. Dies Stadium wird gewöhnlich durch einen starken Frostschauder angekündigt. Darauf folgt ein für den weniger Geübten trügerischer Nachlass der Erscheinungen. Hatte man aber im Anfange die teigige Geschwulst, dann die brettartige Festigkeit beobachtet, und bemerkt man darauf abermals eine teigige Beschaffenheit der leidenden Stelle, so kann man sicher auf Eiterung schliessen. Das abermalige Teigigwerden der Geschwulst (*oedème de retour*) ist an und für sich schon ein untrügliches Kennzeichen der Eiterung. Fluctuation ist schwer wahrzunehmen, weil der Eiter nicht in einer Höhle, sondern in zahlreichen Maschen, die alle unter einander in Verbindung stehen, eingeschlossen (infiltrirt) ist. So wird man denn auch immer „zu spät“ kommen, wenn man nicht eher einschneiden will, als bis „Schwappung“ deutlich zu fühlen ist.

In dem dritten Stadium (Stadium necroseos) wird die Haut durch die beträchtliche Menge des Eiters in die Höhe gehoben, verdünnt, abgelöst, und (zuweilen sehr schnell) brandig. Bald liegen die Brandschorfe sofort vor Augen, bald nimmt die Haut nur ein schmutziges Aussehen an, und man überzeugt sich von ihrem Absterben erst mit dem Eintritte der Fäulniss. Auf dieser Stufe der Krankheit fühlt man unter dem Finger das Fluctuiren der Flüssigkeit, in der man die Pföcke abgestorbenen Bindegewebes wie festere Knoten unterscheidet. Mitunter hört man vor der Fluctuation ein Crepitationsgeräusch, als Zeichen des Emphysems, welches durch die auf Grund der Zersetzung des brandigen Bindegewebes erfolgende Gasentwicklung entsteht. Bricht die Geschwulst von selbst auf, oder wird sie geöffnet, so entleert sich eine grosse Menge stinkenden Eiters und zerstörten Bindegewebes. Sofort ist dann der Umfang des kranken Theiles um Vieles verkleinert; er sieht aus, als wäre er durch eine langwierige Krankheit abgemagert. Die Ausfüllung der entstandenen Lücken durch Granulationen erfolgt langsam, und zwar desto langsamer, je mehr die Kräfte des Kranken bereits gesunken sind. Häufig

aber kommt es noch vor dem Aufbruch zur Entwicklung der Pyämie. Auch im günstigsten Fall bleiben verkürzte, eingezogene Narben zurück, welche die Function des Theils, namentlich die Brauchbarkeit einer Extremität, immer mehr oder weniger beeinträchtigen. Jedenfalls wird das Fettgewebe nicht wieder ersetzt.

Die Krankheit kann unter dem täuschenden Bilde eines Erysipelas bis zur brandigen Zerstörung der Haut verlaufen, bevor ein Unkundiger die furchtbaren Verheerungen ahnt, die in der Tiefe inzwischen entstanden sind. Der populäre Name Brand-Rose ist daher wohl motivirt und mag sich auch dem jungen Arzte einprägen, damit er den unvermeidlichen Ausgang einer sich selbst überlassenen Phlegmone diffusa stets im Gedächtniss behält.

Prognose. Diffuse Phlegmonen, deren glückliche Heilung ohne Kunsthülfe erfolgte, dürften sich wohl nur an der oberen Extremität und im Gesichte finden. In solchen Fällen muss vorausgesetzt werden, dass die Eiterung durch Verdichtung des umgebenden Gewebes (sogen. Erguss plastischer Lymphe) begrenzt wurde. — Durch eine zweckmässige Behandlung wird man die Eiterung beschränken, man wird sie weniger reichlich und vielleicht auch gutartiger machen können; aber sie ganz zu verhindern, scheint unmöglich zu sein. Die Prognose ist also jedenfalls bedenklich, nicht blos in Betreff der künftigen Brauchbarkeit des erkrankten Theils, sondern auch quo ad vitam. Die Ausdehnung der Krankheit, der Kräftezustand und die Zeit, zu welcher, sowie die Art, in welcher die ärztliche Behandlung eingeleitet wurde, sind für den Grad der Gefahr maassgebend.

Anatomische Veränderungen. War die Krankheit, wie in den letalen Fällen gewöhnlich, bereits in das dritte Stadium getreten, so findet man die Haut an dem kranken Theile missfarbig, an einigen Stellen sehr blass, an anderen schwärzlich; sie ist in ihrer ganzen Ausdehnung abgelöst, oder hängt doch nur durch schmale Fortsätze, die leicht abreißen, mit dem unterliegenden Gewebe zusammen. Nach Durchschneidung der Haut sieht man Fetzen von Bindegewebe, welche im Eiter macerirt sind. Fasst man diese mit der Pincette, so leisten sie Anfangs Widerstand, lösen sich aber bald ab. Sie finden sich von einer beträchtlichen Länge, bis zu 20 Centimeter und darüber¹⁾. Wenn man Wasser darüber strömen lässt, so kann man den Eiter von ihnen abspülen; sie haben dann Aehnlichkeit mit Eihäuten. Später sind die Bindegewebsbündel nur von einer Pseudomembran bedeckt, welche sich leicht ablöst und dann die brüchigen,

¹⁾ Dupuytren, Leçons orales de clinique chirurgicale, Tom. II. pag. 295. — Ich habe sie am Oberschenkel mehrmals noch viel länger gesehen.

matschigen Fasern sichtbar werden lässt; diese zerfliessen endlich, und dann findet man unter der Haut nur noch die Aponeurosen; zwischen diesen und der Haut liegt eine grauliche oder schwärzliche Materie, welche den Raum des Panniculus adiposus einnimmt.

Wenn die Entzündung des Unterhaut-Bindegewebes auf die Aponeurosen übergeht, oder wenn sie, den für den Durchtritt der Gefässe bestimmten Oeffnungen folgend, auf das intermusculäre Bindegewebe sich fortsetzt, so sind die Zerstörungen weit beträchtlicher; dann können selbst die Knochen blossgelegt und ihre äussere Schicht nekrotisirt werden, ohne dass es möglich wäre, vorher zu bestimmen, mit welcher Schnelligkeit alle diese Zerstörungen erfolgen. In solchen schweren Fällen finden sich dann oft die bei der Pyämie beschriebenen Veränderungen in anderen Organen.

Macht man in der ersten Zeit einen Einschnitt in das entzündete Gewebe, so sickert entweder gar keine oder eine milchige Flüssigkeit aus; beim Druck kommt etwas Eiter zum Vorschein. Das Gewebe selbst ist fest, wie Speck. Blut fliesst aus den Einschnitten in solchen Fällen, wo man zufällig relativ grössere Gefässe, stark gefüllte Hautvenen u. dgl. getroffen hat. Schon auf diesem frühen Stadium der speckigen Verdichtung des Bindegewebes sind Eiterung und brandige Zerstörung, welche hier stets Hand in Hand gehen¹⁾, unvermeidlich.

Die **Diagnose** ist nur im Anfange schwierig; indess wird man einen Irrthum, namentlich auch eine Verwechslung mit Erysipelas vermeiden, wenn man die Merkmale beachtet, welche im Vorstehenden bei der Beschreibung der Symptome besonders hervorgehoben wurden. Bei den Krankheiten der Venen und Lymphgefässe, sowie bei der Knochenhaut-Entzündung werden wir auf die differentielle Diagnose der Phlegmone diffusa zurückkommen.

Die **Therapie** muss schnell und energisch einschreiten. Im ersten Stadium wollen Viele theils durch innere Mittel (Emetica, Tartarus stibiatus bald in grossen, bald in kleinen Dosen, Mittelsalze u. dgl. m.), theils durch topische und selbst allgemeine Blutentziehungen in Verbindung mit kalten Umschlägen die weitere Ausbildung der Krankheit verhüten. Je sorgfältiger man aber in neuerer Zeit sowohl in Betreff der Diagnose, als bei der Prüfung therapeutischer Resultate verfahren ist, desto bestimmter hat man sich überzeugt, dass durch alle diese Mittel der Krankheit kaum eine günstigere Wendung gegeben, niemals aber ihr Verlauf ganz abgeschnitten werden kann. Daher unterlässt man auch Alles, was die Kräfte des Kranken erfolglos

¹⁾ „Les tissus frappés de suppuration sont frappés de mort.“ Dupuytren.

Bardleben, Chirurgie. 7. Aufl. II.

schwächen würde (wie namentlich Aderlass und Tartarus stibiatus), jetzt gänzlich, setzt auch den Patienten nicht mehr durch die Einreibungen grosser Dosen grauer Quecksilbersalbe (8 bis 12 Grammen, alle 5 bis 6 Stunden einzureiben, nach Serres) der Gefahr einer Mercurialvergiftung aus, sondern beschränkt sich auf energische Anwendung der Kälte (durch Eisbeutel) und zahlreiche Einstiche und Einschnitte, welche weniger durch Blutentziehung (welche sie allerdings auch bewirken), als durch Entspannung nutzen. Dadurch wird der weiteren Verbreitung der Krankheit in die Tiefe und nach der Fläche am Besten vorgebeugt; die Eiterung wird danach oberflächlicher und weniger ausgebreitet, als wenn man die Krankheit bis ins zweite Stadium sich selbst überlassen oder, nach alter Art, mit feucht-warmen Umschlägen behandelt hätte.

Sanson sah die besten Erfolge von tiefen und öfter wiederholten Incisionen. Dobson zieht es vor, zahlreiche und kleine Einschnitte, 10—14, von höchstens 1 Centimeter Länge, in die entzündete Fläche, und zwar um so tiefer zu machen, je mehr dieselbe geschwollen ist, und giebt diesem Verfahren auch, nachdem Eiterung eingetreten ist, den Vorzug. — Ich kann, aus eigener Erfahrung, die frühzeitigen Einschnitte aufs Lebhafteste empfehlen.

Petit (von Lyon) hat, nach Patissier, grosse Vortheile durch Anwendung der Blasenpflaster erzielt. Delpech sagt, dass er dieses Mittel von Dupuytren mit Erfolg habe anwenden sehen, und lobt es. Man hat jedoch anderer Seits dem Zugsplaster vorgeworfen, das es den Brand beschleunige. Patissier antwortet darauf durch Zahlen: nach ihm kam auf 40 Fälle, welche mit diesem Mittel behandelt wurden, nur ein Mal Brand und zwar trat hier der Brand aus dem Grunde ein, „weil ein asthenisches Fieber mit der örtlichen Erkrankung complicirt war“ (?). In seinen „Leçons orales“ vertheidigt Dupuytren sich dagegen, dass man geglaubt habe, er gebe diesem Mittel den Vorzug. Er sagt, dass er zu verschiedene Wirkungen davon gesehen habe, als dass er es unbedingt loben könne. — Jedenfalls geht man sicherer, wenn man von Anfang an Incisionen macht.

Die Compression ist am Häufigsten von Velpeau angewendet und gelobt worden. Doch soll, nach der eigenen Angabe Velpeau's ein gleichmässiger Druckverband, nach dem dritten Tage angelegt, nur noch dazu dienen können, die Entzündung zu mässigen und die Eiterung zu concentriren.

Im zweiten Stadium wäre es ganz unverantwortlich, wenn man die Zeit noch mit der Anwendung indirect wirkender Mittel verschwenden wollte. Sie können dann nur noch nebenbei in Betracht kommen, während chirurgische Hülfe gebieterisch verlangt wird. Die Aufgabe ist: die Haut an mehreren Stellen in grosser Ausdehnung zu spalten und die Aponeurosen durch Einschnitte zu entspannen, worauf dann die weitere (namentlich antiseptische) Behandlung der Suppuration folgen muss. Vgl. Bd. I. pag. 257 u. f. Bei grösserer Ausbreitung der Phlegmone genügt eine Incision niemals, selbst wenn man sie sehr gross macht. Der Eiter muss durchaus freien Abfluss

erhalten. Zu diesem Behuf sind oft mehrfache Einschnitte oder Gegenöffnungen zu machen. Stärkeres Streichen und Drücken, welches manche Aerzte noch immer anwenden, um die Entleerung des Eiters zu befördern, ist verwerflich, weil dabei junge Granulationen zerquetscht und die benachbarten Bindegewebsschichten oft erst mit Eiter gefüllt werden.

Im dritten Stadium würden antiphlogistische Mittel, anstatt zu nützen, nur schädlich sein. Hier sind, nachdem Einschnitte gemacht und die brandigen Gewebe entleert sind, äusserlich Antiseptica, innerlich roborirende Diät, guter Wein und andere Stärkungs- und Belebungs-Mittel indicirt, wie wir dies bei der „Behandlung grosser Eiterungen“ im Allgemeinen erläutert haben (vgl. Bd. I.).

III. Wassererguss im Bindegewebe. Oedema.

Oedem nennen wir eine, durch Erguss von Blutwasser in die Maschen des Bindegewebes gebildete Geschwulst. Sitzt dieser Erguss im Unterhaut-Bindegewebe und ist er über einen grossen Theil des Körpers verbreitet, so nennt man ihn Anasarca.

Die anatomische Untersuchung ödematöser Theile zeigt, dass aus jedem Schnitt grosse Mengen von Blutwasser theils von selbst, theils bei Anwendung eines Druckes, wie aus einem Schwamme hervorrieseln. Das Bindegewebe ist blass, seine Lamellen und Faserbündel sind durch die angesammelte Flüssigkeit auseinander gedrängt, so dass sie verschieden gestaltete und unter einander communicirende Hohlräume zwischen sich lassen. Hierauf beruht es, dass aus einer einzigen Wunde des ödematösen Theils eine ungemein grosse Menge von Flüssigkeit entleert werden kann. Zuweilen ist der Inhalt dieser Höhlen nicht vollkommen wässerig, sondern einer durchscheinenden Gallerte ähnlich. In dem ödematösen Gewebe entdeckt man leicht die durch dasselbe verlaufenden Nerven und Gefässe, besonders auch die Lymphgefässe. Sie erscheinen isolirt mitten in der sie umspülenden Flüssigkeit, indem die ihnen sonst dicht anliegenden Bindegewebszüge durch jene von ihnen abgelöst und verdrängt worden sind. Die Fettzellen finden sich in dem ödematösen Bindegewebe unversehrt. Bestand das Oedem im Unterhautbindegewebe schon lange Zeit und hatte es einen beträchtlichen Grad erreicht, so ist auch die äussere Haut verdünnt und ihre Fasern sind auseinandergedrängt. Hier und dort zeigen sich Spalten und Risse in ihr, die jedoch äusserlich noch von der Epidermis verdeckt werden, welche an den entsprechenden Stellen ausgedehnt und dadurch schwach durchscheinend wird. Die

Farbe der Haut ist mehr oder weniger weiss, so lange ihre Ausdehnung nicht auf das Aeusserste gesteigert ist; geschieht dies, so wird sie glänzend und halb durchscheinend. Die Flüssigkeit, welche man in ödematösem Bindegewebe vorfindet, ist im Allgemeinen wasserhell oder schwach gelblich.

Symptome. Die durch Oedem bedingte Geschwulst ist blass oder weiss, weich, teigig anzufühlen, kühler, als die umliegenden gesunden Hautstellen, weil in der Haut selbst nur wenig Wärme gebildet und die Zuleitung derselben aus den tieferen Schichten durch die dazwischen gelagerte Flüssigkeit behindert wird. Die Falten der Haut verschwinden. Die Geschwulst wird um so bedeutender, je weniger straff das Bindegewebe des ödematösen Theils ist. Der Fingerdruck hinterlässt eine sehr langsam verschwindende Grube. Wendet man methodische Compression auf den ergriffenen Theil an, oder lagert denselben relativ hoch, so vermindert sich die Geschwulst, indem die ergossene Flüssigkeit nach physikalischen Gesetzen ihren Ort verändert. Bestehen neben diesen objectiv wahrnehmbaren Symptomen keine Schmerzen an der geschwollenen Stelle, so hat man es mit einem passiven oder consecutiven Oedem zu thun, welches immer nur als Symptom eines Allgemeinleidens, oder als die Folge einer den Rückfluss der Ernährungssäfte hindernden mechanischen oder organischen Veränderung aufzufassen ist. Dies Oedem ist chronisch.

Es giebt aber auch ein acutes oder actives, entzündliches, hitziges Oedem. Dies ist ausgezeichnet durch eine leichte Röthung der Haut und Hitze an der betreffenden Stelle, prickelnde und heftige Schmerzen und Empfindlichkeit gegen Druck, wozu sich bei empfindlichen Personen oder grosser Ausdehnung auch Fieber gesellen kann. Hier handelt es sich um eine Entzündung des Bindegewebes mit Ausgang in wässerigen Erguss. Sehr selten aber ist dieser Ausgang rein; gewöhnlich besteht vielmehr zugleich Eiterung oder Bluterguss. Solche Fälle, die man, nach dem Vorgehen von Pirogoff, als „serös-purulenten Oedem“ bezeichnet, während Andere sie zu den Phlegmonen, und zwar zu den schlimmsten Formen derselben rechnen, kommen fast ausschliesslich nach schweren, mit gewaltiger Erschütterung des getroffenen Körpertheils complicirten Verletzungen vor. Vgl. pag. 45.

Die **Diagnose** des Oedems bietet niemals Schwierigkeiten dar, wenn man die so eben aufgeführten Symptome sorgfältig beachtet. Höchst schwierig dagegen ist es in manchen Fällen zu bestimmen, ob das Oedem ein rein örtliches Leiden ist, oder auf einer anderweitigen Erkrankung beruhe.

Der Sitz des Oedems ist in der grossen Mehrzahl der Fälle das Unterhaut-Bindegewebe; es ist aber auch in dem submucösen, subserösen und intermusculären Bindegewebe beobachtet worden und namentlich im Bereich der Respirationsorgane von grosser Bedeutung; selbst das im Innern der Organe gelegene Bindegewebe kann davon ergriffen werden. Diejenigen Gegenden des Körpers, in welchen unter der Haut kein Fettpolster liegt, werden am Häufigsten von Oedem ergriffen; an diesen Stellen treten seine Symptome auch am Schärfsten hervor, so z. B. an den Augenlidern, am Scrotum etc.

Aetiologie. Das reine (nicht purulente) Oedem ist als örtliche und selbstständige Krankheit höchst selten. Ein solches idiopathisches Oedem entsteht auf Grund localer Reizungen der Haut, gewöhnlich aber doch nur unter gleichzeitiger Concurrenz einiger der sogleich zu erläuternden „begünstigende Momente.“

Das symptomatische Oedem ist bald von Entzündungen, bald von Verletzungen, bald von organischen Veränderungen, bald von krankhafter Beschaffenheit des Blutes abhängig. Unter den Entzündungen, welche Oedem in ihrem Gefolge haben, sind besonders zu nennen: Erysipelas, Phlegmone, Entzündung der Lymphgefässe. Von der diagnostischen Bedeutung des Oedems für den Uebergang einer Phlegmone in Eiterung war schon oben die Rede (pag. 47). Eine gewöhnliche Erscheinung ist das Oedem bei Quetschungen, Verrenkungen und Knochenbrüchen, überall als Beweis einer in der Tiefe Statt findenden Kreislaufstörung oder einer in der Umgebung der verletzten Theile entstandenen Entzündung. Unter den organischen Krankheiten sind es besonders diejenigen der Kreislaufs-Organen, welche Oedem herbeiführen, indem sie den Rückfluss des venösen Blutes hindern. In ähnlicher Weise können Krankheiten der Leber und der Milz, durch mechanische Hemmung des Blutlaufs in diesen Organen, Ursachen des Oedems werden. Häufiger aber beruht das Oedem bei Erkrankungen der letztgenannten Organe auf der mit ihnen zugleich sich entwickelnden Erkrankung des Blutes. Vollkommen mechanisch dagegen erklärt sich die Entstehung des Oedems an den unteren Extremitäten, wenn Geschwülste in der Beckenhöhle die grossen Venenstämme daselbst comprimiren, während der kräftigere Blutstrom in den Arterien diesen Druck noch zu überwinden vermag. In dieser Weise wirkt auch der Uterus gravidus. Bei Menschen, welche viel aufrecht stehen, und besonders bei solchen, welche in dieser Stellung längere Zeit im Wasser angestrengt arbeiten, entsteht Oedem um die Knöchel und von da weiter aufwärts, indem der Druck der Blutsäule im System der Vena cava inferior der Blutbewegung in diesem Abschnitte des Gefässsystems entgegenwirkt.

Eine andere Quelle für die Entstehung des Oedems liefern gewisse Veränderungen des Blutes. Je weniger reich an festen Bestandtheilen, besonders an Albumin und Fibrin, das Blut ist, desto leichter dringt bei unbedeutenden mechanischen Veranlassungen, oder auch ganz ohne dieselben, das Blutwasser durch die Gefässwandungen in die Maschen des Bindegewebes ein. So kann eine Unterdrückung der Transpiration oder der Harnabsonderung (zumal wenn, wie bei Morbus Brightii, zugleich durch die Nieren dem Blute Eiweiss entzogen wird) Veranlassung des Oedems werden, indem das Blut durch die Unterdrückung jener normalen Secretionen mit Wasser überladen und somit relativ arm an festen Bestandtheilen wird. Profuse und lang andauernde Eiterungen und wiederholte oder bedeutende Blutungen bedingen Oedem, indem sie dem Blute direct feste Bestandtheile entziehen. Derselbe ätiologische Zusammenhang findet sich, wenn die Düninflüssigkeit des Blutes durch schlechte Ernährung, übertriebene Anstrengungen, oder durch Krankheiten des Blutes (Chlorosis, Typhus) bedingt ist. — Ob und in welchem Maasse hierbei auch eine geringere Widerstandsfähigkeit (grössere Permeabilität) der Gefässwandungen wirksam ist, muss noch dahingestellt bleiben.

Verlauf. Je nach der Krankheit, durch welche das Oedem veranlasst wird, ist der Verlauf desselben höchst verschieden. Beruht es auf einer vorübergehenden Behinderung des Blut-Rückflusses, so verschwindet es alsbald, wenn diese beseitigt ist. In der Reconvalescenz nach schweren Krankheiten tritt es in der Umgegend der Knöchel im Laufe des Tages auf, sobald die Beine herabhängen, und verschwindet Nachts, während der Körper sich in liegender Stellung befindet. Dieses zeitweise auftretende Oedem dauert so lange an, bis die Theile ihren gehörigen Tonus und das Blut seine normale Beschaffenheit wieder erlangt haben. Nach einer Fractura comminuta oder einer Phlegmone verschwindet das Oedem erst, wenn die Heilung der gedachten Uebel nahezu vollendet ist.

Beruht das Oedem auf einem tieferen Leiden, welches sich nicht beseitigen lässt, so steigert sich die Schwellung stetig und die Haut wird endlich so weit verdünnt, dass sie an einzelnen Stellen aufbricht, worauf dann grosse Quantitäten von Wasser aus diesen Oeffnungen sich entleeren. Die Verminderung der Geschwulst ist aber nur vorübergehend, da die Oeffnungen durch adhäsive Entzündung alsbald wieder verschlossen werden. Solche spontane Entleerungen können sich mehrmals wiederholen. Zuweilen werden die ödematösen Theile auch von Erysipelas, oder auf Grund des Druckes, den ihre eigene Schwere auf die unterliegende Haut ausübt, von Brand befallen. Die Veranlassun-

gen zum Erysipel, welches seiner Seits an ödematösen Theilen leicht in Brand übergeht, können höchst unbedeutende Verletzungen sein.

Die **Prognose** des Oedems ist im Allgemeinen abhängig von der Natur der ihm zu Grunde liegenden Krankheit. An und für sich kann es nur durch seinen besonderen Sitz, z. B. als Oedema glottidis, gefährlich werden. Im Allgemeinen aber gewährt es eine desto bessere Prognose, je kürzere Zeit es besteht, je jünger das Individuum und je besser das Allgemeinbefinden ist. Von geringer Bedeutung ist es in der Reconvalenz von schweren Krankheiten, es sei denn, dass es als Symptom eines neuen Uebels (z. B. von Nephritis parenchymatosa nach Scharlach) auftritt. In chronischen Krankheiten deutet das Auftreten des Oedems im Allgemeinen eine Verschlimmerung an.

Bei der **Behandlung** des Oedems treten uns zwei Indicationen entgegen: 1) die Krankheit, welche dem Wassererguss zu Grunde liegt, zu beseitigen und 2) die Aufsaugung oder Entleerung der ergossenen Flüssigkeit zu befördern. — Oft reicht es hin, die erste Indication zu erfüllen, und die Aufsaugung erfolgt nach Beseitigung der Grundkrankheit von selbst. In solcher Weise bewirken die Heilung des Oedems: das Oeffnen eines tiefliegenden Abscesses, die Exstirpation einer Geschwulst, welche die Venen comprimirt, u. dgl. m. Beruht das Oedem aber auf örtlichen Störungen, so besteht dasselbe weiter fort, wenn auch das Allgemeinbefinden ganz gut ist. Zuweilen sind wir ausser Stande, die dem Oedem zu Grunde liegende Krankheit zu beseitigen, z. B. die Obliteration eines Venenstammes. Dann muss man Congestion in den kleinen Gefässen der Körperoberfläche zu erregen und auf diesem Wege die Herstellung eines Collateral-Kreislaufs zu bewirken suchen.

Zur Erfüllung der zweiten Indication, welche recht eigentlich in das Gebiet der Chirurgie gehört, dient vor Allem eine zweckmässige Lage des ödematösen Theiles. Dieselbe muss von der Art sein, dass der Rückfluss des venösen Blutes und der Lymphe nach den Gesetzen der Schwere durch sie befördert wird. In ähnlicher Weise wirkt ein gleichmässiger Druck, wie wir ihn besonders an den unteren Extremitäten durch Einwickelungen mittelst elastischer Binden (von Flanell oder Gummigewebe), oder durch Schnürstrümpfe (von Leder oder noch besser aus Gummigarn oder aus gewöhnlichem baumwollenen Garn gestrickt, letztere vorn zuzuschnüren) ausüben. Eine solche Compression hat noch den Vortheil, dass der Kranke dabei oft seinen Geschäften nachgehen kann. Jedenfalls aber müssen alle diese Druckverbände sanft und gleichmässig wirken und besonders nirgend Falten bilden, da sonst leicht Entzündung, Brand und Verschwärung an dem

ödematösen Theile entsteht. Ferner wendet man Einreibungen an, welche die Resorption befördern sollen. Dahin gehören Campherspiritus, flüchtige Salbe, Linimente aus Terpenthin u. dgl. Solche Mittel sind natürlich zu vermeiden, wo man Entzündung zu befürchten hat. Milder wirken Umschläge von Rothwein, von Goulard'schem Wasser, besonders aber die trockene Wärme, in Form von Kräutersäckchen (vgl. Bd. I. pag. 169). Neben dieser örtlichen Behandlung sind, abgesehen von der dem Oedem etwa zu Grunde liegenden Krankheit, gelind eröffnende und harntreibende Mittel nützlich. Sind die Kräfte sehr gesunken, so wird man vielmehr tonische Medicamente (besonders Eisenpräparate) zu verordnen haben.

Widersteht das Oedem allen genannten Mitteln und veranlasst es bedeutende Beschwerden, so muss man die Flüssigkeit auf operativem Wege entleeren. Die schlechtesten Mittel hierzu sind Blasenpflaster und Kaustika, da durch solche zu ausgebreiteten brandigen Zerstörungen Veranlassung gegeben werden kann. Grössere Einschnitte sind aus demselben Grunde zu verwerfen. Zahlreiche kleine Einstiche mit einer schmalen Lancette bewirken in der relativ unschuldigsten Weise (jedoch auch nicht ganz ohne die Gefahr des Erysipels) die gewünschte Entleerung. Diese Operation muss aber öfter wiederholt werden, da die kleinen Stiche schon nach 24 bis 36 Stunden verklebt zu sein pflegen, worauf die Wasseransammlung in sehr kurzer Zeit sich wiederherstellt. Bei bedeutendem und weit verbreitetem Oedem darf man nicht die gesammte Flüssigkeit auf ein Mal entleeren, weil hierauf leicht ein bedenkliches Sinken der Kräfte, sogar der Tod plötzlich eintreten kann.

Zweites Capitel.

Verletzungen des Bindegewebes.

In Betreff der Verletzungen des Bindegewebes muss eine eigenthümliche Erscheinung hier erörtert werden, das Emphysem¹⁾.

¹⁾ Die blutige Infiltration des Bindegewebes könnte hier auch ihren Platz finden. Von praktischer Seite empfiehlt es sich mehr, die geringeren Grade derselben bei den Quetschungen (vgl. Bd. I.), die höheren aber weiter unten bei den Verletzungen der Arterien abzuhandeln. — Auch das *Décollement traumatique de la peau* könnte wesentlich als Bindegewebsverletzung aufgefasst werden, hat aber gleichfalls bereits bei den Quetschungen seine Stelle gefunden. — Eine lehrreiche Darstellung des Emphysem's giebt Demarquay in seinem *Essai de pneumatologie médicale*, Paris 1866, pag. 113—387.

Emphysem, genauer Bindegewebs-Emphysem, nennen wir im Allgemeinen die Anhäufung von Luft im Bindegewebe, die Infiltration des Bindegewebes mit Luft. Eine solche kann aber auf sehr verschiedene Weise und durch verschiedene Ursachen entstehen. Danach lassen sich folgende Arten des Emphysems unterscheiden:

I. Die Luft ist in's Bindegewebe von Aussen oder von anderen Organen her eingetreten, und zwar:

- 1) die äussere atmosphärische Luft, direct durch eine äussere Wunde,
- 2) die in den Respirationsorganen mit ihren Nebenhöhlen enthaltene Luft, bei Verletzungen derselben,
- 3) die im Verdauungscanal enthaltene Luft, bei Verletzungen desselben.

Diese drei Formen setzen stets eine Verletzung voraus und werden daher auch gemeinsam als traumatisches Emphysem im engeren Sinne bezeichnet.

II. Die Luft ist im Bindegewebe entstanden, und zwar:

- 1) durch brandige Zersetzung, — brandiges oder Brand-Emphysem,
- 2) aus unbekanntem (oder doch nicht genügend erklärtem) Veranlassungen, — spontanes Emphysem.

Hier haben wir, da des brandigen Emphysems bereits beim „Brande“ (Bd. I. pag. 292 u. f.) Erwähnung geschah, nur das traumatische und das spontane Emphysem zu erläutern.

I. Traumatisches Emphysem.

Veranlassung des traumatischen Emphysems sind meist solche Verletzungen, durch welche ein Theil der Luftwege (im weitesten Sinne des Wortes) geöffnet worden ist, daher Wunden, welche bis in die Lungen, die Bronchien, die Luftröhre, den Kehlkopf, Schlundkopf, die Mund-, Nasen-, Kiefer- oder Stirnhöhle von Aussen her eindringen. Während des Einathmens dringt die Luft in regelmässiger Weise in die Lunge ein, beim Ausathmen aber dringt ein Theil derselben, statt durch Mund und Nase ausgestossen zu werden, durch die Wunde der Luftwege in das benachbarte Bindegewebe und verbreitet sich in den Maschen desselben allmählig immer weiter. Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn der directe Austritt der Luft durch die Wunde gehindert ist, wenn also die Hautwunde nicht genau an derselben Stelle sich befindet, an welcher die Luftwege verletzt sind, oder wie man gewöhnlich sagt, die innere Wunde der äusseren

nicht entspricht, nicht parallel ist. Daher entsteht das traumatische Emphysem selten bei grösseren Schnitt- und Hiebwunden, vielmehr gewöhnlich bei kleinen, schräg verlaufenden Stichwunden. Nicht ganz selten beobachtet man Emphysem in Folge von Rippenbrüchen, wenn nämlich die Bruch-Enden nicht bloß das Brustfell zerrissen, sondern auch die Lunge verletzt haben. Auch beim Keuchhusten und bei den heftigen krampfartigen Hustenanfällen, welche durch die Anwesenheit von fremden Körpern in den Luftwegen erregt werden, hat man es entstehen sehen. In solchen Fällen ist der Vorgang folgender. Durch die mit höchster Gewalt ausgeführten, stossweisen Athembewegungen erfolgt eine Zerreißung eines oder mehrerer Lungenbläschen; die Luft tritt durch diesen Riss in das Bindegewebe der Lunge, also unter die Pleura pulmonalis, nach deren Verlauf sie in die Mittelfellhöhlen und von da aus weiter zu dem subcutanen Bindegewebe gelangen kann. Vgl. Bd. III.

Durchbohrungen des Speisecanals, gleichgültig an welcher Stelle seines Verlaufs, können ebenfalls Emphysem veranlassen, sobald die localen Verhältnisse den Eintritt von Darmgas in das Bindegewebe begünstigen. Fälle der Art sind, — wenn wir von den brandigen Brüchen (vgl. Bd. III.) absehen —, im Ganzen sehr selten, am Häufigsten aber noch bei Verletzungen der vom Bauchfell nicht überzogenen Theile des Dickdarmes, beobachtet worden.

Etwas häufiger, jedoch immer noch selten im Vergleich zu dem von Verletzungen der Respirationsorgane abhängigen Emphysem, ist das durch Eindringen der äusseren Luft in eine äussere Wunde gebildete. Für diese Entstehungsweise ist erforderlich, dass die Wunde zunächst hinreichend klafft, um Luft eintreten zu lassen, demnächst aber in irgend einer Weise verschlossen wird, so dass die Luft nicht wieder entweichen kann. Damit die eingesperrte Luft im subcutanen oder intermusculären Bindegewebe sich weiter verbreite, muss aber endlich auch noch ein Druck auf sie ausgeübt werden. Gewöhnlich sind in solchen Fällen die Muskeln des verletzten Theils die Factoren, sowohl für die Absperrung der Wunde, als für die Weiterbeförderung der Luft, indem sie durch abwechselnde Zusammenziehung und Erschlaffung den Wundcanal erweitern und versperren und somit einem Pumpwerk ähnlich arbeiten.

Schliesslich müssen wir des sogenannten simulirten Emphysems gedenken. Bei diesem handelt es sich um eine künstlich, durch Einblasen von Luft mittelst eines in eine kleine Hautwunde eingesetzten Röhrchens erzeugte Luftgeschwulst. Fabricius Hildanus erzählt von einem Kinde, welchem seine unmenschlichen Eltern täglich etwas Luft durch eine am Scheitel angebrachte Oeffnung einbliesen, um seinen mon-

strösen Kopf von Stadt zu Stadt für Geld sehen zu lassen. Recruten und Gefangene, die sich im Krankensaale besser zu befinden hoffen, bewirken an ihrem eigenen Körper zuweilen ein ausgedehntes Emphysem, indem sie mit einer Nadel die Schleimhaut der Wange durchbohren und durch heftige Expirationsbewegungen, während sie Mund und Nase verschlossen halten, Luft in das Bindegewebe einpressen. (Beobachtungen von Murat im Hôpital Bicêtre.)

Symptome. Das Emphysem stellt eine weiche und doch elastische Geschwulst dar, in welcher, bei leichtem Druck, der zufühlende Finger eine eigenthümliche Empfindung wahrnimmt, die man als „Knistern“ oder als emphysematöse Crepitation bezeichnet (vgl. Bd. I. pag. 19) und welche so charakteristisch ist, dass man sie nur ein Mal gefühlt zu haben braucht, um daran allein das Emphysem immer wieder zu erkennen. Dauert die Ursache des Emphysems fort, so breitet es sich immer weiter aus, von einer Bindegewebsmasche zur anderen. Besonders schnelle Fortschritte macht es in denjenigen Gegenden, wo viel schlaffes Bindegewebe angehäuft ist, z. B. am Halse, an den Augenlidern, im Hodensack, an den Brustwandungen. An den Extremitäten verbreitet es sich schneller auf der Beuge- als auf der Streckseite. Wo schlaffes Bindegewebe gänzlich fehlt, wie an der Hohlhand, der Fusssohle und dem behaarten Theile des Kopfes, da kommt es auch nicht leicht zur Entwicklung des Emphysems. — Bei bedeutendem Emphysem erreicht der Hals die Dicke des Kopfes; weder Mund noch Augen können wegen der Anschwellung der Lippen und Augenlider geöffnet werden. Am männlichen Körper schwillt die Gegend der Brust zu dem Volumen der Weiberbrust an, der Hodensack vergrößert sich bis aufs Zehnfache, die Gliedmassen stellen dicke, gleichmässig angeschwollene Cylinder dar, an denen man nur die Gegenden der Gelenke wegen der grösseren Straffheit des daselbst gelegenen Bindegewebes als Vertiefungen unterscheidet. — Weiterhin dringt die Luft unter die Fascien, unter die serösen und die Schleimhäute bis zu den Eingeweiden. — Die Haut behält ihre natürliche Farbe; nur erscheint sie bei zunehmender Ausdehnung blass und glänzend. Ausnahmsweise zeigen sich in ihr Ecchymosen, als braune oder braunblaue Flecke. Die Temperatur der Haut ist unverändert. Die angeschwollenen Theile sind nicht schmerzhaft und auch für Druck nicht empfindlich. Die Geschwulst nimmt den Fingerdruck leicht an; die eingedrückte Stelle erhebt sich aber, wengleich langsam, doch vollständig wieder. Durch Streichen und Reiben kann man (unter der charakteristischen Crepitation) die Gestalt der Luftgeschwulst willkürlich verändern, indem man die Luft in die benachbarten Bindegewebsmaschen drängt. Der Percussionsschall ist desto heller und tympanitischer, je dicker die im Bindegewebe angehäuften Luftschicht ist.

Bei einem Emphysem von geringer Ausdehnung treten keine irgend bedeutenden Störungen des Allgemeinbefindens auf, wenn solche nicht etwa durch die Veranlassungen des Emphysems oder die Beschaffenheit des im Bindegewebe angehäuften Gases bedingt werden. Ist es aber über den ganzen Körper oder auch nur über einen grösseren Theil des Rumpfes, namentlich auf das subpleurale Bindegewebe und auf die Mittelfellräume verbreitet, so treten Störungen in den Kreislaufs- und den Athmungsorganen auf. Man findet dann einen kleinen frequenten Puls, beschwerliches Athmen, grosse Angst und Unruhe. Die Kranken sitzen bald mit vornüber gebeugtem Körper, bald auf den Knien oder stützen sich auf die Hände u dgl. m. Das Schlingen wird erschwert, später unmöglich, allmählig hören die Athem- und Herzbewegungen auf; die Kranken sterben bald in einem comatösen Zustande, bald unter Krämpfen. Gewöhnlich erreicht die Krankheit nicht diese Höhe, besonders wenn eine zweckmässige Behandlung eingeleitet wurde. Die Luft wird alsdann resorbirt. In welcher Form und in welcher Verbindung sie wieder in das Blut aufgenommen wird, ist noch unbekannt; wahrscheinlich durchdringt ein Theil derselben, nach den Gesetzen der Diffusion, auch die Haut. Sicher ist, dass sie mit grosser Schnelligkeit, und insbesondere viel schneller als tropfbarflüssige Ergüsse, verschwinden kann.

Von manchen Seiten wird behauptet, dass die Resorption der Luft besonders schnell erfolge, wenn dieselbe aus den Respirationsorganen herrühre, weil solche wegen ihres grösseren Kohlensäuregehaltes weniger irritirend wirke. — Unzweifelhaft wirken die aus dem Darmcanal herrührenden Gase immer viel nachtheiliger.

Die **Diagnose** des oberflächlichen Emphysems ist niemals schwierig; das Gefühl allein entscheidet schon. Dagen ist das tiefe Emphysem schwierig und oft erst bei der Section zu erkennen. Die Art der bestehenden Verletzung, insbesondere auch ihre örtlichen Verhältnisse werden die einzigen sicheren Anhaltspunkte liefern.

Die **Prognose** ist nur bei grosser Ausdehnung des traumatischen Emphysems bedenklich, und auch hier nicht unbedingt schlecht, wenn nur dem weiteren Lufteintritt durch Natur- oder Kunsthülfe vorgebeugt wird. — Ist das Emphysem nicht von bedeutendem Umfange, so kann es nur dann gefährlich werden, wenn die im Bindegewebe enthaltene Luft verdorben, d. h. mit den Producten der Zersetzung gemischt ist, wie z. B. bei Zerreissung des Darms. Aber auch hier beruht die Gefahr viel mehr auf der Natur der Verletzung, durch welche das Emphysem herbeigeführt wird, als auf diesem selbst.

Die **Behandlung** des traumatischen Emphysems kann, wenn dasselbe nicht sehr bedeutend ist, und kein weiteres Zuströmen von Luft

Statt findet, eine durchaus expectative sein. Anderen Falls muss man den weiteren Zutritt von Luft zu verhüten suchen, was in solchen Fällen, in denen das Emphysem von einer Verletzung der Luftwege abhängig ist, dadurch erreicht wird, dass man an der Stelle, an welcher die Luftwege geöffnet sind, von Aussen her eine verhältnissmässig grosse Wunde anlegt. Hierzu ist bald eine Incision, bald nur die Erweiterung einer schon bestehenden Wunde nothwendig. Jedenfalls aber muss man die Wunde offen erhalten, bis die Oeffnung in den Luftwegen geschlossen ist. Diese Vorschriften finden vorzugsweise auf den Halstheil der Respirationsorgane ihre Anwendung; in Bezug auf Lungenwunden erleiden sie bedeutende Modificationen, welche bei der Erörterung der Krankheiten des Thorax näher anzugeben sind.

Wenn die im Bindegewebe angehäufte Luft üble Zufälle hervorbringt, so muss man durch kleine Einstiche mittelst eines methodischen Druckes die Entleerung bewirken. Die Luft strömt dann mit pfeifendem Geräusche hervor und die Geschwulst sinkt zusammen. Aber wie beim Oedem, so schliessen sich auch hier nach wenigen Tagen die kleinen Wunden, ohne dass immer alle angesammelte Luft entleert wäre. Deshalb ist auch beim Emphysem oft eine Wiederholung der Einstiche nothwendig. Bei Weitem mehr leistet das Einstossen feiner (Pravaz'scher) Troicarts, deren Canülen man liegen lässt.

Als Beispiel für die Resorption eines ausgedehnten Emphysems diene folgender Fall, der 1863 in meiner Klinik beobachtet wurde. Ein alter decrepider Mann war von der Höhe eines Stockwerks hinabgestürzt und hatte einige Zeit bewusstlos gelegen. Bei der 1½ Stunden darauf vorgenommenen Untersuchung fand man, ausser einer erheblichen Kopfwunde und einer Verrenkung des Schlüsselbeins, weit verbreitetes Emphysem der linken Thoraxhälfte, deutlich fühlbare Fractur mehrerer Rippen dieser Seite, und konnte aus der Hervorwölbung der Intercostalräume, sowie aus dem Fehlen der Herzdämpfung und des Respirationsgeräusches auf Pneumothorax schliessen. Der Verletzte klagte stöhnend über Luftmangel, Schmerzen in der verletzten Seite und Angstgefühl, zitterte fortdauernd und hatte einen sehr kleinen schwachen Puls von 100 Schlägen in der Minute bei kühler Haut. Das Emphysem breitete sich schnell aus, namentlich am Halse, und überschritt alsbald die Mittellinie; die Temperatur stieg am Abend bis 38° C. Nach einer sehr unruhigen Nacht hatte das Emphysem bedeutend zugenommen; man zählte 42 Athemzüge in der Minute, die Athemnoth stieg, grobe Rasselgeräusche entstanden in der Trachea, und der Tod schien nahe bevorzustehen. Adress von 1 Pfd., Acid. benzoicum innerlich. Der grössere Theil des Emphysems am Thorax wird durch eingestossene feine Troicarts entleert. Die kleinen Canülen bleiben liegen. Am Abend hat sich das Emphysem an den entleerten Stellen dennoch wieder hergestellt; aber die Dyspnoe ist vermindert. Tags darauf begann das Emphysem (nachdem noch wiederholte Punctionen in derselben Weise gemacht waren) zu sinken. Noch einige Mal zeigte es Schwankungen, dann verminderte es sich am 5. Tage nach der Verletzung erheblich und von da ab stetig. Auch der Pneumothorax wurde allmählig resorbirt. Am 20. Tage nach der Verletzung waren Herztöne und Respirationsgeräusch auf der

linken Seite schon wieder, wengleich nicht in normaler Stärke, zu hören. Der Mann genas vollständig.

II. Spontanes Emphysem¹⁾.

Die **Entstehungsgeschichte** des spontanen Emphysems führt auch auf Verletzungen zurück; aber weder eine offene Wunde, noch eine Eröffnung der Luftwege wird dabei vorausgesetzt. In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich freilich um Knochenbrüche, die mit Wunden complicirt waren, in einzelnen aber auch um subcutane Fracturen oder Quetschungen. Immer hatte eine bedeutende Erschütterung des verletzten Theils, meist des ganzen Körpers stattgefunden. Das spontane Emphysem entwickelt sich in vielen Fällen sofort, spätestens aber einige Tage nach der Verletzung. Ob der eigentliche Grund desselben in einer Ausscheidung (Secretion) der Luft aus dem Blute, oder in einer Entwicklung von Gasen durch schnell eintretende Zersetzung aller Säfte, vielleicht selbst der festen Gewebe des Körpers, zu suchen ist, ob nicht vielleicht beide Arten der Entstehung vorkommen, worauf endlich diese pathologischen Luftbildungen beruhen, in welcher Weise namentlich das Nervensystem (vielleicht durch Lähmung der trophischen Nerven) dabei betheilig ist, — das sind zur Zeit noch offene Fragen. Wahrscheinlich ist die Entstehungsweise verschieden, je nach der Form des Uebels.

In Betreff des **Verlaufs** haben wir nämlich, wie Malgaigne zuerst angedeutet hat, eine mildere und eine schwere Form des spontanen Emphysems zu unterscheiden.

a) Die mildere Form beginnt im unmittelbaren Anschluss an den Act der Verletzung, welche in allen vorliegenden Beobachtungen von der Art war, dass sie eine ausgiebige Zerreißung der Gewebe und einen erheblichen Bluterguss bedingen musste. In diesen Fällen fand zwar eine deutliche, selbst erhebliche Luftansammlung statt, aber keine oder doch geringfügige Verbreitung derselben. Das Gas selbst äusserte keine deletären Eigenschaften. Die Kranken genasen, wenn die Verletzung nicht sonst noch tödlich war.

b) Die schwere Form des spontanen Emphysems beginnt niemals unmittelbar, aber doch zuweilen schon einige Stunden, in anderen

¹⁾ Vgl. Malgaigne, *Traité des fractures etc.* Tome I. Paris, 1857. — Gurli, *Handbuch der Lehre von den Knochenbrüchen*, Bd. I. — Dolbeau, *de l'emphyseme traumatique* (thèse de concours), Paris 1860. — Eine gute Uebersicht und die Erzählung eines exquisiten Falles enthält die Dissertation von Gleitsmann, *de emphysemate traumatico spontaneo*. Gryphiswaldiae 1864.

Fällen erst einige Tage nach der Verletzung. Schnellere Verbreitung, baldiges Auftreten aller charakteristischen Symptome des Brandes und beträchtliches Allgemeinleiden zeichnen diese Form aus. Der leidende Theil ist blauroth gefärbt, aufgeschwollen, kühler als der übrige Körper, crepitirt in charakteristischer Weise, kann von dem Patienten nur mit Schwierigkeit bewegt werden und hat nur undeutliches Gefühl. Alsbald erheben sich vor den Augen des Beobachters auf der Haut schnell fortschreitende blaurothe Blasen, und der brandige Zerfall der emphysematösen Theile erfolgt, wenn das Leben nicht, wie gewöhnlich, schon früher erlischt (*gangrène foudroyante*). Hat man Gelegenheit (z. B. nach einer Amputation), die dem Emphysem verfallenen aber noch nicht emphysematösen Theile zu untersuchen, so ergibt sich, dass in diesen bereits erhebliche Veränderungen erfolgt sind: die Muskeln namentlich erscheinen braunblau, zerfallen leicht in Fibrillen und zeigen unter dem Mikroskop beginnende Fettmetamorphose.

Wenn in allen diesen Erscheinungen nun auch das Bild einer schnell fortschreitenden Zersetzung nicht zu verkennen ist, so unterscheidet sich dieselbe doch wesentlich vom gewöhnlichen Brande und dem bei diesem auftretenden Emphysem. Zunächst findet man, sofern nur zeitig genug untersucht wird, die im Bindegewebe angehäuften Gase von den durch Fäulniss entstandenen wesentlich verschieden; der Geruch nach Schwefelwasserstoff sowohl als die Entzündbarkeit fehlen gänzlich. Ferner tritt der gewöhnliche Brand nach Verletzungen immer erst nach einigen Tagen deutlich hervor; das spontane Emphysem kann der Verletzung auf dem Fusse folgen. Bei letzterem geht die emphysematöse Schwellung den übrigen Erscheinungen der Zersetzung lange voraus; bei dem gewöhnlichen Brande tritt sie, wenn überhaupt, doch erst auf der Höhe des Mortificationsprocesses auf.

Die **Prognose** ergibt sich aus dem Vorstehenden von selbst.

Die **Therapie** kann bei der milderen Form expectativ sein. — Um bei der schweren Form des spontanen Emphysems das Leben zu retten, wird von allen Seiten die frühzeitige Amputation (jedoch ebenso einstimmig mit wenig Aussicht auf Erfolg) empfohlen. Sie kann natürlich nur dann rettend wirken, wenn sie in Geweben ausgeführt wird, die durch den Act der Verletzung nicht schon zur Zersetzung prädisponirt waren, — worüber wohl niemals im Voraus Gewissheit zu erlangen sein wird.

Dritter Abschnitt.

Von den Krankheiten der Arterien.

Erste Abtheilung.

Von den Krankheiten der Arterien im Allgemeinen ¹⁾).

Erstes Capitel.

Wunden der Arterien.

Die Wunden der Arterien sind zunächst verschieden je nach der Tiefe, bis zu welcher sie in das Gefäss eindringen. Wird durch die Wunde das Gefässrohr geöffnet, so heisst dieselbe eine penetrirende. Solche Arterienwunden sind viel häufiger, als die nicht penetrirenden. Wurde nur die äusserste Haut einer Arterie verletzt, so entsteht gewöhnlich eine circumscripte Entzündung und in Folge derselben Verdickung der Arterienwand. Wurde auch die mittlere Arterienhaut getrennt, so muss man befürchten, dass die wenig dehnbare innere Membran unter der Gewalt des Blutstromes zerreisse und somit eine arterielle Blutung entstehe.

Guthrie hat einen Fall der Art bei einer Halswunde beobachtet. Die Vena jugularis interna war verletzt. Bei der Unterbindung derselben bemerkte man, dass auch an der Carotis eine, die äussere und mittlere Haut derselben durchdringende Wunde bestand. Diese wurde einer besonderen Behandlung nicht unterworfen, führte aber nach 8 Tagen durch eine heftige Blutung den Tod herbei.

Auf Grund von Versuchen, welche von Haller an den Mesenterial-Gefässen von Fröschen angestellt wurden, hat man angenommen, dass auch ein sogenanntes „gemischtes Aneurysma“ nach solchen Verletzungen entstehen könne, welches durch eine Ausbuchtung oder Hervorstülpung der inneren Gefässhaut durch die Wunde der

¹⁾ Die chirurgische Therapie der Arterienkrankheiten wird im vierten Capitel dieser Abtheilung zusammengefasst werden und bleibt daher in den ersten drei Capiteln ganz unberücksichtigt.

beiden anderen Membranen gebildet würde. Scarpa behauptet, dass dies Aneurysma mixtum s. herniosum nur aus Blutgerinnseln hervorgehe, welche sich in den Maschen des umliegenden Bindegewebes ansammeln; und Hunter hat, gerade im Gegensatz zu Haller, bei Wiederholung derselben Experimente an der Carotis, das Gegentheil gefunden; er sah nämlich stets eine Verdickung der Arterie an der verletzten Stelle zu Stande kommen. — Das Urtheil über diese Versuche ist sehr schwierig, da sich bei der Art, in welcher dieselben bis jetzt angestellt worden sind, ebenso wenig wie bei zufälligen Verletzungen genau bestimmen lässt, bis zu welcher Schicht der Arterienwandungen die Wunde eingedrungen ist. Jedenfalls müsste die innere Arterienhaut, um durch die Wunde der beiden äusseren hervorgestülpt werden zu können, vorher einen hohen Grad von Dehnbarkeit erlangt haben, welchen sie im normalen Zustande durchaus nicht besitzt. Man wird also wohl thun, in einem Falle, wie der oben erwähnte von Guthrie, die Wunde wie eine penetrirende zu behandeln, d. h. die verletzte Arterie zu unterbinden.

Die penetrirenden Wunden der Arterien sind entweder reine oder gequetschte. Zu ersteren rechnen wir die Stich-, Schnitt- und Hieb-Wunden. Kleine Stichwunden, wie sie z. B. durch dünne Nadeln veranlasst werden, haben gewöhnlich keine üblen Folgen; verweilt eine Nadel längere Zeit in einer Arterie, so veranlasst sie die Anlagerung von Blutgerinnseln und endlich Verschluss des Lumens. Bei Versuchen an Thieren ergab sich, dass selbst Stichwunden von 1 Mm. Länge nur unbedeutende Blutungen veranlassen, indem sie sehr schnell durch Gerinnsel verschlossen werden. Die Gerinnung wird begünstigt durch das lockere Bindegewebe in der Umgebung der Arterie, in welchem das Blut alsbald stockt, und durch die fast immer eintretende Verschiebung der verletzten Arterie, wodurch der Parallelismus der Wunde in den verschiedenen durchstochenen Schichten aufgehoben wird. Die Resultate dieser Versuche lassen sich aber nicht geradezu auf die Verhältnisse der menschlichen Arterien anwenden; die Erfahrung lehrt vielmehr, dass bei Menschen tödtliche arterielle Blutungen durch kleine Stichwunden veranlasst werden können.

Eine Längswunde bedingt eine viel stärkere Blutung, als eine kleine rundliche Stichwunde; wenn jedoch die Wundränder nicht weit klaffen, so wird dieselbe bald durch Blutgerinnsel gebremst; die Weitsamkeit des Gefässes kann dabei erhalten werden.

Wenn eine querlaufende Wunde nicht weiter als über den vierten Theil des Umfangs der Arterie geht, so klaffen die Wundränder in der Art, dass sie eine abgerundete Oeffnung bilden, in welcher das Blut unter günstigen Verhältnissen noch gerinnen kann. Das in die Gefäss-Scheide ergossene Blut bildet alsdann den Kopf des von J. L. Petit als „Nagel“ bezeichneten Gerinnsels, dessen dünneres Ende in der Oeffnung des Gefässes sitzt. Eine vollständige Vereinigung solcher Wunden ist nur bei Hunden und Pferden beob-

achtet worden. Das Verhältniss ist keineswegs dasselbe bei Menschen; auch die kleinste Wunde kann hier Veranlassung zu einem Aneurysma geben. Der Spalt in dem Gefässe schliesst sich nicht unmittelbar, sondern wird bloß durch ein Blutgerinnsel verstopft, welches leicht fortgerissen werden kann; auf solche Weise entsteht ein sogenanntes *Aneurysma traumaticum consecutivum*.

Ausnahmen hiervon sind äusserst selten. Scarpa citirt nur einen Fall, in welchem eine Wunde durch Zwischenlagerung eines Stückchen geronnenen Blutes vernarbt sei, ohne dass Obliteration des Gefässes eintrat. Scarpa selbst sieht indess diesen Fall nur für eine unvollkommene Heilung an und hält zur vollständigen Heilung die Obliteration für unerlässlich. Andere Ausnahmen sind von Velpeau (*Médecine opératoire*, Tom. II, pag. 9) angeführt.

Eine quere Trennung des halben Umfanges einer Arterie ist noch viel gefährlicher. In einem solchen Falle nämlich klaffen die Wundränder weit auseinander, und die Blutung wird, wenn das Gefäss von einiger Bedeutung ist, sofort tödtlich. Die eintretenden Ohnmachten begünstigen zwar die Gerinnung des Blutes und hemmen auf einige Augenblicke die Blutung, aber in dem Maasse, wie der Mensch wieder zu sich kommt, stellt sich auch der Blutfluss wieder ein, und es folgt Verblutung. Wenn, ausnahmsweise, eine lange andauernde Ohnmacht es zu der Bildung eines widerstandsfähigen Gerinnsels kommen liess, und das zum Leben nothwendige Blut übrig blieb, so wird die Arterie obliterirt. Weniger sicher ist die Verletzung eine tödtliche, wenn drei Viertel des Umfanges durchschnitten sind. Das Klaffen ist dann freilich sehr beträchtlich, die Wunde hat aber grosse Aehnlichkeit mit einer vollständigen Durchschneidung, und die Blutgerinnung geht daher, wegen der stärkeren Zurück- und Zusammenziehung der beiden Gefässhälften, leichter von Statten, besonders wenn die Scheide nicht in gleicher Ausdehnung verletzt worden war. Bérard meint, dass Verschwärung alsbald auch den übrigen Theil des Umfanges der Arterie zerstöre, und dass die Wunde sich dann verhalte wie eine Durchschneidung der ganzen Arterie. In der Zwischenzeit erfolgt aber oft der Tod durch Verblutung.

Die vollständige Durchschneidung des Gefässes gestattet der mittleren Haut, ihre Elasticität vollständig geltend zu machen; diese Eigenschaft, welche andere Wunden der Arterien so gefährlich macht, wird hier erspriesslich; denn indem die beiden Enden sich in die Gefässscheide zurückziehen, erfolgt die Bildung eines Coagulum bei Weitem leichter, vorzüglich wo es sich um eine Arterie mittleren Calibers handelt, und wenn man die Wunde in den anderen Geweben wieder vereinigt hat. Wird eine Arterie von grossem Caliber durchschnitten und bleibt die ganze Wunde offen, so steht die Blutung

nicht eher, als mit dem Tode. Wurde dagegen die Wunde, wenn auch nur oberflächlich, geschlossen, so ist die Hoffnung, dass das Leben erhalten bleibe (wenigstens bei Thieren), noch nicht ganz verloren, wenn auch eine Arterie von beträchtlichem Umfange durchschnitten war. Häufige Ohnmachten unterstützen in einem solchen Falle die Gerinnung des Blutes in der Wunde. Jedenfalls erfolgt aber die Heilung in allen solchen Fällen nur durch Obliteration des Gefässes.

Unmittelbar nach der Durchschneidung sieht man die Enden der quer getrennten Arterie zurückschnellen. Wird die Blutung dann durch Ohnmacht, Schwäche der Herzbewegungen oder auf andere Art unterbrochen, so bleibt die Arterie zurückgezogen; an ihrer Stelle erhebt sich ein röthlicher Kegel von geronnenem Blut, welcher beim Wiederbeginn eines kräftigen Kreislaufs pulsatorisch gehoben wird, so dass das Arterien-Ende bei jeder Systole sich zu verlängern und über die Oberfläche der Wunde hervorzuspringen scheint. Ist das Gefäss mit seinen Umgebungen (physiologisch oder pathologisch) verwachsen, so bleibt die Zurückziehung aus.

Spontane Stillung der Blutung. Wie bereits in den vorstehenden Erläuterungen erwähnt werden musste, gehört es keineswegs zu den Seltenheiten, dass Blutungen aus kleineren, namentlich aus ganz durchschnittenen Arterien ohne Kunsthülfe wieder aufhören. Dieser Vorgang ist, seit man überhaupt begonnen hat denselben genauer zu untersuchen, auf sehr verschiedene Weise erklärt worden. J. L. Petit¹⁾ lehrte, „dass das Blut in seinem Strome stets nur durch das Blut selbst angehalten werde“, indem es ein Gerinnsel bilde, welches das Ende der Arterie umgebe und das Lumen derselben ausfülle. Morand²⁾ dagegen legte besonderes Gewicht auf die Lebensthätigkeit der Gefässe: die Zusammenziehung der Kreisfasern sollte die Wunde in Falten legen, die der Längsfasern das Gefäss verkürzen, so dass seine Wandungen verdickt, gerunzelt, und sein Caliber verringert würden. Pouteau³⁾ wollte weder von dem Blutgerinnsel Petit's, noch von der Zusammenziehung Morand's Etwas wissen; nach seiner Ansicht sollten die umgebenden Gewebe durch ihre Anschwellung die durchschnitene Arterie zusammendrücken.

Kaum glaublich ist es und doch wahr, dass Seitens der Naturphilosophen behauptet wurde, das Blut stehe still, weil es durch die Capillargefässe nicht mehr angezogen würde, indem man eine freiwillige Bewegung des Blutes, und eine Anziehungskraft der Capillargefässe annahm.

¹⁾ *Mémoires de l'académie royale des sciences*, année 1731, 33 und 35.

²⁾ *Sur le changement qui arrive aux artères coupées*. Paris 1736.

³⁾ *Mélanges de chirurgie*. 1760.

Auf dem Wege des Experiments allein konnte diese Streitfrage gelöst werden. Versuche, welche zuerst von Jones ¹⁾ angestellt, dann aber namentlich mit Bezug auf die therapeutische Wirkung der Torsion ²⁾ in grosser Anzahl von den verschiedensten Forschern wiederholt worden sind, haben ergeben, dass bei der spontanen Stillung der Blutungen mehrere Momente zugleich wirksam sind. Niemand zweifelt mehr daran, dass neben der vor Allem wesentlichen Gerinnung des Blutes in dem Gefässrohr (Thrombose) die Zusammen- und Zurückziehung der verwundeten Arterien und die Anschwellung der umliegenden Gewebe, durch welche die Arterie comprimirt wird, gleichfalls ihre Bedeutung haben. Für die Gerinnung des Blutes ist der Grad seiner Gerinnbarkeit, für die Zusammenziehung der Arterien der Grad ihrer Contractilität, welche nicht blos von der Structur des verletzten Gefässes abhängig ist, sondern auch von der Innervation (z. B. durch psychische Erregungen), wesentlich in Anschlag zu bringen. Die äusserste Grenze der durch die mehr oder weniger starke Wirkung dieser Factoren bedingten Schwankungen zeigt sich bei „Blutern“, d. h. Individuen, bei denen, aus meist erblicher Anlage, weder Gerinnung des Blutes, noch Contraction der Gefässe in hinreichendem Grade erfolgt (vgl. Krankheiten der Venen).

Die Hemmungen der Blutung sind aber theils provisorische, theils definitive. Der Pfropf, welcher durch das Blutgerinnsel gebildet wird, ist zunächst ein provisorisches Mittel, wie die Ligatur und die Torsion, welche von dem Arzte angewendet werden. Die definitive Stillung der Blutung erfolgt erst durch die Verwachsung des Blutpfropfs mit der Arterienwand; auf solche Weise wird aus dem hohlen Artien-Cylinder ein solider.

Die Entwicklung des Blutpfropfs im Gefässrohr, des Thrombus im engeren Sinne des Wortes, hat zu allen Zeiten die Aufmerksamkeit der Aerzte besonders in Anspruch genommen ³⁾. Ganz besondere Bedeutung erlangte die Lehre von der Thrombusbildung durch J. L. Petit, von welchem auch die Unterscheidung des inneren Thrombus (*bouchon*) und des äusseren (*couvercle*) herrührt. Der letztere entsteht zuerst, indem das aus der Arterie hervorströmende Blut sich in der Wunde ansammelt und, soweit es nicht fortgespült

¹⁾ A treatise on the process employed by nature in suppressing the haemorrhage from divided and punctured arteries etc., London 1805.

²⁾ Vgl. das vierte Capitel dieser Abtheilung.

³⁾ Nach den Untersuchungen von Dezeimeris (Dict. histor. de la médecine, p. 785) hatte schon Galen (im 2. Jahrh. nach Chr.) eine ziemlich klare Anschauung von derselben.

wird, namentlich aber da, wo es Haftpunkte (Falten und Vorsprünge der getrennten Gewebe) findet, zur Gerinnung kommt. Gerade in der Richtung des arteriellen Blutstrahls geschieht dies zuletzt. Daher ist der äussere Thrombus, nachdem er sich vollständig gebildet hat, in diesem Bezirk auch hohl, wie eine Kappe aufgestülpt auf das Gefässrohr oder die Gefässwunde, an deren Rändern er haftet¹⁾. Im Gegensatz zu diesem äusseren Thrombus heisst, nach Petit, das im Gefässrohr selbst entstehende kegelförmige Gerinnsel, welches in der Regel mit seinem breiteren Ende nicht blos an den Rändern der Arterienwunde haftet, sondern auch mit dem äusseren Thrombus zusammenhängt, der innere oder eigentliche Thrombus. Die Gerinnung des Blutes in der verletzten Ader erfolgt aber nur, wenn und soweit das Blut zum Stehen kommt, also von der Stelle an, wo der äussere Thrombus oder die Verengerung des Gefässlumens durch Zusammenziehung, Runzelung und Aufrollung der Gefässhäute die Bewegung des Blutes hemmt, bis zu derjenigen aufwärts, wo ein abgehender Ast dieselbe wieder möglich macht. Je näher der letzteren Stelle, desto weniger mächtig ist die Gerinnung, desto dünner der Thrombus; daher seine kegelförmige, peitschenförmig endende Gestalt. Während der Thrombus Anfangs an der Gefässwand nur ganz mechanisch fest sitzt, mithin auch fortgespült werden kann, geht er später eine vollständige Verwachsung mit derselben ein, indem er selbst organisiert wird. Dieser Process ist schon nach 24 Stunden soweit fortgeschritten, dass die Verbindung des Thrombus mit der Gefässwand ohne Ablösung eines Theils der innersten Gefässhaut sich nicht mehr trennen lässt. Die Anfangs dunkelrothe Farbe des Gerinnsels wird braun, dann blässlich und stimmt schliesslich ganz mit derjenigen der Gefässwand überein. Sein Volumen vermindert sich stetig, bis zuletzt (nach einigen Wochen) eine Grenze zwischen ihm und dem durch ihn verschlossenen Gefäss nicht mehr nachweisbar ist. Entfärbung und Schrumpfung des Gerinnsels beruhen zunächst auf dem Zerfall der rothen Blutkörperchen und der Diffusion ihres Inhalts; sie nehmen ebensowenig als der Faserstoff Antheil an der Organisation des Thrombus, welche vielmehr wesentlich von den weissen Blutkörperchen zuzugehen scheint. Der Vascularisation des Thrombus geht eine Canalisation vorher, welche theils direct von dem im Gefässrohr gegen den Blutpfropf anprallenden Blute, theils Seitens der Ernährungsge-

¹⁾ Amussat (Archives générales de méd., 1829. Août) wollte den äusseren Thrombus deshalb als Kappe oder Kaputze bezeichnet wissen und legte auch in praktischer Beziehung Gewicht auf diese Aushöhlung, indem er meinte, man könne bei der Aufsuchung des blutenden Gefässes sich durch dieselbe leiten lassen.

fässe der Arterienwand (Vasa vasorum) eingeleitet wird. Die feineren Vorgänge hierbei scheinen mit denjenigen, welche wir bei der „Heilung der Wunden durch erste Vereinigung“ kennen gelernt haben (Bd. I. „Reine Wunden“), wesentlich übereinzustimmen.

Vergl. die Darstellung von O. Weber (Pitha und Billroth, Handbuch, Bd. I. pag. 141 u. f.) und die von Demselben (ebenda, pag. 120) aufgeführte Literatur, namentlich: Stilling, die Bildung und Metamorphose des Blutpfropfs, Eisenach, 1834, Zwicky, die Metamorphose des Thrombus, Zürich, 1845, O. Weber, über die Vascularisation des Thrombus, Berl. klin. Wochenschrift. 1864.

Quetschungen. Gequetschte und gerissene Wunden lassen die Eigenthümlichkeiten der drei Arterienhäute in voller Wirksamkeit hervortreten. Die innere Membran giebt zuerst nach, darauf die mittlere; die äussere Arterienhaut verlängert sich und wird zugleich enger, wie eine Glasröhre, welche man über der Lampe auszieht. Die erste (und daher auch am Höchsten gelegene) Zerreiſung trifft die innere Haut, welche sich überdies nach Innen aufrollt, darauf folgt die der mittleren, zuletzt reisst die äussere Haut, nachdem sie verdünnt und verengt worden ist. Alle diese Verhältnisse begünstigen die Gerinnung des Blutes, indem sie die Bewegung desselben hemmen. Je stärker die Arterienhäute gequetscht sind, desto leichter erfolgt die Bildung des Thrombus. Der Verschluss des Gefässes durch letzteren ist aber auch bei gequetschten und gerissenen Wunden keineswegs immer von Bestand.

Es kommt vor, dass die inneren Arterienhäute, in Folge von Quetschung oder Zerrung, zerreiſsen, während die äussere Widerstand leistet; alsdann tritt gewöhnlich Obliteration der Arterie in derselben Weise ein, wie bei gequetschten und gerissenen Wunden.

Continuitäts-Trennungen sämmtlicher Arterienhäute bei unverletzter Cutis kommen durch Einwirkung directer Gewalt unzweifelhaft vor. Ob solche aber auch durch übermässige Dehnung, namentlich an Stellen, wo das Gefäss über einen Knochenvorsprung oder über ein Gelenk verläuft (namentlich bei Verrenkungen und Einrenkungen), an sonst gesunden Arterien zu Stande kommen kann, ist ebenso zweifelhaft, als die Zerspaltung eines Arterienrohrs durch Blutwallungen. Im Allgemeinen ist bei solchen Zerreiſungen ohne direct einwirkende äussere Gewalt eine krankhafte Beschaffenheit der Arterienhäute oder eine vorgängige Anheftung der Arterie an den Knochen vorauszusetzen.

Die Folgen der Arterienverletzung sind wesentlich von zweierlei Art. Tritt das Blut aus einer durchschnittenen Arterie nach Aussen oder in eine Höhle des Körpers, so entsteht Blutung; wird es in

den Geweben zurückgehalten, so entwickelt sich (wenn das verletzte Gefäss nicht von sehr geringem Caliber ist) ein traumatisches Aneurysma.

I. Arterielle Blutungen.

Die Blutung (Haemorrhagia) heisst eine primäre oder unmittelbare, wenn sie im Augenblicke der Verwundung oder doch gleich darauf auftritt; eine secundäre oder Nach-Blutung wird hingegen diejenige genannt, welche erst längere Zeit nach der Verletzung, namentlich nach dem Aufhören der primären Blutung erfolgt. Es giebt Blutungen, welche man nachträgliche (tertiäre) oder Spät-Blutung nennen könnte, indem sie erst spät auf eine Verletzung folgen, welche Anfangs gar keine Blutung veranlasst hat. So kann z. B. ein Knochensplitter, welcher Anfangs die benachbarte Arterie nicht verwundet hat, nachdem er abgelöst ist, doch noch durch Druck oder Reibung Verschwärung derselben und dadurch Blutung bewirken. Solche Blutungen können um so üblere Folgen haben, weil man sie gar nicht erwartet. Die nachträglichen Blutungen werden, streng genommen, nicht durch Wunden der Arterien veranlasst; denn die Gefässe bleiben ursprünglich bei der Verletzung verschont; erst später werden sie, gleich den sie umgebenden Geweben, von der Verschwärung ergriffen und gleichsam zerfressen.

Den Nachblutungen geht stets eine Verletzung der Arterien voraus, aber unter Verhältnissen, welche das Blut verhindern, gleich nach der Verwundung andauernd auszufließen. So werden z. B. bei den Schusswunden gewöhnlich die Häute kleinerer Arterien in solchem Grade zerquetscht, dass sich in dem Augenblicke der Verwundung auch schon ein Pfropf bildet, welcher den Ausfluss des Blutes hindert. Der Zutritt der Luft, zufälliger oder absichtlicher Druck, sowie andere Blutstillungs-Mittel können den Ausfluss des Blutes vorübergehend hemmen, besonders wenn die durchschnittenen Gefässe kein grosses Caliber haben, und somit die Bildung eines Blutgerinnsels begünstigen, welches die primäre Blutung hindert, aber nicht immer in Stande ist, einer Nachblutung vorzubeugen. Man muss deshalb auf seiner Hut sein, sobald eine nur etwas bedeutende Arterie während einer Operation sich zu weit zurückzieht, um unterbunden werden zu können. In diesen Fällen entsteht eine Nachblutung gewöhnlich einige Stunden nach der Verletzung, sobald nämlich die Zusammenziehung (Krampf) der Gefässe nachgelassen und das Herz seine Kraft wieder erlangt hat.

Wollte man bei der Unterscheidung der einzelnen Blutung ganz genau zu Werke gehen, so müsste man, mit Vidal, vier Arten annehmen: 1) die unmittelbare Blutung, im Augenblicke der Trennung der Arterie; 2) die primäre Blutung, welche entsteht, nachdem die krampfhaft zusammengezogene Arterie aufgehört hat, Wärme zurückgekehrt, der noch nicht festsitzende Blutpfropf fortgespült ist; 3) die secundäre oder Nach-Blutung, zwischen dem zweiten und fünfzehnten Tage, in Folge der Ablösung eines Blutpfropfs, der schon festsass; 4) die nachträgliche oder Spät-Blutung, welche Folge einer Verschwärung ist. Bei den drei ersten Arten war die Arterie verwundet, bei der vierten blieb sie in dem Augenblicke der Verletzung vielleicht ganz unversehrt.

Wenn nach Verletzung einer Arterie oberhalb und unterhalb einer Wunde sich ein Blutpfropf gebildet hat, so kann nicht blos aus der oberen centralen, sondern auch aus dem peripherischen (unteren) Ende eine Nachblutung erfolgen. Diese, schon von John Bell erwähnte, namentlich aber von Guthrie erläuterte Art der Nachblutungen, kann man als rückläufige Blutungen bezeichnen.

Besonders häufig treten secundäre Blutungen auf: 1) wo die Circulation lebhaft ist, 2) wo sie abwechselnd bald beschleunigt, bald verlangsamt wird, 3) wo eine Erektion Statt finden kann; 4) in Organen und in der Nähe von Organen, welche auch im normalen Zustande der Sitz eines periodischen Blutflusses sind.

Man muss deshalb nach Operationen an der Gebärmutter, der Scheide oder der Blase (bei Frauen) die Kranke zur Zeit der Menses überwachen; hier kann aus einem Gefässe, welches bei der Operation nur eine unbedeutende Menge Blut ausfliessen liess, eine bedeutende Blutung entstehen. Sanson operirte eine Dame, welche am Scheideneingang eine Cystengeschwulst hatte, die sich bis in das Becken erstreckte. Während dieser Operation sickerte nur eine unbedeutende Menge Blut aus. Mehrere Tage hindurch ging Alles gut; aber bei dem Eintritte der Menses erfolgte ein starker Blutfluss aus der Tiefe der Wunde.

Diagnose. Die Erscheinungen einer arteriellen Blutung sind verschieden, je nach dem das Blut direct nach Aussen abfliesst, äussere Blutung, oder in einer Höhle des Körpers sich ansammelt — innere Blutung. Im letzteren Falle kann es, wenn die Höhle eine Oeffnung besitzt, durch diese zum Theil ablaufen (Combination der inneren und äusseren Blutung), in einer geschlossenen Höhle aber gänzlich zurückbleiben, wo dann die Anschwellung des betreffenden Körpertheils als einziges Local-Symptom neben den durch den Blutverlust bedingten Allgemein-Erscheinungen auftritt.

Die Farbe des Blutes, die Art seiner Bewegung, die

¹⁾ Principles of surgery, Vol. I. London, 1815.

Wirkung eines oberhalb der verletzten Stelle angewandten Druckes, die Lage der Wunde sind die wesentlich zu berücksichtigenden Local-Symptome äusserer Blutungen.

Die Farbe des arteriellen Blutes ist scharlachroth; der Strahl, in dem es ausströmt, ist kräftig und stossweise verstärkt — pulsirend¹⁾, die Wunde liegt in dem Bereiche einer Arterie.

Die Farbe des arteriellen Blutes kann durch die des venösen Blutes verdeckt werden, wenn zugleich mit der Arterie auch eine Vene verwundet war. Sieht man indess genau zu, so wird man Streifen arteriellen Blutes bemerken, welche gegen den schwarzen Grund, den das venöse Blut bildet, abstechen. In solchen Fällen muss man sich durch abwechselnde Compression oberhalb und unterhalb²⁾ der Wunde sicher stellen. Druck auf die Vene unterhalb der Wunde hemmt, im Falle einer blossen Venenwunde den Blutstrahl, während er durch denselben Druck nur verstärkt werden würde, wenn es sich um Blutung aus einer Arterie handelte. In letzterem Falle würde man den Strahl des Blutes augenblicklich hemmen durch einen oberhalb der Wunde auf die Arterie ausgeübten Druck; jedoch wird ein solcher Druck nach einiger Zeit wirkungslos, wenn zahlreiche Seitenäste das Blut zu der Stelle der Verletzung führen.

Die Farbe des arteriellen Blutes kann unter gewissen Verhältnissen der Blutbereitung (namentlich auch während der Chloroform-Betäubung), so wie auch wenn der Arterienstamm in einiger Entfernung von der Wunde oberhalb derselben comprimirt wird, dunkler sein. Comprimirt man z. B. die Art. femoralis im oberen Drittel des Schenkels wegen einer Verletzung am unteren Ende desselben, so wird der Blutstrom in dem Hauptstamme gehemmt, er vertheilt sich aber in die Seitenäste, und so wird nach einiger Zeit doch wieder Blut aus der Wunde fliessen, welches aber in Betreff der Farbe und der Art der Bewegung die Charaktere des venösen Blutes darbietet.

Von der Lage der Wunde, als von einem Hilfsmittel für die Diagnose, ist bereits gesprochen: indess trägt sie in vielen Fällen Nichts zur Aufklärung bei, da die Richtung, namentlich bei Stich- und Schuss-Wunden häufig eine sehr schräge ist.

¹⁾ Der Strahl des aus einer Arterie ausströmenden Blutes wird, wie der Strom desselben in der Arterie, stossweise verstärkt: 1) durch jede Systole der (linken) Herzkammer, und mit dieser nahezu synchronisch, 2) durch jede Expirationsbewegung und mit ihr synchronisch, also etwa bei jedem vierten Pulsschlage, wo dann beide Verstärkungsquellen vereint wirken.

²⁾ Wir bezeichnen der Kürze wegen, als „oberhalb der Wunde“ gelegen den centralen, dem Herzen näher liegenden, als „unterhalb“, den peripherischen, weiter vom Herzen entfernt liegenden Theil des Gefässes.

Das Aufhören des Pulsschlages in dem unterhalb der Wunde gelegenen Theile der Arterie kann gleichfalls als ein Zeichen ihrer Verletzung betrachtet werden; aber der Puls kann vorhanden sein, obgleich die Arterie verletzt ist, wenn nämlich das Blut durch Seitenäste dem unteren Ende in hinreichender Menge zugeführt wird, wie dies z. B. bei der Art. radialis der Fall ist.

Bei Nachblutungen ist es von grosser Wichtigkeit, zu wissen, aus welchem Ende der Arterie das Blut fliesst. Man muss den Druck abwechselnd, oberhalb und unterhalb der Wunde, ausüben; wenn das Blut in dem ersten Falle angehalten wird, so ist es das obere Ende und umgekehrt. Guthrie hat zuerst bestimmt darauf hingewiesen, dass das Blut, welches aus dem unteren Ende kommt, nicht blos weniger stossweise hervorsprudelt, sondern auch dunkler ist, eine Erscheinung, welche auch schon J. Hunter nicht entgangen war. Das Arterienblut muss, um zu dem unteren (peripherischen) Ende der verletzten Arterie zu gelangen, seinen Weg durch eine Menge kleiner Gefässe nehmen, in denen es Sauerstoff verliert und Kohlensäure aufnimmt.

Die durch den Blutverlust bedingten Allgemein-Erscheinungen treten bei arteriellen Blutungen verhältnissmässig schnell und heftig auf, und zwar mit um so grösserer Heftigkeit, je grösser die verletzte Pulsader und je freier der Blutausfluss ist. Dieselben erklären sich aus dem absoluten oder relativen Mangel des zur Ernährung aller Organe, namentlich aber des Gehirns, erforderlichen, sauerstoffhaltigen Blutes. Bei Verletzungen grosser Arterienstämme bedingt der plötzliche grosse Blutverlust auch sofort den Tod, ohne dass irgendwelche Krankheitssymptome vorhergehen. Ist die Blutung weniger mächtig, so treten zunächst die Erscheinungen der „Ohnmacht“ (vgl. Bd. I. pag. 60) und demnächst Krämpfe auf, welche den epileptischen ähnlich sind¹⁾. Dem Verletzten wird schwarz vor den Augen, in den Ohren klingt und saust es, kalte Schauer überlaufen seinen Rücken; sein Puls wird klein (flirrend), sein Gesicht blass, die Nase spitz, die Augen sinken in die Orbita zurück, die Stimme klingt tonlos, Neigung zum Erbrechen, zum Gähnen, zum Seufzen stellt sich ein, dann Rollen der Augen, Zuckungen der Gesichtsmuskeln, und unter allgemeinen Krämpfen, welche vielleicht noch einmal durch eine tief seufzende Inspiration und röchelnde Expiration unterbrochen werden, erfolgt der Tod. Bleibt der Blutverlust auf ein geringeres Maass beschränkt, verliert der Verletzte also namentlich erheblich

¹⁾ Marshall Hall, effects of loss of blood, Lond. 1830. — Kussmaul u. Tenner, über die fallsuchtartigen Zuckungen bei der Verblutung. Frankfurt a. M. 1857.

weniger als die Hälfte seiner gesammten Blutmenge, so kommt es in der Regel nicht zu Krämpfen, sondern nur zu einer mehr oder weniger tiefen und langen Ohnmacht, durch welche, vermöge der Abschwächung der Herzkraft, die provisorische Stillung der Blutung begünstigt wird. Der Verletzte bleibt dann Tage und Wochen lang schwach, reizbar, von Kopfschmerz, Durst und Herzklopfen gequält. Wiederholen sich die Blutungen, so steigt auch die Schwäche, die Haut wird immer blasser, Oedeme (namentlich der Knöchelgegend) treten in Folge der „Hydrämie“ auf, und allmählig, bei oft erneuter Wiederkehr der Blutung auch plötzlich, erlischt das Leben.

Prognose. Die arteriellen Blutungen bedingen zunächst die Gefahr der Verblutung oder doch der Blutarmuth. Ausserdem ist aber auch der nachtheilige Einfluss zu erwägen, den das ergossene Blut, je nach den localen Verhältnissen, ausüben kann. Im Allgemeinen sind Blutungen von weit grösserer Bedeutung bei Solchen, welche mit Ruhe ihr Blut fliessen sehen, als bei Denen, welche alsbald in Ohnmacht fallen, wodurch auf Augenblicke die Blutung gestillt und Zeit zur Aufsuchung von Hülfe gewonnen wird. Erschöpfte Subjecte, deren Blut arm an gerinnbaren Bestandtheilen ist, sowie auch solche, die an der Bluterkrankheit leiden, haben geringere Aussicht, dass ein fester Blutpfropf sich bilde. Die Lage der Arterie und die Umstände, unter denen sie geöffnet wurde, sind von Einfluss auf die Prognose. So ist z. B. unter manchen Verhältnissen die Verletzung einer Arterie, die tief liegt, wenn sie auch nur ein kleines Lumen hat, viel bedenklicher, als die einer viel stärkeren Arterie, die oberflächlich verläuft, da diese den Blutstillungs-Mitteln leichter zugänglich ist. Die während einer Operation Statt findende Verletzung einer Arterie ist weniger gefährlich, als eine durch Zufall herbeigeführte, weil der Kranke von Sachverständigen umgeben ist.

II. Traumatisches Aneurysma. Aneurysma traumaticum.

Wenn nach der Verwundung einer grösseren Arterie das Blut sich unmittelbar in das umliegende Gewebe ergiesst, so bildet es eine Geschwulst, der man den Namen „primäres traumatisches Aneurysma“ gegeben hat. Wenn das arterielle Blut in eine Höhle einströmt, welche, bald früher bald später nach der Verwundung einer Arterie unter dem Einflusse des Blutdruckes entstanden ist, so ist dies ein „secundäres traumatisches Aneurysma“. Wenn eine benachbarte Vene zugleich mit der Arterie verletzt wurde, und das arterielle Blut demnächst in die Vene fliesst und diese erweitert, so

entsteht ein „arteriell-venöses Aneurysma“. Bildet hierbei das arterielle Blut in dem Bindegewebe einen Sack, bevor es in die Vene tritt, so entsteht ein „varicöses Aneurysma“; geht das arterielle Blut unmittelbar in die Vene über, so ist dies ein „aneurysmatischer Varix“.

1. Primäres traumatisches Aneurysma. Aneurysma traumaticum diffusum s. primarium.

Ursachen und Entstehungsart. Der Name „Aneurysma, Pulsadergeschwulst“, dessen Vieldeutigkeit wir weiterhin noch kennen lernen werden, wird diesen Geschwülsten nicht ganz mit Recht beigelegt, da sie mit den übrigen Pulsadergeschwülsten nichts gemein haben, als dass das Blut, durch welches sie gebildet werden, aus einer Arterie herrührt. Wir gewinnen eine einfachere Anschauung, wenn wir sie von vornherein als „blutige Infiltration“ bezeichnen. Das Blut kann unmittelbar nach der Verletzung durch die vielleicht verschobene Arterien Scheide einen Augenblick aufgehalten werden, alsbald aber ergiesst es sich in das Bindegewebe oberhalb und unterhalb der Aponeurosen, in die Zwischenräume der Muskeln, zwischen die Muskelbündel, dringt zuweilen selbst bis an das Periost; ja man hat sogar die blutige Infiltration von einem Gliede sich auf das andere fortsetzen sehen. Von den Blutergüssen, welche wir als Sugillationen bei den Quetschungen (Bd. I. „Verletzungen“) kennen gelernt haben, unterscheidet sich das diffuse traumatische Aneurysma durch die Fortdauer pulsirenden Einströmens von arteriellem Blute.

Gewisse Bedingungen sind unerlässlich, damit eine solche Infiltration sich entwickeln könne: der ausströmende Strahl muss durch die localen Verhältnisse gezwungen werden, sich in die Breite auszudehnen, statt in einer Säule in die Höhe zu steigen. Umstände, welche dieses bewirken, sind gegeben in dem Mangel an Parallelismus zwischen der Wunde der Arterie und derjenigen der Haut, in der schrägen Richtung der Wunde innerhalb der übrigen Weichtheile, in ihrer geringen Grösse. Das Blut kann alsdann nur in einer, im Verhältniss zu der, aus der verwundeten Arterie hervorströmenden, sehr geringen Menge abfliessen. Noch näher liegt die Bildung des diffusen Aneurysma, wenn gar keine Hautwunde besteht, z. B. nach der Zerreißung der Arterie durch einen Knochensplitter oder nach dem Bersten eines wirklichen Aneurysma. Uebrigens ist zur Bildung eines diffusen Aneurysma nicht immer die Verletzung einer grossen Pulsader erforderlich; sehr beträchtliche und gefährliche Geschwülste der Art können durch Verletzung eines Gefässes vierter Ordnung ent-

stehen. Die blutige Infiltration beginnt auch nicht immer gleich nach der Verwundung, namentlich nicht bei Quetschungen der Arterien.

Die **Diagnose** der blutigen Infiltration macht zuweilen Schwierigkeiten. Man kann die Geschwulst für eine entzündliche Anschwellung halten. — ein Irrthum, der dem Kranken das Leben kosten kann, wenn unvorsichtiger Weise ein Einschnitt gemacht wird. War eine Wunde vorhanden, so sieht man das Blut doch nicht immer mit allen seinen arteriellen Eigenschaften herausströmen; die Geschwulst bildet sich auch nicht immer gleich nach der Verwundung. Sie erscheint in der Regel zuerst an einer Stelle im Verlaufe der Arterie, dehnt sich dann nach allen Richtungen aus, besonders nach der abhängigen Seite und dorthin, wo viel loses Bindegewebe liegt. Anfangs ist sie weich an dem Punkte, welcher der Arterienwunde entspricht, die Haut über ihr verändert die Farbe lange Zeit gar nicht, späterhin wird sie bläulich. Man fühlt in der Tiefe regelmässige Pulsationen; zuweilen entdeckt die Hand eine zitternde Bewegung (*frémissement*). Die Bewegung des Blutes innerhalb der Geschwulst und die dadurch veranlassten Geräusche sind aber im Anfange meist gar nicht oder doch sehr unvollkommen wahrnehmbar. Erst in einer vorgeschrittenen Periode der Geschwulst, wenn sie schärfer abgegrenzt ist, kann man beim Anlegen des Ohres ein blasendes Geräusch wahrnehmen, welches verschwindet, sobald man die Arterie zwischen dem Herzen und der Wunde zusammendrückt (vgl. Aneurysma, Cap. III.).

Prognose. Das diffuse Aneurysma ist nicht allein gefährlich wegen des Blutverlustes, welcher, wie bei jeder anderen inneren Blutung, gänzliche Erschöpfung herbeiführen kann, sondern auch wegen des oft darauf folgenden Brandes. Das in den Geweben angehäufte Blut bedingt nämlich zunächst eine übermässige Spannung derselben, durch welche schliesslich Compression der kleinen Arterien, sowie auch der Nervenäste, Venen und Lymphgefässe herbeigeführt wird. Die ganze Blutbewegung und somit auch die Ernährung des Theils erfahren eine Unterbrechung, selbst wenn das verletzte Gefäss nicht die Haupt-Pulsader ist; das Glied verliert seine Empfindlichkeit, seine Wärme, der untere Theil desselben wird ödematös; Phlyctänen erheben sich und füllen sich mit jauchiger Flüssigkeit. Das zwischen den Geweben stagnirende Blut wirkt aber nicht blos durch Druck, sondern erregt in seiner Umgebung Entzündung, wird mit Exsudat durchsetzt und kann mit diesem zugleich zerfallen, namentlich wenn die äussere Luft irgendwo Zutritt hat.

Wenn es sich nicht um den Hauptpulsaderstamm einer Extremität, sondern um relativ kleinere Arterien handelt, wenn ferner nur eine

geringe Menge Blut ausgetreten ist, und der Verletzte sich übrigens einer guten Gesundheit erfreut, so kann die Resorption erfolgen. Auch bei dem Uebergange in Eiterung ist Heilung möglich, wenn vor dem Aufbruche Obliteration der Arterie erfolgt ist. Tiefe Lage der verwundeten Arterie, Nähe des Hauptstammes, grosse Menge des ergossenen Blutes machen die Prognose bedenklicher. Je grösser die Geschwindigkeit, mit der die Geschwulst sich entwickelt, desto mehr giebt sie zu secundärer Erkrankung der benachbarten Gewebe Anlass. Je beträchtlicher das Volumen der Geschwulst, desto grösser ist die Gefahr des Verschlusses der Collateraläste durch Druck und somit des Brandes.

B. Secundäres (circumscriptes) traumatisches Aneurysma.

Ursachen und Entstehungsweisen. Aus der geringen Neigung zur Verwachsung, welche die inneren Arterienhäute besitzen, und aus dem unaufhörlichen Druck, welchen das Blut auf die Gefässwandungen ausübt, erklärt sich, weshalb die Heilung der Arterienwunden wenig sicher ist. Nehmen wir an, eine Arterie sei angestochen, eine unbedeutende Blutung ist eingetreten, die sich entweder von selbst stillt, oder doch in Folge eines angewandten Druckes sistirt wird. Wochen, Monate, selbst Jahre vergehen, ohne dass irgend ein bedenklicher Zustand von der verwundeten Stelle auftritt; man glaubt, die Heilung sei von Bestand. Aber ganz allmählig löst sich der Blutpfropf, welcher die Arterie verschloss, das Blut sickert in eben dem Maasse hindurch, es dehnt die Arterien Scheide aus, verdrängt und verdichtet das benachbarte Bindegewebe und bildet so um sich eine Cyste, einen Sack, ein „circumscriptes“ oder „sackförmiges Aneurysma“. Diese neue Höhle steht mit der Arterie in Verbindung vermittelt der alten Wunde, welche zu dieser Zeit immer rund oder oval ist, welches auch die Gestalt des verletzenden Instrumentes war. Der Sack ist mehr oder weniger dick, je nach der Länge der Zeit, seit welcher er bestand. Derselbe enthält Blutgerinnsel, die schichtweise gelagert sind; die excentrischen Lagen sind die dichtesten, am Flüssigsten sind die in der Nähe der Arterienwunde gelegenen. Die Haut über der Geschwulst zeigt fast immer eine Narbe, in Folge der früheren Verwundung. Zuweilen ist sie ihrer geringen Grösse wegen schwer zu finden, da die Wunde gewöhnlich durch ein dünnes, spitzes Instrument gemacht war. Man hat indess solche Aneurysmen auch in Folge von Säbelhieben, Messerstichen und Quetschungen entstehen sehen. Der Schlag eines Pferdehufes veranlasste z. B. ein Aneurysma

der Art. iliaca externa, wegen dessen Salomon (zu Petersburg) die Art. iliaca communis unterband.

Symptome und Diagnose. Die Uebereinstimmung zwischen den Symptomen, welche das secundäre traumatische Aneurysma zeigt, und denen des „spontanen“ Aneurysma ist so gross, dass die Unterscheidung nur durch Berücksichtigung der Anamnese möglich wird. Es finden sich dieselben Pulsationen, dieselbe Erweiterung, dasselbe Geräusch, welche näher beschrieben werden sollen, wenn von dem sogen. spontanen Aneurysma, welches durch Entartung der Arterien entsteht, gesprochen werden wird.

Die Veränderungen, welche in der Umgegend des „spontanen“ und des „secundären traumatischen“ Aneurysma vor sich gehen, sind dieselben; unterhalb und oberhalb der Geschwulst entwickelt sich bei beiden der Collateral-Kreislauf in gleicher Weise. Nur in Betreff der Beschaffenheit der Arterienhäute unterscheiden sie sich wesentlich. Das traumatische Aneurysma ist seinem Wesen nach eine durchaus örtliche Krankheit: ober- und unterhalb der Oeffnung in der Arterie ist in der Regel (s. unten) Alles an ihr gesund; die Häute bewahren ihre Biegsamkeit, ihre Elasticität, ihre Stärke. Bei dem spontanen Aneurysma dagegen erstreckt sich die krankhafte Veränderung der Arterienhäute, durch welche die Geschwulst veranlasst wurde, oberhalb und unterhalb der Geschwulst weiter

C. Arteriell-venöses Aneurysma. Aneurysma arterioso-venosum.

Ursachen und Entstehungsart. Diese Art von Aneurysma beobachtet man am Häufigsten nach einem unglücklichen (ungeschickten) Aderlasse. Die Lancette (oder der Schnepfer) dringt durch die Vena mediana basilica und verletzt die Arterie, welche hinter der Vene liegt. Alsbald geht das arterielle Blut in die Vene über und spritzt durch die äussere Wunde hervor. Die Blutung ist schwer zu stillen, wenn die Wunde in der Arterie gross ist; jedoch gelingt es endlich. Wird nun die Wunde der Vene, welche in Verbindung mit der Hautwunde steht, durch Druck oder auf andere Weise verschlossen, während die einander zugewandten Wunden der entgegengesetzten Venenwand und der Arterie offen bleiben, so tritt das arterielle Blut entweder zunächst in das Bindegewebe, welches die Arterie mit der Vene verbindet, und von da in die Vene, oder aber es fliesst direct in die letztere. In beiden Fällen wird die Vene bedeutend ausgedehnt; in dem ersten Falle entsteht ein Aneurysma varicosum, in dem zweiten ein Varix aneurysmaticus.

Die Ellenbeuge ist aber keineswegs (wie Boyer behauptet) die einzige Stelle, an welcher solche Aneurysmen mit Sicherheit beobachtet worden sind; Larrey d. J. beobachtete eins in der Kniekehle, Dupuytren, Sanson, Breschet, Spence (Edinb. med. journ. 1869. July) und Brindejone-Tréglodé (Thèse, Montpellier 1869) sahen sie am Oberschenkel, Dorsey (in Philadelphia) spricht von einem am oberen und vorderen Theile des Unterschenkels, welches durch eine Flintenkugel veranlaßt war, die gleichzeitig die Art. tibialis antica und die gleichnamige Vene verwundet hatte. Larrey d. Ä. (Mémoires de chirurgie) will ein Aneurysma dieser Art gesehen haben, das durch einen Hieb mit der Spitze eines Säbels entstand, indem Arteria und Vena subclavia zugleich verwundet wurden. Aus dem letzten Feldzuge wurden 2 Fälle von Aneurysma arterioso-venosum der Axillargefäße durch Schusswunden beschrieben, beide in Berliner Dissertationen: von Karl Bardeleben (1871) und von Knäack (1872). Vgl. auch „Krankheiten der Carotiden“ (weiter unten) und „Kopfverletzungen“ Bd. III.

Nicht immer wird die Vene zuerst durchbohrt, und nicht immer wird die Arterie genau an derselben Stelle wie die Vene geöffnet. Dazu wäre nöthig, dass die beiden Gefäße überall in denselben Lage-Verhältnissen sich befänden, wie in der Ellenbeuge, und dass das verletzende Instrument immer in der Richtung von der Vene zur Arterie und zwar mit Durchbohrung der ersteren einwirkte. Ist aber z. B. ein varicöses Aneurysma die Folge einer Schusswunde, so erscheint es viel weniger leicht möglich, dass die Kugel durch die Vene zur Arterie gelangte, als dass beide Gefäße an einem Theile ihres Umfanges quer getrennt waren. Ausserdem giebt es aber auch Aneurysmen dieser Art, welche nicht in Folge einer Verwundung entstanden sind. Syme (zu Edinburg) hat ein varicöses Aneurysma beobachtet, welches durch eine Communication der Aorta mit der Vena cava inferior gebildet wurde, deren Entstehung von einer Verletzung durchaus nicht abgeleitet werden konnte. Thurnam hat mehrere Fälle der Art gesammelt¹⁾. In solchen Fällen wird man zu der Annahme genöthigt, dass ein gewöhnliches Aneurysma sich in eine Vene geöffnet habe, etwa in der Art, dass um eine Ablagerung in den Wandungen derselben (vgl. die folgd. Cap.) Ulceration entstanden sei, die sich auch auf die angrenzende Venenwand erstreckte und endlich eine Perforation beider, mithin Communication zwischen der Vene und der Arterie, herbeiführte. Man hat solche Communicationen zwischen Aorta und Vena cava (sowohl superior als inferior) beobachtet.

Die **Veränderungen**, welche die von einem Varix aneurysmaticus befallenen Gefäße zeigen, hat schon J. Hunter richtig beschrieben. Die Arterie ist sowohl oberhalb, als unterhalb der verletzten Stelle erweitert, verläuft gewunden, ihre Wandungen sind ver-

¹⁾ Medico-chirurgical transactions, London 1840, Tom. XXIII. pag. 323 und Archives de médecine, III. serie, Tom. XI. pag. 210.

dünnt, sie erscheint einer Vene ähnlich. Die Vene ist auch erweitert, aber ihre Wandungen sind verdickt, denen einer Arterie ähnlich. Die Verdickung der Venenwand, ihre „Arterialisirung“, erklärt sich daraus, dass dieselbe von dem Augenblick an, wo die Vene von arteriellem Blute durchströmt wird, unter einem bei Weitem stärkeren Druck steht, als früher im normalen Zustande, wo nur Venenblut in ihr floss. Da dieser Wechsel von einem sehr geringen zu einem sehr bedeutenden Seitendruck ganz plötzlich Statt findet, so erfolgt die Verdickung der Venenwand unter entzündlichen Erscheinungen, während Gefässe, welche eine ähnliche Ausdehnung allmählig erfahren, auch ganz unmerklich immer dickere Wandungen erhalten. Umgekehrt erfolgt die Verdünnung der Arterienwand durch Verminderung der gewohnten Spannung, auf Grund der Ableitung eines grossen Theils des Blutstroms in die nachgiebigere Vene.

Die Erweiterung der Vene an der Stelle, wo die Communication mit der Arterie Statt findet, erfolgt in verschiedener Form, bald flaschenförmig, bald eiförmig, bald nahezu cylindrisch oder spindelförmig.

Symptome. Der aneurysmatische Varix kommt meist einige Tage nach der Verletzung zum Vorschein (selten erst nach mehreren Wochen), in Gestalt einer länglich runden Geschwulst, welche allmählig den Umfang einer Wallnuss erreicht. Diese Geschwulst ist (in der Ellenbeuge) gewöhnlich durch eine Erweiterung der Vena mediana basilica gebildet; über ihrer Mitte liegt dann die Narbe der Aderlasswunde, welche das Uebel veranlasste. Die Erweiterung erstreckt sich sehr bald von der Geschwulst aus auf die mit der verletzten Vene zusammenhängenden anderen Venen, namentlich in centripetaler Richtung. Hängt der Arm herab, oder findet ein Druck in der Achselhöhle statt, so nimmt der Umfang der Geschwulst zu; dagegen verkleinert sie sich oder verschwindet sogar, wenn der Kranke den Arm emporgehoben hält oder wenn die Geschwulst selbst comprimirt wird. Ein aneurysmatischer Varix an der unteren Extremität verkleinert sich in horizontaler Lage, vergrössert sich in aufrechter Stellung.

In der Geschwulst finden eigenthümliche Pulsationen Statt, isochronisch mit den Pulsschlägen der Arterien, aber nur in der Mitte der Geschwulst deutlich; je mehr man sich von dieser entfernt, desto schwächer werden sie, bis auf eine kaum wahrnehmbare, wellenförmige Bewegung und verschwinden noch weiter seitwärts gänzlich. Die undulirende, zitternde Bewegung nimmt man auch wahr, wenn man das eine Ende eines Katheters an die Geschwulst legt und das andere zwischen den Fingern hält oder zwischen die Zähne nimmt oder auch nur die Geschwulst mit einem Finger leicht berührt. Beim

Auscultiren der Geschwulst hört man ein eigenthümliches Blasegeräusch oder Schnurren, welches anhaltend, aber im Augenblicke der Systole, also synchronisch mit den Pulsationen, bedeutend verstärkt ist. Dies Geräusch ist mitunter so stark, dass der Kranke nicht schlafen kann, wenn er seinen Arm nahe an den Kopf legt.

Legt man eine Binde an der peripherischen Seite der Geschwulst so fest an, dass die Pulsschläge unterhalb gänzlich aufhören, so bleibt die Geschwulst sammt ihren Pulsationen unverändert. Wenn man letztere durch directen Druck sistirt, so stellen sie sich bei Aufhebung des Druckes sofort wieder ein. Wird die Arterie oberhalb der Geschwulst comprimirt, ohne dass man die Vene berührt, so hört das Klopfen in dem Aneurysma auf, die Geschwulst sinkt ein, und wenn sie durch den angewandten Druck vollständig entleert war, so kehrt das Klopfen erst in dem Augenblicke zurück, in welchem man die Blutbewegung in der Arterie wieder frei lässt. Die Geschwulst und das Klopfen in ihr verschwinden, wenn man die Arterie oberhalb derselben zusammendrückt und gleichzeitig durch Druck die Venen entleert. Wenn eine comprimirende Binde oberhalb, eine zweite unterhalb der Geschwulst liegt, so finden keine Pulsationen mehr in ihr Statt, und durch Druck kann man dann fast immer das Blut aus der Vene in die Arterie treiben, aus welcher es, beim Nachlassen des Druckes, in die Geschwulst zurückkehrt. — Mit der Zeit nimmt der Umfang der Arterie oberhalb der verletzten Stelle ein Wenig zu, wogegen ihre unterhalb derselben abgehenden Aeste immer kleiner werden.

Die Symptome eines Aneurysma varicosum bieten zwar grosse Aehnlichkeit dar; jedoch ist die Unterscheidung recht wohl möglich. Zu diesem Behuf muss man die Venen-Erweiterung zunächst entleeren, indem man das Blut aus ihr in die Arterie zurückdrängt. Alsdann unterscheidet man deutlich eine zweite, tiefer gelegene, einfach pulsirende Geschwulst, welche an die Arterie angeheftet, und durch die Ausdehnung ihrer Bindegewebsscheide gebildet ist (traumatisches Aneurysma). In dieser bilden sich nach längerem Bestehen Gerinnsel, polypenartige Schichten, welche ihr mehr Festigkeit verleihen. Alsdann ist die Unterscheidung der beiden Geschwülste leichter; nicht nur die Art der Pulsationen in beiden ist verschieden, sondern die eine wird auch durch den geringsten Druck zum Verschwinden gebracht, während die andere bei hinreichender Compression sich zwar verkleinert und zu pulsiren aufhört, aber niemals vollständig verschwindet. Das traumatische Aneurysma, welches in diesem Falle mit der Venen-Communication complicirt ist, kann nach dieser oder jener Seite hin wachsen, wo gerade die nachgiebigste Stelle ist, und

kann daher mit der Zeit eine ganz unregelmässige Gestalt annehmen. Der „aneurysmatische Varix“ dagegen behält immer die rundliche Gestalt eines Varix.

Zur Erläuterung der anatomischen Verhältnisse der venös-arteriellen Aneurysmen dienen die nachstehenden, theils schematischen, theils nach der Natur gezeichneten Figuren.

Fig. 1, schematische Abbildung des aneurysmatischen Varix in einem gedachten Längsburchschnitt; *a* Arterie, *v* Vene; *o* die Stelle, wo die Lanzette eingestochen war; der dem Buchstaben *a* gegenüberliegende weisse Punkt stellt die Communications-Oeffnung der beiden Gefässe vor.

Fig. 2 stellt in gleicher Weise das varicöse Aneurysma dar. Hier ist die Vene *v* von der Arterie *a* durch einen aneurysmatischen Sack *s* getrennt. In *o* sieht man die der Vene beigebrachte Stichwunde; gegenüber ist die Oeffnung, welche den Sack mit der Vene verbindet, weiterhin findet sich eine andere Oeffnung, welche den Sack mit der Arterie in Verbindung setzt. Die Vene ist an dem Einstichpunkte erweitert.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 3, Abbildung eines noch wenig entwickelten Aneurysma varicosum (nach Lenoir). — Es entstand in Folge eines Aderlasses, wobei die Vena mediana basilica durchstochen und zugleich die unter dieser liegende Arterie angestochen war. Die Geschwulst wird von der Vene, von der Arterie und von einem Theile des zwischen diesen Gefässen gelegenen Bindegewebes gebildet; *a* deutet die Spitze der Geschwulst an, welche der Stichwunde entspricht.

Fig. 4 giebt eine Seitenansicht desselben Aneurysma in beinahe natürlicher Grösse; *a* bezeichnet den Sack, welcher von der Arterie und dem benachbarten Bindegewebe gebildet wird; *b* die Erweiterung des Theiles der Vena mediana basilica,

welcher von der Lanzette durchstochen wurde, *ee* die Fortsetzung derselben Vene nach Oben und Unten; *c* Arteria brachialis.

Varietäten. Nicht immer entsprechen die durch gleichzeitige Verletzung einer Arterie und der sie begleitenden oder ihr nahe liegenden Vene veranlassenen aneurysmatischen Geschwülste genau den bisher aufgestellten Typen. Wir erläutern nachstehend die wirklich beobachteten Varietäten, welche sich, streng genommen, weder als Varix aneurysmaticus, noch als Aneurysma varicosum bezeichnen lassen.

Fig. 5.



1. Bei dem „seitlichen“ varicösen Aneurysma (Fig. 5) liegt der Sack (*s*) an der Seite der Gefässe. Diese sind an genau einander entsprechenden Punkten angestochen worden (wie in Fig. 1); das Blut hat aber nicht die Vene erweitert (wie dort), auch nicht einen Sack gebildet zwischen der Arterie und der Vene (wie in Fig. 2), sondern eine Aushöhlung zur Seite gemacht; zwischen den beiden Gefässen befindet sich nur ein Canal, welcher sich seitlich erweitert hat.

Fig. 6.



2. Bei dem „subcutanen“ arteriell-venösen Aneurysma (Fig. 6) hängen Arterie *a* und Vene *v* fest an einander; sie stehen mit einander durch einen Canal in Verbindung, dessen Länge nur der Dicke ihrer mit einander verwachsenen Wandungen entspricht. Auf der entgegengesetzten Seite der Vene, liegt zwischen ihr und der Haut ein aneurysmatischer Sack (*s*), welcher alle Merkmale des secundären traumatischen Aneurysma zeigt, aber mit der Vene durch eine Oeffnung in Verbindung steht, welche gerade über derjenigen liegt, durch welche die Vene mit der Arterie communicirt. Der Vorgang, durch welchen das subcutane arteriell-venöse Aneurysma gebildet wird, ist dieser: Arterie und Vene werden gleichzeitig verwundet, letztere von einer Seite zur anderen durchbohrt; die Wunde der tiefer gelegenen Venenwand bleibt klaffend und stellt mit der Arterienwunde, indem Arterie und Vene in deren Umgebung schnell und fest verwachsen, nur eine Oeffnung dar. Wenn nun die Wunde der vorderen (oberflächlichen) Venenwand vernarbt, so entsteht ein gewöhnlicher aneurysmatischer Varix; wenn aber das arterielle Blut mit grosser Gewalt in die Vene getrieben wird, so durchdringt es ihr Lumen der Quere nach, und quillt aus der unter der Haut liegenden Wunde dieses Gefässes hervor, um sich (vorausgesetzt, dass die Hautwunde bereits vernarbt oder doch sicher verschlossen ist) in dem die Vene umgebenden Bindegewebe unter der Haut anzusammeln. Um diesen mit der Arterie in mittelbarem Zusammenhange stehenden Bluterguss bildet sich ein Sack,

welchen im Allgemeinen die Erscheinungen des secundären traumatischen Aneurysma zeigt, sich indess dadurch unterscheidet, dass seine Öffnung nicht in directer Verbindung mit der Arterie steht, dass diese Verbindung vielmehr erst durch die Vene vermittelt wird.

A. Bérard (Société de chirurgie, 1843) glaubt, dass diese Varietät häufiger, als das Aneurysma varicosum vorkomme; die Entstehung derselben scheint allerdings leichter, als die des letzteren, bei dem es sich um die Bildung eines Sackes zwischen der Arterie und der Vene handelt, an einer Stelle also, wo besonders dehnbare Bindegrube nicht vorhanden ist.

Für die **Diagnose** ist die Kenntniss dieser Varietäten von Wichtigkeit. Der durch Fig. 1 dargestellte Typus (der aneurysmatische Varix) ist charakterisirt durch die eiförmige Gestalt der Geschwulst, das Blasegeräusch, das Gefühl des Schwirrens beim Auflegen der Hand, die Zunahme der Geschwulst bei einer die Bewegung des venösen Blutstroms hemmenden Stellung, endlich die Möglichkeit, die Geschwulst durch Druck zum Verschwinden zu bringen. Wenn die Vene an der Bildung der Geschwulst nicht Theil nimmt, wie bei dem „seitlichen“ und bei dem „subcutanen“ venösen Aneurysma (Fig. 5 u. 6), wo das Blut quer durch die Vene hindurch strömt, ohne sie zu erweitern, so finden sich die Symptome des einfachen sackförmigen Aneurysma; dagegen fehlt das Schwirren, und die Geschwulst vergrößert sich nicht merklich bei Behinderung des venösen Blutstroms.

Dass bei dem aneurysmatischen Varix das arterielle Blut in das Venensystem übergeht, könnte von Niemand in Abrede gestellt werden; einige Autoren sind aber der Meinung, dass auch venöses Blut in die Arterien übertrete. Breschet führte zu Gunsten dieser Ansicht das Taubsein des Gliedes und das Gefühl von Kälte in demselben auf. Letzteres ist keineswegs bloß subjectiv, sondern die Temperaturverminderung ist thermometrisch nachweisbar; in dem von K. Bardeleben (l. c.) untersuchten Falle betrug dieselbe 8° C. Sowohl diese Temperaturverminderung, als auch die Empfindung von Taubsein (Einschlafen) erklären sich ungezwungen aus der ungenügenden Zufuhr arteriellen Blutes. Einen weiteren Beweis entlehnte Breschet aus der pathologischen Anatomie. Die arteriellen Verzweigungen unterhalb der Geschwulst sind weich, schlaff, kurz den Venen ähnlich, wogegen die Venen, durch welche das hellrothe Blut fließt, dick und elastisch werden, bis zu dem Grade, dass sie nach ihrer Durchschneidung fließen wie Arterien. Hieraus deducirt nun Breschet, dass die Arterien venöses Blut führen müssen, woraus sich auch die Schwäche der Pulsationen in der Arterie unterhalb der Geschwulst erklären lasse, welche Hunter und Boyer von der Verengerung der Arterie unterhalb der verletzten Stelle ableiteten. Nach Breschet soll das venöse Blut während der Diastole in die Arterie übergehen. A. Bérard hat dagegen den Einwurf gemacht, dass die Arterie während der Diastole sich passiv verhalte; das durch das Herz fortgestossene Blut erweitere das Gefäß und dringe unter der Wirkung dieses Stosses aus der Arterie in die Vene ein. Die Verhältnisse sind aber noch ungünstiger; denn während der Diastole wirkt bekanntlich die Elasticität der Arterien, und die Kraft des arteriellen Blutstromes ist daher in jedem Augenblick

derjenigen des venösen so sehr überlegen, dass die Breschet'sche Ansicht physikalisch unhaltbar erscheint.

Prognose. Von allen Aneurysmen ist der aneurysmatische Varix am Wenigsten gefährlich. Er kann lebenslänglich auf derselben Stufe der Entwicklung (z. B. dem Umfang einer Nuss) stehen bleiben. Hunter beobachtete eine solche Geschwulst, welche sich während fünf und dreissig Jahren (so lange als die Kranke lebte) durchaus nicht veränderte. Zuweilen verringert sich selbst der Umfang der Geschwulst, wobei sie dann nicht selten eine andere Gestalt annimmt. Die Beschwerden des Kranken sind: Empfindungen von Spannung, die aber nicht beständig sind, subjective Wahrnehmung eines Geräusches, welches den Kranken aufweckt, zuweilen Unmöglichkeit, auf der Seite, wo die Geschwulst sitzt, zu schlafen, ödematöse Anschwellung und Schwäche, auch Abmagerung (Muskelatrophie) der Extremität, das Gefühl, als ob das Blut sich in diesem Gliede anhäufe. Diese im Allgemeinen günstige Prognose bezieht sich aber nur auf den aneurysmatischen Varix; die anderen Arten des arteriell-venösen Aneurysma theilen im Ganzen die Prognose des sackförmigen Aneurysma, obgleich auch bei ihnen der Seitenabfluss des Blutes in die Vene, durch welchen der Blutdruck in der Geschwulst selbst erheblich vermindert werden kann, als günstiges Moment hinzutritt.

Von der **Behandlung** wird nach Erläuterung der übrigen Aneurysmen die Rede sein. Vgl. Cap. IV.

Zweites Capitel.

Entzündung, Atherom und Verstopfung der Arterien.

Die Lehre von der Arteritis stand noch zu Anfang dieses Jahrhunderts in innigem Zusammenhange mit der Lehre von der Localisation des Fiebers (Peter Frank). Von vielen Seiten hat man als Grund des Fiebers überhaupt diese Entzündung annehmen wollen und, in der Voraussetzung der Richtigkeit dieser Annahme, häufig die Veränderungen, die in der Farbe der Arterien auftreten, als Beweis vorausgegangener Entzündung gedeutet, während sie in der That nur Leichenerscheinungen sind und auf der Tränkung der Arterienhaut mit dem aus den zerfallenden Blutkörperchen frei werdenden, diffundirten Blutfarbestoff beruhen (Imbibitionsröthe). Gerade diejenige Membran, welche man in solchen Fällen am Häufigsten für entzündet erklärt hat, die innere Arterienhaut besitzt gar keine Gefässe, un- wenn auch deshalb weder eine primäre Erkrankung derselben über

haupt, noch auch die Möglichkeit eines Hineinwachsens von Gefässen in dieselbe von den anderen Arterienhäuten aus geläugnet werden kann, so ist doch durch die genauen Untersuchungen von Virchow¹⁾ nachgewiesen, dass bei der Entzündung der Arterien im Allgemeinen nur zwischen den Arterienhäuten und niemals an der freien Oberfläche der inneren Membran Exsudate abgelagert werden. Was man früher für Exsudate auf der inneren Fläche, d. h. also im Lumen der Arterie, gehalten hat, sind durchweg Gerinnsel, welche bald an der Stelle selbst, an welcher sie sich festheften (autochthone), bald in einem anderen Theile des Gefäss-Systems entstanden und vom Blutstrom mit fortgerissen sind (fortgeschwemmte Thromben, Emboli). Nach Gendrin soll durch Arteritis, namentlich durch ein von den äusseren Schichten der Arterie geliefertes Exsudat, die innere Membran auf grössere Strecken hin in Form eines Rohres abgelöst werden können, so dass sie entweder frei oder doch leicht ablösbar innerhalb des Gefässrohrs sich findet, oder in einer gewissen Ausdehnung gänzlich fehlt, indem sie vom Blutstrom hinweggespült wurde. Bei dem Mangel mikroskopischer Untersuchungen über dies als „abgelöste innere Gefässhaut“ bezeichnete Gebilde, ist der Einwand zulässig, dass es sich auch in diesen Fällen um Fibrin-Ablagerungen (Gerinnsel) gehandelt habe. Dass aber die innere Gefässhaut an einzelnen Theilen der Arterien, sei es auf Grund ihrer Ablösung oder Zerstörung, ganz fehlen kann, ist unläugbar; in der geöffneten Arterie findet man alsdann rothe Granulationen, welche ihrer Seits das Caliber des Gefässes verengern und seine Innenfläche rau machen, mithin auf doppelte Weise zur Entstehung und Festheftung eines Gerinnsels führen können. Mit dem Auftreten der Gerinnsel oder Blutpfropfe ist die wesentliche Bedingung zur Obliteration der Arterien gegeben. Auf diese folgt häufig mehr oder weniger ausgebreiteter Brand derjenigen Theile, welchen auf solche Weise die Blutzufuhr abgeschnitten ist, seltener endet sie in Eiterung, wodurch einer Seits Pyämie (sehr selten), und anderer Seits Zerreissung (Verschwärung des Gefässes und somit Blutung) bedingt werden kann. Selten findet sich auch eine von Aussen beginnende Verschwärung der Arterien, welche stets eine secundäre, von den Nachbargebilden ausgehende ist. In solchen Fällen entsteht eine umschriebene, meist runde, von einem glatten, scharfen Rande umgebene, gegen das Lumen hin trichterförmig verengte Oeffnung, durch welche die Arterie alsdann mit dem benachbarten Eiterherde oder Geschwürgrunde communicirt.

¹⁾ Archiv für pathol. Anatomie, Bd. I. pag. 272. Gesammelte Abhandlungen pag. 221 u. f.

So wie von anatomischer Seite früher Arterienentzündung und Thrombose mit einander verwechselt worden sind, ist auch das Krankheitsbild, welches von der Arteritis entworfen wurde, ganz unsicher. Die Krankheit sollte mit heftigem Fieber beginnen, namentlich mit sehr frequentem Pulse, die entzündete Arterie Anfangs heftig klopfen, später aber als ein pulsloser, harter Strang erscheinen, nach dessen Verlauf sowohl spontan, als auch bei der Berührung heftige Schmerzen entstehen sollten. Endlich wird Gangrän des entsprechenden Körpertheils als der gewöhnliche, und Abscessbildung in den Häuten der Arterie als ein höchst seltener Ausgang angeführt. Seit man es aber mit der pathologischen Anatomie genauer nimmt, ist es niemals gelungen, eines Falles habhaft zu werden, in welchem auf den eben angegebenen Symptomencomplex Veränderungen der Arterie gefolgt wären, die man als Arteritis hätte deuten können. Entweder man fand, nachdem die Erscheinungen bedeutender Circulationsstörungen vorausgegangen waren, Thrombose der Arterien, oder aber man fand (viel seltener) wirklich entzündliche Verdickung der äusseren Arterienhaut und selbst Eiterung in der Wandung der Arterien, ohne dass die vermeintlichen Symptome der Arteritis vorausgegangen.

Von einer Therapie der Arterienentzündung im früheren Sinne, welche die Einen mit starken Blutentziehungen, die Anderen mit narkotischen Mitteln haben einleiten wollen, kann somit gar nicht die Rede sein.

Während die Krankheits-Erscheinungen, welche man früher von Arterienentzündung ableitete, in der Thrombose ihre Erklärung gefunden haben, sind wirkliche Entzündungen in den Arterien durch die Untersuchungen von Virchow¹⁾ nachgewiesen worden. Je nach dem ursprünglichen Sitze oder Ausgangspunkte der Krankheit kann man eine innere und eine äussere Entzündung der Arterien unterscheiden. Erstere hat in der Tunica adventitia ihren Sitz, letztere kann, je nachdem sie mehr die mittlere oder die innere Gefässhaut betrifft, als Mesarteritis und Endarteritis unterschieden werden.

Entzündung der Tunica adventitia (Periarteritis) kommt häufig vor, wenn die Gewebe in der Umgegend der Arterie entzündet sind, mithin secundär von Aussen; sie kann sich aber auch zu den Entzündungen der inneren Arterienhäuten hinzugesellen. Wird die Arterie von einem fremden Körper, wie z. B. von einer Ligatur, umschlossen, so entsteht an dieser Stelle gleichfalls Periarteritis. Gewöhnlich führt diese Entzündung zur Verdichtung und Verhärtung, seltener zu einer circumscribten Eiterung.

¹⁾ Vgl. dessen gesammelte Abhandlungen, pag. 482 u. f.

Die Entzündung der mittleren Arterienhaut (Mesarteritis) kommt selten acut vor, kann jedoch auch zur Abscessbildung führen. Bei chronischem Verlauf veranlasst sie namentlich eine Vermehrung der Bindegewebelemente der Arterienwand, wodurch diese dicker, homogener und mehr knorpelartig wird.

Entzündung der inneren Gefäßshaut veranlasst bei acutem Verlauf nur eine leichte Trübung und Runzelung der inneren Oberfläche der Arterie. Eiterung der mittleren Haut führt in der Regel zur Nekrose der inneren. Am Häufigsten aber wird die innere Haut von einer chronischen Entzündung befallen, welche in ihrer weiteren Ausbildung den sogenannten atheromatösen Process darstellt und gewöhnlich bald auf die mittlere und zuweilen auch auf die äussere Arterienhaut übergreift.

Der sogenannte atheromatöse Process bildet eine der häufigsten anatomischen Veränderungen im Gewebe der Arterien. Der Name Atherom bezeichnet eine breiige Umwandlung der Arterienblute. Früher glaubte man bei dieser Umwandlung die fettige Entartung als die wesentliche Veränderung ansehen zu können; derselben sollte eine Auflagerung auf die innere Arterienhaut, welche aus dem vorüberströmenden Blute abgeleitet wurde, vorausgehen, ohne dass dabei eine ursprüngliche Veränderung der Arterienwand erkannt worden wäre (Rokitansky). Jene sogenannte Auflagerung ist aber, nach den Untersuchungen von Virchow, keineswegs als eine solche aufzufassen, sondern als das Resultat einer entzündlichen Hypertrophie (Endarteritis chronica deformans) zu betrachten, analog den Verdickungen des Endocardium und der Herzklappen. Die krankhaften Veränderungen beginnen in den zelligen Elementen, welche wuchern und sich vermehren; auch die Intercellularsubstanz nimmt zu, und so kommt es zu einer beträchtlichen Verdickung (Erhebung) der inneren Arterienhaut, welche durch diesen Process eine grosse Aehnlichkeit mit dem Gewebe der Hornhaut erhält. Namentlich sind in ihr höchst entwickelte Bindegewebskörperchen vorhanden. Ihre Consistenz ist, je nach dem Grade der Tränkung, bald beträchtlicher, bald geringer; bald ist sie gallertig, bald (an anderen Stellen) knorpelhart. Weitere Veränderungen finden in ihr vorzugsweise nach zwei Richtungen Statt: entweder Verknöcherung (Verkalkung), welche vorzugsweise durch Ablagerung von Kalksalzen in den vorhandenen Bindegewebskörperchen vermittelt wird, oder fortschreitende, Anfangs in einzelnen Heerden auftretende Fettmetamorphose mit Erweichung der Zwischensubstanz und nachträglicher Ausscheidung von Cholestearin. Diese letztere Metamorphose ist die längst als

Atherom bekannte Entartung, mit der aber die Verknöcherung nur in so fern zusammenhängt, als beide ein gemeinsames Substrat haben und häufig neben einander vorkommen, nicht aber in der Art, dass die bereits atheromatösen Massen nachträglich von Verknöcherung ergriffen würden.

Die fettige Umwandlung betrifft bald nur die oberflächlichen, dem Blutströme zunächst liegenden Schichten, bald, und zwar häufiger, die tiefen. Im ersteren Falle werden die fettig erweichten Theilchen durch den Blutstrom fortgespült, während die Zwischensubstanz dauernd oder doch für einige Zeit zurückbleibt. Dadurch wird die Arterienhaut rau, sammtartig, selbst zottig, wie angefressen, analog der Usur der Gelenkknorpel, so dass die von Virchow gewählte Bezeichnung „fettige Usur“ für diesen Zustand durchaus passend erscheint. In den tieferen Schichten dagegen sammeln sich die fettig entarteten Elemente zu atheromatösen Herden (Abscessen), indem die noch unversehrt gebliebenen Gewebstheile zwischen den fettig entarteten zunächst gelockert, dann aber zertrümmert werden, so dass sie mit den fettig erweichten Massen ein dem Inhalt der als „Atherome“ bekannten Balggeschwülste ähnlichen und in vieler Beziehung auch analogen Brei darstellen. Sowohl an der Oberfläche als in der Tiefe wachsen die von fettiger Entartung ergriffenen Elemente (Zellen und Faserzellen) noch weiter fort. Dies ist in theoretischer Beziehung von Wichtigkeit, weil es entschieden für den activen Charakter dieses Processes spricht. Von Bedeutung ist es aber auch in Bezug auf die weitere Entwicklung der atheromatösen Herde. Diese vergrößern sich nämlich fast immer stetig, theils durch das eben bezeichnete Wachsthum, theils durch weiteres Uebergreifen der fettigen Entartung, theils endlich dadurch, dass auch die von der Fettmetamorphose noch nicht ergriffenen Elemente in der Nachbarschaft brüchig werden. So kommt es schliesslich zum Durchbruch des atheromatösen Herdes in das Gefässrohr. Sein Inhalt wird durch das Blut sofort ausgespült und weiter geschwemmt, die atheromatöse Höhle füllt sich mit Blut. Eine solche Höhle kann vernarben, wobei dann als Residuen des blutigen Inhalts schwarz pigmentirte Stellen zurückbleiben. Nothwendig findet hierbei Narbenverkürzung Statt und die Arterie wird daher an der erkrankten Stelle enger. Hierbei muss jedoch vorausgesetzt werden, dass die mittlere Arterienhaut noch gesund war, und dem Blute hinreichenden Widerstand entgegengesetzte. Dies ist sehr selten. Meist wird diese Schicht, zumal in grösseren Arterien, bald von der fettigen Degeneration ergriffen. Dann sind zwei Fälle möglich: entweder die innere Arterienhaut ist gesund und vermag den

Blute hinreichenden Widerstand zu leisten, der Durchbruch nach Innen erfolgt nicht, sondern die atheromatöse Masse wird resorbirt und an ihre Stelle tritt eine schrumpfende Narbe; oder die innere Arterienhaut erkrankt auch, und es erfolgt Durchbruch in das Arterienrohr; die äussere Arterienhaut vermag dem andrängenden Blute nicht Widerstand zu leisten und wird von demselben zu einem Sacke von allmählig steigender Grösse, zu einem Aneurysma ausgebuchet.

Die äussere Arterienhaut nimmt an diesem Process insofern Antheil, als sie an den Stellen, wo sich weiter nach Innen Atherom entwickelt hat, gewöhnlich verdickt und verdichtet wird, analog den Resultaten einer chronischen Entzündung des Bindegewebes.

Durch die atheromatöse Entartung der inneren Arterienhaut ist eine der häufigsten Veranlassungen zur Bildung von Gerinnseln, Thrombi, gegeben. Solche entstehen innerhalb des Arteriensystems überall mit grosser Leichtigkeit, wo dem Blutstrome, wenn auch nur durch Rauigkeiten der Wandungen, ein Hinderniss sich entgegenstellt. Aehnlich wie beim Quirlen oder Peitschen des aus der geöffneten Ader fliessenden Blutes, setzen sich Fibringerinnsel an diesen scheinbar unbedeutenden Hindernissen fest. Das Gerinnsel selbst spielt wiederum die Rolle eines fremden Körpers und wächst somit stetig weiter durch Anlagerung neuer Schichten aus dem vorüberrollenden Blute. Besteht der Thrombus nur aus solchen aus dem bewegten Blute abgesetzten Faserstoff, so ist er derb, elastisch, zäh und verschmilzt allmählig mit der Arterienwand, wenn nicht eine ungünstige Bewegung oder weitere Erweichung der letzteren seine Ablösung herbeiführen. Wird dagegen ein Gerinnsel langsam in stagnierendem Blute gebildet, so schliesst das gerinnende Fibrin eine grosse Menge von Blutkörperchen ein und verhält sich daher ähnlich wie der Blutkuchen des durch einen Aderlass entleerten Blutes, d. h. es ist roth gefärbt, weich, feucht und schrumpft allmählig zu einer unverhältnissmässig geringen Masse zusammen. Das Lumen einer Arterie kann durch ein Gerinnsel vollständig ausgefüllt werden. Dabei ist es gleichgültig, ob dasselbe an dieser Stelle selbst entstanden (autochthon) oder von einer anderen Stelle her fortgeschwemmt ist (Embolus). Statt eines Gerinnsels kann aber auch ein abgelöstes Stück atheromatöser Arterienhaut oder ein zusammengeballter Brocken aus einem atheromatösen Herde zum Embolus werden, um welchen dann gleichfalls Fibrinschichten sich ablagern, die schliesslich zur Versperrung des Gefässes führen. Sobald der Blutlauf auf irgend eine Weise ganz gehemmt ist, wächst das Gerinnsel in der beschriebenen Weise bis zu der Stelle aufwärts gegen das Herz, wo der nächste Ast abgeht,

d. h. also so weit, als die Bewegung des Blutes gehemmt ist. Je weiter aufwärts, desto dünner ist der Thrombus, da er hier durch die anprallenden Blutwellen stärker comprimirt wird, indem diese sich zwischen ihm und der Gefässwand noch einen Weg zu bahnen suchen. Das Blut wird nun mit grösserer Kraft und in grösserer Menge in die Seitenäste des verstopften Gefässes oberhalb des Thrombus eingetrieben; durch deren Vermittelung kann es auf Seitenwegen zu dem Theile gelangen, der eigentlich von dem verschlossenen Gefässe mit Blut versorgt werden sollte, — collaterale Gefässe, collateralen Kreislauf. Sind diese Seitengefässe aber nicht hinreichend dehnbar oder in der erkrankten Localität nicht in hinreichend grosser Zahl vorhanden, so kann die Entwicklung des collateralen Kreislaufs ausbleiben, die Ernährung eines gewissen Bezirks somit unterbrochen, d. h. Nekrose desselben bedingt werden (vgl. Bd. I. „Brand“). Da man die Bildung der Gerinnsel früher von Entzündung der Arterien ableitete, so bezeichnete man diese Art des Brandes auch als „Gangraena ex arteritide.“

Von der aus Endarteritis deformans hervorgehenden atheromatösen Entartung ist die einfache Fettmetamorphose zu unterscheiden, welche vorzugsweise an der inneren und mittleren Haut der Arterien häufig vorkommt. Die Anfänge derselben, namentlich im Epithelium der Arterien, sind nur mikroskopisch nachzuweisen; weiterhin, wenn das Epithelium vollständig fettig zerfallen ist, erscheinen die erkrankten Stellen auch dem blossen Auge etwas rauher. Noch häufiger findet sich Fettentartung an den musculösen Elementen der mittleren Haut, sowohl in grösseren als in kleineren Arterien. Dass hierbei durch Aufhebung oder Verminderung der Contractilität und der Widerstandsfähigkeit der erkrankten Arterienwand auch Kreislaufstörungen veranlasst werden müssen, leuchtet ein.

Drittes Capitel.

Pulsadergeschwülste, Aneurysmata.

Pulsadergeschwulst, Schlagadergeschwulst, Aneurysma, nennen wir jede mit der Höhle einer Arterie communicirende, Blut enthaltende Geschwulst, mag sie durch Verwundung der Arterie oder auf Grund einer anderweitigen Erkrankung derselben entstanden sein. Die Aneurysmen schliessen sich daher, obgleich sie selbst immerhin als Neubildungen bezeichnet werden können, in ätiologischer Beziehung einerseits an die Wunden der Arterien, andererseits an die Entartun-

gen der Arterienwände sehr innig war. Welches aber auch die Ursache einer Pulsadergeschwulst sein mag, sie bietet stets eine gewisse Reihe von Erscheinungen dar, bedingt eigenthümliche Störungen und Gefahren und erheischt zu ihrer Heilung, sofern diese überhaupt in das Gebiet der Chirurgie fallen kann, bestimmte operative Eingriffe, welche durch die ätiologischen Verhältnisse nur in geringem Grade modificirt werden. Deshalb ist es gerechtfertigt, wenn man die Pulsadergeschwülste einer gemeinsamen Betrachtung unterwirft, ohne deshalb die speciellere Erörterung der durch Verwundung einer Arterie bedingten bei der Lehre von den Arterienwunden zu übergehen.

Die **allgemeinen Erscheinungen** einer Pulsadergeschwulst sind:

1) Fühlbare und hörbare oder doch hörbare Pulsationen, welche mit denen der benachbarten Arterien synchronisch sind.

2) Die gewöhnlich rundliche oder länglich rundliche Geschwulst ist prall und elastisch, kann durch Druck verkleinert werden (indem das Blut in die Arterie zurückgedrängt wird) und nimmt beim Nachlasse des Druckes sogleich ihren früheren Umfang wieder ein; Compression der betreffenden Arterie an der peripherischen Seite der Geschwulst bedingt ein stärkeres Anschwellen, an der centralen Seite dagegen eine Verkleinerung des Aneurysma.

3) Vermöge der Behinderung des Blutzuflusses, welche die Geschwulst durch Schwächung des Blutstromes und durch Compression der Arterie selbst, mit welcher sie communicirt, ausübt, und vermöge des durch dieselbe bedingten Drucks auf die benachbarten Organe (besonders Nerven und Venen) stört die Pulsadergeschwulst die Function und Ernährung des Theiles, an welchem sie ihren Sitz hat. Schmerzen erregt sie nur, wenn ein Nerv von ihr comprimirt oder Entzündung der umgebenden Theile durch sie veranlasst wird.

4) Mit dem Wachstume des Aneurysma treten einerseits diejenigen Veränderungen hervor, welche jede grosse Geschwulst in ihrem Gefolge hat (Varicosität und Verdünnung der Haut, Oedem der an der peripherischen Seite liegenden Theile, Atrophie und Absorption der Muskeln und Knochen), andererseits aber verändert sich auch die Beschaffenheit der Geschwulst selbst. Die Kraft des Blutstromes reicht nicht hin, um die in ihr, wie in einem Divertikel enthaltene Blutmasse vollständig in Bewegung zu erhalten, und es beginnt daher der dem Stosse des Herzens am Wenigsten ausgesetzte Theil des Blutes (zunächst den Wandungen der Geschwulst) zu stagniren und schichtweise zu gerinnen. Durch diese an den Wandungen sich ablagernden Gerinnsel erhält die Geschwulst dann eine grössere Festigkeit, erscheint weniger elastisch, pulsirt schwächer oder gar nicht

und kann durch Druck gar nicht, oder doch nur wenig verkleinert werden.

5) Hat durch die Zunahme der Geschwulst die Ausdehnung der umliegenden Theile den höchsten Grad erreicht, so werden diese sowohl, als auch das Aneurysma selbst brandig, gewöhnlich an dem hervorragendsten Theile. Nach Ablösung des Brandschorfes durchbricht das Blut die der Wand anhaftenden Coagula, und es entsteht eine lebensgefährliche Blutung. Hierbei wird natürlich vorausgesetzt, dass während des allmähigen Wachsthum's des Aneurysma die umliegenden Theile und zuletzt auch die Haut durch adhäsive Entzündung mit den Wandungen der Geschwulst verschmolzen sind. Platzt ein Aneurysma, bevor diese Verwachsung erfolgt ist, so ergiesst sich das Blut in das umliegende Bindegewebe; das bestehende Aneurysma wird auf solche Weise mit einem Aneur. spur. diffusum (vgl. pag. 76) complicirt.

Eintheilung der Pulsadergeschwülste. — Der natürliche Anschluss der traumatischen Pulsadergeschwülste an die Verwundungen der Arterien hat uns bewogen, sie schon bei der Lehre von den Arterienwunden zu erörtern (pag. 75—86). Für die jetzige Betrachtung bleiben daher nur noch diejenigen übrig, welche nicht durch Verwundung der Arterie hervorgebracht werden; dies negative Merkmal ist das einzige, durch welches die Klasse der sogen. spontanen oder endogenen¹⁾ Pulsadergeschwülste, der Aneurysmen inneren Ursprungs, zusammengehalten wird. Unter ihnen bezeichnet man diejenigen, welche auf einer Ausdehnung sämmtlicher Arterienhäute beruhen, als wahre Aneurysmen (An. verum), und nennt, im Gegensatz zu ihnen, alle diejenigen, bei welchen eine Trennung der Continuität der Arterienhäute Statt findet, falsche (An. spurium). Es leuchtet ein, dass, wenn man dieses Eintheilungsprincip dem ätiologischen voranstellt (wie dies vielfach geschieht), sämmtliche traumatische Aneurysmen in die Kategorie der falschen gehören.

Die Eintheilung der Pulsadergeschwülste in wahre und falsche ist nicht glücklich gewählt, da die sogenannten wahren Aneurysmen so überaus selten sind, dass sie von gewichtigen Autoritäten (vgl. Scarpa, Ueber die Pulsadergeschwülste, aus dem Italienischen von Harless, Zürich 1808) sogar ganz gelegnet werden konnten. Viel zweckmässiger würde es sein, wenn man für die seltenere Form ohne Trennung der Continuität der Arterienhäute, welche man jetzt wahres Aneurysma zu nennen pflegt, den Namen Arterienverweiterung, Arteriectasis, einführen, und unter Aneurysma ausschliesslich das gewöhnliche Aneurysma, bei welchem eine Continuitäts-Trennung in den Arterienhäuten erfolgt ist (nach der älteren Nomenclatur das Aneurysma spurium), verstehen wollte.

¹⁾ Crisp, Von den Krankheiten und Verletzungen der Blutgefässe (Deutsche Uebersetzung). 1859, pag. 118.

A. Das sogenannte wahre Aneurysma (Arterie etasis) bietet in seiner Form mancherlei Verschiedenheiten dar, für welche Breschet¹⁾ vier Typen aufgestellt hat:

1) Die sackförmige Erweiterung (das wahre sackförmige Aneurysma), ein Divertikel am Gefässrohr, von den ausgedehnten Arterienklappen gebildet, über einen mehr oder weniger grossen Theil des Umfangs der Arterie verbreitet, im Allgemeinen nicht von bedeutender Grösse, ausser etwa an der Aorta.

2) Die spindelförmige Erweiterung betrifft den ganzen Umfang der Arterie, so zwar, dass die Geschwulst von dem einen Ende gegen die Mitte hin bedeutend zu und gegen das andere Ende hin wieder abnimmt. Diese Form erreicht eine bedeutendere Grösse, als die vorhergehende, eine geringere, als

3) die cylindrische Erweiterung, welche sich jedoch nur an kleinen oder mittleren Arterien findet.

4) Erweiterung mit gleichzeitiger Verlängerung, Aneurysma cyrsoideum s. spongiosum, arterieller Varix, Varix arteriosus²⁾, vgl. Fig. 7 (nach einem Präparate des Museums der Pariser Facultät). Die erweiterte und zugleich verlängerte Arterie beschreibt Krümmungen und Windungen, wie ein Plexus pampiniformis; ausserdem bestehen einzelne vorzugsweise erweiterte Stellen, Ausbuchtungen, welche einem Varix analog sind. Hierbei sind in der Regel zugleich die Wände der Arterie verdünnt; in seltenen Fällen zeigen sie hingegen eine bedeutende Verdickung. Diese eigenthümliche Form der Erweiterung erstreckt sich gewöhnlich auf mehrere und meist kleinere Aeste, welche unter einander in anastomotischer Verbindung stehen; deshalb wird sie auch als ästiges Aneurysma, Aneurysma s. Angioma arteriosum ra-

Fig. 7.



¹⁾ Mémoires de l'Académie de médecine. Tom. III. pag. 112.

²⁾ Nicht zu verwechseln mit Varix aneurysmaticus, vgl. pag. 80.

emosum, An. anastomosium s. anastomotieum, s. per anastomosin bezeichnet. Vgl. Angioma, Bd. I.

B. Die sogenannten falschen, d. h. die gewöhnlichen Pulsadergeschwülste, werden, auch abgesehen von den traumatischen, in derselben Weise eingetheilt, wie diese. Man unterscheidet also das Aneurysma spurium circumscriptum s. consecutivum und das An. spur. diffusum s. primitivum, je nachdem das Blut sich unter die Gefässscheide ergossen und diese ausgedehnt, oder aber auch diese durchbrochen und die benachbarten Bindegewebsräume erfüllt hat.

Besondere Schwierigkeiten macht die Annahme eines Aneurysma mixtum. Mit diesem Namen belegen nämlich Einige (Hunter) eine Pulsadergeschwulst, welche durch die mittlere und innere Arterienhaut nach vorgängiger Trennung der äusseren, oder auch durch die äussere Arterienhaut allein gebildet werden soll, nachdem die inneren Häute getrennt sind. — Andere ein An. spur. diffusum, welches durch Platzen eines wahren Aneurysma entstanden ist (Monro) — oder endlich solche Fälle, in denen die mittlere Arterienhaut zerstört ist und der aneurysmatische Sack von der äusseren und inneren Arterienhaut gebildet wird (Breschet). Von allen diesen Varietäten (und von allen spontanen Aneurysmen überhaupt) wird am Häufigsten diejenige beobachtet, bei welcher nach Trennung (Zerstörung) der inneren und mittleren Arterienhaut die äussere allein oder in Verbindung mit benachbarten Gewebsschichten den Sack der Pulsadergeschwulst bildet. Man nennt sie, im Gegensatz zu dem umkehrten Falle, auch wohl An. mixtum externum.

Unter dem Namen Aneurysma dissecans wird eine Pulsadergeschwulst beschrieben, bei welcher, nach Trennung der inneren und mittleren Gefässhaut, das Blut zwischen die Schichten der letzteren, so wie auch zwischen sie und die äussere Gefässhaut eindringt. Zuweilen breitet sich das Blut hierbei eine ziemlich weite Strecke zwischen den Gefässhäuten aus und kehrt durch eine zweite Oeffnung in das Gefässrohr zurück, so dass also nicht eine mit letzterem communicirende Höhle, sondern ein Canal innerhalb der Gefässwandungen besteht. So kann z. B. die Eingangsöffnung eines Aneurysma dissecans in der Aorta thoracica, die Ausgangsöffnung, durch welche das Blut in das eigentliche Gefässrohr zurückkehrt, in der Aorta abdominalis sich befinden. — Gewöhnlich wird angegeben, dass Laennec dies *Aneurysme disséquant* zuerst beschrieben habe. Crisp (Von den Krankheiten und Verletzungen der Blutgefässe, deutsche Uebersetzung, pag. 178) bemerkt jedoch, dass schon Morgagni und Allan Burns Fälle der Art erwähnt haben.

Man unterscheidet die Pulsadergeschwülste auch in äussere und innere. Die Grenze soll da sein, wo die Möglichkeit der Unterbindung des erkrankten Gefässes aufhört. Chirurgische Kühnheit hat freilich das Gebiet der Ligatur bis zur Aorta ausgedehnt, — wenn auch erfolglos. Innerhalb lassen sich als äussere Aneurysmen diejenigen bezeichnen, welche am Kopf, am Halse und an den Extremitäten ihren Sitz haben.

Vorkommen. Aetiologie. Die häufigsten unter den der Chirurgie

zufallenden Aneurysmen sind die der Poplitea, der Femoralis, der Carotis, der Subclavia und der Axillaris.

Von 179 Fällen, welche Lisfranc (Thèse de concours, 1834) gesammelt hat, gebildest 59 der Kniekehle an, 26 der Art. femoralis. — Crisp (Krankheiten und Verletzungen der Blutgefässe, pag. 121) giebt über das Vorkommen der Pulsadergeschwülste nachstehende, 551 Fälle umfassende statistische Uebersicht: Aorta thoracica 175, Arteria pulmonalis 2, Aorta abdominalis und deren Zweige 59, Arteria iliaca communis 2, Arteria iliaca externa 9, Arteria glutæa 2, Arteria femoralis 66, Arteria poplitea 137, Arteria tibialis postica 2, Arteria innominata 20, Arteria carotis 25, Arteria carotis cerebialis 7, Arteria temporalis 1, Arteria ophthalmica 1, Arteria subclavia 23, Arteria axillaris 18, Arteria subscapularis 1, Arteria brachialis 1.

Das spontane Aneurysma kann an mehreren Stellen zugleich vorkommen; Pelletan sah an einem einzigen Subjecte deren 63. In jeder Kniekehle eins, oder an demselben Beine eins in der Schenkelbeuge, eins in der Kniekehle sind keine ganz seltenen Vorkommnisse¹⁾.

Man findet weniger Aneurysmen bei Frauen, als bei Männern. Nach Guthrie kämen 20 bis 30 Aneurysmen bei dem männlichen Geschlechte auf 1 Aneurysma bei dem weiblichen. Das Missverhältniss ist besonders gross in Bezug auf die Aneurysmen der Art. poplitea, was für die Meinung spricht, dass Zerrung der Arterie eine der Ursachen sei, welche Aneurysmen veranlassen; denn Frauen setzen sich nicht so starken Anstrengungen aus, wie Männer. Hierin liege ferner ein Beweis gegen die Meinung, dass der Quecksilbergebrauch eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Aneurysmen spiele; denn es giebt wohl fast ebenso viele syphilitische Frauen, als Männer, und bei beiden Geschlechtern wird das Quecksilber gegen diese Krankheit in Anwendung gezogen. Jedoch behauptet Hodgson sehr bestimmt, nach seinen speciellen Beobachtungen stelle sich heraus, dass die Mehrzahl der Fälle von Aneurysmen und von solchen organischen Veränderungen der Arterien, welche mit ihrem Zustande kommen in Causalnexus stehen, an solchen Subjecten vorkommen, welche wegen Syphilis grosse Mengen von Quecksilber genommen hatten. Vidal u. A. konnten Dies nicht bestätigen. — Man findet Aneurysmen (mit Ausnahme der fast immer congenitalen cystoiden) sehr selten vor den Jahren der Pubertät; am Häufigsten sind sie zwischen dem 30sten und 50sten Jahre²⁾. Die Geschwindigkeit der

¹⁾ Vgl. mein Referat über Krankheiten der Gefässe und Nerven in Virchow und Hirsch, Jahresbericht pro 1869 u. f.

²⁾ Crisp (l. c.) fand unter 505 Fällen: unter 10 Jahren 1, zwischen 10 und 20 Jahren 5, zwischen 20 und 30 Jahren 71, zwischen 30 und 40 Jahren 198, zwischen 40 und 50 Jahren 129, zwischen 50 und 60 Jahren 65, zwischen 60 und 70 Jahren 25, zwischen 70 und 80 Jahren 8, zwischen 80 und 90 Jahren 2, zwischen 90 und 100 Jahren keinen.

Arterienwandungen, welche sich in der Jugend und im Allgemeinen vorherrschend beim weiblichen Geschlechte findet, ist der Bildung von Aneurysmen offenbar nicht günstig. — Die herpetische, scrophulöse, scorbutische, rheumatische, gichtische Diathese, auch der Missbrauch spirituöser Getränke werden als begünstigende Momente für die Entstehung von Aneurysmen aufgeführt. Mit mehr Recht sind zu erwähnen: Hypertrophie des linken Ventrikels, die Nähe des Herzens, die Lage einer Arterie in der Nähe eines Gelenkes, so dass sie bei Bewegungen desselben Zerrungen erfährt, starke Krümmungen der Arterien, Missverhältnisse zwischen dem Lumen der Gefässe und der Dicke ihrer Wandungen, endlich oberflächliche Lage der Arterien. Letztere kommt nicht nur deshalb in Betracht, weil die oberflächlichen Arterien der Einwirkung äusserer Einflüsse mehr ausgesetzt, sondern auch weil ihre Wandungen gegen den seitlichen Druck des Blutes weniger unterstützt sind. Wenn die Art. radialis dicht unter der Haut verläuft, statt unter den Abductoren des Daumens herzuziehen, so ist sie oft in dieser Strecke erweitert. Man hat die Art. femoralis, welche durch Hospitalbrand blossgelegt worden war, aneurysmatisch werden sehen, weil die Vertiefung, in der sich die Arterie befand, nach der Vernarbung nicht wieder ausgefüllt war, und das Gefäss somit dicht unter der neu gebildeten Haut lag (B. Bell). Heftige Bewegungen des Körpers, oder auch nur eines Körpertheiles müssen zu den Ursachen der Aneurysmen gerechnet werden. Schon Ribes¹⁾ erzählt von einem Falle, wo ein Aneurysma der Art. poplitea an einem Beine auftrat, welches in Folge einer Verletzung am oberen Theile des Schenkels längere Zeit krumm gehalten werden musste, dann aber mit Gewalt gestreckt wurde. Auch Verstopfungen der Arterien können, indem sie den Druck des Blutes auf die Gefässwand steigern, zur Bildung von Aneurysmen führen, zumal wenn gleichzeitig die Haltbarkeit der Gefässwand an der entsprechenden Stelle vermindert ist²⁾. — Die gewichtigsten Ursachen bleiben aber die Entartungen, von denen im vorhergehenden Capitel die Rede war.

¹⁾ Mémoires et observations d'anatomie et de chirurgie. Paris 1841, Bd. I. pag. 225.

²⁾ Den Nachweis eines solchen Vorganges verdanken wir Ponfick, welcher zeigte, dass durch Embolie kleiner, von den Herzklappen abgelöster Kalkplättchen Aneurysmen entstehen können, indem das bis dahin gesunde Gefäss an der verstopften Stelle durch die scharfen harten Körperchen mechanisch insultirt und allmählig perforirt wird. — Aehnlich verhält es sich mit den von Waldenburg u. A. bei Thieren beobachteten Aneurysmen, welche auf Perforation der Gefässwand durch kleine Parasiten oder auch durch deren Borsten beruhen. Vgl. Berl. kl. Wochenschr. 1873 pag. 481.

Bildung der Aneurysmen. Diese Entartungen betrachten wir als die erste Bedingung für die Entwicklung eines endogenen Aneurysma (d. h. nach dem älteren Sprachgebrauch eines Aneurysma spurium spontaneum). Da jene aber sehr verschiedener Art sind, so entwickelt sich auch das Aneurysma, namentlich im Anfange, auf verschiedene Weise. So giebt es z. B. Fälle, wo die Arterienwandungen brüchig geworden sind, und die am Meisten gespannten, d. h. am Wenigsten dehnbaren, Häute in Folge einer Anstrengung, einer Quetschung, eines Falles zerreißen. Alsdann empfindet der Verletzte sofort einen Schmerz, und das Aneurysma kann in sehr kurzer Zeit sich zu einer bedeutenden Grösse entwickeln. Ein anderes Mal lösen sich die Plättchen, welche das Innere der Arterie bekleiden, allmählig ab, und nach und nach tritt nun eine Verschwärung auf, welche die Gefässwand, zumal an einer durch ihre Lage zur Entstehung eines Aneurysma prädisponirten Stelle, verdünnt, bis endlich das Aneurysma mit dem Schwinden der mittleren Membran in gleichem Schritte sich entwickelt. Viel leichter entwickelt sich die Pulsadergeschwulst, wenn sich eine atheromatöse Masse zwischen den Arterienhäuten gebildet hatte, und diese sich in das Gefässrohr entleert; alsdann tritt das Blut an die Stelle der abgelagerten Masse in die schon vorher gebildete Höhle, welche bald durch die Kraft des Blutstromes vergrössert wird. Die Erweiterung der drei Häute der Arterien kann sich mit einer oder mit mehreren der erwähnten Entartungen compliciren; auf einem wahren Aneurysma kann ein Aneurysma durch Verschwärung sich entwickeln. Welchen Ursprung aber auch die Entwicklung des Aneurysma gehabt haben mag, es kommt schliesslich zur Bildung eines durch die äussere Haut der Arterie gebildeten Sackes, welcher mit dem Gefässrohr communicirt. Das Blut tritt von dem Gefässe aus in diesen Sack, und dort coagulirt und veranlasst es Veränderungen, welche schon oben im Allgemeinen erwähnt, hier aber noch genauer zu erörtern sind.

Das Blut bildet um so leichter ein Coagulum, je unebener die Oberfläche ist, mit der es in Berührung kommt. Die äussere Arterienwand bietet in dem aneurysmatischen Sacke gewöhnlich solche der Erinnerung günstige Verhältnisse dar. Nur bei der einfachen Arterienverengung, dem sogenannten wahren Aneurysma, pflegt die innere Fläche der Arterie glatt zu sein; bei diesem fehlen deshalb auch an der Wand anhaftende Gerinnsel gänzlich.

Das Blut gerinnt zuerst und am Festesten an der Stelle, die von der Oeffnung in der Arterie am Weitesten entfernt ist: man bemerkt eine Art Schichtung der Gerinnsel; die innersten Schichten sind roth und weich, je weiter nach Aussen, desto mehr schwindet in ihnen

der Blutfarbstoff und das sie durchtränkende Serum, so dass die äussersten vollkommen weiss und lederartig erscheinen.

Der Sack verdickt sich allmählig mehr oder weniger, theils durch die eben beschriebene Anlagerung der Gerinnsel, theils durch Verwachsung mit den ihn umgebenden Geweben: Bindegewebe, Aponurosen, Muskeln u. s. w. Was das Aneurysma nicht zerstört, das eignet es sich an. Der Sack kann sich selbst theilweise erweitern und ein neues Aneurysma sich über dem alten bilden, sei es durch Ausstülpung oder durch Verschiebung des Sackes. Gewöhnlich hängt der Sack fest mit den benachbarten Geweben zusammen, welche ausgedehnt, aber zugleich verdichtet sind.

Die Communications-Oeffnung zwischen der Arterie und dem aneurysmatischen Sack ist in der Regel unregelmässig; ihre Ränder sind flottirend und gefranzt, sie liegt in Mitten einer Scheidewand, welche durch die perforirte innere und mittlere Haut gebildet wird. Da das Aneurysma sich oft mehr nach einer Richtung, als nach der anderen hin ausdehnt, so liegt die Oeffnung nicht immer in der Mitte, an den Extremitäten gewöhnlich im oberen Theile der Geschwulst, was sich aus der Richtung des Blutstromes erklärt. Entweder setzt sich die innere Haut allmählig in die den Sack auskleidende Membran fort, oder an der Oeffnung findet eine schroffe Abgrenzung Statt, eine wahre Unterbrechung des Zusammenhanges. Zuweilen ist die Oeffnung sehr gross; alsdann stellt der dem Aneurysma gegenüberliegende Theil der Arterie nur eine seichte Rinne dar. Zuweilen ist der ganze Umfang des Gefässes zerstört, wenigstens in einem Theile seiner Dicke.

Wenn die Gefässwand in ihrem ganzen Umfange durchfressen ist, so wird die Arterie durch eine aneurysmatische Geschwulst unterbrochen, welche zwei Oeffnungen zeigt, die zu den beiden Enden des Gefässes führen.

Veränderungen in den umgebenden Theilen. Sowohl die von der Geschwulst ausgehenden, als auch die oberhalb und unterhalb derselben entspringenden Aeste, endlich auch die Fortsetzung des erkrankten Stammes erleiden Veränderungen. Wenn an der aneurysmatisch erkrankten Stelle ein seitlicher Ast entspringt, so findet man an dem entsprechenden Theile der inneren und mittleren Gefässhaut desselben ebenfalls einen Substanzverlust; dieser seitliche Ast hängt dann nur noch vermittelt der äusseren Gefässhaut an dem Hauptstamme, und entfernt sich also von der Axe des Stammes, von dem er entsprang, nebst jener Membran, welche den aneurysmatischen Sack bildet. Auf diese Weise entsteht also eine Verrückung, eine

wirkliche Ortsveränderung des seitlichen Astes, welche, wenn die Geschwulst beträchtlich ist, 5 bis 8 Centim. betragen kann. Was bei einer Arterie eintritt, kann bei mehreren erfolgen, wenn mehrere aus dem aneurysmatischen Sacke entspringen. Platzt der Sack, so werden diese Arterien von ihrem Stamme ganz getrennt. Die Obliteration dieser verschobenen (wandernden) Aeste erstreckt sich, wenn sie überhaupt eintritt, nicht weit, da sie noch auf Umwegen Blut in hinreichendem Maasse erhalten. Damit aber diese Blutzufuhr sich vollständig entwickeln könne, müssen die Arterien der zweiten Ordnung sich erweitern, eine anastomosirende Kette muss an die Stelle des obliterirten Stammes treten¹⁾. — Jedenfalls verringert sich das Lumen der weiteren Fortsetzung des aneurysmatischen Stammes an der peripherischen Seite des Aneurysma.

Die Venen und Lymphgefäße in der Umgegend eines Aneurysma sind abgeplattet oder obliterirt. Die gesammte Säftebewegung und somit auch die Ernährung des Körpertheils wird hierdurch ebenso sehr, wie durch die Veränderungen an der Arterie selbst, beeinträchtigt. Daher die niedrige Temperatur und die Muskelschwäche des Gliedes, die ödematöse Anschwellung, die variköse Erweiterung der Venen.

Die Nerven sind zuweilen in der Art zusammengedrückt, dass die ehemals dicken Stränge dünnen Bändern gleichen; andere sind atrophisch, einige schwinden ganz. Hieraus erklären sich die Störungen der Motilität und Sensibilität, namentlich auch die ausstrahlenden Schmerzen, die mitunter sehr lebhaft sind.

Die Muskeln, welche das Aneurysma bedecken, sind membranös ausgedehnt, verlieren ihre Farbe, ihre Richtung, ihre Zusammenziehungsfähigkeit; daher Behinderung der Beweglichkeit, und die Nothwendigkeit, gewisse Stellungen und Lagen des Körpers anzunehmen.

Die Knochen schwinden allmählig unter den immer wiederkehrenden Pulsschlägen der stetig wachsenden Geschwulst. Die elastischen Faserknorpel erleiden geringere Veränderungen. So leisten z. B. die Zwischen-Wirbel-Knorpel (-Bänder) den Aneurysmen der Aorta Widerstand, während die Wirbel selbst zerstört werden. Diese sogen. Usur der Knochen erscheint indess nicht immer unter dem Einflusse eines Aneurysma; zuweilen tritt wahre Nekrose ein, seltener eine Verbiegung mit Hypertrophie des Knochens, so z. B. der Clavicula bei einem Aneurysma der Art. subclavia. Die Knochen können auch aus ihrer Lage geschoben werden; man hat Luxationen in Folge der Entwicklung eines Aneurysma zu Stande kommen sehen.

¹⁾ Vgl. A. Bérand, Archives de médecine, Juillet 1830.

Dauer und Ausgänge der Aneurysmen. Die Zeit, welche ein Aneurysma bestehen kann, ist sehr verschieden: in seltenen Fällen 30 Jahre, im Mittel nur etwa 10 Monate.

Während die Geschwulst sich allmählig vergrössert, gehen neue Veränderungen mit ihr vor, welche bald ihre inneren Schichten, bald die äussere Arterienhaut betreffen. Erstere werden einer Seits stetig verdickt, anderer Seits erweicht, abgelöst, fortgespült; letztere giebt dem Drucke des Blutes immer mehr nach, verliert an Widerstandskraft, indem ihre Entartung fortschreitet oder ein neuer entzündlicher Process sich in ihr entwickelt. So entstehen Unebenheiten, Hervortreibungen, Verschiedenheiten in der Consistenz der einzelnen Theile der Geschwulst, und die Pulsationen in ihr können sich dem zufühlenden Finger gänzlich entziehen. Solche Veränderungen zeigen sich oft plötzlich nach einer heftigen Bewegung, in Folge einer Anstrengung, eines Stosses. Wenn der Sack hierbei zerreisst, so dringt das Blut in die umliegenden Gewebe bis unter die äusseren Bedeckungen, und die Geschwulst wird an der hervorragendsten Stelle weich. Wenn das Aneurysma gegen die Haut oder gegen eine Schleimhaut hin fort und fort wächst, so bildet sich schliesslich ein Brandschorf, durch dessen Lösung das Aneurysma geöffnet wird. Mitunter bilden sich auch Abscesse in dem Bindegewebe, welches zwischen der Haut und der Geschwulst liegt; die Haut wird in die Höhe gehoben, der Abscess öffnet sich oder wird aufgeschnitten; reiner oder mit etwas Blut vermischter Eiter tritt aus; ein Theil der Geschwulst sinkt ein, die Oeffnung schliesst sich, und man glaubt vielleicht, dass eine Eiteransammlung den gewöhnlichen Ausgang genommen habe¹⁾. Aber der Abscess füllt sich von Neuem, und oft bricht dann gleichzeitig ein Blutstrom in Schrecken erregender Weise hervor; zuweilen bleibt die Blutung aus, indem Gerinnsel in günstiger Weise die Oeffnung verstopfen. In einzelnen Fällen erlagen die Kranken irgend einer anderen Krankheit, und man staunte, wenn man bei der Section fand, dass ein Aneurysma mit einem Abscesse, der sich wiederholt gefüllt hatte, im Zusammenhange stehe. Solche von einem Abscesse bedeckte Aneurysmen können zu einem verhängnissvollen Irrthume verleiten; der Arzt kann, wenn er nicht genau untersucht, in dem Glauben, nur einen Abscess vor sich zu haben, das Messer in das Aneurysma einstossen.

¹⁾ Dass der Durchbruch eines Aneurysma in eine benachbarte Abscesshöhle nach deren Eröffnung ganz gewöhnlich, sehr selten aber vorher erfolge, hat namentlich J. Paget (Lancet 1869. April 24) hervorgehoben.

Als günstige Ausgänge des Aneurysma können folgende betrachtet werden:

1) Nachdem die Faserstoff-Gerinnel den durch eine seitliche Öffnung im Arterienrohr mit diesem communicirenden Sack gefüllt haben, werden sie gegen die Arterie vorgeschoben; das in dieser noch fließende Blut setzt von Zeit zu Zeit neue Schichten ab, welche sich verdichten; endlich springen die Gerinnel in das Arterienrohr vor und bewirken Obliteration desselben. Der aneurysmatische Sack schrumpft allmählig durch Narbencontraction, so dass nur ein fester Kern übrig bleibt, welcher endlich, wenngleich spät, auch schwindet.

Nach Scarpa giebt es keinen anderen günstigen Ausgang, mit oder ohne Kunst-hülfe. Damit eine Heilung zu Stande kommen könne, bedarf es, nach seiner Ansicht, stets der Obliteration der kranken Arterie. — Hodgson hat jedoch gezeigt, dass selbst an grösseren Arterien Heilung mit Erhaltung der Durchgängigkeit der Arterie möglich ist.

2) Gerinnel haben den seitlich der Arterie anhängenden Sack vollkommen ausgefüllt; das Blut dringt nicht mehr in denselben, bewegt sich aber ungehindert in dem Gefässe, welches auf diese Weise von seinem pathologischen Divertikel befreit ist.

3) Wenn eine Zerstörung der beiden innersten Häute in dem ganzen Umfange der Arterie Statt gefunden hat (spindelförmiges Aneurysma), so vereinigen sich die geschichteten Gerinnel entweder in der Mitte und hemmen den Lauf des Blutes vollständig; oder aber die schichtweise Ablagerung schreitet nicht weiter fort, wenn sie bis zu einer gewissen Entfernung von der Achse der Arterie vorgerückt ist. Im letzteren Falle hat der Sack dann aufgehört zu existiren, an die Stelle desselben ist ein Canal getreten, dessen Wandungen zunächst aus Gerinnel bestehen; die mit dem Blutstrom in Berührung stehende Schicht bedeckt sich mit einer Pseudomembran, welche in die innere Arterienhaut nach Oben und nach Unten übergeht. Es ist jedoch die Frage, ob man dies „Heilung des spindelförmigen Aneurysma“ nennen darf, oder ob es nur eine Entwicklungs-Periode desselben ist.

4) Ein Blutgerinnel löst sich von dem Sack ab, bleibt vor der Öffnung liegen, welche den Sack mit der Arterie verbindet, oder welche zur Fortsetzung der Arterie führt, und unterbricht auf diese Weise den Blutstrom.

5) Das Aneurysma hat eine so beträchtliche Ausdehnung gewonnen, dass es, durch Fascien oder Knochen eingeengt, auf die zuleitende Arterie über der erkrankten Stelle einen hinreichend starken

Druck ausübt, um den Blutstrom zu hemmen und sich selbst dadurch die Blutzufuhr abzuschneiden.

Von dieser Art Heilung sprechen Home, Hunter u. A. Damit sie zu Stande kommen können, müssen muskulöse und fibröse Gebilde die Ausdehnung der Geschwulst in der entgegengesetzten Richtung verhindern und dieselbe in der Richtung gegen das Herz hin zurückdrängen. A. Cooper sah die Carotis in der angegebenen Weise von einem Aneurysma obliterirt. Weitere Fälle s. b. Tiedemann: Verengerung und Schliessung der Pulsadern, 1843, pag. 152 u. folg.

6) Der Brand, welcher in Folge eines Aneurysma entsteht, ist nicht immer ungünstig; oberhalb und unterhalb der Geschwulst kann Obliteration erfolgen, während die Geschwulst selbst abgestossen wird; natürlich nicht ohne grosse Gefahr.

Diagnose. Die Diagnose eines Aneurysma erfordert ganz besondere Sorgfalt. Vgl. „Abscess“, Bd. I.

Ein Aneurysma, dessen Umfang noch klein ist, hat eine abgerundete oder eiförmige Gestalt, ist nachgiebig, leistet aber doch einen gewissen Widerstand und verschwindet durch Druck, um nach Aufhebung desselben sofort wieder zu erscheinen; an allen Stellen desselben sind Pulsationen wahrnehmbar, auch dann noch, wenn man es verschiebt. Die Geschwulst liegt im Verlauf einer Arterie; drückt man oberhalb auf die letztere, so wird die Geschwulst weicher und die Pulsationen hören auf; das Gegentheil findet Statt, wenn man unterhalb einen Druck ausübt. Die pulsirenden Bewegungen, welche man an den Aneurysmen grösserer Arterien beobachtet, sind genau genommen, von zweierlei Art: 1) Erweiterung im Augenblick der Systole der Herzkammer, 2) eine bei Weitem weniger deutliche Zusammenziehung (Verkleinerung der Geschwulst) im Moment der Diastole der Kammer, d. h. der Systole der Arterien. Bei der Auscultation hört man ein Reibegeräusch, bald mehr blasend, bald mehr schabend. Eine aneurysmatische Geschwulst beginnt niemals mit Schmerzen, welche mit denjenigen, die beim Entstehen eines phlegmonösen Abscesses beobachtet werden, Aehnlichkeit hätten; auch bleibt die Haut über der Geschwulst Anfangs ganz normal. Wenn aber ein Aneurysma sich bedeutend entwickelt hat, wenn Schichten von Gerinnseln sich abgelagert haben, wenn der Sack geplatzt ist, und die Geschwulst sich nicht bloß vergrößert, sondern auch eine andere Gestalt angenommen hat, — dann wird die Diagnose dunkel. Es findet nun keine Erweiterung, keine Pulsation mehr Statt, oder sie kann wenigstens mit derjenigen verwechselt werden, welche anderen Geschwülsten, die in der Nähe grosser Arterien liegen, mitgetheilt wird. In manchen Fällen werden die Pulsationen deutlich, wenn man die Geschwulst eine Zeit lang zusammendrückt, oder wenn man

unterhalb derselben die Arterie comprimirt. Zuweilen jedoch bringt die Compression weder oberhalb, noch unterhalb der Pulsadergeschwulst irgend eine Veränderung in ihr hervor, wenn nämlich starke oder bereits bedeutend erweiterte Seitenäste in den aneurysmatischen Sack einmünden, oder wenn seine Wandungen bereits so sehr verdickt sind, dass sie keine Nachgiebigkeit mehr besitzen. Die Pulsationen können an einem Tage deutlich gefühlt werden, den folgenden Tag aber schon verschwunden sein. Veränderungen in der Circulation und in der Lagerung der hin und her schwankenden Geriansel können diese sonderbare Erscheinung veranlassen. In solchen Fällen kann dann die Unterscheidung des Aneurysma von irgend einer anderen Geschwulst höchst schwierig und ohne Berücksichtigung der Anamnese geradezu unmöglich werden. Nicht ganz selten hat man gefässreiche Krebse und Sarcome (sogenannte „Marschwämme“) für Pulsadergeschwülste gehalten und in dieser Idee eine mindestens überflüssige Arterienunterbindung unternommen. Dieser diagnostische Irrthum ist namentlich möglich, wenn die Geschwulst ihren Sitz an einer Stelle hat, wo Aneurysmen vorzukommen pflegen, z. B. in der Kniekehle. Anderer Seits haben berühmte Wundärzte die Amputation ausgeführt, um eine vermeintliche Knochengeschwulst zu beseitigen, die sich nachher als Aneurysma erwies¹⁾. Es ist daher von der grössten Wichtigkeit, sich in Bezug auf solche zweifelhafte Geschwülste niemals bei der localen Untersuchung zu beruhigen, sondern stets die Anamnese und den Verlauf mit grösster Genauigkeit zu berücksichtigen.

Prognose. Ein Aneurysma ist immer eine bedeutende und bedenkliche Krankheit, sein Ausgang in den meisten Fällen²⁾, wenn es sich selbst überlassen wird, wahrscheinlich tödlich, und seine Behandlung meist nicht ohne Gefahr. Je grösser die kranke Arterie ist, je näher sie dem Herzen liegt, desto bedenklicher die Prognose. Das endogene Aneurysma ist gefährlicher, als das traumatische; es handelt sich bei jenem stets um ein tiefer wurzelndes und ausgedehnteres Uebel. Mit Unrecht betrachtete man das Ausbleiben des collateralen Kreislaufs als das wesentliche Moment für die Gefahr des spontanen Aneurysma und meinte deshalb, dass eine längere Dauer desselben die Heilung durch die Kunst begünstige, weil inzwischen die Seitenäste Zeit gehabt hätten, sich zu entwickeln. Aus denselben Verhältnissen konnte man auch deduciren, dass eine bedeutende Ausdehnung des Aneurysma seine Prognose verschlimmere; denn dann sind oft Theile

¹⁾ Vgl. *Crisp*, l. c. pag. 185, 246 u. folg.

²⁾ Als Ausnahmen vgl. *Varix aneurysmaticus*, pag. 80, und *Naturheilung*, pag. 103 u. f.

zerstört, welche manche dieser Anastomosen enthielten, oder in denen letztere wenigstens sich hätten entwickeln können. Viel begründeter ist die Besorgniss, welche jede grosse Pulsadergeschwulst, ganz abgesehen von ihrer Natur, als grosse Geschwulst schlechthin einflössen muss. Ihr Volumen bedingt die Verdrängung und Quetschung der umliegenden Theile, auf welche Atrophie und Lähmung, oft auch brandige Zerstörung folgt.

Viertes Capitel.

Therapie der Arterienwunden und der Aneurysmen. Blutstillungsmittel.

Wir haben hier die chirurgischen Heilmittel zu betrachten, welche bei der Behandlung der Wunden und der Geschwülste der Pulsadern in Anwendung kommen. Da diese sich in gleicher Weise bei der Behandlung einer grossen Anzahl von Krankheiten des Venen- und des Capillar-Systems nützlich erweisen, so darf die Benennung „Blutstillende Mittel, Haemostatica“, welche sie wegen ihrer vorzüglich in die Augen fallenden Wirkung, die Blutung zu hemmen, erhalten haben, hier in der weitesten Bedeutung genommen werden.

Alle Mittel, durch welche bei Blutungen oder bei Pulsadergeschwülsten Heilung erzielt werden kann, bezwecken Nachahmung desjenigen Processes, durch welchen wir auch ohne Kunsthülfe Heilungen der Art erfolgen sehen. Der Strom des Blutes soll entweder gänzlich gehemmt oder doch so geschwächt werden, dass Gerinnsel (in der Wunde oder im Aneurysma) entstehen, durch welche zunächst mechanisch dem weiteren Blutzufluss ein Hinderniss entgegengesetzt wird. Aber erst, wenn eine organische Verbindung zwischen dem Gerinnsel und der Arterienwand, somit Obliteration der Arterie zu Stande gekommen ist, können wir die Heilung als eine definitive bezeichnen; bis dahin ist die Stillung der Blutung oder die Hemmung des Blutzuflusses zum Aneurysma eine provisorische (vgl. pag. 68), da das Gerinnsel durch einen stärkeren Blutstrom wieder abgelöst und fortgespült werden kann.

Der Ort, an welchem wir bei Blutungen und Pulsadergeschwülsten die Gerinnung des Blutes herbeizuführen suchen (die Obliterationsstelle), wird in vielen Fällen durch die Verhältnisse geboten; insbesondere können solche Blutstillungsmittel, welche durch chemische Einwirkung auf das Blut Gerinnung derselben bedingen, gewöhnlich auch nur auf die Wunde selbst angewandt werden; im Allgemeinen

aber haben wir bei arteriellen Blutungen zwischen zwei und bei Pulsadergeschwülsten zwischen drei Punkten zu wählen. Bei ersteren nämlich können wir den Verschluss der Arterie unmittelbar an der Wunde oder aber in mehr oder weniger grosser Entfernung von derselben an der centralen Seite (in der Richtung gegen das Herz hin) bewerkstelligen; bei letzteren kann, ausserdem dass wir den Verschluss des Gefässes an der erkrankten Stelle selbst oder oberhalb derselben herbeizuführen suchen, auch noch die Obliteration des peripherischen Endes (zwischen dem Aneurysma und den Capillargefässen) beabsichtigt werden. Der Verschluss des erkrankten oder verletzten Stücks der Arterie selbst gewährt die grösste Sicherheit. Wird der Verschluss des Gefässes oberhalb der verletzten Stelle vorgenommen, so steht zu befürchten, dass durch Collateraläste das Blut zu jener nach einiger Zeit wieder hinströmen werde und daher Blutung oder Aneurysma sich wieder entwickeln. Diese Behandlungsweise ist daher insbesondere unzulänglich, wenn bedeutende Anastomosen zwischen Aesten, die oberhalb der gewählten Verschlussstelle, und solchen, die zwischen ihr und der kranken Stelle der Arterie oder aus dieser selbst entspringen, vorhanden sind. Der Verschluss der Arterie an der peripherischen Seite des erkrankten Stücks kann nur bei Pulsadergeschwülsten Anwendung finden; arterielle Blutungen würden dadurch niemals gestillt, unter Umständen sogar gesteigert werden. Die Möglichkeit, durch Verschluss einer Arterie an der peripherischen Seite eines Aneurysma, dieses zur Heilung zu bringen, beruht gleichfalls auf der Thatsache, dass das Blut in den lebenden Adern gerinnt, sobald seine Bewegung gehemmt wird. Daher bedingt die Obliteration unterhalb des Aneurysma die Coagulation des Blutes auch in diesem selbst, vorausgesetzt, dass nicht aus der Geschwulst oder der zwischen ihr und der Stelle des Verschlusses liegenden Strecke der Arterie Aeste entspringen, welche dem Blute das Weiterströmen in hinreichendem Grade gestatten und somit die beabsichtigte Unterbrechung seiner Bewegung unausführbar machen. — Auf diese Verhältnisse ist in gleicher Weise Rücksicht zu nehmen, mag das eine oder andere der demnächst zu erläuternden Blutstillungsmittel angewandt werden.

Das einfachste und auch wohl natürlichste Blutstillungsmittel ist der Druck, die Compression, bald auf das blutende Stück der Arterie (die Wunde) selbst, bald auf den zuleitenden Theil des verletzten Gefässes oder auch auf eine ganze Extremität ausgeübt. Die unmittelbarste Compression ist die Unterbindung (Ligatura), d. h. die Zusammenschnürung der Arterie mittelst eines um sie geführten

Fadens. Bei der Compression und der Ligatur wird die Bildung eines Gerinnsels (Thrombus) durch mechanische Behinderung des Blutstroms erreicht. Die Gerinnung des Blutes kann aber auch auf chemischem Wege erzielt werden. Die Arzneimittel, deren wir uns zu diesem Behufe bedienen, heissen im Allgemeinen Styptica. Man verbindet oft mit ihrer Anwendung die Compression, und fügt ihnen, um ihr Festhaften in der Wunde zu begünstigen, Klebstoffe bei. Die Glühhitze und die Electricität (Galvanismus) schliessen sich in ihrer Wirkungsweise an die chemisch wirkenden Styptica an. Bei den meisten Blutstillungsmitteln handelt es sich überdies um eine dynamische oder organische Wirkung auf die contractilen Elemente der Arterie. Je stärker die Ringfasern sich zusammenziehen, je kleiner also das Lumen der Arterie wird, desto geringer muss die Menge des aus ihr ausfliessenden oder durch sie strömenden Blutes sein. Ein Mittel, welches vorzugsweise durch Erregung der Contractilität, d. h. durch Verengerung der Arterien blutstillend wirkt, ist die Kälte, obgleich bei ihrer Wirkung auch die Begünstigung der Blutgerinnung durch Wärmeentziehung in Betracht kommt.

Da Gerinnung des Blutes und Verengerung des Gefässrohres in dem verletzten oder erkrankten Stücke der Arterie die wesentliche Quelle der Heilung bei arteriellen Blutungen sowohl, wie bei Aneurysmen ausmachen, liegt es nahe, auch durch innere (auf den ganzen Organismus wirkende) Mittel die Beförderung der gedachten Vorgänge zu erzielen. Insbesondere hat man diesen Zweck in solchen Fällen eingeschlagen, wo die, jedenfalls wirksamere äusseren Mittel gar nicht oder nur in unzureichender Weise angewandt werden können. Die hier zu erwähnenden Heilmittel wirken entweder, indem sie den Blutstrom verlangsamen (*Folia digitalis purpureae*), oder schwächen (Aderlässe), oder, indem sie die Gerinnbarkeit des Blutes und die Contractilität der Arterienwandungen erhöhen. In solcher Weise sollen wirken: Mineralsäuren, besonders *Acidum sulfuricum dilutum*, adstringirende Pflanzenstoffe, z. B. Kino, Katech Tannin, vorzüglich aber die adstringirenden Eisenpräparate, namentlich *Ferrum sulfuricum* und *Ferrum sesquichloratum*, endlich, vorzugsweise gelobt, wahrscheinlich durch Anregung der Contractilität der Gefässwandungen wirksam, — *Secale cornutum*. Alle die Medicamente wirken langsam; bei irgend bedeutenden arteriellen Blutungen wird daher kaum ein Nutzen von ihnen zu erwarten sein, während sie bei der Behandlung von Aneurysmen sich allerdings hilfreich erweisen können. Besonders ist durch wiederholte Aderlässe bei gleichzeitigem Gebrauch der *Digitalis* und Herabsetzung der

Ernährung durch schmale Kost und Purganzen (Valsalva'sche Methode) die Heilung innerer Aneurysmen zuweilen erzielt worden.

Zum Behuf genauerer Erläuterung wollen wir die chirurgischen Blutstillungsmittel, je nachdem sie überwiegend in der einen oder anderen Weise wirken, in drei Klassen theilen.

I. Blutstillungsmittel, welche mechanisch den Blutstrom hemmen und dadurch die Bildung des Thrombus herbeiführen.

A. Druck, *Compressio*.

Die Compression einer Arterie wird entweder provisorisch angewandt (prophylaktisch vor dem Beginne einer Operation, vgl. Bd. I. pag. 49), oder zum Behuf der definitiven Stillung einer Wunde resp. der Heilung eines Aneurysma: permanente Compression. — Wir unterscheiden die mittelbare und die unmittelbare Compression; bei letzterer wird die Blosslegung der Arterie oder der Pulsadergeschwulst vorausgesetzt, sie fällt daher im Wesentlichen mit der Unterbindung, insbesondere der sogenannten mittelbaren Unterbindung (s. unten) zusammen. Wir haben demnach hier nur von der mittelbaren Compression, bei welcher eine Entblössung der Arterie nicht Statt findet, zu handeln. Dieselbe findet, sofern sie nicht blos provisorisch wirken soll, hauptsächlich bei Pulsadergeschwülsten ihre Anwendung; sie kann 1) auf die Geschwulst selbst, 2) oberhalb, 3) unterhalb derselben, 4) an allen diesen 3 Stellen zugleich angewandt werden.

Um die Geschwulst selbst zu comprimiren, bedient man sich gewöhnlich des Verfahrens von Guattani: das Aneurysma wird mit Charpie bedeckt, über welche man, theils in der Richtung der Arterie, theils auch in Form eines X, Longuetten legt, welche durch eine massig fest von der Peripherie gegen den Rumpf hin angelegte Rollbinde angedrückt werden. Dies Verfahren hat, besonders wenn es durch die Anwendung der Kälte unterstützt wurde, zu glücklichen Resultaten geführt. Andere haben (wie es scheint, nach dem Vorgange des Abbé Bourdelot, welcher sich selbst auf diese Weise heilte) ein modificirtes Bruchband zur Compression des Aneurysma (oder auch der Arterie) benutzt. Sehr oft aber ist zu befürchten, dass durch Druck auf die Geschwulst selbst Brand bedingt oder doch begünstigt werde.

Die Compression des zuleitenden Arterienstammes oberhalb der Geschwulst oder der Wunde — indirecte Compression — wird vor Allem als prophylaktisches Blutstillungsmittel bei grösseren Opera-

tionen benutzt; Blutungen aus kleinen Arterien lassen sich oft durch dieselbe definitiv stillen, und in neuester Zeit hat man auch Aneurysmen durch sie heilen gelernt. Bringt sie auch die Geschwulst nicht immer zum Verschwinden, so kann sie doch ihre weitere Entwicklung aufhalten. Gewöhnlich muss die Compression lange Zeit fortgesetzt werden um Heilung eines Aneurysma zu erzielen. Bis vor Kurzem hat man diese allmählig wirkende Compression des Gefäßstammes sogar für die bei der Behandlung von Aneurysmen allein zulässige erachtet; nicht vollständige Absperrung des Blutzufusses, sondern allmählig gesteigerte Abschwächung desselben sollte erzielt werden, um die Ablagerung von festen Gerinnseln im aneurysmatischen Sacke in immer dickeren Schichten zu bewirken. Dieser chronischen Methode gegenüber hat sich jetzt aber auch die acute Geltung verschafft, welche darauf ausgeht, das Blut in der Geschwulst mit einem Schlage durch vollständige Absperrung des Zuflusses zur Gerinnung zu bringen. Dies wird wesentlich erleichtert, wenn man (wie ich es wiederholt mit bestem Erfolge gethan habe) sowohl unterhalb als oberhalb der Geschwulst die Arterie comprimirt.

Nach den Erfahrungen der Irländischen Aerzte, welche die Compression des zuleitenden Arterienstammes bei der Behandlung von Aneurysmen zuerst allgemeiner angewandt haben, wurden schon bis zum Jahre 1851 von 54 Fällen, welche man in dieser Weise behandelte, 41 geheilt, und kein Todesfall in Folge derselben beobachtet. In allen diesen Fällen wurden zwei Compressoria in geringer Entfernung von einander angelegt, mit welchen abwechselnd comprimirt wurde, so dass der Kranke niemals durch allzu lange fortgesetzten Druck an einer Stelle belästigt worden sein soll. — Vgl. Follin, Du traitement des anévrysmes par la compression. Résumé des travaux de quelques chirurgiens irlandais. Archives génér. de médecine. Novembre 1851. pag. 237. — Seitdem sind Hunderte von Aneurysmen durch Compression des zuleitenden Stammes geheilt worden. Vgl. die Literatur in meinen Referaten über Krankheiten der Gefäße in den neuesten Jahrgängen des Jahresber. v. Virchow u. Hirsch. — Jedoch fehlt es auch nicht an Fällen, in denen die Compression sich unzureichend erwies oder wegen der damit verbundenen Schmerzen nicht ertragen wurde. Der letztere Uebelstand tritt um so mehr hervor, je energischer die Compression angewandt wird, am Meisten daher bei dem Versuch einer acuten Heilung. Für diese wird deshalb fast regelmässig die Betäubung durch Chloroform zu Hilfe genommen oder doch durch Morphinum, Chloralhydrat u. dgl. die Empfindlichkeit abgestumpft. Auf diese Weise ist in manchen Fällen die Heilung binnen wenigen Stunden ohne erhebliche Beschwerden gelungen.

Am Wirksamsten ist die Compression, wenn sie sich auf alle oben genannten Punkte zugleich erstreckt. Dies wird durch den Theden'schen Verband erreicht. Theden liess zunächst nach dem Verlaufe der Arterie Longuetten anlegen, welchen er an denjenigen Stellen, auf welche vorzugsweise Druck ausgeübt werden sollte (z. B. in der Ellenbeuge nach Verletzung der Arteria brachialis bei einem

unglücklichen Aderlass), eine Verstärkung durch Pappstücke, Bleiplatten oder dgl. hinzufügte; alsdann wurde die ganze Extremität von den Fingern oder Zehen an aufwärts gleichmässig fest mit Binden eingewickelt. Eine so ausgedehnte Compression bedingt freilich auch die Gefahren der Behinderung des Blutlaufs im höchsten Grade.

Für die Compression eines Arterienstammes, mag sie als provisorisches, oder als definitives Blutstillungsmittel angewandt werden, gelten folgende allgemeine Bestimmungen:

1) Sie lässt sich nur an solchen Punkten ausführen, wo hinter (oder unter) der Arterie ein hinreichend fester Theil (gemeinhin ein Knochen) sich befindet, welcher als Stützpunkt benutzt werden kann. 2) Das drückende Instrument darf nicht zu schmal (spitz) sein, damit der Druck auf eine etwas grössere Oberfläche vertheilt und dadurch dem Druckbrande an der direct comprimierten Hautstelle vorgebeugt werde. 3) Aus demselben Grunde muss der Grad der Compression genau abgemessen werden; das richtige Maass lässt sich im einzelnen Falle nur durch sorgfältige Versuche finden. 4) Die Compression muss (mit Ausnahme der Fälle, in welchen man sich zur Anwendung der Theden'schen Einwickelungen genöthigt sieht, wo man also nicht blos die Arterien, sondern auch die Venen comprimiren will) so viel als möglich die Collateraläste, die Venen und die Lymphgefässe frei lassen und daher nur auf die Gegend der Arterie einwirken.

Von allen Compressions-Instrumenten sind die Finger nicht blos die natürlichsten, sondern auch die besten. Für die Ausführung der Compression mittelst der Finger gelten folgende Regeln:

1) Man übe den Druck senkrecht gegen die unterliegende Knochenfläche aus. Will man mit dem Daumen comprimiren, so setzt man ihn rechtwinklig gegen die Richtung des Gefässes auf; bedient man sich der übrigen Finger, so setzt man sie neben einander in der Richtung der Arterie auf, während der Daumen an der entgegengesetzten Seite des Gliedes, wo möglich gleichfalls gegen den Knochen aufgesetzt wird. Vgl. Bd. I. pag. 49 u. f. Anfänger sind geneigt, bei der Compression Kraft zu verschwenden; daraus entsteht frühzeitige Ermüdung, Unsicherheit und zuletzt die Unmöglichkeit, die Compression weiter fortzusetzen. Es ist von grosser Wichtigkeit, sich hierin die nöthige Uebung zu verschaffen, wozu sich am eigenen Arme (an der Art. brachialis) Gelegenheit bietet.

2) Sind die comprimirenden Finger ermüdet, was namentlich bei tiefer Lage der Arterie oder Anschwellung der zwischen ihr und der Haut gelegenen Theile (z. B. Lymphdrüsen) leicht vorkommt, so unter-

stützt man sie durch diejenigen der anderen Hand oder durch aufgelegte Gewichte (Schrotbeutel) oder lässt einen Gehülften mit seiner Hand auf die ursprünglich comprimirenden Finger drücken.

Die comprimirenden Finger können durch Bewegungen des Kranken in der Art verschoben werden, dass die Arterie unter ihnen fortgleitet; dasselbe kann sich auch ohne Bewegungen des Kranken ereignen, wenn der Druck nicht vollkommen rechtwinklig, sondern mehr in schräger Richtung das Gefäss gegen den unterliegenden Knochen anpresste. In solchen Fällen nutzt die Verstärkung des Druckes gar nichts; man muss vielmehr die Arterie von Neuem aufsuchen und dann die Compression wieder beginnen.

3) Handelt es sich um die Ausführung einer Operation, so muss der mit der Compression beauftragte Gehülfe eine solche Stellung erhalten, dass er den Operateur in keiner Art hindert, und doch die Ausführung der Operation zu verfolgen im Stande ist, so dass er in jedem Augenblicke, je nach Bedürfniss, den Druck vermindern oder verstärken kann.

So sehr auch die Compression mit den Fingern im Allgemeinen den Vorzug verdient, so kann man sich ihrer doch bei Weitem nicht immer bedienen, weil man nicht überall hinreichend geschickte Gehülften vorfindet, und weil sie überall da, wo es sich um permanente, d. h. Tage und Wochen lang fortzusetzende Compression handelt, schwer anwendbar ist. Daher sind die Compressorien und Tournequets, deren wir Bd. I. pag. 50 u. f. bereits gedacht haben, von grösster Wichtigkeit für die Ausführung der Compression¹⁾. Jedoch hat man in neuester Zeit, nach dem Vorgange von Vanzetti²⁾, auch die dauernde Compression mit den Fingern allein bewirkt und dies Verfahren gerade vorzugsweise als Digital-Compression beschrieben, — auf deren Ausführung die damit zu beauftragenden Gehülften und Wärter, welche sich in gewissen Intervallen ablösen sollen, besonders eingeübt werden müssen³⁾.

¹⁾ Ausser den gewöhnlich für die Instrumental-Compression benutzten Apparaten, welche durch Schraubenwirkung, seltener durch Federkraft wirken, kann man zur dauernden Compression auch Gewichte (bleierne Pelotten) oder Schrotbeutel anwenden, welche man auf die Gegend der zu comprimirenden Arterie auflegt oder besser über derselben an einem Bügel aufhängt. Vgl. P. H. Watson, Edinburgh med. Journ, 1869. Mai.

²⁾ Sul metodo della compressione digitale nella cura degli aneurysmi. Gazz. med. ital., stati Sardi. 1858. No. 30., auch 1857. No. 44.

³⁾ G. Fischer (Prager Vierteljahrschr., 1869) fand unter 138 Fällen von Aneurysma, welche ausschliesslich mit Digitalcompression behandelt waren, 104 günstige Erfolge, in der Mehrzahl sogar nach 6—9stündiger Anwendung radicale Heilung.

Zuweilen kann man eine sehr vollständige Compression durch Anlegung einer Naht, insbesondere der umschlungenen Naht ausüben; auch Serres-fines lassen sich dazu benutzen. Natürlich gilt dies nur für oberflächlich gelegene Arterien.

Eine besondere Art der Compression ist die Tamponade, d. h. das Ausstopfen einer Höhle, aus welcher Blut ausfließt, mit Charpie, oder mittelst eines leer eingeführten und nachher mit Luft oder Wasser gefüllten Darmstückes, einer Kautschukblase u. dgl. m.

Auch das Verstopfen blutender Arterien mittelst Pfröpfen von Wachs oder dgl. gehört hierher. Avicenna lehrte bereits solche Pfröpfe durch Umschnüren eines Fadens um den durch den Pfropf verstopften Theil des Gefäßes sicherer zu befestigen. Dupuytren und Roux haben dies nachgeahmt, um verknöcherte Arterien zu verschliessen. Hiervon ist das Einführen von Stückchen Alaun oder Kupfervitriol wohl zu unterscheiden, da durch diese nicht sowohl mechanischer Verschluss, als vielmehr Gerinnung des Blutes auf chemischem Wege und Erregung einer verschliessenden Arteritis beabsichtigt wurde.

An den meisten grösseren Gelenken der Extremitäten lässt sich durch übermässige Beugung (forcirte Flexion) eine Versperrung der entsprechenden Hauptpulsader bewerkstelligen. Seit längerer Zeit schon war bekannt, dass man durch Beugung des Ellenbogengelenks an sich selbst den Radialpuls zum Verschwinden bringen kann. Dies ist zuerst von Formey nachgewiesen und von Durwell zur praktischen Verwerthung empfohlen worden. Grade an dieser Stelle schien sich die Behinderung des Blutlaufs durch die Arterie auf Compression zurückführen zu lassen. Eine solche muss in der That bei übertriebener Beugung des Vorderarms zwischen dem Muskelfleisch der Volarseite desselben einer und dem Musc. brachialis internus anderer Seite erfolgen. Aber neuere Untersuchungen, welche namentlich durch Adelman praktische Bedeutung gewonnen haben, ergeben unzweifelhaft, dass auch durch übermässige Beugung anderer Gelenke (namentlich des Hand-, Hüft-, Knie- und Fuss-Gelenks) der Blutlauf in den entsprechenden Arterienabschnitten gehemmt wird. Wahrscheinlich beruht dies auf der winkligen Krümmung, vielleicht auch auf der Schlingelung, in welche das Arterienrohr während der Beugung des benachbarten Gelenkes versetzt wird. — Um die Beugung eines Gelenkes auf die Dauer zu erhalten, bedarf es besonderer Verbände, die für den gegebenen Fall leicht zu construiren und von Adelman in sehr zweckmässiger Weise angegeben sind. Das andauernde Verharren in der vollständigen Beugung ist allerdings für den Kranken in hohem Grade lästig; aber diese Methode ist so unschädlich und so wirksam, dass man (soweit sie anwendbar) verpflichtet ist, von ihr sowohl zur

Beherrschung von Blutungen, als auch zur Heilung von Aneurysmen den ausgedehntesten Gebrauch zu machen, bevor man zu eingreifenderen Mitteln seine Zuflucht nimmt.

Eine eingehende Schilderung der „übermässigen Beugung“ mit Abbildungen der Verbände giebt Adelmann im Archiv f. klin. Chirurgie Bd. XI. pag. 349 (1869). Dasselbst findet man auch die speciellen Literaturangaben. Die früheren Mittheilungen Adelmann's s. ebenda, Bd III. pag. 28, Nachträge Bd. XI. pag. 870.

B. Unterbindung. Ligatura¹⁾.

Die Unterbindung besteht in der Zusammenschnürung einer Arterie mittelst eines um sie geschlungenen Fadens.

Wir unterscheiden I. die Unterbindung blutender Gefäss-Enden und II. die Unterbindung in der Continuität einer Arterie. Letztere wird, da sie am Häufigsten zum Behuf der Heilung von Aneurysmen in Anwendung kommt, auch wohl Operation der Pulsadergeschwulst, Operatio Aneurysmatis, genannt.

I. Von der Unterbindung blutender Gefäss-Enden.

Dieselbe setzt das Bestehen einer Wunde voraus. Das verletzte Gefäss ist aber nicht immer sogleich sichtbar; es hat aufgehört zu spritzen, hat sich tief zurückgezogen, wird durch Blutgerinnsel ver-

Fig. 8. Fig. 9.



deckt. Um es aufzufinden, reinigt man vor Allem die Wunde und sucht dann an derjenigen Stelle, an welcher man, durch anatomische Kenntnisse geleitet, die Arterie zu vermuthen hat, ihr klaffendes Lumen zu entdecken. Hat man eine provisorische Compression angewandt, so wird diese Behufs der Auffindung kleinerer Aeste zeitweise aufgehoben, um das Blut aus ihnen hervorspritzen zu lassen. Ist ein Arterienast quer getrennt, so sieht man nach Beseitigung der Compression an der Stelle des gegen das Herz hin gelegenen Endes ein rothes Höckerchen sich erheben (gebildet durch das in der unmittelbaren Umgegend des Arterien-Endes festhaftende Blutgerinnsel); dies bewegt sich pulsirend, bis es endlich durchbrochen

¹⁾ Ambroise Paré (1517—1519) wird mit Recht als Erfinder der Unterbindung genannt, da sie, obwohl im Alterthum (z. B. von Archigenes) angewandt, im Mittelalter ganz vergessen war.

wird und der Strahl des arteriellen Blutes hervorspritzt. Ist eine Arterie bloß angeschnitten, so pflegt die Blutung sogleich wieder zu beginnen, wenn die Wunde gereinigt und die Compression beseitigt ist.

Sobald das blutende Gefäß erkannt ist, fasst man es mit einer gewöhnlichen Pincette, einer Arterien-, Schieber- oder Torsions-Pincette (Fig. 8), oder aber mit einem scharfen, sogen. Bromfield'schen Haken (Tenaculum, Fig. 9) und zieht es hervor.

Die sogenannten Arterienpincetten unterscheiden sich von den gewöhnlichen dadurch, dass sie durch eine besondere Vorrichtung geschlossen gehalten werden können. Dies wird entweder durch einen in schmalen Fenstern der Branchen verlaufenden Querbalken (Schieber) bewirkt (wie dies bei der Schmucker'schen Pincette der Fall ist), oder durch einen an der einen Branche befestigten, zwischen den beiden Branchen auf und ab zu schiebenden Stift, welcher beim Vorschieben gegen die Spitze der Pincette in einen Ring der anderen Branche eingreift (Fricke'sche Pincette, Fig. 8); oder der an der einen Branche angebrachte Ring ragt beim Schliessen der Pincette durch eine Oeffnung der anderen Branche hervor und der Verschluss erfolgt durch das Verschieben eines auf der Aussenfläche der zweiten Branche angebrachten Stiftes (Riegels), wie dies bei der Amussat'schen Torsionspincette der Fall ist; oder eine an der inneren Seite der einen Branche befestigte Feder greift beim Schliessen der Pincette in ein Fenster der anderen Branche mit einem Knöpfchen in der Art ein, dass die Pincette dadurch geschlossen bleibt, bis man das Knöpfchen zurückdrückt (Graefe'sche Pincette); oder endlich die Branchen der Pincette sind, nach der sinnreichen Erfindung von Charrière, gekreuzt, so dass die Pincette im Zustande der Ruhe geschlossen ist und durch Druck geöffnet wird. Die complicirten Instrumente dieser Art übergehen wir, da sie weder nützlich sind, noch ohne eigene Anschauung oder sehr gute Abbildungen hinreichend verständlich gemacht werden können. Von den genannten Pincetten sind die von Fricke, Amussat, Graefe und Charrière angegebenen die brauchbarsten, besonders die *ersten*, welche vielfach auch aus Neusilber gearbeitet werden, um das Verrosten zu verhüten. Die Charrière'sche Pincette verlangt eine besondere Uebung, weil ihre Branchen im Moment des Fassens der Arterien nicht, wie bei allen anderen Pincetten, zusammengedrückt, sondern der Federkraft überlassen werden müssen, — eine Uebung, die übrigens leicht zu erlangen ist. Von besonderem Nutzen sind Arterienpincetten in solchen Fällen, wo es sich darum handelt, viele blutende Gefässe sehr schnell zu verschliessen, oder wo kein gewandter Gehülfe zu haben ist. In letzterem Falle kann der Operateur, nachdem er die Arterie gefasst hat, die geschlossene Pincette ruhig auch einem Ungeübten übergeben und die Unterbindung selbst verrichten, oder die Pincette mit den Zähnen fassen und ganz ohne Gehülfe unterbinden, zu welchem Ende an manchen Arterienpincetten ein mit Querrinnen versehener knöcherner Griff angebracht ist. Nicht selten kann man die Unterbindung ausführen, indem man die an die Arterie angelegte Schieberpincette herabhängen und durch ihre Schwere das Gefäss etwas hervorziehen lässt. — Wenn Vidal als Surrogat der Arterienpincetten seine *Serris-fines* empfiehlt, so zeigt dies, dass für dieselben die Charrière'sche Pincette in der That als Vorbild gedient hat; es sind kleine Hakenpincetten mit gekreuzten Branchen.

Um zu bewirken, dass der Ligaturfaden leichter von der Unterbindungspincette ab und auf das gefasste Arterienstück hinübergleite, hat man besondere Vorrichtungen

an der Pincette angebracht. Lüer machte die Enden der Pincettenarme stark konisch (*pince à ligature profonde*); Mathieu brachte einen konischen Aufsatz an, welcher vorgeschoben wird, nachdem die Arterie gefasst ist: Liston, Roser, v. Bruns u. A. liessen die Pincettenarme gegen das Ende bogenförmig gestalten und mit einander greifenden Zähnen versehen. — Fasst man das blutende Gefäss (oder die blutende Stelle) von verschiedenen Seiten mit zwei Pincetten, welche man demnächst unter einem möglichst grossen Winkel (wo möglich von 180°) gegen einander halten lässt, so gelingt meist die Unterbindung auch tief liegender Gefässe leicht und sicher.

Ob zum Fassen der Arterie die Pincette oder der Haken den Vorzug verdiene, dürfte schwer zu entscheiden sein, da individuelle Übung den Ausschlag giebt. Im Allgemeinen ist jedoch dem Anfänger der Gebrauch der Pincette, mit deren Handhabung er schon von der Anatomie her vertraut ist, zu empfehlen und die Anwendung des Hakens nur für diejenigen Fälle anzurathen, wo es sich um kleine Arterien handelt und wo das Gefäss sich nicht vollkommen isoliren lässt. Die mannigfaltigen Complicationen des Arterienhakens mit Schiebern, federnden Fadenträgern u. dgl.¹⁾ erweisen sich in praxi viel mehr hinderlich, als nützlich. Auch hier ist in der That das einfachste Instrument das beste.

Am Sichersten fasst man mit der Pincette das ganze Gefässrohr, so dass es zwischen den Zähnen derselben plattgedrückt wird. Desault gab den Rath, nur einen Theil der Arterie zu fassen, in der Art, dass die eine Branche in das Lumen eingeführt, und mit der einen Spitze also die innere, mit der anderen die äussere Arterienhaut ergriffen wird. Letzteres Verfahren lässt sich blos bei grösseren Arterien anwenden und ist im Allgemeinen schwieriger und weniger sicher. Mit dem Haken sucht man immer das Gefäss quer zu durchbohren: zuweilen gelingt es aber auch, die Arterie mit demselben hinreichend hervorzuziehen, wenn sie auch nur auf der einen Seite durchbohrt worden ist, nach Art des Desault'schen Verfahrens mit der Pincette.

Sobald das Gefäss hervorgezogen ist, führt ein Gehülfe (oder auch der Wundarzt selbst, wenn er seine Hände nicht zum Hervorziehen der Arterie braucht) einen Faden um das Gefäss und schnürt diesen mit einem einfachen Knoten um dasselbe zusammen. Hierbei darf die Pincette (oder das Tenaculum) nicht mit eingeschnürt werden, die Unterbindung wäre sonst ganz unwirksam, da mit dem Abnehmen der Pincette auch der Faden wieder abgestreift werden würde.

¹⁾ Besonders hat man durch verschiebbare Spitzendecker, welche den Haken, nachdem er durch die Arterie hindurchgeführt ist, in einen Ring verwandeln, theils das Abgleiten desselben zu verhüten, theils aber das Anlegen des Unterbindungsfadens zu erleichtern gesucht. — Tenacula von Textor, Weinhold u. A.

Um diesen wichtigen Act gut auszuführen, fasst man die Enden des Unterbindungsfadens jeden mit einer Hand, so dass sie durch die letzten drei, gegen die Hohlhand angedrückten Finger und durch den gegen den Radialrand des ausgestreckten Zeigefingers angelegten Daumen festgehalten werden. Mit der Volarseite der Spitze der Zeigefinger, welche hierbei ihre Dorsalflächen einander zukehren, übt man nun in der Nähe des zu schnürenden Knotens einen Druck auf die beiden Faden-Enden aus, indem man die Spitzen der Zeigefinger zugleich von einander entfernt. Ist auf diese Weise der erste Knoten gemacht, so lässt man die Faden-Enden los, um einen zweiten zu schlingen und in derselben Weise, wie den ersten, zuzuschnüren. Alsdann wird die Arterie losgelassen und die etwa noch bestehende Compression aufgehoben, um sich zu überzeugen, ob die Unterbindung auch vollkommen ihren Zweck erfüllt. Endlich schneidet man, wenn man sich gewöhnlicher Seidenfäden bedient hat, das eine Faden-Ende in der Nähe des Knotens ab und führt das andere beim Verbinde auf dem nächsten Wege aus der Wunde heraus, um es in einiger Entfernung auf der Haut mittelst Heftpflaster-Streifen oder Collodium zu befestigen, wobei eine Anspannung desselben, mit Rücksicht auf die voraussichtlich eintretende Anschwellung der Wundränder, sorgfältig zu vermeiden ist. An diesem Faden-Ende wird nach erfolgter Verschwärung des durch den Knoten zusammengeschnürten Gefässringes die ganze, alsdann lose liegende Ligatur leicht und sicher aus der Wunde entfernt. Gewalt darf hierbei niemals angewandt werden, wohl aber kann man, sobald der Termin, zu welchem man, je nach der Dicke des Gefässes, die Lösung erwarten kann, vorüber ist, durch Drehen des Fadens dieselbe befördern und seine Einsperrung in Granulationshaufen verhüten (Roser).

In der Absicht, die durch die Anwesenheit der gewöhnlichen Ligaturfäden bedingte Eiterung zu vermeiden, hat man sehr dünne Seidenfäden angewandt und beide Faden-Enden dicht am Knoten kurz abgeschnitten¹⁾, danach auch allerdings zuweilen die Hoffnung, dass die kleinen Knötchen eingekapselt werden und ohne Störung des Heilungsprocesses der Wunde in ihrer Tiefe zurückbleiben möchten, in Erfüllung gehen, oft aber langwierige Eiterung folgen sehen. Aehnlich ist es neuerdings mit den von Amerika her lebhaft empfohlenen Draht-Ligaturen gegangen. Man suchte ferner solche animalische Substanzen zu Ligaturfäden zu benutzen, deren allmähliche

¹⁾ Lawrence. Vgl. Seiler's Sammlung einiger Abhandlungen von Scarpa, Vacca, Betlinghieri etc.

Auflösung und Resorption in der Wunde erwartet werden durfte, insbesondere dünne Darmsaiten¹⁾. Abgesehen aber von der Schwierigkeit, diese zu handhaben, hat die Erfahrung ihren Nutzen in keiner Weise bestätigt²⁾, und man war schliesslich zu den gewöhnlichen runden Seidenfäden fast allgemein zurückgekehrt, bis J. Lister³⁾ wirklich resorbirbare Darmsaiten durch Tränkung mit einer ölig-wässrigen Karbolsäure-Lösung darstellen lehrte. Diese „carbolisirten Darmsaiten“ heilen in der That vollständig ein, ohne eine Continuitätstrennung im Gefäss und ohne Eiterung zu erregen.

Die carbolisirten Darmsaiten (*carboliced catgut*) sind ein wesentliches Requisite der antiseptischen Methode. Nur die Torsion (s. unter D.) würde in gleicher Weise der Anforderung entsprechen, dass keine der Fäulniss fähigen oder gar Fäulniss erregenden Substanzen in die Wunde gelangen dürfen. — Die Bereitung der carbolisirten Darmsaiten ist nicht schwierig. Gewöhnliche Darmsaiten von verschiedener Dicke, meist jedoch dünner als die sonst gebräuchlichen Ligaturfäden, werden mindestens 2 Monate lang in eine Mischung von ölig und wässriger Carbolsäurelösung gelegt. Die wässrige Lösung enthält 10, die ölige 20 Procent Carbolsäure; erstere befindet sich nur in geringer Menge auf dem Boden des Gefässes. Durch Einlegen von Glasstückchen oder Steinchen ist zu verhüten, dass die Darmsaiten nicht in die wässrige Lösung eintauchen, deren Anwesenheit aber durchaus erforderlich ist, um gute Darmsaiten zu erhalten. Durch den längeren Aufenthalt in dieser Lösung verändert die Darmsaiten vollständig ihre Beschaffenheit. Anfangs quillt sie auf und wird weich, weiterhin aber erlangt sie bei grosser Biegsamkeit und Transparenz eine grosse Derbheit und Festigkeit, so dass selbst die feinsten Nummern schwer zu zerreißen sind. Wenn sie nach 2—3 Monaten aus der Carbolsäurelösung entfernt sind, so kann man sie wie gewöhnliche Fäden aufbewahren. — Dass diese carbolisirten Darmsaiten wirklich resorbirt werden, zeigt sich sehr deutlich, wenn man sie als Nahtfäden verwendet; in wenigen Tagen wird nämlich derjenige Theil des Fadens, welcher in oder unter der Haut steckt, vollständig aufgesogen, so dass man den auf der Haut liegenden Theil ohne Durchschneidung abheben kann. Carbolisirte Darmsaiten widerstehen der Fäulniss. Schnürt man ein Kautschukrohr mit einer solchen Darmsaiten fest zusammen und legt diese in eine faulende Flüssigkeit, so findet man selbst nach vielen Wochen die Zusammenschnürung noch unverändert. Wenn daher auch in der Wunde Eiterung oder gar Fäulniss entstehen sollte, so ist doch kein Bedenken in Betreff der Sicherheit der Blutstillung. Eben so wenig ist irgend ein anderer übler Zufall vom dem Zurückbleiben dieser Fäden zu erwarten, deren allgemeinen Gebrauch ich nach Hunderten von Erfahrungen nur empfehlen kann.

¹⁾ Asthley Cooper empfahl zu Unterbindungsfäden zuerst „*catgut*“, d. h. Darmsaiten, von Blasius (Handbuch der Akiurgie, 2 Aufl. Bd. I. pag. 220) allzu wörtlich mit „Katzendarm“ übersetzt.

²⁾ Vgl. die Bemerkungen von Gross, in London medical repository, Bd. VII. pag. 363, und die Vorlesungen von A. Cooper selbst.

³⁾ Vgl. J. Lister, on the antiseptic system, Brit. med. journ. 1869. April. — Bickersteth antiseptic treatment of wounds and „carbolic catgut-ligature“ Lancet, Mai, Juni und July, 1869. — J. Lister, Adress in surgery etc., Brit. med. journ. 1871. Aug.

2. Von der Unterbindung in der Continuität der Arterien.

Um eine Pulsader an einer bestimmten Stelle ihres Verlaufes (in ihrer Continuität) unterbinden zu können, müssen wir sie zuerst aufsuchen (Blosslegung der Arterie, Arteriozetesis), isoliren und einen Faden um sie herumführen, durch dessen Zusammenschnürung der mechanische Verschluss der Arterie bedingt wird. Die Technik der Arteriozetesis ist der schwierigste Theil der „Unterbindung.“ Um eine Arterie aufzusuchen, muss man keineswegs immer gerade auf sie losgehen, sondern sich an bestimmte, leicht zu erkennende Punkte, gemeinhin Knochenvorsprünge oder Muskelränder, halten, welche als Wegweiser dienen, durch die man zur Arterie geleitet wird. Man kann in dieser Beziehung für alle Arterien-Unterbindungen einen Ausgangspunkt und einen End- oder Zielpunkt unterscheiden; so z. B. für die Unterbindung der Art. subclavia das Schlüsselbein und den äusseren Rand des Kopfnickers als Ausgangs-, das Höckerchen der ersten Rippe als Endpunkt. Fast alle grösseren Arterien verlaufen in der Art, dass sie von einem Muskel begleitet werden, der sie mit einem seiner Ränder bedeckt. So deckt der Kopfnicker die Carotis, der Biceps die Art. brachialis, der Sartorius die Schenkelpulsader. In anderen Fällen leiten tiefer gelegene Muskeln zu der Arterie, so z. B. der äussere Rand des Scalenus anticus zur Subclavia. Auch Sehnen und Aponeurosen, zuweilen selbst Nerven haben als Wegweiser auf dem Wege zur Arterie ihre Bedeutung, so z. B. der Nervus medianus bei der Aufsuchung der Art. brachialis. Endlich ist auch das Pulsiren der Arterie von Bedeutung; aber die Pulsationen sind oft sehr schwach, zuweilen gar nicht wahrzunehmen; man täuscht sich auch, indem man die von der Arterie den benachbarten Organen mitgetheilten Bewegungen für Pulsationen der Arterie selbst hält. Jedenfalls muss man vor dem Beginne einer Unterbindung den Puls an der zu unterbindenden Arterie, in Bezug auf etwa bestehende Varietäten, genau untersuchen. Findet sich eine Varietät, so werden dadurch alle oder doch die meisten der auf die normalen Verhältnisse berechneten Vorschriften unzulänglich. Alle Arterien, um deren Unterbindung in der Continuität es sich handeln kann, liegen in der Tiefe dreieckiger Räume, deren Grenzen durch leicht erkennbare, vorspringende Linien (bald Knochen-, bald Muskelränder) gebildet werden. Man nehme zum Ausgangspunkt wo möglich eine der deutlich wahrzunehmenden Grenzen. Sollten diese (z. B. bei sehr schwacher Muskulatur) nicht gehörig hervorspringen, so sucht man dies durch Lageveränderungen zu bewirken. Gelingt auch dies nicht, so kann man den Verlauf eines Muskels bezeichnen, wenn man von

seinem Ursprungspunkte zu seiner Insertion (beide gemeinhin leicht zu erkennende Stellen an Knochen) eine gerade Linie zieht, von welcher aus dann die Operation begonnen wird. Gibt es verschiedene Wege, um zu einer Arterie zu gelangen, so wähle man denjenigen, auf welchem die Entblössung anderer wichtiger Theile vermieden wird.

Zu durchschneiden sind auf dem Wege zur Arterie: die äussere Haut und eine oder mehrere Fascien, selten Muskeln; diese werden vielmehr, indem man das sie verbindende Bindegewebe zerschneidet oder zerreisst, mittelst stumpfer Haken von einander gezogen.

Der Hautschnitt wird im Allgemeinen in der Richtung der zu unterbindenden Arterie gemacht. Alle tieferen Schnitte müssen wo möglich in derselben Richtung geschehen, weil sonst die Bewegung der Instrumente in der Tiefe der Wunde während der Operation und der Ausfluss des Wundsecrets nach der Operation gehindert wird. Die Durchschneidung der Haut erfolgt entweder aus freier Hand, nachdem der zu durchschneidende Theil gehörig gespannt ist, oder unter Erhebung einer Hautfalte. Vgl. Bd. I. pag. 77 u. f.

Manche setzen nach dem Verlaufe der Arterie die Fingerspitzen der linken Hand in einer Linie neben einander auf und machen den Einschnitt, indem sie das Messer vor den Nägeln derselben, wie an einem Lineale, vorüberführen. Dies Verfahren ist zu verwerfen, weil die Spannung der Haut dabei nicht in regelmässiger Weise erfolgt, und weil man Gefahr läuft, die unter der Haut liegenden Theile, vielleicht gar die Arterie selbst, wenn sie oberflächlich verläuft, zu verletzen.

Die Länge des Hautschnitts muss von der Art sein, dass man bequem zur Arterie gelangen kann, daher um so grösser, je tiefer die Arterie liegt, *ceteris paribus* je dicker das Fettpolster ist. Die Ränder der auf solche Weise gemachten Hautwunde werden von den Gehilfen mit den Fingern oder den vorsichtig einzusetzenden Wundhaken¹⁾ aus einander gehalten. Der Operateur sucht nun den als Wegweiser zur Arterie dienenden oder sie bedeckenden Muskelrand auf und entblösst denselben in der ganzen Ausdehnung der Hautwunde, indem er die ihn bedeckenden Fascien und Bindegewebs-Schichten in der Richtung seiner Fasern theils spaltet, theils ganz hinwegnimmt. Zu diesem Behufe wird mit der Pincette zuerst ein kleiner Kegel der zu entfernenden Gewebe gefasst und emporgehoben, mit dem flach geführten Messer abgetragen und durch diese Oeffnung die Hohlsonde eingeführt, auf welcher die Spaltung mit einem in

¹⁾ Wundhaken sind stumpfe, rechtwinklig gebogene Haken, gewöhnlich mit hölzernen Stielen. Sie werden nach ihrem angeblichen Erfinder auch Arnaud'sche und, weil Rust die ursprünglich bogenförmige Krümmung in die rechtwinklige verwandelte, auch Arnaud-Rust'sche Haken genannt. Breite Wundhaken, ähnlich den Augenlidhaltern sind, zumal in tiefen Wunden, besonders vortheilhaft.

vierter Position gehaltenen geraden Bistouri vollkommen sicher ausgeführt werden kann. Hat man einen geübten Gehülften, so erhebt man die zu durchschneidenden Gewebe mit zwei Pincetten, deren eine dann der Gehülfe zu halten hat, und schneidet zwischen diesen. Je tiefer man dringt, desto vorsichtiger führe man das Messer, desto sorgfältiger reinige man die Wunde von Blutgerinnseln und stille jede irgend erhebliche Blutung, bevor man weiter geht. Die entblösten oder vermöge der Durchschneidung der Bindegewebs-Schichten von einander getrennten Muskelränder werden mittelst der Wundhaken von den Gehülften auseinander gehalten und so das weitere Vordringen zur Arterie erleichtert oder überhaupt möglich gemacht. Ist man bis zu der gemeinsamen Gefäss-Scheide, durch welche die Arterie mit den sie begleitenden Venen (oft auch Nerven) verbunden wird, gelangt, so erhebt man von dieser mit der Pincette eine kleine Falte, indem man die Branchen der Pincette in der Richtung des Verlaufs der Arterie gegeneinander wirken lässt, weil auf diese Weise das Mitfassen der in der gemeinsamen Gefäss-Scheide liegenden wichtigen Gebilde am Sichersten vermieden wird. Diese Falte wird mit dem flach geführten Messer abgetragen, in diese Oeffnung die Hohlsonde eingeführt und auf ihr ein wenig dilatirt. Oder man erhebt die Falte mit zwei Pincetten und durchschneidet sie zwischen beiden mit dem gerade gegen die Arterie gerichteten Messer, nachdem man die eine Pincette dem Gehülften übergeben hat. Die Oeffnung in der Arterien-Scheide darf nicht grösser sein, als zur Umföhrung des Fadens erforderlich ist, weil durch ausgedehntere Entblössung die zur Ernährung der Arterie nöthige Blutzufuhr beeinträchtigt und somit zum Brande und zu nachträglicher Blutung Veranlassung gegeben werden könnte. Indem man den einen Rand der in der Gefäss-Scheide gemachten spaltförmigen Oeffnung mit der Pincette fasst und mit der Hohlsonde oder der Unterbindungs-Nadel (s. unten) von der Arterie abstreift, schiebt man das Instrument dicht an der Arterie weiter, bis man dasselbe endlich ganz unter der Arterie hindurch zur entgegengesetzten Seite führen kann. Am Besten schiebt man das Instrument von derjenigen Seite ein, auf welcher die begleitende Vene gelegen ist. Liegt auf der einen Seite eine Vene, auf der anderen ein Nerv, so muss von der Seite der Vene her eingedrungen werden; ist die Arterie von zwei Venen begleitet, so führt man das Instrument von der Seite der bedeutenderen oder ihr inniger anliegenden Vene ein. Diese sehr zu beherzigenden Rücksichten auf die Venen sind nicht blos in der leichten Zerreibbarkeit ihrer Wandungen, son-

dem auch in dem Umstande begründet, dass selbst auf geringfügige Quetschungen der Venen leicht Thrombose in ihnen folgt.

Zuweilen gelingt es, die Hohlsonde mit einem Zuge (oder vielmehr: Stoss) von der einen Seite der Arterie zur anderen unter ihr hindurchzuführen. Ein solches Verfahren mag der Operation am Cadaver einen gewissen Glanz verleihen; am Lebenden ist es zu verwerfen, weil es sowohl die benachbarten Theile, als auch die Arterie selbst gefährdet. Es ist vielmehr gerade bei diesem Acte die grösste Bedächtigkeit zu empfehlen.

Fig. 10.



Ist die Arterie auf solche Weise isolirt, so handelt es sich endlich darum, den Unterbindungsfaden um sie herumzuführen. Zu diesem Behufe sind zahlreiche Instrumente erfunden worden, die man im Allgemeinen als Unterbindungs- oder Aneurysma-Nadeln¹⁾ bezeichnet. Ihr Typus ist eine gewöhnliche Oehrsonde, deren nicht durchlöcheretes Ende in einem hölzernen Stiele befestigt ist (Fig. 10). Sie haben also mit den gewöhnlichen chirurgischen Nähnadeln nichts gemein, es sei denn, dass man sich diese mit ihrer Spitze in einen hölzernen Stiel eingesenkt vorstellt²⁾. Von den gestielten Nadeln, wie man sie zum Durchführen von Ligaturen durch Geschwülste (vgl. Bd. I. pag. 92) benutzt,

¹⁾ Die Aneurysma-Nadeln sind entweder gestielt oder ungestielt, haben bald ein, bald zwei Oehre, bald eine starke, bald eine schwache Krümmung. Die älteren (von Knauer und Leber) sind an der Spitze scharf, alle neueren stumpf, wie die von Heister, Zang und Deschamps, von welchen letztere nach der Seite gekrümmt ist. Für tief liegende Arterien sind complicirte Instrumente erfunden worden, jedoch höchst selten angewandt worden. Die bekanntesten unter ihnen sind die von Desault und von C. J. M. Langenbeck, deren Mechanismus wesentlich mit einander übereinstimmt. Aus einem gekrümmten, abgeplatteten Röhrchen lässt sich nämlich mittelst eines Schiebers eine elastische Oehrsonde oder eine Uhrfeder hervorstossen, an welcher der Faden befestigt und durch den zurückziehen unter der Arterie hindurchgeführt wird. Natürlich muss vorher ein gekrümmtes Röhrchen, wie jede andere Aneurysma-Nadel, unter die Arterie gebracht werden; die Schwierigkeit dieses Actes ist durch die Complication des Instrumentes nicht vermindert, sondern wegen seiner Dicke vermehrt. Ist dieser Theil der Operation aber einmal ausgeführt, so ist es ebenso leicht (und gewiss sicherer), eine gewöhnliche Oehrsonde, welcher man die entsprechende Krümmung gegeben hat, auf der anderen Seite der Arterie wieder aus der Wunde herauszuschieben, als den Mechanismus der genannten Instrumente in gehöriger Weise wirken zu lassen.

²⁾ Indem man eine gebogene Heftnadel mit ihrer Spitze in einem Korkstöpsel befestigt, kann man eine zur Unterbindung kleiner Arterien sehr brauchbare Aneurysma-Nadel ex tempore herstellen.

unterscheiden sie sich dadurch, dass sie weder spitz noch scharf und nicht von Stahl, sondern von Silber sein müssen, damit man ihnen, je nach der Tiefe, in welcher das zu unterbindende Gefäss liegt, eine verschiedene Krümmung geben kann. In allen dringenden Fällen kann man eine silberne Oehrsonde zum Behuf des Durchführens der Ligatur benutzen. — Der Faden kann in das zu seiner Führung bestimmte Instrument entweder vor, oder nach dem Durchschieben desselben eingefädelt werden. Ersteres ist gewöhnlich bequemer; man fasst den Faden alsdann, sobald das Ohr zum Vorschein gekommen ist, mit der Pincette, zieht ihn etwas hervor und hält ihn fest, während die Nadel ihren Weg zurück macht.

Das Hindurchführen der Unterbindungs-Nadel unter der Arterie geschieht entweder auf der unter sie geschobenen Hohlsonde (gleichgültig in welcher Richtung, da die benachbarten Theile durch die Hohlsonde alsdann vor jeder Verletzung geschützt sind), oder aus freier Hand; alsdann ist dabei die genaue Beobachtung aller jener Cautelen zu empfehlen, welche für den Act der Isolirung angegeben sind. Man fasse denjenigen Rand des Spaltes in der Arterien Scheide, welcher der begleitenden Vene entspricht, mit der Pincette, spanne ihn etwas an, und führe von dieser Seite her die Aneurysma-Nadel dicht an der Arterie um sie herum, während man auf der entgegengesetzten Seite, um ihr Hindurchgehen zu befördern und die Zerrung sowohl der benachbarten Gebilde, als auch der Arterie selbst zu verhüten, den Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand der hervordringenden Nadel in der Weise entgegengesetzt, dass sie zwischen beiden zum Vorschein kommt. Will man die Nadel auf der Hohlsonde hindurchführen, so muss erstere natürlich in die Rinne der letzteren passen, worauf im Voraus Bedacht zu nehmen ist.

Bevor man die Ligatur zuschnürt, muss man sich noch einmal vergewissern, dass man wirklich die Arterie und nur sie mit der Ligatur umschlungen hat. Dies geschieht theils durch das Gesicht (denn es darf, wie schon erwähnt, während der ganzen Operation in der Wunde keine Blutung, viel weniger Ansammlung von Blut gebildet werden), theils durch das Gefühl, indem man die Arterie mittelst des sie umschlingenden Ligaturfadens ein wenig emporhebt und dann an dieser Stelle ihre Pulsationen mit dem aufgesetzten Finger untersucht. Die Verwechslung einer Vene mit der Arterie, welche einem Ungeübten an der Leiche¹⁾ wohl begegnen kann, dürfte

¹⁾ Bei Operationen an der Leiche unterscheidet man die Arterien von den Venen an ihrer helleren Farbe, grösseren Festigkeit und dem Gefühle zweier

am Lebenden schwerlich vorkommen. Die Venen sehen dunkelblau aus und leisten auch dem schwächsten Drucke keinen Widerstand; die Farbe der Arterien dagegen ist ein helles Rosa, und es bedarf eines stärkeren Druckes, um sie abzuflattern. Leichter möglich ist die Verwechslung der Arterie mit einem sie begleitenden Nerven. Die Farbe des Nerven aber ist glänzend weiss; er kann durch Druck niemals abgeflattet werden, vielmehr werden dadurch Muskelzuckungen und Schmerzen erregt; man fühlt in ihm, wenn er isolirt und etwas emporgehoben ist, niemals Pulsationen. Endlich bringt die Compression der isolirten und emporgehobenen Arterie sofort alle Pulsationen in dem weiteren Verlaufe derselben und in ihren Aesten, sofern aber ein Aneurysma in ihrem Bereiche besteht, auch in diesem, gänzlich zum Verschwinden. Alle diese Verhältnisse müssen in zweifelhaften Fällen bedächtig erwogen werden, bevor man den entscheidenden Schlussact des Zusammenschnürens der Ligatur ausführt. Die Technik desselben ist die bei der „Unterbindung blutender Gefäss-Enden“ (pag. 117) beschriebene. Das Vorschieben der Zeigefinger ist auch hier empfehlenswerth, zumal bei tiefliegenden Arterien, deren Unterbindung durch wohlgeübte Finger mindestens ebenso leicht ausgeführt werden kann, als mit Hülfe der zu diesem Behufe erfundenen Unterbindungswerkzeuge¹⁾.

In der Voraussetzung, dass die Zurückziehung durchschnittener Arterien-Enden, welche zur spontanen Stillung arterieller Blutungen wesentlich beiträgt, auch nach der Anwendung der Ligatur von Bedeutung sei, um gegen Nachblutungen zu sichern, haben Maunoir und Abernethy²⁾, in neuester Zeit aber besonders Sédillot sowie auch mehrere amerikanische und deutsche Chirurgen die Durchschneidung der Arterie zwischen zwei in geringer Entfernung von einander angelegten Ligaturen empfohlen. Gegen dies Verfahren wird geltend gemacht, dass zwei Ligaturen in der Wunde bleiben und zwei Stücke der Arterie nekrotisch werden; auch hegt man Besorgniß vor dem Abgleiten der Ligaturen. Letzteres

über einander verschiebbarer Membranen, welches sie dem Finger beim Drucke gewähren. Letzteres lässt sie auch von Nerven unterscheiden.

¹⁾ Die für diesen Act der Unterbindung ersonnenen Knotenzieher, Schlingenschnürer u. dgl. m. beruhen auf dem Princip, statt der Fingerspitzen eine federnde Gabel wirken zu lassen, welche nach vorheriger Schlingung des Knotens zwischen den gleichmässig gespannt gehaltenen Faden-Enden hinabgeschoben wird (Schlingenschnürer von Liston und von C. J. M. Langenbeck).

²⁾ Surgical works I. pag. 151. Nach Sédillot wäre Celsus, nach Anderen Aëtius der Urheber dieses Verfahrens. Vgl. Compt. rend. de l'Académie des sciences, 29. Octob. 1849.

dürfte wohl durch sorgfältige Ausführung des Zusammenschnürens leicht zu verhüten und diesem Verfahren daher in Fällen, wo sonst ungenügende Thrombusbildung zu erwarten wäre, ein höherer Grad von Sicherheit zuzugestehen sein.

Was in Betreff des Materials zu den Unterbindungsfäden und der Anordnung dieser letzteren bei dem Verbande (durch welchen so viel als möglich *prima intentio* erzielt werden muss) bei der Unterbindung blutender Gefäss-Enden (pag. 114—118) gelehrt wurde, gilt auch hier.

Ist die Hauptpulsader eines Gliedes oder doch ein wesentlicher Ast unterbunden worden, so muss die betreffende Extremität ruhig und mit möglichst erschlafften Muskeln auf einem weichen Kissen gelagert, und jeder Druck auf die Collateraläste, von deren Erweiterung und Entwicklung die fernere Ernährung des Gliedes abhängt, sorgfältig vermieden werden. Letztere sucht man durch das Auflegen warmer Kräuter-, Sand- oder Kleiesäckchen (deren Temperatur jedoch 38° C. nie überschreiten sollte), auch wohl durch lauwarmer aromatische Umschläge zu begünstigen.

Heilungsvorgang und üble Zufälle nach der Unterbindung in der Continuität einer Arterie.

Zunächst haben wir die Veränderungen zu erörtern, welche an der Unterbindungsstelle selbst durch das Zusammenschnüren der

Arterie mechanisch bewirkt werden. Nur die äussere Arterienhaut ist zähe und widerstandsfähig; die beiden inneren Membranen sind brüchig; sie zerreißen unter dem Drucke der Ligatur und krämpfen sich, ihrer Elasticität folgend, gegen die Achse des Gefässrohrs um (Fig. 11). Dem Blutstrom wird durch die Ligatur ein Hinderniss gesetzt; das Blut stockt bis zu dem nächsten Ast aufwärts; es gerinnt, und das Gerinnsel haftet an den rauhen Rändern der zerrissenen

und nach Innen umgekrämpften inneren Gefässhäute. Je weiter aufwärts, desto mehr wird das Gerinnsel noch von dem andrängenden Blute bewegt und umspült; daher ist seine Gestalt die eines Kegels, dessen Basis an der Unterbindungsstelle festhaftet, dessen Spitze aber in der Richtung gegen das Herz bis zur Abgangsstelle des nächsten Astes frei flottirt (Fig. 12). — Das unschnürte Stück der Arterie wird, wenn man Seidenfäden zur Unterbindung verwandt hat, nekrotisch;



Fig. 11.



Fig. 12.

dadurch wird die Oese des Fadens frei und dieselbe kann nun zugleich mit dem abgestorbenen Ringe des Gefässrohres aus der eiternden Wunde ausgezogen werden, das Gefäss selbst aber erfährt eine Continuitätstrennung, welche stets zur Blutung führen müsste, wenn nicht inzwischen durch Festheftung und Einheilung des Thrombus das Lumen der Arterie verschlossen wäre. Hat man dagegen carbolisirte Darmsaiten angewandt, so bleibt die äussere Gefässhaut unversehrt erhalten; es erfolgt keine Nekrose, keine Eiterung, keine Continuitätstrennung, vielmehr eine Verdickung der Gefässwand.

In Betreff der Bildung und der Metamorphosen des Thrombus vgl. das I. Cap. dieses Abschnitts.

Unmittelbar nachdem durch die Unterbindung der Zufluss des arteriellen Blutes unterbrochen ist, wird der Theil (die Extremität), zu welchem die Arterie verläuft, beträchtlich kühler; einige Zeit darauf nimmt die Temperatur wieder zu und steigt oft sogar über die normale Höhe. Lässt die Erhebung der Temperatur lange auf sich warten, so hat man zu befürchten, dass der Theil brandig werde. — Alle Muskeln, welche durch Aeste, die unterhalb der Unterbindungsstelle entspringen, versorgt werden, sind gleich nach der Unterbindung und in nächster Zeit darauf gelähmt, die Haut in der entsprechenden Ausdehnung unempfindlich und taub.

Die Pulsationen im peripherischen Theile der Arterie (und des Aneurysma) hören in den meisten Fällen nach der Unterbindung ganz auf, oder sind doch erheblich schwächer. Zuweilen stellen sie sich nach Ablauf einiger Tage wieder ein, um dann abermals und dauernd zu verschwinden. Dies ist namentlich dann zu erwarten, wenn sie schwächer wieder auftreten, als sie vor der Operation waren, zumal an der Carotis, der Poplitea und Femoralis. Weniger darf man auf abermaliges Verschwinden der Pulsationen hoffen, wenn es sich um Aneurysmen am Unterschenkel oder am Vorderarme handelt, weil sich hier zahlreiche und weite Anastomosen finden. Wenn die Pulsationen im Aneurysma wieder auftreten, so ist dies ein Beweis, dass die Arterie nicht gut unterbunden war, oder dass Seitenäste vorhanden sind, welche Blut zu dem Theile der Arterie geführt haben, der sich zwischen der Ligatur und der Geschwulst befindet. Da gewöhnlich nur ein schwacher Blutstrom in denselben gelangt, so wird dadurch die Bildung und das Wachsthum des Blutgerinnsels in der Regel nicht verhindert, so dass schliesslich doch Heilung erfolgen kann. Dagegen bleibt diese aus, wenn Collateraläste das Blut zu bald und in zu reichlicher Menge in den jenseits der Unterbindungsstelle gelegenen Theil des Stammes zurückführen.

Pulsationen in der unterbundenen Arterie können sowohl dicht oberhalb als unterhalb der Ligaturstelle auftreten; relativ häufiger und stärker oberhalb derselben. Man hat dann Nachblutungen zu berechnen. Wenn Pulsationen der Arterien in dem jenseit der Ligatur gelegenen Theile des Gliedes gar nicht wieder eintreten, so ist deshalb auch nicht immer Brand zu befürchten; oft circulirt das Blut in diesen Gefäßen schon, wenn auch die Wirkung des Herzstosses in ihnen noch nicht fühlbar ist.

Man hat geglaubt, die Unterbrechung des Blutstromes in einem grossen Gefässe müsse eine dauernde Zurückstauung des Blutes gegen das übrige Gefässsystem veranlassen, durch welche Plethora, Congestion in inneren Organen oder „entzündliches Fieber“ bedingt werden könne, so dass man in solchen Fällen zu antiphlogistischen Mitteln greifen müsse. Dabei ist übersehen, dass das Blut, welches früher im Hauptstamm durchströmte, alsbald durch die seitlichen Aeste fließt, und dass folglich das Glied, an welchem eine Unterbindung vorgenommen ist, nahezu von derselben Blutmenge durchtränkt wird, wie nur anders vertheilt ist, als vorher.

Zuweilen treten nach Unterbindungen nervöse Erscheinungen auf: bald Affectionen der Centralorgane (Delirien, Coma, Tetanus), bald Symptome eines asthenischen Fiebers, bald auch sympathische Affectionen der Baueingeweide (wiederholtes Erbrechen, unfreiwillige Stuhlentleerungen). In solchen Fällen sind Narcotica angezeigt, besonders Morphium. Man muss Nervenzufälle um so mehr fürchten, je weniger gut die Arterie isolirt wurde.

Blutungen aus der Operationswunde erfolgen nach der Unterbindung in der Continuität nicht ganz selten und sind stets von grosser Gefahr. Bei dem Zuschnüren des Ligatur-Fadens kann eine Blutung entstehen, wenn das Gefäss von dem Faden durchschnitten wird, woran sowohl allzugeringe Dicke des Fadens als auch Brüchigkeit der Gefässwand schuld sein kann. Wenn man das Gefäss zwischen zwei Ligaturen durchschnitten hat, so kann die Blutung einige Stunden nach der Anlegung des Verbandes eintreten, wenn die Ligatur abgeglitten ist. Hat man carbolisirte Darmsaiten benutzt, so ist eine Nachblutung an der Stelle der Unterbindung nur in der eben erläuterten Weise möglich. Dagegen können bei dem gewöhnlichen Verfahren mit Seidenfäden in der pag. 126 erläuterten Weise Blutungen auch noch zwischen dem fünften bis dreissigsten Tage, in seltenen Fällen noch später vorkommen.

Zuweilen lässt sich aus der Anwesenheit deutlich fühlbarer Pulsationen im oberen oder unteren Ende der unterbundenen Arterie mit

Wahrscheinlichkeit erschliessen, ob die Blutung aus dem centralen oder aus dem peripherischen Ende der unterbundenen Arterie kommt; gewöhnlich gelingt dies aber erst nach Abnahme des Verbandes. Man muss alsdann sofort das entsprechende (meist also das obere) Ende der Arterie zum zweiten Male unterbinden, wobei nicht zu vergessen ist, dass die unmittelbaren Umgebungen der ersten Unterbindungsstelle in Entzündung begriffen sind und daher zu befürchten steht, dass die Arterienwandungen zu brüchig sind, um eine Ligatur mit Erfolg zu ertragen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, wie die Erfahrungen von Nélaton und Notta ¹⁾ beweisen. Nichtsdestoweniger ist zu empfehlen, dass man sich, wenn wegen Blutung nach einer übrigens gut ausgeführten Unterbindung in der Continuität einer Arterie eine zweite Unterbindung notwendig wird, so weit, als mit Rücksicht auf die übrigen Verhältnisse möglich, von der ersten Unterbindungsstelle entfernt halte, weil dieselben mechanischen Verhältnisse, welche die erste Nachblutung bewirkt oder begünstigt haben, bei Wiederholung der Unterbindung in der nächsten Nähe wahrscheinlich wieder obwalten dürften. Die meisten Blutungen der Art haben ihren Grund in der Anwesenheit eines nahe oberhalb der Unterbindungsstelle abgehenden Astes oder Aestchens, durch welche die Bewegung des Blutes in der Nähe der Ligaturstelle unterhalten und somit die Thrombusbildung gehindert wird. Auch andere Verhältnisse, besonders mangelhafte Gerinnungsfähigkeit des Blutes, Verschwärung der Arterie in grösserer Ausdehnung, eitriges Zerfallen des Thrombus, Durchschneidung der Arterie durch die Ligatur, bevor sich ein hinreichend festes Gerinnsel gebildet hat (wie dies bei degenerirten Arterienhäuten zu erwarten steht), können eine Blutung an der Unterbindungsstelle bedingen.

Von grösstem Interesse ist der Vorgang, durch welchen nach der Unterbindung des Hauptarterienstammes eines Körpertheils der Kreislauf in demselben wieder hergestellt wird. Die zahlreichen, gewöhnlich sehr kleinen Anastomosen, durch welche die oberhalb der Ligatur entspringenden Aeste mit denen, welche unterhalb der Unterbindungsstelle aus dem Stamme hervorgehen, im normalen Zustande in Verbindung stehen, erweitern sich sehr schnell, unter gleichzeitiger Verdickung ihrer Wandungen, in der Art, dass auch derjenige Abschnitt der Extremität, welcher aus dem unterhalb der Unterbindungsstelle gelegenen Theile des Gefässes sein Blut erhalten sollte, vollständig wieder damit versehen wird. Die hierbei stattfindende Erweiterung kleiner Gefässe ist so bedeutend, dass solche, die in der normal-

¹⁾ Gazette médicale de Paris, 1851.

Anatomie gar nicht benannt und beachtet werden, bis zu der Dicke der A. radialis sich entwickeln. Diese erweiterten Arterienäste erhalten den Namen „Collateralgefässe“, der Blutlauf durch sie „Collateralkreislauf“. Die anastomotischen Bögen, durch welche verschiedene Abschnitte eines Arterienstammes auf Umwegen mit einander in Verbindung stehen, waren zum grossen Theile schon seit langer Zeit bekannt. So war z. B. die Verbindung zwischen der Aorta thoracica und der Art. femoralis, welche durch Vermittelung der Anastomosen zwischen Art. mammaria int. und epigastrica int. besteht, schon Galen nicht entgangen; aber, trotz der lehrreichen Arbeiten über diesen Gegenstand, welche wir Haller u. A. verdanken, hatte man doch bis auf die neueste Zeit hin wenig Vertrauen auf die Zulänglichkeit dieses Collateralkreislaufes für die Ernährung einer Extremität. Erst, nachdem Scarpa¹⁾ und dann Tiedemann²⁾ durch ihre schönen Beschreibungen und Abbildungen die Arbeiten ihrer Vorgänger vervollständigt haben, ist man über die Möglichkeit der Wiederherstellung des durch Obliteration eines grossen, ja selbst des grössten Arterienstammes unterbrochenen Kreislaufes zu einer klaren Einsicht gelangt³⁾. Während man in alter Zeit vor einer mangelhaften oder unvollständigen Entwicklung des Collateralkreislaufes sich fürchtete, weiss man jetzt, dass viel häufiger eine zu schnelle und zu vollständige Entwicklung desselben zu besorgen ist. Gelangt nämlich durch die Vermittelung der Collateraläste das Blut mit einiger Kraft zu demjenigen Theile des Gefässes, welchem wir die Blutzufuhr ganz abschneiden wollten, früher, als dort der krankhafte Zustand, um dessen Beseitigung es sich handelte, wirklich beseitigt ist, so wird der Erfolg der Unterbindung gerade durch die Mächtigkeit der Collateraläste vereitelt. Wenn z. B. eine Blutung aus der Art. tibialis postica durch die Unterbindung der Art. femoralis (in der Mitte des Schenkels) gestillt werden sollte, die das Kniegelenk umspinnenden Collateraläste sich aber so schnell erweitern, dass das Blut in den verwundeten Theil der Art. tibialis postica wieder mit voller Kraft einströmt, bevor sie an der verwundeten Stelle obliterirt ist, so würde eine Nachblutung aus der Wunde eintreten. Würde die A. femoralis wegen eines Aneurysma der A. poplitea unterbunden, so kann die Anfangs verschwundene Pulsation in demselben wieder zurückkehren, die Geschwulst kann

¹⁾ Ueber die Pulsadergeschwülste, aus dem Italienischen von Harless, Zürich 1808.

²⁾ Vgl. dessen berühmte Arterientafeln, sowie die Supplemente dazu und die Monographie über Verengung und Schliessung der Pulsadern in Krankheiten. Heidelberg 1843.

³⁾ Vgl. besonders die Fälle von Obliteration der Aorta bei Tiedemann, l. c. *Kordeleben, Chirurgie. 7. Aufl. II.*

weitere Fortschritte machen, ja sie kann, trotz der Unterbindung, sogar platzen, wenn die erweiterten Seitenäste dem Blutstrome das Eindringen in die Geschwulst gestatten, bevor hinreichend mächtige Schichten von Gerinnseln ihre Wandungen verdickt oder ihre Höhle ganz erfüllt haben. Die Unterbindung eines Arterienstammes hat also keineswegs immer die Obliteration seines ganzen peripherischen Theiles zur Folge, vielmehr, je nach der individuell wechselnden Anordnung der Collateraläste, nur den Verschluss eines verhältnissmässig kleinen Stückes. Wie schnell das Blut nach Unterbindung des Hauptstammes mit voller Kraft, den mechanischen Gesetzen folgend, sich den Seitenästen zuwendet, kann in handgreiflicher Weise bei jeder Amputation am Cadaver demonstrirt werden. Wird nach einer solchen in den Hauptstamm der Extremität Wasser eingetrieben, so sieht man zunächst nur einen starken Strahl aus dem Arterienstamme hervorspritzen; sobald aber dieser in der Wunde unterbunden ist, dringt die Flüssigkeit in kräftigen Strahlen aus den vorher kaum bemerkten Seitenästen hervor.

Wo zwei Arterien eine Strecke weit parallel verlaufen und endlich durch starke anastomotische Bögen in directe Verbindung mit einander treten, wie z. B. am Vorderarme Art. radialis und ulnaris, da wird, wenn eine von ihnen unterbunden ist, diese durch die andere sofort gänzlich ersetzt.

Nicht in allen Körpertheilen, und nicht in allen Lebensaltern entwickelt sich der Collateralkreislauf mit gleicher Leichtigkeit. Die praktischen Anatomen wissen sehr wohl, dass Injectionen der Arterien leichter bei jungen, als bei alten Leuten, leichter an den oberen, als an den unteren Extremitäten gelingen, weil im höheren Alter und an den Aesten der Aorta descendens Arterien-Entartungen relativ häufiger sind. Für den Chirurgen ist die Thatsache besonders wichtig, dass jenseit des vierzigsten Jahres die Fähigkeit der Arterien, sich zu erweitern, beträchtlich abnimmt, ungefähr in demselben Maasse, in welchem die Tendenz zur Verknöcherung sich steigert. Vgl. „atheromatöse Degeneration“, pag. 86 u. f.

Vielleicht findet neben der Erweiterung der schon bestehenden anastomotischen Aeste auch noch eine Neubildung von Gefässen Statt, wie von Jones, Parry u. A. behauptet worden ist; wenigstens sieht man zuweilen das oberhalb der Ligatur gelegene Stück der Arterie mit dem unteren durch kurze, aber ansehnlich weite Aestchen so direct in Verbindung gesetzt, dass, wenn keine Neubildung, doch wenigstens eine höchst auffallende Erweiterung und Hypertrophie fast capillarer Aestchen Statt gefunden haben muss.

Anwendung der Ligatur zur Heilung von Aneurysmen.

Mit Rücksicht auf die Anwendung der Unterbindung in der Continuität bei der Behandlung der Aneurysmen unterscheidet man, je nach der Lage der Unterbindungsstelle im Verhältniss zum Aneurysma, 3 Methoden.

I. Unterbindung unmittelbar am Aneurysma. Directe Unterbindung.

A. Unterbindung dicht oberhalb und dicht unterhalb des Aneurysma mit gleichzeitiger Eröffnung und Entleerung der Geschwulst. Methode des Antyllus¹⁾.

Vor Beginn der Operation wird der Blutlauf in der kranken Arterie durch Compression oberhalb der Geschwulst vollkommen unterbrochen. Ein genau nach dem Verlaufe des Gefässes geführter Schnitt trennt die Haut und die unterliegenden Gewebe bis zur Geschwulst, der zweite öffnet den aneurysmatischen Sack; Blutgerinnsel und blässiges Blut stürzen hervor; man reinigt den Sack und sucht die Eingangsöffnung auf. Macht dies Schwierigkeiten, so hebt ein momentanes Nachlassen der Compression jeden Zweifel. Man führt hierauf in die gedachte Oeffnung den Finger, eine Sonde oder einen weiblichen Katheter, und hebt den der Geschwulst zunächst liegenden Theil des centralen Stückes der Arterie damit empor, trennt denselben von den benachbarten Venen und Nerven und unterbindet ihn, wobei die in das Arterienrohr eingeführte und inzwischen von einem Gehülfen gehaltene Sonde vor Verwechslung sicher schützt. Natürlich muss diese vor dem Zuschneiden des Knotens entfernt werden. In gleicher Weise verfährt man darauf mit dem peripherischen Stücke der Arterie. — Der aneurysmatische Sack wird mit Charpie gefüllt und die ganze (gewöhnlich sehr grosse) Wunde unter langwieriger Eiterung geheilt, wobei ein grosser Theil der Wandungen des Sackes, insbesondere die abgelagerten Blutgerinnsel, ausgestossen, zuweilen auch noch andere benachbarte Theile brandig werden, und schliesslich immer eine bedeutende und oft störende Narbe zurückbleibt. — Diese Methode ist in Bezug auf die radicale Beseitigung des Aneurysma gewiss die sicherste, zugleich aber, wegen der Grösse und Tiefe der Wunde und der langen Dauer der Eiterung die gefährlichste. Nachblutung ist überdies zu fürchten, wenn die Arterie in der Nähe des Aneurysma nicht vollkommen gesund ist und deshalb voraussichtlich von dem

¹⁾ Antyllus verdrängte (im 3. Jahrhundert nach Chr.) durch seine Methode diejenige seines Zeitgenossen Philagrius, welcher zuerst eine Operation gegen Aneurysmen unternommen zu haben scheint, indem er, nach vorgängiger Unterbindung des Gefässes oberhalb und unterhalb der Geschwulst, letztere exstirpirte.

Faden isoliert mit nicht erdölsäure brennsamen anwendet) frühe durchschnitten wird. Es der Thrombus sich nur wenig befestigt hat wie dies meistens bei allen traumatischen Thrombosen Schwülste vorausgesetzt werden muss. So ist daher für gewisse Fälle sogenannt spontanen Aneurysmen wohl nur ausnahmsweise zu empfehlen und muss selbst bei der traumatischen vor möglich vermieden werden wenn die Geschwulst gross ist, tief liegt oder in einer Stelle sich befindet, wo die ungenügende Ernährung mit der ungenügenden Verankerung voraussetzender unregelmäßiger Deformation besonders schädliche und Nachteile bedingen z. B. in der Leber etc.

II. LIGATUR DER ARTERIE MIT EINER LIGATUR DER GEFÄSSELN IM FÄHIGEN URSPRUNGE.

Die Aufsuchung mit Unterbindung der Arterie geschieht auf Grund der anatomischen Kenntnisse ihrer Lage, wird aber durch die in der Nähe des Aneurysma normal vorhandenen anatomischen Veränderungen erleichtert erspart. Die Fehlung soll durch Schrumpfung des Aneurysma mit der in ihm enthaltenen Längla erfolgen. Ist das Aneurysma gross, so erfolgt statt der Schrumpfung Zerfall, und man sieht eine bedeutende Zerscherung der Weichteile, wie bei anderer nicht Nekrose zu erwarten. Einspritzung geräth ras dem Sack ein Serensast, den durch die obere Ligatur die Hinzufuhr nicht abgeschnitten ist, so kann das Aneurysma durch diesen weiter unterhalten werden. Die Gefahr der Bindung ist, sofern die Arterienhülle erkrankt sind, ebenso gross, wie bei der Methode des STYVENS. Somit besteht der Vortheil dieser Methode in der Vermeidung der Eiterung in der Fülle, wo Schrumpfung erfolgt. Dies ist aber nur bei kleinen Aneurysmen zu erwarten, bei denen die Nachteile der ARYLLUS'Schen Methode aber nicht besonders hervortreten.

Allgemeine Anwendung findet diese Methode bei den verschiedenen Formen des Aneurysma arteriosum, namentlich dem Venenaneurysmatis. Im Falle jedoch die Unterbindung der Arterie unausführbar erscheint, kann man nach dem Vorgange von STROVIER¹⁾ statt der Arterie auch die Vene durch oberhalb und dicht unterhalb der Geschwulst unterbinden.

III. LIGATUR DER GEFÄSSELN AN EINIGE PUNKTE MIT DER GEFÄSSELN ZWISCHEN DEM HERZE UND DEN GEFÄSSELN. METHODE VON HENRI²⁾.

¹⁾ Vgl. dessen Handbuch der Chirurgie, pag. 61. — Die Carotis war in diese Falle weder eine Venenarterie, sondern die Temporalarterie, vorher vereinigt untereinander waren.

²⁾ The Works of Henry Hall, London, London 1837, Vol. III, pag. 59. HALL'S Methode ist im Grunde WELLS'S Methode, als Vertreter dieser Methode.

Sie beruht wesentlich auf zwei Principien: 1) Die Arterie in ausreichender Entfernung von dem Aneurysma zu unterbinden, um sicher zu sein, dass die Ligatur keinen kranken Theil des Gefässes trifft, und 2) die Unterbindung an einer Stelle auszuführen, wo das Gefäss leicht aufzufinden und zu isoliren ist. Diese Grundsätze hat zuerst John Hunter klar ausgesprochen, der, um ein Aneurysma in der Kniekehle zu heilen, die Art. cruralis im unteren Drittel des Schenkels unterband¹⁾. Die Vorzüge der Hunter'schen Methode sind: geringe Grösse und Einfachheit der Operationswunde, ferner die Wahrscheinlichkeit, im Gesunden zu operiren, insbesondere einen degenerirten Theil der Arterie zu vermeiden. Dagegen hat sie den Nachtheil, dass die Geschwulst nicht unmittelbar verschlossen wird, und daher in der pag. 129 erörterten Weise durch Collateraläste, welche von dem oberhalb der Ligatur gelegenen Theile der Arterie zu dem zwischen ihr und der Geschwulst befindlichen Stücke verlaufen, der Blutfluss zu dem Aneurysma in so hohem Grade unterhalten werden kann, dass die Ablagerung von Gerinnseln in demselben ausbleibt. Sehr selten entsteht in Folge der Hunter'schen Operation Brand, jedoch wäre es thöricht, sie noch auszuführen, wenn das Aneurysma oder seine Umgebung schon Zeichen des Brandes darbieten; dann ist nur die Antyllus'sche Methode oder bei sehr grosser Ausdehnung des Brandes (sofern es sich um eine Extremität handelt) die Ampu-

1. B. Augustin in Rust's Handbuch, Bd. IX. pag. 104, während in demselben Werke unter „Aneurysma“ John Hunter richtig angegeben wird.

¹⁾ Allerdings ist es unzweifelhaft, dass Anel bereits am 30. Januar 1710, wegen eines Aneurysma der Ellenbeuge, an der Brachialis die Unterbindung verrichtet hat. Anel wurde wegen dieser Operation vielfach angegriffen und die Heilung mehr einem Zufall zugeschrieben. Erst Desault wandte diese Methode im Jahre 1785 wieder an, indem er die Arteria poplitea wegen eines Aneurysma popliteum dicht unter dem Spalt des Adductor magnus unterband. Noch nach dieser Zeit hat John Hunter in einer Consultation über ein Schenkel-Aneurysma von der Grösse einer Orange erklärt, dass sich dies nicht operiren lasse (September 1785), und als er einige Monate später (12. December 1785) wegen eines Aneurysma popliteum die so berühmt gewordene Operation ausführte, unterband er die Art. cruralis dicht über dem Schlitz des Adductor magnus, legte aber vier Ligaturen an, die alle nicht ganz fest angezogen wurden und sämmtlich neben der Arterie auch die Vene umfassten. Der Operirte hatte eine Nachblutung zu überstehen und genas erst nach sieben Monaten. Jedenfalls bleibt J. Hunter das Verdienst, die „Ligatur in grösserer Entfernung vom Aneurysma“ eingeführt zu haben. Vgl. Broca, Des anévrysmes, Paris 1858, pag. 440—446. — Die Unterbindung dicht oberhalb der Geschwulst empfahl übrigens bereits Ambroise Paré im 16ten Jahrhundert (vgl. die Ausgabe der Werke des Paré von Malgaigne. Paris 1830, Tom. I. pag. 372).

tation anzuwenden. — Bei günstigem Erfolge der Operation geschieht der Verschluss des Aneurysma durch Blutgerinnsel (zu deren Ablagerung oft schon eine blosse Verminderung der Kraft des Blutstroms ausreicht) in der pag. 103 u. f. angegebenen Weise. Zuweilen entsteht Eiterung in der Geschwulst und nach erfolgtem Aufbruch Heilung durch Granulationen. Auch soll in seltenen Fällen ein Theil der Höhle des Aneurysma, nachdem die Communicationsöffnung oder ein grösserer Theil der Arterie obliterirt ist, als seröse Cyste fortbestehen können.

III. Unterbindung zwischen dem Aneurysma und den Capillargefässen. Unterbindung an der Peripherie der Geschwulst. Methode von Brasdor¹⁾.

Die Ausführung der Operation erfolgt in derselben Weise, wie bei der Hunter'schen Methode, nur an der peripherischen Seite der Geschwulst. Der Einwurf liegt nahe, dass der Verschluss der Arterie an der peripherischen Seite einer Pulsadergeschwulst eine grössere Ausdehnung und wohl gar ein Platzen derselben zur Folge haben müsse. Die Erfahrung, dass die Aufhebung der Blutbewegung, gleichgültig auf welche Weise sie erfolgt, stets Gerinnung der ausser Bewegung gesetzten Blutsäule zur Folge hat, lässt zwar jene Furcht für die Mehrzahl der Fälle unbegründet erscheinen. Dennoch wird man sich zur Anwendung der Brasdor'schen Methode immer nur in solchen Fällen entschliessen, wo die Unterbindung nach der Hunter'schen Methode unausführbar ist; denn zu ihrem Gelingen wird erfordert: dass 1) der aneurysmatische Sack eine hinreichende Festigkeit besitzt, um dem Andringen des Blutes bis zur erfolgten Gerinnung zu widerstehen, und 2) weder aus ihm selbst, noch auch aus dem zwischen ihm und der Unterbindungsstelle gelegenen Theile der Arterie Aeste entspringen, mithin wirklich die Unbeweglichkeit der in der Pulsadergeschwulst zurückgehaltenen Blutmasse erreicht wird.

Entspringen aus der Pulsadergeschwulst selbst zwei grössere Arterien, so fragt es sich: 1) muss man beide unterbinden? 2) soll man beide zugleich unterbinden? und 3) wenn dies nicht der Fall wäre, welches von den beiden Gefässen soll man zuerst unterbinden? Diday, welcher sich mit diesem Gegenstande besonders beschäftigt hat²⁾, kommt, auf Grund der vorliegenden Erfahrungen zu dem auch

¹⁾ Von Brasdor zu Ende des vorigen Jahrhunderts zuerst vorgeschlagen, von Desault gebilligt und von Deschamps zuerst ausgeführt. Vgl. Deschamps, *Observations et reflexions sur la ligature*, Paris 1797. Später hat J. Wardrop (Ueber die Aneurysmen und eine neue Methode, sie zu heilen. London 1828. Deutsch Weimar 1829.) die Brasdor'sche Methode besonders empfohlen.

²⁾ Bulletin de l'Académie royale de médecine, Tom. VIII. pag. 963: Gaz. médicale 22. février 1845.

theoretisch begründeten Schlusse, dass stets beide Arterien unterbunden werden müssen. Die Unterbindung beider Stämme auf einmal führt in einem solchen Falle gewiss schneller zum Ziele, als die Unterbindung in zwei Zeiten. Letztere aber ist minder gefährlich, da bei der ersteren Platzen oder Entzündung des Sackes durch die plötzliche Hemmung jedes Blutabflusses eher zu befürchten sein könnte. Man schreitet erst dann zur Unterbindung des zweiten Stammes, wenn der erste vollkommen verschlossen ist. In dieser Beziehung ist es sehr wichtig, den wirklichen Verschluss von dem scheinbaren zu unterscheiden. Es kann nämlich der Anschein eines Verschlusses dadurch herbeigeführt werden, dass der betreffende Gefässstamm durch die Pulsadergeschwulst selbst so bedeutend gedrückt oder verdeckt wird, dass keine Pulsationen mehr daran zu fühlen sind. Da möglicher Weise schon nach Verschluss eines Stammes Heilung der Pulsadergeschwulst erfolgen kann¹⁾, so beginnt man stets mit der minder gefährlichen Unterbindung. Macht die, in Folge der ersten Operation eingetretene Verkleinerung der Geschwulst keine weiteren Fortschritte, oder werden die Pulsationen in derselben wieder stärker, so muss man zur Unterbindung des zweiten Stammes schreiten.

Nach den vorliegenden Erfahrungen darf man sich keine glänzenden Hoffnungen von der Brasdor'schen Methode bei solchen Aneurysmen machen, deren zuleitender Arterienstamm seiner Lage wegen nicht unterbunden werden kann, und doch sollte sie gerade für diese in ihren Leistungen über die anderen Methoden hinausgehen.

Aus einer von Diday gegebenen Uebersicht geht hervor, dass unter 16 Fällen, in welchen die Brasdor'sche Methode zur Heilung von Pulsadergeschwülsten am Truncus anonymus und dem ihm zunächst liegenden Theile seiner beiden Aeste zur Anwendung kam, 4 mit vollständiger Heilung, 12 aber mit dem Tode endeten. Jedoch wurde nur in zwei Fällen der unglückliche Ausgang durch Zufälle herbeigeführt, welche der Operation zur Last gelegt werden konnten (Blutung). In 4 Fällen war Fortdauer oder Wiederkehr des Uebels die Todesursache; in den übrigen 6 konnte ein direkter Zusammenhang zwischen der Operation und der zum Tode führenden Krankheit (Pleuritis, Pneumonie, Pericarditis etc.) nicht nachgewiesen werden.

Varianten der Unterbindung.

Die verschiedenen Materialien, aus welchen man Unterbindungsfäden gemacht hat, sind schon pag. 117 u. f. erwähnt worden.

¹⁾ Es ist sogar vorgekommen, dass in Folge der Unterbindung der linken Carotis, welche unternommen wurde, um ein vermeintliches Aneurysma dieser Arterie nach der Brasdor'schen Methode zu heilen, Gerinnsel in einem wirklich bestehenden Aneurysma Arcus Aortae abgelagert wurden und somit, trotz der sehr indirecten Beziehungen jener Ligaturstelle zu dem Sitze des Aneurysma,

Man unterscheidet im Gegensatze zu dem bisher geschilderten gewöhnlichen Verfahren die sogenannte mittelbare Unterbindung, deren Erfindung fast allgemein Scarpa zugeschrieben wird, in der That aber schon von Dionis¹⁾ herrührt. Hierbei wird die Arterie, nachdem sie bloßgelegt ist, durch die umgeführte Ligatur nicht direct zusammengeschnürt, sondern gegen einen auf sie gelegten Cylinder von Heftpflaster oder dgl. abgeplattet, weshalb man dies Verfahren auch Abplattung der Arterien genannt hat. Es soll hierdurch die Zerreißung der inneren und mittleren Gefäßhaut vermieden werden. Man bedient sich daher auch nicht runder Seidenfäden, sondern bandförmiger Ligaturen. Hierbei wird zugleich beabsichtigt, die Ligatur nur so lange liegen zu lassen, als zur Bildung des Thrombus nothwendig ist, und eine Continuitätstrennung der Arterie durch Nekrose des von der Ligatur umfassten Stückes zu vermeiden. Die Entfernung des Fadens wird zu diesem Zwecke einige Tage oder einen Tag, nach Travers sogar nur wenige oder gar eine Stunde, nachdem die Unterbindung ausgeführt ist, vorgenommen, was hier nicht schwierig ist, da man den Unterbindungsfaden auf dem eingelegten Cylinder ohne Gefahr durchschneiden kann. Diese „temporäre Ligatur“ sollte ersetzt und erleichtert werden durch die zuerst als „Presse-artère“, „Serre-artère“ u. s. f. beschriebenen Instrumente²⁾. Die Erfahrung hat aber die Vorzüge der mittelbaren Ligatur überhaupt noch nicht dargethan. Lässt man sie zu lange wirken, so entsteht voraussichtlich Verschwärung der Arterie in bedeutender Ausdehnung und dadurch Nachblutung; will man sie als temporäre Ligatur anwenden und frühzeitig entfernen, so geschieht dies leicht zu früh, und der Zweck der Ligatur wird dann gar nicht erreicht. Nur bei brüchigen, atheromatösen Arterien dürfte die mittelbare Unterbindung Empfehlung verdienen.

doch Aussicht auf Heilung entstand (Dubreuil). Andere Fälle enthält mein Referat in dem „Jahresbericht“ p. 1869 u. ff.

¹⁾ Cours d'opérations de chirurgie. Paris 1707.

²⁾ Die zweckmässigsten unter diesen Instrumenten sind: 1) die von V. v. Brun empfohlene silbernen Ligaturröhrchen, 2) der von Porter angegebene kleine spitzwinklige Triangel von Draht, welcher in der Nähe seiner stumpferen Ecke an dem kurzen Schenkel zwei Löcher hat, durch welche die Ligatur gezogen wird, deren Enden dann am spitzen Winkel befestigt werden. Vgl. G. Porter, an artery-compressor, Med. press and circular, 1869. Febr. 3. — Der von Richardson (Med. Times and Gazette. 1869. April) angegebene Tubular-presseartere hat die Einrichtung des Roux'schen Nadelhalters (Bd. I. pag. 115). — Die Spannung einer bloßgelegten Arterie durch eine untergeschobene Sonde kann als provisorisches Blutstillungsmittel benutzt werden.

Mehrfache Ligaturen sind erforderlich, wenn zu einer Arterienwunde oder einem Aneurysma von mehreren Seiten her Blut zuströmt. Der Sicherheit wegen, statt einer Ligatur, wenn sonst kein Grund dazu vorhanden ist, zwei anzulegen ist mindestens nutzlos, vielleicht gefährlich, weil die dadurch bedingte ausgedehntere Verschwärung die Gefahr der Nachblutung erhöht.

In Betreff der Durchschneidung der Arterie zwischen zwei Ligaturen vgl. pag. 124. — Die sogenannten Nothschlingen (*ligatures d'attente*) verdienen heut zu Tage kaum noch Erwähnung. Man legte sie um die entblösste Arterie, ohne sie zuzuschüren, um im Fall einer Nachblutung gegen diese gewaffnet zu sein; sie bedingen aber bei längerem Verweilen unzweifelhaft Ulceration der Arterie und dadurch grade Nachblutung.

C. Umstechung und Acupressur.

Die Umstechung der Arterien steht in der Mitte zwischen der Compression und der Ligatur. Wir haben bereits pag. 113 erwähnt, dass man durch eine Naht eine sehr wirksame Compression ausüben könne. Wenn man eine Naht nun blos zum Behuf der Blutstillung und gar nicht zur Wundvereinigung anwendet, so nennt man die Operation nicht mehr Naht, sondern „Umstechung“. In der Mehrzahl der Fälle macht man von ihr nur bei blutenden Gefässen Gebrauch. Man bedient sich dazu am Besten kurzer Heftnadeln, die in einem Halbkreise von 15—20 Mm. Durchmesser gebogen sind, und mit einem Nadelhalter geführt werden. Das blutende Gefäss oder (gewöhnlich) die blutende Stelle, welche man mit einer Hakenpincette oder einem Haken fasst und etwas hervorzieht, wird mit der Nadel in einem Zuge umkreist und der auf solche Weise herumgeführte und durch seine Lage im Stichcanale vor dem Abgleiten gesicherte Faden fest zusammengeschnürt. Hört die Blutung nicht auf, so wiederholt man die Umstechung von der entgegengesetzten Seite her, wobei dann der zuerst angelegte Faden zum Hervorziehen der zu umstechenden Stelle benutzt werden kann. Die Umstechung blutender Gefässe hat im Vergleich zur Ligatur des isolirten Gefässes den Nachtheil, dass ein grösserer Complex von Geweben zusammengeschnürt und daher bei Anwendung gewöhnlicher Seidenfäden auch meist mortificirt wird. Fasst man bei der Unterbindung das Gefäss nicht ganz isolirt, sondern zugleich mit ihm die benachbarten Weichtheile (wie es oft genug in der Eile geschieht), so besteht in der That kaum eine Differenz in der Wirkung zwischen einer solchen Ligatur und der Umstechung. Letztere hat aber den Vorzug, dass der Faden sicher nicht abgleitet. Natürlich würde dieser Vortheil ganz verschwindend klein sein, gegenüber dem Nachtheil, der daraus erwachsen müsste, wenn man bei der Umstechung

das Mitfassen von Nerven und anderen wichtigen Theilen nicht vermiede oder nicht vermeiden könnte. Die Lösung eines zur Umstechung angewandten Seidenfadens erfolgt wie bei der Ligatur, nur später, wegen der grösseren Masse der umschnürten Weichtheile.

Auf die Vortheile der Umstechung hat Roser neuerdings wieder aufmerksam gemacht im Archiv der Heilkunde 1860, pag. 86.

Die Umstechung in der Continuität, welche sich der Unterbindung in der Continuität analog verhält, ist früher wohl hier und da geübt worden; als eine besondere Methode hat sie erst Middeldorpf begründet und als „percutane Umstechung der Arterien“ bezeichnet¹⁾. Dieselbe wird in der Weise ausgeführt, dass man an der centralen Seite der blutenden oder aneurysmatischen Stelle die mit einem starken Faden versehene entsprechend gekrümmte Nadel neben der Arterie, 1—4 Ctm. von ihr entfernt, durch die Haut einsticht, unter dem Gefäss, ein starkes Bündel von Weichtheilen mitfassend, hindurch- und auf der anderen Seite wieder aussticht. Die Enden des Fadens werden sodann über einem auf die Haut gelegten Charpiebausch zusammengeschnürt und fest geknotet. Zwischen dem vierten und siebenten Tage wird der Faden entfernt. Hat man eine carbolisirte Darmsaite benutzt, so fällt der aussen liegende Theil von selbst ab. Die Erfahrung hat die Besorgnisse, welche man vor dieser Operation von theoretischer Seite wegen der möglichen (meist sogar wahrscheinlichen) Einschnürung von Nerven und anderen wichtigen Gebilden hegen musste, als unbegründet erscheinen lassen. Sie scheint ganz gefahrlos zu sein, wenn man nur nicht fester zusammenschnürt, als zur Hemmung des Blutlaufs grade nöthig, und ferner möglichst grosse Massen von Weichtheilen umfasst, also absichtlich in einem recht grossen Kreise umsticht. Die Bequemlichkeit und Leichtigkeit dieses Verfahrens im Vergleich zur isolirten Unterbindung leuchtet von selbst ein. Besondere Vorzüge gewährt es bei tief liegenden Gefässen mit zahlreichen anastomotischen Aesten, zumal wenn wegen der Nachbarschaft wichtiger Theile oder wegen bestehender entzündlicher Schwellung die Schwierigkeiten der Blosslegung der Arterie erheblich gesteigert sind. Sowohl bei Blutungen (namentlich im Handteller) als auch bei cyrsoiden Aneurysmen hat diese Operation auch mir bereits gute Erfolge geliefert.

An die Umstechung der Arterien schliesst sich die von Simpson²⁾

¹⁾ Vgl. Winklewski. De ligatura in continuitate arteriae circumscisa. Diss. inau. Vratislav. 1861. Middeldorpf's erste Versuche datiren von 1856.

²⁾ Sir James Young Simpson, Baronet, der Erfinder der Chloroformbetäubung und der Acupressur, Professor der Geburtshilfe zu Edinburgh, starb 1870.

rfundene Acupressur¹⁾ an. Sie verhält sich zur gewöhnlichen Umstechung, wie die umschlungene Naht zur Knopfnah. Dem Namen entspricht am Meisten die ursprüngliche Methode Simpson's, bei welcher mittelst einer durch die Haut tief in die Gewebe eingestossenen Nadel das Gefäss gegen die Haut oder gegen einen Knochen comprimirt werden soll. Die Compression wird dadurch erreicht, dass man die Nadel, nachdem man mit ihrer Spitze an der Arterie vorübergegangen ist, plötzlich wendet (in einer anderen Richtung weiter schiebt) und das Gefäss auf solche Weise entweder gegen die Haut emporhebt, oder gegen den Knochen niederdrückt. Dies ist die Acupressur im engeren Sinne. Man kann aber eine zum Verschluss hinreichende Compression auch erreichen, wenn man eine Nadel neben der durchschnittenen Arterie, rechtwinklig gegen deren Verlauf, in die Gewebe ein- und 5 bis 10 Millimeter weiter wieder aussticht, demnächst aber um ein Viertel eines Kreises dreht und schliesslich durch tieferes Einstossen der Spitze in indifferente Gewebe befestigt, — Aberdeen-Methode, Acutorsion. Endlich lässt sich auch der Verschluss eines Gefässes mittelst einer Drahtschlinge bewirken, deren Klang man um die Spitze einer neben der Arterie durch die benachbarten Gewebe ein- und ausgestochenen Nadel schlingt und deren Enden man an das Knopfende der Nadel durch Umwickeln befestigt, — Methode von Keith, Acufilopressur.

Für die Ausführung der Acupressur bedient man sich am Besten gut polirter langer Stahlnadeln mit Troicartspitze und festem Knopf. Es können aber auch gewöhnliche Nähadeln, an denen zum Behuf des Ausziehens aus der Wunde ein hinreichend langer Draht befestigt ist, benutzt werden. Alle drei Methoden der Acupressur sind, nach den vorliegenden Erfahrungen, praktisch bewährt; jedoch dürften, sofern die Localität es gestattet, die eigentliche Acupressur und die Acutorsion den Vorzug verdienen, weil das Ausziehen bei der Acufilopressur umständlicher ist. Während nämlich bei den übrigen Methoden, nach 24, 48, höchstens 72 Stunden nur die Nadeln zu entfernen sind, muss bei der Acufilopressur die Drahtschlinge, welche,

¹⁾ Vgl. J. Y. Simpson, Acupressure, a new method of arresting surgical haemorrhage. Edinb. med. Journ. 1860 u. 1861. Unter demselben Titel erschien auch eine grosse Monographie von Simpson, Edinburgh, 1864. — J. Dix. On the Advantages of Acupressure over the Ligature. Med. Times and Gazette 1860. June 2. — W. Pirrie, Acupressure. Brit. med. Journ. 1867, Aug. 31. pag. 171. — Pirrie and Keith, Acupressure, an excellent method of arresting surgical haemorrhage and of accelerating the healing of wounds. Lond. 1867. — Th. Billroth, Ueber Acupressur, Wiener medicinische Wochenschrift, 1868, No. 1 u. f. — Langenbeck's Archiv Bd. III. pag. 79.

analog den Umwicklungsfäden der umschlungenen Naht, nach Entfernung der Nadel keinen Halt mehr hat, auch noch herausgezogen werden, wodurch leicht Störungen der Wundheilung bewirkt werden können.

Simpson selbst vindicirt der Acupressur folgende Vorzüge vor der Ligatur. 1) Sie ist leichter und schneller auszuführen. 2) Die Nadeln sind kaum als fremde Körper zu betrachten, zumal sie nach 2–3 Tagen entfernt werden. 3) Es erfolgt keine Continuitätstrennung des Gefässes, wie dies bei der gewöhnlichen Ligatur an der umschnürten Stelle der Fall ist. 4) Die Aussicht auf prima intentio ist grösser (vgl. 2). 5) Schlechte Eiterung und Pyämie werden seltener sein (aus demselben Grunde). — Weiterhin haben Simpson und seine Anhänger (namentlich die letzteren) das Lob der Acupressur übertrieben; das Zustandekommen der ersten Vereinigung (ohne einen Tropfen Eiter!) sollte, Dank der neuen Erfindung, auch bei grossen, namentlich Amputationswunden, ohne Ausnahme gelingen. Dagegen haben sich die von Simpson ursprünglich gerühmten Vorzüge in der That unter den Händen zahlreicher Chirurgen in Hunderten von Fällen bewährt. Wenn ich dennoch nicht geneigt bin, der Acupressur auch für grössere Arterien unbedingt den Vorzug vor der Ligatur einzuräumen, so geschieht Dies, weil ich sie, nach fremden und eigenen Erfahrungen, nicht für ebenso sicher erklären kann¹⁾, und weil die Vorwürfe, welche man, Seitens der unbedingten Verehrer der Acupressur, der Unterbindung gemacht hat (als wären die Gefahren grosser Wunden wesentlich von den Ligaturfäden abhängig), mir nicht begründet erscheinen. Gegenüber der antiseptischen Ligatur sind diese Vorwürfe ganz hinfällig. Vgl. pag. 106.

Die Acupressur ist vorzüglich auf den Verschluss blutender Arterien berechnet. Man kann sie aber auch in der Continuität anwenden, indem man unter der Arterie eine Nadel hindurchschiebt. Mit Sicherheit wird dies immer nur nach vorgängiger Blosslegung geschehen können, wo dann das Verfahren wesentlich mit der „mittelbaren Unterbindung“ übereinstimmt. Vgl. pag. 131.

Als Modification der Acupressur ist die von C. Schmitz²⁾ be-

¹⁾ Vgl. die in meinem Referat über Krankheiten der Arterien in dem Jahresbericht von Virchow und Hirsch, pro 1869. Bd. II. angeführte Literatur. Ich selbst sah in einem Amputationsstumpf die durch Acupressur geschlossene Arterie bei Ausziehen der Nadel nach 72 Stunden kräftig spritzen. — Die Gefahr, dass unverständige Kranke an den (gewöhnlich aus Glas gemachten) Nadelknöpfen ziehen und dadurch Blutung hervorrufen, ist keineswegs gering anzuschlagen. Man muss strenger Ueberwachung sicher sein, wenn man Acupressur anwenden will.

²⁾ Allgem. med. Central-Zeitung 1861.

schriebene Ansa haemostatica zu betrachten. In eine gerade Nadel mit seitlich offenem Ohr zieht man einen gewichsten Seidenfaden bis zu seiner Mitte ein; die Faden-Enden klemmt man in einem radialen Einschnitt einer Papp- oder Guttapercha-Scheibe fest. Die Nadel wird nun bis zur Wundfläche (des Amputationsstumpfs) von der Seite durch die Haut gestossen, und wenn die in ihr befindliche Ansa nahe dem zu verschliessenden Gefäss-Ende sich befindet, entfernt. Letzteres wird mit Haken oder Pincetten hervor und durch die Schlinge hindurchgezogen, die Haltscheibe gegen den Einstichpunkt angedrückt und die Schlinge durch Anziehen der Faden-Enden möglichst genau an die Oeffnung angepresst. Die Faden-Enden werden zur Sicherheit noch durch Heftpflaster befestigt. Die Ansa wird am zweiten oder dritten Tage durch Zug an dem einen Faden-Ende entfernt.

B. v. Langenbeck¹⁾ wandte in ähnlicher Weise Eisendraht an. Die Enden der Drahtschlinge werden in gerade Nadeln gefädelt, die von der Wunde aus zu den Seiten der hervorgezogenen Arterie durch die Weichtheile nach Aussen hindurchgestossen werden. B. v. Langenbeck selbst u. A. haben dann aber auch den Eisendraht wie gewöhnliche Ligaturfäden gebraucht und damit die Rückkehr von diesen umständlicheren Verfahrensweisen zu der altbewährten Ligatur angebahnt.

D. Drehung der Arterien, Torsio arteriarum.

Der mechanische Verschluss einer Arterie durch Drehung ist von Amussat²⁾, Thierry³⁾, Velpeau und Fricke⁴⁾ in die Praxis eingeführt, von Galen⁵⁾ aber bereits angegeben worden. Die Torsion ist eigentlich nur zur Stillung von Blutungen aus durchschnittenen Gefässen anwendbar, jedoch auch für den Verschluss in der Continuität statt der Ligatur empfohlen worden. Zu ihrer Ausführung bedarf man mindestens einer der sogenannten Torsionspincetten (vgl. pag. 115), unter welchen diejenige von Fricke (Fig. 8) die bequemste und gebräuchlichste ist. Mag man sich nun dieses oder jenes Verfahrens bedienen, so läuft die Operation im Wesentlichen doch immer darauf hinaus, die mit der Torsionspincette gefasste Arterie so

¹⁾ Vgl. C. E. Martin, Ansa filii metallici, nova methodus haemostatica. Diss. inaug. Berol. 1861.

²⁾ Archives générales de médecine, 1829, Août.

³⁾ De la torsion des artères, Paris 1829.

⁴⁾ Annales des Hamburger Krankenhauses, Bd. II.

⁵⁾ Galen rieth die Gefässe mit einem scharfen Haken zu torquieren. Vgl. Léveillé, Nouvelle doctrine chirurgicale, Paris 1812, Tom IV. pag. 549.

Fig. 13.



oft um ihre Axe zu drehen, dass die inneren Gefässhäute zerreißen und sich aufrollen, die äussere aber einen festgedrehten Strang darstellt (Fig. 13).

Nach Amussat's ursprünglicher Angabe bedarf man zur Ausführung der Operation vier Pincetten. Zunächst wird das Arterien-Ende mit einer gewöhnlichen Pincette gefasst und hervorgezogen und mit einer anderen von den ihm anhaftenden Gebilden soweit isolirt, dass es etwa 1 Centim. frei hervorragt. Hierauf wird die Arterie mit der Torsionspincette und zwar rechtwinklig gegen ihre Achse gefasst und letztere geschlossen; die andere Hand ergreift mit einer zahnlosen und an ihren Spitzen glatt abgerundeten Pincette das hervorgezogene Arterien-Ende dicht an seiner Austrittsstelle aus den übrigen Weichtheilen gleichfalls in querer Richtung, um eine Zerreißen der inneren Gefässhäute zu bewirken und gleichzeitig zu verhüten, dass die demnächst mit der Torsionspincette auszuführenden Drehungen ihre Wirkung nicht auf den übrigen Theil der Arterie erstrecken. Die Drehungen werden Anfangs mit der quer angesetzten Torsionspincette gemacht, weiterhin aber wird diese in die Richtung des Gefässes gebracht, so dass sie rechtwinklig gegen die glatte Haltpincette zu stehen kommt. Im Ganzen sollen 7—8 Axendrehungen vorgenommen werden, worauf man das Gefäss-Ende in die Weichtheile zurückdrückt und die Pincette löst. — Einfacher verfährt man, nach Fricke, in der Art, dass man das Arterien-Ende sofort mit der Torsionspincette fasst, hervorzieht, mit einer gewöhnlichen Pincette isolirt und, während die Finger der linken Hand dasselbe in der Nähe der Weichtheile fixiren, mit der rechten die Drehung langsam ausführt (sogen. *Torsion libre*). Statt sich an eine bestimmte Zahl von Umdrehungen zu halten, thut man besser, die Drehung so lange gleichmässig fortzusetzen, bis das Gewicht einer gewöhnlichen Torsionspincette genügt, um die Zurückdrehung zu hindern.

Für die Torsion der Arterie in der Continuität empfahl Thierry, eine Deschamps'sche Nadel unter die blossgelegte Arterie zu führen und sie mit dieser, wie mit einem Knebel, zusammenzudrehen. Amussat rieth, die Arterie mit zwei Torsionspincetten zu fassen, in dem Zwischenraume zwischen beiden zu durchschneiden und jedes Ende hierauf in der oben beschriebenen Weise zu torquiren.

Die Wirkungsweise der Torsion ist mit Rücksicht auf die bei der Unterbindung gemachten Erörterungen leicht zu erklären. Schon die zerrissenen und aufgerollten inneren Arterienhäute setzen dem Blutstrom ein mechanisches Hinderniss entgegen; noch mehr aber

chieht dies durch die zu einem soliden Strang zusammengedrehte sere Membran. Die mit der Operation verknüpfte Zerrung und reissung hat Entzündung zur Folge, und so sind die beiden Bewegungen zum definitiven Verschluss, freilich aber auch die Möglichkeit zur Verschwärung in dem zusammengedrehten Ende gegeben.

Durch die Torsion haben Manche die gewöhnliche Unterbindung zu verdrängen wollen. Vergleicht man aber beide Mittel in Bezug auf Leichtigkeit der Ausführung und Sicherheit des Erfolges, so kann man sich einer solchen Ansicht nicht anschliessen. Es ist zunächst indeswags leicht, die Torsion gut auszuführen; hat man doch sogar an Seiten ihrer Verehrer die ungünstigsten Resultate, welche sie in den Händen bedeutendster Chirurgen lieferte, daraus erklären wollen, dass sie nicht richtig ausgeführt worden sei! Dies ist von Bedeutung bei einer Operation, welche, da sie als Blutstillungsmittel wirken soll, von jeder Wundarzt sofort müsste ausführen können. — Was die Sicherheit des Erfolges betrifft, so lässt die Torsion im Allgemeinen keine bessere Heilung der Wunde erwarten, weil kein fremder Körper derselben zurückbleibt; jedoch kann das zusammengedrehte Arterienende auch absterben und dann als fremder Körper wirken. In Bezug auf die Sicherheit des Gefässverschlusses muss anerkannt werden, dass die Torsion sich in den Händen aller Chirurgen, welche sie speciell geübt haben, als ein zuverlässiges Blutstillungsmittel bewährt hat; aber man muss doch zugestehen, dass das zusammengedrehte Gefäss-Ende sich auch aufdrehen könne¹⁾ und dass die äussere Gefässhaut, welcher hier so viel zugemuthet wird, auch reissen kann. Denfalls hat aber die antiseptische Ligatur bei mindestens gleicher Sicherheit den Vorzug grösserer Leichtigkeit der Ausführung. Bei Verletzungen bedeutenderer Arterien hat man daher der Unterbindung den Vorzug zu geben. Kleine Arterien mag man, je nach Bequemlichkeit, bald unterbinden, bald durch Nadeldruck, bald durch Torsion abliessen. Letzteres kann in der Tiefe einer Wunde in der That viel bequemer sein.

Neuerdings haben sich namentlich Th. Bryant (*Torsion of arteries etc.*, Med. jur. transact. Lf. 1868) und Humphry (*Brit. med. journ.* 1868, May und 1869, n.) für die Torsion ausgesprochen.

In ihrer Wirkungsweise der Torsion ähnlich sind: die Zerquetschung der inneren Gefässhäute (*mâchure*), nach Maunoir, und das Zurückdrängen (*refoulement*) derselben, nach Amussat. — Bei der *Mâchure* wird die Arterie mit einer Pinzette, deren Zähne wenig scharf sein müssen, gefasst und kräftig gequetscht, so dass durch die Zerreiessung und Aufrollung der inneren Gefässhäute eine Ver-

¹⁾ Um dies zu verhüten, empfahl Mac Kinnon (*New Orleans journ. of med.*, April 1869) das gedrehte Ende mit einer eingestossenen Nadel zu befestigen.

Fig. 13. oft um ihre Axe zu drehen, dass die inneren Gefässhäute zerreißen und sich aufrollen, die äussere aber einen festgedrehten Strang darstellt (Fig. 13).



Nach Amussat's ursprünglicher Angabe bedarf man zur Ausführung der Operation vier Pincetten. Zunächst wird das Arterien-Ende mit einer gewöhnlichen Pincette gefasst und hervorgezogen und mit einer anderen von den ihm anhaftenden Gebilden soweit isolirt, dass es etwa 1 Centim. frei hervorragt. Hierauf wird die Arterie mit der Torsionspincette und zwar rechtwinklig gegen ihre Achse gefasst und letztere geschlossen; die andere Hand ergreift mit einer zahnlosen und an ihren Spitzen glatt abgerundeten Pincette das hervorgezogene Arterien-Ende dicht an seiner Austrittsstelle aus den übrigen Weichtheilen gleichfalls in querer Richtung, um eine Zerreißen der inneren Gefässhäute zu bewirken und gleichzeitig zu verhüten, dass die demnächst mit der Torsionspincette auszuführenden Drehungen ihre Wirkung nicht auf den übrigen Theil der Arterie erstrecken. Die Drehungen werden Anfangs mit der quer angesetzten Torsionspincette gemacht, weiterhin aber wird diese in die Richtung des Gefässes gebracht, so dass sie rechtwinklig gegen die glatte Haltpincette zu stehen kommt. Im Ganzen sollen 7—8 Axendrehungen vorgenommen werden, worauf man das Gefäss-Ende in die Weichtheile zurückdrückt und die Pincette löst. — Einfacher verfährt man, nach Fricke, in der Art, dass man das Arterien-Ende sofort mit der Torsionspincette fasst, hervorzieht, mit einer gewöhnlichen Pincette isolirt und, während die Finger der linken Hand dasselbe in der Nähe der Weichtheile fixiren, mit der rechten die Drehung langsam ausführt (sogen. *Torsion libre*). Statt sich an eine bestimmte Zahl von Umdrehungen zu halten, thut man besser, die Drehung so lange gleichmässig fortzusetzen, bis das Gewicht einer gewöhnlichen Torsionspincette genügt, um die Zurückdrehung zu hindern.

Für die Torsion der Arterie in der Continuität empfahl Thierry, eine Deschamps'sche Nadel unter die blossgelegte Arterie zu führen und sie mit dieser, wie mit einem Knebel, zusammenzudrehen. Amussat rieth, die Arterie mit zwei Torsionspincetten zu fassen, in dem Zwischenraume zwischen beiden zu durchschneiden und jedes Ende hierauf in der oben beschriebenen Weise zu torquiren.

Die Wirkungsweise der Torsion ist mit Rücksicht auf die bei der Unterbindung gemachten Erörterungen leicht zu erklären. Schon die zerrissenen und aufgerollten inneren Arterienhäute setzen dem Blutstrom ein mechanisches Hinderniss entgegen; noch mehr abet

geschieht dies durch die zu einem soliden Strang zusammengedrehte äussere Membran. Die mit der Operation verknüpfte Zerrung und Zerreiſung hat Entzündung zur Folge, und so sind die beiden Bedingungen zum definitiven Verschluss, freilich aber auch die Möglichkeit zur Verschwärung in dem zusammengedrehten Ende gegeben.

Durch die Torsion haben Manche die gewöhnliche Unterbindung ganz verdrängen wollen. Vergleicht man aber beide Mittel in Bezug auf Leichtigkeit der Ausführung und Sicherheit des Erfolges, so kann man sich einer solchen Ansicht nicht anschliessen. Es ist zunächst keineswegs leicht, die Torsion gut auszuführen; hat man doch sogar von Seiten ihrer Verehrer die ungünstigsten Resultate, welche sie in den Händen bedeutendster Chirurgen lieferte, daraus erklären wollen, dass sie nicht richtig ausgeführt worden sei! Dies ist von Bedeutung bei einer Operation, welche, da sie als Blutstillungsmittel wirken soll, doch jeder Wundarzt sofort müsste ausführen können. — Was die Sicherheit des Erfolges betrifft, so lässt die Torsion im Allgemeinen eine bessere Heilung der Wunde erwarten, weil kein fremder Körper in derselben zurückbleibt; jedoch kann das zusammengedrehte Arterien-Ende auch absterben und dann als fremder Körper wirken. In Betreff der Sicherheit des Gefässverschlusses muss anerkannt werden, dass die Torsion sich in den Händen aller Chirurgen, welche sie speciell geübt haben, als ein zuverlässiges Blutstillungsmittel bewährt hat; aber man muss doch zugestehen, dass das zusammengedrehte Gefäss-Ende sich auch aufdrehen könne¹⁾ und dass die äussere Gefässhaut, welcher hier so viel zugemuthet wird, auch reissen kann. Jedenfalls hat aber die antiseptische Ligatur bei mindestens gleicher Sicherheit den Vorzug grösserer Leichtigkeit der Ausführung. Bei Verletzungen bedeutenderer Arterien hat man daher der Unterbindung den Vorzug zu geben. Kleine Arterien mag man, je nach Bequemlichkeit, bald unterbinden, bald durch Nadeldruck, bald durch Torsion schliessen. Letzteres kann in der Tiefe einer Wunde in der That viel bequemer sein.

Neserdings haben sich namentlich Th. Bryant (Torsion of arteries etc., Med. chir. transact. LI. 1868) und Humphry (Brit. med. journ. 1868, May und 1869, Jan.) für die Torsion ausgesprochen.

In ihrer Wirkungsweise der Torsion ähnlich sind: die Zerquetschung der äusseren Gefässhäute (*mâchure*), nach Maunoir, und das Zurückdrängen (*refoulement*) derselben, nach Amussat. — Bei der *Mâchure* wird die Arterie mit einer Pincette, deren Zähne wenig scharf sein müssen, gefasst und kräftig gequetscht, so dass durch die Zerreiſung und Aufrollung der inneren Gefässhäute eine Ver-

¹⁾ Um dies zu verhüten, empfahl Mac Kinnon (New Orleans journ. of med., April 1869) das gedrehte Ende mit einer eingestossenen Nadel zu befestigen.

stopfung ihres Canals eintritt. Gewöhnlich musste man an mehreren benachbarten Stellen der Arterie diese Zerquetschung wiederholen, um nur einiger Maassen sicher zu gehen. — In ähnlicher Weise wirkt der neuerdings von Fleet Speir (New York med. record, 1871, April) angegebene Arterienschnürer, ein stumpfer Haken, dessen abgeplatteter Stiel in einer, ihn genau umfassenden Scheide auf und ab bewegt werden kann. Nachdem die zu verschliessende Arterie hervorgezogen und mit dem stumpfen Haken des Instrumentes umfasst ist, wird der letztere durch Umdrehung einer Schraube in die Scheide hineingezogen. Dadurch wird die Arterie mit grosser Kraft geknickt und eingeklemmt. Sofort wieder freigelassen, bleibt sie, nach Speir, verschlossen, wie nach der Torsion. — Um das *Refoulement* auszuführen, fasst man die Arterie mit einer Pincette und streift mit einer anderen, deren Branchen abgerundet und ungezähnt sind, indem man sie, fest an das Gefäss angedrückt, an ihm hinaufgleiten lässt, die inneren Gefässhäute aufwärts. Zugleich soll mit der ersten Pincette eine Drehung ausgeführt werden, so dass die ganze Procedur sich von der Torsion kaum noch unterscheidet. Um in der Continuität einer Arterie durch dies Verfahren Obliteration herbeizuführen, soll man das blossgelegte Gefäss mit zwei nahe an einander angelegte Pincetten fassen, die obere festhalten, die untere aber gegen die Peripherie des Gefässes hin fortschieben, um solcher Gestalt die inneren Gefässhäute im Gefässrohr umzukrümpfen und aufzurollen. — Als Gefässdurchschlingung beschrieb Stilling folgendes Verfahren. Man macht an dem blutenden Gefässe, nahe dem Ende, einen kleinen Einschnitt, führt durch diesen Spalt eine kleine gekrümmte Pincette, fasst den Wundrand der Arterie mit dieser und zieht ihn in den Spalt hinein, um ihn daselbst einzuklemmen, — was jedenfalls schwierig ist.

E. Einbringen fremder Körper. Acupunctur.

Auf Grund der bekannten Thatsache, dass unbedeutende Rauigkeiten im Gefässrohr hinreichen können, um die Bildung von Gerinnseln und dadurch Obliteration zu veranlassen, empfahl Velpeau, in die zu verschliessende Arterie oder Pulsadergeschwulst Nadeln einzustechen und dadurch die Entstehung und Festheftung von Gerinnseln herbeizuführen. Nach Velpeau's Versuchen an Thieren genügt für eine Arterie von der Dicke einer Schreibefeder eine Nadel; in grössere Gefässe muss man 2, 3, 4 oder gar 5 Nadeln einstechen. Da andere Autoren die von Velpeau gerühmte Sicherheit der Wirkung nicht bestätigen konnten, vielmehr mit Recht die Gefahr einer Blutung aus den kleinen Sticheanälen fürchten, würden wir dies Verfahren nicht besonders aufführen, wenn nicht die Electropunctur, von welcher weiter unten zu handeln sein wird, sich an dasselbe anschliesse. — In ähnlicher Weise, wie die Nadeln Velpeau's, müssen auch der Lederstreifen wirken, welchen Jameson mit einer Nadel quer durch eine Arterie hindurchführte (eine Art Haarseil), oder der Seidenfaden, welchen Magendie in das Gefässrohr solcher Gestalt einführen will, dass er darin frei flottire, während das Hineingleiten durch einen, an dem einen Ende angebrachten starken Knoten ver-

hindert wird. In dieselbe Kategorie gehört auch der Vorschlag von Strömeyer¹⁾, in ein Aneurysma indifferente Substanzen einzuspritzen, welche bei mässiger Erhitzung schmelzen, in der Temperatur des Körpers aber wieder fest werden, wie namentlich Wallrath. Aeusserst schwierig muss es in diesem Falle sein, die Entfernung zur rechten Zeit vorzunehmen, so dass einer Seits Verschluss der Communicationsöffnung des Aneurysma durch Bluteoagula, und anderer Seits doch keine Eiterung zu erwarten steht.

Das Kneten der Pulsadergeschwülste in der Absicht, Gerinnsel abzulösen, welche, durch den Blutstrom fortgetrieben, die Arterie verstopfen sollen (eine Nachahmung der pag. 103 unter 4. erwähnten Naturheilung), hat nur sehr selten zum Ziele geführt.

II. Blutstillungsmittel, welche vorzugsweise auf chemischem Wege Gerinnung des Blutes und dadurch Verschluss des Gefässes bedingen.

Die meisten der zu dieser Gruppe gehörenden Mittel sind pharmaceutische (*Medicamenta styptica*). Diese wirken nur dann, wenn sie mit dem Blute selbst in Berührung kommen. Man wendet dieselben entweder in Auflösungen oder, was gewöhnlicher ist, als Pulver an. Im ersteren Falle werden sie in Wunden und besonders in Höhlen, aus denen eine Blutung erfolgt, eingespritzt oder Charpiebäusche damit getränkt; im letzteren streut man sie auf die blutenden Gefässe theils direct, theils indem man sie einem Tampon einverleibt. Um das Haften in der Wunde zu sichern, mischt man ihnen auch Gummi und Harze bei, denen Manche eine specifische Wirksamkeit zuschreiben. — Unter den Mitteln dieser Reihe erfreuen sich eines besonderen Rufes: Gerbsäure (Tannin), Alaun²⁾, schwefelsaures Kupfer, schwefelsaures Eisen, Chloreisen, Höllenstein, Schwefelsäure, Alkohol. Gegen Blutungen aus grösseren Arterien sind alle diese Stoffe, selbst wenn man sie, wie in alter Zeit geschah, als kleine Pfröpfe in die Oeffnung einer Arterie einführen wollte, unzulänglich. Wo es gelingen ist, durch diese Mittel arterieller Blutungen Herr zu werden,


¹⁾ Handbuch der Chirurgie, Bd. I., pag. 399 u. f.

²⁾ Alaun ist ein Hauptbestandtheil vieler hämostatischer Flüssigkeiten, insbesondere auch des vorzüglich von Sédillot (*Gaz. méd. de Paris*, 1852, Mai) gerühmten Pagliarischen Wassers. Zur Darstellung desselben werden $\frac{1}{2}$ Pfund Benzocöcarz und 1 Pfund Alaun mit 10 Pfund Wasser sechs Stunden lang, unter stetem Umrühren und Ersatz des verdampften Wassers durch anderes heisses Wasser, gekocht, und die Flüssigkeit endlich filtrirt. Die Wirksamkeit dieses Blutstillungsmittels hat sich nicht in dem Grade bestätigt, wie Sédillot sie rühmt; jedenfalls hat es die unangenehme Eigenschaft, die Heilung durch *prima intentio* in Wunden, welche damit benetzt sind, zu verhindern.

da hat immer die (bewusst oder unbewusst) zugleich angewandte Compression die Hauptsache gethan.

Mit der grössten Sicherheit bewirkt unter allen hierher gehörigen Mitteln das Eisenchlorid (*Perchlorure de fer*, *Liquor ferri sesquichlorati*) Gerinnung des mit ihm in Berührung kommenden Blutes.

Fig. 14.



Dies Mittel ist deshalb auch nicht blos zur Tränkung von Tampons, mit denen man Blutungen aus kleineren Arterien stillt, sondern, nach dem Vorschlage von Pravaz, auch zu Einspritzungen in Pulsadergeschwülste angewandt worden. Man benutzt dazu einen höchst feinen Troicart (Fig. 14), welcher in die Geschwulst eingestossen wird und dessen Canüle am äusseren Ende so eingerichtet ist, dass, nach Zurückziehung des Stilets, eine mit Platinansätzen versehene gläserne Spritze aufgeschraubt werden kann¹⁾. Diese fasst genau 1 Gramme des *Liquor ferri sesquichlorati*; ihr Stempel wird durch Umdrehung des

in der Art vorwärts geschoben, dass jede halbe Umdrehung $\frac{1}{30}$ Gramme aus der Spritze in die Canüle und somit schliesslich auch in das Aneurysma eintreibt. $\frac{1}{2}$ Gramme des *Liquor ferri sesquichlorati* zu 30 Grad Beaumé reicht hin, um ein Centiliter defibrinirtes Blut zur Gerinnung zu bringen. Man erreicht dasselbe Resultat, wenn man statt dessen etwa $\frac{1}{2}$ mal so viel (20 Umdrehungen) von einer schwächeren Lösung zu 15 Grad Beaumé anwendet, und diese letztere Lösung gewährt den grossen Vortheil, dass sie nicht in dem Grade reizend (Entzündung erregend) einwirkt, wie die concentrirte²⁾. Setzt man sofort eine grössere Quantität der Lösung dem bereits gebildeten Gerinnsel hinzu, so löst sich dies wieder auf oder wird wenigstens

¹⁾ Neuerdings werden diese, von Pravaz in Lyon 1850 angegebenen „Pravazschen Spritzen“, deren man sich ungleich viel häufiger zu hypodermatischen Einspritzungen als zu Injectionen in Aneurysmen bedient, zu ersterem Behuf sehr zweckmässig (nach Lührer) so construirt, dass die Canüle eine lanzettförmige Spitze besitzt und der Stempel nicht durch Drehungen, sondern durch Zug und Druck bewegt wird. Es bedarf dann weder eines Stilets noch des zeitraubenden Aufschraubens.

²⁾ Die von Piazza (*Ebdomadario clinico*, Bologna 1863) empfohlene Mischung der Eisenchloridlösung mit gleichen Theilen einer concentrirten Kochsalzlösung scheint mir keine Vortheile darzubieten.

eder weicher. Man muss daher die anzuwendende Menge genau rechnen und lieber Anfangs zu wenig, als zu viel einspritzen. Vor m Beginn der Einspritzung muss oberhalb und unterhalb des eurysmatischen Sackes die Arterie comprimirt werden. Die Spitze r Canüle muss bis in die Mitte des Aneurysma eingeschoben wer- n. Nachdem die für zureichend erachtete Menge der Eisenlösung ngetrieben ist, hält man die Spritze etwa eine Minute lang still, um e Gerinnung des mit dem Eisenchlorid in Berührung kommenden lutes abzuwarten. Demnächst sucht man die Gerinnsel durch rücken und Kneten der Geschwulst in derselben zu vertheilen, wobei ch weitere Gerinnungen eintreten. Erscheint die Geschwulst nach nigen Minuten nicht hinreichend fest, so wiederholt man die Ein- ritzung und führt damit nöthigen Falls in Zwischenräumen von fünf inuten so lange fort, bis man den hinreichenden Grad von Festig- it erreicht hat. Dann dreht man den Stempel der Spritze um einen llen Schraubengang rückwärts, um zu verhüten, dass nicht beim usziehen der Canüle ein Theil ihres Inhalts den kleinen Wundcanal enetze, wodurch Eiterung in demselben veranlasst werden würde. ndlich wird die Canüle sammt der Spritze mit einem Ruck ausge- egen, während die Finger der linken Hand die Haut fixiren; die mpression oberhalb des Aneurysma wird aber noch wenigstens 25 inuten lang fortgesetzt, um der Ausbildung und gleichmässigen An- gerung der Gerinnsel volle Zeit zu lassen. Bleibt die Geschwulst, achdem die centrale Compression aufgehoben ist, hart und pulsirt eicht, so kann man die Operation als gelungen betrachten und hat un nur die etwa nachfolgende Entzündung zu bekämpfen. Eine iederholung der Einspritzungen ist immer erst nach Ablauf der ent- ndlichen Erscheinungen zulässig, sofern solche überhaupt auftreten.

Eisenchlorid bewirkt nicht blos Gerinnung des Blutes, sondern t auch ein heftiges Reiz- und, bei stärkerer Concentration, Aetz- ittel. Die Gefahren der Eiterung und der Gangrän liegen deshalb ahe. Durch die dreiste Anwendung desselben in Wunden ist schon el Unheil angerichtet worden.

B. Kauterisation. Ferrum candens.

Die Kauterisation wird zum Behufe der Blutstillung fast aus- schliesslich mit dem glühenden Eisen vorgenommen. Jedoch bietet die Galvanokaustik auch in dieser Beziehung die Vortheile dar, welche von ihr im Allgemeinen (Bd. I. pag. 105 u. f.) gerühmt wurden. Die Glühhitze war das hauptsächliche Blutstillungs-Mittel der Alten und wurde nur sehr allmähig durch die zwar schon von Hippokrates,

Archigenes u. A. angewandt, aber doch erst von Ambroise Paré wieder eingeführte Ligatur verdrängt. Jedenfalls ist das glühende Eisen, wenn auch keineswegs das sicherste, doch für viele Fälle ein wichtiges Blutstillungsmittel, zuweilen das einzig mögliche. Immer aber wird es nur auf blutende Gefäße (und zwar mit Aussicht auf Erfolg nur auf mittlere und kleine), niemals zum Behufe des Verschlusses einer Arterie in ihrer Continuität anzuwenden sein. Für alle hämostatischen Zwecke ist es zweckmässig, sich eines nur schwach rothglühenden Eisens zu bedienen und dieses nicht andauernd, sondern stossweise auf die blutenden Gefässmündungen aufzusetzen (Bouchacourt). Nicht blos die durch die Hitze bedingte Gerinnung des Blutes, sondern besonders auch die Schrumpfung und Aufrollung der Gefäss-Häute in das Gefäss-Rohr hinein bedingen die Stillung der Blutung.

Zur Behandlung von Aneurysmen konnte das Glüheisen nur zu einer Zeit, wo man von der Natur dieser Geschwülste noch keine richtige Vorstellung hatte, als ein allgemein anwendbares Mittel empfohlen werden¹⁾. Nur wenn die Geschwulst so klein ist, dass man sie durch das Aufsetzen²⁾ des glühenden Eisens oder Platins sofort ganz zerstören und die Kauterisation bis auf die Arterie in hinreichender Stärke anwenden kann, um deren Verschluss sicher zu bewirken, wird man heut zu Tage noch Gebrauch davon machen dürfen³⁾. — Auch mit Aetzmitteln hat man einige, jedoch nicht zur Nachahmung auffordernde Versuche bei Aneurysmen gemacht.

C. Electropunctur, Galvanopunctur.

Die Anwendung der Electricität zum Behufe des Verschlusses von Arterien und insbesondere von Aneurysmen ist erst in neuester

¹⁾ Lanfranchi (1300) soll, nach der Angabe von Sprengel (in dessen Geschichte der Medicin), die Anwendung des glühenden Eisens auf die vorher nicht geöffnete Pulsadergeschwulst empfohlen haben. Liest man genauer nach, so findet man, dass gar nicht von Aneurysma, sondern von Varix die Rede ist (vgl. Broca, l. c. pag. 221). — Das Einbringen von Aetzmitteln in die geöffnete Geschwulst, eine Modification der Methode des Antyllus, war schon früher angewandt worden. — Marc. Aurel. Severinus (1641) soll, (wie auch Broca, l. c., angiebt) durch das Glüheisen ein Aneurysma geheilt haben. Bei näherer Betrachtung dieses Falles ergibt sich aber: 1) dass es gar nicht erwiesen ist, dass es sich wirklich um eine Pulsadergeschwulst gehandelt habe, und 2) dass das Glüheisen erst angewandt wurde, als die Geschwulst schon brandig war. — In anderer Weise wandte Everard Home die Hitze mit glücklichem Erfolge zur Heilung eines Aneurysma an, indem er eine Nadel in dasselbe einstach und diese mittelst einer unter den hervorragenden Theil derselben gehaltenen Spirituslampe erhitze. Dies Verfahren bildet den Uebergang zur Electropunctur.

²⁾ Vgl. den Fall von Teirlinck (Bull. de Thérap., 1854), in welchem es sich um ein kleines Aneurysma der Arteria palatina descendens handelte.

nicht worden. Guérard soll zuerst den Vorschlag gemacht (1838) sie zuerst wirklich angewandt haben³⁾. Nach wäre Pravaz der Urheber dieses Verfahrens. Am Eifrigsten Electricität von Pétrequin³⁾ empfohlen worden, nachdem eine oft italienischer Aerzte unter der Leitung von Strambio³⁾ Versuche an Thieren über die Obliteration der Gefässe galvanopunctur angestellt hatte. In Deutschland hat ihr beschuldigung Geltung verschafft⁴⁾.

Verfahren bei der Electropunctur ist folgendes. Eine, scharf zugespitzte Nadeln von Stahl oder Platina, welche in der Nähe der Spitze genau mit Firniss, Hartgummi oder (am besten) Email überzogen sind, werden in das zu obliterirende Stück des Gefässes in einiger Entfernung von einander, parallel mit der Richtung des Gefässes so eingestochen, dass die Spitzen dem Blutstrome gegenüber gerichtet sind. Mit der einen dieser Nadeln wird darauf der positive, mit der anderen der negative Pol einer constanten galvanischen Batterie in Verbindung gesetzt. Der Strom wird durch die Nadeln bis in das Innere des Gefässes geleitet. Hier springt der Strom von einer Nadelspitze zur anderen über und durchdringt also das Gefässe befindliche Blut, wodurch die Gerinnung des Blutes und zwar um so schneller und sicherer veranlasst wird, wenn die Nadelspitzen nicht zu nahe beisammen stehen und die mit dem positiven Pol in Verbindung stehende Nadel etwas weiter gegen den Strom vorgeschoben ist, als die negative. Die Dauer der Operation, je nach der Grösse des Gefässes (oder Aneurysma), verhält sich umgekehrt, je nach der Grösse des Gefässes, verhältnissmässig, je länger sein, 5—45 Minuten; auch ist es nothwendig, bei Aneurysmen mehrere Nadel-Paare anzuwenden und die Operation mehrmals zu wiederholen. Letzteres ist besonders in solchen Fällen, wo eine lange fortgesetzten Einwirkung der Electricität vorzuziehen,

wo der Kranke heftige Schmerzen empfindet, oder von Muskellähmung befallen wird; beides dürfte jedoch nur dann beobachtet werden, wenn entweder ein zu starker Strom in Anwendung gebracht wird, oder die Nadeln nicht dauerhaft mit einer isolirenden Substanz bezogen waren. Vor der Operation und mindestens eine

¹⁾ Magaigne, Médecine opératoire, V. édition, pag. 189.

²⁾ Sur une nouvelle méthode pour guérir certains anévrysmes sans opération et à l'aide de la galvanopuncture, par J. E. Pétrequin, Prof. à Lyon, 1846, und Clinique chirurg. de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Paris 1850.

³⁾ Schmidt's Jahrb. Bd. 60, pag. 145, Auszug aus Gazzetta med. di Milano 1847.

⁴⁾ In der neuesten Literatur ist namentlich die Arbeit von J. Duncan (on the applicat. of electricity, Edinb. med. journ. 1871. Dec.) zu erwähnen.

halbe Stunde nach derselben, muss die Arterie oberhalb und unterhalb der Geschwulst (so weit dies der Localität nach möglich) vollständig comprimirt werden. Nach der Operation sind überdies kalte Umschläge und absolute Ruhe nothwendig. Die Electropunctur darf erst nach Ablauf aller Entzündungserscheinungen wiederholt werden.

Sowohl die Electropunctur, als auch die coagulirenden Einspritzungen können mit der dauernden Compression¹⁾, sowie nöthigen Falls mit der Unterbindung, namentlich nach der Brasdor'schen Methode, combinirt werden.

Arterien, welche man durch Electropunctur verschliessen will, müssen, wenn sie nicht ganz oberflächlich liegen, vor der Einführung der Nadeln blossgelegt werden, um des Erfolges sicher zu sein. Handelt es sich um ein Aneurysma, so wird in den meisten Fällen eine Entblössung desselben sich umgehen lassen; man sucht aber beim Einführen der Nadeln solche Stellen, an denen man Nervenäste zu vermuthen hat, sorgfältig zu vermeiden.

Ueber die Entstehung des Gerinnsels unter dem Einfluss eines galvanischen Stromes haben besonders Steinlin und Broca Untersuchungen angestellt. Die Gerinnung erfolgt durch Zersetzung des Blutwassers und der Blutsalze, durch welche das Albumin gelöst gehalten wird, und zwar fast ausschliesslich um die mit dem positiven Pol in Zusammenhang stehende Nadel. Dort scheidet sich auch der Sauerstoff ab und bedingt eine Oxydation der Nadel, sofern man nicht Platin angewandt hat, während am negativen Pole sich stets etwas Wasserstoffgas entwickelt. Bemerkenswerth ist, dass die durch Electropunctur erzeugten Gerinnsel weich sind und erst durch Anlagerung neuer Schichten, welche um sie, wie um jeden anderen fremden Körper, innerhalb der Arterien sehr bald erfolgt, die erforderliche Festigkeit gewinnen.

Der Heilungsvorgang nach der Anwendung der Electropunctur ist dadurch ausgezeichnet, dass die Gerinnung des Blutes ohne eine irgend bedeutende Insultation der Gefässwände zu Stande kommt. Nur zuweilen beobachtet man an den Einstichpunkten eine oberflächliche Verschwärung, welche offenbar von einer ungenügenden Isolation der Nadeln herrührt. Ein Aneurysma wird nach gehöriger Anwendung der Electropunctur sehr bald hart, die Pulsation in ihm hört auf, und die Geschwulst wird allmählig immer kleiner. Man befördert die Zusammenziehung und Resorption durch Anwendung der Kälte. — Zum Verschluss blutender Gefäss-Enden ist die Electropunctur, wegen des mit ihrer Ausführung verknüpften Zeitverlustes, nicht verwendbar, dagegen kann sie bei der Behandlung von Aneurysmen sowohl zum Verschlusse der Geschwulst selbst durch Coagulation

¹⁾ So z. B. in dem Fall von Brandis und Schumacher (Heilung eines Aneurysma femorale durch Instrumentalcompression und Galvanopunctur, Aachen, 1873.)

ihres Inhaltes, als auch zur Obliteration der erkrankten Arterie benutzt werden.

Die Tabelle, in welcher Meschede (vgl. dessen Dissertation „De Electropunctura“, Greifswald 1836) die bis dahin bekannt gewordenen Fälle von Anwendung der Electropunctur bei Aneurysmen zusammengestellt hat, führt zu dem Ergebniss, dass unter 46 in dieser Art behandelten Aneurysmen 23 in der glücklichsten Weise geheilt wurden. In 6 Fällen erfolgte der Tod und in 11 anderen blieb der Erfolg unentschieden. In 5 Fällen schien die Electropunctur guten Erfolg zu versprechen, aber die Patienten wollten sich derselben wegen der grossen Schmerzhaftigkeit nicht hinreichend lange unterwerfen. In einem Falle endlich ist die Diagnose zweifelhaft. Somit bleiben eigentlich nur 40 Fälle zur Vergleichung übrig, unter denen 23 günstige. Der ungenügende oder schlechte Erfolg der übrigen ist nur zum geringen Theil der Methode selbst zur Last zu legen; es finden sich darunter Fälle, in denen man Nadeln von der Dicke einer Stricknadel (!) anwandte, oder die Nadeln acht Tage lang in der Geschwulst stecken liess, oder die Operation Tag für Tag wiederholte oder Aneurysmen der Aorta ascendens mit Electropunctur behandelte.

III. Blutstillungsmittel, welche wesentlich durch Erregung der Contraction der Gefässe wirken.

Es ist unzweifelhaft, dass alle bisher aufgeführten Blutstillungsmittel, indem sie die Gefässwandungen mehr oder weniger reizen, auch Zusammenziehung derselben bedingen; aber ihre wesentliche Wirkung ist noch eine andere und viel intensivere, so dass die eben angedeutete daneben verschwindet. Bei den Mitteln, welche jetzt zu erwähnen sind, ist dagegen eine andere Art der Wirksamkeit gar nicht oder doch nur in geringem Grade zu bemerken. Die Reihe derselben eröffnet, als das wirksamste von ihnen, die Kälte, welche am Zweckmässigsten durch Eis angewandt wird. — Unbedeutendere Blutungen werden schon durch kaltes Wasser gestillt; handelt es sich aber um Verletzungen grösserer Arterien, so reicht auch das Eis nicht aus. Noch weniger leisten die übrigen hierher gehörigen Mittel: die Ergotinlösung (nach Bonjean), das Brocchieri'sche, Chappelin'sche, Binelli'sche (Kreosot-), Pagliari'sche Wasser (vgl. pag. 145), oder die Abkochungen verschiedener Harze in Wasser. — Bei der Behandlung der Aneurysmen kann die Anwendung des Eises gute Dienste thun. Es wird dadurch die Zusammenziehung der Geschwulst und der Arterie angeregt und zugleich, vermöge der Wärme-Entziehung, die Gerinnung des Blutes begünstigt. Ob ein Aneurysma durch die Anwendung der Kälte allein geheilt werden könne, erscheint fraglich, obgleich einzelne Fälle der Art aufgeführt werden. Bei zu lange fortgesetzter Anwendung könnte das Auflegen von Eis zum Brande führen. — Unter den inneren Mitteln, welche wesentlich durch Erregung von Gefässcontractionen wirken sollen, verdient nur das Mutter-

korn und das aus ihm dargestellte wässrige Extract (Ergotin) besondere Erwähnung, insofern B. v. Langenbeck die hypodermatische Einspritzung desselben zur Heilung von Aneurysmen empfiehlt¹⁾.

Specielle Behandlung der Pulsadergeschwülste²⁾.

Die Wahl unter den verschiedenen Methoden, welche zur Heilung von Aneurysmen empfohlen worden sind, muss einerseits auf die Beschaffenheit der Geschwulst, andererseits auf ihre Localität Rücksicht nehmen. Keine unter allen verdient unbedingt den Vorzug; jede hat ihren Wirkungskreis und ist andererseits auch wieder jenseit desselben unwirksam oder selbst nachtheilig. So gestattet z. B. unzweifelhaft die Methode von Valsalva die ausgedehnteste Anwendung, und doch ist sie vollkommen unwirksam, wenn es sich um ein Aneurysma arterioso-venosum handelt; die Methode des Antyllus gewährt eine grosse Sicherheit für die Mehrzahl der Fälle, aber sie ist schwer auszuführen bei Aneurysmen des Halses, der Achselhöhle, der Schenkelbeuge, und höchst gefährlich bei allen grossen Aneurysmen; die Methode von Brasdor ist nur für solche Aneurysmen erfunden, auf welche die Hunter'sche Methode keine Anwendung finden kann, und die indirecte Compression kann ihre Vorzüge nur bei Aneurysmen der Extremitäten geltend machen. Dass die Valsalva'sche Methode andererseits viel weniger wirksam ist, als irgend eine andere, dass die Hunter'sche Methode eine grössere Sicherheit gewährt, als die Brasdor'sche, und dass die indirecte Compression wiederum weniger gefährlich ist, als eine Unterbindung, — dies Alles ergibt sich schon aus unseren früheren Erläuterungen. Können wir also auch im Allgemeinen sagen, dass die minder gefährliche Operation im Allgemeinen vor der gefährlicheren den Vorzug verdient und dass somit die Compression des zuleitenden Gefäss-Stammes³⁾ — unterstützt durch die Anwendung des Eises — eher anzuwenden sein wird, als irgend eine Unterbindung, so wird sich doch bei der speciellen Betrachtung ergeben, dass von diesem allgemeinen Satze vielfach abgewichen werden muss.

A. In Bezug auf die einzelnen Arten der Pulsadergeschwülste muss man vor Allem

¹⁾ Berl. klin. Wochenschrift 1869. No. 12. Es wurden p. dosi 0, 18 Grmm. einer Lösung von Extr. secal. aquos. 2, 5 in Spirit. vin. und Glycerin ñã 7, 5 injicirt. Ich habe mehrere Fälle gesehen, in denen dies Verfahren erfolglos geblieben war. Eine Heilung durch dasselbe ist mir noch nicht vorgekommen.

²⁾ Vgl. Broca, Des anévrysmes. Paris 1856, pag. 877 u. f.

³⁾ Vgl. Georg Fischer, Digitalcompression und Flexion bei Aneurysmen, Prag^{et} Vierteljahrschrift, 1869.

I. das Aneurysma arterioso-venosum von den übrigen trennen. Wenn dasselbe (wie gewöhnlich) keine besonderen Beschwerden macht, namentlich nicht stetig wächst, so genügt es, dasselbe durch Verbände vor Insulten zu schützen und leicht zu comprimiren. Anderen Falls muss man sich zur Operation entschliessen. Der Unterbindung der Arterie wird man um so lieber ausweichen, je länger die Geschwulst schon besteht, weil desto mehr zu befürchten ist, dass wegen der Veränderungen, die das Arterien Gewebe erlitten hat, Ligaturen frühzeitig durchschneiden und dann Nachblutungen erfolgen. Sonst ist die doppelte Unterbindung (oberhalb und unterhalb der Geschwulst) das beste Operationsverfahren. Nur in dem Fall, dass zwischen diesen beiden Ligaturstellen, also im Bereich der Geschwulst, ein Collateralast mündete und somit das Aneurysma wieder mit Blut gefüllt würde, wäre die Spaltung und Tamponade der Geschwulst (nach Antyllus) indicirt. Von der indirecten Unterbindung ist weniger Erfolg zu erwarten¹⁾; dagegen wird man, wenn nach den anatomischen Verhältnissen die doppelte Ligatur der Arterie allzu schwierig und gefährlich erscheint, die Unterbindung der Vene dicht oberhalb und dicht unterhalb der Communicationsstelle zu versuchen haben. Der schöne Erfolg, welchen Stromeyer in einem Falle der Art, wo die indirecte Unterbindung (der Carotis) früher vergeblich ausgeführt worden war, hierdurch erzielt hat, berechtigt sogar zu der Frage, ob diese Methode nicht in allen Fällen von Varix aneurysmaticus bevorzugt werden soll, in denen sich bereits eine bedeutende Verdickung der Venen- und voraussichtlich also auch eine entsprechende Verdünnung der Arterien-Häute entwickelt hat. Wahrscheinlich werden hiernach Nachblutungen weniger leicht entstehen, als nach der doppelten Unterbindung der Arterie, da die Wandungen der Venen an Widerstandsfähigkeit gewonnen haben²⁾.

II. Für die reinen arteriellen Aneurysmen gilt zunächst Alles, was wir über Pulsadergeschwülste im Allgemeinen ausgesagt haben. — Entschliesst man sich zur Ligatur, so soll man bei dem endogenen Aneurysma die Nähe der Geschwulst vermeiden, weil voraussichtlich dieser Theil der Arterie erkrankt sei. Diese Voraussetzung wird jedoch weder nach der einen, noch nach der anderen Seite durch die Erfahrung ganz bestätigt. Bei endogenen Aneurysmen kann

¹⁾ In einem Fall von hühnereigrossem Aneurysma varicosum in der Ellenbeuge habe ich jedoch durch einfache Unterbindung der A. brachialis in der Mitte des Oberarms vollständige Heilung erzielt.

²⁾ In Betreff der Vorzüge der Unterbindung mit carbolisirten Darmsaiten vgl. pag. 118 u. 127.

der Gefässstamm in seiner ganzen Länge bis in die Aorta hinein krank sein, oder das Atherom kann sich auf einzelne Stellen beschränken; letzteres kann aber ebenso gut in grösserer Entfernung vom Aneurysma, als in unmittelbarer Nähe der Fall sein. Andererseits ist man beim traumatischen Aneurysma keineswegs sicher, das Gefäss dicht an der Geschwulst gesund zu finden¹⁾. Häufig genug traf die Verwundung, die zur Bildung des Aneurysma Veranlassung gab, eine bereits erkrankte Arterie.

Das diffuse traumatische Aneurysma erfordert, wie es, seinen anatomischen Verhältnissen nach, von den übrigen wesentlich verschieden ist, so auch in therapeutischer Beziehung eine besondere Berücksichtigung. Die blutige Infiltration nimmt zwar, wenn die verletzte Arterie verschlossen wird, nicht weiter zu; aber das bereits ergossene Blut macht seine übeln Wirkungen auf die umgebenden Theile weiter geltend. Die für die Unterbindung erforderliche Incision bedingt sogar (wenn man nicht streng antiseptisch verfährt) eine Verschlimmerung, da sie dem Zutritt der Luft den Weg öffnet. Handelt es sich um eine Verletzung des Arterienstammes einer Extremität, so ist der Verschluss derselben, so nothwendig er auch für die Erhaltung des Lebens erscheinen mag, doch für die Extremität gefährlich, weil zur Herstellung des collateralen Kreislaufs, wegen der durch den Bluterguss bedingten Compression der kleineren Gefässe, wenig Aussicht ist. Kommt der Arzt früh genug hinzu, bevor noch ausgebreitete Entzündung oder gar Gangrän eingetreten ist, so muss er, nachdem durch Compression an der Wurzel der Extremität eine weitere Blutung verhütet ist, mit einem grossen Einschnitt die Geschwulst in der Richtung der voraussichtlich verletzten Arterie spalten, die Arterienwunde aufsuchen und dicht oberhalb, sowie dicht unterhalb derselben eine Ligatur anlegen. Meist wird es sich empfehlen, die Arterie zwischen beiden Ligaturen zu durchschneiden (vgl. pag. 124). Die Blutgerinnsel werden so viel als möglich entfernt, zu welchem Behuf noch andere Einschnitte erforderlich werden können, durch welche jedoch die wesentlichen Collateraläste nicht gefährdet werden dürfen. Erscheint das Auffinden des verletzten Gefässes, namentlich bei sehr tiefer Lage desselben, unmöglich, oder wegen anderweitiger Complication der Wunde (namentlich durch einen Knochenbruch) unzulässig, so entschliesst man sich zur Unterbindung oberhalb der Stelle der Verletzung, die jedoch, wie bereits erläutert, viel unsicherer ist. Zeigt sich, dass die Compression Seitens des infiltrirten Blutes bereits zu

¹⁾ Dass dies nicht immer der Fall ist, beweist die lehrreiche Beobachtung von Günther, *Jenaische Annalen für Physiol. u. Med.*, Bd. II. pag. 373 u. f.

stark und zu lange eingewirkt hat, um noch Aussicht auf Wiederherstellung des Kreislaufs zu gewähren, so muss ohne Verzug oberhalb der infiltrirten Gewebe amputirt werden. Dies ist gleichfalls nothwendig, wenn schon bei äusserlicher Untersuchung eine pralle, harte Entzündungsgeschwulst oder beginnende Gangrän in der Umgebung des Blutergusses sich finden.

B. Durch Complicationen des Aneurysma können wesentliche Abweichungen in der Behandlung nothwendig werden.

1. Die Geschwulst ist nach Aussen geplatzt. Die Behandlung ist vor Allem gegen die Blutung zu richten: Compression oberhalb der Geschwulst, Erweiterung der Oeffnung des Sackes, Entleerung der Gerinnsel, Tamponade mit Chloreisen, Unterbindung nach Antyllus, wenn ausführbar, sonst nach Hunter.

2. Das Aneurysma ist unter der Haut geplatzt (diffus geworden). Die Verhältnisse sind denen des Aneurysma traumaticum diffusum (primarium) analog, die Behandlung ist dem entsprechend einzuleiten, namentlich darf, wenn blutige Infiltration eines ganzen Extremitäten-Abschnitts (Oberschenkel, Oberarm u. s. f.) entstanden ist, mit der Amputation nicht gezögert werden.

3. Complication mit Entzündung und deren Ausgängen. Obgleich die Heilung auf diesem Wege erfolgen kann, so sind die Gefahren doch so gross, dass man die Entzündung unter allen Umständen bekämpfen muss. In leichteren Fällen genügt ruhige Lage, Eis, Compression des zuleitenden Arterienstammes, sofern sie anwendbar ist. Steigert sich die Entzündung zu einer solchen Heftigkeit, dass die Bildung eines Abscesses in der Wand des Aneurysma oder in deren unmittelbarer Nähe befürchtet werden muss, oder beginnt bereits Gangrän in der Umgebung der Geschwulst, so muss man Alles aufbieten, um die Ruptur des Sackes zu verhüten. Bestehen dabei die Pulsationen im Aneurysma unverändert fort, so muss man ohne Verzug zur Unterbindung schreiten, am Besten, wenn die localen Verhältnisse es gestatten, nach der Methode von Antyllus. Sind Pulsationen in der Geschwulst nur undeutlich oder gar nicht wahrzunehmen, so wird man in der Hoffnung auf die unter dem Einfluss der Entzündung allerdings mögliche Naturheilung leicht verführt, statt einer eingreifenden Behandlung blos die indirecte Compression anzuwenden. Dabei ist aber die grösste Vorsicht nothwendig, da auch solche Geschwülste, in denen die Pulsation nur undeutlich wahrzunehmen ist, doch ganz unerwarteter Weise aufbrechen und, wenn nicht sofort Hilfe geleistet wird, zu einer tödlichen Blutung Veranlassung geben können. Ist

das Aneurysma sehr gross und bereits in weiter Ausdehnung von nekrotisirenden Geweben umgeben, so muss (an einer Extremität) amputirt werden.

4. Entsteht an einer Extremität, in Folge eines Aneurysma, Gangrän der Finger, Zehen u. s. f., so lässt sich bestimmt voraussetzen, dass die Pulsadergeschwulst bereits durch Gerinnsel ausgefüllt sei. Die Amputation wird also nur unter denselben Verhältnissen nöthig, wie beim Brande durch Verstopfung der Arterien. Wo möglich wird man, wenn auch der Brand sich unterhalb des Aneurysma begrenzt haben sollte, nicht nahe unterhalb des Aneurysma amputiren, weil der mit Gerinnseln gefüllte Sack durch die auf ihn übergreifende Entzündung in Verjauchung gerathen könnte.

5. Complication mit Entzündung eines benachbarten Gelenkes indicirt zunächst neben der indirecten Compression die Anwendung des Eises, — sobald sich aber (zumal im Kniegelenk) Eiterung im Gelenk eingestellt hat, die Amputation.

6. Durchbruch des Aneurysma in eine Gelenkhöhle (namentlich das Kniegelenk) lässt eine andere Behandlungsweise als die Amputation nicht zu. Der Durchbruch selbst lässt Zerstörungen in der Tiefe voraussetzen, die, wenn auch vielleicht durch indirecte Compression oder Unterbindung die Bildung von Gerinnseln bewirkt werden könnte, doch keine Heilung erwarten lassen.

7. Als Complication kann auch das gleichzeitige Bestehen mehrerer Aneurysmen betrachtet werden. Betreffen beide denselben Gefässstamm, so leitet man die Behandlung, wo möglich, zuerst gegen das dem Herzen näher gelegene ein.

Wenn das eine der vorhandenen Aneurysmen ein inneres, das andere ein äusseres ist, so liegt in diesem Umstande kein absolutes Verbot der Operation des äusseren. Der Grund, weshalb man unter diesen Umständen die Operation früher vermied, lag in der Besorgniss, dass die Obliteration einer äusseren Arterie das Wachstum und selbst den Aufbruch des inneren Aneurysma befördern könne. Die Fälle, in denen nach der Operation einer äusseren Pulsadergeschwulst innere Aneurysmen geborsten sind, gehören aber zu den seltensten, — vielleicht, weil unter diesen Umständen die Operation nicht häufig vorgenommen worden ist¹⁾. Aus allgemeinen Gründen erscheint es nicht

¹⁾ Tiedemann (Verengung und Schliessung der Pulsadern, pag. 128) kann trotz des grossen literarischen Reichthums seiner Arbeit doch nur zwei Fälle von Berstung einer inneren Pulsadergeschwulst (an der Aorta) nach Unterbindung einer äusseren Arterie aufführen, nämlich: Burns, on diseases of the heart, pag. 226, und London Medical Review, T. II. pag. 420.

nothwendig, dass die Unterbindung einer äusseren Arterie, wenn sie gleich vorübergehend eine stärkere Anfüllung der übrigen Pulsadern bedingt, jenen üblen Erfolg haben müsse. Das Blut, welches in der Hauptarterie eines Gliedes Hindernisse findet, tritt alsbald in die Seiten-Aeste über, welche überall zum Ersatz des unterbundenen Gefässes eine anastomotische Kette bilden; ein Zurückstauen des Blutes gegen den Stamm findet nicht nothwendig Statt.

Soll man bei dem Vorhandensein zweier Aneurysmen, an verschiedenen Gliedern, die Operation beider gleich nach einander, oder nach längerer Zwischenzeit machen? Sofern man unter „Operation des Aneurysma“ schlechtweg die Unterbindung versteht, thut man wohl besser, die zweite Operation so lange zu verschieben, bis der Kranke von der ersten genesen ist. Die Compression kann unbedenklich an zwei Extremitäten gleichzeitig unternommen werden; ebenso die Flexion, die Anwendung des Eises, die hypodermatische Injection von Ergotin. Dagegen sind die Einspritzungen von Chloreisen und die Galvanopunctur, wegen der möglichen üblen Folgen, der Unterbindung gleich zu achten.

Zweite Abtheilung.

Von den Krankheiten und der Unterbindung der einzelnen Arterienstämme¹⁾.

Erstes Capitel.

Truncus anonymus s. brachiocephalicus s. cleidocaroticus.

I. Anatomie.

Der Truncus anonymus verläuft in der Richtung einer Linie, die man von der Mittellinie des Brustbeins, 25 Mm. unterhalb seines oberen Randes anfangend, zum rechten Sternoclavicular-Gelenk gezogen denkt. Seine Länge beträgt ungefähr 2 Centim. seine Dicke 10—12 Mm. — Die Vena anonyma sinistra verläuft quer vor ihm; die Thyms-Drüse (bei Kindern) sowie die Insertionen der MM. sternobyoideus und sterno-

¹⁾ Diese Abtheilung soll die durch locale Verhältnisse bedingten Eigenthümlichkeiten der Erkrankung der einzelnen Arterien und das zu ihrer Unterbindung (Blosslegung) erforderliche Verfahren schildern; jedes Capitel wird den Namen einer Arterie als Ueberschrift tragen und in eine anatomische, eine pathologische und eine operative Unterabtheilung zerfallen.

thyreoideus liegen in dem Raume zwischen ihm und dem Brustbein. Er steigt schräg vor der Luftröhre aufwärts; von der rechten Lunge ist er an seiner äusseren Seite nur durch die Pleura getrennt. Nach Innen liegt ihm Anfangs die linke Carotis ziemlich nahe; weiter aufsteigend entfernen sich beide Gefässstämme immer mehr von einander, indem sie die Luftröhre zwischen sich nehmen. 6—8 Mm. oberhalb des Sternoclaviculargelenkes theilt sich der Truncus anonymus in Carotis dextra und Subclavia dextra.

Varietäten. Dubreuil fand den Truncus 7 Centimeter lang; er theilte sich erst in der Höhe der Verbindungsstelle zwischen dem 5. und 6. Halswirbel. Die Tracheotomie und die Exstirpation eines Kropfes werden durch eine solche Varietät besonders gefährlich; auch bei der Diagnose von Geschwülsten ist sie nicht ausser Acht zu lassen. — Der Truncus anonymus kann ganz fehlen, indem seine Aeste, jeder für sich, aus dem Aortenbogen entspringen. Zugleich kann hierbei die Ursprungsstelle der rechten Subclavia so weit nach Links gerückt sein, dass sie an der linken Seite der linken Subclavia entsteht und quer am Halse, bald vor, bald hinter der Speiseröhre verlaufend, zum rechten Arme gelangt. Diesen Weg kann auch der Truncus anonymus selbst einschlagen, indem er links von der Subclavia sinistra aus dem Arcus Aortae kommt¹⁾. — Andererseits kann der Truncus anonymus dicker sein, als man ihn erwarten sollte, wenn nämlich ausser seinen gewöhnlichen Aesten auch noch die linke Carotis aus ihm entspringt.

II. Krankheiten des Truncus anonymus.

Verletzungen dieses grossen Gefäss-Stammes haben fast augenblicklich den Tod zur Folge; daher sind denn auch traumatische Aneurysmen an ihm nicht beobachtet worden. Die spontanen Aneurysmen theilt man in 4 Arten, je nachdem sie 1) an seinem unteren, 2) an seinem mittleren, 3) an seinem obersten Theile ihren Sitz haben, oder 4) die ganze Ausdehnung des Stammes einnehmen. Mit der ersten dieser Arten besteht in der Regel auch Erweiterung des Aortenbogens; die zweite ist äusserst selten; bei der dritten findet sich fast immer zugleich Erweiterung eines der beiden oder beider Aeste des Truncus anonymus.

Wardrop hat ein Aneurysma beobachtet, welches sich über den ganzen Truncus erstreckte, ohne dass die benachbarten Gefässe irgendwie krank waren. — Bemerkenswerth ist der von Whiting beobachtete Fall, in welchem ein kleines Aneurysma von der hinteren Wand des Truncus anonymus gegen die Luftröhre vorgedrungen war und deren Knorpelringe durchbohrt hatte. — Nach J. Cockle (Lancet 1869, March 27) sind wahre Aneurysmen (pag. 94) am Truncus anonymus relativ häufig.

Die Unterscheidung der 4 Arten des Aneurysma trunci anonymi soll die Wahl der Unterbindungsmethode erleichtern. Bedenkt man die geringe Länge des ganzen Stammes, so wird man wenig Hoffnung haben, irgend einen Theil noch in gesundem, also zur Unterbindung tauglichem Zustande zu finden, wenn überhaupt ein Aneurysma seinen Sitz am Truncus hat. Nimmt die Geschwulst ihren Ursprung wesentlich vom obereren Ende des Stammes, so kommt sie

¹⁾ Dubreuil, Gaz. méd. de Paris 1863. No. 10.

lb des Sternoclavicular-Gelenks zum Vorschein. Ihre Gestalt ist nicht immer regelmässig. Wardrop sah ein solches Aneurysma, welches mit einer Ausbuchtung sich bis zum Ringknorpel erstreckte, mit einer zweiten schräg nach Aussen und Oben bis zum Processus sternalis, mit der dritten längs dem Schlüsselbein hin erstreckte. Diese sind erwachsenen Schwierigkeiten für die Diagnose, da ein solches Aneurysma leicht für ein der Carotis oder der Subclavia angehöriges angesehen werden kann.

Das Aneurysma am unteren Ende des Truncus, so kann es lange Zeit unbeachtet bleiben; zuerst macht es sich dann durch eine kleine Hervorwölbung an der rechten Seite des oberen Sternalrandes bemerklich und erst, wenn es eine bedeutende Grösse erreicht hat, tritt es als eine Geschwulst am Halse hinter der Portio sternalis des Halses hervor. Von der Unterscheidung der Aneurysmen des Truncus anonymus von denjenigen der Subclavia und Carotis wird späteren beider die Rede sein. Dagegen muss hier auf die Merksamkeit aufmerksam gemacht werden, durch welche ein solches Aneurysma von einem am Arcus aortae sitzenden unterschieden werden soll. Ersteres tritt oberhalb der ersten Rippe der rechten Seite hervor und verdrängt weiterhin diese Rippe, sowie auch das obere Ende des Schlüsselbeins; letzteres dagegen wird in dem Raume zwischen der zweiten und vierten Rippe der rechten Seite durch Auscultation und Percussion wahrnehmbar. Die Auscultation lässt, nach Gendrin, in einem Aneurysma des Truncus anonymus stets zwei Stösse erkennen, von denen der erste, mit einem pfeifenden, zuweilen pfeifenden Geräusche verbundene, isochronisch mit der Diastole der Kammern ist und sich aufwärts nach dem Verlaufe der Subclavia und Carotis dextra, nicht aber abwärts in der Richtung der Carotis sinistra verbreitet, während der zweite der Systole entspricht. Dieser zweite Stoss soll sich nur bei Aneurysmen des Truncus anonymus, nicht bei denen des Arcus aortae finden.

Erweiterungen am Truncus anonymus bedingen Compression der benachbarten Gebilde, daher Störungen der Respiration (besonders bei anstrengter Bewegung und beim Sprechen), auch Husten, Behinderung des arteriellen Blutstroms im rechten Arme, so dass der Radialpuls ganz unfühelbar werden kann, Stockungen im Verlaufe der Venae jugulares und subclavia der rechten Seite, Oedem des rechten Arms und mehr oder weniger ausgedehnte Schmerzhaftigkeit desselben. Bei einem höheren Grade des Uebels treten Schlingensymptome, Schwindel, Ohnmachten, unruhiger Schlaf hinzu. Alle durch den Druck der Geschwulst bedingten Symptome können

sich aber ganz ebenso bei Pulsadergeschwülsten der Carotis oder Subclavia und bei anderen Geschwülsten dieser Gegend vorfinden.

Die **Behandlung** der Aneurysmen des Truncus anonymus durch Electropunctur und Einspritzungen von Chloreisen hat bis jetzt keine dauernden Erfolge aufzuweisen. Mehr Aussicht auf Erfolg hat die Unterbindungsmethode von Brasdor: man müsste zuerst die Carotis und, wenn dies nicht ausreicht, später auch die Subclavia unterbinden. Bevor man sich aber hierzu entschliesst, muss man die Valsalva'sche Methode nebst energischer Anwendung des Eises versuchen; nebenbei könnte auch die möglichst dauernd ausgeführte Compression der Carotis oder der Subclavia dextra von Nutzen sein.

III. Unterbindung des Truncus anonymus.

Diese gefährliche Operation ist bis jetzt 16 Mal am lebenden Menschen ausgeführt worden, und zwar immer in der Continuität der Arterie zum Behuf der Heilung von Aneurysmen und fast immer mit tödtlichem Ausgange¹⁾.

Erwägt man die Schwierigkeiten und Gefahren der Operation, durch welche dem Gehirn die Hälfte seiner Blutzufuhr abgeschnitten wird²⁾ und bei welcher die Pleura, der Nervus vagus und grosse Venenstämme leicht verletzt werden können, berücksichtigt man anderer Seits die Möglichkeit einer Heilung durch die Brasdor'sche Methode (welche erfahrungsmässig feststeht), so wie derjenigen durch die Electropunctur, so wird man diese Unterbindung nicht gern vornehmen, um nach der Hunter'schen Methode ein Aneurysma des Truncus selbst oder eines seiner beiden Aeste zur Heilung zu bringen.

¹⁾ Vgl. Velpeau, in dem Dict. en 30 volumes, nouvelle édition, pag. 473 u. fgl. und J. Ehrmann, Des effets produits sur l'encéphale par l'oblitération des vaisseaux arteriels qui s'y distribuent. Paris, 1860. pag. 30. — Zuerst wurde die Ligatur der Anonyma von Valentin Mott 1818 an einem 27jährigen Manne unternommen, welcher am 26sten Tage an einer Nachblutung starb. Zum zweiten Male wurde sie von F. v. Graefe ausgeführt; der Operirte starb am 58sten Tage nach der Unterbindung an einer Blutung, vielleicht nicht ohne eigenes Verschulden, da er sich nicht gehörig robig verhielt; vielleicht war auch das zur Unterbindung angewandte und in der Wunde zurückgelassene Ligaturstäbchen an der Blutung schuld. — Andrew Smyth (in New-Orleans) ist der Erste und bis jetzt Einzige, welcher (1864) die Anonyma mit glücklichem und dauerndem Erfolge unterbunden hat. Er musste gleichzeitig die rechte Carotis, sowie nachträglich auch (wegen einer Nachblutung) die rechte Vertebralis unterbinden. Vgl. Med. Centralzeitung, 1865, No. 20. Die ausführliche Mittheilung findet sich New-Orleans journ. of med., July 1859.

²⁾ Merkwürdiger Weise traten nur in einem der bis jetzt bekannten Fälle erhebliche Cerebralstörungen ein. Vgl. Ehrmann, l. c. pag. 31. Vgl. d. folgd. Cap.

Verfahren von V. Mott. Ein dicht über dem rechten Sternoclavicular-Gelenk beginnender Schnitt wird am äusseren Rande des sternomastoideus 5 Ctm. schräg aufwärts geführt; ein zweiter, von demselben Punkte beginnend, erstreckt sich in gleicher Länge oberhalb des Schlüsselbein-Randes quer nach Aussen, so dass ein dreieckiger Lappen entsteht, welcher abgelöst und nach Oben und Aussen zurückgeschlagen wird. Die Portio clavicularis des Kopfnickers wird vom Schlüsselbeine abgeschnitten und in der Richtung des Lappens zurückgeschlagen. Dann spaltet man das tiefe Blatt der Fascia colli und gelangt zur Vena jugularis interna und zu dem weiter nach Aussen liegenden M. scalenus anticus, an dessen innerem Rande der Truncus anonymus gefunden wird. Während der ganzen Operation muss der Kranke mit stark hintenüber gebeugtem Kopfe und nach Rechts gewandtem Gesicht liegen.

Zweites Capitel.

Arteria carotis und deren Hauptäste.

I. Anatomie.

Die rechte Carotis communis entspringt aus dem Truncus anonymus, die linke aus dem Arcus aortae; jede von beiden spaltet sich in der Höhe des oberen Randes des Schildknorpels in ihre zwei Aeste. Die rechte ist daher um die Länge des Truncus anonymus kürzer, als die linke, und liegt etwas oberflächlicher, als letztere. Der Raum zwischen beiden Carotides communes ist unten durch Luftröhre und Oesophagus, weiter oben durch Pharynx und Kehlkopf ausgefüllt. Auf beiden Seiten verläuft die Carotis in der Tiefe eines Dreiecks, welches nach Aussen vom Sternomastoideus, nach Innen vom Kehlkopf begrenzt wird. Der Sternomastoideus bedeckt weiter unten die Arterie, gleichzeitig mit den mehr nach Innen liegenden Mm. sternohyoideus, sternothyreoideus und dem schräg aufsteigenden M. omohyoideus. Auch hinter der Arterie liegt eine Muskelschicht: der Longus colli und der Rectus capitis anticus major. Luftröhre, Speiseröhre, Kehlkopf, Pharynx und Schilddrüse liegen an der inneren, bei vielen Menschen aber Kehlkopf und Schilddrüse zum Theil auch noch an der vorderen Seite der Arterie. Im Grunde des bezeichneten Dreiecks liegt an der äusseren Seite der Arterie, im angeschwollenen Zustande sich etwas vor sie wölbend, die Vena jugularis interna, in der Furche aber, welche die beiden Gefässe an ihrer hinteren Seite bilden, verläuft der Nervus vagus und noch mehr nach hinten der Grenzstrang des Sympathicus. Die Carotis nebst der sie begleitenden Vene erhalten von der Fascia colli eine gemeinsame Umhüllung, während jedes der beiden Gefässe seine besondere Gefässscheide besitzt.

Unter den Varietäten sind folgende von besonderem Interesse. Die linke Carotis kann, wenn sie aus dem Truncus anonymus, oder doch nahe an ihm entspringt, bald vor, bald hinter der Luftröhre schräg aufsteigen. In letzterem Falle möchte sie schwer zu finden sein; in ersterem würde sie bei der Tracheotomie in Gefahr gerathen. Beide Carotiden können auch aus dem Aortenbogen mit einem gemeinsamen Stamme

entspringen; dann liegen sie oberflächlicher als gewöhnlich. Die Spaltung der Carotis communis erfolgt nicht immer in der Höhe des Schilddrüsenknorpels. Dubreuil hat die Theilungsstelle bis zum Winkel des Unterkiefers hinaufgerückt gefunden. In diesem Falle entspringen die Aa. thyreoidea superior und maxillaris externa aus der Carotis communis.

II. Krankheiten der Carotiden.

Auf eine Verletzung der Carotis folgt gewöhnlich mit Blitzschnelle eine furchtbare Blutung. Ein Messerstich oder ein in der Absicht des Selbstmordes beigebrachter Schnitt geben am Häufigsten die Veranlassung. Jedoch hindert bei Selbstmords-Versuchen gewöhnlich der vorspringende Kehlkopf das Messer, bis zu den Carotiden zu gelangen. Selten möchten Zerreißen dieser Adern vorkommen. Jedoch ist eine unvollkommene Zerreißen, welche sich nur auf die innere und mittlere Arterienhaut erstreckt, bei Erhängten nachgewiesen¹⁾.

Blutungen aus der Carotis communis sind gewöhnlich so furchtbar, dass der Kranke stirbt, bevor Hilfe geschafft werden kann; nur wenn die Wunde sehr klein ist oder die Gefäßwand sehr schräg durchdringt, oder aber, wenn gleich nach der Verletzung durch kräftige Compression die Wunde verschlossen wird, ist Lebensrettung möglich. Dann kann es später zur Entwicklung eines Aneurysma circumscriptum kommen. Die von Larrey²⁾ und Hodgson³⁾ mitgetheilten Fälle von Heilung solcher Verletzungen durch Compression beziehen sich offenbar nicht auf die Carotis communis, sondern auf die (wahrscheinlich durchschnittene und deshalb nach beiden Seiten zurückgezogene) Carotis externa. Eine Verletzung dieser letzteren lässt sich erwarten, wenn eine bedeutende arterielle Blutung aus einer Wunde zwischen dem Kehlkopf und dem Ohre Statt findet; jedoch wird es schwerlich jemals möglich sein, in einem solchen Falle zu bestimmen, ob die Carotis interna oder externa oder vielleicht gar nur einer der Aeste der letzteren verletzt ist.

Bei allen diesen Verletzungen ist die Unterbindung oberhalb und unterhalb der Arterienwunde zu empfehlen. Unterbindet man nur unterhalb der Wunde, d. h. also zwischen ihr und dem Herzen, so kann mit grosser Schnelligkeit durch die weiten Anastomosen, welche zwischen den Carotiden der einen und der anderen Seite, so wie

¹⁾ Genaue Beobachtungen der Art sind namentlich von G. Simon (*Virchow's Archiv* 1856) gemacht worden.

²⁾ *Mémoires de chirurgie militaire*, T. I. pag. 309.

³⁾ *Traité des maladies des artères et des veines*, aus dem Englischen mit Noten von Breschet, Paris 1819, T. II. pag. 38.

wischen Carotis interna und A. vertebralis bestehen, der verletzten Stelle wieder Blut zugeführt werden. Leider kann man die eben gegebene Vorschrift nicht immer befolgen, wenn die Dringlichkeit des Falles und die Schwierigkeit der genauen Aufsuchung des verletzten Gefässes zur Unterbindung der Carotis communis nöthigen. Allerdings hat auch diese ausgereicht, wenn die zur Bildung eines festen Thrombus an der Stelle der Verletzung nothwendige Zeit vorüberging, ehe der Blutstrom durch die genannten Anastomosen wieder mit voller Kraft gegen die Arterienwunde vordrang. Häufig genug aber hat man Gelegenheit gehabt, sich von der Unsicherheit der indirecten Unterbindung zu überzeugen¹⁾. Wo es also irgend möglich ist, lege man nach der, vielleicht im ersten Augenblicke zur Abwendung der Lebensgefahr nothwendigen (provisorischen) Umschnürung der Carotis communis auch noch dicht unterhalb und dicht oberhalb der Wunde eine Ligatur an, wenn es sich um Verletzung eines der beiden grossen Carotiden-Aeste handelt; ist die Carotis communis selbst verletzt, so muss man unbedingt die Unterbindung des peripherischen Stückes gleich nach derjenigen des centralen ausführen.

In den seltenen Fällen von traumatischen Aneurysmen der Carotiden wird (wenn man überhaupt zur Unterbindung schreiten muss) die Hunter'sche Methode zu bevorzugen sein, da die (übrigens an dieser Stelle auch schon mit Glück ausgeführte) Methode des Antyllus einen höheren Grad von Gefahr bedingt (Broca).

Nicht ganz so selten ist am Halse der Varix aneurysmaticus beobachtet worden.

Willlaume (*Journal complémentaire*, T. II. pag. 71) beschreibt einen Fall, in welchem das Blasegeräusch besonders deutlich war. In einem anderen Falle war es bemerkenswerth, dass bei jeder tiefen Inspiration die Geschwulst vorübergehend verschwand. Larrey (*Clinique chirurgicale*, T. III. pag. 149) beobachtete bei einem solchen aneurysmatischen Varix am Halse eine besonders starke Entwicklung der Hautvenen. In einem von Marx (*Mémoires de l'Acad. de med.*, T. III. pag. 233) beobachteten Falle litt der Kranke heftig durch (objectiv wahrnehmbare) Rasselgeräusche, häufige Ohnmachten, Beängstigungen und Störungen des Sehvermögens auf dem Auge der kranken Seite.

Die verhältnissmässig grosse Häufigkeit dieser Art von Aneurysmen an der Carotis könnte auf den Gedanken bringen, dass die in der Vena jugularis interna im Momente der Inspiration Statt findende Aspiration gegen den Thorax hin, bei jeder auch noch so unbedeutenden Verletzung, welche diese Vene und die neben ihr liegende Carotis zugleich betroffen hat, das Einströmen des arteriellen Blutes in die Vene begünstigt und auf solche Weise dem, jeden Falls gefährlicheren, Blutergüsse nach Aussen oder in das Bindegewebe des Halses vorbeuge.

¹⁾ Vgl. Breschet's Bemerkungen über 2 Fälle der Art an der pag. 162 citirten Stelle.

Die spontanen Aneurysmen der Carotis nehmen in der Häufigkeitscala der äusseren spontanen Aneurysmen den dritten Platz ein. Sie finden sich ebenso häufig beim weiblichen, wie beim männlichen Geschlecht. Gewöhnlich haben sie ihren Sitz an der Theilungsstelle der Carotis communis, seltener an ihrem Ursprunge. Ein Carotiden-Aneurysma pflegt schnell zu wachsen und kann eine solche Grösse erreichen, dass es fast die ganze Länge des Halses einnimmt und sich vom Kehlkopfe bis zu den Querfortsätzen der Halswirbel erstreckt. Durch Druck auf die benachbarten Gebilde (Nervus vagus) entstehen bald: Husten, Athemnoth, Heiserkeit und anderweitige Veränderungen der Stimme, Schlingbeschwerden und, durch die Beeinträchtigung des Blutlaufs, Schmerzen und Klopfen im Kopf, Ohnmachten u. dgl. m. Zuweilen empfindet der Kranke die Pulsationen der Geschwulst wie Hammerschläge auf den Kopf.

Aneurysmen des unteren Endes der Carotis indiciren die Anwendung der Brasdor'schen Methode. Electropunctur und Einspritzungen von Eisenchlorid sind wegen der Gefahr einer Embolie in die Gehirnarterien bedenklich. Aneurysmen am oberen Ende der Carotis communis, sowie diejenigen der beiden grossen Carotidenäste sind nach der Hunter'schen Methode zu behandeln.

Besondere Schwierigkeiten machen die Aneurysmen der Arteria ophthalmica. Die Unterbindung der Carotis hat auf sie wenig Einfluss. Wo möglich muss also ihr Verschluss durch Electropunctur oder Chloreisen bewirkt werden. Dagegen lassen sich die Aneurysmen an den Aesten der Carotis externa, namentlich im Gesicht und an der Aussenfläche des Schädels, leicht direct angreifen. Man wird daher ihrerwegen nur ausnahmsweise und mit zweifelhaftem Erfolge die Unterbindung der Carotis vornehmen.

In Betreff des Aneurysma art. mening. med. vgl. Bd. III.

III. Unterbindung der Carotis communis und ihrer wichtigsten Aeste.

1) Carotis communis.

Die Unterbindung der Carotis communis wird indicirt: 1) durch Blutung aus ihr selbst oder aus einem ihrer Hauptäste; 2) durch Aneurysmen an den eben bezeichneten Stellen; 3) durch anderweitig nicht zu beseitigende Gefäss-Geschwülste an ihren Aesten; 4) höchst selten prophylaktisch beim Beginne von Operationen, durch welche voraussichtlich bedeutende Aeste der Carotis verletzt werden.

Die Besorgnisse, welche man in Bezug auf die Gefahren und üblen Folgen dieser Unterbindung mit Recht hegen musste, sind einer Seits durch die Versuche, welche

schon Galen und Valsalva an Hunden anstellten, anderer Seits durch die Beobachtung des spontanen Verschlusses der Carotis (Petit, Haller, Baillie), insoweit beseitigt worden, dass schon van Swieten ihre Ausführung vorschlug. Abernethy hat sie (1803), wie es scheint, zuerst an einem lebenden Menschen ausgeführt, wegen einer Verletzung, die durch den Stoss einer Kuh veranlasst war. Jedoch erzählt Behenstreit schon früher von einer Unterbindung der Carotis communis wegen Verletzung bei Exstirpation einer scirrösen Geschwulst (vgl. Hasse in Rust's Handbuch Bd. II. pag. 66). Zum Behuf der Heilung eines Aneurysma nach der Hunter'schen Methode hat sie Asthley Cooper zuerst im Jahre 1805 mit unglücklichem, dann aber 1808 mit glücklichem Erfolge ausgeführt. Velpeau (Nouveaux éléments de médecine opératoire, Paris 1839. T. II. pag. 231) konnte 1839 schon 150 Fälle von Unterbindung der Carotis communis zusammenstellen, von denen 80 einen glücklichen Erfolg gehabt hatten. Idzikowsky sammelte (in seiner Dissertation, de ligatura carotidis) bei Gelegenheit der Beschreibung einer von mir mit glücklichem Erfolge ausgeführten Unterbindung der Carotis communis, 1852, mit Benutzung der ihm damals zu Gebote stehenden Literatur, 246 Fälle von Unterbindung dieses Arterienstammes, darunter 79 mit letalem Ausgang. In dieser Uebersicht sind aber, wie Ehrmann (Des effets produits sur l'encéphale par l'oblitération des vaisseaux artériels qui s'y distribuent. Paris 1860) nachgewiesen hat, wegen der Unzulänglichkeit der literarischen Hilfsmittel, mehrere Fälle doppelt aufgeführt. Ehrmann selbst hat zwar auch 266 Fälle von Carotiden-Unterbindung in der Literatur gefunden, aber nur 202 mit hinreichend genauen Angaben, um über den Erfolg bestimmt urtheilen zu können. In 46 unter diesen traten Störungen der Hirnthätigkeit auf, welche entschieden aus der Absperrung der Blutzufuhr erklärt werden mussten. Merkwürdig genug, hatten unter den 15 Fällen von Ligatur beider Carotiden nur 4 diese üble Folge. — Die vollständigste Statistik der Carotiden-Unterbindung verdanken wir Pilz (Archiv f. klin. Chirurgie. Bd. IX. 1868). Unter den von ihm zusammengestellten 600 Fällen endeten 319, also $53\frac{1}{6}$ pCt. mit Genesung; 259, also $43\frac{1}{6}$ pCt. mit Tod; bei 22 Fällen, also $3\frac{3}{8}$ pCt. fehlt jede Angabe über den Ausgang. Zieht man aber 29 Fälle, in welchen die Kranken an anderen Leiden, nicht an dem operativen Eingriffe, starben, ab, so ergibt sich eine Mortalitätszahl von $38\frac{1}{3}$ pCt. Die grösste Zahl der Genesungen fällt in die Blüthejahre von 20—30; von da ab sinkt sie langsam. — Der Abfall des Lipterfadens erfolgt durchschnittlich am 13.—14. Tage, doch kommen hierin grosse Schwankungen vor: die Extreme sind der 4. und der 96. Tag, die mittlere Dauer 9 bis 22 Tage. Gehirnerscheinungen traten bei 32 pCt. auf, von denen wiederum $\frac{1}{3}$ pCt. starben.

Handelt es sich um ein Aneurysma in der Gegend der Theilung der Carotis communis, so wird man der Unterbindung des Stammes unterhalb der Geschwulst den Vorzug geben. Sitzt das Aneurysma dagegen in der Nähe des Ursprungs der Carotis, so wird, wenn überhaupt eine Unterbindung vorgenommen werden soll, nur die Brasdorische Methode Anwendung finden können, und zu deren Ausführung, wenn das Aneurysma sich hoch hinauf erstreckt, die Unterbindung sowohl der inneren als auch der äusseren Carotis nöthig sein.


Unabsichtlich hat man in einigen Fällen, wo es sich um Aneurysmen des Arcus aortae handelte, welche für Aneurysmen der Carotis communis oder des

Truncus anonymus gehalten wurden, durch Unterbindung der ersteren in der Nähe ihrer Theilungsstelle (Brasdor'sche Methode) einen günstigen Erfolg erzielt. Die Patienten starben zwar nach einiger Zeit; aber ihr Tod hing in keiner Weise von der Operation oder auch nur von dem Aneurysma ab; man fand sogar feste weisse Gerinnsel, welche Aussicht auf vollkommene Heilung machten. Die neuesten Fälle der Art sind von J. Cockle, *Lancet*, 1869, Apr. 10, und von Sauds, *New York med. rec.* 1869, Dec. 1, veröffentlicht.

Die Carotis communis wird in der Regel entweder in der Höhe des Kehlkopfs am inneren Rande des Sternocleidomastoideus (A, Fig. 15) oder tiefer unten (nahe dem Schlüsselbein) unterbunden. Der Kranke liegt mit etwas erhöhter Brust und hintenüber geneigtem Kopfe, das Gesicht nach der gesunden Seite gewandt. Der Operateur steht auf der kranken Seite, welche hinreichend beleuchtet sein muss.

A. Verfahren von Asthley Cooper. Die Unterbindung geschieht in dem Dreieck, welches von der Luftröhre und dem Kehl-

Fig. 15¹⁾.



¹⁾ A, M. sternomastoideus; B, M. sternohyoideus; C, M. sternothyroideus; D, M. omohyoideus; E, M. cucullaris; F, M. scalenus anticus; G, M. subclavius; H, M. pectoralis minor; I, Clavicula; J, Vena jugularis interna; K, Nervus vagus; L, Carotis communis; M, Plexus cervicalis; N, A. subclavia; O, A. axillaris s. subclaviae pars inferior, P, Plexus brachialis; Q, Vena axillaris.

kopfe nach Innen, von dem Kopfnicker nach Unten und Aussen begrenzt wird. Der Hautschnitt wird 5 bis 7 Centim. lang, parallel dem inneren Rande des Sternocleidomastoideus gemacht, jedoch so, dass man auf den Muskel selbst einschneidet. Ein zweiter Messerzug trennt das Platysma und legt die schräg von Unten und Innen nach Oben und Aussen aufsteigenden Muskelfasern des Kopfnickers bloß. Hierauf lässt man den Kopf etwas vornüber neigen, um die Halsmuskeln zu erschlaffen, und trennt mit leichten Messerzügen das den Kopfnicker bedeckende Bindegewebe, bis sein innerer Rand in der ganzen Ausdehnung der Wunde frei liegt. Mit einem Wundhaken wird jetzt durch einen Gehülfen der äussere Wundrand sammt dem Kopfnicker, mit einem anderen der innere Wundrand zurückgezogen. Der Operateur trennt mit dem Messer die fibröse Schicht, welche vom Sternohyoideus und Sternothyreoides zu der hinteren Fläche des Sternomastoideus hinübergespannt ist, und schiebt den Omohyoideus, je nachdem er höher oder weiter nach Unten liegt, aufwärts (vgl. Fig. 16) oder abwärts. Sollte es Schwierigkeiten machen, diesen Muskel zu erkennen, so lasse man den Kranken schlucken, wobei der Omohyoideus sich spannt und deutlich hervortritt. Sollte er sich nicht mit Leichtigkeit verschieben lassen, so durchschneidet man ihn sammt der ihm anhaftenden Bindegewebs-Schicht in der Richtung der Arterie auf der Hohlsonde. Jetzt erscheint in der Tiefe die gemeinsame Scheide, welche die Carotis (*L*), die Vena jugularis interna (*J*) und den Nervus vagus (*K*) einschliesst (Fig. 15). Zuweilen wird sie noch durch eine Lymphdrüse verdeckt, welche dann entfernt werden muss. Die Eröffnung der Gefäss-Scheide erfolgt nach den allgemeinen Regeln (und zwar um so mehr genau auf der Arterie, als weiter nach Aussen der Ramus descendens N. hypoglossi der Gefäss-Scheide der Vena jug. intern. dicht anliegt); alsdann muss die Arterie zuerst an der äusseren Seite von der Vene getrennt und der Unterbindungsfaden von hier aus, dicht hinter der Carotis (um nicht den Vagus zu quetschen oder mitzufassen), herumgeführt werden. Während der Operation ist die Vena jugularis interna oft sehr hinderlich, besonders indem sie bei jeder Expiration in störender Weise anschwillt. Um dies zu verhüten, lässt man sie durch einen Gehülfen am oberen Wundwinkel comprimiren, wodurch ihr die fernere Blutzufuhr von der Peripherie her ganz oder doch grösstentheils abgeschnitten wird; der rhythmischen Anschwellung derselben bei der Expiration, welche dennoch Statt finden kann, müsste durch Compression dicht am Schlüsselbein vorgebeugt werden¹⁾. Um die Blosslegung der Vene ganz zu ver-

¹⁾ Aus mündlicher Ueberlieferung kenne ich einen Fall, in welchem der Operateur

meiden, will Vidal, statt am inneren Rande des Sternomastoiden am äusseren Rande des Sternohyoideus einschneiden und von hier aus zur Carotis vordringen (Fig. 16. 1). Abgesehen aber von den

Fig. 16.



Hervorquellen der Vene, wie es beim Lebenden beobachtet wird, dürfte selbst an der Leiche eine vollständige Blosslegung der Carotis ohne gleichzeitige Entblössung, wenigstens eines Theiles der Vena jugularis interna, doch unausführbar sein. — Sehr erschwert wird die Operation (am Lebenden) durch eine, besonders beim weiblichen Geschlecht (auch wenn kein Kropf vorhanden ist) häufige, stärkere Entwicklung der in die Vena jugularis externa einmündenden seitlichen Schilddrüsen-Venen, welche eine Verschiebung jener Vene nach Aussen fast unmöglich machen kann¹⁾.

B. Unterbindung in der Nähe des Schlüsselbeins.

a) Verfahren von Zang. Die Arterie soll in dem (auf Fig. 16 durch punktirte Linien bezeichneten) dreieckigen Raume zwischen den beiden Köpfen des Sternocleidomastoideus unterbunden

die angeschwollene Jugularis nicht anders zu beseitigen vermochte, als indem er sie zwischen zwei Ligaturen durchschnitt; der Fall verlief glücklich.

¹⁾ Hiervon habe ich mich selbst am Lebenden überzeugt. Vgl. auch Velpeau, Anatomie chirurgicale, Paris 1825, Tom. I. pag. 206.

werden. Die Operation ist viel schwieriger, weil die Arterie in einer viel tieferen Wunde aufgesucht werden muss und an dieser Stelle noch mehr als weiter oben von der Vena jugularis interna bedeckt wird. Auf der linken Seite liegt ausserdem dicht hinter der Gefässscheide der Bogen des Ductus thoracicus, welcher, wenn man die Vena jugularis interna sehr stark nach Aussen zieht und mit stumpfen Instrumenten tief in der Wunde arbeitet, zerrissen werden könnte. Auf der rechten Seite entsteht bei sehr tiefer Unterbindung die Gefahr einer mangelhaften Thrombus-Bildung, weil man dann nahe der Theilungsstelle des Truncus anonymus die Ligatur anlegt. — Der Hautschnitt wird (während Kopf und Hals sich in derselben Stellung, wie beim Cooper'schen Verfahren, befinden) am äusseren Rande der Portio sternalis des Kopfnickers geführt, also an der Extremitas sternalis claviculae begonnen und in der Richtung gegen den Processus mastoideus 6 bis 8 Centim. aufwärts geführt; die beiden Köpfe des Sternocleidomastoideus werden von einander getrennt und mit Wundhaken aus einander gezogen, worauf in der Wunde der schräg verlaufende Omohyoideus erscheint; dieser wird mit dem Claviculartheil des Kopfnickers unter denselben Wundhaken gelegt, die alsdann erscheinende Vene nach Aussen geschoben und die Unterbindungsnadel von Aussen nach Innen um die Arterie geführt.

b) Verfahren von Allan Burns. Die Schwierigkeiten der Operation dürften geringer sein, wenn man am inneren Rande des Sternocleidomastoideus (nach dem Vorschlage von Scarpa) einschneidet, und die Portio sternalis desselben in ihrem sehnigen Theile subcutan durchschneidet; dann lässt sich letztere sammt dem äusseren Wundrande leicht so weit nach Aussen ziehen, dass man zur Carotis gelangen kann. Bei diesem Verfahren würde die sonst stark hervorquellende Vena jugularis und die Beengung der Wunde durch die gespannten Köpfe des Kopfnickers dem Operateur nicht hinderlich sein; bei stark angeschwollener Schilddrüse dagegen müsste man der von Lang angegebenen Incision den Vorzug einräumen, würde aber durch Ablösung der Portio sternalis des Sternocleidomastoideus auch von dieser Seite her (wo sie zuerst von Coates ausgeführt worden ist) die Operation bedeutend erleichtern¹⁾.

c) Verfahren von Malgaigne. Bei vollkommen gerade liegendem Halse und hintenüber gebeugtem Kopfe wird am äusseren

¹⁾ Allan Burns hat die Durchschneidung der Sternalportion des Kopfnickers zu diesem Behuf in seinen „Bemerkungen über chirurgische Anatomie des Kopfes und Halses“ (in der Uebersetzung von Döhlhoff, pag. 153) zuerst vorgeschlagen und wahrscheinlich auch schon ausgeführt.

Rande des Sternohyoideus, d. h. in der Richtung einer von der Articulatio sternoclavicularis zum Kinn gezogenen Linie, nahe über dem Sternoclavicular-Gelenk eingeschnitten, der gedachte Muskel nach Innen geschoben (nöthigenfalls eingeschnitten), worauf man dann von der Luftröhre her zur Arterie vordringt.

Als Hilfsmittel zur Auffindung der Carotis kann der von Chassaignac als „Tuberculum carotideum“ bezeichnete, vordere Höcker des Querfortsatzes des 6. Halswirbels benutzt werden, welchen man (sobald die Haut durchschnitten ist), 6 Centim. oberhalb der Clavicula, hinter dem inneren Rande des Sternomastoideus, bei gerade gestreckter Lage des Halses fühlt; die Arterie liegt genau vor diesem Höcker, oder ein klein wenig nach Innen von ihm.

Unmittelbar nach Unterbindung der Carotis communis wird oft die entsprechende Kopfhälfte sowohl in motorischer als in sensitiver Beziehung gelähmt. Dies dauert jedoch nur kurze Zeit, weil durch die vielfachen Anastomosen bald wieder Blut hinüberströmt. Tritt bald nach der Operation eine dauernde Lähmung der Extremitäten der anderen Seite ein, so kann man sicher darauf schliessen, dass die Arterien des Gehirns nicht mehr die nöthige Dehnbarkeit besitzen, um den Collateralkreislauf zu Stande kommen zu lassen, und hat dann eine letale Gehirnerkrankung zu erwarten. Selten stellt sich eine solche Lähmung nur vorübergehend und erst mehrere Tage nach der Unterbindung ein¹⁾. — An der Operationsstelle entwickelt sich eine mehr oder weniger heftige Entzündung, welche besonders nach Unterbindung der linken Carotis sich leicht auf den Oesophagus und den Pharynx ausbreiten und somit zu bedeutenden Schlingbeschwerden Veranlassung geben kann. Tritt unmittelbar nach der Operation Husten, Heiserkeit, Erbrechen ein, so muss befürchtet werden, dass der Vagus verletzt worden sei, — ein Zufall, der sich übrigens nur bei grosser Uebereilung oder beim Bestehen ganz besonders erschwerender Umstände zutragen dürfte.

2) Unterbindung der Arteria carotis externa.

Wenn es sich um die Verletzung eines Astes der Carotis externa handelt, oder, wenn ein Aneurysma an einem dieser Aeste seinen Sitz hat, so erscheint es richtiger, statt der Carotis communis die C. externa zu unterbinden, vorausgesetzt, dass diese gesund, und die Unterbindung des betreffenden Astes selbst nicht möglich oder nicht zulässig ist. Die Vortheile, welche unter solchen Verhältnissen die

¹⁾ Einen von mir beobachteten Fall der Art hat Brockmüller (de ligat. carotid. Gryphiswald. 1866) beschrieben.

Unterbindung der Carotis externa darbieten soll¹⁾, sind: 1) dass die Gefahr, welche aus der Unterbindung der Carotis communis für das Gehirn erwächst, ganz fortfällt; 2) dass eine Nachblutung aus dem unterbundenen Gefässe weniger zu fürchten ist, weil die Arterie überhaupt kleiner, entfernter vom Herzen, und der Andrang des Blutes an der Unterbindungsstelle dadurch wesentlich gemindert ist, dass die Carotis interna ihm Abfluss gewährt; 3) dass die Blutzufuhr zu dem verletzten oder aneurysmatischen Theile nicht so leicht wiederhergestellt wird, weil die grossen Anastomosen der Carotis interna mit der gleichnamigen Arterie der anderen Seite und mit der Arteria vertebralis gar nicht mit ins Spiel kommen.

Von diesen für die Vorzüglichkeit der Unterbindung der äusseren Carotis beigebrachten Gründen ist jedoch nur der erste vollkommen stichhaltig (vgl. pag. 165). — Ueber die relative Wahrscheinlichkeit einer Nachblutung bei der einen oder der anderen Unterbindung lässt sich erfahrungsmässig noch Nichts feststellen, weil die Carotis externa im Ganzen noch zu selten unterbunden worden ist; von theoretischer Seite aber dürfte eine Nachblutung viel eher nach der Unterbindung der äusseren als derjenigen der gemeinsamen Carotis zu befürchten sein, weil es bei letzterer sich um ein Gefäss handelt, welches eine weite Strecke vor der Unterbindungsstelle gar keine Aeste abgibt, und in welchem daher die Bildung eines grossen und widerstandsfähigen Blutpfropfes erwartet werden darf, während bei jener die Nähe der Theilungsstelle der Carotis communis und der höchst unregelmässige Ursprung der Aeste des zu unterbindenden Gefässes der Entwicklung eines zureichenden Thrombus leicht hinderlich werden können. Letzterem Uebelstande soll zwar dadurch begegnet werden, dass man die Carotis externa in grösserer Ausdehnung entblösst und die Arteria thyroidea superior, wenn sie nahe an der Unterbindungsstelle entspringt, mit unterbindet; aber auch dies Verfahren dürfte nicht sicher schützen, da man sich am lebenden Menschen doch unmöglich, wie an einem anatomischen Präparate, über die verschiedenen Abgangsstellen genau unterrichten kann. Die hierzu nothwendige ausgedehnte Entblössung der Arterie würde sich mit den allgemeinen Regeln der Unterbindung schwer in Einklang bringen lassen. Bei Anwendung der antiseptischen Methode, namentlich auch antiseptischer Ligaturen (vgl. pag. 118) fällt dieser Einwand gegen

¹⁾ Besonders Wutzer (Rheinische Monatsschrift 1847, Febr. pag. 72, Deutsche Klinik 1850, pag. 171—173) hat diese zuerst von Bushe, dann von Lizars, von V. Mott, und von Maisonneuve ausgeführte Unterbindung lebhaft empfohlen und mit glücklichem Erfolg angewandt.

die Unterbindung der Carotis externa ganz fort, da diese keine Continuitätstrennung des unterbundenen Gefässes zur Folge haben. — Als Vorzug der Ligatur der Carotis externa vor derjenigen der Carotis communis führten wir endlich die grössere Sicherheit auf, mit welcher durch sie der beabsichtigte Zweck erreicht werden soll. Bedenken wir aber, dass das Blut, um durch die Aeste der Carotis interna von den Anastomosen derselben aus bis in ihren Stamm, und von da durch den Stamm der Carotis externa zu der Stelle der Verletzung oder des Aneurysma zu gelangen, welche zur Unterbindung der Carotis communis die Veranlassung gaben, einen langen Weg, aus engen Canälen in immer weitere übergehend, zurücklegen muss, und folglich mit sehr geringer Stromkraft und erst längere Zeit nach Anlegung der Ligatur zu der verletzten Stelle gelangen wird; bedenken wir ferner, dass die zahlreichsten Anastomosen der Carotis externa, diejenigen nämlich zwischen den Aesten der rechten und linken Körperseite, bei dieser, wie bei jener Unterbindung nicht verschlossen werden, und dass endlich durch Unterbindung des gemeinsamen Carotidenstammes doch noch die Blutzufuhr, welche die Aeste der äusseren Carotis durch die Arteria ophthalmica von Seiten der inneren erhalten, mit abgeschnitten wird; so erweist sich dieser Vorzug der Unterbindung der Carotis externa keineswegs so fest begründet, wie es auf den ersten Blick scheint.

Die Unterbindung der Carotis externa ist schwieriger, als diejenige der C. communis. Natürlich dürfte dies, wenn ihre Vorzüge fest stünden, nicht als Grund gegen ihre Ausführung, oder doch nur als ein individueller Grund geltend gemacht werden. Da aber jene nicht sicher erwiesen sind, muss die leichtere und schneller auszuführende Operation, wenn nicht im einzelnen Falle Gegen Gründe vorliegen, den Vorzug behalten.

Verfahren nach Dieterich. Ein 6 Centim. langer Schnitt parallel dem inneren Rande des Sternocleidomastoideus und $1\frac{1}{2}$ Centim. vor ihm, vom Kieferwinkel schräg abwärts geführt, durch die Haut, das Platysma myoides und die Fascia colli. Im oberen Winkel der Wunde erscheint der M. digastricus und der N. hypoglossus, welche sammt der Glandula submaxillaris nach Oben gezogen werden; die Venae thyreoidea, sublingualis und facialis werden nach Unten, Carotis interna, Vena jugularis interna und Art. pharyngea ascendens nach Aussen und der Stamm der Vena facialis nach Innen gezogen.

Wutzer empfiehlt in dem Falle, dass nahe an der Unterbindungsstelle ein Ast (namentlich die A. thyreoidea superior) entspringen

sollte, diesen in der Nähe des Stammes entweder gesondert zu unterbinden, oder mit in die um den Stamm zu legenden Ligatur zu fassen.

3) Unterbindung der *Arteria thyreoidea superior.*

Dieselbe ist vorzugsweise zur Heilung des Kropfes (vgl. Bd. III.) ausgeführt worden. In solchen Fällen fühlt man die *Arteria thyreoid. sup.* gewöhnlich schon durch die unverletzte Haut pulsiren. Sollte dies nicht möglich sein, so würde ihre Unterbindung immer einige Schwierigkeit machen. Der Einschnitt muss dann, wie für die Blosslegung der *Carotis communis* zwischen dem Kehlkopf und dem Kopfnicker gemacht werden; in der Tiefe der Wunde dringt man aber sogleich an der inneren Seite der *Carotis* gegen die Schilddrüse hin vor. — Zuweilen entspringt die *A. thyreoid. sup.* aus der *Carotis communis.*

4) Unterbindung der *Arteria lingualis*¹⁾.

Bei Verletzungen der Zunge, besonders aber vor oder nach Exstirpationen an der Zunge (vgl. Bd. III.) ist die Unterbindung der *Art. lingualis* zuerst von Bécclard, neuerdings aber besonders von Roser empfohlen worden. Man soll sie über dem grossen Horne des Zungenbeins, hinter dem *M. hyoglossus* aufsuchen. Bevor man aber bis zu diesem Muskel gelangte, sind die Schwierigkeiten der Operation zuweilen so gross gewesen, dass auch geübte Operateure sie nicht immer zu besiegen vermochten (Mirault), namentlich wenn das Zungenbein sehr hoch liegt, und sein grosses Horn von der *Glandula submaxillaris* bedeckt ist. Durch das von Hueter angegebene Verfahren werden diese Schwierigkeiten wesentlich vermindert.

Verfahren von Malgaigne. Man fixirt, während der Kranke mit hintenüber gebeugtem Kopfe liegt, das grosse Horn des Zungenbeins. Vier Millimeter über ihm und parallel mit demselben durchschneidet man auf drei Centimeter Länge die Haut und das *Platysma*, worauf man als ersten Wegweiser den unteren Rand der *Glandula submaxillaris* findet. Nachdem diese ein wenig aufwärts geschoben ist, erscheint die glänzend weisse Sehne des *Digastricus* und 1 Millimeter unter ihr, zuweilen durch einige Fasern des *Stylohyoideus* verdeckt, der *N. hypoglossus*; 2 Millimeter unter diesem dritten Anhaltspunkte durchschneidet man quer den *M. hyoglossus* und findet hier die Arterie ganz frei und isolirt liegend. — Die *Vena facialis*

¹⁾ In Betreff der Literatur vgl. Adelman, Beiträge zur chirurgischen Pathologie der Arterien, Archiv f. klin. Chirurg., Bd. III. pag. 11 u. f.

ant. kreuzt den Hautschnitt; um ihre Verletzung zu vermeiden, muss man das Messer von Anfang an vorsichtig führen und die gedachte Vene, sobald sie blossgelegt ist, nach Aussen schieben.

Das Verfahren von Hueter¹⁾ unterscheidet sich dadurch, dass die Arterie nicht nach Aussen von der Sehne (dem hinteren Bauche) des Digastricus aufgesucht wird, sondern nach Innen und Vorn (medianwärts) von ihr, in dem von Hueter als „Trigonum linguale“ bezeichneten Raume, welcher nach Aussen vom hinteren Bauch des Digastricus und vom Stylohyoideus, medianwärts vom freien Rande des Mylohyoideus und nach Oben vom Nervus hypoglossus, welcher sammt der ihn begleitenden Vene einen leicht erkennbaren Strang darstellt, begrenzt wird. Der Hautschnitt muss dem entsprechend in der Gegend der Insertion des grossen Horns am Körper des Zungenbeins beginnen und etwa 3—4 Centim. mit jenem parallel nach Aussen verlaufen. Der untere Rand der Glandula submaxillaris muss auch bei diesem Verfahren blossgelegt und emporgehoben werden. Das Durchschneiden der Fasern des Hyoglossus geschieht am Besten zwischen zwei dieselben emporhebenden und spannenden Pincetten. Der Patient muss bei der Operation mit dem Kopf hintenüber, das Kinn vom Operateur abgewandt, liegen.

5) Unterbindung der Arteria maxillaris externa seu facialis.

Man findet die Art. max. ext. am vorderen Rande des Masseter, dicht an der Basis des Unterkiefers. Der Einschnitt wird senkrecht (der Richtung des Masseter entsprechend), am Besten unter Erhebung einer Hautfalte, gemacht, da die Arterie sehr oberflächlich liegt.

6) Unterbindung der Arteria temporalis.

Verticaler Einschnitt von 3 Centim. Länge, in der Mitte zwischen Ohrmuschel und Kiefergelenk. Die Arterie liegt nicht ganz oberflächlich, von dichten Bindegewebsschichten umhüllt.

In Betreff der Zweige der Arteria temporalis vgl. Arteriometrie, Bd. I. pag. 194.

Drittes Capitel.

Arteria subclavia.

I. Anatomie.

Die rechte Subclavia ist kürzer, als die linke, und zwar um die ganze Länge des Truncus anonymus, aus welchem jene entspringt, während letztere direct aus der

¹⁾ Vgl. Lesser, eine Methode zur Unterbindung der Arteria lingualis, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. I. pag. 587. (1872).

Aorta kommt. Beide verlaufen bogenförmig zwischen den Mm. scaleni hindurch über die erste Rippe gegen die Mitte der Clavicula, unter welcher sie fortgehen, um weiterhin den Namen Arteria axillaris anzunehmen (vgl. Cap. IV.). — Da, wo die Arterie zwischen den Scalenen hervortritt, ruht sie in einer Vertiefung des Mittelstücks der ersten Rippe, zu deren Seiten sich zwei Höckerchen befinden, von denen das innere deutlicher zu fühlen ist. Ueber ihr bilden die Mm. scaleni einen Spitzbogen. Vor ihr, sie von der Vene scheidend, liegt der Scalenus anticus, hinter ihr Scalen. medius und posticus und der Plexus brachialis. Verfolgen wir die Arterien weiter abwärts und nach Aussen, so findet sich unter ihr gleichfalls die erste Rippe, aber von Oben und Vorn wird sie nur noch durch Bindegewebe, Fascia colli, Platysma und Haut bedeckt. Zuweilen liegt über ihr, gewöhnlich aber auch mehr nach Vorn, die Arteria transversa scapulae. Nach Vorn liegt die Clavicula, welche von der Arterie Anfangs durch den M. subclavius, weiter nach Aussen durch die Vena subclavia getrennt wird.

Die hauptsächlichsten Varietäten des Verlaufs der Subclavia sind folgende.

1) Die Subclavia dextra entspringt direct aus der Aorta. 2) Der Truncus anonymus befindet sich auf der linken Seite. 3) Beide Subclaviae entspringen isolirt aus der Aorta. 4) Beide Subclaviae entspringen aus der linken Hälfte des Aortenbogens, und zwar die rechte am Meisten nach Links, so dass sie, um zum rechten Arme zu gelangen, schräg vor der Wirbelsäule, entweder hinter dem Oesophagus, oder zwischen diesem und der Luftröhre verlaufen muss. Diese Varietät bedingt, besonders bei der letzteren Art des Verlaufes, Schlingbeschwerden (Dysphagia lusoria, ex lusu naturae). Bei diesem abweichenden Verlaufe dringt die Arterie übrigens zuletzt (ganz wie beim normalen Ursprunge) zwischen den Scalenen hindurch, und verhält sich von da ab wie gewöhnlich. 5) Es besteht eine überzählige (Hals-) Rippe und die Subclavia verläuft über diese (vgl. Poland, med. surg. transcript. 1869. LII.) — Auch Verengung und vollkommene Verschliessung der Subclavia ist einige Male beobachtet worden (vgl. Tiedemann, l. c. pag. 82).

Von grosser Bedeutung sind die Varietäten der Lage der Arterie im Verhältniss zu ihrer nächsten Nachbarschaft. Die Vene liegt zuweilen unmittelbar an und auf der Arterie, und geht mit ihr zwischen den beiden Scalenen hindurch. In anderen Fällen liegt die Arterie vor dem Scalenus anticus oder dringt durch das Muskelfleisch des Scalenus medius hervor. Im letzteren Falle pflegt dann einer der grossen Nervenstämme des Plexus brachialis an der normalen Stelle der Arterie zu liegen, woraus der zuweilen begangene Irrthum, einen Nerven statt der Arterie zu unterbinden, erklärlich wird.

Bei Menschen mit kurzem Halse und hohen Schultern liegt die Arterie tief, je länger der Hals, desto oberflächlicher.

II. Krankheiten der Arteria subclavia.

Verletzungen dieser Arterie sind selten, da dieselbe durch die Schulter und das Schlüsselbein von der einen und durch die Spitze des Brustkorbes von der anderen Seite gedeckt ist. Von Oben her gewährt ihr der Kopf Schutz. Dennoch sind Blutungen aus ihr und traumatische Aneurysmen beobachtet worden. Durch die Section nachgewiesen ist jedoch kein einziges rein traumatisches Aneurysma der Subclavia; zuverlässig an Lebenden beobachtet nur die von uns

als Aneurysma arterioso-venosum bezeichnete Art der traumatischen Pulsadergeschwülste (Larrey und Robert). Es ist hiernach wahrscheinlich, dass bei Verletzung der Arteria subclavia allein der Tod erfolgt, während bei gleichzeitiger Verletzung der Vene durch das Einströmen des arteriellen Blutes in diese letztere die Lebensgefahr abgewandt werden kann. Ein solcher Vorgang kann nur unter besonderen mechanischen Verhältnissen (durch welche das Einströmen des Arterien-Blutes, unter Ausschluss des Lufteintritts, begünstigt wird) oder bei sofort angewandter Compression Statt finden.

Die gewöhnlichen Pulsadergeschwülste der Arteria subclavia sind endogene. Jobert hat an dieser Stelle die seltene Beobachtung einer gleichmässigen Erweiterung des ganzen Arterienstammes gemacht¹⁾. Als Gelegenheitsursache für die endogenen Aneurysmen dieser Gegend hat man einen Schlag auf die Schulter oder heftige Anstrengungen aufführen zu müssen geglaubt²⁾; aber die wesentliche Ursache derselben ist hier, wie überall, die Entartung der Arterienwände (vgl. p. 89 u. 99). Die Aneurysmen haben häufiger ihren Sitz an dem nach Aussen von den Mm. scaleni gelegenen Theile der Arterie, als am inneren. Letztere erstrecken sich auf der rechten Seite immer zugleich auf den Truncus anonymus. Findet man die Geschwulst nach Innen von den Mm. scaleni, so kann die Communicationsöffnung dennoch an der Durchtrittsstelle selbst liegen. Entwickelt sich das Aneurysma nach Aussen von jenen Muskeln, gegen das Schlüsselbein hin, so darf man annehmen, dass die Oeffnung sich in der Nähe der Mm. scaleni an ihrer äusseren Seite befinde. Nimmt es seinen Ursprung in der Nähe des Schlüsselbeins, so wächst es gewöhnlich aufwärts. Solche Bestimmungen des Ausgangspunktes sind jedoch nur dann möglich, wenn man die Geschwulst ganz zu Anfang beobachten kann; späterhin, wo sie oft eine gewaltige Grösse erreicht, ist davon keine Rede mehr. Entstand das Aneurysma hinter dem Kopfnicker und wuchs von da aufwärts oder abwärts, aber nicht nach Aussen, so kann es später sogar zweifelhaft bleiben, ob dasselbe überhaupt der Subclavia, oder der Carotis, oder dem Truncus anonymus, oder gar dem Arcus aortae angehöre.

¹⁾ Vgl. Bourgeroy, *Traité de l'Anatomie de l'homme etc.* Tom. I. Pl. 32. — Nach J. Cockle (*Lancet*, 1869, March 27) wäre das wahre Aneurysma an dieser Stelle, wie am Truncus anonymus (vgl. pag. 150), relativ häufig.

²⁾ Vgl. Robert, *des Anérysmes*, Paris 1843, pag. 23. — Poland (*Statistics of subclav. aneurism. Guy's hospit. rep.* XV) führt unter 120 Fällen von Aneurysma der Subclavia 9 als in Folge von Erschütterungen oder übermässiger Muskelanstrengungen entstanden auf.

So lange das Aneurysma noch von mittlerer Grösse ist, hat es eine runde oder ovale Gestalt; erstreckt es sich aber bis unter die Clavicula oder unter das Schulterblatt bis in die Achselhöhle, und anderer Seits unter den Sternocleidomastoideus gegen den Hals hinauf und unter das Sternum, oder dringt es zwischen die Rippen hinein, so verliert seine Gestalt jede Regelmässigkeit und kann lappig, höckerig und verschiedenartig ausgebuchtet erscheinen. Auch seine Consistenz wird dann verschieden: an einzelnen Stellen ist es hart, an anderen nachgiebig oder auch fluctuirend. Unter den Veränderungen, welche die benachbarten Theile erfahren, ist besonders die Verdrängung des Schulterblattes und des Schlüsselbeins hervorzuheben. Beide Knochen werden unter dem Drucke der Geschwulst zuweilen von oberflächlicher Nekrose ergriffen. Aehnliche Veränderungen erfahren auch die Rippen, wenn die Geschwulst nach Vorn wächst; dieselben können sogar ganz zerstört werden. Häufiger entwickelt sich die Geschwulst nach Hinten in der Richtung der Fossa subscapularis. Höchst selten dagegen sind die Fälle, wo einer ihrer Lappen in den ersten Zwischenrippen-Raum eindringt und sich so weit in die Pleurahöhle hinein erstreckt, dass Compression der Lunge bewirkt wird oder eine Communication mit der Lunge eintritt. Ferner können die Wirbel sowohl der Hals- als auch der Rückengegend zerstört, der *Musc. trapezius* zuweilen sammt dem *Levator anguli scapulae* nach Aussen gedrängt und verdünnt, der *Scalenus medius* und *posticus* in einen bandartigen Streifen verwandelt und an die Wirbelsäule angedrängt werden, der *Scalenus anticus*, nach Vorn und Innen verschoben, ganz mit dem *Sternomastoideus* verschmelzen, welcher dann auch verdünnt und verschoben ist. Alle diese Muskeln werden also, wenn man bei einem grossen Aneurysma die Operation unternimmt, in ganz abnormem Zustande und in veränderten Lageverhältnissen angetroffen.

Die Athemnoth, die Erstickungszufälle, die Aphonie, die Schlingbeschwerden, die Störungen der Verdauung erklären sich theils aus dem Druck und der Zerrung, welche der *Vagus*, insbesondere dessen *Ramus recurrens*, erleidet, theils aber auch aus der Raumbegung, welche am Halse überhaupt eintritt, und durch welche die Luft- und Speiseröhre in ihren Functionen direct gestört werden. Die Schmerzen, das Gefühl von Taubheit und Kälte und die an Lähmung grenzende Schwäche der entsprechenden oberen Extremität finden in der Compression und Zerrung der Nervenstämme des *Plexus brachialis* ihre Erklärung. Auch die *Jugularvenen*, die *Vena subclavia* auf der rechten Seite, schliesslich auch die *Vena cava superior* werden com-

primirt; daher Anschwellung ihrer Aeste und der Theile, aus denen sie das Blut zurückführen, daher insbesondere auch bläuliche Färbung des Kopfes, des Halses, der Schulter u. s. f. Die Aeste der Subclavia finden sich zuweilen in der oben (pag. 100) erörterten Weise obliterirt. Alle diese Erscheinungen können allerdings auch durch jede andere in der Tiefe des Halses sich entwickelnde Geschwulst bedingt werden. Ausser den Aneurysmen dürften aber kaum andere Geschwülste, als Sarcome, eine so bedeutende Entwicklung in dieser Gegend erlangen. Die Pulsationen der Geschwulst und zwar nicht bloß die pulsirende Erhebung derselben, welche jeder Geschwulst durch die unterliegende Arterie mitgetheilt werden kann, sondern die mit dem Pulschlage synchronisch eintretende Ausdehnung der Geschwulst sind entscheidend.

Spontane Heilung eines Aneurysma der Arteria subclavia gehört zu den grössten Seltenheiten.

Therapie. Bei einer frischen Verletzung oder einem Aneurysma traumaticum primitivum wäre dicht oberhalb und dicht unterhalb der Arterienwunde eine Ligatur anzulegen, vorausgesetzt, dass entweder durch eine tiefe Ohnmacht oder durch Compression der Arterie gegen die erste Rippe (wenn nämlich die Verletzung nach Aussen von dieser Stelle sich befindet) die sonst schnell tödtliche Blutung verbütet worden ist. Jedenfalls wird man auf frischer That schleunigst comprimiren müssen. — Auch zur Beseitigung eines Aneurysma arterioso-venosum würde die Unterbindung der Subclavia dicht oberhalb und dicht unterhalb desselben erforderlich sein; da aber diese Geschwülste nur verhältnissmässig geringe Beschwerden machen, die gedachte Operation dagegen an und für sich lebensgefährlich ist, so wäre es verwerflich, sie in einem solchen Falle auszuführen. — Bei den gewöhnlichen Aneurysmen dieser Gegend ist die Ligatur entweder gar nicht, oder nur nach der Brasdor'schen Methode anwendbar. Wollte man nämlich an der centralen Seite der Geschwulst unterbinden (nach Hunter oder Ane1), so würde man entweder zu nahe am Aneurysma, oder zu nahe an den aus der Subclavia entspringenden Aesten die Ligatur anlegen müssen und daher einen unglücklichen Ausgang zu erwarten haben. Die Erfahrung hat dies bestätigt. Nicht minder ungünstig sind die Aussichten bei Unterbindung des Truncus anonymus (vgl. pag. 160). Nach der Methode Brasdor's wäre die Art. axillaris zu unterbinden, wie Dupuytren u. A. (mit constant unglücklichem Erfolge) gethan haben. Die zahlreichen Aeste, welche voraussichtlich zwischen der Communicationsöffnung des Aneurysma und der zu wählenden Ligaturstelle entspringen, lassen einen günstigen Erfolg

dieser Operation von theoretischer Seite kaum möglich erscheinen. Die Compression des zuleitenden Stammes ist fast niemals ausführbar; jedoch wird von ihr, sowie auch von der Compression der Geschwulst selbst je ein Erfolg berichtet. Somit bleibt in der Regel nur die Valsalva'sche Methode, die Anwendung der Kälte, die hypodermatische Injection von Ergotin und die Electropunctur übrig. Letztere erheischt in dieser Gegend vorzugsweise sicher isolirte Nadeln, um Reizung der nahe gelegenen Nervenstämme zu vermeiden.

III. Unterbindung der Arteria subclavia¹⁾.

Ihre Indicationen ergeben sich aus der Darstellung der Krankheiten der Subclavia und der Art. axillaris. Ausnahmsweise kann die Ligatur der Subclavia auch vor oder bei der Exstirpation grosser Geschwülste nothwendig werden²⁾.

Man hat die Subclavia 1) an der inneren Seite der Scaleni, 2) zwischen ihnen und 3) an der äusseren Seite derselben unterbunden. Für die erste dieser 3 Stellen gilt in Bezug auf das Verfahren und die Gefahren fast Alles, was über die Unterbindung des Truncus anonymus gesagt wurde (pag. 160). Wir betrachten daher nur:

A. Unterbindung zwischen den Mm. scaleni (Dupuytren). Einschnitt in der Richtung der Clavicula, ein wenig oberhalb derselben, vom vorderen Rande des Trapezium bis in die Clavicular-Portion des Kopfnickers³⁾. Hierauf entdeckt man ohne Schwierigkeit mit der Fingerspitze das am äusseren Rande des Scaleni ant. gelegene grössere Höckerchen der ersten Rippe, führt von diesem aus unter den Scaleni ant. eine Hohlsonde und durchschneidet ihn auf derselben, wobei Verletzungen des Nerv. phrenicus, welcher an der inneren Seite dieses Muskels und etwas vor ihm verläuft, und der etwas weiter nach Aussen gelegenen A. mammaria interna zu vermeiden sind.

B. Unterbindung an der äusseren Seite der Mm. scaleni, in der Furche der ersten Rippe⁴⁾. Fig. 15 u. 16, pag. 166 u. f.

¹⁾ Vgl. Koch, Archiv f. klin. Chirurgie. 1869. X. pag. 195 u. f. Zusammenstellung von 259 Fällen.

²⁾ Ich habe z. B. die Unterbindung am äusseren Rande des Scaleni bei der Exstirpation eines Carcinoms mit gutem Erfolge ausgeführt; ebenso Hueter (Berl. klin. Wochenschr. 1870. No. 7).

³⁾ Fig. 15 (pag. 166) sieht man in *F* den Scaleni ant., hinter welchem die Art. subclavia, *N*, hervortritt. Der Fig. 16 (pag. 168) bei 2 abgebildete Schnitt muss etwas weiter nach Innen verlängert gedacht werden, um ein Bild des hier beschriebenen Verfahrens zu geben.

⁴⁾ Zuerst ausgeführt von Ramsden und Post (1809). Andere benennen dies Verfahren nach Hodgson, Dupuytren, Lisfranc, C. J. M. Langenbeck.

Der Wegweiser, welcher sicher zur Arterie führt, ist das bereits erwähnte Höckerchen der ersten Rippe; die Arteria subclavia liegt unmittelbar an seiner äusseren Seite. Den Hautschnitt macht man entweder quer (wie Fig. 16, No. 2 dargestellt ist), 2 Centim. oberhalb der Clavicula, oder vertical an der äusseren Seite des Sternocleidomastoideus¹⁾. Durch ersteren gewinnt man mehr Raum, läuft aber Gefahr, die mit der Richtung der Wunde sich kreuzende Vena jugularis externa zu verletzen; durch letzteren vermeidet man diese sicher, verliert aber den grossen Vortheil der weit offenen Wunde. Daher wird nur bei einem Aneurysma, welches das Schlüsselbein bereits aufwärts gedrängt hat oder sich über demselben befindet, der verticale Schnitt der bequemere sein. Wo es irgend nützlich erscheint, kann man auch einen Lappen bilden, indem man einen verticalen Schnitt am äusseren Rande des Kopfnickers mit dem queren Schnitte combinirt. Jedenfalls muss der Hautschnitt 5—6 Centim. lang und vom Schlüsselbeine hinlänglich entfernt sein, um Entblössung oder gar Verletzung der Vena subclavia zu vermeiden. Sobald der äussere Rand des Musc. scalenus durch Hinwegnahme des Bindegewebes (Fettes) entblösst ist, hört man auf, mit schneidenden Instrumenten zu arbeiten; der Zeigefinger gleitet, während die Wunde durch Gehülfen mit Wundhaken offen erhalten und die Schulter abwärts und nach Vorn gedrückt wird, an jenem Muskelrande zu dem Höckerchen der ersten Rippe und fühlt an dessen äusserer Seite die Arterie, welche er sofort fixirt. Neben der Fingerspitze wird hierauf, genau auf der ersten Rippe, das die Arterie umgebende Bindegewebe mit zwei Pincetten oder mit Hohlsonde und Pincette zerrissen und der Ligaturfaden mit einer stark gekrümmten Aneurysma-Nadel von der inneren Seite herumgeführt.

Die Unterbindung der Art. vertebralis ist bisher nur ein Mal (auf der rechten Seite) von Andrew Smyth in dem pag. 160, Note 1. erwähnten Falle, nach vorgängiger Ligatur der Anonyma und der Carotis dextra, wegen Nachblutung aus dem aneurysmatischen Sacke der Subclavia ausgeführt worden. — Der Kranke lag auf dem Rücken, etwas nach Links geneigt. Einschnitt von 6 Centim. Länge am äusseren Rande des Kopfnickers, dicht über dem Schlüsselbein beginnend; der Rand des Muskels dann nach Innen gezogen. Das vordere Höckerchen des Querfortsatzes des 6. Halswirbels wird leicht gefühlt und dient als Führer. Das tiefe Blatt der Fascie wird gespalten, Lymphdrüsen und A. cervicalis ascend. werden einwärts verschoben, Mm. scalenus ant. und longus colli von einander gedrängt; dicht unter der Insertion des letzteren am genannten Höckerchen liegen Art. und V. vertebralis. Die Vene wird nach Aussen geschoben, die Unterbindungsnadel um die Arterie von Innen nach Aussen herumgeführt.

¹⁾ Der Schnitt soll, streng genommen in der Mitte des vom Cleidomastoideus nach Innen und vom Omohyoideus nach Aussen begrenzten Winkels vertical zur Clavicula geführt werden (Zang, Roux).

lo Betreff der Unterbindung der A. mammaria interna und der Arteriae intercostales siehe Bd. III., „Brustwunden“.

Viertes Capitel.

Arteria axillaris.

I. Anatomie.

Die Grenzen der Art. axillaris werden verschieden angegeben, je nachdem man sie zwischen dem M. pectoralis major und der vordern Thoraxwand belegene Stück der Arterie noch als Subclavia bezeichnet oder schon zur Axillaris rechnet. Im ersteren Falle nimmt man als obere Grenze der Axillaris ihr Hervortreten in der Achselhöhle an und giebt daher diesen Namen nur einer ganz kleinen Strecke der Arterie. Bei der zweiten Bezeichnungsweise dagegen nennt man Axillaris dasjenige Stück der Arterie, welches gegen das Herz hin vom Schlüsselbein, genauer ausgedrückt, vom unteren Ende der ersten Rippe, nach der Peripherie zu von der Insertion des Pectoralis major am Oberarme oder, genauer bezeichnet, von der Ursprungsstelle der Art. circumflexa humeri posterior begrenzt wird. Letztere Definition erscheint vom chirurgischen Standpunkte zweckmässiger, weil bei verschiedenen Stellungen des Armes dasselbe Stück der Arterie bald in der Achselhöhle, bald hinter dem Pectoralis major zu befinden. Legt man z. B. an einer Leiche bei möglichst stark erhobenem Arme eine Ligatur um die in der Achselhöhle entblösste Arterie, zieht dann aber den Arm wärts, so dass er dem Rumpfe anliegt und die betreffende Schulter etwas tiefer steht, als die der andern Seite, so findet man die von der Ligatur umfasste Stelle der Arterie hinter dem Pectoralis major, zwischen ihm und der Brustwand, wieder. Die Namen „Axillaris“ weiter abwärts gelten zu lassen, als bis zum Abgange der Art. circumflexa hum. post. ist von chirurgischer Seite nicht empfehlenswerth, weil eine Ligatur der sogen. Axillaris, welche unterhalb des Ursprungs der gedachten Arterie liegt würde, nicht zur Thrombusbildung in der Axillaris führen könnte. Fassen wir die „Arteria axillaris“ in der angegebenen Beschränkung auf, so liegt sie zur Mitte des obersten Theils des Brustkorbes und verläuft von da schräg durch die Achselhöhle. Vor ihr liegen, von Innen nach Aussen gezählt: M. subclavius, dann Pectoralis major und minor, von denen besonders ersterer die vordere Wand der Achselhöhle bildet, noch weiter nach Aussen, unmittelbar vor der Arterie, M. coracobrachialis; hinter ihr, in derselben Reihenfolge: die zweite und dritte Rippe, dann das zwischen Serratus anticus major und Subscapularis befindliche Bindegewebe; hinter der Arterie: Anfangs der erste Intercostalraum, weiterhin die oberste Portion des Serratus anticus major, endlich (in der Achselhöhle) nur noch die Fascie und die äussere Haut. Ueber der Arterie liegt der Musculus subclavius, demnächst der Plexus coracoideus, die Sehne des Subscapularis, welche zwischen der Arterie und dem Oberarmkopf hindurchgeht, zuletzt dieser Knochen selbst. Die Vena axillaris liegt Anfangs vor der Arterie, biegt sich aber in der Achselhöhle an ihre hintere Seite an. Sie ist an den Proc. coracoideus und an die Fascie des Pectoralis minor angeheftet, so dass sie nicht in der Weise, wie die Arterie, bei den Bewegungen des Armes hin und her geschoben wird und, wenn man sie in der Nähe des Pectoralis major durchschneidet, nicht wie andere Venen zusammenfällt, wodurch die Gefahr des Eintrittes bei ihrer Verletzung entsteht. Der Plexus brachialis liegt Anfangs nach

Hinten und Aussen von der Arterie, umgiebt sie aber an der Stelle, wo der *Pectoralis minor* dieselbe kreuzt, in der Art, dass die Nn. medianus und ulnaris an der unteren, der N. radialis an der oberen Seite ihren Platz nehmen. Die beiden zum Nerv. medianus zusammentretenden Nervenstämme pflegen die Arterie gabelförmig zu umfassen.

Die Varietäten der Art. axillaris bestehen wesentlich in einer mehr oder weniger frühen (hohen) Theilung derselben; vgl. „Art. brachialis“. Bemerkenswerth ist, dass die Portio clavicularis des *Pectoralis major* ganz fehlen kann (Cruveilhier). Die Art. axillaris ist dann auch im oberen Theile ihres Verlaufes blos von der Haut und der Fascie und nur in sehr geringer Ausdehnung vom *Pectoralis minor* bedeckt, so dass man ihre Pulsationen an der vorderen Thoraxwand sieht. Zuweilen fehlt auch die Sternalportion des *Pectoralis major*, oder der Zwischenraum zwischen den beiden Portionen des *Pectoralis major* ist sehr gross, wodurch die Arterie an dieser Stelle dann auch leichter zugänglich wird.

II. Krankheiten der Arteria axillaris.

Wunden der Art. axillaris, namentlich Hieb- und Schnittwunden, führen gewöhnlich zur Verblutung, bevor Hülfe geleistet werden kann; nur bei einer sehr kleinen oder sehr schräg verlaufenden Wunde, oder aber, wenn durch eine tiefe Ohnmacht die Blutung unterbrochen, oder sofort ärztliche Hülfe bei der Hand ist, lässt sich Rettung erwarten. Bérard erklärt die höchst seltenen Fälle, in denen man ohne Kunsthülfe Heilung erfolgen sah, durch die Annahme einer vollständigen Durchschneidung der Arterie und einer dadurch möglich gemachten Zurückziehung ihrer Enden. Fälle, in denen die Blutung durch eine Ohnmacht gestillt wurde, sind schon von Boerhave¹⁾ und John Bell²⁾ beobachtet worden. Zuweilen ist es gelungen, während die Blutung durch eine Ohnmacht unterbrochen war, die beiden Enden des Gefässes in der Wunde selbst zu fassen und zu unterbinden. In anderen Fällen hat sich ein Aneurysma gebildet; dies ist jedoch nur bei sehr enger Wunde möglich. Entsteht ein Aneurysma traumaticum primitivum, so kann dasselbe die ganze Achselhöhle ausfüllen, den *Pectoralis major* nach vorn, den

¹⁾ Commentaria, Tom. I. pag. 235. Ein Bauer erhielt in der Achselhöhle einen Messerstich; das Blut spritzte mit ungeheurer Gewalt hervor, so dass der Verletzte bald zusammensank und für todt galt. Tags darauf wurde eine gerichtliche Untersuchung des Körpers vorgenommen. Man fand die Brust noch etwas warm, übrigens kein Lebenszeichen, schob jedoch die genauere Untersuchung der Wunde noch einige Stunden auf. Inzwischen fing der Verletzte an, wieder warm zu werden. Man glaubte dennoch, dass er sterben müsse; aber nachdem er längere Zeit in grosser Schwäche zugebracht hatte, erholte er sich allmählig; nur blieb der Arm der verletzten Seite mumienartig, woraus wohl erschlossen werden kann, dass die Art. axillaris verletzt und dann obliterirt war.

²⁾ Principles of surgery, Vol. I. London, 1815.

Latissimus dorsi nach Hinten drängen, ja sogar über die Wandungen des ganzen Thorax und des Bauches sich erstrecken. Der Arm wird alsdann gelähmt, in verschieden hohem Grade schmerzhaft und die Gangrän desselben ist zu befürchten, da ihm (theils durch die Verletzung selbst, theils durch den Druck der von dem ergossenen Blute gebildeten Geschwulst) Blutzuffluss, Blutabfluss und Nerveneinfluss abgeschnitten sind.

Desault (Oeuvres chirurgicales, Tom. II. pag. 553), Debaig (Thèses de la faculté de Paris, 1812), Larrey (Bulletin de la faculté et de la société de médecine, Tom. VI. pag. 285) haben Fälle der Art beobachtet. In dem von Debaig beschriebenen sah man sich genöthigt, die Exarticulation des Armes vorzunehmen. Wird die Blutung spontan oder durch Compression gestillt, so ist die Entwicklung eines Aneurysma traumaticum consecutivum wahrscheinlich. Sabatier (Médecine opératoire 1832. Tom. III. pag. 124) berichtet einen solchen Fall, welcher durch die Valsalva'sche Methode geheilt wurde. Hodgson (Traité des maladies des artères et des veines, franz. Uebersetzung von Breschet, Tom. III. pag. 352) erwähnt ein Axillar-Aneurysma, welches in Folge einer Verletzung durch einen Scherben entstanden war und ohne Kunsthülfe heilte. In einem von S. Cooper (Dictionary of practical Surgery, fourth edit. pag. 157) aufgeführten Falle war ein Messerstich die Veranlassung, und die Heilung wurde durch Unterbindung der Art. axillaris erreicht.

Die Diagnose einer Verletzung der Art. axillaris ist leicht; nur Blutungen aus der Art. subscapularis oder Circumflexa humeri posterior könnten einen Irrthum veranlassen. In diesen zweifelhaften Fällen hat man den Radialpuls zu untersuchen; ist er vorhanden, so handelt es sich um Verletzung eines Astes der Axillaris, fühlt man ihn nicht, so ist wahrscheinlich die Axillaris selbst verletzt. Mit voller Sicherheit kann man Letzteres nicht annehmen, da ja auch der Schreck oder der bereits erfolgte Blutverlust den Puls unfühlfbar machen können und es überdies Menschen giebt, bei denen wegen eines abweichenden Verlaufes der Radialis der Puls nicht an der gewöhnlichen Stelle gefühlt werden kann.

Behandlung. Bei jeder Blutung aus der Achselhöhle muss der erste Griff nach der Art. subclavia sein, um sie auf der ersten Rippe zu comprimiren. Dies ist das dringend indicirte provisorische Blutstillungsmittel. Demnächst handelt es sich um genaue Untersuchung der Wunde. Nur wenn gleichzeitig mit der Arterie auch die benachbarten Weichtheile, besonders die Nervenstämme, in grösserer Ausdehnung zerrissen sind, oder wenn durch ein bereits gebildetes, Aneurysma diffusum die Gewebe des Armes bedeutend infiltrirt sind, kann — als letztes Rettungsmittel — die Exarticulation des Armes nothwendig werden, welche noch 1767 von Gooch bei jeder Verletzung der Art. axillaris angerathen wurde, aus Furcht, der Arm möchte nach der Unterbindung wegen mangelnder Blutzufuhr

brandig werden. Abgesehen von diesen Ausnahmefällen hat man immer sofort die Unterbindung und zwar, wenn irgend möglich, die Unterbindung dicht oberhalb und dicht unterhalb der Arterienwunde auszuführen, zu welchem Behufe die äussere Wunde fast immer mit dem Messer erweitert werden muss. Dies kann besonders in der oberen Hälfte des Verlaufs der Arterie grosse Schwierigkeiten machen.

Statistische Untersuchungen ergeben, dass die Unterbindung viel seltener ein günstiges Resultat hatte, wenn sie wegen einer Blutung, als wenn sie wegen eines Aneurysma traumaticum circumscriptum vorgenommen wurde. A. Bérard hat deshalb die Frage aufgeworfen, ob es nicht besser wäre, statt sofort zu unterbinden, lieber, wenn sich die Blutung nur irgend durch Compression stillen lässt, die Bildung eines consecutiven Aneurysma abzuwarten. Dies dürfte ein gewagter Versuch sein, da die Blutung auch plötzlich wiederkehren und tödtlich werden kann.

Gestattet die Art der Verletzung nicht, die Unterbindung an der verletzten Stelle auszuführen, so bleibt noch die Ligatur in der Continuität oberhalb der Wunde übrig, welche aber wegen der zahlreichen Anastomosen, weniger Sicherheit gewährt.

Einen schönen Erfolg erzielte Schmidt (jetzt in Marburg) in der Berliner Charité durch Unterbindung der Subclavia oberhalb des Schlüsselbeins wegen Verletzung derselben dicht unter dem Schlüsselbein. Berl. klin. Wochenschr. 1869. No. 38.

Die gleichzeitige Verletzung der Vena axillaris kann leicht den Tod sofort durch Lufttritt herbeiführen; jedoch giebt es auch einige Beispiele, dass in Folge einer gleichzeitigen Verletzung der Art. und Vena axillaris ein Aneurysma arterioso-venosum sich gebildet hat. Vgl. pag. 79. Man empfiehlt bei solchen Aneurysmen, nach dem Vorgange von Larrey, mit Recht ein expectatives Verfahren.

Endogene Aneurysmen der Art. axillaris sind relativ häufig. Uebertreibung der an sich schon ausgedehnten Bewegungen des Arms, zu heftiges und zu lange fortgesetztes Ziehen an demselben u. dgl. m. sind Gelegenheitsursachen zu ihrer Entstehung, sobald die Arterie durch krankhafte Veränderungen ihres Gewebes prädisponirt ist.

Ein Axillar-Aneurysma kann eine erhebliche Grösse erreichen, ohne von dem Kranken oder dem Arzte bemerkt zu werden, wenn es in der Tiefe der Achselgrube, unter dem Musc. pectoralis major, entsteht. Erreicht es einen höheren Grad der Entwicklung, so erscheint es entweder nahe am Schlüsselbein — und wächst von da aufwärts in die Regio supraclavicularis, so dass es für ein dort entstandenes Aneurysma gehalten werden kann —, oder in der Achselhöhle selbst, wo es besonders bemerklich wird, wenn der Kranke den Arm erhebt, später aber die vordere und hintere Wand der Achselhöhle (den Pectoralis major und den Latissimus dorsi) verdrängt. Die durch

Compression der Vena axillaris und der benachbarten Nerven bedingten Erscheinungen verhalten sich ähnlich, wie beim Aneurysma der Subclavia. Durch grosse Axillar-Aneurysmen wird die Clavicula aufwärts gedrängt, Erosion der Rippen bedingt und schliesslich zuweilen zu einem Bluterguss in die Pleurahöhle, oder auch in die Gelenkkapsel Veranlassung gegeben, wenn die Geschwulst nicht früher schon die Haut nach Aussen durchbrochen hat. Je weiter nach Oben die Geschwulst ihren Ursprung nimmt, desto mehr ähnelt sie, in Bezug auf Gefahr und Schwierigkeit der Behandlung, den am Halse gelegenen Aneurysmen; je weiter abwärts, desto mehr tritt sie in die Kategorie der Aneurysmen des Armes. Axillar-Aneurysmen haben gewöhnlich ein schnelles Wachsthum; die Schlawheit des die Achselhöhle ausfüllenden Bindegewebes begünstigt dasselbe. Die Diagnose ist zuweilen sehr schwierig, besonders wenn die Pulsadergeschwulst noch ganz in der Tiefe gelegen ist. Auch wenn sie gegen den Hals hin wächst, bleibt die Entscheidung schwer, ob es sich um ein Aneurysma, oder um eine andere Geschwulst handele. In zweifelhaften Fällen muss man immer zunächst an ein Aneurysma denken.

Die wenigen Fälle von spontaner Heilung, welche beobachtet sind, kamen in der letzten Periode der Krankheit vor. Hierauf fussend hat man eine expectative Behandlung empfohlen. Bedenkt man aber die Seltenheit solcher Fälle, die Verschlimmerung des Zustandes der Kranken, welche durch ein solches Zögern herbeigeführt wird, und die viel grössere Schwierigkeit und Gefahr einer operativen Behandlung in einem späteren Stadium, so erscheint ein solcher Rath verwerflich.

Die Behandlung sollte, wenn die Ausdehnung der Geschwulst nach Oben es irgend gestattet, stets mit der (allerdings nur durch Fingerdruck sicher auszuführenden) Compression der Subclavia beginnen, deren Wirkung durch Auflegen von Eis auf die Geschwulst unterstützt werden kann. Demnächst kommt die Electropunctur (mit gleichzeitiger Anwendung der Kälte) in Frage. Von den Unterbindungsmethoden könnte die Antyllus'sche nur bei kleinen traumatischen Aneurysmen, und auch bei diesen nur schwierig, Anwendung finden. Kommt man mit Compression, Kälte und Electropunctur nicht zum Ziele, so wird daher gewöhnlich (und bei endogenen Aneurysmen immer) nur die Hunter'sche oder Brasdor'sche Methode angewandt werden können. Erstere erheischt die Unterbindung der Subclavia auf der ersten Rippe; dieselbe ist, wenn die Ausdehnung des Aneurysma es gestattet, der zur Ausführung der

Brasdor'schen Methode erforderlichen Unterbindung des Endstückes der Axillaris oder des Anfangs der Brachialis bei Weitem vorzuziehen.

III. Unterbindung der Arteria axillaris.

Man kann die Art. axillaris blosslegen: entweder, indem man die vordere Wand der Achselhöhle, namentlich den Pectoralis major durchschneidet, oder in dem offenen Theile der Achselhöhle, wo sie nur von Haut, Fascie und Bindegewebe bedeckt ist.

A. Unterbindung hinter dem Musculus pectoralis major.

Unterbindung der Arteria subclavia unterhalb des Schlüsselbeins.

Der Hautschnitt wird parallel dem Schlüsselbeine, 2 Centim. unter demselben, 10 Centim. lang gemacht; er beginnt in der Gegend des Sternal-Endes der Clavicula und endet nahe an der Stelle, wo Pectoralis major und Deltoides zusammenstossen, ohne die hier verlaufende Vena cephalica zu verletzen. Haut, Platysma und Pectoralis major werden dreist durchschnitten; dann erscheint eine Bindegewebsschicht (Fascia coracoclavicularis), welche gewöhnlich eine ziemliche Festigkeit besitzt. Diese wird vorsichtig getrennt; unter ihr findet man die zu einem Bündel vereinigten Gefässe und Nerven als einen die Richtung der Wunde schräg kreuzenden Strang, welcher gegen den äusseren Wundwinkel hin gelegen und am Besten von dem, durch den beschriebenen Schnitt bereits entblösten, inneren Rande des Pectoralis minor aus aufzusuchen ist (vgl. pag. 166, Fig. 15 und pag. 168, Fig. 16, No. 3). Am Oberflächlichsten in dem gemeinsamen Gefäss- und Nerven-Bündel liegt die grosse Vena axillaris, deren Verletzung man mit höchster Vorsicht zu vermeiden hat. Etwas weiter aufwärts und zugleich mehr nach Aussen und Hinten (näher dem Schlüsselbeine und tiefer) liegt die Arterie, noch weiter aufwärts der Plexus brachialis. Mit dem Zeigefinger der linken Hand fixirt man zunächst die Vene und schiebt sie sanft nach Innen, um sie alsdann dem Finger oder Wundhaken eines Gehülfen zu übergeben. Von ihrer Seite, also von Innen und Unten nach Aussen und Oben, muss auch die Unterbindungsnadel um die Arterie herumgeführt werden. Die Ligatur muss oberhalb des Ursprunges der Arteriae thoracicae angelegt werden, weil diese sonst die Thrombusbildung hindern würden.

Statt dieses gradlinigen Schnittes empfiehlt Hodgson einen halbmondförmigen, nach Unten convexen, was keine besonderen Vortheile und schlechtere Heilung erwarten lässt. Ebenso verhält es sich mit dem Vorschlage, einen V-Schnitt zu machen, dessen einer Schenkel den grossen Brustmuskel vom Schlüsselbein ablösen, der andere parallel der Vena cephalica verlaufen soll. — Macht man blos einen Ein-

schnitt in dem Zwischenraume zwischen den beiden Portionen des Pectoralis major (Verfahren von Lisfranc), so hat man den Vortheil, gar kein Muskelfleisch zu durchschneiden; aber die Unterbindung wird auf solche Weise viel schwieriger, und Eiterwirkungen, welche bei tiefen Wunden dieser Gegend überhaupt leicht eintreten, werden durch dies Verfahren ganz besonders begünstigt.

B. Unterbindung in der Achselhöhle.

Der Arm wird stark abducirt und gegen den Kopf erhoben; der Hautschnitt wird 6—8 Cent. lang, genau am inneren Rande des Musc. coracobrachialis und längs desselben, an der vorderen Grenze des Haarwuchses (wie Schlemm richtig bemerkt) gemacht, die Fascie in derselben Richtung gespalten. Unmittelbar hinter dem inneren Rande des Coracobrachialis (dem ersten Haltpunkt), etwas nach innen von ihm, findet man die Arterie, umfasst von den beiden Wurzeln des Nervus medianus (Fig. 17). Sollte der Musc. coracobrachialis gar nicht zu entdecken sein, so kann man oft die dicken Nervenstränge durch die Haut hindurch fühlen, und alsdann am vorderen Rande derselben einschneiden.

Dies Verfahren gewährt mehr Sicherheit, als die von Lisfranc angegebene Bemerkung. Nach ihm soll man die Achselhöhle in Gedanken in 3 Theile theilen, und in der Grenze zwischen der vorderen und mittleren Abtheilung einschneiden (Vgl. Fig. 18 auf pag. 195). Auf solche Weise gelangt man aber direct zur Vena axillaris, deren Entblössung grade vermieden werden soll, was bei genauer Befolgung der oben gegebenen Vorschriften sehr wohl geschehen kann.

Fünftes Capitel.

Arterien des Armes und der Hand.

I. Anatomie.

Die Art. brachialis verläuft an der vorderen inneren Seite des Oberarmes, in der Richtung einer von der vorderen Wand der Achselhöhle (d. h. dem unteren Ende der Sehne des Pectoralis major) zu der Mitte der Ellenbeuge gezogenen Linie. In ihren Endästen wendet sich die Radialis zur äusseren (Radial-) Seite und dringt wesentlich in die Tiefe der Hand ein, während die Art. ulnaris, an der inneren (Ulnar-) Seite des Vorderarmes verlaufend, vorzugsweise den oberflächlichen Hohlknöchelbogen versorgt. — Nachdem die Art. brachialis den Rand des Musc. coracobrachialis verlassen hat, verläuft sie bis zur Ellenbeuge am inneren Rande des Biceps und wird von diesem etwas verdeckt. Vor ihr, dem Biceps-Rande dicht anliegend, befindet sich der Nerv. medianus, welcher erst im unteren Dritteltheile des Oberarmes sich zu ihrer inneren Seite und etwas mehr in die Tiefe wendet, so dass die Arterie zuletzt zwischen ihm und dem Biceps liegt. Von den die Arterie begleitenden beiden Arter. braachiales ist die innere gewöhnlich stärker; die äussere, dem Biceps näher liegende, ergießt sich im oberen Dritteltheile des Armes häufig in erstere, so dass

dasselbst überhaupt nur eine Vena brachialis, welche weiter aufwärts dann den Namen „axillaris“ erhält, zu bestehen pflegt. Nahe unter der Sehne des M. latissimus dorsi giebt die A. brachialis die Profunda brachii ab, aus welcher die mit dem Nerv. radialis verlaufende Collateralis radialis entspringt; weiter abwärts scheidet sie zwei Collateralis ulnares ab, welche (wie die Collateralis radialis) den aus den Vorderarm-Pulsadern entspringenden Arteriae recurrentes entgegenlaufen. In der Ellenbeuge wird die Art. brach. bedeckt von der Aponeurosis bicipitis, während Tendo bicipitis an ihrer Radialseite in die Tiefe geht. — Etwas weiter unten, also auch etwas unterhalb des Ellenbogengelenks, liegt die normale Theilungsstelle der Arterie in Radialis und Ulnaris. Die Art. radialis liegt oberflächlicher, nur von der Fascie bedeckt, Anfangs zwischen Supinator longus und Pronator teres, weiter abwärts zwischen dem erst genannten Muskel und dem Flexor carpi radialis, zwischen deren Sehnen sie in der Nähe des Handgelenkes zum Pulsfühlen benutzt wird. Der oberflächlichste Ast des Nerv. radialis legt sich von der äusseren Seite her an die Arterie an, verlässt sie aber in der unteren Hälfte des Vorderarmes wieder, um sich zwischen dem Supinator longus und dem Radius hindurch zur Rückenseite des Vorderarmes zu wenden. — Die Art. ulnaris verläuft viel tiefer, schräg nach Innen, um am Radialrande des Flexor carpi ulnaris, in der oberen Hälfte bedeckt vom Rande des Supinator longus, begleitet von dem an ihrer Ulnarseite gelegenen Nerv. ulnaris, zur Hand abwärts zu verlaufen. Die aus ihr, nahe der Ellenbeuge, entspringende Art. interossea wendet



Fig. 17¹⁾.

¹⁾ a, Nervus medianus, gerade vor der Art. brachialis gelegen; b, Nervus medianus und Vena brachialis sind mit einem Haken nach Innen gezogen, um die Arterie zu entblößen; c, Art. radialis mit den sie begleitenden Venen in ihrem ganzen Verlaufe blossgelegt durch die (mittelst eines Schnittes bei f vorgenommene) Entfernung des Flexor carpi radialis, des Flexor digitorum sublimis und des Palmaris longus; d, Art. ulnaris, durch denselben Schnitt blossgelegt; e, Art. interossea, blossgelegt (durch die Hinwegnahme der genannten Muskeln) bis zu der Stelle, wo sie hinten den Pronator quadratus tritt.

sich in die Tiefe, zur Volarseite des Ligamentum interosseum, welches sie mit ihrem Vordersaste nahe am Ursprunge, mit ihrem Endaste, aber hinter dem Pronator quadratus durchbohrt. Am Handgelenk, unterhalb des Ligament. carpi volare proprium, umdet die Ulnaris einen schwächeren tiefen Ast in die Hohlhand, welcher mit dem tiefen Ast der Radialis den unmittelbar auf den Mittelhandknochen liegenden tiefen Hohlhandbogen bildet, während sie mit ihrem stärkeren oberflächlichen Aste in dem Arcus volaris sublimis übergeht, welcher unmittelbar unter der Fascia palmaris liegt, und zu dessen Bildung die Radialis nur mit ihrem sehr schwachen oberflächlichen Aste (welcher in Fig. 17 viel zu stark gezeichnet ist) beiträgt. Der Stamm der Radialis geht, nachdem er diesen oberflächlichen Ast abgegeben hat, um den Radialrand der Handwurzel zwischen Processus styloides radii und Os multangulum majus, bedeckt vom Abductor longus und Flexor brevis pollicis, auf den Rücken der Hand, um in dem Zwischenraume zwischen dem 1. und 2. Mittelhandknochen in die Hohlhand einzudringen und sich in den tiefen Hohlhandbogen zu ergießen.

Die Varietäten der Art. Brachialis sind sehr zahlreich. Für den Chirurgen zu Wichtigsten ist die sogenannte hohe Theilung, welche so häufig vorkommt, dass Billroth dieselbe für den normalen Verlauf hielt. Gewöhnlich ist es die Art. radialis, welche sich zu früh von dem Stamme ablöst, und in seltenen Fällen sogar schon aus der Art. axillaris entspringt; sehr selten nimmt die Interossea hoch oben aus der Brachialis ihren Ursprung. Gewöhnlich liegt der zu früh entsprungene Ast auch oberflächlicher, als er sollte, nämlich zwischen Haut und Fascie. Für die Praxis ergiebt sich aus der Kenntniss dieser Varietäten die wichtige Regel, vor dem Beginne jeder, auch der unbedeutendsten Operation am Arme nicht bloß die Lage der Art. brachialis, sondern auch ihren Zusammenhang mit den Vorderarm-Pulsadern genau zu prüfen, zu welchem Befufe man sich, während die Brachialis am Biceps-Ende comprimirt wird, über das Aufhören oder Fortbestehen der Pulsationen in der Radialis, Ulnaris, sowie auch in einer vielleicht vorhandenen Interossea superficialis (A. mediana) zu unterrichten hat. Von derjenigen Vorderarm-Arterie, in welcher hierbei die Pulsationen nicht aufhören, ist anzunehmen, dass sie schon oberhalb der comprimirten Stelle ihren Ursprung nimmt.

Ueber die einzelnen Verhältnisse dieser Varietäten vgl. Tiedemann, Tabulae Arteriarum und die Supplemente dazu. Derselbe hat das Verdienst, zuerst auf die Mannigfaltigkeit und Wichtigkeit dieser Varietäten, sowie auf den Umstand, dass die hohe Theilung sich gewöhnlich bei kurzarmigen Individuen vorfindet, aufmerksam gemacht zu haben. Ferner sind zu vergleichen: Krause, Handbuch der Anatomie, Bd. I. Th. 2. pag. 895 u. f., Henle, Handbuch d. system. Anatomie, Bd. III., Barkow, die angiologische Sammlung etc. zu Breslau (1869). — Von diesen Autoren sind auch die ausserordentlich häufigen Varietäten der Hand-Arterien genauer erörtert.

II. Krankheiten der Arterien des Armes und der Hand.

Mit der Abnahme des Durchmessers der Arterien vermindern sich die Gefahren ihrer Verletzung. So sind denn Wunden der Brachialis bei Weitem seltener tödtlich, als diejenigen der Axillaris, zumal die provisorische Stillung der Blutung durch Compression selbst von Laien leicht bewirkt wird. Verletzungen der Brachialis im oberen

Drittel des Armes sind gefährlicher, als in den beiden unteren, nicht blos weil die Arterie dort grösser ist, sondern besonders wegen der dort liegenden, der Thrombusbildung ungünstigen Ursprungsstelle der *Art. profunda brachii*. In den beiden unteren Dritteln des Armes ist es leicht, eine Blutung aus dem Stamm der *Brachialis* von einer aus ihren Aesten, besonders aus der *Profunda* kommenden zu unterscheiden. Letztere ist die einzige Arterie, welche ausser dem Stamme zu einer unmittelbar gefährlichen Blutung in dieser Gegend Veranlassung geben könnte. Blutungen aus den *Collaterales* werden durch *Compression* leicht gestillt.

Früher gab der Aderlass an der *Vena mediana basilica* (vgl. Bd. I. pag. 183) häufig Veranlassung zur Verletzung der *Art. brachialis* in der Armbeuge. Gewöhnlich war dann die Wunde sehr klein, es war sofort zweckmässige Hülfe geleistet, und man findet daher auch zahlreiche Fälle verzeichnet, in denen durch einen fest angelegten und lange Zeit fortgesetzten Druckverband vollständige Heilung erreicht wurde¹⁾. Es kann aber auch sogleich ein *Aneurysma diffusum* oder später ein *Aneurysma circumscriptum* oder endlich ein *Aneurysma arterioso-venosum* entstehen.

Als allgemeine Vorschrift muss man festhalten, dass bei allen Verletzungen der *Art. brachialis* (wenn nicht augenscheinlich durch *Compression* an der verwundeten Stelle die Blutung sicher gestillt werden kann), die Unterbindung oberhalb und unterhalb der Arterien-Wunde ausgeführt werden muss; besonders gilt dies für die beiden unteren Drittel des Oberarmes, zu welchen nicht durch die *Profunda* und durch die *Collaterales* im unteren Drittel so reichlich Blut zugeführt wird, dass alsbald eine Blutung vom peripherischen Ende her erwartet werden muss. Deshalb ist auch hier die indirecte Unterbindung nur in solchen Fällen als Ersatzmittel zu ergreifen, wo die Unterbindung an der Stelle der Verletzung unausführbar oder aus anderen Gründen unzulässig erscheint.

Aneurysmen im oberen Drittel des Armes können durch indirecte *Compression* nicht leicht behandelt werden, da diese mit Sicherheit sich auf die Dauer nicht ausüben lässt. *Electropunctur* und *styptische Einspritzungen* könnten bei kleineren Geschwülsten versucht werden; bis jetzt liegen nur Erfolge vor, welche durch indirecte Unterbindung erzielt wurden. In den beiden unteren Dritteln des Oberarmes gestalten die Verhältnisse sich anders, weil hier die indirecte *Compression* mit viel geringerer Gefahr dasselbe zu leisten ver-

¹⁾ Ich würde immer zur Unterbindung an der Stelle der Verletzung rathen und habe davon in vier Fällen den vorzüglichsten Erfolg gesehen.

mag, wie die indirecte Unterbindung. Dasselbe gilt von den (gewöhnlich traumatischen) Aneurysmen der Ellenbeuge und des Vorderarmes, bei denen aber der geringen Grösse wegen meist die Antyllus'sche Methode mit Sicherheit angewandt werden kann.

Verletzungen der Arterien des Vorderarmes werden am Häufigsten durch Messerstiche, Fall in Glasscherben oder auf ein scharfes Instrument, auch wohl durch ungeschickte Handhabung schneidender Werkzeuge, endlich durch Schusswunden u. dgl. m. veranlasst. Häufiger finden sie sich in der unteren Hälfte des Vorderarmes, als weiter oben. Die Art. interossea wird wegen ihrer tiefen Lage sehr selten getroffen; es gehört dazu entweder ein ganz besonderer Zufall¹⁾ oder eine sehr tiefe Zerstörung der Weichtheile. Pulsadergeschwülste sind am Vorderarme sehr selten. Was die traumatischen betrifft, so wird ihre Entstehung durch die oberflächliche Lage der Arterien in der unteren Hälfte des Vorderarmes und die daraus entspringende Leichtigkeit des Blutausflusses sehr erschwert.

Beobachtungen von Aneurysma traumaticum consecutivum an der unteren Hälfte des Vorderarmes finden sich bei Tulpus (*Observationes medicae*, lib. III. observ. 17), Scatani (*De externis aneurysmatibus*, edente Lauth. Strassburg 1785; in 4. m. Abb.), Rigdon (*Maladies des artères et des veines*. Tom. I. pag. 148, französische Uebersetzung von Breschet).

Bei Verletzung der Vorderarm-Arterien ist es durchaus nothwendig, sowohl unterhalb, als oberhalb der Arterienwunde zu unterbinden, weil beide Gefässe durch die grossen Gefässbögen in der Hohlhand mit einander in fast directer Verbindung stehen, und die Blutung also sehr bald wieder eintreten müsste, wenn man blos am centralen Theile der Wunde eine Ligatur angelegt hätte. Wäre es (was freilich nur höchst selten der Fall sein dürfte) unmöglich, zur Arterienwunde selbst zu gelangen, so müsste man entweder beide Vorderarm-Arterien in ihrer Continuität oberhalb der Wunde oder die Brachialis unterbinden, was wegen des wechselnden Ursprungs der Interossea im Allgemeinen sicherer ist. Letzteres dürfte auch einfacher und leichter sein, da statt zweier Wunden nur eine und, statt der schwierigen Aufsuchung der Vorderarm-Pulsadern in der Tiefe des Muskelfleisches, nur die leicht ausführbare Blosslegung der Brachialis am Rande des Biceps erforderlich ist. Auch bei Verletzungen der Interossea ist, sofern Compression nicht ausreicht, die Unterbindung der Brachialis vorzunehmen.

Verwundungen des unteren Endes der Art. ulnaris sind häufig

¹⁾ Eine solche Verletzung der Interossea durch Messerstich habe ich ein Mal beobachtet. Radialis und Ulnaris waren unversehrt.

mit Verletzung des Nervus ulnaris complicirt, obgleich dieser durch die Sehne des Flexor carpi ulnaris geschützt ist. Dieselbe veranlasst Unempfindlichkeit des kleinen Fingers und der Ulnarseite des Ringfingers, zu welchen die Hautäste jenes Nerven verlaufen; auch die kurzen Muskeln des kleinen Fingers und die Mm. interossei sind in einem solchen Falle gelähmt, da auch sie vom N. ulnaris versorgt werden. Diese Lähmungserscheinungen verschwinden, sobald die Nervenwunde geheilt ist, — oft sogar viel früher, durch einen noch nicht vollkommen aufgeklärten Mechanismus, welcher dem Medianus und Ulnaris gestattet, einander zu vertreten.

Vgl. Richet, Gaz. des hôpit. 1867, Novembr. und die in meinem Referat im Jahresber. v. Virchow u. Hirsch pro 1868. Bd. II. pag. 319 angeführte Literatur.

An der Hand sind Verletzungen des oberflächlichen Hohlhandbogens viel häufiger als diejenigen des tiefen. Ihre Ursachen sind alle die bei den Wunden der Vorderarm-Arterien aufgeführten. Viele Handwerke geben zu solchen Verletzungen besonders häufig Veranlassung. Die Gefahren sind geringer, wenn der oberflächliche, als wenn der tiefe Hohlhandbogen verletzt ist; dort kann man noch (obgleich oft auch mit Schwierigkeit) die blutenden Gefäss-Enden selbst unterbinden (vgl. pag. 197); im letzteren Falle ist dies geradezu unmöglich, weil man, um zu dem tiefen Hohlhandbogen zu gelangen, sich zwischen den Sehnenscheiden einen Weg bahnen müsste, welcher, wenn er auch zum Ziele führt, doch eine so heftige Entzündung der ganzen Hand und besonders der Sehnenscheiden zur Folge haben würde, dass mindestens die Brauchbarkeit derselben auf dem Spiele stände. Wenn die Unterbindung in der Wunde nicht ausführbar erscheint, so hat man am Arcus sublimis, nach Middeldorpf¹⁾, vor Allem die percutane Umstechung zu versuchen. Ausser dieser kommen noch die Unterbindung in der Continuität und die permanente Compression in Frage. Erstere kann wiederum entweder an einer der beiden Vorderarm-Arterien, oder an beiden, oder an der Brachialis vorgenommen werden. Da die Vorderarm-Arterien in beiden Hohlhandbögen mit einander anastomosiren, so dürfte die Unterbindung bloß einer der Vorderarm-Arterien gewöhnlich unzureichend sein. „Jedoch,“ sagt Cloquet²⁾, „wenn die Compression der Ulnaris bei einer Verletzung des Arcus sublimis, und bei derjenigen des Arcus profundus die Compression der Radialis die Blutung vollkommen unterdrückt, so kann man sich mit der Unterbindung des entsprechenden Gefässes begnügen, wird aber aus Vorsicht doch

¹⁾ Vgl. „Umstechung“ pag. 137.

²⁾ Dictionnaire de médecine, Tom. IV. pag. 452.

gut thun, einige Tage lang auf die andere Vorderarm-Arterie eine kräftige Compression auszuüben.“ Statt einer solchen sehr unvollkommen sichernden Unterbindungsweise wendet man, wenn von der Umstechung abgesehen werden soll, gewiss besser die Compression und zwar die directe Compression des blutenden Gefässes an, indem man die Hohlhand, bei gebeugter Stellung der Finger, mit Schwamm ausstopft, diesen durch fest angelegte Cirkelbinden andrückt und den Arm in stark gebeugter Haltung befestigt. Die übermässige Beugung im Ellenbogengelenk hat sich als ein sicheres und einfaches Mittel zur Stillung von Blutungen aus den Arterien des Vorderarmes und der Hand bewährt.

Ich kann in dieser Beziehung die Angaben Adelmann's (vgl. pag. 113) aus eigener Erfahrung bestätigen. — Jedoch ist, wie eine Beobachtung Burow's zeigt (Arch. f. kl. Chir. XII. 3.), vor allzulanger Fortsetzung zu warnen; in dem angeführten Falle bedingte eine 67 Stunden fortgesetzte gewaltsame Beugung, ohne die Blutung definitiv zu stillen, Brand der Hand und nöthigte zur Amputation.

Führen die bisher erwähnten Maassregeln nicht zum Ziele, so dürfte auch bei diesen Verletzungen nicht die von Einigen vorgeschlagene Unterbindung der Radialis und Ulnaris anzuwenden sein, sondern diejenige der Brachialis, welche hier umsomehr indicirt ist, als die Interossea nicht ganz selten gross genug ist, um durch ihre Endäste die Blutung aus der Hohlhand zu unterhalten, was durch die Unterbindung jener beiden Arterien in keiner Weise gehindert werden würde.

An der Rückenseite der Hand kann zwischen den Sehnen des Extensor und Abductor longus pollicis, in dem bei stark abducirten und gestreckten Daumen als Grube („*tabatière*“ der Franzosen) erscheinenden Raume, die Art. radialis (nach Anderen: ihr Ramus profundus) verletzt werden; sie ist leicht zu unterbinden. Auch die zahlreichen Varietäten des Arterienverlaufs an der Hand, wobei oft starke Aeste auf der Rückenseite der Hand liegen, können zu bedeutenden Blutungen Veranlassung geben, welche durch Unterbindung in der Wunde leicht und sicher beseitigt werden. Verletzungen der an den Seiten der Finger verlaufenden Aa. digitales sind häufig, sie werden durch Druckverband oder (wenn dieser lästig sein sollte) durch Unterbindung der Gefäss-Enden in der Wunde gestillt.

Cyrsoide Arteriectasis (vgl. pag. 95, Fig. 7) ist mehrmals an den Arterien des Vorderarmes und der Hand beobachtet worden.

Einen sehr ausgeprägten Fall der Art habe ich bei einem Knaben mit Hülfe der Galvanokaustik und wiederholter Unterbindungen zur Heilung gebracht. Der Fall ist vor Vollendung der Heilung beschrieben in der Dissertation von Jansen, *Nonnulla de aneurysmate anastomotica*. Greifswald, 1857.

III. Unterbindung der Arterien des Armes und der Hand.

A. Arteria brachialis. Dieselbe Rolle, welche bei der Aufsuchung der Art. axillaris der M. coracobrachialis spielt, hat für die Art. brachialis der M. biceps. Mit der Blosslegung des inneren Randes des Biceps hat man stets den richtigen Weg zu ihr gefunden. In der grösseren Ausdehnung des Oberarmes findet man alsdann zuerst den Nerv. medianus und erst hinter diesem die Arterie; im unteren Drittel und besonders in der Ellenbeuge ist das Verhältniss das umgekehrte. Jedenfalls hat man gewonnenes Spiel, sobald man den Medianus aufgefunden hat; entweder zwischen ihm und dem inneren Rande des Biceps oder an der inneren Seite des Nerven liegt die Arterie. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse ist es von grosser Wichtigkeit, auf den M. biceps selbst in der Nähe seines Randes einzuschneiden und erst, nachdem der Muskel sicher gefunden und entblösst ist, seinen inneren Rand aufzusuchen. Folgt man der von einigen Autoren gegebenen Vorschrift, den Hautschnitt am inneren Rande des Biceps zu machen, so kann man leicht bei einiger Verschiebung der Wunde zu weit nach Innen gerathen, alsdann statt des Medianus den Ulnaris blosslegen¹⁾ und somit die Arterie an einer Stelle suchen, an welcher sie niemals liegt.

a) Unterbindung in der Mitte des Oberarms. In der so eben angegebenen Weise wird am inneren Rande des Biceps der Nerv. medianus blossgelegt. Dicht hinter ihm führt man die Hohlsonde von Innen her gegen den Biceps-Rand und hebt den Nerven sanft damit empor, ohne irgend einen hinter oder neben ihm liegenden Theil mitzufassen. Hierauf setzt man auf die Rinne der Hohlsonde einen Wundhaken, welcher dem Gehülfen übergeben wird, um nach Entfernung der Hohlsonde mit diesem den Nerven gegen den Muskelrand anzudrücken. Sobald dies geschehen ist, erscheint in der Wunde die Arterie, begleitet von zwei Venen, welche nach Spaltung der gemeinsamen Gefäss-Scheide sich leicht von ihr trennen lassen. Die Operation gelingt weniger leicht, wenn man den Medianus in entgegengesetzter Richtung von der Arterie zu entfernen sucht. Besonders zu warnen ist davor, dass man die Arterie nicht mit dem Nerven zugleich unter den Wundhaken schiebe, wovon nur ein genaues Isoliren des Nerven schützen kann, welches, mit Sorgfalt ausgeführt, die Function des Nerven in keiner Weise stört.

¹⁾ Die Besorgniss vor einer solchen Verwechslung gründet sich auf Erfahrung, wie sie bei Operationsübungen an Leichen häufig gemacht werden.

b) Unterbindung in der Armbeuge (Fig. 18). Hautschnitt in der Richtung einer vom inneren Rande des Bicepsmuskels zur Mitte der Armbeuge gezogenen Linie oder an der inneren Seite der Cauda des Biceps oder auch nach dem Verlauf der Vena mediana basilica, welche nachher vorsichtig bei Seite zu schieben ist. Die an der Ulnarseite des Vorderarmes verlaufende peroneurische Ausbreitung der Bicepssehne wird durchschnitten; unter ihr findet man die Arterie in dem, nach Innen vom Pronator teres, nach Aussen vom Supinator longus und der Sehne des Biceps begrenzten dreieckigen Raume. Man geht von der Biceps-Sehne gegen die innere Seite der Armbeuge vor; der erste Strang, den man hier antrifft, ist unfehlbar die Art. brachialis mit den sie begleitenden beiden Venen. Der Nervus medianus liegt an der Ulnarseite der Arterie.

In 2 Fällen, in denen ich die Brachialis wegen Verletzung beim Aderlass, in der Ellenbeuge doppelt unterbunden habe, stellte sich der collaterale Blutlauf sehr schnell her; an der Art. radialis konnte in dem einen Falle bereits nach 9 Stunden der Puls gefühlt werden. — Die Heilung der Wunde erfolgt langsamer und nachträgliche Phlegmonen sind wegen der erforderlichen Durchschneidung der

Fig. 18¹⁾.

¹⁾ Fig. 18 zeigt bei 1, 2, 3 Lisfranc's Einteilung der Achselhöhle zum Behufe der Aufsuchung der Art. axillaris (vgl. pag. 187). *a* bezeichnet die Spitze des Dreiecks, in welchem der Coracobrachialis und die Arterie verlaufen, *b* die gewöhnliche Unterbindungsstelle in der Mitte des Oberarmes. Bei *c* ist die Arterie in der Armbeuge zwischen dem Nerv. medianus und der Cauda des Biceps blossgelegt und ein Faden unter ihr durchgeführt. *d* ist der Einschnitt für die Blosslegung der Arteria radialis an der Grenze zwischen dem oberen und mittleren Drittel des Vorderarmes, am inneren Rande des Supinator longus. *e* Einschnitt zur Blosslegung der Ulnaris in derselben Höhe. *f* und *g* sind die Stellen, wo die Radialis und Ulnaris im unteren Drittel des Vorderarmes unterbunden werden.

derben Aponeurosis bicipitis wohl eher zu erwarten, als bei der Unterbindung in der Mitte des Oberarmes.

B. Arteria ulnaris. a) Unterbindung in der oberen Hälfte des Vorderarmes. Man sucht die Sehne des Flexor carpi ulnaris nahe am Os pisiforme auf, und verfolgt ihren Radialrand aufwärts, indem man, um den Muskel selbst stärker hervorspringen zu lassen, abwechselnd die Hand beugen und strecken lässt. Ist man über die Lage desselben nicht ganz genau aufgeklärt, so thut man besser, etwas näher dem inneren Rande den Hautschnitt zu machen, weil man, von hier aus nach Aussen vorrückend, sicher durch die Fascia antibrachii hindurch den Zwischenraum zwischen dem Flexor carpi ulnaris und dem Flexor digitorum sublimis erkennen kann. Erst, wenn dies geschehen ist, wird, genau diesem Zwischenraume entsprechend, die Fascia antibrachii gespalten. Man lässt durch einen Gehülfen die Hand stark gegen den Vorderarm beugen, um die Flexoren zu erschlaffen. Der Flexor digitorum sublimis wird mit einem Wundhaken nach Aussen, der Flexor carpi ulnaris nach Innen gezogen. Diese Muskeln sind aber oft mit einander verwachsen, so dass man sie mit dem Messer trennen muss. Zwischen beiden erscheint dann in der Tiefe, wenn man von der Ulnarseite ausgeht, zunächst der Nerv. ulnaris und weiter nach der Radialseite die von zwei Venen begleitete Arterie.

b) Im unteren Drittel des Vorderarmes findet man die Arterie in der Furche zwischen den Sehnen des Flexor carpi ulnaris und des Flexor digitorum sublimis. Der Hautschnitt wird vom Radialrande des Os pisiforme in der Richtung gegen die Mitte der Ellenbeuge gemacht. Nachdem die Fascia antibr. in derselben Richtung durchschnitten und die Wundränder auseinander gezogen sind, erscheint zunächst am Rande des Flexor carpi ulnaris der Ulnarnerv, weiter nach der Radialseite die Arterie mit ihren beiden Venen.

c) An der Radialseite des Os pisiforme kann der Volarast der Art. ulnaris unterbunden werden; auch hier liegt der entsprechende Nerv an dessen Ulnarseite. Der Einschnitt muss 3 bis 5 Millim. vom Os pisiforme gemacht werden; man hat die Haut, fettreiches Bindegewebe und die Fasern des Palmaris brevis zu durchschneiden. Die Arterie liegt dicht am Ligam. carpi volare proprium.

C. Arteria radialis. a) Unterbindung in der oberen Hälfte des Vorderarmes. Supinator longus an der äusseren, Pronator teres und Palmaris longus an der inneren Seite begrenzen einen nach Oben offenen Winkel. Schneidet man gerade im Scheitel dies-

Winkels in der Richtung gegen die Hand ein, so gelangt man, nachdem die Fascia antibrachii gespalten ist, zu dem inneren Rande des Supinator longus, schiebt diesen nach Aussen und durchschneidet auf der Hohlsonde das unter ihm gelegene tiefe Blatt der Fascia antibrachii, unter welchem die von zwei Venen begleitete Arterie liegt. Kann man die angegebenen Muskeln nicht deutlich durch die Haut erkennen, so zieht man von der Stelle, an welcher man in der Nähe des Handgelenks gewöhnlich den Puls (an der Radialis) fühlt, eine Linie zur Mitte der Armbeuge; dies ist die Richtung der Arterie. Ist man nicht ganz sicher, so thut man übrigens besser, sich näher dem Radialrande zu halten; dringt man dann weiter gegen die Mittellinie des Armes vor, so findet man ohne Zweifel den vor Durchschneidung der Fascie leicht zu erkennenden Zwischenraum zwischen dem Supinator longus und dem Palmaris longus, oder (wenn dieser fehlt) dem Flexor digitorum sublimis, — vom Radialrande aus gerechnet, das erste Spatium intermusculare.

b) Unterbindung in der unteren Hälfte des Vorderarmes. Die Sehnen des Supinator longus und des Flexor carpi radialis begrenzen eine ungemein leicht zu fühlende Furche, in welcher die Arterie verläuft. Es handelt sich nur darum, bei der Durchschneidung der Fascia antibrachii die Arterie nicht zu verletzen und sie dann von den beiden begleitenden Venen zu isoliren.

c) An der Rückenseite der Hand entblösst man die Art. radialis in der Furche zwischen den Sehnen des Abductor longus und des Extensor longus pollicis durch einen, in der Richtung jener Sehnen geführten, etwa 3 Centimeter langen Schnitt, welcher nur die Haut und die Aponeurose zu trennen hat.

D. Arcus volaris superficialis. Um den oberflächlichen Hohlhandbogen aufzufinden, bringt man, nach Boeckel¹⁾, den Daumen in möglichst starke Abduction und zieht in der Verlängerung seines Cubitalrandes eine Linie quer durch die Hohlhand; parallel mit derselben aber etwa 1 Centimeter näher an den Fingern, grade in der Mitte zwischen jener Linie und der mittleren Hautfurche der Hohlhand, wird eine zweite Linie gezogen, welche genau dem Verlaufe des Hohlhandbogens entspricht. In dieser Richtung einschneidend, findet man die Arterie, sogleich nach Durchschneidung der Aponeurosis palmaris, durch eine Fettlage von den Sehnen und Nerven getrennt.

¹⁾ Gazette médicale de Paris, 1862, No. 13.

Sechstes Capitel. Arteriae iliacaе.

I. Anatomie.

Die beiden Iliacae communes sind, abgesehen von der schwachen Art. sacralis media, die Endäste der Aorta abdominalis. Die Theilungsstelle befindet sich in der Höhe des unteren Randes des vierten Lendenwirbels. Jede Iliaca communis theilt sich nahe an der Symphysis sacro-iliaca in die Iliaca externa und interna. Die Länge der Iliaca communis beträgt etwa 6 Centimeter. Sie liegt auf den Seitentheilen des fünften Lendenwirbels und am inneren Rande des Psoas, umgeben von zahlreichen Lymph-Gefäßen und -Drüsen, vorn vom Peritoneum überzogen, welches durch lockeres Bindegewebe mit ihr verbunden ist. Die Vena iliaca comm. dextra liegt in ihrer ganzen Länge dicht an der hinteren Seite der gleichnamigen Arterie; die Vena iliaca comm. sinistra dagegen wendet sich, aufsteigend, von der hinteren Seite ihrer Arterie zu deren innerer Seite, um unter der Art. iliaca comm. dextra hindurch zur Vena cava inferior zu gelangen (Fig. 19¹⁾).



Höhe des unteren Randes des vierten Lendenwirbels. Jede Iliaca communis theilt sich nahe an der Symphysis sacro-iliaca in die Iliaca externa und interna. Die Länge der Iliaca communis beträgt etwa 6 Centimeter. Sie liegt auf den Seitentheilen des fünften Lendenwirbels und am inneren Rande des Psoas, umgeben von zahlreichen Lymph-Gefäßen und -Drüsen, vorn vom Peritoneum überzogen, welches durch lockeres Bindegewebe mit ihr verbunden ist. Die Vena iliaca comm. dextra liegt in ihrer ganzen Länge dicht an der hinteren Seite der gleichnamigen Arterie; die Vena iliaca comm. sinistra dagegen wendet sich, aufsteigend, von der hinteren Seite ihrer Arterie zu deren innerer Seite, um unter der Art. iliaca comm. dextra hindurch zur Vena cava inferior zu gelangen (Fig. 19). Die linke Vena iliaca comm. ist somit einem gewissen Drucke von Seiten der Pulsationen der mit ihr sich kreuzenden Arterie ausgesetzt, woraus man zu deduciren pflegt, dass der Rückfluss des venösen Blutes aus dem linken Beine schwieriger erfolgen müsse, als aus dem rechten. Genauere Betrachtung lehrt, dass auch die rechte Vena iliaca einer ähnlichen Compression ausgesetzt ist, indem die gleichnamige Arterie schräg über sie fortgeht und die Arteria hypogastrica in der Gegend der Symphysis sacro-iliaca durch ihre Pulsationen gleichfalls einen Druck auf sie ausübt.

Die Art. iliaca externa (femorialis), der stärkere Ast der Iliaca comm., verläuft in der Richtung des Stammes schräg

¹⁾ a Psoas major; b Iliacus internus; c Schenkelband, Ligamentum Fallopii s. Poupartii (zu breit gezeichnet); i Aorta; j Art. iliaca communis; k Art. hypogastrica; l Art. iliaca externa; m Art. femoralis; o Vena cava inferior; p Vena iliaca communis; q Vena hypogastrica; r Vena iliaca externa; s Vena femoralis. In Betreff der übrigen Buchstaben vgl. Cap. VIII.

aus- und abwärts zum Schenkel. Auch sie ist nur ganz locker mit dem, ihre vordere und innere Seite überziehenden Bauchfelle verbunden. Hinter ihr liegt die Fascia iliaca, welche den Musc. ileo-*psaos* bedeckt. Die Vena iliaca externa verläuft vom Schenkel her Anfangs an der inneren, weiterhin an der hinteren Seite der gleichnamigen Arterie. Die Nerven des Plexus lumbalis liegen weiter nach Aussen; nur der Nerv. spermaticus externus kreuzt sie. Vor der Arterie liegt auf der linken Seite die Flexura sigmoidea, auf der rechten ein Theil des Dünndarms. In der Nähe ihrer Austritts-Stelle aus dem Becken (in der Höhe des Ligamentum Fallopii s. Pouparti, nahe der Eminentia ileo-pectinea) entspringen: die aufwärts steigende Epigastrica und die nach Aussen gekrümmte Circumflexa ilium.

Die Art. iliaca interna s. hypogastrica giebt nach einem Verlauf von 2 bis 4 Centimeter den ersten bedeutenden Ast ab, die Art. ileolumbalis, welche gewöhnlich mit Sacra lateralis, Obturatoria und Glutea aus einem gemeinsamen Stämmchen entspringt. Die Fortsetzung der Hypogastrica verläuft Anfangs schräg nach Vorn und Unten, dann abwärts vor der Symphysis sacro-iliaca und bildet im Becken einen nach Hinten schwach convexen Bogen.

Varietäten. Die Theilungsstelle der Aorta kann höher oder tiefer liegen, bis zum 2. Lendenwirbel hinauf und bis zum 5. Lendenwirbel hinab; im ersteren Falle divergiren die beiden Iliacae communes aber doch erst vom 4. Lendenwirbel an. Cruveilhier sah die Iliaca communis dextra fehlen. Dubreuil beobachtete eine doppelte Art. iliaca externa: beide verliefen unter dem Poupart'schen Bande und eine davon wurde merkwürdiger Weise unterbunden. Die Epigastrica entspringt zuweilen etwas höher, zuweilen etwas tiefer. Ueber die Varietäten der Art. obturatoria, insbesondere ihren Ursprung aus der Epigastrica, „Unterleibsbrüche“, vgl. Bd. III.

II. Krankheiten der Arteriae iliacaе.

Blutungen aus der Art. iliaca communis werden wegen der geschützten Lage derselben selten beobachtet, sind aber, wenn sie vorkommen, fast immer so heftig, dass der Verletzte stirbt, bevor ärztliche Hülfe geleistet werden kann. Dies gilt auch für die meisten Verletzungen der Art. iliaca externa. Nur wenn die Wunde sehr klein oder sonst günstig für die Bildung des Thrombus gestaltet ist, gelingt es, zunächst durch Compression und dann durch die möglichst bald auszuführende Unterbindung das Leben zu retten. Die Compression allein reicht selten aus; sie muss kräftig und bei vollkommen erschlafte[n] Bauchdecken etwa 9 Centimeter oberhalb des Poupart'schen (Fallopia'schen) Bandes, am inneren Rande des Psoas ausgeübt werden¹⁾. Auch die Compression der Aorta abdominalis ist

¹⁾ Ulrich (Berliner klin. Wochenschr. No. 4. pag. 38) stillte im Feldzuge von 1866 eine Blutung aus der Art. iliaca ext., nachdem ein während kürzerer Compression gebildeter Thrombus 2 Mal gelöst war, durch eine 6 Tage lang ununterbrochen fortgesetzte Digital-Compression. Es erfolgte vollständige Obliteration der Arterie, während der inzwischen eingeleitete Collateral-Kreislauf allen üblen Zufällen vorbeugte. Die Anwendung der Digital-Compression war in diesem

hülfreich; bei Wunden der *Iliaca communis* ist man wesentlich auf sie angewiesen. — Die Diagnose einer Verletzung der *Iliaca communis* oder eines ihrer grossen Aeste gründet sich, abgesehen von dem Hervorspritzen des Blutes durch die äussere Wunde, auf Lage und Richtung derselben, Anwesenheit einer teigigen Geschwulst in der Fossa iliaca (welche mit Blut gefüllt ist), Mangel oder doch Schwäche der Pulsationen in der entsprechenden *Art. femoralis*. — Larrey hat in der Fossa iliaca ein arteriell-venöses Aneurysma beobachtet.

Höchst selten ereignet sich eine Verletzung des Stammes der *Art. hypogastrica* oder eines ihrer in der Beckenhöhle gelegenen Aeste. Häufiger werden diejenigen, welche ausserhalb der Beckenhöhle verlaufen, insbesondere die *Glutea* und *Ischiadica* verwundet. Vgl. Cap. VII.

Bei allen Blutungen aus dem Stromgebiet der *Arteriae iliacae* (auch bei Metrorrhagien) ist die Compression der *Aorta abdominalis* ein vorzügliches, provisorisches Blutstillungsmittel; bei schlaffen Bauchdecken (daher auch in der Chloroformbetäubung) lässt sich dieselbe sehr leicht ausführen, nicht blos mit den Fingern, sondern auch mit einem entsprechend construirten Compressorium, wie namentlich Lister ein solches angegeben hat.

Spontane Aneurysmen kommen häufig an den grossen Aesten der *Iliaca*, dagegen, wie es scheint, niemals primär am Stamme der *Iliaca communis* selbst vor¹⁾. Pulsadergeschwülste der *Iliaca externa* sind gewöhnlich nur weitere Entwicklungsstufen von ursprünglichen Femoral-Aneurysmen. Die Geschwulst geht dann unter dem Fallopi'schen Bande hindurch, von welchem sie etwas eingeschnürt und in zwei Theile getheilt wird: einen äusseren, am Schenkel gelegen und einen inneren, die Bauchwand hervorbölbenden. Aneurysmen der *Iliaca externa* sind durch Pulsationen und schnelles Wachstum vor anderen Geschwülsten der Hüftbeingrube ausgezeichnet; ihre Veranlassung ist entweder ganz unbekannt oder wird in einer plötzlichen heftigen Anstrengung, einem Fall, Stoss u. dgl. m. gesucht. Mancherlei Gewächse, Cysten, Abscesse, namentlich aber Sarcome (Marschwämme) welche ja oft auch schnell wachsen, können (zumal wenn sie auf der *Art. iliaca* aufliegen) Täuschungen veranlassen.

Syme (Edinb. med. and surg. journal, 1836, Oct.) erzählt einen lehrreichen Fall dieser Art. Bei einem Manne, welcher in Folge einer unbedeutenden Verletzung

Falle leicht, da man von der bestehenden Wunde aus alsbald auf die pulsirende Arterie kam, und ein mässiger Druck genügte, um die Blutung zu sistiren. Ulrich glaubt, dass man in anderen Fällen zum Behuf der Compression der *Art. iliaca ext.* dieselbe wohl auch theilweise blosslegen dürfte.

¹⁾ Vgl. Malgaigne, Journ. de Chirurg. 1846, Févr.

Schmerzen in der linken Seite empfand, entwickelte sich im Verlauf von 14 Tagen eine Anschwellung des Schenkels und etwas später eine scharf umgrenzte, eiförmige Geschwulst in der Inguinalgegend, welche gespannt war, für Druck unempfindlich, und an ihrer ganzen Oberfläche undeutlich pulsirte. Mit dem Stethoskop erkannte man deutlich Pulsationen und Blasegeräusch. Man glaubte ein Aneurysma der Iliaca externa vor sich zu haben und schnitt ein, um die Iliaca communis zu unterbinden. Aber es fand sich ein „Fungus“, neben welchem (wie die Section lehrte) noch mehrere andere in der Beckenhöhle bestanden.

Spontane Heilungen von Aneurysmen der Iliaca externa sind höchst selten, so dass man ihre Prognose als ganz schlecht betrachten musste, bevor Abernethy (1796) es unternahm, die Iliaca externa oberhalb der Geschwulst zu unterbinden. Dies lässt sich jedoch mit gewöhnlichen Unterbindungsfäden nur in solchen Fällen ausführen, wo zwischen der Theilungsstelle der Iliaca communis und dem Anfange des Aneurysma noch mehr als 3 Centimeter Zwischenraum bleibt, weil man sonst Gefahr läuft, die Ligatur zu nahe an der Theilungsstelle anzulegen¹⁾. Für die übrigen Fälle ist vorgeschlagen, entweder die Iliaca communis zu unterbinden, oder die Brasdor'sche Methode anzuwenden, welche die Unterbindung der Iliaca externa oder der Femoralis nahe am Schenkelbunde erheischen würde, — letztere mit geringer Aussicht auf Erfolg, da vermittelst der Epigastrica und Circumflexa ilium der Blutlauf durch das Aneurysma unterhalten werden könnte. Die Brasdor'sche Methode bietet hier alle die Unsicherheiten dar, welche ihr überhaupt vorgeworfen werden, und gerade an dieser Stelle spricht die Erfahrung gar nicht zu ihren Gunsten. Anderer Seits ist nicht zu übersehen, dass die Unterbindung der Iliaca communis ein gefährliches Mittel ist, wengleich bereits mehrere Fälle vorliegen, in denen sie mit Glück verrichtet wurde.

Viel günstiger gestalten sich die Verhältnisse, wenn man mit der Compression auskommen kann. Diese gewährt desto bessere Aussichten auf Erfolg und macht desto weniger Schwierigkeiten, je näher der Schenkelbeuge das Aneurysma sitzt.

Ein das Endstück der Iliaca externa einnehmendes, auf die Femoralis übergreifendes Aneurysma spontaneum, habe ich durch Compression oberhalb und unterhalb der Geschwulst (erstere durch das Bd. I. Fig. 30 abgebildete Compressorium ausgeführt) in 3 Wochen zur Heilung gebracht.

Bei den auf die Art. iliaca communis übergreifenden Pulsadergeschwülsten kann, wenn die Ligatur angewandt werden soll, eigentlich nur von der Brasdor'schen Methode die Rede sein. Die Unterbindung der Aorta abdominalis, welche zum Behuf der

¹⁾ Die antiseptischen (resorbirbaren) Ligaturen würden voraussichtlich gestatten, bis nahe an die Theilungsstelle hinaufzurücken.

Anwendung der Hunter'schen Methode in Frage kommen könnte, ist nach den vorliegenden Erfahrungen nicht zu empfehlen.

Die Unterbindung der Aorta abdominalis ist wiederholt (1869 zum 6ten Mal), und zwar nach zwei verschiedenen Methoden, aber stets mit unglücklichem Erfolge versucht worden. Asthley Cooper unternahm sie zuerst am 25. Juni 1817; der Kranke starb nach 40 Stunden. Cooper's Verfahren war folgendes. Kopf und Brust des Kranken liegen hoch, die Oberschenkel gegen das Becken geneigt. Die Bauchhöhle wird durch einen 10 bis 15 Centimeter langen Schnitt, welcher links nahe der Linea alba geführt wird und den Nabel mit einer leichten Concavität umgeht, geöffnet. Man schneidet zunächst nur bis aufs Bauchfell und spaltet dieses mit grosser Vorsicht, um Vorfall der Gedärme zu verhüten. Diese werden so viel als möglich nach Rechts gedrängt. Der Zeigefinger wird auf die Aorta gesetzt, und das sie bedeckende Blatt des Peritoneum mit dem Nagel zerrissen; der Finger muss demnächst unter die Arterie zu dringen suchen, so dass auf ihm die Unterbindungsnadel um das Gefäss unterhalb der Abgangsstelle der Art. mesenterica inferior herumgeführt werden kann.

Abweichend hiervon hat man sich in den letzten vier Fällen, nach dem Vorgange von Murray und Candido Borges in Rio Janeiro (Revue méd.-chirurg. 1852), einer Methode bedient, bei welcher die Bauchfellhöhle nicht geöffnet werden soll. Von der letzten Rippe der linken Seite nach der Spina ilei anterior superior abwärts wird durch die Haut, die Muskeln und die Fascia transversalis ein Schnitt geführt, von welchem aus das Bauchfell in derselben Art, wie bei der Unterbindung der Iliaca communis, verdrängt werden soll, bis man zur Aorta gelangt. Bedeutende Zerrung des Bauchfells ist hierbei nicht zu vermeiden. Vgl. pag. 204 u. 205.

W. Stockes, welcher die 6te Unterbindung der Aorta ausführte, bediente sich des Porter'schen Instrumentes (vgl. pag. 136), um die temporäre Ligatur anzuwenden; der collaterale Kreislauf war bereits eingeleitet, als 13 Stunden nach der Operation der Tod erfolgte. Vgl. Dublin quarterly journal, Aug. 1869.

Wäre die Wiederherstellung des Kreislaufes durch die Collateral-Aeste nach Unterbindung der Aorta die einzige Bedingung zum Gelingen der Operation, so würden die Beobachtungen von Verengerung und Verschluss der Aorta (vgl. Tiedemann, in der pag. 129 citirten Monographie, pag. 10—76), sowie die gelungenen Versuche an Hunden diese Operation keineswegs als verwerflich erscheinen lassen. Aber es handelt sich hier um die Berücksichtigung anderer Verhältnisse. Das Bauchfell wird bei der einen, wie bei der anderen Methode erheblich verletzt, zahlreiche Nerven und Lymphgefässe sind in der nächsten Umgebung der Aorta auseinander zu zerren, und wahrscheinlich hat man ein krankes Gefäss zu unterbinden.

Man muss daher andere Behandlungsweisen versuchen. Die Anwendung der Electropunctur oder der Einspritzungen von Eisenchlorid ist wegen der Nachbarschaft des Bauchfells gefährlich und bei grösseren und hoch hinauf reichenden Aneurysmen ganz unzulässig. Desto erfreulicher ist es, dass die Compression des zuleitenden Stammes auch hier bereits Erfolge aufzuweisen hat. Je nach der Ausdehnung des Aneurysma bedarf es bald nur der Compression der Iliaca communis selbst, bald derjenigen der Aorta abdominalis—Ob Fingerdruck ausreicht oder Instrumente zu Hülfe genommen werden müssen, hängt von individuellen Verhältnissen ab. Jedenfalls

t, um die, in solchen Fällen erforderliche, vollständige Compression durchzuführen, Chloroformbetäubung nicht zu entbehren, dabei aber anderer Seits die äusserste Vorsicht zu empfehlen, dass der Druck nicht zu stark und nicht zu lange angewandt, auch nicht etwa ein Darmstück eingeklemmt werde¹⁾. Kommt man auf diesem Wege nicht zum Ziele und erscheint die Unterbindung zu gefährlich, so muss man sich auf die Valsalva'sche Methode und die örtliche Anwendung des Eisens beschränken. Letztere kann auch zur Unterstützung der Compression dienen.

Aneurysmen der Arteria iliaca interna (hypogastrica) oder eines ihrer Aeste innerhalb des Beckens sind noch nicht beobachtet worden.

III. Unterbindung der Arteriae iliacaе.

Bei der Blosslegung aller drei Arteriae iliacaе handelt es sich vor Allem darum, die Verletzung des Bauchfells zu vermeiden. Die Bauchdecken müssen im oberen Theile der Regio inguinalis gespalten werden. Die Richtung des Schnitts wird verschieden angegeben; man kann zwei Extreme annehmen: entweder parallel der Linea alba, oder parallel dem Fallopi'a'schen Bande. Je mehr man sich der verticalen Richtung nähert, desto leichter kann man aufwärts und in die Tiefe (nach Hinten) dringen, desto leichter wird aber auch das Bauchfell verletzt. Je mehr der Schnitt der Richtung des Schenkelbandes folgt, desto leichter wird die Verletzung des Bauchfells vermieden, ohne dass die Unterbindung des unteren Endes der Iliaca externa erschwert würde; aber es macht grössere Schwierigkeiten, wenn man zu dem oberen Theile der Iliaca gelangen will. Der Ausgangspunkt bei der Operation ist jedenfalls die Mitte des Schenkelbandes, wo man die Pulsationen der Arterie (unter den gewöhnlichen Verhältnissen) sicher fühlt. Weiter nach Innen darf

¹⁾ Vgl. die Angaben von Mapother und Murray, Brit. med. journ. 1867, Oct. 5, Moxon und Durham, Brit. med. journ. 1872, May 4, und Th. Bryant, ibid. — Obgleich mehrere der mittelst Aorten-Compression behandelten Unterleibs-Aneurysmen nicht an der Iliaca, sondern an der Coeliaca oder an anderen Eingeweide-Arterien ihren Sitz hatten, so haben diese Fälle doch für die Frage nach der Wirksamkeit jener Compression volle Beweiskraft. In dem Falle von Bryant konnte die Wirksamkeit der peripherischen Compression bei einem Aneurysma des Stammes der Coeliaca sogar anatomisch nachgewiesen werden, da der Pat. in Folge der erlittenen Quetschung des Darms starb. Aehnlich erging es, nach Bloxam (ibid.) einem Pat. von Paget, bei dem wegen eines Aneurysma der A. mesenterica sup. die Aorta comprimirt wurde.

man den Schnitt nie führen, weil man sonst die *Art. epigastrica* verletzen, bei Männern auch den Samenstrang gefährden würde.

Das zweckmässigste Verfahren für die Unterbindung der *Iliaca externa* ist folgendes. Der 8 bis 12 Centimeter lange Hautschnitt beginnt etwa 3 Centimeter nach Innen vom vorderen oberen Darmbeinstachel und endet 5 bis 6 Centimeter von dem *Tuberculum pubis*, 2 bis 3 Centimeter oberhalb des *Fallopia'schen* Bandes. Die *Epigastrica* und die *Spermatica externa* liegen nahe am inneren Wundwinkel, aber ganz geschützt. Alle blutenden Gefässe werden sorgfältig verschlossen, die Wunde wird in der Weise vertieft, dass man sicher ist, auch die *Fascia transversalis*, nicht aber das Peritoneum zu durchschneiden, und hierauf das Peritoneum mit den Fingern behutsam unterminirt, indem man den ganzen Peritoneal-Sack sammt den darin enthaltenen Eingeweiden etwas nach Oben und Innen zu drängen sucht. Während die eine Hand (besser die eines Gehülfen) das Peritoneum in dieser Stellung fixirt, dringt man mit dem Finger im unteren Wundwinkel zum Rande des kleinen Beckens, welcher hier vom *Psoas* gebildet wird. Dort findet man die Arterie und verfolgt sie bis zu der Stelle, an welcher sie unterbunden werden soll, aufwärts. Der äussere Wundwinkel wird nun (sofern dies nicht schon früher erforderlich schien) dem Wundhaken eines Gehülfen übergeben. Der Operateur entblösst die Arterie an einer kleinen Stelle vorsichtig, besonders mit Schonung der an ihrer inneren — weiter oben an ihrer hinteren — Seite gelegenen Vene, worauf dann, am Besten von der inneren Seite her, die Unterbindungs-Nadel unter der Arterie hindurchgeführt wird. — Die Resultate dieser Unterbindung sind verhältnissmässig günstiger, als die der Unterbindung der *Art. femoralis* am Schenkel, wahrscheinlich, weil durch Abwesenheit aller Aeste oberhalb der Ligaturstelle die Thrombusbildung in höherem Grade gesichert ist. Sie ist bei der Ausführung an der Leiche — und sofern es sich um einen Fall handelt, wo die anatomischen Verhältnisse der Arterie normal geblieben sind, auch am Lebenden — nicht besonders schwierig. Ganz anders verhält sich dies, wenn nahe an der *Fossa iliaca* oder in ihr selbst ein *Aneurysma* seinen Sitz hat. Alsdann ist der Raum höchst beengt, die Verdrängung des Bauchfells wegen der wahrscheinlich bestehenden Verwachsung sehr schwierig, und man kann sich das Auffinden der Arterie nicht dadurch erleichtern, dass man mit dem Finger in der angegebenen Weise hinaufgleitet.

Nach *Stephen Smith* führten unter 14 wegen Blutung gemachten Unterbindungen der *Iliaca externa* 11, unter 95 wegen *Aneurysmen* ausgeführten 69 zur

Heilung. Vgl. Gorlt im Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. III. pag. 99. In der neuesten Literatur finde ich noch 22 Fälle von Unterbindung der Iliaca externa, von denen 17 glücklich verliefen (darunter nur 2 wegen Blutung ausgeführt).

Für die Unterbindung der Iliaca communis genügt bei normalen Verhältnissen derselbe Einschnitt, nur in etwas mehr verticaler Richtung geführt, damit es leichter gelingt, das Bauchfell weiter aufwärts zu drängen. Aber schwerlich dürfte es sich jemals um eine normal beschaffene Fossa iliaca handeln, wenn man sich zur Unterbindung der Iliaca communis entschliesst. Daher haben, je nach den obwaltenden pathologischen Verhältnissen, verschiedene Chirurgen auch eine verschiedene Richtung des Schnittes gewählt, ohne dass ihre Verfahrungsweisen als allgemein maassgebend betrachtet werden können.

Gibson führte die Unterbindung der Iliaca communis zuerst (1812) aus — mit absichtlicher Eröffnung des Bauchfells. — Das jetzige Verfahren rührt von Kott her; der von ihm 1827 wegen eines Aneurysma der Art. iliaca externa operirte Mann war 1861 noch am Leben. — Im Ganzen sind 34 Fälle von Ligatur der Iliaca communis bekannt, darunter nur 7 mit günstigem Erfolge und 27 tödtliche. Vgl. Gorlt, l. c.

Es wird erwähnt, dass die Möglichkeit der Unterhaltung des Kreislaufs in der unteren Extremität nach der Unterbindung der Art. iliaca communis nicht blos durch die Beobachtung ihrer spontanen Obliteration (vgl. Tiedemann, von der Verengerung und Schliessung der Pulsadern, pag. 89), sondern auch durch die von Cooper, Béclard und Scarpa an Hunden vorgenommene Unterbindung dieser Arterie begründet worden sei. Ein Beweis dieser Art kann durch Versuche an Hunden nicht geliefert werden, da eine Iliaca communis bei diesen Thieren gar nicht existirt, vielmehr die Iliaca externa und Hypogastrica, jede für sich, aus der Aorta entspringen, welche nach Abgabe der letzteren ihren Lauf als Art. caudalis weiter fortsetzt.

Zur Unterbindung der Art. hypogastrica ist zunächst dasselbe Verfahren, wie für diejenige der Iliaca communis einzuschlagen. Hat man die Theilungsstelle erreicht, so muss man auf der Hypogastrica selbst mit dem Zeigefinger abwärts dringen, um die Ligatur in einiger Entfernung von jener anlegen zu können und somit die Thrombusbildung sicher zu stellen. Die Resultate dieser (zuerst von Stevens ausgeführten, aber noch nicht häufig wiederholten) Operation sind im Allgemeinen günstig. Wenn sie auch an der Leiche schwieriger erscheint, als die Ligatur der Iliaca communis, so dürfte dies in praxi sich anders verhalten, da die Schwierigkeiten, welche durch die Anwesenheit eines Aneurysma in der Fossa iliaca bedingt werden, beim Aufsuchen der Hypogastrica wegfallen; denn die Unterbindung dieser letzteren wird man doch nur wegen Aneurysmen oder Verwundung der aus ihr entspringenden Aeste unternehmen. Vgl. Cap. VII.

Siebentes Capitel.**Arteria glutea, ischiadica, pudenda interna.****I Anatomie.**

Die *Arteria glutea*, der stärkste Ast der *Hypogastrica*, verläuft nach Unten und Hinten zwischen den vorderen Aesten des letzten Lenden- und des ersten Sacral-Nerven, tritt dann durch den obersten Theil der *Incisura ischiadica major*, oberhalb des *M. piriformis*, zur Aussenseite des Beckens und spaltet sich (zuweilen schon innerhalb des Beckens) in einen oberflächlichen und einen tiefen Ast. Im Becken und an der Austrittsstelle liegt die *Vena glutea* vor ihr, der gleichnamige Nerv hinter ihr.

Die etwas kleinere *Art. ischiadica* verläuft im Becken gerade abwärts, zwischen Mastdarm und seitlicher Beckenwand, und geht durch den unteren Theil des grossen Hüftbein-Ausschnittes hinaus, unterhalb des *M. piriformis*, zwischen ihm und dem *Ligamentum sacro-spinosum*. An ihrer äusseren Seite liegt der *Nervus ischiadicus*, an ihrer inneren die gleichnamige Vene und die *Art. pudenda interna*. Der *Nervus ischiadicus* wird von einem Aste der *Art. ischiadica* begleitet. In seltenen Fällen (die man auch als „Fehlen der *Femoralis*“ bezeichnet) sendet die *Art. ischiadica* einen sehr starken Ast in dieser Richtung ab, welcher sich unterhalb der Kniekehle in *Tibialis antica* und *postica* spaltet. Alsdann sind *Iliaca externa* und *Femoralis* sehr schwach; letztere giebt blos die sonst aus der *Profunda* entspringenden Aeste ab, hat auch deren Verlauf und endet mit Gelenk-Aesten, welche, wie gewöhnlich, mit den aus den Unterschenkel-Arterien entspringenden anastomosiren. Vgl. *Dubreuil*, *Des anomalies artérielles*, pag. 346, *Tiedemann*, *Tabulae arteriarum und deren Supplemente*, *Barkow*, l. c.

Die *Art. pudenda interna* wendet sich, nachdem sie die *Ischiadica* verlassen, in einem nach Aussen und Hinten convexen Bogen um das *Ligamentum sacro-spinosum* und kehrt durch die *Incisura ischiadica minor* an der inneren Seite der Sehne des *Musc. obturator internus* in die Beckenhöhle zurück. Dann läuft sie an der inneren Seite des *Tuber ischii*, am aufsteigendem Sitz- und absteigenden Schoossbein-Aste vorwärts und einwärts, um an der inneren Seite des Schoosshogens zur Wurzel des *Penis* (der *Clitoris*) aufzusteigen.

II. Krankheiten der Arterien des Gesässes¹⁾.

Die Arterien des Gesässes werden, ihrer tiefen Lage wegen, durch zufällige Wunden selten getroffen, auch bei chirurgischen Operationen nur sehr selten verletzt²⁾. Gelingt es auch gewöhnlich,

¹⁾ Vgl. *Bouisson*, sur les lésions des art. fessière et ischiatique. *Gaz. méd.* 1845. — *Bourgeois de Mercy*, Des lésions traumatiques des vaisseaux rétro-pelviens. Thèse. Paris. 1870. — *Georg Fischer*, Die Wunden und Aneurysmen der *Arteria glutea* und *ischiadica*. *Archiv für klinische Chirurgie*, Band XI. pag. 762. — *Champenois*, Urgence et sûreté pour la ligature de l'artère fessière. *Bec de mém. de médec. milit.* 1871. Janv.

²⁾ *Theden* erzählt einen tödtlich verlaufenen Fall von Verletzung der *Glutea b* der Erweiterung einer Schusswunde.

den Tod abzuwenden, so bleibt doch oft die Entstehung eines Aneurysma zu fürchten. Befindet sich die Wunde im unteren Drittel des *Gluteus maximus*, so ist die Blutung weniger heftig, weil es sich hier um Verletzung der *Ischiadica* oder eines ihrer Aeste handelt. Diese ist von geringerem Caliber als die *Glutea* und kann gegen das *Ligamentum sacro-spinosum* comprimirt werden. Befindet sich die Wunde noch weiter nach Unten und Innen in der Gegend des Sitzbeinstachels, so hat man Grund, eine Verletzung der *Art. pudenda interna* anzunehmen; diese kann gegen den genannten Knochenvorsprung comprimirt werden¹⁾. Bedeutende arterielle Blutung im Bereich der oberen Hälfte des grossen Gesässmuskels lässt immer eine Verletzung der *Glutea* selbst oder eines ihrer Aeste vermuthen. Im ersteren Falle ist die Blutung höchst lebensgefährlich; man muss so schnell als möglich in der (erweiterten) Wunde selbst unterbinden. Diese Unterbindung, welche *Bouisson* zuerst mit Erfolg ausführte, ist schwierig, weil der ausserhalb des Beckens gelegene Theil des Stammes äusserst kurz ist, und man in der Tiefe einer mit Blut erfüllten Wunde zu operiren hat. Sollte man mit der Unterbindung des blutenden Gefässes durchaus nicht zu Stande kommen, so kann die Tamponade mit Hilfe von Chloreisen, welche überdies durch Compression der *Aorta* zu unterstützen wäre, versucht werden. Die Unterbindung der *Hypogastrica* oder der *Iliaca communis* ist nicht blos ein gefährliches, sondern voraussichtlich auch kein ganz sicheres Mittel. Ehe man sich zu einer solchen Operation entschliesst, wird, nachdem die Tamponade mit Chloreisen sich unzureichend erwiesen hat, der Versuch, an der blutenden Stelle zu unterbinden, immer erst noch zu wiederholen sein.

Wenige Arterienwunden lassen, sofern sie nicht sicher verschlossen werden, mit mehr Wahrscheinlichkeit die Bildung eines *Aneurysma spurium primitivum* erwarten, als die der *Glutea*. Ihr beträchtliches Caliber, die tiefe Lage, die Unmöglichkeit einer genauen Compression und die Verschiebung der verschiedenen Muskelschichten übereinander begünstigen die blutige Infiltration der zunächst gelegenen Bindegewebs-Räume. Ist die Wunde unbedeutend und wird sogleich ein gehöriger Druck auf dieselbe ausgeübt, so kommt es zur Entwicklung eines *Aneurysma circumscriptum*, zu dessen Diagnose wegen der Tiefe, in der es liegt, die Auscultation von

¹⁾ *Travers* legte einen Kranken, welcher durch eine heftige Blutung aus einem brandigen Geschwür der Eichel schon sehr erschöpft war, auf ein hartes Lager und schob unter den Sitzbeinstachel jeder Seite ein Stück Korkholz, gegen welches durch das Gewicht des Körpers die *Pudenda* comprimirt wurde.

grosser Wichtigkeit ist. — Bouisson erwähnt eines von Riber beobachteten Aneurysma arterioso-venosum der Art. ischiadica.

Spontane Aneurysmen der Gesässarterien sind selten¹⁾; sie kommen häufiger links, als rechts vor. Zuweilen wirken Contusionen, heftige Anstrengungen, z. B. Drängen beim Stuhlgang, als Gelegenheitsursachen. Ihrer tiefen Lage wegen wird die Geschwulst gewöhnlich erst, nachdem sie schon längere Zeit bestanden und bereits eine ansehnliche Grösse erreicht hat, erkannt. Ausser den allgemeinen Zeichen der Aneurysmen finden sich alsbald Schmerzen, Ameisenkriechen, Schwebbeweglichkeit in dem entsprechenden Beine, wegen des Druckes, den die Geschwulst auf den Nervus ischiadicus ausübt²⁾. Auf einer solchen mittleren Entwicklungsstufe können diese Aneurysmen längere Zeit (jedoch selten Jahre lang) stehen bleiben. Zuweilen wachsen sie aber stetig fort bis zum Durchbruch, welcher dann oft plötzlich und unerwartet erfolgt. Eine grosse Schwierigkeit für die Diagnose erwächst daraus, dass die Compression des centralen Endes der aneurysmatischen Arterie gar nicht oder doch nur indirect (durch Compression der Iliaca communis oder der Aorta abdominalis) ausgeübt werden kann. Jedenfalls bleibt es aber, auch wenn man darüber, dass die Geschwulst ein Aneurysma sei, ausser Zweifel ist, unmöglich zu entscheiden, ob dasselbe der Glutea oder der Ischiadica angehört. Alle diese Schwierigkeiten finden sich auch bei traumatischen Aneurysmen; nur wird bei diesen die Diagnose durch die Kenntniss von der vorausgegangenen Verletzung erleichtert.

Bei abnormer Entwicklung des den Nervus ischiadicus begleitenden Astes der Ischiadica (vgl. pag. 206) kann das Aneurysma auch in dieser Richtung weiter wachsen, — Aneurysma ischiadico-popliteum. Anderer Seits kann ein Aneurysma, welches am Gesäss hervortritt, sich auch in die Beckenhöhle hinein fortsetzen oder in ihr seinen Ursprung nehmen.

Bei traumatischen Aneurysmen am Gesäss, bei denen vorausgesetzt werden kann, dass die Arterie übrigens gesund ist, verdient die Methode des Antyllus oder doch die Unterbindung der betreffenden Arterie an der hinteren Seite des Beckens unbedingt den Vorzug, — so schwierig auch, wegen der Kürze der zu unterbindenden Stämme, der tiefen Lage und der voraussichtlich bedeutenden Blutung, eine solche Operation sein mag.

Von diesen Schwierigkeiten giebt die Beschreibung eines von Syme 1861 operirten Falles, in welchem das Aneurysma 1 Pfund Blutgerinnsel enthielt, eine gute Vorstellung. Vgl. Gurlt's Jahresbericht in dem Archiv f. klin. Chirurg. Bd. III. pag. 36.

¹⁾ Georg Fischer hat (l. c.) deren im Ganzen 35 zusammengestellt.

²⁾ Vgl. Blasius, in d. Deutschen Klinik, 1859, pag. 105.

Bei endogenen Aneurysmen wollen Einige der Unterbindung des Stammes der Hypogastrica (also der Hunter'schen Methode) den Vorzug geben. Bedenkt man aber, dass dies eine sehr schwierige Operation ist, bei welcher in einer Tiefe von mindestens 12 Centm., mitten in dem lockeren, zur Eiterung sehr geneigten Bindegewebe des kleinen Beckens nur mit stumpfen Instrumenten gearbeitet, dabei die Gefahr, das Bauchfell zu verletzen, nicht ganz sicher, und die, es zu zerren, gar nicht vermieden werden kann, bedenkt man ferner die zahlreichen Varietäten der zu unterbindenden Arterie und endlich die Ungewissheit darüber, ob sie, wenn ein spontanes Aneurysma an einem ihrer Aeste besteht, nicht auch selbst schon erkrankt ist; erwägt man anderer Seits, dass es sich bei der directen Methode um eine Operation handelt, durch welche nur Muskeln und Bindegewebe verletzt werden, welche ferner weniger schwierig und wahrscheinlich ebenso sicher in ihrer Ausführung ist: so wird man den von Bouisson aufgestellten Satz billigen müssen; „dass bei allen Aneurysmen des Gesässes der directen Unterbindung, d. h. der Operation am Gesäss selbst, der Vorzug vor der Unterbindung der Hypogastrica zu geben ist.“ Natürlich wird man aber berechtigt sein, bevor man sich überhaupt zur Unterbindung entschliesst, die Electropunctur und, wenn das Aneurysma nicht von bedeutender Grösse ist, auch die Injection von Eisenchlorid zu versuchen.

Die Einspritzungen von Eisenchlorid, nach der Empfehlung von Pravaz (in einer Lösung von etwa 20° Beaumé) haben sich grade bei Aneurysmen dieser Gegend günstig erwiesen. Baum heilte auf diese Weise zuerst ein 13—14 Centimeter im Durchmesser grosses Aneurysma per anastomosin der Art. glutea und ischiadica, — welches anderweitig an dieser Stelle noch nie beobachtet zu sein scheint. Dieser äusserst seltene Fall ist von dem Sohne des Operators, G. G. Baum, in seiner Inaugural-Dissertation (de laesionibus et aneurysmatibus art. glut. et ischiad. etc. Berol., 1859) beschrieben. — Ein zweiter Fall von günstigem Erfolge der Pravaz'schen Methode, und zwar bei einem traumatischen Aneurysma der A. glutea, gehört gleichfalls Baum an; derselbe ist von G. Fischer (l. c.) beschrieben.

III. Unterbindung der Arterien am Gesäss.

A. Aelteres Verfahren. Man macht einen tiefen Einschnitt in der Richtung einer Linie, welche von der Crista ilei, 5 Centm. über und vor der Spina posterior superior, anfängt und am Tuberculo sacrospinali endet; der Schnitt wird bogenförmig geführt, so dass seine Concavität gegen das Os sacrum gerichtet ist. Nachdem man bis auf den M. piriformis vorgedrungen ist, findet man von Oben nach Unten

fortschreitend: 1) die Art. glutea zwischen dem oberen Rande Incisura ischiadica und dem M. piriformis; 2) die Art. ischiadica der Basis des Sitzbeinstachels; 3) die Art. pudenda interna unteren Wundwinkel, an der Stelle, wo sie um das Lig. sacrosacrum einen Bogen bildet. — Um eines dieser Gefässe allein blosslegen, kann man sich damit begnügen, nur den entsprechenden des angegebenen Schnittes auszuführen. Der Gluteus maximus muss immer in grosser Ausdehnung durchschnitten werden, in der Tiefe den gehörigen Raum zu gewinnen. Wollte man zwischen seinen Bündeln in die Tiefe dringen, so würde man durch die Zusammenziehungen ungemein gehindert werden.

B. Verfahren von Diday. Man spannt einen Faden von der Steissbeinspitze zu dem höchsten Punkte des Darmbeinkamms 5 Centm. hinter der Spina anterior superior; von der Mitte dieses Fadens (welche genau der Austrittsstelle der Art. glutea entspricht) fällt man lothrecht eine Linie abwärts; in dieser Richtung hat man einzuschneiden. — Nach Pétrequin ist es zweckmässiger, ein wenig hinter dieser Linie den Schnitt zu führen, um direct zur Glutea zu gelangen. — Deren Blosslegung dieses Verfahren wesentlich berechnet ist, zu gelangen.

C. Verfahren von Champenois. Ein Schnitt wird 3 Centm. unter der Spin. ilei post. sup. und 3 Centm. nach Aussen vom Kniebeinrande begonnen und in der Richtung zum grossen Trochanter in einer Länge von 6 Centm. geführt; ein zweiter gleich langer Schnitt verläuft vom unteren Wundwinkel des ersten aus in der Richtung gegen das Steissbein.

In Fällen, wo man sich zur Unterbindung einer der genannten Arterien entschliesst, wird auch immer entweder eine Wunde oder ein Aneurysma bestehen. Im ersteren Falle kann die Lage und Richtung der Wunde von Belang für die Richtung des Einschnittes sein. Handelt es sich um ein Aneurysma, so wird dessen Grösse und Lage das Operationsverfahren wesentlich bestimmen.

Achtes Capitel.

Arteria femoralis.

I. Anatomie.

Die Arteria femoralis verläuft von der Schenkelbeuge bis zur unteren Grenze des zweiten Dritttheils des Oberschenkels an der vorderen und inneren Seite desselben. Dort durchbohrt sie den Abductor magnus und gelangt so zur hinteren Seite des Schenkels, wo sie den Namen Poplitea erhält. Ihr Verlauf am Oberschenkel

ird genau bezeichnet durch eine in der Mitte zwischen dem vorderen oberen Darm-einstachel und der Symphysis ossium pubis beginnende und von da zum inneren unteren Theil des Condylus internus femoris gezogene Linie. Im oberen Theil ihres Verlaufes findet man zwischen ihr und der Haut, ausser dem subcutanen Bindegewebe nur die Fascia lata, weiter abwärts auch noch den M. sartorius, welcher im oberen Drittheile an ihrer äusseren Seite liegt. Der nach Innen vom Adductor longus, nach Aussen vom Sartorius begrenzte dreieckige Raum, in dessen Mitte die Arterie im oberen Drittheile des Schenkels verläuft, führt den Namen Trigonum inguinale. Hinter der Arterie bieten sich mehrere knöcherne Stützpunkte dar, gegen welche sie mit Leichtigkeit comprimirt werden kann: zunächst bei ihrem Austritt aus dem Becken die Lamina ileo-pectinea, dann das Caput femoris, endlich (nachdem die Arterie eine kleine Strecke nur Weichtheile hinter sich gehabt) die innere Seite der Diaphyse des femur. Art. und Vena femoralis liegen in einer, durch die Blätter der Fascia lata gebildeten, gemeinsamen fibrösen Scheide. Im oberen Theile ihres Verlaufes liegt die Arterie an der äusseren, weiterhin an der vorderen Seite der Vene. Der Nerv. cruralis liegt nach Aussen von der gemeinsamen Gefäss-Scheide. Der Nerv. saphenus läuft nahe der Mitte des Schenkels vor der Arterie abwärts. Die kleinen Arteriae pudendae interna und die Epigastrica superficialis entspringen aus der Femoralis bald nach ihrem Austritt aus der Beckenhöhle, in der Gegend der Fovea ovalis. Die Profunda femoris, welche fast eben so stark ist, wie die weitere Fortsetzung des Stammes, entspringt 4–6 Centimeter unterhalb des Poupart'schen Bandes.

Von chirurgischer Seite ist die Unterscheidung des Theils der Schenkelpulsader oberhalb des Abgangs der Profunda von demjenigen unterhalb desselben besonders wichtig; man bezeichnet daher zweckmässig den ersteren als Femoralis superficialis oder auch als Femoralis communis, den zweiten als Cruralis (da dieser fast nur für „crus“ Blut liefert) oder als Femoralis superficialis.

Varietäten. Die Art. femoralis kann in der oberen Hälfte ihres Verlaufes doppelt sein, wie Ch. Bell bei einem Neger, bei dem er wegen eines Kniekehlenaneurysma die Hunter'sche Unterbindung machte, beobachtet hat¹⁾. Dies ist höchst selten und nicht zu verwechseln mit dem häufigen Falle, dass die Profunda sehr hoch entspringt und somit in dem Trigonum inguinale zwei fast gleich starke Arterien eben einander liegen. In Betreff des sogen. „Fehlens“ der Art. femoralis s. pag. 206. Zuweilen theilt sich die Femoralis von Anfang an in drei Aeste: Circumflexa externa, Profunda und Cruralis — Die Vena femoralis verläuft zuweilen weiter nach Innen und durchbohrt den Adductor longus. In anderen Fällen fand man an jeder Seite der Arterie eine Vene, welche jedoch in der Nähe des Poupart'schen Bandes sich vereinigen. — Sehr selten liegt der Nervus cruralis zwischen der Arterie und der Vene. — Zuweilen wendet sich der Sartorius schon hoch oben auf die innere Seite des Schenkels, bildet mithin einen spitzeren Winkel mit dem Poupart'schen Bande und verkürzt daher das Trigonum inguinale.

¹⁾ Dublin Hospital Report 1837, Vol. IV. — Der Kranke starb am 8. Tage nach der Operation an einem „Leiden der Brustorgane“. Beide Femorales communicirten mit dem Aneurysma; die Unterbindung der einen hatte aber hingereicht, um eine reichliche Fibrinablagerung in demselben zu bewirken. Vgl. Tiedemann, Supplements, Tab. LI. Fig. 1.

II. Krankheiten der Arteria femoralis.

Die Art. femoralis wird nächst der Brachialis am Häufigsten verletzt, was sich aus ihrer Lage erklärt. Sie kann von Schnitt-, Hieb-, Stich- und Schuss-Wunden getroffen werden. Bei Brüchen des Schenkelbeins kann sie durch Knochen-Splitter oder -Spitzen zerrissen werden, wodurch dann in der Regel ein Aneurysma traumaticum primarium entsteht (vgl. pag. 76). Stichwunden dieser Arterie entstehen zuweilen, wenn Jemand ein spitzes Instrument, welches er zufällig fallen lässt, unwillkürlich mit den schnell an einander gezogenen Beinen aufzufangen strebt. Nicht ganz selten verletzen sich Handwerker, die ihre Messer zur Seite tragen, bei einem Fall oder Stoss, der sie trifft, an diesen selbst in der Art, dass die Femoralis geöffnet wird. Auch absichtliche Durchschneidung dieser Arterie ist bei Selbstmördern vorgekommen. Wunden der Femoralis sind von grosser Gefahr, jedoch nicht immer tödtlich, zumal bei Schuss-Wunden¹⁾. In den meisten Fällen wird der Tod nur durch rechtzeitig geleistete Kunsthilfe abgewendet. Gewöhnlich wird von Laien oder von dem Verletzten selbst²⁾ sofort die, wegen der oberflächlichen Lage des Gefässes, leicht ausführbare Compression angewandt. — Die Diagnose ist leicht: Lage und Tiefe der Wunde, stossweises Ausfliessen eines hellrothen Blutstrahls, Stillung der Blutung durch Compression oberhalb der Wunde sind entscheidend. Nur in der Nähe der Schenkelbeuge kann es schwierig werden, eine Verletzung der Profunda oder eines der aus ihr entspringenden Aeste von derjenigen der Femoralis selbst zu unterscheiden. — Die Unterbindung kann in allen diesen Fällen durch Nichts ersetzt werden; sie muss, wenn irgend möglich, in der Wunde selbst, nach gehöriger Erweiterung derselben, und zwar oberhalb und unterhalb der verletzten Stelle der Arterie vorgenommen werden. Blutungen aus dem unteren Ende (vgl. pag. 72 u. 128) sind gerade an der Femoralis wegen der zahlreichen Anastomosen sehr häufig. Ist man ausser Stande, in der Wunde selbst die Unterbindung beider Enden des Gefässes auszuführen, so muss man die Ligatur in der Continuität oberhalb der Abgangsstelle der Profunda vornehmen, weil, wenn der Blutstrom durch diese fortbesteht, mit grosser Wahr-

¹⁾ Guthrie (Wounds and injuries of arteries, 1816) führt mehrere Beispiele an, auch Larrey beobachtete einen solchen Fall (Clinique chirurgica'le, Tom. I pag. 100 u. 132).

²⁾ Mehrmals ist beobachtet worden, wie der Verletzte, während Alle um ihn herum in Verwirrung waren, durch andauernde starke Beugung des Oberschenkels den Leib die Blutung anhielt. Vgl. pag. 113 und 193.

Scheinlichkeit eine Nachblutung aus dem unteren Ende der verletzten Femoralis zu erwarten ist. Sollte die Blutung bei Ankunft des Arztes aufgehört haben, sei es wegen einer Ohnmacht oder durch zweckmässige Compression, so muss er (sofern überhaupt die Erscheinungen einer Arterienverletzung vorliegen) doch sogleich zur Unterbindung bereiten; nur wenn bereits mehrere Tage vergangen sind und die Wunde schon in Eiterung steht, darf man, unter Fortsetzung der Compression, die Ligatur bis auf den Eintritt einer Nachblutung verschieben.

Das Aneurysma arterioso-venosum ist am Schenkel selten¹⁾. Ein hoch hinaufgehender Schnürstrumpf würde die Beschwerden, die Ohnmacht, mindern. Zum Behuf radicaler Heilung müsste entweder die Arterie oder die Vene dicht oberhalb und dicht unterhalb des Aneurysma zur Obliteration gebracht werden.

Endogene Aneurysmen der Femoralis sind nächst denen der Poplitea die häufigsten unter den in das Gebiet der Chirurgie fallenden. Gewöhnlich kommen sie im oberen Drittel des Schenkels vor und erreichen dort schneller eine bedeutende Grösse, als eiter unten, wo sie durch den die Arterie bedeckenden M. sartorius ihrer Entwicklung gehemmt werden. In der oberen Hälfte des Schenkels befindet sich die Communicationsöffnung zwischen Arterie und aneurysmatischem Sacke in der Regel etwas unterhalb der Mitte der Geschwulst, in der unteren Hälfte meist oberhalb. Gewöhnlich entwickelt sich das Aneurysma an der vorderen inneren Seite der Arterie, sehr selten am hinteren oder äusseren Umfange. Im letzteren Falle kann die Arterie durch das Aneurysma gegen die Haut hin erdrängt werden, folglich auf dem Aneurysma liegen²⁾.

¹⁾ Velpeau hat einen Fall der Art (1835) beobachtet, 20 Jahre nachdem der Kranke durch einen Messerstich in der Schenkelbeuge verletzt worden war. Man bemerkte an der äusserlich durch eine Narbe bezeichneten Stelle heftiges Klopfen und ein starkes Reibegeräusch. Die Vena saphena war auf eine Strecke von 1½ Centimeter bis zur Dicke eines Fingers ausgedehnt, weiter abwärts aber normal. In ihrem erweiterten Theile hörte man ein heftiges Brausen, wie von einem grossen Schmiedehämmer; dasselbe erstreckte sich bis in die Fossa iliaca hinauf. Veränderungen der Stellung und Lage des Kranken hatten keinen Einfluss auf die Ausdehnung der Saphena und auf die Intensität des Geräusches. In diesem und ähnlichen Fällen war das Uebel keineswegs lebensgefährlich. Eine schnellere Entwicklung beobachtete J. Spence. Vgl. mein Referat im „Jahresbericht“ p. 1869. Bd. II. pag. 319 u. f.

²⁾ Vgl. Casamayor, Réflexions et observ. sur l'Anévrisme de l'artère fémorale. Paris 1825. (Fall von Delpech.)

Die **Diagnose** des Aneurysma in der Schenkelbeuge ist oft schwierig; besonders können Abscesse, zumal kalte und Congestions-Abscesse, welche langsam entstanden sind, wenn sie gerade auf der Arterie aufliegen, für Pulsadergeschwülste gehalten werden — und umgekehrt¹⁾. Jedoch sind solche Verwechslungen nur möglich, wenn man den Gang der Krankheit nicht von Anfang an beobachtet hat.

Naturheilung eines Femoral-Aneurysma ist höchst selten.

Severinus sah ein Aneurysma in der Schenkelbeuge durch Brand heilen, ebenso Lancisi, auch Hodgson erzählt einen Fall von Heilung eines sehr grossen Inguinal-Aneurysma unter den Erscheinungen der Abscessbildung und Gangrän.

Behandlung. Es hat lange gedauert, bis man sich von der Möglichkeit, die Art. femoralis zu verschliessen, überzeuete. Die Fälle von spontaner Obliteration der Femoralis ohne Brand der unteren Extremität sind freilich auch bis auf die neueste Zeit hin noch sehr selten²⁾; aber die Möglichkeit, Aneurysmen durch Unterbindung der Art. femoralis zu heilen, ist jetzt vollkommen erwiesen³⁾. Der Umstand, dass gerade nach der Unterbindung der Femoralis nicht selten Nachblutungen beobachtet werden, und die Möglichkeit, einen andauernden Druck auf die Arterie bequem auszuüben, haben der Behandlung der Femoral- und Popliteal-Aneurysmen durch permanente Compression der Art. femoralis zahlreiche Freunde gewonnen. Die Resultate, welche in neuester Zeit, nach dem Vorgange der Irischen Aerzte, durch diese Behandlungsweise erzielt wurden, sind so ungemein erfreulich, dass es heut zu Tage geradezu als ein Unrecht bezeichnet werden müsste, wenn man bei einem nicht complicirten Aneurysma dieser Region die Unterbindung vornehmen wollte, ohne sich vorher durch sorgfältige Versuche von der Unwirksamkeit der Compression überzeugt zu haben. Sogar bei Femoral-Aneurysmen, welche dicht am und selbst unter dem Fallopiä'schen Bande liegen,

¹⁾ Guattani berichtet, dass Maximi sich einen solchen Irrthum zu Schulden kommen liess. Vgl. Lauth, *Scriptorum latinorum de aneurysmatibus collectio*. Cullerier stach ein Aneurysma an, welches er für einen Bubo hielt. — Macilwain (*Diagnosis of hernial and other tumors*. London 1830) hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass auch Congestionsabscesse mit Femoral-Aneurysmen verwechselt werden können.

²⁾ Tiedemann (l. c.) erwähnt keinen einzigen hierher gehörigen Fall.

³⁾ Man begreift jetzt nicht, wie der berühmte Lorenz Heister noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts behaupten konnte, in allen Fällen, in denen ein Aneurysma am Oberschenkel heile, müssten zwei Femorales bestanden haben, von denen die eine nach der Obliteration der anderen die Ernährung des ganzen Gliedes übernommen hätte; sonst sei Brand zu erwarten.

ann die Compression, welche dann auf die Iliaca externa ausgeübt werden muss und daher schwieriger ist, noch zum Ziele führen.

Ich habe selbst ein Aneurysma der Schenkelbeuge durch 16tägige Instrumental-Compression des Endstücks der Iliaca geheilt. — Nach der von Follin (Archiv. génér. de méd., 1851, Nov.) gegebenen Uebersicht wurden durchschnittlich von 5 durch Compression behandelten Femoral-Aneurysmen 4 geheilt. — Die Zahl der durch Compression geheilten Fälle hat sich in den letzten Jahren, namentlich auch durch Anwendung der Digitalcompression, ungemein vergrössert. — Auch durch Flexion im Hüftgelenk sind Heilungen erzielt worden.

Käme man mit der Compression nicht zum Ziele, so würde, wenn die Grösse des Aneurysma nicht zu beträchtlich ist, immer erst noch mit der Electropunctur oder den styptischen Einspritzungen ein Versuch gemacht werden dürfen.

Soll aber die Unterbindung in Gebrauch gezogen werden, so entsteht die Frage, ob unmittelbar an der Geschwulst oder nach Hunter operirt werden soll. Velpeau vertheidigt ersteres Verfahren, um nicht genöthigt zu sein, entweder oberhalb der Profunda femoralis, oder nahe unterhalb ihres Ursprunges zu unterbinden, da man im ersteren Falle befürchten müsse, Brand wegen Mangel an Blutzufuhr eintreten zu sehen, im zweiten aber eine Nachblutung wegen mangelhafter Thrombusbildung zu erwarten habe. Der erste dieser Gründe ist nicht stichhaltig, da, wie wir schon bei der Art. iliaca gesehen haben, auch ohne Mitwirkung der Profunda, der Collateralkreislauf wiederhergestellt wird. Dagegen ist die Gefahr der Nachblutung in dieser Region allerdings beträchtlich: unterbindet man dicht am Fallopiä'schen Bande, so kann die Thrombusbildung wegen der unmittelbar darüber sich findenden Abgangsstellen der Epigastrica und Circumflexa ilium ungenügend ausfallen; will man die Ligatur weiter abwärts anlegen, so geräth man, vielleicht ohne es zu wollen, bei hohem Abgange der Profunda dicht unter deren Ursprungsstelle, was noch gefährlicher wäre. Broca und neuerdings Kocher¹⁾ empfehlen deshalb, statt der hohen Unterbindung der Femoralis immer diejenige der Iliaca externa auszuführen. — Die Brasdor'sche Methode gewährt am Schenkel gar keine Vortheile. Sitzt das Aneurysma hoch oben, so ist sie wenig wirksam, wegen der Abgangsstelle der Profunda; befindet es sich weiter abwärts, so wird leichter und sicherer oberhalb desselben unterbunden. — Bei Schenkel-Aneurysmen, welche so hoch liegen, dass an die Femoralis keine Ligatur mehr gelegt werden darf, ergiebt sich die Unterbindung der Iliaca externa von selbst.

¹⁾ Archiv f. klinische Chirurgie, Bd. XI. pag. 527.

III. Unterbindung der Arteria femoralis.

Die Richtung der Femoralis wird durch eine von der Mitte des Fallopiä'schen Bandes zum hinteren Rande des Condylus internus (Fig. 20¹⁾).



femoris gezogene Linie angedeutet. Für den grösseren Theil ihres Verlaufes muss vom inneren Rande des Sartorius ihre Aufsuchung begonnen werden (vgl. Fig. 20).

A. Unterbindung dicht am Fallopiä'schen Bande. Unterbindung der Femoralis communis. Verticaler Hautschnitt, in der Mitte einer, von der Spina anterior superior ilei zur Symphysis ossium pubis oder von der Spina anterior inferior zum Tuberculum pubis gezogenen Linie beginnend, in der Richtung gegen den inneren Rand der Patella 5 bis 7 Centim. abwärts; dann Trennung der Fascia superficialis und Entfernung der im Wege liegenden Lymphdrüsen. Hierauf wird die Fascia lata (sofern nicht etwa die Fovea ovalis sich so weit erstreckt, dass die Arterie gar nicht von der Fascia lata bedeckt ist) auf der Hohlsonde gespalten, die Arterie vorsichtig von der, an ihrer inneren Seite liegenden Vene getrennt und die Nadel von Innen nach Aussen um sie geführt.

Ist der Raum für den Hautschnitt beschränkt, so kann man

¹⁾ Oberschenkel nach Aussen gerollt. a Psoas; b Iliacus internus; c Ligamentum Fallopii; d Sartorius; f Gracilis; g Adductor longus; h Pectineus; i Aorta; j A. iliaca communis; k A. hypogastrica; l A. iliaca externa; m A. femoralis; n Vena femoralis; t Nervus cruralis (welcher aber weiter von der Arterie nach Aussen entfernt ist, als es in der Figur erscheint) resp. N. saphenus; u Haken; durch welchen der Sartorius nach Aussen gezogen ist, um die Arterie sichtbar zu machen. (Uebrigens siehe pag. 198.)

ihn auch parallel dem Fallopiä'schen Bande (in beinahe querer Richtung machen. Dies wird von Manchen, namentlich von Porter, überhaupt als bequemer empfohlen.

Die Ligatur darf niemals unmittelbar am Fallopiä'schen Bande liegen, da die nahe darüber entspringenden Aa. epigastrica und circumflexa ilium sonst die Thrombusbildung hindern könnten. Um sicher zu sein, dass man sich oberhalb des Abgangs der Profunda befindet, muss man die Femoralis in etwas grösserer Ausdehnung blosslegen und die Ligatur am unteren Ende des entblössten Stücks anlegen. Vgl. die Note auf pag. 201.

B. Unterbindung unterhalb des Abgangs der Profunda.
Unterbindung der Art. cruralis.

a) An der Grenze zwischen dem oberen und mittleren Drittel des Schenkels (nach Scarpa). Man erforscht mit den Fingern die Pulsationen der Arterie im Trigonum inguinale in der Richtung abwärts; da, wo sie aufhören deutlich zu sein, beginnt man einen 6 bis 8 Centm. langen Einschnitt, der am inneren Rande des Sartorius — mit Vermeidung der Vena saphena — abwärts geführt wird. Die Scheide des Sartorius wird in derselben Ausdehnung geöffnet, und nachdem dieser Muskel entblösst ist, an seinem inneren Rande auch das tiefe Blatt der Fascia lata auf der Hohlsonde gespalten. Alsdann erscheint die Arterie in der Tiefe und wird auch hier, nachdem sie sorgfältig isolirt ist, mit Rücksicht auf die Lage der nach Innen und Hinten liegenden Vene, von der inneren Seite her mit der Ligatur umgangen. Gewöhnlich läuft gerade an dieser Stelle der Nervus saphenus schräg über die Arterie und muss daher sorgfältig zur Seite geschoben werden. — Wo die Wahl des Ortes frei steht, ist diese Stelle zu bevorzugen.

b) In der Mitte des Schenkels, — gewöhnlich nach Hunter benannt, obwohl J. Hunter seine berühmte Unterbindung (vgl. pag. 133) näher am Kniegelenk ausgeführt hat. Einschnitt am inneren Rande des Sartorius, in der Mitte seines Verlaufes, 8 Centm. lang. Die Gefahr, der Vena saphena zu nahe zu kommen, ist mindestens ebenso gross, wie bei dem Scarpa'schen Verfahren. Der Sartorius muss, nachdem sein Rand entblösst ist, weiter nach Aussen gezogen werden, da er hier die Arterie bereits vollkommen bedeckt. Deshalb ist der Rath von Desault zweckmässig, den Hautschnitt in der Mitte der Breite des Sartorius zu machen und von dieser Wunde aus den inneren Rand desselben zu entblößen, welcher alsdann leichter nach Aussen gezogen (gelüftet) werden kann. Der Vorschlag von Roux, am äusseren Rande des Sartorius einzuschneiden, gewährt keinen Vortheil.

c) Unterbindung im unteren Drittel des Schenkels, an der Stelle, wo die Arterie in den Adductor magnus eintritt. Sehr schwierig. Der Schenkel liegt, im Hüft- und Kniegelenk gebeugt, auf der äusseren Seite. Ein zur einen Hälfte seiner Länge in das mittlere, zur anderen in das untere Drittel des Oberschenkels fallender Schnitt von 8 bis 10 Centm. Länge wird in der Richtung des Sartorius geführt. Je nachdem der Muskel sich früher oder später zur hinteren Seite des Schenkels wendet, wird bald sein äusserer, bald sein innerer Rand entblösst und dem entsprechend der Muskel selbst bald nach Aussen (wie in Fig. 20 bei *u*), bald nach Innen und Hinten geschoben und durch einen Wundhaken zurückgehalten. Vidal räth am inneren, Malgaigne am äusseren Rande einzudringen. Jedenfalls muss nachher noch das tiefe Blatt der Fascie und, wenn die Arterie schon frühzeitig in den Adductor eintritt, auch ein Theil des sie innerhalb desselben umfassenden sehnigen Canals gespalten werden. Die Verhältnisse, unter denen man veranlasst sein sollte, gerade an dieser Stelle eine Unterbindung in der Continuität vorzunehmen, sind schwer einzusehen, zumal die kurz vorher abgehenden Muskel- und Gelenk-Aeste der Thrombusbildung hinderlich werden könnten und das Isoliren der Arterie wegen ihrer innigen Verbindung mit der Vene sehr schwierig ist. Wichtig ist es aber dennoch, die Ligatur auch an dieser Stelle einzuüben, um bei einer Verletzung daselbst die Unterbindung sicher ausführen zu können.

Neuntes Capitel.

Arteria poplitea.

I. Anatomie.

Fig. 21.



Die Arteria poplitea liegt in der Tiefe der Kniekehle von fettreichem Bindegewebe umhüllt, sehr genau verbunden und in eine feste gemeinsame Scheide eingehüllt mit der, hinter ihr und ein wenig mehr nach Aussen gelegenen Vena poplitea. An der äusseren Seite der Gefässe verlaufen die in der Kniekehle bereits stark divergirenden beiden Unterschenkelnerven, von denen der Tibialis dem Laufe der Gefässe folgt, der Peroneus aber sich um das Capitulum fibulae zur vorderen Seite des Unterschenkels wendet (Fig. 21, *b*). — Varietäten der Art. poplitea sind selten und beziehen sich wesentlich auf eine zu früh erfolgende Theilung des Stammes. Zuweilen hat man die relative Lage der Art. und Vena poplitea gerade umgekehrt gefunden.

II. Krankheiten der Arteria poplitea.

Was über die Verletzungen der Art. femoralis gesagt worden ist, gilt auch für diejenigen der Poplitea; nur sind letztere seltener, da die Arterie tiefer liegt und von vorn durch Knochen, seitlich durch starke Muskel- und Sehnen-Stränge geschützt wird. Daher sind denn auch traumatische Aneurysmen an ihr selten.

Der merkwürdigste Fall der Art wurde von Larrey in Toulouse beobachtet (*Presse médicale*, Tom. I. pag. 25). Ein Koch wollte rückwärts springend sich auf eine Komode setzen. Ein grosses Messer, welches von einer ledernen Scheide umgeben in seiner Hosentasche steckte, stemmte sich hierbei gegen den Rand der Komode, so dass die dadurch abwärts gestossene Spitze desselben in die Kniekehle eindrang und die Art. poplitea verletzte. Eine Ohnmacht unterbrach die gewaltige Blutung, deren Wiederkehr demnächst durch ein Tourniquet verhütet wurde. Allmählig bildete sich aber ein *Aneurysma arterioso-venosum* aus, dessen anatomische Verhältnisse wir pag. 83 u. f. erwähnt haben.

Endogene Aneurysmen kommen an der Art. poplitea häufiger, als an irgend einer anderen äusseren Arterie, und bei Weitem häufiger bei Männern, als bei Weibern vor. Man hat sich vielfach bemüht, die Ursachen dieser Häufigkeit aufzufinden. Die Dehnung, welcher die Arterie bei der Streckung des Unterschenkels, besonders bei einer plötzlichen und forcirten Streckung ausgesetzt ist, wurde früher allgemein als ätiologisches Moment angesehen. Man glaubte sogar nachweisen zu können, dass aus eben diesem Grunde Pulsadergeschwülste bei Kutschern, die Tag für Tag die Höhe eines altmodischen Kutschenbocks zu ersteigen hatten, und bei Matrosen, die beim Klettern auf den Strickleitern ähnlichen Anstrengungen des Kniegelenks ausgesetzt sind, besonders häufig angetroffen würden, — eine Annahme, welcher, nach der neueren Statistik, vor Allem die thatsächliche Begründung fehlt. Aber abgesehen hiervon ist auch die Erklärung selbst nicht stichhaltig, weil andere Arterien einer solcher Dehnung in noch höherem Grade ausgesetzt sind (z. B. die Ulnaris bei starker Streckung der Hand), ohne besondere Neigung zur Entwicklung von Aneurysmen zu zeigen. Eine andere mechanische Erklärung ist von Hyrtl aufgestellt. Durch das Anschwellen des M. popliteus (eines Beugers des Unterschenkels) während seiner Contraction, so wie des Tibialis posterior und des Flexor digitorum longus werde die Art. poplitea gegen den hinter ihr liegenden sehnigen Bogen, welcher dem Ursprunge des Musc. soleus angehört, in der Weise angedrückt, dass bei einer Beugung im Knie, zumal wenn gleichzeitig die Ferse erhoben wird, eine Knickung und Verengerung der Arterie an dem Rande des gedachten Sehnenstreifens erfolgen müsse, wodurch dann der oberhalb

dieser Stelle gelegene Theil der Arterie (d. h. also die Poplitea) einem stärkeren Drucke von Seiten des Blutstromes ausgesetzt sei, welcher, oft wiederholt („gutta cavat lapidem“), endlich zur Erkrankung, resp. Erweiterung der Poplitea führe. Als entschiedene Gegner aller mechanischen Erklärungsweisen sind schon früher Delpech und Scarpa aufgetreten. Sie behaupten, die Art. poplitea sei nur deshalb so oft aneurysmatisch, weil sie besonders häufig der Sitz von Erkrankungen sei, welche die Aneurysmen-Bildung begünstigen, — womit denn freilich Alles und somit auch Nichts erklärt ist. Die Sachlage ist wohl folgende: das ganze Gebiet der Aorta descendens, vorzugsweise aber die Art. femoralis mit ihren Aesten, ist besonders häufig der Sitz von Entartungen, durch welche die Festigkeit der Arterienwandungen beeinträchtigt wird. Dies ist eine unläugbare, wenn auch zur Zeit unerklärte Thatsache. Derjenige Theil nun der Schenkelarterie, auf welchen bei Bewegungen des Beins die zur Erzeugung eines sogenannten spontanen Aneurysma geeigneten Gelegenheitsursachen am Häufigsten einwirken, ist offenbar die Art. poplitea.

Der gewöhnliche Ausgangspunkt eines Aneurysma in der Kniekehle ist die Mitte derselben; später erstreckt es sich oft über die ganze Art. poplitea. Wegen der tiefen Lage der Arterie wird die Geschwulst, obgleich sie in dem lockeren Gewebe sich bald nach allen Seiten hin ausdehnt, oft lange Zeit von dem Kranken nicht beachtet. Bei weiterem Wachsthum wölbt sich das Aneurysma, besonders in der Mitte der Kniekehle, nach Hinten hervor, ohne dabei seine Vergrößerung nach Vorn zu unterbrechen, durch welche schliesslich sogar die Gelenkenden des Femur und der Tibia zerstört werden können.

Das Aneurysma popliteum zeigt, in Folge des von ihm auf den Nervus tibialis ausgeübten Druckes, oft als erstes Symptom, Störungen der Innervation: Ameisenkriechen, Einschlafen des Fusses, dumpfe Schmerzen u. s. f. Durch Druck auf die Kniekehlevene und die benachbarten Lymphgefässe entsteht Ausdehnung der Venen des Unterschenkels (natürlich nicht der Saphena magna) und Oedem.

Für die Diagnose gelten übrigens alle die bereits im Allgemeinen erörterten Lehren. Die Aneurysmen der Kniekehle sind nicht so oft, als die der Schenkelbeuge und der Achselhöhle, mit anderen Geschwülsten verwechselt worden, weil andere Geschwülste, besonders grosse Abscesse, in der Kniekehle viel seltener vorkommen. Jedoch führt Crisp¹⁾ Fälle auf, in denen tüchtige Wundärzte alte Aneurysmen

¹⁾ Von den Krankheiten und Verletzungen der Blutgefässe. Aus dem Englisch. Berlin 1849, pag. 246 u. 248.

men der Kniekehle für Krebsgeschwülste gehalten haben; ich habe selbst wegen eines Sarcoms der Kniekehle amputirt, welches so stark pulsirte und fluctuirte, dass es leicht für ein Aneurysma gehalten werden konnte, und habe später einmal einen pulsirenden Knochenkrebs in den Condylen des Femur, in dem die Pulsation bei Compression der Art. femoralis aufhörte, eine Zeit lang für ein Aneurysma gehalten, während andere Aerzte in diesem Falle einen „Tumor albus genu“ (vgl. Bd. IV.) erblickt hatten¹⁾.

Für die **Behandlung** der Pulsadergeschwülste in der Kniekehle wurde die „indirecte“ Methode von Hunter erdonnen und zuerst ausgeführt. Seitdem sind weit über 800 Unterbindungen der Art. femoralis vorgenommen worden, um Aneurysmen der Poplitea zu heilen. Aber die Erfolge derselben sind, wie bereits R. B. Günther²⁾ durch vergleichende Zusammenstellung gezeigt hat, daraus nicht so günstig, wie man früher annahm. Alles, was über die Mangelhaftigkeit der Hunter'schen Methode und der Unterbindung in der Continuität im Allgemeinen gesagt wurde, gilt hier im vollsten Maasse. Von der Anwendung der Brasdor'schen Methode kann aus anatomischen Gründen bei Kniekehlen-Aneurysmen gar nicht, von der Operation nach Antyllus aber, mit Rücksicht auf die bei spontanen Aneurysmen voraussichtlich bestehende Erkrankung der nächstgelegenen Arterienstücke, eigentlich nur bei traumatischen und immer mit der Aussicht auf die mit ihr überhaupt verknüpften üblen Folgen die Rede sein. — Daher hat man sich denn in neuerer Zeit ziemlich allgemein der permanenten Compression zugewandt. Dieselbe muss an verschiedenen Stellen der Femoralis gleichzeitig, entweder mit den Fingern, oder mit Compressorium, Tourniquet, Bruchband ausgeübt werden, ohne dieselbe Stelle allzu lange zu belästigen. Nach den glücklichen Resultaten, welche auf diesem Wege erzielt worden sind³⁾,

¹⁾ Vgl. die Dissertation von Dr. Franz Mücke: De ossium carcinomate aneurysma simulante. Greifswald 1856.

²⁾ Unterbindung der Art. cruralis wegen Aneurysma traumaticum nebst einer vergleichenden Zusammenstellung dieser Operationen von Dr. Rudolph Biedermann Günther. Jenaer Annalen, Bd. II. (1851) pag. 373—474.

³⁾ Schon unter den von Follin zusammengestellten 27 Kniekehlen-Aneurysmen, welche in Dublin durch Compression behandelt wurden, finden sich 21, bei denen vollkommene Heilung erreicht wurde; in einem Falle blieb das Aneurysma nach Unterbrechung der Compression bestehen, ohne jedoch weiter zu wachsen, in einem anderen wurde die Unterbindung und zwei Mal die Amputation nothwendig; drei Mal erfolgte der Tod, jedoch in zwei Fällen durch Herzkrankheit, ein Mal durch Erysipel. Vgl. pag. 110. Die letzten Jahre haben eine grosse Anzahl von günstigen Erfahrungen sowohl für die Instrumental-, als für die Digital-

ist es gewiss unsere Pflicht, sofern der Fall nicht dringend ist, die Compression mit gehöriger Ausdauer (nöthigen Falls auch in der Chloroformbetäubung) anzuwenden, bevor wir uns zur Unterbindung der Femoralis entschliessen. Die Flexion ist nirgend leichter anzuwenden, als hier, da man durch gleichzeitige Beugung im Hüft- und Kniegelenk den Blutstrom durch das Aneurysma fast immer vollständig beherrscht. In Betreff der Electropunctur und der Einspritzungen von Eisenchlorid findet hier volle Anwendung, was über dieselben im Allgemeinen ausgesagt wurde. Namentlich ist wohl bei kleineren Aneurysmen die gerade in der Kniekehle leicht zu handhabende Electropunctur zu versuchen, welche durch die Compression der Femoralis und Anlegen von Eis unterstützt werden kann.

III. Unterbindung der Arteria poplitea.

Der Kranke liegt auf dem Bauche, das Bein im Kniegelenk gestreckt, so dass die beiden die Kniekehle begrenzenden Muskel- und Sehnen-Stränge deutlich hervorspringen. Der innere Strang (*a* in Fig. 21), gebildet von den Sehnen des Semitendinosus und Semimembranosus, ist der Ausgangspunkt für die Operation. Beim weiteren Vordringen in die Tiefe hat man die Richtung gegen die hintere Fläche des Femur einzuhalten, da die Arterie tiefer und weiter nach Innen liegt, als Vene und Nerv. Die Trennung der Arterie von der Vene muss mit grosser Vorsicht geschehen. Ueberhaupt handelt es sich, sobald die Fascie gespalten ist, vielmehr um Auseinanderdrängen, als Schneiden. Der Hautschnitt muss wegen der tiefen Lage der Arterie mindestens 10 Centm. lang sein. Die Aufsuchung der Gefässe gelingt leichter in der unteren Hälfte der Kniekehle, als weiter oben, weil die Arterie dort oberflächlicher liegt.

Man ist selten zur Unterbindung der Poplitea genöthigt und wird, wo irgend möglich, die Unterbindung der Femoralis vorziehen, da nach jener die zurückbleibende tiefe Narbe die Brauchbarkeit des Gliedes voraussichtlich beeinträchtigen würde.

Zehntes Capitel.

Arterien des Unterschenkels.

I. Anatomie.

Die *Art. tibialis antica* entspringt aus der Poplitea dicht unter dem schiefen Streifen, mit welchem der *M. soleus* an dem Capitulum fibulae und der *Linea obliqua*

Compression bei Popliteal-Aneurysmen geliefert. Vgl. Gurlt l. c. pag. 116 u. f. und mein Referate im „Jahresbericht“ pro 1867 u. fg. Bd. II.

teft ist, und wendet sich sofort zwischen den
hen nach Vorn, um in den oberen zwei Dritteln
henkels dicht vor dem Ligamentum interosseum,
n an der vorderen äusseren Seite der Tibia zu
Anfangs liegt sie (*e* in Fig. 22) tief zwischen
anticus (*a*) und dem Extensor digitorum longus
obwärts immer oberflächlicher zwischen den
Tibialis anticus und des Extensor hallucis longus
Fortsetzung der Tibialis antica am Fussrücken, Art.
liegt Anfangs zwischen der Sehne des Extensor
dem Extensor brevis hallucis (*d*) und läuft dann
interosseum primum, um dort ihren Ramus
profundus zu dem tiefen Fusssohlenbogen der
tica abzuschicken. Die Art. tibialis antica wird
venen begleitet; der Nerv. peroneus legt sich
Aussen her an sie an, geht aber im unteren
Unterschenkels zu ihrer vorderen und endlich
vorderen Seite.

Art. tibialis postica die eigentliche Fortsetzung
es der Poplitea, liegt in der oberen Hälfte des
kels, wo sie alsbald die Peronea abgiebt, unge-
wischen dem Tibialis posticus und den Waden-
muskeln letzteren, welche sie von Hinten her bedecken,
tiefe Blatt der Fascie getrennt. Im unteren
t sie (Fig. 23, *d*) oberflächlich, nur bedeckt
at und der Fascia, in der Mitte des Raumes
er Tibia und der Achillessehne (Fig. 23, *a*),
venen begleitet; der Nerv liegt nach Hinten und
e Sehnen des Tibialis posticus und Flexor digi-
tus (*b*) vor ihr. An der Stelle, wo sie, mit

Vorn concaven Bo-
r dem Malleolus in-
usssohle sich wendet,
on dem (in Fig. 23
tenen) Ligamentum
(annolare) bedeckt.
Art. peronea ver-
er hinteren Seite der
l wird Anfangs von
chlichen, weiter ab-
h von der tieferen
r Wadenmuskeln be-

äten. Eine der drei
kel-Arterien kann zum
und wird dann durch
wicklung eines Astes
ersetzt. So endet

Fig. 22.



Fig. 23.



nicht selten die Tibialis antica schon im unteren Dritttheile des Unterschenkels, und der Fussrücken erhält sein Blut aus dem alsdann beträchtlichen vorderen Aste der Peronea. Fehlt auch das obere Stück der Tibialis antica, so wird dies durch Aeste der Tibialis postica ersetzt; fehlt letztere, so treten dafür Aeste der Peronea ein, welche zuletzt wieder den normalen Verlauf der Tibialis post. am Malleolus internus darstellen¹⁾. Besonders beachtenswerth ist die zuweilen vorkommende oberflächliche Lage der Tibialis antica, wenn sie nämlich, statt zwischen den beiden Knochen hindurchzugehen, mit dem Nerv. peroneus verläuft.

II. Krankheiten der Arterien des Unterschenkels.

Verwundungen der Unterschenkel-Arterien, besonders in der oberen Hälfte ihres Verlaufs, sind aus anatomischen Gründen selten. Ihre gewöhnlichen Ursachen sind Hiebe mit einer Sense oder einem Beil, Schusswunden, Zerreibungen durch Knochensplitter bei complicirten Fracturen. In der oberen Hälfte des Unterschenkels ist die Blutung nach Aussen wegen der tiefen Lage der Arterien gemeinhin unbedeutend; es erfolgt vielmehr blutige Infiltration des Bindegewebes in der Tiefe. Fast immer ist es in solchen Fällen unmöglich, bestimmt zu erkennen, welches Gefäss verletzt sei, wenn man nicht bedenklich grosse diagnostische Einschnitte machen will. Ebenso schwierig würde die Ausführung der directen Unterbindung sein. So bleibt denn für diese Fälle, wenn die Compression nicht hinreicht, oft nichts Anderes übrig, als die Femoralis zu unterbinden²⁾. — In der unteren Hälfte finden sich solche Schwierigkeiten nicht, und die Compression³⁾ sowohl als auch die directe Unterbindung sind mit Erfolg angewandt worden. Jedoch dürfte die Wirksamkeit der ersteren bei bedeutenden Verletzungen sich jedenfalls auf das untere Drittel beschränken, und auch hier sind (da sie, um wirksam zu sein, mit einiger Energie ausgeführt werden muss) Brandschorfe, selbst Brand des ganzen Fusses zu befürchten⁴⁾. Der directen Unterbindung können sich aber auch in dieser Gegend Schwierigkeiten entgegenstellen, wenn man es, statt mit einer frischen Wunde, mit einem Eiterheerde, einem Geschwüre, oder einer complicirten Fractur zu thun hat⁵⁾.

Aneurysmen der Unterschenkel-Arterien sind sehr selten.

¹⁾ Vgl. Tiedemann's Supplementa Tab. 51.

²⁾ Guthrie will auch in dieser Gegend durchaus die Unterbindung oberhalb und unterhalb der verletzten Stelle des Gefässes ausgeführt wissen. Dupuytren dagegen rath entschieden zur Ligatur der Femoralis.

³⁾ Vgl. Wernher, „Das akademische Hospital in Giessen“ pag. 73—82, und Sanson in seiner Thèse sur les hémorrhagies traumatiques, woselbst ein Fall von Carro⁶⁾ du Villards besonders merkwürdig ist.

⁴⁾ Boyer erzählt einen Fall dieser Art. Malad. chirurg. Tom. II. pag. 295.

⁵⁾ Ich war in einem solchen Falle genöthigt, die Femoralis zu unterbinden.

III. Unterbindung der Unterschenkel-Arterien.

1) *Arteria tibialis antica*. Nachdem man durch abwechselndes Strecken und Beugen des Fusses die Sehne des *M. tibialis anticus* erkannt hat, schneidet man an der äusseren Seite dieses Muskels ein. Lässt sich der Rand der Sehne oder des Muskels nicht deutlich fühlen, so zieht man von der Mitte des Fussgelenks eine Linie zu der Mitte des Raumes zwischen *Crista tibiae* und *Capitulum fibulae* und folgt dieser; oder der Schnitt durch die Haut und die oberflächliche Fascie wird einen Finger breit vom äusseren Rande der Tibia gemacht und der äussere Wundrand alsdann so weit nach Aussen gezogen, bis das erste *Spatium intermusculare* erscheint; in diesem liegt die Arterie. Der Hautschnitt muss wegen der Tiefe, in die man zu dringen hat, bis 10 Centimeter lang sein. Die Trennung der beiden, die Arterie umfassenden und bedeckenden Muskeln muss, wegen der zahlreichen und fast rechtwinklig divergirenden Aeste vorsichtig und zum Theil mit stumpfen Werkzeugen geschehen. Ist man endlich zu der gemeinsamen Gefäss-Nerven-Scheide gekommen, so ist es noch schwierig, die Arterie zu isoliren; besonders ist zu bedenken, dass im unteren Drittel der Nerv vor der Arterie liegt. In sehr schwierigen Fällen kann man das ganze Bündel mit einem Haken hervorziehen, um alsdann die Arterie in der gewöhnlichen Weise zu isoliren. — Die Unterbindung der *Art. pedialis* kann an der äusseren Seite der Sehne des *Extensor longus hallucis* in der Nähe des Fussgelenks, weiter nach Vorn aber auch an der äusseren Seite des *Extensor brevis hallucis* vorgenommen werden.

2) *Arteria tibialis postica*. Der Ausgangspunkt für ihre Aufsuchung ist der innere Rand der Tibia; von ihm nach Hinten und Aussen findet man die Arterie. Ihre Unterbindung sollte niemals höher als im zweiten Viertel des Unterschenkels vorgenommen werden. Auch hier liegt sie so tief und so entfernt vom Rande der Tibia, dass nicht unmittelbar an diesem, sondern in der Mitte zwischen ihm und einer von dem inneren Rande der Achillessehne gerade aufwärts gezogenen Linie der Hautschnitt gemacht werden muss. Das Bein muss daher gebeugt auf seiner äusseren Seite in der Art liegen, dass nur das Knie und der äussere Knöchel unterstützt sind. Der Schnitt durch die Haut und die *Fascia cruris* muss 10 Centimeter lang sein und parallel dem inneren Rande der Tibia mit Vermeidung der *Vena saphena magna* geführt werden. Der *Gastrocnemius* wird nach Hinten geschoben und der *Soleus* etwa 2 Centimeter vom Rande der Tibia in der Richtung und Ausdehnung des Hautschnittes durchschnitten, bis das tiefe Blatt der Fascie unter ihm erscheint, welches auf der

Hohlsonde vorsichtig zu spalten ist. Zwischen dieser Fascie und der tiefen Muskelschicht liegt an der bezeichneten Stelle die Arterie (vgl. pag. 223). — Viel leichter findet man die *Tibialis postica* in der Nähe des inneren Knöchels. Ein genau in der Mitte zwischen der Achillessehne und dem hinteren Rande der Tibia geführter Schnitt hat die Haut und die Fascie zu trennen, worauf man sofort zu der, von Fettgewebe umgebenen, von zwei Venen begleiteten Arterie gelangt (vgl. Fig. 23 und deren Erklärung im Text, pag. 223). Noch weiter abwärts findet man die *Arteria tibialis postica* genau in der Mitte einer Linie, welche man sich vom Malleolus internus senkrecht zum Lauf der Arterie bis zum inneren Rande des Calcaneus gezogen denkt. Die Blosslegung wird durch einen halbmondförmigen, nach Vorn concaven Schnitt erleichtert.

3) Die *Art. peronea* kann (in der Continuität) nur an der Stelle, wo der *Soleus* und der *Gastrocnemius* auseinander weichen, mit einigem Vortheil aufgesucht werden. Ein 8 Centimeter langer Schnitt am hinteren Rande der *Fibula* hat die Haut, die Fascie, die Anheftung des *Soleus* und das tiefe Blatt der *Fascia suralis* zu trennen. Nachdem dann der hintere Wundrand gehörig von dem vorderen entfernt ist, findet man die Arterie entweder zwischen den Muskelfasern des *Flexor longus hallucis* oder an dessen hinterer und innerer Seite.

Tabellarische Uebersicht des Collateralkreislaufs nach Unterbindung der grösseren Arterien¹⁾.

Unterbundene Arterie.	Aeste aus dem centralen Theile.	Aeste aus dem peripherischen Theile ²⁾ .
I. <i>Truncus anonymus.</i>	1. <i>Carotis</i> und <i>A. vertebralis</i> der linken Seite. 2. <i>Aa. intercostales</i> (ex <i>Aorta</i>). 3. <i>A. epigastrica</i> (ex <i>A. iliaca externa</i>).	1. <i>Carotis</i> und <i>A. vertebralis</i> der rechten Seite. 2. <i>A. intercostalis prima</i> et <i>Aa. thoracicae</i> (ex <i>A. subclavia</i>). 3. <i>Arter. mammaria interna</i> (schwache Anastomosen).
II. <i>A. carotis communis.</i>	1. Sämmtliche Aeste der <i>A. carotis communis</i> der anderen Seite. 2. Beide <i>Aa. vertebrales</i> . 3. <i>A. thyreoidea inferior</i> (ex <i>A. subclavia</i>).	1. Sämmtliche Aeste der unterbundenen <i>Carotis</i> ; quere Anastomosen und Zusammenfluss im <i>Circulus arteriosus Willisii</i> . 2. <i>Circul. arterios. Willisii</i> . 3. <i>A. thyreoidea superior</i> .

¹⁾ Es sind nur die wichtigsten Anastomosen berücksichtigt, diejenigen des Vorderarms und des Unterschenkels, als sich von selbst ergebend (vgl. 187 u. f. und 222 u. f.), gar nicht aufgeführt. — Keineswegs soll durch diese Uebersicht ausgedrückt werden, dass die aufgeführten Collateralbahnen sich jedes Mal sämmtlich herstellen; es sind ganz gewöhnlich nur einzelne entwickelt.

²⁾ Die Bezeichnungen *central* und *peripherisch* beziehen sich auf die Bahn (Richtung) des collateralen Kreislaufs, diesseits und jenseits der Ligaturstelle.

Unterbundene Arterie.	Aeste aus dem centralen Theile.	Aeste aus dem peripherischen Theile.
I. A. carotis externa.	1. Sämmtliche Aeste der nicht unterbundenen Carotis externa. 2. A. vertebralis auf der Seite der Unterbindung. 3. A. ophthalmica auf der Seite der Unterbindung. 4. A. thyreoidea inferior.	1. Dieselben Aeste der unterbundenen Carotis externa; quere Anastomosen. 2. Ramus descendens Arteriae occipitalis. 3. Aa. angularis, temporalis superf., temporal. profund. (ex A. maxillari interna) auf der Seite der Unterbindung. 4. A. thyreoidea superior.
IV. A. subclavia auf der ersten Rippe.	Aa. transversa scapulae, transversa colli, cervicalis profunda.	Aa. circumflexa humeri und subscapularis.
V. A. axillaris.		
VI. A. brachialis.	Aa. circumflexa humeri und subscapularis. Aa. collaterales ulnaris, radialis und media.	A. profunda brachii (deren aufsteigende Aeste). Aa. recurrentes ulnaris, radialis und interossea.
a) Oberhalb des Abgangs der A. profunda brachii. b) Unterhalb desselben.		
VII. A. iliaca communis.	1. Aeste der A. hypogastrica der anderen Seite. 2. A. sacra media. 3. A. mammaria interna. 4. Aa. lumbales.	1. Aeste der A. hypogastrica der Seite der Ligatur. 2. A. sacra lateralis auf der Seite der Unterbindung. 3. A. epigastrica. 4. A. ilio-lumbalis und deren Anastomose mit der A. circumflexa ilium.
VIII. A. iliaca interna s. hypogastrica.	1. Alle Aeste der A. hypogastrica der anderen Seite. 2. A. circumflexa ilium und die letzten Aa. lumbales. 3. Aa. circumflexae femoris. 4. A. sacra media.	1. Dieselben auf der Seite der Unterbindung. 2. A. ilio-lumbalis. 3. Aa. obturatoria, glutea, ischiadica. 4. A. sacra lateralis.
IX. A. iliaca externa.	1. Aa. glutea, ischiadica, obturatoria. 2. A. pudenda interna. 3. A. ilio-lumbalis. 4. A. mammaria interna.	1. Obere Aeste der A. profunda femoris, besonders Aa. circumflexae. 2. A. pudenda externa. 3. A. circumflexa ilium. 4. A. epigastrica.
X. A. femoralis.	Aa. glutea, ischiadica, obturatoria. Aa. perforantes (ex A. profunda femoris).	Obere Aeste der A. profunda femoris, besonders Aa. circumflexae. Aa. articulares genu et rami musculares Arteriae popliteae.
a) Oberhalb des Abgangs der A. profunda femoris. b) Unterhalb desselben.		

Vierter Abschnitt.

Von den Krankheiten der Venen.

Erstes Capitel.

Verletzungen der Venen.

Stichwunden der Venen haben eine verschiedene Bedeutung je nach der Stärke des verletzenden Instrumentes. Man kann mit einer gewöhnlichen Näh-Nadel grössere Venen quer durchstechen ohne dass Blutung entsteht. Grössere Stich- oder Schnittwunden können dagegen gefährliche Blutverluste bedingen. Längswunden bluten verhältnissmässig weniger, weil ihre Ränder keine Neigung zum Klaffen haben. Streckung des Theils, an welchem sich eine solche Venenwunde befindet, kann die Blutung hemmen. Quere und schräge Wunden liefern eine viel bedeutendere Blutung, vorzüglich, wenn ungefähr zwei Drittel des Umfangs der Vene durchschnitten sind. ZerreiSSung der Venen ohne gleichzeitige ZerreiSSung der übrigen Theile ist selten, wenn die Venenhäute gesund sind. Sind sie aber verdünnt, wie dies bei der krankhaften Erweiterung der Venen (Varix) gewöhnlich der Fall ist, so zerreiSSen sie leicht. Besonders häufig wird dies an erweiterten Venen der unteren Extremität beobachtet.

In Betreff ihres Verhaltens bei Verletzungen lassen sich die Venen in drei Abtheilungen bringen: 1) solche, die nur mit lockerem Bindegewebe umgeben sind, z. B. die unter der Haut liegenden; 2) solche, die von festem fibrösen Gewebe umfasst und durch dasselbe mit anderen Organen verbunden werden, z. B. die Vena subclavia, die Sinus im Schädel; 3) solche, die ganz in Knochen gelegen sind, die Knochenvenen. Die zu den letzten beiden Abtheilungen gehörigen klaffen nach ihrer Durchschneidung ganz wie Arterien; ihre Ver-

etzung bedingt daher eine viel bedeutendere Blutung und gestattet viel leichter das Eintreten von Luft in ihre Höhle. Dieselben Verhältnisse können durch eine pathologische Verdickung der Venenwandungen oder durch eine unvollständige Trennung ihres Umfanges herbeigeführt werden.

Wegen der Richtung der Blutbewegung und der Einrichtung der Klappen sind venöse Hämorrhagien, wenn es sich nicht um grosse Stämme handelt, selten gefährlich. Anderer Seits erwachsen aus demselben Umstände die bei der Pyämie (Bd. I. pag. 249) geschilderten Gefahren, weil Alles, was die Venen aufnehmen, nach dem Centrum bewegt wird, d. h. zum Herzen, und von da aus wieder zu allen Organen, zunächst zu den Lungen, gelangt.

Die Zufälle, welche durch Venenverletzung unmittelbar herbeigeführt werden können, sind: Blutung und Eintritt von Luft. Der letztgenannte Zufall ist bis jetzt nur bei Operationen beobachtet und deshalb schon Bd. I. pag. 63 berücksichtigt worden.

Das ausfliessende Venenblut hat eine dunkelroth-bläuliche Farbe, fließt in continuirlichem, nie rhythmisch verstärktem Strome oder tröpfelnd. Die Blutung wird durch Contraction der Muskeln des verletzten Theils, durch kräftige Expiration und durch Compression der Venen oberhalb der Wunde (zwischen ihr und dem Herzen) verstärkt, dagegen durch kräftige Inspiration und Compression an der peripherischen Seite (zwischen der Wunde und den Capillargefässen) gestillt oder doch vermindert. Vgl. pag. 72 u. f.

Venöse Blutungen können von Bedeutung sein, theils durch die Masse des entleerten Blutes, theils durch den Ort der Blutung. Erfolgt z. B. die Blutung in eine seröse Höhle, so kann das Blut als fremder Körper Entzündung in derselben herbeiführen. Gewöhnlich hören venöse Blutungen von selbst auf, und die Wunde in der Venenwand wird mit Erhaltung des Lumens der Vene durch eine feste Narbe verschlossen. Unter besonderen Umständen kann der Blutverlust aus einer Vene bedeutend und lebensgefährlich werden, nämlich:

1) wenn das Lumen der Vene sehr bedeutend ist, wie z. B. bei der Vena femoralis;

2) wenn die Vene keine oder unzureichende Klappen besitzt (wie dies in der Nähe des Rumpfes allgemein der Fall ist), so dass aus dem centralen Ende eine erhebliche Blutung erfolgt;

3) wenn sie an benachbarte Gebilde in der Art befestigt ist oder ihre Wandungen so sehr verdickt sind, dass sie weit klafft (vgl. pag. 228);

4) wenn zufällig oder absichtlich zwischen der Wunde und dem Herzen auf die Vene ein Druck ausgeübt wird oder wenn eine Verstopfung derselben stattfindet, — phlebostatische Blutung (vgl. Bd. I. pag. 251);

5) wenn der Kranke ausser Stande ist, tief einzuathmen und somit Zurückstauung des Blutes in den grossen Venen an ihrer Eintrittsstelle in den Thorax Statt findet; endlich

6) bei Blutern.

Bluter-Krankheit, Bluter-Dyskrasie, Haemophilia, Haemorrhaphilia, nennt man eine seltene, gewöhnlich zugleich mit rheumatisch-arthritischen Beschwerden und grosser Erregbarkeit bestehende, oft erbliche Neigung zu Blutungen, welche theils spontan, theils nach höchst unbedeutenden Verletzungen mit solcher Heftigkeit auftreten, dass ohne Kunsthilfe häufig der Tod erfolgt. Durch welche inneren Mittel (Tonica, Säuren, Bleizucker, Opium) diese Dyskrasie zu bekämpfen sei, ist noch keineswegs entschieden. Die Blutungen selbst werden durch Adstringentia und besonders durch methodische Compression sicherer gestillt, als durch das Glüheisen, da bei der Lösung des Brandschorfes die Blutung wiederzukehren pflegt. Vgl. die Lehrbücher über „innere Medicin“.

Ueber die gleichzeitige Verwundung von Venen und Arterien, sowie über deren weitere Folgen vgl. pag. 79 u. f.

Bei der Behandlung der venösen Blutungen¹⁾ kommen im Allgemeinen die bei den Krankheiten der Arterien (pag. 106 u. f.) erläuterten Blutstillungsmittel in Betracht.

Die Compression ist auch hier das zuerst anzuwendende Mittel. Bei geringeren Verwundungen genügt ein mit dem Finger auf die verletzte Stelle selbst ausgeübter Druck (directe Compression). Ist die Vene nicht ganz durchschnitten, so muss der Druck nur in so mässigem Grade ausgeübt werden, dass die Fortbewegung des Blutes durch die Vene nicht ganz gehindert wird. Genügt ein solcher Druck nicht, oder ist ein Venenstamm völlig durchschnitten, so muss man sofort das peripherische Ende nahe der Wunde comprimiren, um den Zufluss des Blutes zu hindern. Findet auch aus dem centralen Ende eine Blutung statt, so muss auch auf dieses ein entsprechender Druck ausgeübt werden. Bei Verwundungen der Jugularvenen ist mit der Compression des centralen Endes zu beginnen, um den Eintritt von Luft zu verhindern.

Lässt sich die Venenblutung nicht in sehr kurzer Zeit sistiren, so muss an die Stelle des drückenden Fingers ein comprimirender Verband treten, bei dessen Anlegung man vor Allem zu verhüten hat, dass der Druck nicht vorwiegend auf das centrale Ende der Vene

¹⁾ Vgl. B. Langenbeck, Beitr. z. chir. Pathol. d. Venen, Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. I. pag. 43 u. f.

ausgeübt werde, wodurch sonst gerade eine Verstärkung der Blutung eintreten müsste¹⁾. Ferner ist, wo möglich, die unmittelbare Berührung der Vene mit den Verbandstücken zu vermeiden, weil dadurch Venenentzündung und gefährliche Thrombusbildung veranlasst werden könnte. Jedenfalls lässt man solche Verbände möglichst kurze Zeit (etwa 24 Stunden) mit der Vene in unmittelbarer Berührung. An den Extremitäten ist die Einwickelung von der Peripherie gegen die verletzte Stelle hin das wichtigste Unterstützungsmittel der directen Compression.

Die Unterbindung der Venen hat die Gefahren der Venenthrombose und des Zerfalls der Thromben in geringerem Grade und zwar um so weniger, je vollständiger Eiterung dabei ausgeschlossen wird. Nicht die Ligatur an sich, auch nicht die durch sie bedingte Thrombose sind gefährlich, sondern der durch Entzündung und Eiterung bedingte Zerfall der Thromben. Es kann sogar directe Verwachsung ohne Obliteration der Vene zu Stande kommen. Die Wiederherstellung des Lumens an der Unterbindungsstelle erfolgt häufig, zuweilen sogar schon nach Jahr und Tag.

Man hat versucht, angeschnittene und angestochene Venen in der Art zu verschliessen, dass man die Wundränder der Vene mit der Fincette fasste und demnächst wie einen seitlichen Anhang am Gefässrohre mit dem Faden umschnürte. Diese sogenannte seitliche Unterbindung ist, nach den vorliegenden Erfahrungen und aus theoretischen Gründen, als ein unsicheres und gefährliches Unternehmen zu bezeichnen; es ist höchst wahrscheinlich, dass bald die Ligatur sich abstreifen, bald bei ihrer Lösung eine gefährliche Nachblutung, bald endlich unvollkommene Thrombose mit nachfolgendem Zerfall oder doch Ablösung der Thromben sich einstellen werden.

Die Besorgniss vor zerfallenden Thromben und der aus ihnen abzuleitenden purulenten Infection lässt auch die Anwendung der Styptica, namentlich des Liquor ferri sesquichlorati unräthlich erscheinen. Dagegen erregt die Glühhitze solche Bedenken nicht, weil die durch dieselbe erzeugten Thromben fest haften. Von ihr werden wir daher sowohl in Gestalt des Glüheisens, als auch mit Hilfe des galvanokaustischen Apparates bei Blutungen aus kleineren Venen, namentlich, wenn es sich um vielfache Verletzungen auf einem beschränkten Raume handelt, Gebrauch machen, sofern die übrigen localen Verhältnisse die Anwendung dieses Mittels angemessen erscheinen lassen.

¹⁾ Vgl. den Aderlass-Verband, Bd. I. pag. 188 u. 191.

Bei Blutungen aus grossen Venenstämmen der Extremitäten muss man, wenn es nicht gelingt, durch Compression ihrer Herr zu werden, den entsprechenden Arterienstamm (durch welchen der verletzte Vene Blut zugeführt wird) unterbinden. Dadurch wird in der Regel der Blutung ebenso sicher Einhalt gethan, wie durch Unterbindung der Vene selbst, und die möglichen Gefahren der letzteren, Pyämie, Gangrän durch venöse Stase fallen fort.

Die grosse Bedeutung der Arterienunterbindung für die Stillung der Blutung aus grossen Venen ist zuerst von B. v. Langenbeck (l. c. pag. 49—52) erläutert worden. Jedoch mag dies Verfahren schon früher von Einzelnen angewandt worden sein, so namentlich von B. Beck, welcher bei venöser Blutung aus Plantarästen nach der Chopart'schen Exarticulation mit glücklichem Erfolge die Art. tibialis postica unterband (Deutsche Klinik, 1860, pag. 470).

B. v. Langenbeck empfiehlt (l. c.) das analoge Verfahren, d. h. die Unterbindung der Carotis, auch für Verletzungen der Vena jugularis interna. Bei der grossen Menge und Weite der Anastomosen war es im Voraus unwahrscheinlich, dass die Ligatur der entsprechenden Carotis hinreichen sollte, um den Blutlauf in der Vena jugularis zu sistiren. Ich hatte Gelegenheit zu demonstrieren, dass dies auch in der That nicht der Fall ist. Bei der Extirpation einer Geschwulst, in welcher sowohl Carotis dextr. als Jugularis interna dextr. eingeschlossen waren, unterband ich die Carotis communis und durchschnitt dann die Jugularis interna, worauf aus dem Kopfteil der letzteren ein solcher Blutstrom sich ergoss, dass ich sie sofort unterbinden musste. Vgl. Brockmüller, de ligatura carotidis, Gryphiswald. 1856, u. W. Gross, American Journ. of med. science, 1867, Jan. und April.

Besondere Berücksichtigung erheischen Quetschungen und Entblössungen grösserer Venen, da sie zur Thrombose und dadurch unmittelbar zur Pyämie Veranlassung geben können. An kleineren Venen sind solche Insulte kaum von Bedeutung, obgleich zuweilen auch an diesen sehr ausgebreitete Thrombusbildung, meist jedoch mit dem Ausgang in völlige Resorption und Wiederherstellung des Lumens, namentlich nach Quetschungen und Erschütterungen, beobachtet wird. — Die Therapie hat in allen solchen Fällen die Resorption zu befördern und Entzündung zu verhüten, wozu nächst ruhiger Lage und Schonung des Theils vor Allem die Anwendung der Kälte zu empfehlen ist.

Zweites Capitel.

Entzündung und Thrombosis in den Venen¹⁾.

In derselben Weise, wie bei den Arterien (pag. 86 u. fgd.), stellen wir auch hier Entzündung und Thrombosis zusammen, weniger

¹⁾ Vgl. Virchow, gesammelte Abhandlungen, pag. 219—711.

wegen eines nothwendigen Zusammenhanges zwischen ihnen, als weil fast ein halbes Jahrhundert lang die Krankheits-Erscheinungen der Thrombosis als entzündliche gedeutet, die wirklichen Symptome der Venen-Entzündung aber gar nicht verfolgt worden sind. Wie an die sogenannte Arteritis der spontane Brand, so schliesst sich an die sogenannte Phlebitis die Pyämie an. So wenig wir bei der Darstellung des Brandes die früher als Arteritis gedeutete Verstopfung der Arterien als eins der ätiologischen Momente übergehen durften, ebenso wenig konnten wir bei der Schilderung der Pyämie die Thrombose in den Venen und deren Beziehung zur Phlebitis unerwähnt lassen. Thrombose kann Phlebitis zur Folge haben und umgekehrt; aber es ist nicht immer der Fall. Der zerfallende Venen-Thrombus führt zur Pyämie; aber nicht jeder Thrombus zerfällt und nicht immer ist „Pyämie“ aus Thrombosis abzuleiten. Vgl. Bd. I. pag. 249 u. f.

Gerinnung des Blutes in den Venen des lebenden Körpers, Thrombosis, Phlebothrombosis, entsteht in Folge einer Hemmung oder Verlangsamung des Blutlaufes in denselben. Die Veranlassung kann somit eine ganz mechanische sein: Compression, Unterbindung, Durchschneidung oder anderweitige Trennung der Continuität, durch welche das Blut der Triebkraft des Herzens entzogen wird. Die Hemmung des Blutlaufes braucht aber, selbst um die Bildung grosser Blutpfropfe zu veranlassen, keine bedeutende zu sein. Rauigkeiten der inneren Gefässwand können hinreichen, um zunächst kleine Fibringerinnsel entstehen zu lassen, um welche dann weiter Verdickungsschichten sich ablagern, wie bei der Bildung der analogen Blutpfropfe in den Arterien. Bei übrigens gesunden Menschen bilden sich, auf Grund von mechanischen Hindernissen, in den Venen weniger leicht, als in den Arterien Gerinnsel. Wenn aber bei grosser Pulsfrequenz in Krankheiten, welche die gesammte Ernährung stören, die Kraft des Herzens und somit der Kreislauf in hohem Grade geschwächt ist, so reichen unbedeutende mechanische Hindernisse hin, um die Bildung von Gerinnseln in den Venen zu bewirken. Haften dieselben im ganzen Umfange des Venenrohrs, und füllen dessen Lumen vollständig aus, so heissen sie „verstopfende (obturirende) Gerinnsel“; sind sie dagegen blos an einem Theile der Gefässwand festgeheftet, so dass ein Theil des Venenrohrs für den Blutstrom frei bleibt, so nennt man sie „wandständige“. Letztere können durch weitere Anlagerung zuletzt zu obturirenden Gerinnseln umgewandelt werden; erstere dagegen erfahren zuweilen in der Art eine Resorption, dass sie in der Mitte durchgängig werden und somit einen Canal darstellen, der das obere Stück des Venenrohrs wieder mit dem unteren

in Verformung setzt. Beide Arten von Venenpfropfen können im Wachsthum nicht in der Längsrichtung fortsetzen, indem von der peripherischen Seite her aus dem Blute, welchem der Weg versperrt ist, neue Schichten sich anlagern, von der centralen, dem Herz näher gelegenen Seite aber, aus dem daselbst nur noch durch die Seitenäste mit sehr vermindelter Stromkraft einflussenden Blute gleichfalls Gerinnsel abgeschieden werden, die sich an das in das Gefäßrohr frei liegende Ende des ursprünglichen Blutpfropfs ansetzen. Alle diese Blutkrümel können endlich auch wieder ganz oder theilweise mechanisch abgelöst werden, oder durch eine Art von Maceration zerfallen, welche unmittelbar an dem centralen, vom Blut unspürbar Ende häufiger beobachtet wird. Die abgelösten Stücke, Emboli, werden in der Vene allmählig weiter fortgeschwemmt und gelangen endlich zum rechten Herzen, welches sie demnächst in die Lungenarterie einströmen, in deren Ästen sie in der Regel stecken bleiben. Auf dem Wege von dem Orte ihrer Bildung bis zu der Stelle, an welcher sie wegen der Lage des Gefäßes, haften bleiben, können diese Emboli durch Ablagerung von Faserstoff, der sich auf ihnen, wie auf einer fremden Körperoberfläche niederschlägt, erheblich vergrößert werden.

Schrumpft ein Blutpfropf, welcher an der Gefäßwand ringsum haftet, unter gleichzeitiger Verwachsung mit derselben, zu einem soliden Stränge an, so wird dadurch dauernde Obliteration der Vene bedingt. Geschieht dasselbe mit einem wandständigen Gerinnsel, so ist der Erfolg das Verengung der Vene. In beiden Fällen kann das schrumpfende Gerinnsel durch Aufnahme von Kalksalzen zu einem sogenannten Venensteine werden. Selten werden vollständige, hängiger wandständige Gerinnsel, allmählig resorbirt. Die üblen Wirkungen, welche fortgeschwemmte Emboli, namentlich wenn sie in septischen Zerfall begriffen sind, für den ganzen Organismus haben, wurden bereits bei der Pyämie besprochen. Vgl. Bd. I. pag. 249 u. f.

Krankheits-Erscheinungen ruft die Thrombose der Venen an Ort und Stelle nur dann hervor, wenn bedeutendere Stämme verstopft werden und somit Störungen in der Bewegung des Venenblutes eintreten, welche durch die Seitenäste gar nicht, oder doch nicht hinreichend schnell ausgeglichen werden können. Dann entsteht Oedem in dem ganzen Stromgebiete der verstopften Vene. Zuweilen kann, namentlich bei oberflächlicher Lage, das ausgefüllte Gefäßrohr als harter Strang gefühlt werden. Bleibt es bei der blossen Thrombose und erfolgt allmählig Resorption, so schwindet auch das Oedem in entsprechendem Grade, und der Kreislauf wird völlig wiederhergestellt.

Verwächst das Gerinnsel mit der Venenwand zu einem soliden Strange, so dauert das Oedem längere Zeit an und verschwindet erst, wenn das venöse Blut durch die inzwischen erweiterten Seitenäste auf Umwegen wieder freien Abfluss gewonnen hat. — In solchen Fällen hat die Therapie sich auf ruhige Lage und gleichmässige Compression des ödematösen Theils (durch Einwickelungen) zu beschränken.

Wir haben bis jetzt die Thrombosis in den Venen betrachtet, ohne dabei irgend eine primäre oder secundäre Erkrankung der Venenwand selbst vorauszusetzen. Früher war man ganz allgemein der Ansicht, dass Entzündung der Vene das Primäre und die Bildung des Gerinnsels in ihr das Secundäre sei. Die anatomische Untersuchung hat aber nachgewiesen, dass Thrombi auch in nicht entzündeten Venen vorkommen, und dass anderer Seits nicht in jeder entzündeten Vene Blutpfropfe stecken. Man darf bei solchen Untersuchungen nicht die nach dem Tode entstehenden Gerinnsel, welche sich überall in den Gefässen vorfinden können, mit den während des Lebens entstandenen verwechseln. Letztere unterscheiden sich vor Allem durch ihre genaue Anheftung an die Venenwand, und ihren geschichteten Bau; sie sind ferner wegen grösseren Gehaltes an Faserstoff und wegen geringeren Gehaltes an Wasser, bei Weitem trockner, leichter zerreiblich und viel weniger elastisch; die mikroskopische Untersuchung weist in ihnen einen viel grösseren Reichthum an farblosen Blutkörperchen nach (welche man früher irrthümlich für Eiterkörperchen, und zwar, da sie von Fibrinschichten umschlossen waren, für „sequestrirten Eiter“ erklärt hat). Anderer Seits darf man nicht jede stärkere Röthung der Venenhäute als Entzündung deuten, wenn dieselben im Uebrigen keine wesentlichen Veränderungen erfahren, namentlich ihre Dehnbarkeit und Geschmeidigkeit nicht eingebüsst haben. Völlig unhaltbar ist die Ansicht, der in der Vene steckende Pfropf sei ein von der inneren Venenhaut geliefertes Exsudat. Die innere Venenhaut nimmt ebenso wenig Antheil an der Entzündung, wie die Tunica intima der Arterien. Die Veränderungen, welche man an ihr findet, beruhen auf Maceration, welche theils von dem septisch zerfallenden Pfropf, welcher im Venenrohre steckt, theils von dem, in den äusseren Schichten der Vene gebildeten Eiter veranlasst werden kann. Phlebitis kann aber zu Thrombosis führen. Durch Entzündung werden die Venenhäute ihrer Elasticität beraubt, der betreffende Theil des Gefässrohrs wird relativ starr; jede Biegung, jede Hervorragung wird jetzt zu einem doppelt mächtigen Hinderniss für das in der Vene fliessende Blut und somit zum Anlass für die Abscheidung von Gerinnseln. Thrombosis ihrer Seits erregt Entzündung

der Venenhäute, da der Thrombus als „fremder Körper“ reizend wirkt, selbst wenn er nicht eitrig zerfällt. Geschieht dies, so wirkt er auch noch auf chemischem Wege nachtheilig, und die Entzündung der Venenhäute nimmt alsdann ihren Ausgang gewiss nicht blos in Verdickung und Vascularisation, sondern in Eiterung. — Die Ursachen der Venen-Entzündung können aber ausserdem noch sehr mannigfaltige sein. Vor Allem sind von chirurgischer Seite die Verletzungen zu erwähnen (vgl. Cap. I.); die Entzündung kann sich aber auch von Nachbargebilden auf die Venen fortsetzen, oder durch Eiterung in der Umgebung der Vene veranlasst werden. In der Regel beginnt sie in den äusseren Schichten, als *Periphlebitis*.

Die Krankheits-Erscheinungen, welche von *Phlebitis* abhängen, sind in den älteren Beschreibungen schwer zu sondern von denjenigen, welche der Thrombose und denjenigen, welche der *Pyämie* angehören; ja in vielen Fällen hat man auch Symptome, welche offenbar der Entzündung der benachbarten Gewebe angehören, hierher gerechnet. Die entzündeten Venen sollen sich hart anfühlen und schmerzhaft sein, die Schmerzen sich nach dem Verlauf der Venen und gewöhnlich auf die ganze Extremität ausdehnen und von ödematöser Schwellung begleitet werden. Weiterhin werden dann die Schüttelfröste und die übrigen Erscheinungen der *Pyämie* angeführt. Offenbar wird man aber die Vene, auch wenn sie blos verstopft und nicht entzündet ist, als einen harten Strang fühlen, sofern sie oberflächlich liegt. Bei tiefer Lage wird auf dies Symptom überhaupt wenig Werth zu legen sein. Oedematöse Schwellung des Gliedes ist nicht Resultat der *Phlebitis*, sondern der Thrombosis. Somit bliebe, als charakteristisch, die Schmerzhaftigkeit übrig, — ein Symptom von überhaupt zweifelhaftem Werthe, welches durch die mannigfaltigsten Störungen hervorgerufen wird und anderer Seits bei unzweifelhafter *Phlebitis* fehlen kann. Liegt die entzündete Vene oberflächlich, so zeigt sich längs ihres Verlaufs eine streifenförmige Röthung der Haut, welche sich genau auf die nächste Umgebung der Vene beschränkt, also weder mehrfache parallele (oder schwach convergirende) Streifen darstellt, wie bei *Lymphangitis*, noch auch diffuse Ausbreitung gewinnt, wie bei *Erysipelas* oder *Phlegmone*. Freilich können alle diese Krankheiten auch als *Complicationen* der *Phlebitis* auftreten.

Lebert (*Virchow's Handb. der spec. Pathol. Bd. V. Abth. 2. pag. 73*) erwähnt einen Fall, in welchem eine Neuralgie des *N. musculo-cutaneus* nach einem Aderlass, bei dem wahrscheinlich ein Ast jenes Nerven verletzt war, für ein Symptom von Venen-Entzündung gehalten wurde, zumal in der Umgebung der Aderlasswunde Eiterung entstanden war.

Als Therapie der Phlebitis tritt uns fast überall bei den verschiedensten Schriftstellern der Kampf mit der Pyämie entgegen. Die Behandlung der Phlebitis als solcher hätte zunächst die ätiologischen Momente zu berücksichtigen, namentlich also fremde Körper zu entfernen, stockendem Eiter freien Abfluss zu verschaffen u. s. f. Der Indicatio morbi soll man durch Blutegel, welche nach dem Verlauf der schmerzhaften und geschwellenen Vene in grosser Anzahl anzusetzen wären, entsprechen. Weiterhin werden Cataplasmata (Wasserumschläge) und eine gleichmässige Compression empfohlen, auch Einreibungen grosser Massen von Quecksilbersalbe und Cauterisation mit dem Glüheisen. Offenbar beziehen sich letztere Empfehlungen mehr auf die Behandlung der Pyämie, als auf Phlebitis. Ich würde rathen, sich auf ruhige, sicher fixirte Lage und Eisumschläge zu beschränken. Abscesse, welche sich im Verlauf einer entzündeten Vene entwickeln, sind frühzeitig zu öffnen.

Drittes Capitel.

Neubildungen. — Erweiterung der Venen.

Atheromatöse Degeneration der Venenwand ist sehr selten und niemals mit einer in das Gefässrohr eindringenden Ulceration verbunden. Häufiger kommen Ablagerungen von Kalkerde vor, welche sich jedoch immer auf die mittlere Gefässhaut beschränken, niemals die Intima befallen und daher auch sehr selten Thrombose veranlassen. Auch die sogenannten Venensteine sind als circumscribte Ablagerungen von Kalkerde zu deuten; aber dieselben entstehen nicht durch Verkalkung der Venenwand, sondern durch Ablagerung von Kalk in Blutgerinnseln, welche allerdings nicht selten an der Venenwand mehr oder weniger fest haften. Sie finden sich nur in varicösen Venen, gewöhnlich von Erbsen- bis Bohnen-, selten von Haselnuss-Grösse, und sind durch das Gefühl als feste, selbst harte, relativ bewegliche Körper in den oberflächlich gelegenen Venen leicht zu erkennen, kommen aber in tiefen Venen, namentlich in denen der Ligamenta uteri lata mindestens ebenso häufig vor.

Entozoen, welche so häufig in den Venen von Thieren gefunden werden, sind in den Venen des Menschen sehr selten.

Auch die Geschwülste (im engeren Sinne des Wortes) haben ihren Sitz nur höchst selten innerhalb der Venen; namentlich gehen sie fast niemals von den Venenhäuten selbst aus, sondern sind entweder a) ganz unabhängig von der Vene in den Nachbargeweben

entstanden und nur nachträglich mit ihr verwachsen, oder b) von der Gefässscheide aus entwickelt, oder endlich c) innerhalb des Venenrohrs in Blutgerinnseln gebildet. Der letzte bei Weitem seltenste Fall dürfte wohl nur bei Carcinomen und auch bei diesen nur auf den spätesten Stadien der Krankheit vorkommen, so dass er kaum von praktischer Bedeutung ist¹⁾. Von grosser Wichtigkeit ist dagegen der Ausgang gewisser Geschwülste von den Gefässcheiden. Es handelt sich in solchen Fällen, nach den Erfahrungen von Langenbeck²⁾, wesentlich um Dermoidcysten, Drüsensarcome und Epithelialkrebs.

Das Venensystem nimmt oft bedeutenden Antheil an der Entstehung von Neubildungen, ohne dass man sie als wesentlich von den Venen ausgehend bezeichnen kann. Im Zellenkrebs ist dasselbe oft sehr bedeutend entwickelt, und es kann keinem Zweifel unterliegen, dass es sich hier und in ähnlichen Fällen auch um Neubildung von Venengewebe handelt.*

Krampfadern. Varices.

Von besonderer Wichtigkeit sind in der Chirurgie diejenigen organischen Veränderungen der Venen, welche gewöhnlich als Varicosität derselben oder als Phlebectasie bezeichnet werden. Hierbei handelt es sich keineswegs um blosse Erweiterung durch Dehnung des Gefässes, sondern fast immer auch um Neubildung gewisser Elemente. So gross auch die Bedeutung der mechanischen Einflüsse für die Entstehung der Venenerweiterungen (Varices, Krampfadern) ist, so findet man doch immer eine Veränderung der Gefäss-Structur an den erweiterten Stellen.

Man unterscheidet, nach Andral, folgende Varietäten:

1) Einfache Erweiterung ohne anderweitige Veränderungen und zwar über die ganze Länge des Gefässes verbreitet, oder blos auf einzelne, mehr oder weniger nahe beisammen liegende Stellen beschränkt. Ist das erstere der Fall, so hängt die Ausdehnung oft blos von Ueberfüllung der Vene ab, ist also dann auch weder als Neubildung noch als organische Krankheit zu bezeichnen.

2) Erweiterung der Venen mit Verdünnung ihrer Wandungen an den erweiterten Stellen. Auch diese ist entweder gleichmässig verbreitet oder besteht in einzelnen Anschwellungen.

3) Gleichmässige Erweiterung mit Verdickung der Wandungen.

¹⁾ Vgl. Sick, über den Venenkrebs, Tübingen 1863.

²⁾ l. c. pag. 53 u. flg.

4) Höckerige (rosenkranzförmige) Erweiterung mit Verdickung der Wandungen an den erweiterten Stellen.

Bei der dritten und vierten Varietät besteht gleichzeitig immer eine Verlängerung und ein geschlängelter Verlauf der Vene, so dass sie die Gestalt der cyrsoiden Arteriectasie (vgl. Fig. 7, p. 95) annimmt.

Verdickung der Venenwandungen ohne Erweiterung der Vene ist höchst selten. Die Folge einer solchen Verdickung ist immer, dass die durchschnittenen Venen wie Arterien klaffen. Vgl. pag. 228.

5) Erweiterung der Vene mit gleichzeitiger Entwicklung von Scheidewänden im Innern, durch welche ihre Höhle in kleine Zellen getheilt wird, in denen das Blut stockt und gerinnt. Dadurch entstehen kleine schwammige Geschwülste, deren Zusammenhang mit der Vene oft erst, nachdem sie blossgelegt, zuweilen erst, wenn sie bereits exstirpirt sind, gehörig erkannt werden kann, zumal in Fällen, wo in der Umgegend varicöse Venen nicht zu sehen sind.

6) Zu den so eben geschilderten Veränderungen gesellt sich noch die Entwicklung zahlreicher kleiner Oeffnungen, durch welche ihre Höhle oder vielmehr die kleinen Zellen der erweiterten Vene mit dem benachbarten Bindegewebe communiciren.

Bestehen mehrere solcher siebförmigen, multiloculären Varicen nahe bei einander und verdichtet sich die umgebende Bindegewebsschicht zu einer Kapsel, so stellen sie eine Species der „cavernösen Geschwülste“ dar, zu denen man auch die unter 5) aufgeführte Art der Varices rechnen kann (vgl. Bd. I. pag. 427). Häufig wird das zwischen solchen siebförmigen Varicen gelegene Bindegewebe, nachdem seine Maschen mit Blut gefüllt sind, gleichfalls der Sitz von mancherlei Neubildungen.

Abgesehen von diesen complicirten Formen ist für die Praxis von besonderem Belang, die circumscripte und die diffuse Form der Varices zu unterscheiden. Nur erstere hat eigentlich Anspruch auf den Namen „Blutaderknoten“. Die zweite wird, wenn die Erweiterung einfach und gleichmässig ist, auch als cylindrische, wenn dieselbe aber mit Schlängelung (mithin auch Verlängerung) des Gefäßrohrs verbunden ist, als cyrsoide oder serpentine Form bezeichnet. Ganz gewöhnlich combiniren sich an den subcutanen Venen, namentlich des Unterschenkels, alle Formen.

Aetiologie. Venen, in denen durch ihre Lage und andere mechanische Verhältnisse der Abfluss ihres Inhaltes nicht begünstigt oder gar gehemmt wird, sind zur Entstehung von Varicositäten prädisponirt. Daher sieht man sie denn auch viel häufiger an den oberflächlichen, unter der Haut gelegenen, den sogenannten Haut-Venen. Die tiefen

Venen finden an den sie umgebenden Organen nicht blos einen Halt, sondern die Weiterbewegung des Blutes in ihnen wird auch durch die Compression, der sie durch jede Zusammenziehung der sie umgebenden Muskeln und durch jeden Pulsschlag der neben ihnen verlaufenden Arterien ausgesetzt sind, wesentlich befördert, da die Anwesenheit der Klappen in ihnen ein Ausweichen des Blutes nur in der Richtung gegen das Herz hin gestattet. Die Hautvenen dagegen finden weder jenen Halt, noch eine solche Unterstützung für die Blutbewegung durch die sie umgebenden Theile; ausserdem sind sie durch ihre Lage äusseren Schädlichkeiten viel mehr ausgesetzt und zum Theil, besonders an den unteren Extremitäten, nur unvollständig mit Klappen versehen. Daher sind denn auch diese Hautvenen, sowie die unter ähnlichen Verhältnissen stehenden *Venae haemorrhoidales* und *spermaticeae* bei Weitem am Häufigsten der Sitz von *Varicositäten*. Keinesweges besitzen aber die tiefen Venen eine vollständige Immunität gegen *Varicosität*; vielmehr hat man durch genauere anatomische Untersuchungen erkannt, dass dieselbe bei Weitem häufiger vorkommt, als man früher geglaubt hat. Selten findet man *Varices* an den oberen Extremitäten. Bei Personen von hohem Wuchs und bei Beschäftigungen, welche andauernd zur aufrechten Stellung nöthigen, sind *Varicositäten* an den unteren Extremitäten besonders häufig. Ein Einfluss der verschiedenen Temperamente und Geschlechter ist behauptet und auch wieder geläugnet worden. Wahrscheinlicher ist eine erbliche Disposition. Von manchen Seiten wird behauptet, *Varices* seien häufiger bei alten Leuten, als bei jungen. Sie entwickeln sich aber in der Regel schon um das zwanzigste Jahr, nehmen nur nach und nach an Grösse zu und werden im höheren Alter theils beschwerlicher wegen der allgemeinen Gebrechlichkeit des Körpers, theils deutlicher sichtbar und stärker hervorspringend wegen des Schwindens des Fettes, wodurch selbst die normalen Venen in stärkeren Umrissen erscheinen. Gewöhnlich beginnt die Entwicklung der *Varices* dicht oberhalb eines Klappenpaares. Indem die Klappen nämlich den Rückfluss gegen die *Capillargefässe* hin gar nicht oder doch nur in geringem Maasse gestatten, wird der Theil der Vene dicht oberhalb derselben dem ganzen Druck der zwischen dieser Stelle und dem nächst-oberen Klappenpaare befindlichen Blutsäule ausgesetzt. Häufig beginnt die Entwicklung des *Varix* an einer Stelle, wo zwei Venen zusammenfliessen, weil daselbst gewöhnlich vorzugsweise vollständige Klappen angebracht sind und weil an der Stelle des Zusammenflusses zweier Ströme die Kraft der Bewegung überhaupt gebrochen wird, wenn der Strom in der Richtung des einen von beiden seinen Lauf

weiter fortsetzt. Daher ist denn die Varicosität der oberflächlichen Venen selten eine gleichmässige, sondern an den bezeichneten Stellen vorzugsweise entwickelt. Alles, was den Abfluss des venösen Blutes zum Herzen hin erschwert, begünstigt die Entstehung von Krampfädem, also jeder Druck, der auf irgend eine Weise die Venenstämme trifft, jede Stauung im Gebiete der Hohlvenen. Daher also das Tragen eng anliegender Strumpfbänder, die Einklemmung eines Venenstammes in einem relativ engen Schlitz der Aponeurose, durch welchen er verläuft, der Druck einer pathologischen Geschwulst in der Inguinalgegend oder in der Fossa iliaca, die Belastung der Vena iliaca durch den Uterus gravidus oder der Spermatica durch den gefüllten Mastdarm, die Stauung des Hohlvenenblutes bei organischen Krankheiten des Herzens, des Pfortaderblutes bei Erkrankungen der Leber u. s. f. Sehr selten entstehen Varicositäten durch plötzliche Gewalt-Einwirkung, wie Schlag, Stoss, Zerrung, übertriebene Muskelanstrengung.

Dass organische Veränderungen der Venenwand an den varicösen Stellen gefunden werden, haben wir schon erwähnt; dieselben scheinen wesentlich auf entzündlichen Vorgängen zu beruhen. Ob solche erst die Folge der eben erläuterten mechanischen Einwirkungen sind, oder selbstständig sich entwickeln und die Wirksamkeit der mechanischen Momente nur begünstigen, ist unentschieden. Letzteres wird dadurch wahrscheinlicher, dass es eine von mechanischen Verhältnissen unabhängige, sogar auch eine hereditäre Prädisposition zu Varicositäten giebt, wie bereits oben erwähnt wurde.

Symptome. Eine äusserlich sichtbare Varicosität erscheint, je nach der Form der Erweiterung, bald als eine pralle, rundliche oder cylindrische, einfache oder vielfache, mehr oder weniger leicht zusammendrückbare und durch Druck gewöhnlich ganz zu beseitigende Geschwulst, welche im Verlauf einer Vene liegt, durch Druck an der centralen Seite vergrössert, an der peripherischen Seite verkleinert wird, welche niemals pulsirt (es sei denn ein Varix aneurysmaticus, vgl. pag. 79 u. f.) und nicht selten bläulich durch die Haut hindurchschimmert. Sehr oft ist der Verlauf der varicösen Vene ein gewundener, geschlängelter, selbst in spitzwinkligen Zickzack-Krümmungen aufsteigender. Liegen die Windungen mehrerer benachbarter varicöser Venen dicht aneinander, so entstehen dadurch höchst merkwürdige Geschwülste, deren eigenthümliche Natur zuweilen schwer zu enträthseln ist¹⁾. Gewöhnlich finden sich an einer übrigens gleich-

¹⁾ Severinus und unter den Neueren Boyer beschrieben Geschwülste der Art, welche in der Regio hypogastrica sassen und die grösste Aehnlichkeit mit einem Medusekopfe hatten. Man ist geneigt, aus der Anwesenheit eines solchen „Caput Bardeleben, Chirurgie. 7. Aufl. II.

mässig erweiterten Vene einzelne auffallend stark ausgedehnte Stellen, sackförmige Ausbuchtungen, welche die Grösse eines Gänseeies erreichen können; namentlich sieht man dies an der Vena saphena magna, nahe ihrer Einmündungsstelle in die Vena femoralis, in der Gegend der Fossa ovalis fasciae latae, besonders häufig bei Frauen, welche wiederholt geboren haben. Auch am Condylus internus femoris kommen solche circumscripae Varices von bedeutender Grösse nicht selten vor. Die diffuse Erweiterung der Venen, besonders der Saphena magna, in selteneren Fällen aber auch der tief liegenden Venen¹⁾ kann so bedeutend sein, dass ihr Durchmesser 5 Centimeter überschreitet. Je mehr eine Vene sich erweitert, desto mehr drückt sie auf die umliegenden Theile und desto träger ist die Blutbewegung in ihr, zumal die Wirkung der Klappen schon bei einem geringen Grade der Erweiterung gänzlich aufgehoben wird. Hieraus erklärt sich das bei höheren Graden der Varicosität immer eintretende Oedem der peripherischen Theile, das Schwinden des Panniculus und die allmälige Verdünnung der bedeckenden Haut bis zur endlichen Verwachsung derselben mit der Wand des Varix. Erreicht die Compression der Haut durch den Varix den höchsten Grad, so erfolgt Aufbruch des Varix und damit eine zuweilen tödtliche Blutung. Dasselbe kann durch allmälige Einwirkung äusserer Schädlichkeiten oder durch plötzliche Verwundung des Varix herbeigeführt werden. In Folge des Aufbruchs oder der Verwundung von Krampfadern, häufiger noch durch Entzündung ihrer Umgebungen, entstehen die durch ihre Hartnäckigkeit berühmten varicösen Geschwüre (vgl. pag. 243 u. f.). Abgesehen von diesen üblen Zufällen veranlassen Varicositäten stets nicht ganz unbeträchtliche Beschwerden, indem sie die Function des Theils, an welchem sie sitzen, in mehr oder weniger hohem Grade beeinträchtigen, zuweilen auch seine Ernährung stören, häufig durch Druck auf die Nervenäste erhebliche Schmerzen (sogen. Krämpfe)

Medusae“ auf Obliteration der Pfortader zu schliessen. — Zuweilen fühlen sich solche Krampfaderbündel wie ein Haufen Blutegel an. Vidal hat in einem Falle von Obliteration der unteren Hohlader die Venen der Bauchdecken so bedeutend erweitert gefunden, dass man hätte glauben können, es handle sich um herausgetretene Darmschlingen.

²⁾ Vgl. Günther, Jenaer Annalen, Bd. II. pag. 373 u. f. — Neuerdings haben A. Verneuil (Gaz. hebdomadaire 1861, pag. 428 u. f.) und Sirius-Pirondi (ebenda, pag. 532 u. f.) auf das Vorkommen tiefgelegener Varicositäten im inter- und intramusculären Bindegewebe besonders aufmerksam gemacht und gezeigt, dass dieselben sich, namentlich beim Fehlen äusserer Varices, doch aus dem eigenthümlichen Gefühl von Schwäche und Angst, welches die Patienten in der Dicke der Wade empfinden, erkennen lassen.

egen, wie dies namentlich bei den in der Gegend der Malleolen vorkommenden, dicht gedrängte Netze darstellenden, oberflächlichen Varices der Fall ist.

Diagnose. Oberflächlich gelegene und besonders isolirte Varices sind leicht zu erkennen; es sei denn, dass die Haut über den varicösen Venen noch ganz unverändert (auch nicht bläulich gefärbt) und von den Venen durch eine Fettschicht getrennt ist. Alsdann findet man eine nicht scharf umschriebene, höckerige, nachgiebige, durch Druck verschwindende Geschwulst. Zuweilen hört oder fühlt man beim Drücken ein durch die Verschiebung der Flüssigkeit bedingtes Geräusch. Lässt man den Theil hoch legen, so verkleinert sich die Geschwulst; Herabhängen und Compression zwischen ihr und dem Herzen vergrössern sie; durch Anwendung von Kälte wird sie kleiner, durch Wärme grösser. Die von benachbarten Arterien mitgetheilten Pulsationen sind von denen eines Aneurysma nach den Bd. I. pag. 276 angegebenen Regeln zu unterscheiden. Angestrengte Expirationen, z. B. Husten, bedingen eine plötzliche stossweise Erweiterung in den varicösen Venen, besonders am Schenkel, was, bei der Unwirksamkeit der Klappen, aus dem Drucke, welchem die Vena cava inferior bei jedem kräftigen Expiriren ausgesetzt ist, sich leicht erklärt.

Prognose. Krampfadern an und für sich sind selten lebensgefährlich, aber immer lästig und im Allgemeinen schwer zu heilen. Zuweilen ist sogar der Versuch, sie nur vorübergehend zu beseitigen, wegen der dadurch bedingten venösen Hyperämie in inneren Organen, gefährlich. Nur höchst selten beobachtet man Naturheilung durch Obliteration der varicösen Venen, indem durch die Langsamkeit der Blutbewegung die Ausscheidung eines Fibringerinnsels möglich gemacht wird, welches sich an die Gefässwand anlegt und schliesslich mit ihr verwächst (J. Hunter).

Varicöse Geschwüre und Venenfisteln.

Varicöse Geschwüre nennt man sowohl die ursprünglich aus Varicositäten hervorgegangenen, als auch diejenigen, welche aus anderen Ursachen entsprungen, während ihres Bestehens mit Krampfadern complicirt worden sind. Sie kommen fast ausschliesslich am Unterschenkel vor, und in dem letztgedachten Sinne sind wiederum fast alle Unterschenkelgeschwüre (sogen. Fussgeschwüre) als varicöse zu bezeichnen. Geht das Geschwür von einem Varix aus, so ist es schwerer zu unterscheiden, ob die zur Verschwärung führende Entzündung ursprünglich in der Vene selbst, oder aber in der Umgegend derselben ihren Sitz hatte. Im ersteren Falle wird die Entzündung

gewöhnlich durch die Entstehung von Gerinnseln in der Höhle des Varix eingeleitet; aber statt einer Adhäsion entwickelt sich in der Umgegend des Gerinnsels, wie um einen fremden Körper, Verschwärung der Venenhäute, welche sich von diesen aus auf die umliegenden Theile fortsetzt und endlich auch die Haut durchbricht. Im zweiten Falle dagegen entsteht das varicöse Geschwür, indem eine durch andere, oft äussere Veranlassungen herbeigeführte Verschwärung sich von den benachbarten Theilen auf den Varix fortsetzt. Die Umgebungen varicöser Venen sind fast immer zur Verschwärung prädisponirt. Stockung der Blutbewegung, Compression der Lymphgefässe, daher übermässige Tränkung des Bindegewebes mit Serum, Verminderung des Nerveneinflusses, und somit jener Zustand, den man als „geschwächte Vitalität“ der Theile zu bezeichnen pflegt, finden sich an solchen Stellen.

Die Entstehungsweise der (viel seltneren) Venenfisteln ist folgende. Es bildet sich in einer varicösen Vene ein langes, nirgend an der Gefässwand fest haftendes Gerinnsel. An einer kleinen Stelle der Venenwand entsteht eine zur Verschwärung führende Entzündung (wie beim varicösen Geschwür), welche endlich auch die Haut durchbricht. Aus dieser Oeffnung lässt sich dann das Gerinnsel als ein wurmförmiger Strang (welcher auch mit dem Medinawurme verwechselt worden sein soll) hervorziehen. Aus dem, solcher Gestalt entleerten, an den Enden des Gerinnsels aber obliterirten Gefässe erfolgt alsbald die Absonderung dünnflüssigen Eiters, und es besteht somit ein fistulöses Geschwür, dessen Fistelgang durch die Vene selbst gebildet wird. Ein solcher Vorgang soll namentlich an varicösen Mastdarmvenen (Hämorrhoiden) beobachtet werden (Vidal).

Die Diagnose des varicösen Geschwürs ist immer leicht. Seine Lage im Verlauf einer grösseren Vene, die Anwesenheit von Krampfadern in seiner teigig angeschwollenen, bräunlich gefärbten Umgebung, die blaurothe Färbung seines Grundes und die serös-sanguinolente Beschaffenheit seiner Absonderung machen es leicht kenntlich. Ganz gewöhnlich besteht in grösserem Umkreise um dasselbe eine schleichende, von Zeit zu Zeit exacerbirende Entzündung, deren Product die oft sehr bedeutenden Callositäten sind, welche sich an seinen Rändern und auch im weiteren Umfange zeigen.

Die Prognose dieser varicösen Geschwüre hängt mit derjenigen der Krampfadern überhaupt zusammen. Lebensgefährlich werden sie höchst selten, nur dann nämlich, wenn übermässige Eiterverluste zugleich mit bedeutenden Blutungen durch sie herbeigeführt werden. Gewöhnlich sind ihre Beschwerden von der Ausbreitung der Krampf-

abhängig. Die Heilbarkeit des varicösen Geschwürs hängt wesentlich von der Heilbarkeit der Varices ab; auch die Behandlung beider daher zusammen, sofern die Beschaffenheit des Ulcus nicht noch e Maassregeln erforderlich macht. Vgl. Bd. I. pag. 342 u. f.

Behandlung der Varices.

Die **Behandlung** der Krampfadern soll entweder nur palliativ die werden und Unannehmlichkeiten lindern, welche durch die Varicen veranlasst werden, oder dieselben radical beseitigen. Im ersten Falle sind operative Eingriffe nothwendig, durch welche das Leben des Kranken gefährdet werden kann. Wäre die Wirksamkeit der sogenannten Radicaloperationen auch völlig sicher (was, wie oben werden, nicht der Fall ist) so würde doch vor Allem die Frage entstehen, ob der Arzt Operationen der Art überhaupt unternehmen soll, durch welche doch nur ein unangenehmes, meist aber das Leben, noch die Arbeitsfähigkeit gefährdendes Leiden beseitigt würde. Vgl. Bd. I. pag. 29 u. f.

Palliativmittel. Den ersten Platz nimmt die Compression ein. In den unteren Extremitäten dienen hierzu Einwickelungen mit Binden. Besten von Flanell oder Gummigewebe, mit Unterlegung von Watte an den Stellen, wo der Druck nicht gut ertragen wird), ferner die sogenannten Baynton'schen Einwickelungen mit Heftpflasterstreifen, Strümpfen von Leder oder aus gewöhnlichem Strumpfgewebe (Berling), elastische Strümpfe aus Gummigewebe, wie sie ursprünglich von Leperdreil angefertigt, jetzt aber überall auch in Deutschland leicht zu haben sind¹⁾. Wirkt der Druck gleichmässig, so macht er keine Schmerzen und erhöht die Brauchbarkeit der Kranken in der Weise, dass selbst bei dem Bestehen von Geschwüren gewohnten Arbeiten wieder ausgeführt werden können. Jedoch dem Kranken immer zu empfehlen, dass er die aufrechte Stellung besonders das Stillstehen vermeide. Die gänzliche Vermeidung der verticalen Körperstellung, das Stillliegen, womöglich mit hochgehobenen Füßen und tiefliegendem Rumpfe ist das zweite Mittel gegen die Varicositäten der Beine. Kann man die Compression und beim Bestehen von Geschwüren auch noch kalte Umschläge hinzufügen, so dadurch Alles erreicht, was Palliativmittel überhaupt vermögen. Die horizontale Lage ist aber nicht bloß unangenehm und langweilig,

Strümpfe aus gewöhnlichem Garn, vorn der Länge nach gespalten und mit Löchern am Zusehnen versehen, scheinen mir bequemer zu sein, als Gummistrümpfe, weil sie weniger aufragen und weniger erhitzen. Uebrigens sind sie viel billiger, die Patienten können sie selbst stricken.

den Erwerb beeinträchtigend, sondern bei älteren Leuten und bei Solchen, die an Congestionen zum Kopfe oder an chronischem Bronchial-Katarrh leiden, geradezu gefährlich.

Radicalmittel. — 1. *Directe Compression.* a) Verfahren von Delpsch. Die Vene wird durch einen Einschnitt von 3 Centim. Länge blossgelegt, isolirt, dann ein Stückchen Feuerschwamm unter sie geführt, gegen welches sie durch Heftpflasterstreifen comprimirt wird. b) Viel weniger verletzend ist das Verfahren von Velpeau, welcher eine Stecknadel an der einen Seite der Vene in die Haut einsticht, unter der Vene hindurch und auf der anderen Seite derselben wieder herausführt und die hervorragenden Nadelenden alsdann, wie bei der umschlungenen Naht, mit einem Faden in 8-Touren umwickelt. Lässt man die Nadel liegen, so wird Alles, was zwischen der Nadel und den Fadentouren liegt, brandig. Dies ist aber nicht die Absicht; vielmehr soll die Nadel nach 48 Stunden ausgezogen werden, in der Hoffnung dass inzwischen Verschluss der Vene erfolgt sei, wie bei der Unterbindung (vgl. 2.), womit dies Verfahren eigentlich zusammenfällt. c) Davat glaubt grössere Sicherheit zu erzielen, indem er eine zweite Nadel in der Richtung der Vene und durch beide Wandungen derselben hindurch ein- und aussticht. d) Verfahren von Sanson. Die Vene wird sammt der sie bedeckenden Haut emporgehoben und in eine Zange eingeklemmt, deren Spitzen in ovale Platten auslaufen, und deren Branchen mittelst einer Schraube geschlossen werden können. Alle 24 Stunden wechselt man die Stelle dieser Klemmen, damit die gefassten Weichtheile nicht brandig werden. Dies Verfahren ist eigentlich nur auf die Vena saphena magna und die Venen des Samenstranges (für welche es von Breschet modificirt worden ist, vgl. *Varicocele*, Bd. IV.) anwendbar. Am Unterschenkel dürfte es wegen der geringen Beweglichkeit der Venen und wegen der beträchtlichen Spannung der Haut unausführbar sein. Statt des besonderen Instrumentes von Sanson kann man sich beliebiger schliessbarer Pincetten bedienen; auch *Serres-fines* lassen sich dazu benutzen. e) Startin will durch starke Compression der varicösen Venen an verschiedenen Stellen ihres Verlaufs den Verschluss bewirken, indem er einen dicken Streifen von vulkanisirtem Kautschuck, an dessen einem Ende sich ein den Fuss umfassender Steigbügel befindet, in weillüfigen Spiraltouren zum Knie aufwärts führt und hier mittelst eines Strumpfbandes befestigt.

2. *Unterbindung.* a) Verfahren von Béclard. Die blossgelegte Vene wird wie eine Arterie unterbunden. Nachdem Todesfälle in Folge dieser Unterbindung vorgekommen waren, hat Béclard

später die Vene oberhalb der Unterbindungsstelle durchschnitten (um dadurch das weitere Fortschreiten der vermeintlichen Phlebitis zu verhüten) und den Verschluss des oberen Endes durch Compression bewirkt. — b) Verfahren von Ricord. Subcutane Unterbindung mittelst 2 Schlingen, von denen die eine unter, die andere über der Vene mit einer Heftnadel hindurchgeführt wird. Vgl. Varicocele, Band IV.

Die subcutane Unterbindung ist eins der wenigst gefährlichen Verfahren, namentlich wenn man sie mit feinem Draht ausführt und diesen nur so lange liegen lässt, bis die Härte der Vene oberhalb und unterhalb der Ligatur erkennen lässt, dass feste Gerinnsel gebildet sind. Das ältere Verfahren der subcutanen Unterbindung (von Gagnebé) ist für die Anwendung des Drahts bequemer als das Ricord'sche. Man führt mit einer Heftnadel einen feinen (Silber- oder Eisen-) Draht zwischen Vene und Haut hindurch, dreht dann die Nadel um und geht durch die Ausstichsöffnung wieder zurück, aber hinter der Vene, so dass letztere nun in einer Schlinge liegt, deren Enden aus der Einstichsöffnung heraushängen und über einem Pflasterröllchen durch Drehen oder Knoten geschlossen werden.

3. Haarseil. Verfahren von Fricke. Man führt mittelst einer Nähnadel quer durch die Vene einen Faden, den man längere Zeit in ihr zurücklässt. Sehr gefährlich.

4. Durchschneidung der Vene, entweder in der Richtung des Gefässes selbst und an mehreren nahe gelegenen Punkten zugleich oder in querer Richtung und zwar, nach Brodie, subcutan, mit einem, dem Dieffenbach'schen Tenotome ähnlichen Messer, wobei der Luftzutritt ausgeschlossen werden soll. Richerand machte grosse Einschnitte von 10—20 Centim. Länge, parallel der Achse des Gliedes und zwar mit einem Zuge durch die Haut, die erweiterten und gewundenen Venen hindurch bis zur Fascie; nachher Entleerung der Venen durch Druck und Salbenverband. — Das Ausschneiden oder Ausschälen varicöser Säcke wird ganz so, wie bei der Exstirpation der Geschwülste angegeben ist, ausgeführt.

5. Kauterisation, schon im Alterthum angewandt, in neuerer Zeit besonders durch Vidal, Bonnet, Bérard, Laugier empfohlen. Verfahren von Bérard¹⁾. Nachdem der Kranke am Tage vor der Operation viel umhergegangen ist, um eine recht starke Anschwellung der Varices an den unteren Extremitäten herbeizuführen und ihre Localität durch Höllensteinstriche sicher bezeichnet ist, wird nach

¹⁾ Annales de chirurgie, Paris 1842, Tom. V. pag. 222.

dem Verlauf der Vena saphena magna besonders am Oberschenkel in einer Breite und Dicke von 5—10 Mm. und in einer Länge von 3—5 Cm., Wiener Aetzpaste 15—20 Minuten lang applicirt. Der Schorf löst sich erst nach mehreren Monaten und zwar ohne Eiterung, indem unter demselben schon die Vernarbung erfolgt. Ist zu dieser Zeit die Obliteration der Vene nicht vollständig, so kann leicht eine bedeutende Blutung erfolgen, die durch horizontale Lage und Compression jedoch gestillt wird. Die Kranken sollen nämlich keineswegs während dieser langen Zeit still liegen, sondern (nach Bérard) bereits am fünften oder sechsten Tage wieder unbesorgt an die Arbeit gehen. — Marchal hat varicöse Unterschenkelgeschwüre geheilt, indem er sie mit einem Kranz von Wiener Aetzpaste umgab. Wie lange die Geschwüre heil blieben, ist nicht angegeben. Für die varicösen Geschwülste des Mastdarms hat sich die Kauterisation mit dem Glüh-eisen in hohem Grade bewährt.

6. Electropunctur. Die Nadeln werden entweder in den zu heilenden Varix selbst¹⁾ — wenn er isolirt ist —, oder aber in den Venenstamm, dessen Aeste varicos sind, eingestochen. Man muss immer an möglichst vielen Stellen Obliteration zu bewirken suchen.

7. Auch Einspritzungen von Liquor ferri sesquichlorati sind vielfach versucht worden, haben aber die Gefahren der Thrombose in besonders hohem Grade, wegen der bröcklichen Beschaffenheit der durch sie erzeugten Gerinnsel. Jedenfalls darf man nur verdünnte Lösungen anwenden (vgl. pag. 146 u. f.) und muss für vollständige und lang dauernde Compression des centralen Endes der Vene sorgen.

Wirkungsweise und Gefahren der Radicalmittel²⁾. Man will durch Obliteration des centralen Endes der varicösen Vene auch den Verschluss dieser selbst herbeiführen und das Blut somit nöthigen, seinen Weg zum Herzen auf anderen Bahnen, namentlich durch die tiefen Venen zu suchen. — Alle diese „Radicaloperationen“ bedingen die Gefahren der Venen-Thrombose.

Die Erscheinungen, welche man, in Folge des Verschlusses der Venenstämme, in den Aesten und besonders in den Varicositäten beobachtet, sind folgende. Dieselben schwellen zunächst mächtig an und der Patient empfindet ein Sieden und Knirschen in ihnen. Gegen den 4ten oder 5ten Tag werden sie unter Fortdauer der Anschwellung schmerzhaft; von da ab vermindert sich ihr Volumen und nach

¹⁾ Circumscripae Varices von der Grösse einer Wallnuss und darüber sind von mir auf diese Art wiederholt ohne üble Zufälle radical geheilt worden.

²⁾ Vgl. Minkiewicz, in Virchow's Archiv, 1862, Bd. 25, pag. 193 u. f.

und nach auch der Schmerz. Sie erscheinen weniger gespannt, mehr teigig, ziehen sich allmählig immer stärker zusammen, bis endlich ein scheinbar solider Strang übrig bleibt, in dessen Axe aber noch lange Zeit ein ihn durchziehendes Blutgerinnsel nachgewiesen werden kann. Wurde die Obliteration durch Unterbindung oder eine nach Art der mittelbaren Unterbindung wirkende energische Compression einzelner Stellen der Vene bewirkt, so entsteht meist eine brandige Zerstörung und im weiteren Umkreise mehr oder weniger heftige Entzündung. Nimmt diese ihren Ausgang in Eiterung und erstreckt sich auch auf die Vene, so ist der Tod der gewöhnliche Ausgang. Beschränkt sich die Eiterung auf die Umgebungen der Vene oder erfolgt überhaupt gar keine Eiterung, so ist der Verlauf günstig, ohne dass man jedoch vor Recidiven sicher wäre. Das Gerinnsel, welches die Vene ausfüllt, und sogar die Narbensubstanz, welche sich in ihr entwickelt hat, kann resorbirt werden, so dass der Stamm selbst, an welchem man operirt hat, wieder vollkommen durchgängig wird. Ein zweiter Grund für die Erfolglosigkeit der Operation sind die zahllosen Anastomosen, durch welche das Blut alsbald, statt den tief gelegenen Venen sich zuzuwenden, seinen Weg in der alten Richtung einschlägt.

Man kann die aufgeführten Methoden in Bezug auf die Art ihrer Einwirkung in zwei Gruppen sondern: die einen wirken primär und direct auf die Vene ein, z. B. die Durchschneidung, die Unterbindung; dies sind die allergefährlichsten; sie erregen in der Vene selbst und bevor dieselbe noch organisch verschlossen ist, Entzündung, welche den Zerfall des Thrombus begünstigt. Milder sind die mittelbar wirkenden, z. B. die Sanson'sche Compression, die Electropunctur. Hier wird der Verschluss der Vene voraussichtlich früher herbeigeführt, als Entzündung entsteht, oder letztere bleibt vielleicht ganz aus.

Fassen wir Alles zusammen, so müssen wir zugestehen, dass im Allgemeinen die zum Verschluss der Venen Behufs der Heilung von Krampfadern empfohlenen operativen Eingriffe unsicher und gefährlich sind. Die Gefahr ist desto geringer und die Sicherheit desto grösser, je kleiner die zu verschliessenden Venen sind.

Anhang zum vierten Abschnitt.

Infusion, hypodermatische Injection, Transfusion.

Unter **Infusion** versteht man das Einspritzen einer Flüssigkeit in die Venen. Es handelt sich wesentlich darum, in die Vene ohne bedeutende Insultation eine Spritze oder eine auf diese genau passende Canüle einzuführen und die Flüssigkeit ohne Beimischung von Luft einzuspritzen. Man wählt zu diesem Behuf eine deutlich sichtbare oder nach anatomischen Kenntnissen leicht aufzufindende Vene, legt diese bloss, öffnet sie mit der Lanzette oder Scheere in der Richtung ihrer Längsachse, während sie oberhalb und unterhalb dieser Stelle comprimirt wird, und führt durch diesen Schlitz die Spitze der Spritze in der Richtung gegen das Herz hin ein. Sollte das von der Peripherie her zuströmende Blut stören, so lässt man den peripherischen Theil der Vene comprimiren. Die zu injicirende Flüssigkeit muss ungefähr bis zur Temperatur des Blutes erwärmt, jedenfalls nicht wärmer sein, auch darf sie keine ungelösten Substanzen und sicher nichts enthalten, was Gerinnung des Blutes bewirken könnte. Die Spitze der Spritze muss, bevor man sie einsetzt, gerade emporgehalten und in dieser Stellung etwas Flüssigkeit ausgespritzt werden, um ganz sicher alle Luft aus ihr auszutreiben. Die Medicamente, welche man durch die Infusion in den Körper bringt, gelangen nicht bloß direct mit dem Blute in Berührung, sondern werden auch so schnell den Centralorganen des Nervensystems zugeführt, dass ihre Dosis sehr sorgfältig erwogen und im Allgemeinen auf $\frac{1}{2}$ der für die gewöhnliche Darreichung der Arzneimittel bestimmten herabgesetzt werden muss. Man hat die Infusion namentlich angewandt, wenn wegen eines im Schlunde fest sitzenden fremden Körpers, der sich weder ausziehen, noch in den Magen hinabstossen liess, oder wegen eines hohen Grades von Angina oder wegen anhaltenden Erbrechens u. dgl. m., Arzneimittel nicht verschluckt werden konnten. Man hat auch, wenn bei bedeutenden (acuten und chronischen) Krankheiten die gewöhnliche Behandlung sich erfolglos zeigte, die Infusion versucht, um eine recht energische Wirkung der Arzneimittel herbeizuführen¹⁾; der Erfolg hat den in dieser Beziehung gehegten Hoffnungen nicht entsprochen. Zur

¹⁾ Die ersten Versuche an Menschen (in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, kurz zuvor an Hunden) verfolgten wesentlich diese Richtung. Auch in neuerer Zeit fehlt es nicht an Versuchen der Art bei Faulfiebrern, Cholera, Epilepsie, Tetanus, Hundswuth u. s. w.

Wiederbelebung Scheintodter hat man sie mit Erfolg angewandt¹⁾. — Sehr gewöhnlich entsteht in Folge der Infusion auch indifferenten Stoffe eine heftige Aufregung, oft von Schüttelfrost oder von Erbrechen und Durchfall begleitet. An der Operationsstelle entwickelt sich nicht selten eine lebhaftere Entzündung, welche man durch antiphlogistische Nachbehandlung und möglichst reizlosen Verband (wie beim Aderlass) zu verhüten sucht.

Durch die Leichtigkeit und Gefahrlosigkeit, mit der man jetzt alle in geringer Menge wirksamen und in Wasser löslichen Arzneistoffe mittelst der **hypodermatischen Injectionen** einzuverleiben vermag, ist die Infusion völlig überflügelt worden, so dass sie heut zu Tage eigentlich nur noch in ihrer Beziehung zur Transfusion ein praktisches Interesse darbietet. Zur Ausführung der hypodermatischen (subcutanen) Einspritzungen bedient man sich der Pravaz'schen Spritze (pag. 146). Nachdem diese mit der an der Scala des Pistons genau abgemessenen Tropfenzahl einer Lösung von bekannter Concentration gefüllt ist, erhebt man irgendwo eine kleine Hautfalte, stösst die Spitze der Canüle bis in's Unterhautbindegewebe ein und lässt sofort die Injection folgen. Morphium-, Atropin-, Chinin- und ähnliche Salze werden auf diese Weise in zahllosen Fällen mit Vortheil applicirt. Die Dosis muss im Allgemeinen etwas kleiner sein, als die für den inneren Gebrauch bestimmte.

Da das Caliber der kleinen Spritzen nicht immer genau dasselbe ist, empfiehlt es sich für jede einzelne vor dem Gebrauch den Inhalt derselben und den Werth der auf dem Stiel des Stempels angebrachten Theilstriche empirisch festzustellen und danach die Quantität der einzuspritzenden Lösung zu berechnen. Man muss sich hüten, die Spritze in eine kleine Vene einzusetzen, sonst macht man eine unbeachtliche Infusion und bekommt viel heftigere, oft gefährliche Wirkungen. Vgl. Nussbaum, Intelligenzbl. bayerischer Aerzte, 1865. — Auch davor ist zu warnen, dass man die Canüle (den „Giftzahn“) nicht in die Haut, statt unter die Haut einsteckt. Die Injection gelingt alsdann nur unter grossen Schmerzen und in viel zu geringer Menge. Ich habe diesen Fehler selbst machen sehen. Vgl. auch Rezek in d. Wien. med. Presse. 1874.

Die gründlichste Belehrung über die hypodermatischen Injectionen giebt A. Eulenburg in seiner diesen Gegenstand behandelnden Preisschrift (2. Aufl. Berlin, 1866).

Transfusion nennt man das Ueberführen von Blut eines Menschen (oder Thiers) in das Gefässsystem eines anderen. Die Transfusion ist entweder eine einfache (completorische), wenn der Kranke blos Blut erhält, oder eine depletorische (substitutio sanguinis), wenn ihm, der zugeführten Menge entsprechend, von dem alten Blute ent-

¹⁾ Es wird natürlich wesentlich darauf ankommen, wovon der „Scheintod“ herrührt.

zogen wird. Man kann das Blut in eine Vene einspritzen — venöse Transfusion, oder in eine Arterie — arterielle Transfusion.

Die Transfusion erfordert, wenn sie Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang gewähren soll, eine höchst bedächtige und sorgfältige Ausführung, um Gerinnung des Blutes und Eintritt von Luft in die Venen zu vermeiden. Diesen Anforderungen entspricht das von Johannes Müller empfohlene Verfahren, wonach man sich des durch Schlagen oder Quirlen von Faserstoff befreiten (defibrinirten) Blutes bedient, welches keine Neigung zum Gerinnen besitzt, sehr leicht auf der normalen Temperatur erhalten oder doch ohne Nachtheil wieder auf dieselbe gebracht werden kann und sich dann ganz wie eine andere Flüssigkeit infundiren lässt. Dass der Mangel des Faserstoffs in dem defibrinirten Blute keinerlei Nachtheile bedingt, dass die belebende Wirkung vielmehr nur von den Blutkörperchen abhängt und dass es von grösster Bedeutung ist, nicht kohlenstoffreiches Blut, sondern wo möglich recht sauerstoffreiches einzuspritzen, daran kann nach den zahllosen Versuchen, welche in dieser Beziehung gemacht sind, nicht gezweifelt werden¹⁾. Die Anwendung des defibrinirten Blutes gewährt aber den doppelten Vortheil, dass man vor Gerinnungen (Thrombose) sicher ist und dass das einzuspritzende Blut durch das Schlagen oder Quirlen an Kohlensäure ärmer und an Sauerstoff reicher wird. Will man das frische und nicht geschlagene Blut transfundiren, so ist, wegen der Schnelligkeit, mit welcher dasselbe gerinnt, zu grosse Eile nothwendig und daher ein guter Erfolg, selbst wenn man sich, zur Vermeidung der Kohlensäure, des arteriellen Blutes bedienen wollte, minder gesichert. Deshalb zog man es früher auch allgemein vor, das Blut direct durch Röhren aus der Arterie eines Thieres in die Vene des mit Blut zu versehenen Menschen überzuführen²⁾, welches Verfahren, im Gegensatz zu dem vorher beschriebenen Einspritzen des Blutes, als „unmittelbare Transfusion“ bezeichnet wurde, während man jenes „mittelbare Transfusion, Transfusio infusoria“ nannte. Die Transfusion von Thierblut in das Gefässsystem eines Menschen ist aber überhaupt bedenklich. Allerdings kann man ein verblutetes Thier auch durch Transfusion des Blutes einer anderen, ihm ferner stehenden Säugethierart wieder

¹⁾ Vgl. Panum, Experimentelle Untersuchungen über die Transfusionen, Transplantation oder Substitution des Blutes in theoretischer und praktischer Beziehung, Virchow's Archiv, 1863, Bd. 27. pag. 240 u. f. und 433 u. f.

²⁾ Vgl. die Beschreibung und Abbildung in der von Sproegel besorgten Ausgabe von Joannis Sculteti Armentarii chirurgici Appendix, Amstelod. 1741, pag. 377 u. f. und Tab. XI.

leben; aber dieser Erfolg ist nur vorübergehend und die Zersetzung und Ausscheidung des fremdartigen Blutes kann den Tod zur Folge haben. Man wird also zur Transfusion bei Menschen, wo möglich, nur Menschenblut anwenden.

Trotz der bereits von Johannes Müller und Th. Bischoff so bestimmt hervorgehobenen Vorzüge der Transfusion des defibrinirten Blutes, ist auch in neuester Zeit bei der Ausführung dieser Operation am Menschen häufig noch das unveränderte (eisenstoffhaltige) Blut in Anwendung gezogen worden. E. Martin (Ueber die Transfusion bei Blutungen Neuentborener, Berlin, 1859) hat 57 hierher gehörige Fälle zusammengestellt, unter welchen 45 mit vollständiger Heilung endigten. Martin selbst hat die Transfusion in dieser Weise wiederholt mit Glück ausgeführt. — Rautenberg (Petersb. med. Zeitschrift. 1868. pag. 261) empfiehlt gleichfalls die Transfusion mit nicht-defibrinirtem Blute und meint, bei guter Assistenz lasse sich die Operation genügend schnell ausführen, um nicht durch Gerinnung des Blutes gefährdet zu werden; jedoch schlägt er zu grösserer Sicherheit vor, auf je 4 Unzen Blut eine Lösung von 2 Gran Natron carbon. in 2 Drachmen Wasser zuzusetzen, wodurch das Blut freilich wohl nicht verherrt und die Thrombose nicht sicher verhütet wird. — Auch direct zu den Capillaren (oder doch aus den kleinen Hautgefässen) mittelst eines grossen Schröpfkopfes (vgl. „Sarlandière“, Bd. I. pag. 201) entnommenes Blut ist zur Transfusion in Vorschlag gebracht. F. Gesellius (Capillarblut zur Transfusion. Petersburg 1868) hat dazu einen besonderen (am Hunde bewährten) Apparat construiert. In Betreff der Gefahren, welche aus der Ueberführung von Blut einer anderen Säugthierart entstehen können, hat namentlich Panum (l. c. p. 455) Versuche an Hunden mit Blut von Kälbern und Schafen angestellt. Bei naher Verwandtschaft der Arten (wie Pferd und Esel oder Kalb und Lamm) beobachtete Panum jedoch einen günstigen und dauernden Erfolg. Welche von den uns zugängigen Thierarten nun ein dem menschlichen hinreichend ähnliches Blut besitze, darüber ist noch nicht zu entscheiden. Immerhin ist es aber sehr bemerkenswerth, dass die in allerletzter Zeit, namentlich auf den Vorschlag von Gesellius, wiederholt ausgeführte Transfusion von arteriellem Lammblood eine grosse Anzahl günstiger Erfolge aufzuweisen hat. Man hat hierbei das Blut aus der Carotis des Lammes entweder durch eine einfache Nadelableitung in eine Vorderarm-Vene des Kranken übergeführt (Hasse) oder dasselbe durch eine in die Röhrenleitung eingeschaltete Pompvorrichtung in eine Arterie eingetrieben (Küster und Schliep). Als unmittelbare Wirkung der Thierblut-Transfusion hat man Beklemmung, Athemnoth, Rückenschmerzen, Uebelkeit, auch wohl Ohnmacht beobachtet; jedoch sind ähnliche Zufälle auch bei anderen Transfusionen vorgekommen, und es bleibt die Frage offen, ob dieselben nicht mehr der stärkeren Füllung des Gefässsystems als der specifischen Wirkung des Thierblutes zur Last zu legen sind. Jedenfalls ist die Frage nach dem Werth der Thierblut-Transfusion noch nicht spruchreif; ihre Zulässigkeit aber muss zugestanden werden.

Vgl. Franz Gesellius, die Transfusion des Blutes. St. Petersburg und Leipzig. 1873. — Oscar Hasse, die Lammblood-Transfusion beim Menschen (31 eigene Transfusionen), St. Petersburg u. Leipzig. 1874. — Fr. Gesellius, zur Thierblut-Transfusion beim Menschen, St. Petersburg u. Leipzig. 1874. — Paul Schliep, Fall von directer arterieller Thierblut-Transfusion, Berlin. klin. Wochenschr.

1874. No. 3. — O. Hasse, einige Bemerkungen etc. ebenda No. 8. — Friedrich Sander, zur Lammblood-Transfusion, ebenda No. 15 — J. Roussel, Bemerkungen, ebenda, No. 14.

Das zweckmässigste Verfahren für die (mittelbare) Transfusion dürfte folgendes sein. Man macht einem hinreichend kräftigen Menschen, welcher das Blut spenden will, je nach Bedarf, einen Aderlass von 180—200 Grammen. Das Blut wird von einem Gehülfen in einem reinen Glase aufgefangen und während des Ausfliessens, sowie auch weiterhin bis zur vollständigen Abscheidung alles Faserstoffes mit einem Quirl oder mit einem nach unten zu einem Brettchen verbreiterten Stäbchen gequirlt (geschlagen). Dazu genügt das Drehen des Quirls oder Stäbchens mit einer Hand, während die andere das Glas hält. Nach Entfernung des an dem Quirl haftenden Faserstoffes wird das Blut durch ein reines Leintuch durchgeseiht (filtrirt) und in einem bis nahezu auf 35° C. erwärmten Gefäss aufgefangen. Inzwischen beschäftigt sich der Arzt selbst mit der Einführung der Canüle in die zu benutzende Ader (Arterie oder Vene) des Patienten.

Für die venöse Transfusion ist in der Regel die *Vena mediana basilica* am Meisten geeignet. Dieselbe wird wie eine zu unterbindende Arterie blossgelegt und mit 3 Ligaturfäden umgeben. Nachdem die Vene mit der Lanzette, einem spitzen Messer oder (bequemer) mit einer spitzen Scheere in schräger oder longitudinaler Richtung geöffnet ist, wird eine entsprechend starke Canüle, auf welche die anzuwendende Spritze genau passt, in der Richtung des venösen Blutstroms in die Vene eingeschoben und mit dem mittleren der drei Fäden durch Umschnürung befestigt. Der obere Faden dient dazu, den Rückfluss des eingespritzten Blutes zu verhüten, sofern die Klappen der Vene nicht genau schliessen; der untere Faden wird angespannt oder auch sofort als Ligatur benutzt, um das Ausfliessen von Blut aus dem peripherischen Theil der Vene zu verhindern. Besitzt die Canüle einen Hahn, so ist der obere Faden entbehrlich. Bedient man sich einer hinreichend grossen Spritze und braucht dieselbe daher nicht wiederholt aufzusetzen, so sind Vorrichtungen zur Verhütung des Blutrückflusses überhaupt nicht nöthig. Um die Gerinnung des Blutes in der Canüle zu verhüten, füllt man dieselbe vor der Einfügung mit einer Lösung von phosphorsaurem oder doppeltkohlensaurem Natron. Nur gut calibrierte Glasspritzen mit Ansatzstücken von Metall oder Hartkautschuck sollten zur Transfusion benutzt werden. Die Spritze wird mit Blut gefüllt, ihre Spitze aufwärts gerichtet, und etwas Blut ausgetrieben, um sicher zu sein, dass keine Luft darin ist. In Glasspritzen kann man jedes Luftbläschen leicht

kennen. Um absolute Sicherheit vor dem Eintreiben von Luft zu erzielen, haben Eulenburg und Landois¹⁾ zwischen Spritze und Anüle einen „Luftfänger“ eingeschaltet, d. h. ein geräumiges Glasrohr, in dessen eines Ende oben die Spritze eingesetzt wird, während an anderen Ende sich unmittelbar am Boden (bei horizontaler Haltung der Spritze) das Abflussrohr befindet, auf welches die Canüle passt. Alle Luft bleibt also, wenn man sie auch absichtlich eintreibt, in oberen Theile des „Luftfängers“.

Die von Uterhart (Berl. klin. Wochenschr. 1868. No. 10) angegebene excentrische Einfügung des Abflussrohrs der Spritze leistet bei richtiger Haltung dasselbe.

Um die Operation zu erleichtern, hat man auch Troicarts angegeben, welche man direct in die Vene oder, indem man dieselbe mit einer Hautfalte erhebt, quer durch die Vene stossen soll (subcutane Transfusion). Im ersteren Falle muss die Öffnung des Troicarts an der Spitze, im letzteren ungefähr in der Mitte sich befinden (Eulenburg und Landois). Alle diese Abweichungen von dem oben angegebenen Verfahren erleichtern in der That die Operation nicht, vermindern aber ihre Sicherheit. — Bei Neugeborenen kann man die Canüle in die durchschnittenen Nabelnerven im Nabelstrang einsetzen.

Die arterielle Transfusion ist zwar von A. v. Graefe, dem berühmten Augenarzt, bei Cholerakranken versucht, aber erst von C. Hueter in die Praxis eingeführt worden²⁾. Derselbe empfiehlt folgendes Verfahren. Die Arteria radialis (am Handgelenk) oder die Art. tibialis postica (hinter dem inneren Malleolus) wird auf eine Strecke von 2 bis 3 Centimeter vollkommen frei gelegt (herauspräparirt). Vier Ligaturfäden, von denen einer Reservefaden ist, werden hinter (unter) der Arterie hindurchgeführt. Der Faden, welcher am weitesten central, gegen das Herz hin, liegt, wird in Form einer gewöhnlichen Ligatur zugeschnürt und geknotet, so dass direct vom Herzen her kein Blut mehr in die freigelegte Strecke der Arterie eintreten kann. Die für die bisher beschriebenen Acte nothwendige Zeit entspricht fast immer genau der Zeit, welche für das Defibriniren, Färbiren und für das Einfüllen des Blutes in die Spritze nothwendig war. Ist die Spritze gefüllt, so lässt man den am meisten peripher, gegen die Hand oder den Fuss, gelegenen Faden etwas anziehen, damit für einen Augenblick auch der Collateralkreislauf von der Peripherie kein Blut in das freigelegte Arterienstück führen kann. In diesem Augenblicke öffnet man in der Nähe des centralen (oberen) Wundwinkels das Arterienrohr durch einen quergerichteten Scheerenchnitt, welcher ungefähr die Hälfte des Arterienrohrs trennt. Ein

¹⁾ Experimentelle und praktische Beiträge zur Transfusion des Blutes. Berl. klin. Wochenschrift 1866. No. 9—15.

²⁾ C. Hueter, die arterielle Transfusion, Archiv f. klin. Chirurg. Bd. XII. 1870.

solcher Querschnitt klafft an der Arterie viel besser, als an der Vene; und bei der Dicke des Arterienrohrs findet man für die Einführung der Canüle keine Schwierigkeit. Die Spitze der Canüle wird gegen die Peripherie, gegen Hand oder Fuss, gerichtet und mittelst des dritten Fadens wird die Canüle, wie bei einer Gefässinjection an der Leiche, fest in das Arterienrohr eingebunden. Ungefähr 1 Centim. der Canüle kann vor dieser Ligatur in dem Arterienrohr liegen. Nun muss der Zug an dem zweiten Faden aufhören und die Bewegung des Spritzenstempels kann beginnen. Muss man, wie das bei kleinen Spritzen in der Regel nothwendig ist, zwei oder drei Spritzen voll transfundiren, so wird, sobald der Inhalt der ersten Spritze verschwunden ist, der zweite (periphere) Faden wieder angezogen, um das Blut in der Peripherie von der Canüle abzuschliessen. Ist die Spritze wieder gefüllt, so wird sie auf die Canüle aufgesetzt, der Zug am zweiten (peripheren) Faden lässt nach und die Injection beginnt wieder. Sobald die Injection der letzten Spritze vollendet ist, wird der zweite Faden im peripheren (unteren) Wundwinkel als Ligatur zusammengeschnürt und geknotet. Nun trennt man in der Nähe der ersten centralen und der zweiten peripheren Ligatur das isolirte Arterienrohr mit je einem Scheerenschnitt ab, und entfernt dasselbe sammt der Spritze, auf deren Canüle es festgebunden ist. Endlich wird ein einfacher Wundverband angelegt.

Die Einspritzung des Blutes muss jedenfalls nicht stürmisch erfolgen, vielmehr langsam oder, wenn man abzusetzen Veranlassung hat, in kleinen Portionen, aber in einer zur Erreichung des Zweckes, meist also zur Belebung des Patienten, genügenden Gesamtquantität, welche sich, wenn man auch gewiss nicht zu viel einspritzen will, doch, namentlich in Fällen von Blutleere, keineswegs auf „wenige Unzen“ beschränken darf¹⁾.

Grade in Betreff der Sicherheit vor allzu stürmischem Eintreiben des Blutes, mithin vor gefährlicher Ueberfüllung der rechten Herzhälfte, verdient die arterielle Transfusion ebenso sehr den Vor-

¹⁾ Von der Sicherheit und der belebenden Wirkung der in dieser Weise ausgeführten Transfusion kann sich leicht Jeder überzeugen, der sich nur einmal die Mühe nehmen will, den Versuch an einem Thiere anzustellen. Man lässt einem Hunde aus der Art. femoralis so lange Blut ab, bis unparteiische Zuschauer zugestehen, dass er rettungslos verloren sei; durch eine inzwischen in die Vena femoralis eingeführte Canüle wird nun von dem aufgefangenen und defibrinirten Blute (oder auch von dem inzwischen einem anderen Hunde abgelassenen) eine entsprechende Quantität eingespritzt; das Thier lebt wieder auf und kann, wenn es sorgfältig gepflegt wird, vollständig genesen.

ung vor der venösen, als durch den Ausschluss der Gefahren des Lufteintritts“ und der „Phlebitis“. Das Blut muss durch den Druck des Spritzenstempels dem durch die collateralen Aeste (namentlich also Ulnaris oder Tibialis antica) zufließenden Ströme entgegen eingetrieben werden, zum grossen Theil muss es sogar die Capillaren passiren, wie dies aus der beträchtlichen Schwellung des Papillarkörpers der Haut (an Hand oder Fuss) ersichtlich wird. Daher bedarf man aber auch für die arterielle Transfusion grösserer Kraft und besonders haltbarer Spritzen¹⁾, namentlich wenn die Operation aus anderen Gründen als wegen Anämie (bei welcher die Spannung in den Gefässen vermindert ist) zur Ausführung kommt.

Wird die Transfusion richtig und zur rechten Zeit — bevor die Herzthätigkeit erloschen ist, bevor also der Puls und die Herztöne verschwunden sind — ausgeführt, so ist sie ein grosses, in vielen Fällen unersetzliches Heilmittel, um nach bedeutenden Blutverlusten oder bei gewissen Blutvergiftungen das Leben zu erhalten oder selbst zurückzurufen.

In älterer Zeit wurde die Transfusion hauptsächlich zur „Verbesserung der Säfte-mischung“ empfohlen. Wenn man auch nicht geradezu geglaubt hat, dass man einen lethigen, heissblütigen Menschen durch Einspritzen von Schafsblut sanft und milde machen könne, so gaben doch ähnliche humoral-pathologische Ansichten die Indication an. — In neuester Zeit ist man insofern auf diese Indication zurückgegangen, als man namentlich bei Schwindsüchtigen die Lammbhut-Transfusion gemacht hat. Die vorliegenden Erfolge lassen sich aber sehr wohl aus der Wirkung der Transfusion gegen die relative Anämie erklären, ohne Annahme einer specifischen Wirkung des Lammbluts.

Nach den jetzt vorliegenden Erfahrungen müssen wir die Transfusion für indicirt halten:

1) Bei einer durch Blutungen bedingten lebensgefährlichen Blutleere, mag sie plötzlich oder durch oft wiederholte Blutverluste allmählig entstanden sein.

2) Bei acuten Vergiftungen des Blutes, namentlich wenn die giftige Substanz, wie das Kohlenoxyd, innig an den Blutkörperchen haftet und daher durch künstliche Respiration weder ausgetrieben, noch zersetzt wird.

In solchen Fällen kann in der That, wie Kühne zuerst für das Kohlenoxyd durch Versuche an Thieren erwiesen hat (Centralblatt für die medicinischen Wissen-

¹⁾ Die von Mosler (Transfusion bei Anämie und Leukämie, Berlin, 1868) angegebene, von Sauerwald construirte Spritze, an welcher der Stempel durch Umdrehungen einer Kurbel mittelst einer Schraube vorwärts getrieben werden kann, eignet sich hierzu ganz besonders.

schaften, 1864, pag. 134), nur ein Ersatz des verdorbenen Blutes durch neues respirationsfähiges Blut die Vergifteten retten. Chloroform verhält sich in den höheren Graden seiner Einwirkung dem Kohlenoxyd analog (vgl. Bd. I. pag. 46). Dass in solchen Fällen nur sauerstoffreiches geschlagenes Blut angewandt werden darf, und dass man, da eine Vermehrung der Blutmasse durchaus nicht erwünscht wäre, ebensoviel Blut ablassen muss, als man einspritzt, ist leicht einzusehen. — Auch nach Opiumvergiftung gelang es Eulenburg und Landois (Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, 1865, No. 46), bei Thieren durch eine solche „Substitution des Blutes“ die Vergiftungszeit und die Intensität der Symptome bei nicht letaler Dosis erheblich zu vermindern, bei anderweitig tödtlicher Dosis aber das Leben und die Integrität aller Functionen zu erhalten. Neuere Versuche derselben Autoren lehren das Gleiche auch für Strychnin, sowie für Vergiftung durch Kohlensäure, Aether- und Chloroformdämpfe, und machen es auch für andere, noch ungeprüfte Substanzen wahrscheinlich.

Wo es sich darum handelt, bei asphyktischen Zuständen schnell respirationsfähige Blutkörperchen in die Adern zu schaffen, dürfte die unmittelbare Transfusion von Lammblut bedenklich sein, da das Blut der Wiederkäuer (auch das arterielle) reicher an Kohlensäure ist, als das des Menschen.

3) Auch bei Erkrankungen, welche wesentlich in materiellen Veränderungen des Blutes, die nicht geradezu als Vergiftungen gedeutet werden können, begründet sind, darf der Versuch, beim Fehlschlagen anderer Mittel durch die Transfusion Hülfe zu schaffen, wohl gewagt werden, obgleich die vorliegenden Erfahrungen noch nicht ausreichend sind, um eine bestimmte Indication zu formuliren.

In erster Reihe gehören hierher die Fälle von Erschöpfung durch grosse Eiterungen u. dgl. m., welche sich der chronischen Anämie anschliessen. So hat z. B. Neudörffer (österreich. Zeitschr. für prakt. Heilkunde 1860. No. 8 u. f.) in 5 Fällen den Versuch gemacht, bei Anämie durch lange andauernde Eiterungen mittelst der Transfusion Hülfe zu schaffen. In allen 5 Fällen folgte sofort Besserung des Allgemeinbefindens, selbst bei denen, die nahe am Tode zu sein schienen; aber alle starben dennoch nach 3 bis 5 Wochen. — Nussbaum gelang es, einen erschöpften Patienten durch die Transfusion so weit zu bringen, dass man ihn amputiren konnte. — Eulenburg und Landois (l. c.) vermochten einen fastenden Hund durch wiederholte Transfusion 24 Tage am Leben zu erhalten. — Ferner hat man bei Leucaemie (zuerst Mosler, Berl. klin. Wochenschrft. 1866. No. 19, mit relativ günstigem Erfolge) die „Substitution des Blutes“ durch depletorische Transfusion versucht. In dem Falle von Weber und Blasius erfolgte der Tod durch suppurative Phlebitis. — Bei Septicaemie ist die Transfusion von Hueter (l. c.) mit Vortheil angewandt worden; bei Pyaemie, Uraemie, Cholaemie wird sie empfohlen. Bei der asiatischen Cholera machten Dieffenbach, Guttman, A. v. Graefe, Schiltz, v. Reyher u. A. die Transfusion, — meist erfolglos, zum Theil mit vorübergehend günstigem, in einzelnen wenigen Fällen mit dauerndem Erfolge. Vgl. G. Kalischer, über die Transfusion und ihre Anwendung auf die Cholera, Inaug.-Diss. Berlin, 1873.

Die Geschichte der Transfusion ist in vieler Beziehung interessant. Geschrieben hat über Transfusion zuerst Libarius in Halle 1615, aber er scheint sie nie ausgeführt zu haben. Die ersten Versuche an Thieren sind im 17. Jahrhundert in England auf Anregung des Theo-

en Potter gemacht worden, namentlich von Richard Lower und Robert Boyle. Am Menschen wurde die Transfusion (und zwar aus der Carotis eines Schafs in eine Armvene des Kranken) erst 1667 von Jean Baptiste Denis in Paris und von Richard Lower in London ausgeführt, ein Jahr später auch von Purmann in Frankfurt a. d. O. und von Riva, Manfred u. A. in Rom. Trotz mangelhafter Erfolge wurde sie aber in demselben Jahre in Paris und Rom obrigkeitlich verboten. Erst mit dem Ende des 18. Jahrhunderts hat eine wissenschaftliche Begründung der Transfusion begonnen. Menschenblut hat zuerst Blundell in London zur Wiederherstellung Neuentbundener, welche sich verblutet hatten, eingespritzt.

Vgl., ausser den bereits citirten Schriften, Dieffenbach, Die Transfusion, Berlin, 1828 (Fortsetzung von Scheel's gleichnamigem Werke), Tb. Bischoff in Müller's Archiv 1835 u. 1837, Blasius im Monatsbl. f. med. Statistik, Beil. zur Deutschen Klinik, v. 11. 1863, besonders aber Landois, Die Transfusion des Blutes in ihrer geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Bedeutung. Wiener med. Wochenschrft. 1867. s. 30 u. f.

Fünfter Abschnitt.

Von den Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphdrüsen.

Die Lymphgefäße haben in pathologischer, wie in physiologischer Beziehung mit den Venen Manches gemein. Die von ihnen aufgenommenen Substanzen und die sie befallenden Erkrankungen werden in der Richtung gegen das Herz hin fortgeleitet. Aber abgesehen von der viel geringeren Grösse dieser Gefäße und der bei Weitem langsameren Bewegung der Flüssigkeit in ihnen, besteht der grosse Unterschied, dass der Verlauf der Lymphgefäße an vielen Stellen durch die Lymphdrüsen unterbrochen wird. Von Bedeutung ist auch die Art ihrer Anastomosen, welche immer nur durch Verbindung zweier oder mehrerer, oft lange Strecken nebeneinander und parallel miteinander verlaufender Stämmchen, oder aber durch Spaltung eines Stammes und Einmündung seiner beiden Endäste in die Nachbarstämme zu Stande kommen. Die Wandungen der Lymphgefäße sind mit zarten Blutgefässen versehen. In die Lymphdrüsen treten ansehnliche, sich pathologisch oft sehr stark entwickelnde Arterien und Venen.

Erstes Capitel.

Wunden der Lymphgefäße.

Fast bei jeder Verwundung werden auch Lymphgefäße verletzt ohne dass für gewöhnlich irgend ein Symptom ihre Verletzung anzeigt. Die ausfliessende Lymphe vermischt sich mit dem Blute und wird durch dessen Farbe verdeckt; das Lumen der Gefässchen ist in der Regel viel zu klein, um erkannt zu werden. An manchen Körperstellen jedoch finden sich nahe unter der Haut so bedeutende Lymph

gefäße, dass ein Abfluss von Lymphe beobachtet und zuweilen auch das Lumen des Lymphgefäßes entdeckt werden kann, so namentlich auf dem Fussrücken¹⁾, ferner nahe vor dem Malleolus internus, wo dicht an der Vena saphena magna ein Lymphgefäß zu liegen pflegt, welches oft die Dicke einer Rabenfeder besitzt²⁾, endlich an der inneren Seite des Oberschenkels³⁾. Die Diagnose einer Lymphgefäßwunde beruht ausschliesslich auf dem Ausfluss der Lymphe, d. h. also einer wasserhellen, nach einiger Zeit von selbst gerinnenden und Erweiss enthaltenden Flüssigkeit. Abgesehen von krankhaften Ansammlungen, könnte der Ausfluss von Synovia zu Verwechslungen führen. Diese zeigt aber nicht die spontane Gerinnung und ihr Ausfluss wird durch Bewegung des verletzten Gelenkes befördert, durch Compression an der peripherischen Seite der Wunde nicht unterbrochen; aus verletzten Lymphgefässen dagegen strömt jene wasserhelle, spontan gerinnende Flüssigkeit desto reichlicher hervor, wenn man oberhalb der Wunde eine Compression ausübt, während ihr Ausfluss durch Compression an der peripherischen Seite gänzlich unterdrückt wird, die meisten Lymphgefäßwunden werden durch Gerinnung der Lymphe in der nächsten Umgebung und Contraction der umgebenden Gewebe schnell verschlossen. Die Fälle, in welchen der Ausfluss von Lymphe längere Zeit fortbesteht (Lymphfisteln), sind so selten, dass sie gewöhnlich einer ausführlichen Beschreibung gewürdigt werden⁴⁾. Eine Prädisposition dazu bedingen pathologische Erweiterungen der Lymphgefäße (Lymphektasien). Von besonderer Bedeutung scheint aber die Anheftung des Lymphgefäßes an eine Fascie zu sein (wie in den oben erwähnten Localitäten), indem durch diese das Zusammenfallen des Gefässchens gehindert wird.

Angeschnittene, vielleicht sogar ganz durchgeschnittene Lymphgefäße können auch in der Weise wieder zusammenheilen, dass ihr Lumen erhalten bleibt. Man kann sich durch genaue Untersuchung der (vorher mit Quecksilber zu injicirenden) Lymphgefäße eines Armes, an welchem wiederholt Aderlässe gemacht worden sind, hiervon mit

¹⁾ Fälle von Johannes Müller und von R. Marchand; s. Müller's Handb. d. Physiologie (3. Aufl.), Coblenz 1837, Bd. I. pag. 256.

²⁾ Nach Vidal hat man an dieser Stelle besonders beim Misslingen des Aderlasses oder nach dessen Beendigung einen Ausfluss von Lymphe beobachtet.

³⁾ Nach Assalini wurde daselbst ein Ausfluss von 5 Pfd. (!) Lymphe beobachtet, wie auch Nélaton nachzählt. Vidal beobachtete nach der Operation eines Schenkelbruchs einen Ausfluss von Lymphe (?), der 8 Tage anhielt und dann aufhörte, als der Kranke wieder aufstand. Vgl. Hernien.

⁴⁾ Vgl. I. Müller, l. c., und Leudesdorf, Fall von Lymphgefäßfistel, Archiv f. Clin. Chirurg. III. pag. 417.

Bestimmtheit überzeugen. An der Stelle der Aderlasswunde finden sich die oberflächlichsten Lymphgefäße ebenso wenig obliterirt, als die Vene. Im Gegentheil bemerkt man an ihnen nicht selten der Hautnarbe entsprechende Erweiterungen bis zu 1 Ctm. Länge und 3 Millm. Durchmesser.

Sind Stücke aus der Continuität eines Lymphgefässes verloren gegangen, so erfolgt kein Ersatz und keine Wiederherstellung des Gefässcanals. Ein solcher Substanzverlust betrifft, der anatomischen Anordnung gemäss, immer mehrere, meist viele Lymphgefäße zugleich, so dass eine merkliche Stauung der Lymphe dadurch bedingt wird, deren Folgen wir bei der „Elephantiasis“ erläutern werden.

Einer besonderen **Behandlung** bedürfen nur die „Lymphfisteln“. Methodische Compression an der peripherischen Seite der Wunde und auf die Wunde selbst angewandt, — wenn diese nicht ausreicht, Kauterisation der Oeffnung mit Alaun (Monro), mit Höllenstein oder Ferrum candens, auch Umschläge von Alkohol werden gegen dies hartnäckige Uebel empfohlen.

Zweites Capitel.

Entzündung und Thrombosis der Lymphgefäße.

Die Lymphgefäße der verschiedenen Körperteile, innere wie äussere können von Entzündung — Lymphangioitis, Lymphangitis, Angioleucitis — befallen werden. Am Häufigsten erkranken die dicht unter der Haut liegenden Lymphgefäße, häufiger die an den Extremitäten gelegenen, in Folge von Verwundung, besonders wenn dabei heterogene oder giftige Substanzen in dieselben hineingerathen sind. Unter den inneren Lymphgefässen erkranken besonders diejenigen des Beckens bei Wöchnerinnen häufig.

Der **Verlauf** der Lymphgefäss-Entzündung ist entweder acut oder chronisch. Wir beschreiben zunächst die acute Form.

A. Acute Lymphangitis.

Die **anatomischen Veränderungen**, welche man bei Lymphangitis nachgewiesen hat, zeigen eine grosse Analogie mit den bei Phlebitis gefundenen. Hier wie dort ist in der Regel die Gerinnung des Gefäss-Inhaltes, die Thrombose, das Primäre. Man findet die Lymphgefäße mit Gerinnseln gefüllt, welche namentlich in der Gegend der Klappen fest haften, seltener mit der Gefässwand verwachsen und dadurch dauernde Obliteration bedingen, zuweilen auch zerfallen und dann

die eiterähnliche Masse darstellen, welche von früheren Autoren als wirklicher Eiter angesehen worden ist, den die entzündeten Wandungen der Lymphgefässe secretirt haben sollten. Fast ausnahmslos erstreckt sich die Gerinnung nur bis zur nächsten Lymphdrüse, erreicht daher nur äusserst selten die grossen Stämme, von denen aus eine Embolie der Lymphgerinnsel in die Venen erfolgen könnte. — Bei längerem Bestehen der Lymphangitis findet man die Wandungen der entzündeten Lymphgefässe verdickt; die innere Haut erscheint milchweiss getrübt und aufgelockert, die äussere mit dem umgebenden Bindegewebe verklebt, welches mürbe und serös infiltrirt ist. Namentlich an solchen Stellen, wo Klappen sitzen oder wo mehrere Gefässchen zusammenschliessen, finden sich in der Umgebung oft die sogen. perilymphangitischen oder perilymphatischen Abscesse. An der peripherischen Seite einer obliterirten Stelle bemerkt man zuweilen eine beträchtliche Erweiterung des Lymphgefässes, in welcher denn auch in der oben beschriebenen Weise eine eiterähnliche Flüssigkeit entstehen kann. An solchen Stellen kann das Gefäss auch perforirt und sein Inhalt mit dem umspülenden Eiter in dem umgebenden Bindegewebe gemischt sein. Die Haut über den erkrankten Gefässen erscheint im Anfange geröthet, weiterhin mit denselben verwachsen und endlich an solchen Stellen, wo sich Abscesse gebildet hatten, durch Verschwärung zerstört. Eigentliche Gangrän findet sich sehr selten in den unterhalb der Aponeurosen gelegenen Theilen. Serös-eiterige Ergüsse in der Bauchhöhle, in der Pleura und in den Gelenken hat man bei hohen Graden und grosser Ausbreitung der Krankheit, namentlich bei Wöchnerinnen, allerdings angetroffen; wahrscheinlich gehören dieselben aber der concomitirenden septischen Infection an. Auch in Lymphgefässen, welche nicht unmittelbar an den primären Entzündungsherd grenzten, ist in einzelnen Fällen eine eiterähnliche Masse gefunden worden, ohne dass sie anderweitige Spuren von Entzündung oder überhaupt andere Veränderungen, als eine Erweiterung ihres Calibers an der entsprechenden Stelle zeigten. Solche Fälle hat man früher als „Metastasen“ angesehen, während sie sich leicht erklären lassen, wenn man annimmt, dass selbstständige Erkrankungen der betreffenden Lymphgefässe bestanden haben, die nur noch nicht über das Stadium der Thrombose hinaus waren.

Die **Erscheinungen** der acuten Lymphgefäss-Entzündung zerfallen in die örtlichen und in die allgemeinen. Erstere sind verschieden, je nachdem die oberflächliche oder die tiefe Schicht der Lymphgefässe ergriffen ist.

1) Bei Entzündung der oberflächlichen Schicht besteht

fast immer eine Verletzung, Entzündung oder Eiterung, von der jene ausgeht. Man sieht röthliche oder rothe, selten blauröthe Streifen und Flecke, welche von jenem Ausgangspunkte, zuweilen aber auch in einiger Entfernung von ihm beginnend, dem Laufe der Lymphgefässe folgen. Als bald entwickelt sich in der Umgegend des eigentlichen Ausgangspunktes eine Röthung der Haut, gewöhnlich in Gestalt einzelner Flecke, zwischen denen die zuerst erwähnten rothen Streifen verlaufen oder von denen sie ausgehen. Später fliessen diese Flecke oft zusammen und gewinnen dann grosse Aehnlichkeit mit Erysipel. Soweit die Röthung sich erstreckt, besteht auch ein heftiger brennender Schmerz, welcher durch Berührung gesteigert wird. Eine geringe Schwellung entwickelt sich nach dem Verlaufe der rothen Streifen und breitet sich später oft in unregelmässiger Weise aus, ohne jedoch eine bedeutende Spannung zu erreichen oder entschieden teigig zu werden. Die Drüsen, zu welchen die erkrankten Lymphgefässe verlaufen, findet man angeschwollen und schmerzhaft. Dies wichtige Symptom fehlt nur in solchen Fällen, wo vor dem Entstehen der Entzündung die Continuität des Lymphgefässes zwischen dem Sitze der Entzündung und den nächsten Lymphdrüsen unterbrochen war (durch Obliteration oder Trennung).

2) Entzündung der tiefen Schicht der Lymphgefässe entsteht entweder ohne nachweisbare Veranlassung oder nach tiefen Verletzungen und Eiterungen, besonders in Folge bedeutender Quetschungen und complicirter Knochenbrüche. Ist die Entzündung eine „spontane“, so geht das Fieber den örtlichen Erscheinungen oft voraus. In den übrigen Fällen ist der Schmerz das erste Symptom. Er ist tief, stechend und fix. Demnächst entsteht Anschwellung, und zwar bilden sich einzelne harte Knoten oder Stränge, die (wie eine aufmerksame Untersuchung lehrt) unter der Aponeurose liegen. Allmählig schwillt das ganze Glied an; jedoch bleibt die Stelle, wo die entzündeten Lymphgefässe liegen, vorwiegend hart. Erst später stellt sich Röthung der Haut ein und zwar in Gestalt von unregelmässigen Flecken, die man durch die Haut gleichsam hindurchscheinen sieht. In den Zwischenräumen ist die Haut glänzend, bald ganz weiss, bald blass rosa gefärbt, von einem Ansehen, als wäre sie mit einer molkenartigen Flüssigkeit getränkt. Die Anschwellung der tief liegenden Lymphdrüsen lässt sich oft durch das Gefühl nicht wahrnehmen, obgleich sie gewiss nie fehlt. Aus der an allen Körpertheilen bestehenden Verbindung zwischen den beiden Schichten der Lymphgefässe ist es erklärlich, dass die Entzündung zuweilen von der einen auf die andere übergeht. Alsdann combiniren sich ihre localen Symptome.

Die allgemeinen Symptome der acuten Lymphgefäss-Entzündung unterscheiden sich in keiner Weise von dem bei anderen Entzündungen auftretenden Fieber und zeigen keine wesentlichen Verschiedenheiten, mag die eine oder die andere Schicht befallen sein. Horripilationen, auch ein wirklicher Frostanfall im Beginne der Krankheit, dann Hitze und Trockenheit der Haut, der Puls bald voll und kräftig, bald klein und ungleichmässig, lebhafter Durst, Gefühl von Angst in den Präcordien, Uebelkeit, Erbrechen, selbst Delirien, andauernde Schlaflosigkeit und Aufregung, werden im Verlaufe der Lymphangitis acuta beobachtet; aber die Mehrzahl dieser Symptome ist wohl auf Rechnung der mit der Lymphangitis zugleich entstandenen Infection (mit Leichengift, Jauche u. s. f.) zu setzen, welche man früher irrthümlich als eine Folge der Lymphgefäss-Entzündung aufgefasst hat. Jedenfalls steht fest, dass die Entzündung ohne Störungen des Allgemeinbefindens verlaufen kann, wenn auch in der Mehrzahl der Fälle ein Initialfrost und eine Steigerung der Temperatur und der Pulsfrequenz in den ersten Tagen nicht fehlt.

Von den **Ausgängen** der acuten Lymphgefäss-Entzündung ist die Zertheilung seltener, als die Eiterung. Es dauert oft bis über den 10ten Tag, ja zuweilen bis über den 20sten, bevor man über den Ausgang, welchen die Krankheit nehmen wird, Gewissheit erhält. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Zertheilung zwischen dem 3ten und 10ten, Eiterung zwischen dem 5ten und 20sten Tage sich einstellt. Auch kann die acute Form in die chronische übergehen. — Zum Tode kann die acute Lymphgefäss-Entzündung führen: 1) durch allzu grosse Ausdehnung, namentlich, wenn die grossen Lymphstämme im Bauch befallen werden; 2) durch Pyämie oder Septichämie, welche zwar nicht aus der Lymphangitis als solcher (wie man früher glaubte), sondern aus der von derselben Substanz, welche die Entzündung bedingte, eingeleiteten Infection zu erklären sind, in deren Verlauf aber die durch die Drüsenanschwellung begünstigte Venenthrombose bedeutsam sein kann; 3) durch Erschöpfung, wenn zahlreiche Abscesse aufbrechen und reichlich eitern.

Den Ausgang in Zertheilung kann man erwarten, wenn nur wenige Lymphgefässe ergriffen sind und die tiefe Schicht nicht befallen ist. Eiterung ist zu erwarten, sobald unter zahlreichen und zusammenfliessenden rothen Flecken reihenförmig nach dem Lauf der Lymphgefässe angeordnete harte Knoten auftreten. Alsdann kann man darauf gefasst sein, dass bald einzelne Abscesse in diesen Knoten nach dem Verlauf der rothen Streifen sich bilden, — *perilymphangitische Abscesse*. Fluctuation ist, wegen der Dicke der Abscess-

wand, Anfangs selten mit Bestimmtheit und bei tiefer Lymphangitis fast gar nicht zu fühlen. Man entdeckt sie am Besten, wenn man auf einen Punkt, welcher vorher der Sitz eines harten Knotens war, den Finger auflegt und nun an einer anderen, scheinbar gesunden Stelle, an der man bloß eine unbedeutende teigige Anschwellung bemerkt, einen Druck ausübt. Oft sind diese Abscesse, dem Laufe der Lymphgefäße entsprechend, in mehrfachen Reihen nebeneinander gelagert; man nennt sie deshalb auch „Reihen-Abscesse“. Meist besteht gar keine Communication zwischen den einzelnen. Ganz unabhängig von der Abscessbildung in der Umgebung der entzündeten Lymphgefäße kommt es häufig im Verlauf der Lymphangitis zu Abscedirungen in der Umgebung der entsprechenden Lymphdrüsen und in diesen selbst. Vgl. Lymphadenitis. — Beim Uebergang in die chronische Form sieht man die harten Knoten nebst der ihnen entsprechenden Hautröthung, als sog. Erythema nodosum, forbestehen; auch eine mehr oder weniger feste, gleichmässige Schwellung in der Peripherie dauert oft fort, worauf wir unter *B* (pag. 269) zurückkommen.

Diagnose. Verwechslung mit Phlebitis wäre möglich. Bei dieser sind aber, sofern die oberflächlichen Venen entzündet sind, viel breitere harte Stränge zu fühlen. Auch die in der Haut auftretenden rothen Streifen sind viel breiter und weniger zahlreich. Zeigen sich rothe Flecke, so haben sie ihren Sitz auf grösseren, weniger harten und weniger tief gelegenen Knoten und fließen seltener in der Art eines Erysipelas zusammen. Die periphlebische Eiterung pflegt schneller einzutreten, aber weniger reichlich zu sein. Kommt es zur Entwicklung allgemeiner Störungen (Pyämie), so ist ihr Verlauf entschieden schneller; gemeinhin erfolgt bald der Tod. Alle diese diagnostischen Momente verlieren an Werth, wenn beide Krankheiten zugleich bestehen. Jedoch lässt sich, wenn man die Reihenfolge der Symptome genau beachtet, gewöhnlich noch entscheiden, ob die Lymphgefäße oder die Venen zuerst entzündet waren. Ersteres ist häufiger. — Verwechslung mit Erysipelas oder Erythem ist nur im Anfange möglich. Werthvoll für die Unterscheidung ist von vornherein, dass die geschwollenen Lymphdrüsen bei Lymphangitis für Druck sehr empfindlich sind, bei Erysipelas nicht.

Aetiologie. Die Ursachen der Lymphgefäss-Entzündung sind sehr mannigfaltig. Bald breitet sich die Entzündung von den benachbarten Geweben auf die Lymphgefäße aus; bald werden sie in Folge eines mechanischen oder organischen Verschlusses an einer Stelle ihres Verlaufs durch ihren eigenen Inhalt ausgedehnt und gereizt;

bald endlich werden direct reizende Substanzen in sie bei Verwundungen eingeführt, oder sie nehmen solche aus Eiter- und Jaucheherden auf. Letzteres ist besonders gefährlich, wenn der Eiterherd mit der äusseren Luft in Verbindung steht, mithin eine septische Substanz enthält. So sieht man oft lange Zeit die mit einem geschlossenen Abscess in Verbindung stehenden Lymphgefässe vollkommen gesund bleiben; sobald aber die Eiterhöhle geöffnet ist, beginnt in ihnen die Entzündung. Bei Weitem nicht immer hat die Grösse einer Wunde oder Eiterhöhle Einfluss auf die Schnelligkeit oder Heftigkeit, mit welcher die Lymphgefäss-Entzündung ausbricht. Kleine Stichwunden und wenig umfängliche Geschwüre sind gerade die häufigsten Ursachen, und gar nicht selten mag das Uebersehen einer solchen Verletzung zur Annahme einer „spontanen Lymphangitis“ verleitet haben. Von grosser Bedeutung ist die Qualität der in die Lymphgefässe eingeführten heterogenen Substanz, wovon die übeln Wirkungen des Leichengiftes (Bd. I. pag. 692) ein Beispiel geben. — Als prädisponirende Momente werden jugendliches Alter, zarte Haut und Erschöpfung der Körperkräfte durch grosse Anstrengungen, Ausschweifungen oder Kummer angesehen.

Die **Prognose** der acuten Lymphgefäss-Entzündung ist im Allgemeinen nicht ungünstig; sie wird jedoch sehr bedenklich, wenn die Entzündung in der Tiefe eines Gliedes oder gar in einer Leibeshöhle ihren Sitz hat, wenn ferner der Körper ausserdem schon leidend ist, oder wenn sie durch septische Substanzen, complicirte Knochenbrüche, Gelenkwunden oder dgl. m. veranlasst war, wo dann freilich die Gefahr viel mehr durch das zu Grunde liegende Uebel, als durch die complicirende Lymphangitis bedingt wird.

Die **Behandlung** hat nicht blos die Entzündung, sondern auch deren Ursachen und weitere Folgen zu bekämpfen. Vor Allem ist hier der Prophylaxis zu gedenken, welche sich bis auf die Verhütung der Eiterung und des Eindringens giftiger Substanzen in Wunden erstrecken muss. Besteht eine eiternde Wunde, so wird diese durch antiseptische Bäder oder Umschläge in einen möglichst reizlosen Zustand versetzt. Geht die Entzündung von einem offenen Eiterherde aus, so sucht man die Eiterung in demselben zu verbessern. Zur Bekämpfung der Entzündung selbst wird eine entsprechend grosse Anzahl von Blutegeln und lauwarms Bähnen und Baden des kranken Theils empfohlen. Demnächst soll man, nach dem Rathe von Velpeau u. A. versuchen, ob eine mässige Compression mittelst einer Rollbinde ertragen wird, und letztere durch häufiges Begiessen oder andauerndes Ueberrieseln feucht erhalten. Wird die Compression nicht ertragen,

so soll man Wasserumschläge machen oder, nach dem Rathe zahlreicher Autoren, täglich zwei bis drei Mal reichliche Einreibungen von grauer Salbe auf die schmerzhaften Stellen und deren Umgebung machen. Auch durch innere Mittel (kühlende Salze u. dgl. m.) kann man die Zertheilung der Entzündung zu befördern gesucht. — Nach eigener Erfahrung muss ich mehr als alle anderen Behandlungsweise die Anwendung des Eises empfehlen. Gelingt es nicht Zertheilung herbeizuführen, so sind an allen Stellen, wo nur irgend, wenn auch noch so dunkel, Fluctuation zu fühlen ist, Einschnitte zu machen und die geöffneten Abscesse nach den allgemeinen Regeln (Bd. pag. 279 u. f.) zu behandeln. — Lässt beim Ausbleiben der Zertheilung die Eiterung ungewöhnlich lange auf sich warten, so soll man nach Velpeau, auf die vorzugsweise von der Entzündung ergriffene und noch am Meisten angeschwollenen Stellen grosse Blasenpflaster legen und, wenn es der Zustand des Darmkanals erlaubt, alle 3 bis 4 Tage ein Abführmittel reichen, um entweder vollständige Zertheilung oder definitiven Uebergang in Eiterung zu erzielen. Auch Aufpinseln von Jodtinctur wird zu diesem Behuf empfohlen. Die schliesslich zurückbleibenden Härten werden durch Einreibung von Jodsalbe, methodische Compression und Bäder bekämpft.

B. Chronische Entzündung der Lymphgefässe. Lymphangitis chronica. Elephantiasis Arabum. Pachydermia.

Die chronische Form der Lymphgefäss-Entzündung kommt unzweifelhaft viel häufiger vor, als sie beobachtet wird. Der innige Zusammenhang zwischen Bindegewebe und Lymphgefässen bedingt eine Betheiligung der letzteren bei allen Erkrankungen desselben. Da aber die Veränderungen im Bindegewebe stets vorwiegend erscheinen werden solche Fälle in der Regel nur als chronische Bindegewebs-Entzündung oder -Induration bezeichnet. In anderen Fällen entsteht die chronische Lymphangitis, nachdem mehrere Anfälle der acuten vorausgegangen sind. Alsdann erfolgt regelmässig Obliteration der Lymphgefässe und eine eigenthümliche Wucherung des Bindegewebes in und unter der Haut, welche, wegen der dadurch bedingten Volumensvermehrung den Namen Elephantiasis erhalten hat.

Ob in solchen Fällen die Lymphgefäss-Entzündung (-Thrombose) das Primäre oder nur eine secundäre und begleitende Erkrankung sei, darüber sind die Ansichten noch getheilt¹⁾. Jedoch wird v

¹⁾ Vgl. Virchow, die krankhaften Geschwülste, I. pag. 295 u. f. und O. Weber in Pitha u. Billroth, Handb. d. Chir. Bd. II. Abth. 2. pag. 23 u. f.

allen Seiten die grosse Bedeutung der Betheiligung des Lymphsystems hervorgehoben, namentlich auch von denjenigen Autoren, welche Gelegenheit hatten, diese Erkrankung in ihren grossartigsten Formen, wie sie auf Grund miasmatischer oder klimatischer Einflüsse — endemisch — auftritt, genauer und häufiger zu beobachten, als dies bei uns zu Lande möglich ist¹⁾. Nach den Angaben der gedachten Autoren²⁾ beginnt die Krankheit mit einer erysipelatösen Röthung, in der sich alsbald schmerzhaft Streifen nach dem Verlaufe der Lymphgefässe auszeichnen. Störungen des Allgemeinbefindens, insbesondere ein oft sehr heftiger Frostanfall, gehen den örtlichen Erscheinungen entweder voraus oder folgen sehr bald nach deren Auftreten. Daneben bestehen nicht selten gastrische Beschwerden. Die Lymphdrüsen an dem befallenen Theile schwellen beträchtlich an, werden schmerzhaft und vereitern zuweilen. Gewöhnlich kehrt nach kurzer Zeit, selbst wenn gar keine Behandlung Statt findet, die Gesundheit zurück bis auf eine hartnäckige, wenngleich gewöhnlich unbedeutende Anschwellung des ursprünglich ergriffenen Theiles. Bald aber stellt sich ein neuer Anfall ein mit Hinterlassung einer etwas grösseren und etwas härteren Anschwellung. Immer wieder und wiederkehrend treten die febrilen Erscheinungen zwar jedes Mal

¹⁾ Elephantiasis kommt häufiger in der heissen Zone als in gemässigten Klimaten vor, vorzugsweise in Aegypten und demnächst in den übrigen Küstenländern des mittelländischen Meeres, besonders auch an den spanischen Küsten, in der asiatischen Türkei, ferner an der malabarischen und japanischen Küste. Ausserdem aber findet sich die Elephantiasis auch in Norwegen und Esthland sehr häufig. Ueberall, wo sie endemisch vorkommt, findet sich neben ihr auch Lepra (Elephantiasis Graecorum). Ueber letztere, als eine bei uns zu Lande unbekannt Krankheit, wird hier nicht weiter gehandelt; ein sehr genauer Nachweis der auf sie bezüglichen neueren Literatur, sowie ihrer interessanten anatomischen und Ausbreitungs-Verhältnisse ist von Kierulf gegeben worden. (Ueber die norwegische Spedalskhed. Virchow's Archiv, Bd. V. pag. 13.) — Elephantiasis Arabum kommt sporadisch auch in Gegenden vor, wo durchaus keine Lepra besteht. Ich habe sie an der pommerschen Küste gar nicht selten und auch in Berlin wiederholt gesehen. In der Mehrzahl der bei uns vorkommenden Fälle besteht Elephantiasis als Complication grosser, tiefer Unterschenkelgeschwüre. Relativ oft bleibt sie auf die unterhalb des Geschwürs gelegenen Theile beschränkt, wo dann die Erklärung zulässig ist, dass das entsprechende Lymphgefäss-Bündel in der Ausdehnung des Geschwürs zerstört und dadurch zu einer Lymphostase, wie durch Verschluss der Lymphwege, Veranlassung gegeben sei. Vgl. pag. 266. — Nach Hillary und Henseler wäre die Elephantiasis zuerst von den Aethiopiern nach der Insel Barbados und von da weiter nach Europa verbreitet worden; daher der französische Name *Jambe de Barbados*.

²⁾ Hillary, Hendy, Rollo, Larrey, Pruner. Vgl. L. Hoefler, De Elephantiasis Arabum. Diss. inaug. Gryphisae 1851.

milder auf, die Anschwellung dagegen nimmt bei jedem neuen Anfalle unverhältnissmässig stärker zu, so dass der Umfang des kranken Theiles in unglaublichem Maasse vermehrt wird. Nächst der Zunahme des Volumens und der bedeutenderen Consistenz des Theiles zeigen sich auf der Oberfläche noch mehrere eigenthümliche Veränderungen. Die Epidermis wird an manchen Stellen verdickt, rissig, rauh, wie bei Ichthyosis, indem die Epidermiszellen, statt flach auf der Cutis aufzuliegen, sich mit ihrem einen Rande erheben und den anderen der Cutis zuwenden. An manchen Stellen fehlt die Epidermis gänzlich; die Cutis wird dann nur von locker aufliegenden Krusten bedeckt, die durch das Eintrocknen des aus ihr hervorquellenden Plasma entstehen. Eine solche gerinnende oder doch an der Luft zu Krusten vertrocknende Flüssigkeit dringt auch aus den von selbst entstehenden Rissen der Epidermis und nach jeder zufälligen oder absichtlichen Verletzung der Haut hervor. Zuweilen erfolgt an Stellen, welche noch von normaler Epidermis überzogen sind, ein beträchtlicher Erguss dieser Flüssigkeit (Lymphorrhagie), wodurch helle Blasen gebildet werden, nach deren Entleerung durch Resorption oder Eröffnung eigenthümliche weisse Narbenflecke zurückbleiben. Die Farbe der Haut wird dunkler, schmutzig, und die Venen schimmern an Stellen, wo keine beträchtliche Verdickung der Epidermis erfolgt ist, als blaue Stränge deutlich hindurch. Die Haare fallen gewöhnlich ganz aus; nur wenn die Geschwulst höckrig ist, findet man sie noch in den Vertiefungen zwischen den einzelnen Höckern, zuweilen sogar üppig gewachsen. Nicht selten entstehen an den verdickten Theilen Geschwüre (oder dieselben bestanden auch vorher). Diese liefern ein dünnflüssiges, milchiges oder auch wasserhelles Secret.

Der gewöhnlichste **Sitz** dieser Krankheit ist der Unterschenkel. Die enorme Verdickung desselben, in einzelnen Fällen bis zu einem Umfange von 1 Meter, hat zu den Namen Elephantenfuss, Elephantopus und Elephantiasis Veranlassung gegeben¹⁾. Demnächst wird das Scrotum am Häufigsten (besonders unter endemischen Verhältnissen, z. B. in Aegypten) befallen. Dasselbe kann bis zu dem Gewichte von 120 Pfund vergrössert werden. Ferner ist die Krankheit an den Brüsten, an der Vorhaut des Penis, auch an anderen Körpertheilen, jedoch sehr viel seltener, beobachtet worden²⁾.

¹⁾ Die Fusssohle bleibt stets ganz frei, wenn der Fussrücken auch noch so sehr aufschwillt. Dasselbe bemerkt man in den viel selteneren Fällen von Elephantiasis des Armes an der Hohlhand.

²⁾ Die seltenen Fälle von Elephantiasis des Gesichts werden auch als Leontiasis, *Facies leonina*, bezeichnet, worunter aber von Anderen wahre Lepra verstanden wird.

Der **Verlauf** der Krankheit ist immer ein langwieriger. Sie kann längere Zeit bestehen, ohne andere als örtliche Beschwerden zu veranlassen. Ist die Geschwulst noch nicht übermässig gross und handelt es sich um einen sporadischen Fall, so ist sogar noch Heilung möglich. Die Krankheit kann aber auch zum Tode führen, entweder durch die Grösse des Säfteverlustes oder durch Brand. Letzterer entsteht, wenn die Spannung einen so hohen Grad erreicht hat, dass dadurch Obliteration der Blutgefässe bedingt wird.

Anatomische Veränderungen. Bei genauer Untersuchung der Leichen oder der amputirten Theile hat man in der ganzen Ausdehnung der Erkrankung die Lymphgefässe verschlossen, weiter aufwärts aber zuweilen erweitert und mit trüber oder milchiger Flüssigkeit erfüllt gefunden. Die Venen dagegen sind stets erweitert und ihre Wandungen so bedeutend verdickt, dass die Vena saphena z. B. auf dem Querschnitt der Arteria femoralis täuschend ähnlich sehen kann. Die Lymphdrüsen sind angeschwollen, von verdichtetem Bindegewebe umgeben, oft von junger Zellenwucherung so vollkommen erfüllt, dass bei mikroskopischer Untersuchung von ihren normalen Gewebs-elementen Nichts mehr zu erkennen ist. In einzelnen Fällen können durch dieselben benachbarte Venen in so hohem Grade comprimirt werden, dass Obliteration erfolgt. Anderweitige Veränderungen, welche von den Schriftstellern noch aufgeführt werden, sind nicht von denjenigen unterschieden, welche wir durch andauerndes Bestehen einer Geschwulst überhaupt bedingt sehen, so z. B. fettige Entartung der Muskeln, Usur der Knochen u. dgl. m. Die Geschwulst selbst aber, das augenfälligste Symptom der Elephantiasis, wird durch Neubildung von Bindegewebe, welches eine verschiedene Festigkeit darbietet und bald mehr, bald weniger stark von Lymphe getränkt ist, bedingt. Die unter der Haut liegende Fettschicht ist in einzelnen Fällen hypertrophisch, in anderen Fällen dagegen atrophisch befunden worden. Die Haut ist immer in sehr hohem Grade verdickt (daher „Pachydermie“), durch Hyperplasie des in ihr enthaltenen Bindegewebes. Gewöhnlich ist diese Verdickung eine ungleichmässige, höckerige.

Theorie der Krankheit. Die anatomischen Veränderungen sind in Uebereinstimmung mit den angegebenen Symptomen leicht zu deuten. Die Krankheit mag als Lymphgefäss-Entzündung oder als Wucherung des Bindegewebes in der Haut und dem Panniculus (unter erysipelatösen Erscheinungen) beginnen, jedenfalls betheiligen sich die Lymphgefässe frühzeitig an dem Process: bald mögen Anfangs blos die Lymphgefässe, bald auch die Lymphdrüsen zugleich, oder auch

letztere primär ergriffen sein; consecutiv erkranken letztere immer. Die wiederholt auftretenden Anfälle führen zur Obliteration der Lymphdrüsen und Lymphgefässe des befallenen Theils; die Lymphe stagnirt, transsudirt in das Bindegewebe und kann von den Venen, trotz der durch den grösseren Andrang bedingten Hypertrophie und Erweiterung derselben nicht fortgeschafft werden. Aus den von ihr, als einer dem Plasma sanguinis wesentlich analogen Flüssigkeit, getränkten Geweben entsteht jene diffuse Wucherung von Zellen und Fasern, wie wir sie in Sarcomen und Fibromen circumscrip't auftreten sehen. Daher die sogenannte Hypertrophie der tiefen und oberflächlichen Bindegewebsschichten, sowie der Cutis. Die Epidermis erfährt in Folge der veränderten Ernährung der Haut, als ihrer Matrix, nothwendig auch Veränderungen, die jedoch, je nach der Localität und je nach der Art und Weise, in welcher jene abgeändert ist, verschieden sein können; anders auf der Oberfläche hügel förmig hervorgewölbter Knollen, als in der Tiefe, gleichsam im Thale zwischen ihnen; anders an solchen Stellen, wo eine sehr feuchte Bindegewebsschicht unter der Haut liegt und noch ein Andrang der stagnirenden Lymphe gegen die Haut hin Statt findet, als an solchen Stellen, wo die Haut an die unterliegenden Theile durch eine mächtige Schicht festen fibrösen Gewebes angeheftet ist und daher statt einer reichlicheren, vielleicht sogar eine verminderte Säftezufuhr erhält.

Die **Behandlung** sucht zunächst die Aufsaugung der ergossenen Flüssigkeit zu befördern und das Auftreten einer neuen Entzündung zu verhüten. Abgesehen von einer zweckmässigen Lagerung, scheint besonders von der Anwendung einer methodischen Compression unter Beihilfe des Jod und continuirlicher Irrigationen Hülfe zu erwarten sein. Zwar wird von theoretischer Seite die Hoffnung, auf diesem Wege einen Erfolg zu erzielen, dadurch sehr geschwächt, dass gerade diejenigen Gefässe, von deren Thätigkeit wir bei der Resorption das Meiste erwarten, bei der Elephantiasis sämmtlich oder doch zum grössten Theil verschlossen sind; aber die Erfahrung spricht entschieden zu Gunsten dieser Behandlungsweise.

In dem von Hoefler l. c. beschriebenen Fall betrug bei der Aufnahme des Kranken der Umfang:

	am kranken	am gesunden Beine
im oberen Theile der Wade	40	35 Centim.
in der Gegend der Knöchel	44	30 -
vom Tuber calcanei über die Mitte des Fussgelenks	51	38 -
an der vorderen Grenze des Metatarsus	39	27 -

Bei der Entlassung des Kranken nach dreimonatlicher Behandlung ergab sich für die angegebenen Stellen am kranken Beine genau dasselbe Maass, wie

unden: der obere Theil der Wade hatte sogar an dem kranken Beine nur einen Umfang von 33 Centim., während das gesunde Bein dasselbst seinen früheren Umfang waltete hatte, was sich aus der schon früher erfolgten Atrophie der Wadenmuskeln ergibt. Der Kranke, welcher vorher nicht aufzutreten vermochte, konnte nach seiner Heilung wieder an die Arbeit gehen.

Von den operativen Eingriffen, welche früher zur Beseitigung der Elephantiasis vorgeschlagen wurden, führen Scarificationen gewöhnlich zum Brande; bei der Amputation sind Blutungen aus den erweiterten und klaffenden Venen und späterhin zerfallende Thromben in den letzteren zu fürchten. Jedoch giebt es eine grosse Anzahl von Beobachtungen günstiger Heilung nach Amputationen elephantiasisch entarteter Theile, und jedenfalls ist die Besorgniss vor tödtlichen ungegründet¹⁾. Auch die der Amputation gleich zu setzende Abtragung des Scrotum, der Clitoris, des Präputium ist in vielen Fällen mit Glück ausgeführt worden²⁾.

Für die Elephantiasis der Extremitäten hat Carnochan³⁾ zuerst die Unterbindung der Hauptpulsader des Gliedes als die beste Behandlungsweise vorgeschlagen und mit Glück ausgeführt. Dies Verfahren ist namentlich durch Th. Bryant⁴⁾ auch in Eurapa sehr in Aufnahme gekommen und hat in der That mehrere schöne Erfolge aufzuweisen⁵⁾. Jedoch ist in zahlreichen Fällen auch jeder Erfolg der doch ein dauernder Erfolg ausgeblieben und in einigen der Tod nach der Operation veranlasst worden. Da sich überdies durch andauernde Compression der Hauptpulsader ebenso viel erreichen lässt⁶⁾, dürfte kein Grund vorliegen die Unterbindung be-

¹⁾ Vgl. namentlich die Fälle von Adelman in der Diss. von Ivenssen, Beitr. z. Kenntn. d. Elephantiasis Arabum, Dorpat. 1864.

²⁾ So beschreibt Thebaud (New York med. Journ. 1867. May) z. B. die zwar schwierige, aber glückliche operative Entfernung eines durch Elephantiasis Arabum bis zum Gewicht von 63½ Pfd. geschwellten Scrotum bei einem 22jährigen Mann und führt an, dass in Calcutta von 1859 bis 1866, 113 Fälle von Elephantiasis operirt wurden, von denen nur 21, also 18½ pCt. letal endeten. Die grössten Geschwülste scheinen gerade die beste Prognose für die Operation zu geben, was Thebaud daraus erklärt, dass die Elephantiasis anfangs entzündlicher Natur sei und somit operative Eingriffe weniger gut ertrage.

³⁾ New York Journal of Medicine, 1852, September.

⁴⁾ Medico-chirurgical Transactions, Vol. 49. 1866.

⁵⁾ Vgl. Georg Fischer, die Behandlung der Elephantiasis Arabum mittelst Ligatur oder Compression der Hauptarterien. Virchow's Archiv Bd. 46.

⁶⁾ Bereits vor Jahrzehnten scheint ein französischer Arzt Dufour durch Compression der Art. femor. glückliche Resultate bei Elephantiasis erzielt zu haben. Vergl. G. Fischer, l. c. — Ich selbst habe ohne Kenntniss von diesen Versuchen zu haben, die Compression der Hauptpulsader bei Elephantiasis angewandt und von Bardeleben, Chirurgie. 7. Aufl. II.

sonders zu empfehlen. Andererseits wird sie nicht zu verwerfen sein und namentlich vor der Amputation noch versucht werden müssen, wenn andere Mittel, namentlich die Compression, im Stiche lassen. Bei der Erklärung der Wirksamkeit der Ligatur sowohl als der Compression der Hauptarterie des Gliedes geht man allgemein von dem zuerst von Stromeyer ausgesprochenen Gedanken aus, dass dadurch das Gleichgewicht in der Zuleitung und dem erschwerten Abfluss des Blutes wiederhergestellt werde¹⁾. G. Fischer erklärt es geradezu für eine wesentliche Aufgabe der Therapie der Elephantiasis, „den erhöhten inneren Blutdruck herabzusetzen.“ Dies würde durch Verschluss des Haupt-Arterienstammes jedoch nur für kurze Zeit erreicht werden, da durch die collateralen Aeste die ursprünglichen hämodynamischen Verhältnisse bald wieder hergestellt werden. Dagegen kann wohl grade die stärkere Füllung und Ausweitung der zumeist oberflächlicher verlaufenden Collateraläste und die dadurch bedingte grössere Energie des Blutlaufs in den oberflächlichen Venen zur Erklärung der guten, wenn auch nicht immer dauerhaften Wirkungen des Verschlusses der Hauptarterie des erkrankten Gliedes herangezogen werden.

Drittes Capitel.

Entzündung der Lymphdrüsen. Lymphadenitis.

Die Veranlassung einer acuten Entzündung der Lymphdrüsen ist zuweilen eine äussere Gewalt, Quetschung u. dgl. Auch übermässige Anstrengungen einer Extremität können acute Entzündung der an ihrer Wurzel gelegenen Lymphdrüsen (namentlich in der Schenkelbeuge) zur Folge haben, — eine Thatsache, für welche sich noch keine genügende Erklärung geben lässt. Bei Weitem häufiger aber entsteht Lymphadenitis acuta auf andere Weise. Entzündung kann nämlich 1) von den benachbarten Geweben auf die Lymphdrüsen übergehen, oder 2) von den Lymphgefässen aus sich auf die Lymphdrüsen verbreiten. Im ersten Falle entwickelt sich die Entzündung von der Peripherie gegen das Centrum, im zweiten ergreift sie zuerst das Innere der Drüsen und entwickelt sich von da

derselben in 3 Fällen einen fast ebenso schnellen Erfolg gesehen, als er von der Ligatur gerühmt wird.

¹⁾ Stromeyer empfahl 1844 in seinem „Handbuch“, Bd. I. pag. 371, die Unterbindung der Art. cruralis, um varicöse Beingeschwüre zur Heilung zu bringen.

der Richtung nach Aussen weiter. 3) Sehr häufig wird sie durch die Anwesenheit deletärer Stoffe in den Lymphdrüsen veranlasst, welche in sie durch die Lymphgefässe eingeführt worden sind, ohne dass letztere erkrankten. In dieser ätiologischen Beziehung stehen Schanker des Penis zu Bubonen der Inguinalgegend, Blutschwäre der durch Leichengift verunreinigte Wunden an der Hand zu entzündeten Achseldrüsen. Weshalb diese in den Lymphdrüsen Entzündung erregenden Ursachen die Lymphgefässe, durch welche sie nach fortgeführt werden, unversehrt lassen, ist nicht vollkommen aufgeklärt. Jedoch ist es wahrscheinlich, dass die Verschlingungen der Lymphgefässe in den Drüsen und die dadurch bedingte langsamere Bewegung und innigere Berührung der in ihnen enthaltenen Flüssigkeiten mit den Wandungen der wesentliche Grund sei. Oft findet sich die Quelle der irritirenden Flüssigkeit weit entfernt von den entzündeten Drüsen, und keineswegs erfolgt immer Obliteration der Lymphgefässe in letzteren, sondern es können auch noch weiter aufwärts gelegene Drüsenreihen durch dieselbe Flüssigkeit, welche bereits ein Drüsenpacket passirt hatte, gleichfalls in Entzündung versetzt werden. In der Ansicht, dass die Entzündung der Lymphdrüsen niemals als primäre Krankheit, wenigstens nicht ohne vorangegangene Verletzung der Haut, vorkomme, ist irrig; nicht bloss directe mechanische Einwirkungen, sondern auch Aufsaugung einer deletären Substanz durch unverletzte Haut kann die Entzündung der Lymphdrüsen veranlassen.

Unläugbar ist eine gewisse Prädisposition bei der Entstehung einer Lymphdrüsen-Entzündung mindestens ebenso wirksam, wie bei der Lymphangitis. Bei Scrophulösen entsteht die chronische Entzündung der Lymphdrüsen sogar ganz gewöhnlich bloss auf Grund der vorhandenen Diathese (s. unten).

Im Verlauf der acuten Lymphdrüsen-Entzündung kommen dieselben Störungen des Allgemeinbefindens vor, wie bei der acuten Lymphangitis. Die örtlichen Erscheinungen sind folgende: Anschwellung, Härte, Schmerzhaftigkeit in der Tiefe, Empfindlichkeit der betreffenden Stelle für Druck; die bedeckende Haut wird wärmer, zuletzt heiss und roth, in der Umgebung der Drüsen entsteht Phlegmone und es treten daher auch deren Erscheinungen hinzu. Zwischen dem 6ten und 15ten Tage erweicht die Geschwulst, und zwar stets an mehreren Stellen zugleich. Fluctuation zeigt sich zuerst entweder nur an einer kleinen Stelle und alsdann ganz oberflächlich oder in grösserer Ausdehnung, aber ganz in der Tiefe und schwer zu entdecken. Bricht die Geschwulst auf oder wird sie geöffnet, so ergibt sich gemeinhin, dass die Quantität des ausfliessenden Eiters

entweder grösser oder geringer ist, als man vermuthete. Ersterer Fall, wenn die Entzündung sich von der Drüse aus hauptsächlich in die Tiefe, letzteres, wenn sie sofort nach der Oberfläche hin ausgebreitet hat. Die Eiterung in der Drüse selbst hat immer einen sehr langsamen Verlauf. Es entstehen in ihr mehrere Eiterherden, welche zuletzt oft zu einem grossen, die ganze Ausdehnung der Drüse einnehmenden Abscess zusammenfliessen, dessen unmittelbare Umgebung die Kapsel der Drüse ist. Letztere wird endlich an mehreren Stellen durchbrochen, so dass der Eiter alsdann in das umliegende Bindegewebe sich ergiesst. Sehr oft aber geht die in der Umgebung einer entzündeten Drüse entstandene Phlegmone in Eiterung über und bildet den sogen. perilymphadenitischen Abscess, während in der Drüse selbst noch kein Eiter gebildet ist, vielmehr die Entzündung fortbesteht und sogar noch einen anderen Ausgang als in Eiterung nehmen kann. Daher ist denn auch mit der Entleerung des Eiters noch keineswegs die Adenitis beendet. Sogar wenn der Drüse selbst Eiter ausfliesst, ist noch keine Entscheidung erforderlich, da auch einzelne Eiterherden in derselben aufbrechen, andere aber in der Tiefe fortbestehen können. Zertheilung der Entzündung lässt sich erwarten, wenn die Entzündungsursachen nur vorübergehend und nicht mit grosser Intensität einwirkten, insbesondere also, wenn durch oberflächliche Entzündung der äusseren Haut veranlasst wird. Liegt ihr eine eiternde Wunde oder ein Geschwür zu Grunde, hat sich schnell auf die benachbarten Theile verbreitet, besteht schon in der Umgegend eine teigige Anschwellung oder Röthung der Haut vor, so ist Eiterung zu vermuthen. Höchst selten tritt Brand ein. Uebergänge in chronische Entzündung lassen sich, wie bei Zertheilung, zunächst alle Krankheits-Erscheinungen nach; aber die Lymphdrüsen bleiben hart und angeschwollen. Auch die Anschwellung der benachbarten Theile besteht, wenn auch in geringerem Grade weiter fort. Hier kommen wir dann zu der schwer zu ziehenden Grenze zwischen chronischer Entzündung und Hyperplasie.

Von der Beziehung der Lymphdrüsen-Entzündung zur Elephantiasis war im vorhergehenden Capitel die Rede.

Prognose. Die Entzündung der Lymphdrüsen ist an sich keine gefährliche Krankheit, jedoch stört sie immer die Function der entsprechenden Lymphgefässe für längere Zeit und hinterlässt fast immer Spuren. Kommt es zum Aufbruch, so hat man überaus langwierige Heilung zu erwarten. Durch ihre Anschwellung können die entzündeten Lymphdrüsen auch benachbarte Organe auf gefährlicher Weise comprimiren, besonders am Halse. Nimmt

Lymphadenitis ihren Ausgang in Eiterung, so können, wenn die entzündete Drüse tief sitzt, alle Gefahren tiefer Eiterungen auftreten; insbesondere hat man in einzelnen Fällen auch Verschwärung der von Eiter umspülten Blutgefässe und dadurch lebensgefährliche Blutungen entstehen sehen.

Behandlung. Ueberall ist auf die ursächlichen Verhältnisse der Entzündung Rücksicht zu nehmen. — Bei acuter Entzündung ist vor allem eine kräftige Anwendung des Eises nützlich. Die ältere Ansicht, dass dadurch Indurationen veranlasst würden, ist irrig. Auch Cataplasma mit nachfolgenden Wasserumschlägen können angewandt werden, um die Zertheilung zu befördern. Jedoch ist der Blutverlust zu vermeiden erwünscht, und die Wirksamkeit ist nicht grösser, als diejenige des Eises. Dass durch das Auflegen grosser Blasenpflaster (Velpeau) der Uebergang in Eiterung verhütet, oder, wenn er nicht mehr zu verhüten, in besonders günstiger Weise eingeleitet werde, ist durch mehrere Erfahrungen nicht bestätigt worden. Von der von vielen Seiten noch immer empfohlenen Einreibung von grauer Quecksilbersalbe auf die Gegend entzündeter Lymphdrüsen habe ich keinen anderen Erfolg gesehen, als dass schmerzhafte Ekzeme entstanden.

Deutlich fluctuirende Abscesse sind in bekannter Weise zu behandeln. — Wird die den Drüsenabscess bedeckende Haut brandig oder verwächst sie allzu langsam mit den unterliegenden Theilen wieder, so müssen die unterminirten und verdünnten Hautlappen mit der Scheere abgetragen und das hierauf zurückbleibende Geschwür dann in entsprechender Weise behandelt werden.

In vielen Fällen kürzt es den Verlauf sehr erheblich ab und vermindert daher die durch die Länge der Eiterung bedingten Gefahren und Beschwerden, wenn man die durch Eiterung zerstörten oder chronisch indurirten und von Eiter umspülten Lymphdrüsen vollständig aus ihrer Kapsel herauschält, was sich in der grossen Mehrzahl der Fälle ohne besondere Schwierigkeit, namentlich auch an den Bubonen der Leistengegend bewerkstelligen lässt.

Viertes Capitel.

Organisirte Neubildungen in den Lymphdrüsen¹⁾.

Pseudoplasmen in den Lymphdrüsen sind häufiger secundäre, als primäre Erkrankungen; besonders gilt dies vom Krebs, welcher

¹⁾ In den Lymphgefässen kommen Neubildungen isolirt niemals vor. Die Erweiterungen der Lymphgefässe, welche man bis zu einem sehr hohen

nur höchst selten in ihnen zuerst auftritt, ganz gewöhnlich aber von benachbarten Organen, dem Lauf der Lymphgefäße (welche jedoch selbst unversehrt bleiben können) folgend, auf sie übergeht.

Als selbstständige und primäre Entartungen werden die Tuberculose der Lymphdrüsen und das sogenannte scrophulöse Sarcom derselben aufgeführt.

Die sogenannte Tuberculose der Lymphdrüsen ist meist keine wirkliche Tuberculose. So häufig dies Leiden sich auch namentlich am Halse scrophulöser Kinder findet, so selten lässt sich die Existenz miliarer Tuberkel in den Lymphdrüsen nachweisen. Die Entwicklung der sogenannten Tuberkelmasse erfolgt vielmehr unter den Erscheinungen schleichender Entzündung, durch eine stetig, fortschreitende Hyperplasie: die Lymphdrüsen vergrössern sich und zwar gewöhnlich nach allen Seiten hin gleichmässig, zugleich werden sie hart. Die Zunahme des Volumens erfolgt Anfangs durch Wucherung der kleinen Zellen, welche sich auch in den normalen Drüsen finden, dann aber sehr schnell schrumpfen. Daher nimmt die aus ihnen gebildete „Tuberkelmasse“ sehr bald ein gelbes, käsiges Ansehn an. Dies tritt an mehreren Stellen der Drüse zugleich auf, so dass dieselbe sowohl äusserlich, als auch auf dem Durchschnitt ein marmorirtes Ansehn gewinnt. Das zwischen den einzelnen, oft nicht scharf abgegrenzten „Tuberkeln“ liegende Gewebe nämlich, besonders das interstitielle Bindegewebe, ist sehr blutreich und daher stark geröthet. Mit der Zunahme der Krankheit wird das Bindegewebe ungemein verdichtet, geht aber anderer Seits auch in Vereiterung über; in Folge davon verschwinden jene rothen Stellen und die ganze Drüse ist dann in eine grosse, käsige „Tuberkelmasse“ umgewandelt, welche von dem inzwischen auch erheblich verdickten und verdichteten Bindegewebe überzogen der Drüse, wie von einer Kapsel eng umschlossen wird. Weiterhin erfolgt nun entweder, unter entzündlichen Erscheinungen, Erweichung und Aufbruch (bei Weitem der häufigste Ausgang), oder aber die „Tuberkelmasse“ verkalkt; die Drüse wird alsdann noch härter, als vorher, aber etwas kleiner, bleibt schmerzlos, nach wie vor, und kann ohne weitere Beschwerden während des ganzen übrigen Lebens in diesem Zustande bestehen.

Von der vorstehend erläuterten Form der Hyperplasie unterscheidet sich diejenige, welche man als scrophulöses Sarcom der

Grade beobachtet hat (vgl. Peters, Prager Vierteljahrsschrift 1862), bieten von pathologisch-therapeutischer Seite kein anderes Interesse dar, als das bereits pag. 268 u. f. erwähnte. — Ueber Adenolymphocèle und Lymphangioma cavernosum vgl. Bd. I. pag. 430 u. f.

Lymphdrüsen (Lobstein), neuerdings auch schlechtweg als Hypertrophie der Lymphdrüsen¹⁾ bezeichnet hat, durch ihr viel schnelleres und gefährlicheres Wachstum. Man hat sogar eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Krebs darin zu erblicken geglaubt, dass gewöhnlich mehrere Lymphdrüsen, oft ganze Haufen und Reihen derselben, zuweilen fast alle Lymphdrüsen des Körpers zugleich von dem „Sarcom“ ergriffen werden. Endlich besitzt das Drüsensarcom, ganz ähnlich wie der Zellenkrebs, eine elastische Consistenz und gewährt nicht selten ein täuschendes Gefühl von Fluctuation. Dagegen unterscheidet sich diese Krankheit vom Krebs sowohl als von der „Tuberculose“ in Bezug auf den Verlauf dadurch, dass eine Neigung zum Zerfallen in ihrem Wesen nicht begründet und daher Verschwärung und Aufbruch, wenn sie überhaupt erfolgen, nur durch äussere Einflüsse (wohin aber auch Druck und Spannung zu rechnen) herbeigeführt werden. Durch solche aber kann eine Entzündung der erkrankten Drüsen, und in Folge derselben auch Eiterung und Abscessbildung vorkommen. Nach partiellen Exstirpationen kann man einen sehr schnellen Wiederersatz des Entfernten, eine wahrhaft üppige Wucherung beobachten.

Man ist nicht berechtigt, irgend eine Dyskrasie als Grundlage des „Drüsensarcoms“ zu betrachten. Ich muss mich in dieser Beziehung aus eigener Erfahrung durchaus an Lebert anschliessen: „das Sarcom der Lymphdrüsen ist keineswegs ein Zeichen scrophulöser Diathese; man trifft es ebenso oft mit, als ohne dieselbe an.“

Die anatomische Untersuchung scheint auf den ersten Blick vollkommen die Benennung „Sarcom“ zu rechtfertigen. Die Geschwülste haben auf dem Durchschnitt ein „markiges“ oder „fleischiges“ Ansehen, welches mit demjenigen der ächten Sarcomé entschieden übereinstimmt. Bei der mikroskopischen Untersuchung findet man als Elemente dieser Geschwülste: Kerne, welche mit den Lymphkörperchen oder den Kernen junger Epithelialzellen die grösste Aehnlichkeit haben, aber sich von ersteren durch ihre bedeutendere Grösse unterscheiden; demnächst Zellen, bald nur durch einen undeutlichen Contour um den Kern angedeutet, bald aber auch vollständig entwickelt, vorzugsweise als sogenannte geschwänzte oder Faserzellen; ferner Fasern, denen des gewöhnlichen Bindegewebes durchaus ähnlich; nach den verschiedensten Richtungen sich kreuzend, so dass dadurch ein Fasergerüst in der Geschwulst entsteht; endlich grosse Capillargefässe.

¹⁾ Vgl. Lebert, Abhandlungen aus dem Gebiete der prakt. Chirurgie, pag. 154, und Langenbeck's Bemerkungen „über das scrophulöse Sarcom der Lymphdrüsen“, in d. Deutschen Klinik 1849, pag. 11.

Aber genauere Untersuchungen einer grossen Anzahl solcher Drüsen auf verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung lassen in dem sogenannten Sarcom doch nur eine Hypertrophie der Drüsensubstanz selbst erkennen, welche bei längerem Bestande unter dem Drucke der die gewucherte Drüsenmasse eng umschliessenden Kapsel, noch secundäre Veränderungen erleidet. Namentlich kommt es nicht blos zur fettigen Degeneration, sondern auch zum wirklichen Zerfall und Aufbruch. Diejenigen Fälle, in denen man ein Eindringen solcher Drüsengeschwülste in benachbarte Organe, und zwar zwischen deren Gewebeelemente, beobachtet hat, dürften wohl auszusecheiden und nicht als Drüsenhypertrophien, sondern als wirkliche Sarcome aufzuweisen sein. Vgl. Bd. I. pag. 553.

Die **Behandlung** der in den Lymphdrüsen vorkommenden Neubildungen muss wesentlich eine operative sein; in der Mehrzahl der Fälle beseitigt man sie am Zweckmässigsten durch die Exstirpation. Man hat gegen diese „Entartungen der Lymphdrüsen“ eine ansehnliche Reihe von inneren und äusseren Medicamenten empfohlen, von denen keins sich bewährt hat und welche zum Theil üble oder doch unangenehme Nebenfolgen haben können. Innerlich: Leberthran, Jod, Jodkalium, Jodquecksilber, Plummer'sche Pulver, Decoctum Zittmanni, Chlorbaryum u. s. f.; äusserlich: künstliche und natürliche Soolbäder, Quecksilber- und Jodsalben, Cicutaapflaster, heisse und kalte trockene und feuchte Umschläge, Blasenpflaster mit oder ohne nach folgende Eiterung, mit oder ohne Aufstreichen starker Jodsalben und dgl. m. In Betreff aller dieser Heilmittel muss zunächst wiederholt werden, was in Betreff der antiscrophulösen Behandlung bereits bei den Geschwüren (Bd. I. pag. 343) im Allgemeinen bemerkt wurde. Speciell haben wir hier hervorzuheben, wie nachtheilig es ist, wenn die Haut über einer Lymphdrüsengeschwulst durch reizende oder gar ätzende Substanzen in Entzündung versetzt wird. Auf solche Weise begünstigt man nicht blos die entzündliche Erweichung und den Aufbruch der Drüse, sondern es werden auch, wenn dies glücklicher Weise nicht geschieht, doch Verwachsungen in der Tiefe eingeleitet, welche für eine später etwa vorzunehmende Exstirpation grosse Erschwerungen bereiten und namentlich eine schnelle Heilung der Wunde fast immer vereiteln. Hierauf Rücksicht zu nehmen, ist aber um so mehr nöthig, als die gedachten Mittel in der That das Gewünschte nicht leisten, und man zuletzt doch zur Exstirpation sich entschliessen muss.

Operationen an den Lymphdrüsen.

1) **Exstirpation.** Das Verfahren bei dieser Operation muss verschieden sein, je nach der krankhaften Veränderung, welche die Drüsen erfahren haben. Am Leichtesten ist die Exstirpation, wenn die Drüsen mit den umgebenden Theilen noch nicht verwachsen sind. Abdann verfährt man in folgender Weise. Man entblösst die Drüse an der Stelle, wo sie der Haut am nächsten liegt¹⁾, und spaltet die sie umgebende Bindegewebskapsel, zieht sie mit einer Hakenzange aus derselben hervor und schält sie mit dem Scalpellstiele gänzlich heraus. Bei diesem Verfahren können bedeutende Nebenverletzungen nicht vorkommen, indem die hintere Wand der Kapsel, welche unversehrt bleibt, die benachbarten grösseren Gefässe und Nerven schützt. Einige Arterienäste, oft von ansehnlichem Caliber, spritzen gewöhnlich innerhalb der Kapsel, sind aber leicht zu unterbinden. Die Exstirpationswunde ist bei diesem Verfahren nicht ganz regelmässig und erhält die Fetzen der Kapsel, welche sich meist allmählig abstossen. Dies macht ihre Heilung durch *prima intentio* unwahrscheinlich, aber doch nicht unmöglich, so dass man, wenn die übrigen Verhältnisse es angemessen erscheinen lassen, immerhin die Naht anwenden darf. Gewährt aber die Wunde nicht entschieden Aussicht auf erste Vereinigung, so ist es besser, sie von Anfang an nur mit einem antiseptischen Verbands zu bedecken. Die Heilung erfolgt dann in 15 bis 20 Tagen. — Bei sarcomatösen und carcinomatösen Drüsengeschwülsten dagegen muss die Drüsenkapsel mit der Drüse zugleich extirpiert werden, um sicher zu sein, dass nichts Krankhaftes zurückbleibt. Dasselbe Verfahren kann aber auch recht wohl bei tuberculösen Drüsen Anwendung finden, wenn es wünschenswerth ist, eine entstellende Narbe sicher zu verhüten. Man erhält nämlich auf diese Weise eine regelmässiger Wunde, welche bei Anwendung der Naht fast immer durch *prima intentio* heilt und jedenfalls schneller und besser vernarbt. Allerdings erfordert aber dies Verfahren, sobald die Drüsen tief liegen, viel grössere Vorsicht, da sie dann fast immer innig mit der Gefässscheide verwachsen, zuweilen sogar von den grossen Gefässstämmen durchsetzt sind.

Drüsen-Exstirpationen werden fast nur am Halse, in der Achselhöhle und in der Leistengegend vorgenommen. An allen drei Stellen kommt man, sobald die Drüsen irgend tief liegen, in die

¹⁾ Liegen mehrere Drüsen dicht bei einander, so kann man mittelst eines einzigen Einschnitts das ganze Convolut extirpiren; anderen Falles macht man für jede Drüse oder jedes Packet einen besonderen Einschnitt.

Nähe bedeutender Gefässe und Nerven. Insbesondere muss bei der Exstirpation krebsiger Achseldrüsen die Art. thoracica longa ganz gewöhnlich durchschnitten und Art. und Vena axillaris, sowie auch die Vena basilica nicht selten blossgelegt werden; in der Schenkelbeuge muss man in solchen Fällen auf die Durchschneidung der Vena saphena, welche gewöhnlich gerade durch die Drüsenpackete hindurchgeht, und die Blosslegung der grossen Schenkelgefässe in der Fossa ovalis gefasst sein¹⁾; bei der Exstirpation tiefer Drüsengeschwülste am Halse erscheinen die Vena jugularis interna und die Carotis stets im Grunde der Wunde; ihre Verletzung ist oft schwer, zuweilen gar nicht zu vermeiden²⁾. In allen diesen schwierigeren Fällen ist es von der grössten Bedeutung, dass man die ganze Geschwulst von Anfang an vollständig blosslege, wozu bei grösseren Tumoren statt eines einfachen Hautschnittes das Ausschneiden eines entsprechend breiten elliptischen Hautstücks zu empfehlen ist³⁾ und dass man, wo möglich, von der Seite der grossen Gefässstämme in die Tiefe dringe, um diese sicher beherrschen zu können.

Andere Gefahren, als die durch die Localität und die Grösse der Geschwulst bedingten, bieten solche Exstirpationen nicht dar. Besonders hervorzuheben ist, dass die Entwicklung von Lungentuberkeln durch die Exstirpation tuberculöser Halsdrüsen nicht befördert wird. Dagegen ist es ebenso irrhümlich, wenn man glaubt, dass durch die Hinwegnahme dieser Drüsen die Anlage zur Tuberculose der Lungen beseitigt würde. Die Beobachtungen, durch welche nachgewiesen werden sollte, dass bei Kranken, deren tuberculöse Halsdrüsen exstirpirt waren, die Lungen stets gesund geblieben seien, sind nicht mit der nöthigen Sorgfalt angestellt und besonders nicht lange genug fortgesetzt. Anderer Seits ist nicht einzusehen, weshalb von den meisten Schriftstellern die Exstirpation tuberculöser Drüsen bei Individuen, welche nachweisbar an Lungentuberkeln leiden, als durchaus unzulässig bezeichnet wird. Wenn solche Drüsen z. B. in grösserer Anzahl vorhanden und dem Aufbruch nahe sind, weshalb sollte man sie nicht entfernen, da offenbar durch die Operation die Dauer der Eiterung abgekürzt und manche Beschwerde beseitigt wird? Von theoretischer Seite muss sogar die Abkürzung der chronischen Eiterung als ein Moment zur Verhütung der Tuberculose anerkannt werden. Vgl. Bd. I. pag. 584 u. f.

2) Kauterisation. Mittelst derselben zerstört man die Haut

¹⁾ Vgl. die Dissertation von Münch, De carcinomate testicularum. Gryphiae 1858

²⁾ Vgl. Langenbeck, l. c., pag. 56 u. flg.

³⁾ Vgl. Langenbeck, l. c., pag. 65 u. flg.

und die Kapsel, welche erkrankte Drüsen bedeckt, um dem erweichten Inhalte derselben Ausfluss zu verschaffen. Um eine möglichst wenig hässliche Narbe zu erhalten, legt man einen ganz schmalen Streifen des Aetzmittels auf und bedient sich lieber der Chlorzink- oder der Wiener Aetzpaste, als des Aetzkali, weil letzteres zu leicht zerfließt. Jedoch lässt sich auch bei der grössten Sorgfalt niemals genau bestimmen, wie breit die Narbe sein wird; sie wird gewöhnlich hässlich und man thut deshalb (wenigstens am Halse) besser, das Kauterisiren ganz zu unterlassen und statt dessen die Incision oder — noch besser — die Exstirpation vorzunehmen.

3) Die subcutane Incision und Zermalmung sind bei chronisch entzündeten und verhärteten Lymphdrüsen versucht worden. Ein kleines schmales Messer (Vidal) oder eine starke Staarnadel (Richt) wird von der Seite her in die angeschwollene Drüse eingestossen und diese darauf nach verschiedenen Richtungen hin mit dem eingeführten Instrumente zerrissen. — Man hat auch vorgeschlagen, die angeschwollene Drüse sammt der sie bedeckenden Haut mit einer Klemme oder Zange zu fassen und auf diese Weise zu zerquetschen. Dies dürfte in der Regel höchst unzweckmässig sein, da mindestens Eiterung in der Tiefe oder gar Brand der gequetschten Haut zu erwarten steht.

Nächster Abschnitt. Von den Krankheiten der Nerven.

Drittes Capitel.

Verwundungen der Nerven.

Das vorstehende Capitel bezieht sich auf die Verwundung von Nerven-ästen, welche im 2. Theile S. 129 u. f. Über betrachten wir zunächst nur die Verwundungen der grösseren Nervenzweige.

Die Nerven des Menschen. Nach Durchschneidung eines Nerven stehen die beiden Nervenenden so wenig von einander ab, was bei stärkeren Nerven die geringen Wände zu dem Irrthume Veranlassung giebt, dass die Nervenenden verhängerten sich nach ihrer Durchschneidung, und es entsteht häufig Schmerz, auch Unempfindlichkeit für die Wirkung der Reize, auch Lähmung derjenigen Muskeln, zu welchen der Nervenast in Beziehung stand. So auch man, wenn zugleich mit der Durchschneidung des Nerven ein Verwundungspunct in dem Nerven herbeigeführt wird, so stehen die beiden Enden so weit von einander ab, dass die Nervenenden sich nicht vereinigen, es mit sich führt. Bleiben die beiden Enden in Berührung, so erfolgt unmittelbar Entzündungs-Erscheinungen, Schmerz, Entzündung und Hyperämie in den beiden Enden, unmittelbar umher in der Umgebung in dem umliegenden Bindegewebe und in der Umgebung des Nerven. Allmählig kommt Vernarbung zu Stande, die Nervenenden sind durch Narbengewebe zwischen den beiden Enden so weit von einander ab, dass die Nervenenden ausgefüllt wird. Au dem Nerven selbst ist ein Verlust der Substanz, dem Substanzverlust entsprechende Erscheinungen, die im allgemeinen Stadium, in welcher bei mikroskopischer Untersuchung die Nervenenden sind, aber auffallend dünne Nerven-ästen, die nicht mehr als Substanz genommen werden. Ist der Substanzverlust bedeutend, so bemerkt man stets eine stärkere

anschwellung des oberen und eine viel schwächere des unteren Endes. Ist letzteres ganz entfernt, wie bei Amputationen, so ist die Anschwellung des zurückbleibenden Nerven-Endes überaus stark. — Aus allen diesen Thatsachen ergibt sich die therapeutische Regel. Wunden, in denen Nerven verletzt sind, möglichst genau zu vereinigen und dafür zu sorgen, dass die getrennten Nerven-Enden in unmittelbarer Berührung bleiben. Dazu ist jedoch das Zusammennähen derselben weder nothwendig, noch auch überhaupt empfehlenswerth, da es die Entzündung des Nerven steigert; dagegen ist es mindestens unschädlich und in manchen Fällen wohl auch nützlich, durch die Nervenscheide einige Saftfäden zu legen und dadurch die richtige Lage der Nerven-Enden zu sichern (Hueter).

Der glänzende Erfolg, welchen Laugier und Nélaton (Comptes rendus 1864, No. 25. Tom. LVIII von der Nerven-Naht gehabt haben sollen, hat sich in den von Eulenburg und Landois (Berliner klinische Wochenschrift, 1864, No. 46 u. 47) an Thieren angestellten Versuchen nicht bestätigt; vielmehr muss, nach denselben, der durch die Naht bewirkte dauernde Reiz bedenklich erscheinen. Die scheinbaren Erfolge von Laugier und Nélaton haben aber durch weitere Beobachtungen ihre vollständige Erklärung gefunden. Richet (Union méd. 1867, pag. 444, Gaz. des hôp. 1867, pag. 319 u. flc. hat bei einer jungen Frau, welche mit dem Arm auf scharfe Kupferplatten gefallen war, in einer 3 Centimeter oberhalb des Handgelenks an der Volarfläche des Vorderarms quer bis auf den Radialrand hinüberlaufenden Wunde von 6 Centimeter Länge eine Trennung des Nervus medianus mit Erhaltung der Empfindlichkeit des peripherischen Stücks beobachtet. Bei der Berührung, wie als man, theils um die Wunde des Nerven zu glätten, theils um die Diagnose durch mikroskopische Untersuchung sicher zu stellen (was auch wirklich gelang), ein Stückchen abschneid, schrie die Patientin laut auf, und nach dem Schnitt spritzte aus der Mitte des peripherischen Endes die kleine Art. centralis. Das obere Ende wurde mit vieler Schwierigkeit entdeckt. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und Bahalrand des Ringfingers erwiesen sich bei den vorsichtigsten Versuchen, trotz dieser queren Trennung des Medianus, in normaler Weise empfindlich. Obgleich von anatomischer Seite ein Irrthum unmöglich war, so wurde doch noch ausdrücklich festgestellt, dass auch die Verbreitungsbezirke des Ulnaris und des Radialis ihre normale Empfindlichkeit bewahren. Duchenne wies am anderen Tage nach, dass die kleinen Daumenmuskeln am Thenar, gelähmt waren, während die des Antithenar auf elektrische Reizung reactiven. Richet knüpfte an diese sehr merkwürdigen Thatsachen die nahe liegende Vermuthung, dass es sich mit der Erhaltung der Sensibilität in den Fällen von Nélaton und von Laugier, in denen die Nerven-naht eine so unerwartet schnelle Verwachsung der getrennten Nerven-Enden bewirkt haben sollte, wohl ebenso verhalten haben möge. Und in der That, es hat sich feststellen lassen, dass Laugier in seinem Falle die Sensibilität der vom Medianus versorgten Theile vor Anlegung der Naht gar nicht geprüft hat und, als er sie am Abend desselbigen Tages vorfand, daraus den vorläufigen Schluss zog, die Nerven-Enden müssten schon zusammengeheilt sein. Nélaton hat aber vor Anlegung der Naht das Fortbestehen der Sensibilität in den vom Medianus versorgten Theilen sehr wohl beobachtet, aber trotz

seines Erstaunens darüber kein Wort davon gesagt, weil —, „er die oft herbe Kritik der Physiologen fürchtete“ [1]. Die wunderbar schnellen Erfolge der Nervennaht sind also aufgeklärt, unaufgeklärt dagegen ist die Thatsache, dass nicht bloß der periphere Stamm des Medianus, sondern auch seine Verästelungen nach vollständiger querer Trennung empfindlich bleiben. Für erstere könnten Sappey's Nervi nervorum eine Erklärung gestatten.

B. Stichwunden und unvollständige Durchschneidung eines Nerven erregen zunächst heftigen, nach dem Verlaufe des Nerven ausstrahlenden Schmerz; gewöhnlich folgt aber schnelle Heilung ohne weitere Zufälle. Wird der verletzte Theil nicht geschont, oder zieht sich der Verletzte eine Erkältung zu und ist derselbe überdies von reizbarer Constitution, so dauert der Schmerz ungewöhnlich lange an; es wird daraus zuweilen eine Neuralgie, oder der Kranke wird von Krämpfen befallen, es steht Tetanus (vgl. d. folg. Cap.) zu befürchten. In solchen Fällen thut man gut, die unvollständige Trennung in eine vollständige zu verwandeln, und der Nervenerrregung durch antiphlogistische und beruhigende Mittel zu begegnen.

C. Zerreiſſung. Die gefährlichen Zufälle, welche man der Zerrung und Zerreiſſung eines Nerven zuschreibt, so wie diese Art der Verletzung selbst, sind viel seltener, als man gewöhnlich annimmt. Zunächst müssen alle umliegenden Gebilde zerrissen werden, wenn es zur Zerreiſſung eines Nerven kommen soll: denn die Nerven sind sehr zähe und dehnbar. Allerdings kommen aber Verletzungen der Art bei Verrenkungen vor, z. B. bei der Verrenkung des Oberarmes nach Unten Zerreiſſung des Nervus axillaris, bei Verrenkungen im Ellenbogengelenk Zerreiſſung des N. medianus. Auch durch übermäßig starke Tractionen, bei der Reduction von Verrenkungen, hat man sie zuweilen entstehen sehen. Zuweilen fand man nach gewaltsamem Ziehen am Arm die Nervenwurzeln am Rückenmark zerrissen.

Relativ oft sind Nerven-Zerreiſſungen ohne übele Folgen beobachtet worden. Eine langsam erfolgende Dehnung der Nerven bedingt niemals besondere Zufälle, wie dies in Fällen von chronischer Exophthalmie sich deutlich zeigt.

D. Contusionen und gequetschte Wunden beobachtet man vorzüglich an solchen Nerven, welche in der Nähe von Knochen, zwischen diesen und der Haut, gelegen sind, hauptsächlich an den Aesten des Frontalis, am Ulnaris, da, wo er in der Rinne des Condylus internus liegt, am Radialis, da, wo er um das Oberarmbein herumgeht, am Peroneus unterhalb des Capitulum fibulae. Allgemein bekannt sind die Schmerzen und vorübergehenden Functionsstörungen,

welche darauf folgen, wenn der Ulnaris in der gedachten Knochenrinne gequetscht wird. Bedenklicher sind die Zufälle, wenn für das Leben wichtige Nerven von einer Quetschung betroffen werden, wie z. B. der N. vagus. Bei allen Nervenquetschungen hat man die nachfolgende Entzündung zu fürchten. Man thut deshalb gut, von vornherein Eis anzuwenden. — Selten werden Nervenstämme isolirt durch Flintenkugeln verletzt; sie weichen ihnen beinahe wie Arterien aus. Dass sie häufiger verletzt zu sein scheinen, als diese, beruht nur darauf, dass auch unbedeutende Zerrungen und Quetschungen der Nerven sich durch Schmerz hinreichend bemerklich machen, während Insultationen der Arterien erst zur Kenntniss kommen, wenn sie Blutungen veranlassen.

E. Die Unterbindung eines Nerven bedingt ähnliche Erscheinungen, wie die Durchschneidung; nur erfolgt die Wiederherstellung der Function des Nerven, wenn man die Ligatur alsbald wieder entfernt, viel schneller, gewöhnlich schon nach einigen Tagen. Das Neurilem bleibt unverseht, wenn man die Ligatur auch stark zusammenschnürt. Man sieht an der unterbundenen Stelle, wenn der Faden sofort wieder entfernt wird, nur eine Furche, niemals eine Continuitätstrennung. Nach einigen Tagen entwickelt sich an dieser Stelle durch die nachfolgende Entzündung eine bedeutende Anschwellung. Lässt man die Ligatur liegen, so erfolgt durch Verschwärung des Neurilems endlich eine vollständige Continuitätstrennung, welche ganz wie nach Durchschneidung wieder ausgeglichen wird. Die Gefahren der Unterbindung eines Nerven sind übertrieben geschildert worden. Man hat darauf in der That weder Krämpfe, noch andere üble Zufälle häufiger folgen sehen, als auf Nervendurchschneidung. Immerhin ist die Unterbindung eines Nerven ebenso gefährlich, wie die Durchschneidung desselben, durch die nachfolgende Entzündung vielleicht noch gefährlicher. Dies hat sich z. B. deutlich gezeigt, wenn der N. vagus zugleich mit der Carotis unterbunden wurde. Wird ein Extremitäten-Nerv zugleich mit der Hauptarterie des Gliedes unterbunden, so ist viel eher Brand zu befürchten, als wenn die Arterie allein unterbunden wurde. (Vgl. „Brand“, Bd. I. pag. 292 u. f.)

Vernarbung und Regeneration der Nerven erfolgt nach allen Verletzungen mit einer wunderbaren Vollständigkeit und Schnelligkeit. Der Zeitraum, welcher dazu erforderlich ist, wechselt, je nach der Grösse des Substanzverlustes zwischen 6 Wochen und mehreren Monaten. Man hat darüber gestritten, ob es sich hierbei blos um gewöhnliche Narbensubstanz, oder wirklich um Wiedererzeugung von Nerven-Primitivcylindern handele. Der mikroskopische Nachweis der

letzteren in der Nervenarbe kann in jedem Falle mit solcher Bestimmtheit geführt werden, dass wir uns eines weiteren Eingehens auf die früher zum Behuf dieses Nachweises in grosser Anzahl angestellten Experimente gänzlich überheben können. Unbekannt aber ist, wie diese in die Continuität der Nervenröhren eingeschalteten Ersatzstücke sich entwickeln, und wie es geschieht, dass die zu einander gehörigen Enden der einzelnen Nervenröhrchen gerade wieder mit einander in Verbindung gesetzt werden.

Nach Reichert und Bidder (Zur Lehre von dem Verhältniss der Ganglienkörper zu den Nervenfasern. Leipzig 1847, pag. 60) spielen die in die Nervenröhre an verschiedenen Stellen eingeschalteten Ganglienkugeln die Rolle von Ernährungs- oder Absonderungs-Organen. Sie liefern den öligen Inhalt des Cylinders, in welchem sie eingebettet sind, während die Wandung desselben aus formloser Bindesubstanz (Reichert) besteht. Ist nun aus einem Nerven irgendwo ein Stück ausgeschnitten, so wird die Lücke zunächst mit indifferentem Exsudat (Bindesubstanz) ausgefüllt. Durch dieses hindurch aber bahnt sich das von den Ganglienkugeln fort und fort (vielleicht sogar in erhöhtem Maasse) abgesonderte und daher gegen die Stelle, an welcher das Exsudat ihm den Weg versperrt, andrängende Nervenfett seinen Weg in ebenso vielen Canälen, als Primitivcylinder verletzt sind. So ist also sehr bald das homogene Exsudat umgewandelt in ein System von Röhrchen, welche sich in der Richtung der Primitivcylinder des centralen Nerven-Endes gegen das peripherische Ende fortsetzen und hier also, selbst wenn von diesem aus vielleicht (wegen Mangels an Ganglienkugeln) ein Entgegenkommen des Nervenfettes nicht Statt findet, voraussichtlich mit den entsprechenden Primitivcylindern des letzteren zusammenstossen müssen. Die Anschwellung des centralen Endes, besonders bei gänzlicher Abwesenheit des peripherischen (bei Amputirten), würde sich nach dieser Theorie aus einer Anhäufung des Nervenmarkes in der Nerven-, resp. Bindesubstanz erklären lassen.

Wiederholt hat man gefunden, dass die Function des Nerven und besonders die centripetale (sensitive) Leitung, welche sich immer zuerst wieder einstellt, früher wiederhergestellt war, als es gelang, bei anatomischer Untersuchung die Regeneration des Nerven nachzuweisen. Vgl. H. Demme, militair-chirurgische Studien. I. pag. 59.

Zweites Capitel.

Wund-Starrkrampf, Tetanus traumaticus¹⁾.

Wir nennen im Allgemeinen „Starrkrampf“ eine Krankheit, welche durch heftige, bald mehr tonische, bald mehr klonische Krämpfe fast aller von Cerebrospinal-Nerven versorgten Muskeln, mit andauernder Steigerung der Reflexerregbarkeit, ausgezeichnet ist.

¹⁾ Edmund Rose, „über den Starrkrampf“ in dem Handbuch von Pitha und Billroth, Bd. I. Abth. II. — W. Heineke, „über den Starrkrampf“, Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, Bd. I. pag. 267 u. f.

solche Krämpfe können durch Gifte, namentlich Strychnin (Tetanus toxicus), durch Erkältung (Tetanus rheumaticus), durch Verletzungen (Tetanus traumaticus) herbeigeführt werden; Erkältung und Verletzung scheinen häufig zugleich zu wirken.

Wir haben hier wesentlich von dem Wund-Starrkrampfe, Tetanus traumaticus, zu handeln. Derselbe ist leicht zu erkennen an den heftigen, andauernden und mit Schmerzen verbundenen, unwillkürlichen Zusammenziehungen fast aller animalen Muskeln, welche meist als „Kieferklemme“, „Kinnbackenkrampf“, in den Kaumuskeln beginnen, sich dann auf die Nacken-, Rücken- und Bauchmuskeln (seltener auf die oberen, als auf die unteren Extremitäten, am Seltensten auf die Muskeln des Vorderarms und der Hand) weiterverbreiten und nur vorübergehend nachlassen, um sich dann anfallsweise verstärkt wieder einzustellen, — bei meist vollständiger Schlaflosigkeit, aber vollkommen klarem Bewusstsein. Als Vorläufer hat man Störungen der Verdauung, Sedimente im Harn, Beschleunigung des Pulses, Trockenheit der Haut, Trockenheit und grössere Schmerzhaftigkeit der Wunde, Aufregung des Kranken und plötzliches Aufschrecken im Schlaf, bezeichnet. Alle diese Symptome können ebenso gut anderen Krankheiten vorausgehen. Jedoch scheint ein schreckhaftes Erwachen beim Beginne der Krankheit fast ganz constant zu sein. In seltenen Fällen bricht der Tetanus mit grosser Heftigkeit plötzlich aus¹⁾. Gewöhnlich tritt er erst einige Tage nach der Verletzung, am Häufigsten zwischen dem 5ten und 15ten Tage auf; man hat ihn aber auch noch nach Vollendung der Vernarbung beobachtet.

Je nachdem diese oder jene Muskelgruppe vom Krampfe ergriffen ist, hat man mehrere Formen oder Varietäten des Tetanus unterschieden. 1) Trismus, Kinnbackenkrampf, ist weniger eine besondere Form, als vielmehr der gewöhnliche Anfang des Tetanus. Die Zusammenziehung der Kaumuskeln ist zuweilen so kräftig, dass es unmöglich ist, irgend Etwas zwischen den Zähnen hindurchzuschieben. Bleibt noch ein Zwischenraum zwischen ihnen, so läuft Speichel aus dem Munde, weil die Spannung der Kaumuskeln auch das Schlingen erschwert. Eine aufmerksame Untersuchung ergibt meist, dass mit dem Trismus zugleich auch schon eine unwillkürliche Spannung der Nackenmuskeln besteht, so dass der Kranke das Kinn nicht der Brust zu nähern vermag. 2) Opisthotonus heisst diejenige Form, bei welcher die Nacken- und Rückenmuskeln vorzugs-

¹⁾ Ein Neger verletzte sich am Daumen mit einem Stück Porzellan und starb schon nach einer Viertelstunde am Tetanus. (Rees, Cyclopaedia, Art. Tetanus.)

weise stark contrahirt sind; daher Krümmung des ganzen Rumpfes nach Hinten¹⁾. 3) Emprosthotonus, Biegung des Körpers nach Vorn durch überwiegend starke Zusammenziehungen der vorderen Hals- und Rumpfmuskeln. 4) Pleurotonus oder Pleurothotonus, Biegung des Rumpfes nach der rechten oder linken Seite des Körpers. Für die beiden letzten Formen lassen sich jedoch beweisende Beobachtungen in der Literatur nicht auffinden²⁾, und es bleibt daher neben dem als Anfangsstadium zu bezeichnenden Trismus nur der Opisthotonus als eine besondere Form übrig, die sich aus der überwiegenden Stärke der Nacken- und Rückenmuskeln leicht erklärt. Bei grosser Heftigkeit der Erkrankung und schnellem Verlauf wird der Tetanus ein allgemeiner, indem er sich auf alle animalen Muskeln zugleich erstreckt. Der ganze Körper ist dann starr und steif; in keinem Gelenke (etwa mit Ausnahme der Finger) ist irgend eine Bewegung möglich. Das Gesicht ist vollkommen starr, ebenso die glänzenden Augen und die Augenlider; reichlicher Schweiß bedeckt den ganzen Körper und fliesst auch über das Gesicht, welches den Eindruck einer grossen Beängstigung macht. In solchen acut verlaufenden Fällen von Wundstarrkrampf können Zuckungen (klonische Krämpfe) ganz ausbleiben, während sie bei chronischem Verlauf regelmässig auftreten, nachdem Trismus und allgemeine Erstarrung der Rumpfmuskeln vorhergegangen sind, so dass man in solchen Fällen 3 Stadien unterscheiden kann, deren letztes durch die Convulsionen ausgezeichnet ist, von denen namentlich der Rumpf und die unteren Extremitäten befallen werden.

Die Schmerzen sind, nach den Angaben von L^ébaut, welcher den Tetanus an sich selbst beobachtete³⁾, denjenigen eines heftigen Wadenkrampfes ähnlich. Der Puls ist gewöhnlich frequent, die Temperatur oft, aber nicht constant, erhöht⁴⁾. Findet sich ein Puls von normaler Frequenz, so fehlt auch meist der Schweiß. Das Athemholen ist erschwert, das Sprechen ganz unmöglich oder doch abgebrochen, und sehr schwierig. Die oft beobachtete Harnverhaltung

¹⁾ Nach Larrey soll diese Form dann auftreten, wenn eine Verletzung an der hinteren Körperfläche den Starrkrampf veranlasst hat. Dies ist irrig; man sieht bei allen höheren Graden des Tetanus diese Form vorherrschen.

²⁾ Vgl. Edmund Rose, l. c. pag. 6. — Jedoch erwähnte Heineke (l. c. p. 272) einen Fall mit linksseitiger Neigung des Kopfes und linksseitiger Concavität des Rumpfes.

³⁾ Considér. génér. sur le Tétanos, Thèse de la Faculté de Paris, 1826.

⁴⁾ Weder die prae-, noch die postmortalen Temperatursteigerungen, welche in einzelnen Fällen bis zur beträchtlichsten Höhe beobachtet sind, haben sich constant erwiesen. Vgl. E. Rose, l. c.

findet in der Steifigkeit der Bauchmuskeln ihre Erklärung¹⁾. Appetit ist vorhanden, die Kranken leiden sogar, da sie Nichts hinabschlucken können, in dem Grade an Hunger, dass Larrey behauptete, sie verhungerten.

Gewöhnlich endet die Krankheit gegen den 4ten Tag hin plötzlich mit dem Tode. Derselbe kann aber, trotz der entgegengesetzten Behauptung des Hippokrates, auch viel später, sogar noch am 15ten Tage der Krankheit erfolgen. Je später nach der Verletzung der Tetanus ausbricht, desto langsamer ist im Allgemeinen der Verlauf und, je langsamer der Verlauf, desto günstiger die Prognose.

Jedenfalls ist aber der Wund-Starrkrampf eine höchst gefährliche Krankheit, gegen welche die Kunst wenig vermag.

Der Leichenbefund liefert uns keine genügende Aufklärung. Den gewaltigen Erscheinungen entsprechend, hätte man bedeutende Veränderungen in den Centralorganen des Nervensystems erwarten sollen; gefunden aber sind, abgesehen von der auffallenden Schwere des Gehirns, auf welche erst E. Rose die Aufmerksamkeit gelenkt hat, — nur unbedeutende Farben- und Consistenz-Veränderungen, Gefässerweiterungen und Bindegewebswucherungen²⁾, und auch diese nicht einmal constant, so dass es keineswegs zulässig ist, Entzündung des Rückenmarkes etwa als Wesen der Krankheit anzusehen. Allerdings sind aber die meisten dieser Untersuchungen an den Leichen Tetanischer (grösstentheils während der Feldzüge) nicht mit der wünschenswerthen Genauigkeit ausgeführt. Vielleicht, dass durch weitere mikroskopische Untersuchungen in dieser Beziehung noch Aufklärung gewonnen wird. Die Zerreibungen von Muskeln und die Blutüberfüllungen bald in diesen, bald in jenen Theilen des Körpers, welche man wiederholt gefunden hat, waren offenbar nicht Ursache, sondern Folge der Krämpfe. — Wenn wir, trotz der Unzulänglichkeit der anatomischen Thatsachen, den Starrkrampf als eine Krankheit des Nervensystems betrachten, so stützen wir uns hierbei auf die Physiologie, die uns seine Erscheinungen von veränderter Nerven-thätigkeit ableiten lehrt.

Als Ursache des Wund-Starrkrampfes betrachten wir zunächst Nervenverletzung. Aber nicht gerade die grössten oder schwersten Verletzungen³⁾, auch nicht solche Wunden, in denen grössere Nerven-

¹⁾ Vgl. Edmund Rose, l. c. pag. 9.

²⁾ Vgl. H. Demme, Beiträge zur pathol. Anatomie des Tetanus, 1859, und Militairchirurg. Studien. Würzburg, 1860. Abth. I. pag. 142—166.

³⁾ Der einzige Tetanische, welchen ich im Feldzuge 1866 heilen sah (Gitschin, Lazaret des Oberstabsarzt Dr. Lendel), hatte eine so ausgedehnte Eröffnung der

stränge durchschnitten sind, veranlassen ihn am Häufigsten, vielmehr Stichwunden, Zerreißungen, Zerschmetterungen, Schusswunden, besonders wenn Gelenke oder solche Theile, die von festen fibrösen Gebilden umschlossen sind, verletzt wurden, auch Verbrennungen, sehr selten Erfrierungen. Von grosser Wichtigkeit scheint die Anwesenheit fremder Körper in der Wunde zu sein¹⁾. Auch die Art der Wund-Behandlung oder — Misshandlung ist von Belang. Vernachlässigte oder durch unzweckmässige Behandlung heftig irritirte Wunden sind entschieden prädisponirt. Nicht ganz selten ist auch nach chirurgischen Operationen Tetanus beobachtet worden, aber keineswegs besonders häufig nach Amputationen oder nach der, früher deshalb besonders gefürchteten Castration, sondern auch nach unbedeutenden Operationen an der Hand und an den Zehen²⁾, wie denn überhaupt Verletzungen an der Hand und am Fuss relativ häufiger Starrkrampf zur Folge haben sollen³⁾.

Die Art und der Ort der Verwundung sind aber nicht die einzige Veranlassung des Tetanus. Es gehört immer noch ein zweites ätiologisches Moment, eine sogenannte prädisponirende Ursache dazu. Männer sollen eine relativ grössere Disposition zum Tetanus

linken Thoraxhälfte durch Granatschuss erlitten, dass man mit der Hand in die Pleurahöhle greifen konnte; ausserdem war durch einen Granatsplitter das Ellenbogengelenk geöffnet und der Proc. cubit. hum. zerschmettert. Der Fall schien Anfangs ganz hoffnungslos; nach Erlöschen des Tetanus machte ich die Resection im Ellenbogengelenk. Ich habe den Mann, vollkommen geheilt, auf dem Bock eines Transportwagens von Gitschin abfahren sehen.

¹⁾ In Cayenne trifft deshalb jeden Hausbesitzer eine harte Strafe, vor dessen Hause Glas-Scherben, Stacheln oder ähnliche Dinge, die in die nackte Fusssohle eines Vorübergehenden eindringen könnten, gefunden werden, weil man aus Erfahrung weiss, dass auf solche Verletzungen daselbst sehr häufig der Starrkrampf folgt.

— Dupuytren erwähnt eines Falles von Tetanus, der durch das Eindringen eines Peitschenknotens in den Nervus ulnaris herbeigeführt wurde. Der Tetanus brach erst aus, nachdem die Wunde völlig geheilt war, so dass man den Fall für „spontanen Tetanus“ ansah, bis jener fremde Körper zufällig entdeckt wurde. — Unter den von H. Demme (l. c.) zusammengestellten 86 Fällen von Tetanus bei Schusswunden waren 21 durch Zurückbleiben von Geschossen complicirt. Vgl. auch Rose, l. c.

²⁾ H. Demme (l. c.) fand unter 86 Tetanischen 21 Operirte, aber nur 12, an denen grössere Amputationen gemacht waren.

³⁾ Nach Poland (Guys Hospital Reports, 1857) kamen von 323 Fällen 162 auf Verletzungen der Hand und des Fusses. — Es lässt sich wohl zur Zeit noch nicht entscheiden, ob nicht blos die absolut grössere Zahl der an Hand und Fuss überhaupt vorkommenden Verletzungen, der Grund ist für die Häufigkeit des Tetanus bei Verletzungen grade dieser Theile.

ben; auch heftige Aufregungen und Gemüthsbewegungen, gestörte Verdauung, sogar Eingeweidewürmer werden als prädisponirende Momente erwähnt. Besonders aber hervorgehoben wird von allen Beobachtern ein plötzlicher Temperaturwechsel, vorzüglich, wenn eine kalte Nacht auf einen recht heissen Tag folgt. Dieser unlegene Einfluss des Temperaturwechsels, oder, wie Andere es bezeichnen, die Erkältung, kann aber mit demselben Rechte als Gelegenheitsursache betrachtet werden, wie die vorausgegangene Verwundung. Es erscheint mir sogar richtiger zu sagen: ein Verwundeter ist prädisponirt zum Tetanus, und die Erkältung ist die Gelegenheitsursache, welche den Tetanus herbeiführt, als umgekehrt.

Auf den Antillen, wo heisse Tage und kalte Nächte fast immer mit einander wechseln, hat oft die geringste Stüchwundé, zuweilen eine unbedeutende Excoriation Tetanus zur Folge. — Der Einfluss der Erkältungen zeigt sich besonders im Kriege, wo die Verwundeten nach ihrem heissen Tagewerke auf der feuchten kalten Erde zurückgelassen werden. Ich habe im Ganzen 19 Fälle von Tetanus gesehen, davon 13 auf Gitschin im Feldzuge 1866. Vgl. E. Rose, l. c. — Auch in solchen Lokalen, die zugig sind, deren Fenster auf die See hinausgehen u. s. f., sah man den Starrkrampf besonders häufig. Sanson hat hierüber in Barcelona lehrreiche Erfahrungen gesammelt (*Nouveaux éléments de pathologie médico-chirurgicale*, 4. édit. Paris 1844, pag. 114). — In sehr anziehender Weise hat Heineke (l. c.) die Theorie der „Erkältung“ entwickelt: im Allgemeinen wirken Erkältungen auf den *locus minoris resistentiae*; der Eine bekommt Schnupfen, der Andere Kopfschmerz, der Dritte Durchfall u. s. f. Bei Verwundeten ist nun unter Umständen der *locus minoris resistentiae* in den Centralorganen des Nervensystems zu suchen, welche von der Wunde aus in einen Zustand höherer Erregung versetzt sind; auf diesen macht sich dann der nachträgliche Einfluss der Erkältung unter solchen Verhältnissen geltend.

Behandlung. Es giebt kaum irgend eine Behandlungsweise, kaum irgend ein überhaupt wirksames Mittel, welche nicht auch beim Tetanus versucht worden wären. Grosse Dosen Opium, andere narkotische Mittel¹⁾, reichliche und oft wiederholte topische und allgemeine Blutentziehungen, Calomel bis zur Salivation, Kalium jodatatum und bromatum, Kali carbonicum in grossen Dosen, Ableitungen im Genick²⁾, wärmere Bäder, Schwefelbäder, Kalibäder u. dgl. m. sind von Alters her empfohlen worden.

Larrey empfiehlt den Theil zu amputiren, an welchem die mit Tetanus complicirte Wunde sass. Günstige Erfolge sind nicht mit Sicherheit erwiesen. — In der

¹⁾ Busse (*Gaz. médic.* 1849, 17. Novbr.) rühmt Einreibungen mit alkoholischer Belladonna-tinctur. Atropin würde wohl wirksamer sein.

²⁾ H. Demme (l. c.) empfiehlt, als ein rationelles Verfahren, zuerst Blutegel im Genick und längs der Wirbelsäule zu setzen, dann ebenda Eis zu appliciren und endlich Narcotica, namentlich auch Digitalis zu geben, weiterhin Hautreize längs der Wirbelsäule und Jodkali zu 2—10 Grammen in 24 Stunden.

Voraussetzung, dass die Reizung der Centralorgane von den insultirten Nerven aus den Tetanus bedinge, hat man die Durchschneidung der betreffenden Nervenstämme empfohlen und sogar bis zur Durchschneidung aller Hauptstämme des Plexus brachialis durchgeführt. Es ist höchst wahrscheinlich, dass zur Zeit des Ausbruchs der Krankheit jene Reizung in den Centralorganen längst ihre volle Höhe erreicht habe, und anderer Seits keineswegs sicher, dass von der Schnittfläche des Nervenstammes keine neue Reizung ausgehen solle. Die Erfolge haben den auf die Neurotomie gesetzten Hoffnungen auch keineswegs entsprochen. Vgl. mein Referat in dem Jahresbericht v. Virchow u. Hirsch p. 1870. Bd. II, pag. 311 u. f.

Von allen diesen grossen Mitteln vereinigen die Opiumpräparate (namentlich das leicht lösliche und constant wirkende Morphium chloratum) die meisten Stimmen für sich. In Betreff der vielgerühmten warmen Bäder ist nicht ausser Acht zu lassen, dass die zu ihrer wiederholten Anwendung erforderlichen Bewegungen und Berührungen der Körperoberfläche des Kranken häufig zu erneuten und heftigeren Krampfanfällen Veranlassung geben. Die Amputation ist, nach den vorliegenden Erfahrungen, durchaus zu verwerfen. Ob die Durchschneidung der Nerven, von deren Erregung man den Tetanus ableiten zu müssen glaubt, oberhalb der verletzten Stelle, einen Nutzen gewährt, scheint mindestens zweifelhaft. Auch Inhalationen von Aether und Chloroform sind wiederholt, aber fast immer nur mit vorübergehendem Erfolge angewandt worden. Dauernde Erfolge hat das Chloralhydrat aufzuweisen, welches man, sofern der Kranke noch zu schlucken vermag, durch den Mund, sonst aber ohne Beeinträchtigung der Wirkung durch den Mastdarm einverleiben kann. Die dauernde Chloroform-Wirkung, welche dasselbe durch seine Umsetzung in Chloroform im Blute erzeugt, lässt, bei dem durch Liebreich¹⁾ nachgewiesenen Gegensatz zwischen Strychnin- und Chloroform-Wirkung, hoffen, dass auch gegen den traumatischen Tetanus ein radicaler Erfolg auf diesem Wege erzielt werden könne, und mehrere Beobachtungen sprechen bereits zu Gunsten dieses Mittels, dessen Application freilich bei Kieferklemme stets etwas schwierig ist. Unter den in neuester Zeit mit Erfolg versuchten Mitteln sind neben dem Chloralhydrat namentlich das von Vella empfohlene Curare und das von H. Watson²⁾ mit glücklichem Erfolg angewandte Calabarextract hervorzuheben. Für die guten Wirkungen des Curare (am Besten hypodermatisch oder endermatisch angewandt) liegen zahlreiche Beobachtungen vor³⁾, und man würde dies Mittel vielleicht in erster Reihe

¹⁾ Berliner klinische Wochenschrift 1870. No. 43.

²⁾ Lancet 1867. March 2.

³⁾ Vgl. H. Demme, Milit.-chirurg. Studien, I. pag. 161 u. f. W. Busch, über Behandlung des Trismus und Tetanus, Berliner klin. Wochenschrift 1867. No. 43.

zu nennen haben, wenn man nur in Betreff der Beschaffenheit des oft sehr unreinen Präparats und seiner individuellen Wirkungsweise sich stets Gewissheit verschaffen könnte. In Betreff des Extracts der Calabarbohne kann ich dem Lobe Watson's nicht beistimmen, da ich gerade auf der Höhe der Calabarwirkung einmal die heftigsten Anfälle habe auftreten sehen.

Alle Beobachter stimmen darin überein, dass ungewöhnlich grosse Mengen narkotischer Mittel Tetanischen ohne üble Wirkung in den Magen gebracht werden können. Wahrscheinlich beruht dies nur darauf, dass von der Schleimhaut des Magens und Darmcanals während des Tetanus schlecht resorbirt wird. Man darf daraus keineswegs folgern, dass es zulässig sei, beim Tetanus ungewöhnlich grosse Gaben zu verordnen; wohl aber spricht dies zu Gunsten der hypodermatischen Anwendung aller Narcotica, welche einem Tetanischen gegeben werden sollen.

Von der hypodermatischen Methode muss man abstehen, wenn das Einstechen des sogen. Giftzahns einen Krampfanfall (Convulsionen) hervorruft. Freilich bleibt es fraglich, ob bei starrer Kieferklemme die Application durch den Mund nicht ebenso nachtheilig wird. Die Einspritzung in den Mastdarm hat, sobald die Rumpfmuskeln befallen sind, nichts voraus.

Stromeyer¹⁾ geht etwas zu weit, wenn er sagt: „Der acute Tetanus ist unheilbar, der chronische erlischt allmählig, ohne dass die Behandlung jemals mehr als palliativ sein könnte, wie sie es beim Typhus und so vielen anderen grossen Krankheiten auch ist und vermuthlich ewig sein wird“; aber man sollte jedenfalls festhalten, dass stürmische Eingriffe beim Tetanus nur schaden und dass absolute Ruhe des ganzen Körpers, namentlich aller Sinnesorgane, und gleichmässige Wärme²⁾ zu den wichtigsten Heilmitteln gehören. — Auch bei der Abmessung der anzuwendenden Dosen von narkotischen und hypnotischen Mitteln muss man stets des „nimis ne nocerem veritus“ eingedenk sein.

Nach Cruveilhier (Anat. pathol. génér. Tom. I. pag. 154 u. f.) erfolgt der Tod Tetanischer durch Asphyxie, indem die Kranken aufhören, Respirationsbewegungen zu machen. Man soll daher den Kranken absichtlich tief und regelmässig nach dem Takte athmen lassen. Das wird kein Tetanischer zu Stande bringen!

Bei der grossen Unzulänglichkeit der Therapie des Tetanus muss unsere ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet sein, ihn zu verhüten.

¹⁾ Maximen der Kriegsheilkunst. 2te Aufl. Hannover 1861. pag. 128.

²⁾ Ambroise Paré heilte einen Tetanischen, indem er ihn 3mal 24 Stunden in einen Stall (*faute de mieux*) in Mist einpackte. — Strychnin-Tetanus wird bei Fröschen durch höhere Wärmegrade ganz aufgehoben. Vgl. Kunde in den Verb. der phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg. 1858, Bd. 8. pag. 175.

Wie viel die Prophylaxis in dieser Beziehung vermag, ist daraus ersichtlich, dass die Fälle von Tetanus überhaupt, besonders aber das endemische Auftreten dieser Krankheit z. B. auf den Antillen, und das Hinzutreten des Starrkrampfes nach chirurgischen Operationen, sich in neuerer Zeit immer mehr vermindert haben. In letzterer Beziehung ist das Chloroform vielleicht auch als ein prophylaktisches Mittel zu betrachten. Uebrigens ergibt sich das prophylaktische Verfahren von selbst, wenn man die oben aufgeführten ätiologischen Momente berücksichtigt. Wir müssen den Verletzten vor jedem plötzlichen Temperaturwechsel und vor jeder Erschütterung und Erregung bewahren, daher namentlich beim Transport und beim Verbandschonend behandeln, die Wunde in einen möglichst reizlosen Zustand versetzen, fremde Körper und Splitter entfernen, Bruch-Enden, welche die Weichtheile reizen und zerren, reseciren, fibröse Häute spalten, wenn eine Entzündungs-Geschwulst unter ihnen eingeklemmt ist, unvollkommen getrennte und zerrissene Nerven ganz durchschneiden, zerquetschte und zermalmte Wunden, wo möglich, in reine und regelmässige verwandeln (wozu allerdings auch grosse Einschnitte, Resectionen und selbst Amputationen erforderlich sein können), die Zersetzung der Wundsecrete durch antiseptische Behandlung verhüten oder doch möglichst beschränken.

Drittes Capitel.

Neuralgien¹⁾.

A. Von den Neuralgien im Allgemeinen.

Neuralgie nennt man die Hyperästhesie eines Gefühls-Nerven, d. h. also Schmerzen von meist bedeutender Intensität, welche im Verlauf eines bestimmten Nerven spontan, d. h. unabhängig von einer irgendwie erkennbaren Reizung, auftreten.

Das wesentlichste **Symptom** einer Neuralgie ist also ein heftiger Schmerz, welcher den Nerven entweder vom Stamme gegen die Peripherie hin wie Feuer durchläuft, oder an einzelnen Punkten im

¹⁾ In Bezug auf die allgemeinen Verhältnisse der Neuralgien ist hier nur das Wichtigste hervorgehoben, da diese Lehre als der inneren Medicin zugehörig betrachtet wird. Vgl. Romberg, *Nervenkrankheiten*. 3te Aufl., Berlin, 1857, pag. 8 u. f., und Valleix, *Traité des névralgies*. Paris 1841. A. Eulenburg, *Lehrb. d. functionellen Nervenkrankheiten*, Berlin 1871, pag. 38 u. f. — Hier wird nur von denjenigen Neuralgien gehandelt, welche in äusseren, den chirurgischen Hilfsmitteln zugängigen Nerven ihren Sitz haben.

Verlaufe des Nerven plötzlich gleichsam aufschiesst. Derselbe ist bald bloß stechend, bald brennend und stechend zugleich, und wird durch Druck niemals vermehrt. Lässt der Schmerz nach, so hat der Kranke in dem ergriffenen Theile doch noch das Gefühl von Ameisenkriechen oder von Eingeschlafensein, jedoch ohne Verminderung der Sensibilität. Seltener werden Pulsationen, kneifende und prickelnde Schmerzen beobachtet. Die benachbarten Theile, selbst die allernächsten, sind frei von Schmerz. Bei grosser Heftigkeit und Ausbreitung stellt sich allgemeine Aufregung ein. Ist der erkrankte Nerv nicht ein rein sensibler, so gesellen sich zuweilen krampfhaftige Zusammenziehungen der von ihm versorgten Muskeln hinzu. Die schmerzhaften Theile sind manchmal auch etwas geröthet, angeschwollen und heisser, als im gesunden Zustande. Gewöhnlich sind Neuralgien nicht andauernd, sondern treten in der Form von Anfällen auf, zwischen denen bald regelmässige, bald unregelmässige Zwischenräume liegen. In seltenen Fällen geht dem neuralgischen Anfalle ein allgemeiner Frost und Kälte-Empfindung an der leidenden Stelle voraus.

Sitz der Neuralgien ist am Häufigsten das Gesicht, seltener eine Extremität, noch seltener der Rumpf.

Die **Aetiologie** der Neuralgien ist dunkel. Die sogenannte nervöse Constitution, meist im Zusammenhange mit Blutarmuth, das weibliche Geschlecht und das reifere Lebensalter bedingen eine Prädisposition für dieselben, während Kinder fast immer von ihnen verschont bleiben. Gelegenheitsursachen sind: plötzliche Erkältung durch Zugluft bei heissem, schweissbedecktem Körper und dauernde Einwirkung feuchter Kälte (durchnässte Kleidungsstücke, Liegen auf feuchtem Boden u. dgl. m.). Auch Verwundung eines Nerven kann Neuralgie zur Folge haben. Ferner kann sie durch den Druck, welchen irgend eine Geschwulst (im weitesten Sinne des Wortes) auf den Nerven ausübt, endlich auch durch die Einwirkung gewisser Gifte herbeigeführt werden, wofür die Bleikolik das deutlichste Beispiel liefert.

Prognose. Neuralgien sind immer sehr unangenehme, langwierige, in vielen Fällen jedoch heilbare und nur sehr selten tödtliche Krankheiten¹⁾; aber sie können allerdings allmählig einen Zustand örtlicher und allgemeiner Schwäche und Abmagerung herbeiführen und secundäre Erkrankungen begünstigen, so dass dem Leben selbst Gefahr droht. Manche Neuralgien heilen dagegen von selbst.

Die **Behandlung** der Neuralgien ist mit einer zahllosen Menge von Mitteln unternommen worden, meist ohne Berücksichtigung der

¹⁾ Für die specielle Prognose ist natürlich die Aetiologie maassgebend.

freilich oft genug dunklen Aetiologie, auf welcher eine rationelle Therapie doch fussen müsste. Innerlich hat man Orangenblüth- und Baldrian-Thee, Aether, Castoreum, Vinum colchici, Terpenthinöl, narcotische Mittel, Purganzen (Oleum ricini, ol. crotonis), Arsenik (Solut. Fowleri), Eisen u. s. f. angegeben. Mit Sicherheit kann man auf einen günstigen Erfolg innerer Mittel rechnen, wenn die Neuralgie mit intermittirendem Typus (als Febris intermittens larvata der älteren Autoren) auftritt. Dann hilft Chinin¹⁾ und in schlimmeren veralteten Fällen Arsenik, dem aber auch bei anderen Formen gute Erfolge nachgerühmt werden. Mit gleicher Sicherheit wirken grosse Dosen der Eisenpräparate, wenn die Neuralgie eine Theilerscheinung der Bleichsucht oder Anämie ist²⁾. Blutentziehungen sind bei vollblütigen Subjecten mit Nutzen, bei anderen aber mit nachfolgender Verschlimmerung angewandt worden. Aeusserlich rühmen die Einen die Kälte, die Anderen trockene, und die Dritten feuchte Wärme; so werden denn auch Seebäder, Kaltwasserkuren und russische Dampfbäder mit gleicher Lebhaftigkeit empfohlen; in dem einen Falle hilft Dies, in dem anderen Jenes, und in der That bleibt oft Nichts übrig, als zu versuchen. Blasenpflaster (besonders von Cotugno empfohlen), nützen oft, wenn die Krankheit durch Erkältung entstanden ist. Auch andere Ableitungsmittel und Hautreize sind vielfach angewandt, namentlich Veratrinsalben. Noch kräftiger wirkt die Moxa und das Ferrum candens, deren schmerzhaftige Einwirkung man nicht zu scheuen braucht, da der Kranke während der Application durch Chloroform betäubt werden kann. In ähnlicher Weise, aber langweiliger, mag die Acupunctur zum Ziele führen. Auch die Electricität wird auf die verschiedenste Art, von der Goldberger'schen Kette bis zur Bunsen'schen Batterie, mit entsprechend eingebildetem oder wirklichem Erfolge angewandt. Als Palliativmittel ist die locale Application der Narcotica und Anästhetica von grösster Bedeutung. Letztere werden in Form von Umschlägen, die man zur Verhütung der Verdunstung dicht umhüllt, erstere auch wohl als Umschläge oder Salben, seltener endermatisch, am Besten und mit dem bei Weitem sichersten, meist wahrhaft überraschenden Erfolge mittelst der hypodermatischen Injection³⁾ applicirt.

Endlich hat man den schmerzenden Nerven entweder durch-

¹⁾ Auch hypodermatisch sehr bequem anzuwenden.

²⁾ Neuralgien dieser Art werden leider noch allzu oft mit Narcoticis (auch Coffein u. dg! m.) nicht blos vergeblich, sondern zum Schaden der Patienten behandelt.

³⁾ Vgl. pag. 251. Man löst z. B. 0,06 Morphinum hydrochloratum in 3,6 destillirten Wassers und spritzt davon 10—15 Tropfen (= 0,01—0,015 Morphinum) an der leidenden Stelle unter die Haut.

schnitten (Neurotomie) oder Stücke aus ihm ausgeschnitten (Neurectomia, Resectio nervorum). Letzteres gewährt mehr Aussicht auf dauernden Erfolg, weil bei der blossen Durchschneidung das schnelle Zusammenheilen der getrennten Nerven-Enden sehr bald die Rückkehr des Leidens erwarten lässt. Anderer Seits darf auch einfache Durchschneidung an gemischten (nicht rein sensitiven) Nerven nicht vorgenommen werden, weil die centrifugale Leitung sich selten vollständig wiederherstellt und somit eine unheilbare Lähmung aller von jenem gemischten Nerven versorgten Muskeln zu erwarten stände. Von allen erwähnten Mitteln und insbesondere auch von der Ausschneidung eines Nervenstücks kann ein dauernder Erfolg niemals erwartet werden, wenn die Neuralgie durch eine am centralen Ende des Nerven wirkende Ursache (meist eine dort sitzende Geschwulst) oder durch eine Vergiftung bedingt wird. Hiernach sollte man glauben, dass die Neurectomie nur in seltenen Fällen hilfreich sein könne, da die Mehrzahl der Neuralgien centralen Ursprungs zu sein scheint. Die Erfahrung hat aber gelehrt, dass auch bei solchen Neuralgien, deren centraler Sitz sich später deutlich zeigt, oft schon die blosse Durchschneidung des Nerven und zuweilen selbst die Durchschneidung eines Astes, der gar nicht bei der Neuralgie betheiligte zu sein scheint, für längere Zeit (auf unerklärliche Weise) Hülfe zu schaffen vermag.

Erfahrungen der Art habe ich selbst an einem Manne gemacht, der sich wegen einer Trigemini-Neuralgie den mannigfaltigsten Operationen unterwarf. Die Neuralgie in den Nn. dental. post. und im N. subcutaneus malae hörte z. B. für mehrere Monate auf, nachdem der N. frontalis durchschnitten war. — Vgl. auch den „Bericht über 91 Nerven-Resectionen, 5 Carotis-Unterbindungen und 1 osteoplastische Kiefer-Resection, welche vom Prof. Nussbaum zur Heilung des Gesichtsschmerzes ausgeführt wurden.“ Wöchener ärztliches Intelligenzblatt vom 15. August 1863, pag. 473.

Bei der Ausführung einer Neryendurchschneidung hat man im Allgemeinen Folgendes zu beachten. 1) Die Blosslegung des Nerven muss wo möglich oberhalb des Ursprungs aller der von der Neuralgie ergriffenen Aeste vorgenommen werden. 2) Nachdem man, durch anatomische Kenntnisse geleitet, den Nerven gefunden und entblösst hat, durchschneidet man ihn zunächst so hoch als möglich gegen seinen Ursprung hin mit einem Zuge; dann ist der zum Behuf der Neurectomie nothwendige zweite Schnitt schmerzlos.

C. Hueter (Archiv f. klin. Chirurgie, 1869, Bd. XI. pag. 863) glaubt es als allgemeinen Grundsatz aufstellen zu müssen, dass man Neurectomien immer jenseits des centralen Endes derjenigen Knochenkanäle ausführen solle, durch welche der neuralgisch afficirte Nerv verläuft, da voraussichtlich gerade in den innerhalb der knöchernen Canäle vor sich gehenden Veränderungen der Grund für das Auftreten peripherischer Neuralgien zu suchen sein dürfte.

Eine ausführliche Erörterung des therapeutischen Werthes der Neurotomie und

eine spezielle Beschreibung der Technik einzelner Nervendurchschneidungen findet sich in V. v. Bruns Prakt. Chirurgie, Abth. II. Bd. I. pag. 838 u. f.

Mit sehr schwankendem Erfolge ist einige Mal die dem neuralgischen Theile Blut zuführende Arterie (Carotis communis) unterbunden worden. Vgl. Nussbaum l. c.

B. Von den wichtigsten äusseren Neuralgien im Besonderen.

I. Gesichtsschmerz, Prosopalgie, Neuralgia facialis, Tic douloureux¹⁾.

Diese Neuralgie hat ihren Sitz in den Aesten des Nervus trigeminus, und zwar gewöhnlich in einzelnen derselben, wo sie dann als 1) Neuralgia frontalis; 2) Neuralgia infraorbitalis seu maxillaris superior; 3) Neuralgia maxillaris seu maxillaris inferior bezeichnet wird.

1) **Neuralgia frontalis.** Der Schmerz beginnt am Rande der Augenhöhle und erstreckt sich von da zur Stirn, zum oberen Augenlid und dem inneren Augenwinkel der leidenden Seite, zuweilen auch zu der entsprechenden Nasenhälfte, oder zum Auge selbst, in welchem Falle dann auch die übrigen Zweige des Ramus ophthalmicus trigemini ergriffen sein müssen. Während des Anfalles bemerkt man eine Senkung des Augenlides, Klopfen der Arterien, Hervorquellen heisser Thränen, Röthung des Auges, zuweilen auch Trockenheit der entsprechenden Nasenhöhle.

Durchschneidung des Nervus frontalis. a) **Subcutane Neurotomie.** Man erhebt die Gegend der Augenbraue in eine Hautfalte, stösst in diese ein Tenotom ein und führt es im Zurückziehen mit ziemlich starkem Druck längs des Orbitalrandes, namentlich in der Gegend des Foramen supraorbitale.

b) **Neurectomie.** Verfahren von Linhart²⁾. Längs des oberen Randes der Augenhöhle wird Alles bis auf den Knochen mit einem Zuge durchschnitten, demnächst die Membrana tarso-orbitalis dicht am Knochen auf der Hohlsonde gespalten und der gesammte Inhalt der Orbita von deren Decke mit einem Spatel etwas abgedrängt. Arteria und Nervus frontalis liegen oben auf. Man kann den Nerven mit Pincette und Hohlsonde isoliren und ziemlich weit nach Hinten durchschneiden. Das abgetrennte Nerven-Ende wird hervorgezogen und aus dem Foramen supraorbitale frei gemacht, wozu bald blos die Durchschneidung der fibrösen Brücke, bald die Ablösung des Knochenrandes erforderlich ist. Endlich werden die Stirnäste des Nerven noch

¹⁾ Dieser Name rührt her von dem Versailler Chirurgen André (Observations sur les maladies de l'urètre et sur plusieurs faits convulsifs. Paris, 1753).

²⁾ Vgl. W. Linhart, Compend. d. chirurg. Operationslehre, Wien, 1862, pag. 205 ff.

eine Strecke weit herauspräparirt, was eine auf den ersten Schnitt rechtwinklige, verticale Incision wesentlich erleichtert.

2) **Neuralgia infraorbitalis** hat ihren Sitz in den Verästelungen des gleichnamigen Nerven und erreicht oft einen so furchtbaren Grad, dass die Kranken halbwahnsinnig zum Selbstmord getrieben werden. Sie wird häufig mit Zahnschmerzen verwechselt, kann aber auch durch einen cariösen Zahn veranlasst werden. Gewöhnlich tritt sie plötzlich und gleich von Anfang an mit grosser Heftigkeit auf; zuweilen geht ihr Kribbeln und Kitzeln in der entsprechenden Gesichtshälfte voraus, auch wohl Blutandrang zum Gesicht, seltener Schmerzen in der Herzgrube oder Athembeschwerden. Der Schmerz geht vom Foramen infraorbitale aus und erstreckt sich von da zum Jochbogen, dem unteren Augenlide, zur Nase, zur Oberlippe, zu den Zähnen des Oberkiefers, dem Sinus maxillaris, dem Gaumen, der Zungenbasis. Krampfartige Bewegungen der Gesichtsmuskeln und Salivation hat man als begleitende Erscheinungen beobachtet.

Für die Durchschneidung des Nerv. infraorbitalis giebt es zwei verschiedene Wege, entweder von der Mundhöhle aus, oder von Aussen durch die Haut.

a) Um von der Mundhöhle aus die Operation vorzunehmen, erhebt man die Unterlippe an der entsprechenden Seite möglichst stark, sticht an der Stelle, wo die Schleimhaut der Wange auf den Alveolarfortsatz des Oberkiefers übergeht, oberhalb und etwas hinter dem zweiten Backzahn ein schmales Messer in der Richtung gegen das Jochbein bis zur Höhe des unteren Augenhöhlenrandes ein und durchschneidet, in der Richtung nach Vorn, hart am Knochen sämtliche Weichtheile. Die Wunde wird mit Wundhaken auseinander gehalten, das peripherische Ende des Nerven von der Mundhöhle aus mit der Pincette gefasst, und ein Stück davon mit der Scheere abgeschnitten. Dies Verfahren bedingt eine erhebliche Blutung, ist überdies sehr unsicher und daher nicht zu empfehlen; der wesentlichste Theil der Operation geschieht im Dunkeln.

b) Um von Aussen her den Nerven zu durchschneiden, kann man entweder subcutan verfahren, oder ihn blosslegen. Im ersteren Falle beabsichtigt man die einfache Neurotomie, im zweiten die (bei Weitem mehr sicherstellende) Ausschneidung eines Stückes des Nerven.

a) Zum Behuf der subcutanen Durchschneidung des Infraorbitalis bei seinem Austritt aus dem Canal stösst man ein Dieffenbach'sches Tenotom vom Jochbein her, 5 Millim. unterhalb des Margo infraorbitalis, durch die Haut und führt es mit diesem parallel bis zum Proc. nasalis des Oberkiefers. Dann wendet man die Schneide

gegen den Knochen und zieht es langsam zurück, indem man die Gegend des Foramen infraorbitale gleichsam rasirt.

β) Für die Ausschneidung eines Stückes aus dem Infraorbitalis hat man sich bisher meist des von Schuh¹⁾ modificirten Verfahrens von Malgaigne bedient. Man incidirt zunächst längs des ganzen Margo infraorbitalis bis auf den Knochen. Während das auf solche Weise von der Wange getrennte Augenlid durch einen Gehülfen emporgezogen wird, spaltet der Operateur die Membrana tarso-orbitalis in sehr geringer Ausdehnung aus freier Hand, dann aber auf der Hohlsonde in der Ausdehnung der Hautwunde. Der Ursprung des Musc. obliquus inferior bleibt auf diese Weise unberührt. Der ganze Inhalt der Augenhöhle wird nun mit einem Spatel emporgedrängt. Durch die Periorbita hindurch kann man dann den Nervus infraorbitalis als einen intensiv weissen Streifen erkennen. Neben ihm stösst man, möglichst weit nach Hinten, ein schmales, starkes Messer (Tenotom) durch den Boden der Augenhöhle in die Highmorshöhle hinein und führt es mit sägenden Bewegungen quer nach der entgegengesetzten Seite, bis man sicher ist, über den Canalis infraorbitalis hinaus zu sein und somit den Nerven gewiss durchschnitten zu haben. Hierauf wird der Nerv an seiner Austrittsstelle im Foramen infraorbitale völlig frei präparirt und das durchschnitene (peripherische) Ende aus dem Canal hervorgezogen. Zuweilen hat man, wegen frühzeitiger Spaltung des Nerven, statt eines Stranges mehrere hervorzuziehen. Schliesslich wird der Nerv entweder dicht am Foramen infraorbitale abgeschnitten oder auch noch die weitere peripherische Verästelung eine Strecke weit aus den Weichtheilen des Gesichts herauspräparirt. Jedenfalls kann man auf solche Weise ein Stück von 1 bis nahezu 3 Centim. Länge excidiren. Die Blutung aus der immer mit verletzten Arteria infraorbitalis ist durch Tamponade und Kälte zu stillen.

Um den Erfolg der Neurectomie noch mehr zu sichern, hat Schuh ausserdem die Resection des Theils des Oberkiefers, welcher den Canalis infraorbitalis enthält, und Linhart das Aufsprengen des Canals empfohlen. Gegen eine in den hinteren Zahnerven oder im Subcutaneus malae sitzende Neuralgie sind aber auch diese eingreifenderen Verfahren voraussichtlich²⁾ unwirksam.

Man ist deshalb noch weiter gegen den Stamm vorgedrungen und hat auf verschiedenen Wegen den ganzen Ramus maxillaris superior trigemini an seiner Austrittsstelle aus dem Foramen

¹⁾ Ueber Gesichtsneuralgien und über die Erfolge der dagegen vorgenommenen Nervenresectionen. Wien 1858.

²⁾ Vgl. jedoch pag. 299.

Foramen rotundum in der Fossa sphenomaxillaris zu durchschneiden gesucht. Carnochan (in New-York) hat diese Operation zuerst mit Hilfe einer partiellen Resection des Oberkiefers ausgeführt. Zunächst muss die vordere Wand des Knochens blossgelegt werden. Dazu bedient sich Carnochan eines V-förmigen, v. Bruns eines T-förmigen Schnittes. Die Oberlippe wird durch das untere Ende des Schnittes gespalten, der Nerv nach Zurückschlagen der übrigen Weichtheile am Foramen infraorbitale aufgesucht, dann die vordere Kieferwand trepanirt (oder hinreichend ausgesägt) und der Nerv unter Anwendung von Pinzette und Knochenzange von der Highmorshöhle aus blossgelegt und weiter nach Hinten verfolgt. Endlich wird die hintere Wand der Highmorshöhle mit einem kleinen Meissel zersprengt und, nach Entfernung der Knochenstückchen, der Nerv in der Fossa sphenomaxillaris selbst isolirt. Dabei werden die Dentales posteriores abgeschnitten. Den Nervenstamm selbst durchschneidet man nahe dem Foramen rotundum mit einer Hohlsechere, die man dicht am Nerven von Unten nach Oben führt, um die ihn begleitende, jedoch etwa 1 Millim. tiefer liegende Arteria maxillaris interna nicht zu verletzen.

Die hierbei unvermeidliche erhebliche Knochenverletzung hat Linhart (l. c. p. 219) ausgesagt, indem er von der Orbita aus den Nerven bis zum Foramen rotundum mit dem Middeldorpf'schen Stricturenbrenner verfolgte und dort mittelst der Glühhitze cauterisirte. Allein dabei fand eine bedenkliche Blutung statt.

Noch mehr führt der von v. Bruns (l. c.) als möglich angedeutete Weg in's Unklare, nach Vorausschickung einer partiellen Resection des Wangenbeins von der Augenhöhle aus in die Flügelgaumengrube mit dem Messer einzudringen, um den Stamm des Ramus maxillaris superior zu durchschneiden.

Bei Weitem die grösste Sicherheit gewährt das von A. Wagner¹⁾ angegebene Verfahren, dessen erste Acte sich von dem Schuh'schen nur dadurch unterscheiden, dass die Knochenhaut am unteren Rande der Augenhöhle mit grosser Genauigkeit scharf durchschnitten und dann von der unteren Augenhöhlenwand sorgfältig abgehoben wird. Demnächst aber wird der Bulbus durch einen spiegelnden Hohlhebel emporgehalten, welcher löffelförmig den Bulbus in seiner Concavität aufnimmt und an der convexen Fläche, zu einem Metallspiegel polirt, zur Beleuchtung des Operationsfeldes dient. Durch einen feinen griffelförmigen Hohlmeissel wird alsdann der Infraorbitalcanal in seinem hintersten Theil 4—7 Millim. weit eröffnet und die abgehobenen Knochenplättchen mit der Pincette entfernt. Von der Seite der anliegenden Arterie lässt sich alsdann bei dem reflectirten Lichte mit einem der Deschamps'schen Unterbindungsnadel ähnlich construirten

¹⁾ Ueber nervösen Gesichtsschmerz und seine Behandlung durch Neurectomie. Archiv für klin. Chirurgie, Bd. XI. pag. 1—2.

Haken der Nerv umgehen, ohne Verletzung der Arterie herausheben und bis in die Flügelgaumengrube, selbst bis zum Foramen rotundum isoliren und mit einer feinen, langarmigen Scheere durchschneiden. Bei dieser Operationsmethode wird eine erhebliche Knochenverletzung vermieden, die Highmorshöhle nicht eröffnet, somit Entzündung und Blennorrhoe der Schleimhaut dieser Höhle umgangen und die Art. infraorbitalis nicht verletzt. — Ich kann das Wagner'sche Verfahren aus eigener Erfahrung empfehlen.

Weniger sicher erscheint die, allerdings auch noch weniger verletzende subcutane Durchschneidung des N. infraorbitalis in der Fissura orbitalis inferior nach v. Langenbeck¹⁾. Ein Dieffenbach'sches Tenotom wird mit nach Hinten und abwärts geneigter Spitze unter dem Lig. palpeb. ext. eingestossen und an der äusseren Orbitalwand nach Hinten und Unten bis in die Fissura orbit. inf. fortgeschoben. Die Schneide des Messers wird hier nach Innen, gegen den scharfen Rand des Proc. orbital. des Oberkiefers gewendet und mit sägeförmigen Zügen nach Vorn geführt. Ein 1—2 Centimeter langer senkrechter Einschnitt legt den Nerven bei seinem Austritt aus dem Foramen infraorb. bloss, um ihn auch dort zu durchschneiden und das ausgeschnittene Stück hervorzuziehen. — Hueter's Verfahren²⁾ unterscheidet sich nur dadurch, dass er sich, nachdem ein Einstich am äusseren Augenwinkel gemacht ist, eines besonders starken Diffenbach'schen Tenotoms mit stumpfer Spitze bedient, dessen concave Schneide Anfangs nach Aussen und Unten steht und erst, nachdem die Spitze in die Fissura orbitalis inferior eingedrungen ist, nach Innen gewandt wird. Die Abstumpfung der Spitze hält Hueter für besonders nützlich, um Verletzung der Art. maxillaris interna zu vermeiden.

3) **Neuralgia maxillaris.** Diese hat ihren Sitz im dritten Ast des Trigemini, ergreift denselben aber nur selten ganz, sondern betrifft meist a) den Nerv. alveolaris inferior und besonders dessen Ramus mentalis; b) die Verbindungsäste, welche der N. maxillaris inferior hinter dem Unterkiefer zum Facialis schiebt, in welchem Falle die Schmerzen sehr oft nach der Verästelung des Facialis auszustrahlen scheinen und dadurch die irrige Vorstellung hervorrufen, die Neuralgie habe ihren Sitz in dem Facialis, welcher doch ein entschieden motorischer Nerv ist³⁾; c) den Ramus auricularis

¹⁾ Die subcutane Durchschneidung des Nervus infraorbit. in der Fissura orbit. inferior. Archiv für klin. Chirurgie, Bd. XI. pag. 127.

²⁾ Archiv für klin. Chirurgie, Bd. XI. pag. 863.

³⁾ Von dieser falschen Ansicht ausgehend, hat man sogar den Facialis (natürlich

terior, so dass die Schmerzen in derselben Richtung, wie die rt. temporalis, ausstrahlen, wobei gleichfalls früher der Facialis für en leidenden Theil gehalten worden ist; endlich d) am Seltensten in Ramus lingualis.

Bei der Durchschneidung wurden früher nur die vom Foramen mentale ausstrahlenden Schmerzen berücksichtigt.

Durchschneidung des Nerv. mentalis. Das Foramen mentale liegt in der Richtung einer zwischen dem ersten Backzahn und dem Eckzahn des Unterkieferswärts gezogenen Linie. Die Unterlippe wird umgestülpt und an der bezeichneten Stelle, hart an der Aussenfläche des Unterkiefers ein 6—8 Millim. tiefer Schnitt gemacht, der Nerv gefasst und resecirt. Es handelt sich aber niemals um ein Nervende, da der Nerv. mentalis sich gleich nach seinem Austritt in zahlreiche Aestchen theilt. Deshalb ist es sicherer, die Gegend des Foramen mentale von Aussen mittelst eines durch die Haut geführten J-Schnittes zu entblößen (Bérard).

Um Neuralgien des ganzen Alveolarastes operativ zu bekämpfen, muss derselbe vor seinem Eintritt in den Alveolarcanal aufgesucht werden.

Durchschneidung des Nerv. alveolaris inferior.

a) von Aussen her.

a) Blosslegung durch ein in den Kieferast eingeschnittenes Loch (nach Warren). Einschnitt in der Richtung des Ramus mandibulae; die Parotis wird blossgelegt, etwas abgelöst und nach Hinten geschoben. Hierbei geht man am Besten von dem Musculus Stenonianus aus, der jedenfalls nicht verletzt werden darf. Einige Fasern des Masseter werden durchgeschnitten, seine sehnigen Insertionen sammt dem Periost vom Knochen mit dem Schabeisen in dem erforderlichen Umfange entfernt und der Ast des Unterkiefers, der auf diese Weise blossgelegt ist, in seiner Mitte trepanirt; dann hebt man den Nerven, welcher vor der Arteria dentalis inferior und wenige Linien hinter dem Nervus lingualis liegt, mit einem Haken auf und schneidet mindestens $1\frac{1}{2}$ Ctm. aus ihm aus. Die durch Trepanation gewonnene Lücke im Unterkieferaste gewährt aber in verticaler Richtung zu wenig Raum für die weiteren Operationsacte, während sie in horizontaler Richtung einen unnöthig grossen Substanzverlust im Knochen bedingt. Diesem Uebelstande hat Lin-

ohne Erfolg) durchgeschnitten und zwar: entweder nur den wesentlich zum Gesicht bestimmten Ast desselben, da wo er nach Aussen vom Halse des Processus condyloides mandibulae, dicht vor dem Ohrläppchen verläuft, oder aber, nach Velpeau, sogar nahe an seinem Austritt aus dem Foramen stylomastoideum zwischen dem Ohr und dem Unterkiefer einer Seits und dem Zitzenfortsatz nebst vorderem Rande des M. sternocleidomastoideus anderer Seits.

hart¹⁾ abgeholfen, indem er mit Hilfe des Osteotoms ein schiefes Parallelogramm umschneidet, dessen untere Begrenzungslinie parallel der Basis des Unterkiefers sich in der Höhe des Alveolarrandes befand, während die obere nahe an der Incisur des Kieferastes verlief. Die Schnitte drangen nur durch die äussere Knochenlamelle; die übrige Knochensubstanz wurde in der vorgezeichneten Ausdehnung mit dem Meissel entfernt.

β) Blosslegung durch Absägen eines Stückes vom hinteren Rande des Kieferastes. J. Kühn²⁾ hat zuerst versucht, dem Nerven von der hinteren Seite des Unterkiefers beizukommen, indem er durch Absägen eines dreieckigen Stückes vom Unterkieferwinkel den erforderlichen Raum schaffte. Mit grösserer Sicherheit und Leichtigkeit erreicht man seinen Zweck, wenn man, nach dem Vorschlage von v. Bruns³⁾, ein viereckiges Stück absägt, und sich folgenden Operationsverfahrens bedient. Der Hautschnitt läuft bogenförmig von der Gegend der Incisura auris am hinteren Rande des Unterkiefers um den Winkel herum nach Vorn bis zur Kreuzungsstelle der Art. maxill. externa. Mit vorsichtigen Schnitten dringt man bis auf die Parotis und löst die Haut von dieser so weit nach Vorn ab, dass ihr vorderer Umfang blossliegt und sie ohne andere Verletzungen, als die Durchschneidung der aus ihrem vorderen unteren Theile hervortretenden Aestchen des Facialis, nach Hinten und Oben zurückgeschlagen werden kann. Der Kieferast wird nun, vom hinteren Rande und namentlich vom Winkel anfangend, auf eine Strecke von 3—3½ Ctm. Höhe und 1—1½ Ctm. Breite mit Messer und Pincette blossgelegt, das entsprechende rhombische Knochenstück mit dem Osteotom oder der Scheibensäge in zwei Zügen umschnitten und demnächst von den seiner inneren Fläche anhaftenden Fasern des M. pterygoideus internus gelöst. Nach Entfernung desselben erscheint in dem Winkel, in welchem die beiden Knochenschnitte zusammenstossen, der Nerv gerade an seiner Eintrittsstelle in den Canalis alveolaris, kann leicht von den ihm lose anhaftenden Nachbartheilen getrennt und in hinreichender Ausdehnung resecirt werden.

b) von der Mundhöhle aus (nach Paravicini und Menzel).

Die Mundschleimhaut wird dicht (etwa 5 Millm.) hinter der vorderen Kante des Unterkieferastes durchtrennt, das Periost mit einem stumpfen Instrument bis zur Lingula abgedrängt, worauf der Nerv

¹⁾ l. c. pag. 233.

²⁾ Archiv für physiolog. Heilkunde 1859. pag. 226.

³⁾ l. c. pag. 938 u. flg.

er den eingeführten Finger fühlbar wird. Isolirt wird er mit einem Häkchen herausgehoben und entweder mit einer Pincette gefasst oder mittelst einer Aneurysma-Nadel mit einem Faden umschnürt und dann central und peripherisch durchschnitten. Die Blutung aus der A. alveolaris inf. ist gering. Die Verletzung des N. lingualis ist leicht zu vermeiden, wenn man die Incision der Schleimhaut unmittelbar unter dem vorderen Rande des Kieferastes ausführt, den N. alveolaris zunächst dicht an der Lingula mit einer Scheere durchtrennt und dann mit den etwas geöffneten Scheerenbranchen den Nerv entlang führt bis zu der Stelle, wo seine centrale Trennung vorgenommen werden soll. Zur besseren Fixirung des Nerven hat Menzel einen sehr zweckmässigen Haken nach Art eines Lithotriptors construirt¹⁾.

Durchschneidung des Nervus lingualis. — Roser, welcher diese Operation, wegen einer furchtbaren Neuralgie der Zunge, zuerst gemacht hat, spaltete die Wange vom Mundwinkel aus bis zum vorderen Rande des Kieferastes, zog die Zunge hervor und nach der entgegengesetzten Seite, durchschnitt die Mundschleimhaut dicht an der Zunge und konnte nun den Nerven hervorziehen und reseciren. Da sich hier alle Gebilde sehr zurück- und zusammenziehen, ist das Ausschneiden eines recht grossen Stücks zu empfehlen²⁾. — Da der Nervus lingualis dem Unterkiefernerve vor dessen Eintritt in den Kiefercanal sehr nahe liegt, so könnte man ihn auch an dieser Stelle, nach den für dessen Blosslegung angegebenen Vorschriften, aufsuchen und durchschneiden.

II. Hüftweh, Neuralgia ischiadica, Iachias (nervosa Cotogni), Névralgie sciatique, Névralgie fémoro-poplitée.

Der Ausgangspunkt der Schmerzen bei dem nervösen Hüftweh ist die Incisura ischiadica. Ihre Ausstrahlung folgt den Hautzweigen des Nervus ischiadicus, setzt sich weiter abwärts auf einen seiner Endäste (Tibialis oder Peroneus) oder auf beide fort und ist oft so heftig, dass krampfartige Bewegungen der Muskeln des leidenden Beines sich hinzugesellen. Zuweilen aber sind die Schmerzen auch milder, oder es besteht überhaupt statt ihrer nur ein unangenehmes Gefühl von Ameisenkriechen, welches aber plötzlich in die heftigsten Schmerzen übergehen kann, wenn das Bein angestrengt wird. Bei

¹⁾ Vgl. Menzel, die Resection des Unterkiefernerve vom Munde aus. Archiv f. Med. Chir. XIII. (1872) pag. 608. — Ich kann die Ausführbarkeit dieser Operation am Lebenden bestätigen.

²⁾ Archiv für physiol. Heilkunde, 1855, pag. 579.

längerem Bestehen führt Ischias zu Schwäche, Zittern, Abmagerung, endlich auch wohl Lähmung der leidenden Extremität. Unter den mancherlei Geschwülsten, welche durch Druck auf den Nervus ischiadicus Schmerzen nach seinem Verlauf erregen könnten, ist auch an die *Hernia ischiadica* (vgl. Bd. III.) und an *Varicosität* der *Vena ischiadica* zu denken. Bei beiden würde die vielgerühmte Behandlung mit Abführmitteln nützlich sein. Gewöhnlich ist Ischias durch Erkältung herbeigeführt, und die antirheumatischen, sowohl inneren als äusseren Mittel erweisen sich nützlich. Besonders bewährt ist unter letzteren die Anwendung der Blasenpflaster, welche man in entsprechender Grösse entweder nahe der *Incisura ischiadica*, am *Capitulum fibulae* und an den Malleolen, oder aber in langen Streifen nach der Richtung des Schmerzes applicirt. Auch *Veratrinsalbe* wird gelobt. Die schnellste und entschiedenste, aber keineswegs immer dauerhafte Wirkung hat die hypodermatische Einspritzung narkotischer Lösungen. Unter den inneren Mitteln werden besonders *Ol. ricini*, *Colchicum*, *Kalium jodatum*, *Sublimat*, *Terpenthinöl*, auch *Arsenik* gerühmt.

Nur in ganz verzweifelten Fällen könnte man sich zu der von *Malagodi* empfohlenen und ausgeführten *Resection* des Nerv. *ischiadicus* entschliessen. Bei Ausführung derselben liegt der Patient auf dem Bauche. Etwa 8 Centim. oberhalb der Kniekehle macht man einen 5 Centm. langen Schnitt, welcher in der Mitte der hinteren Fläche des Oberschenkels 5 Centm. aufwärts geführt wird, durch Haut und *Fascia lata*. Der *Biceps* wird nach Aussen, das Muskelfleisch der übrigen Beuger nach Innen gezogen, worauf man in der Tiefe den Nerven findet, bei gebeugtem Unterschenkel hervorzieht und etwa 4 Centim. aus ihm ausschneidet. *Malagodi* sah nach dieser Operation den Schmerz verschwinden, aber es folgte (wie vorauszusehen) dauernde Lähmung des Unterschenkels und Fusses und das Gefühl von Ameisenkriechen stellte sich doch wieder ein. Vgl. pag. 299.

In denjenigen Fällen, wo der Schmerz schon in der *Incisura ischiadica* beginnt, würde diese Durchschneidung in der Mitte des Oberschenkels gar keinen Nutzen gewähren können, die Ausschneidung eines Stückes aus dem unmittelbar an der *Incisura ischiadica* gelegenen Theile des Nerven aber als eine an sich gefährliche und doch nicht einmal vor *Recidiven* sicherstellende Operation zu unterlassen sein.

Viertes Capitel.

Entzündung der Nerven. Neuritis.

Der Symptomen-Complex, welchen wir als *Neuralgie* bezeichnen, kann das Resultat entzündlicher Veränderungen am Nerven sein; dann ist also die *Neuritis* der Grund einer *Neuralgie*. Aber *Neuralgien* beruhen, wie wir sahen, oft auch auf anderen, zum grossen Theil unserer Beobachtung noch gar nicht zugänglichen Veränderungen. So-

Man kann man Neuritis und Neuralgie einander nicht als verschiedene Krankheiten gegenüberstellen; erstere ist eine bestimmte Erkrankung des Nerven, Neuralgie dagegen ein schmerzhaftes Uebel, welches auf sehr verschiedenen Erkrankungen beruhen kann.

Alle Verletzungen der Nerven, namentlich auch Quetschungen, ausserdem sogenannte rheumatische Einflüsse und, nach der Ansicht anderer Autoren, auch geistige Aufregungen und der Missbrauch erregender Substanzen, wie z. B. des Kaffee's, können Neuritis verursachen. Kräftige Männer von sanguinischem Temperament sollen häufiger von dieser Krankheit befallen werden, als Frauenzimmer. Die Gefässarmuth der Nerven dürfte als der Grund zu betrachten sein, weshalb primäre Neuritis selten vorkommt. Von benachbarten Organen und Geweben kann aber eine Entzündung ebenso gut auf die Nerven, wie auf andere Theile übergehen (secundäre Neuritis).

Die gröberen anatomischen Veränderungen, welche man an entzündeten Nerven findet, sind: Injectionsröthe des Neurilems, bald circumscripirt, bald diffus, oft nur schwach entwickelt, ferner eine schmutzig graue Färbung und Verminderung oder gänzlichliches Fehlen der Elasticität der Nervenfasern. Zuweilen finden sich mitten im Nervengewebe härtere Stellen oder kleine Knötchen, welche durch ein Exsudat gebildet sind; in anderen Fällen ist der entzündete Nerv verdickt, aber zugleich erweicht, das Neurilem getrübt, stark geröthet und mit Exsudatklümpchen besetzt.

Die Symptome der Neuritis sind immer diejenigen einer gestörten Leitung in dem erkrankten Nerven, Anfangs mit Erregung, später, wenn die Krankheit nicht rückgängig wird, mit Lähmung. Sie müssen also verschieden sein, je nachdem ein rein sensitiver oder ein motorischer, oder endlich ein gemischter Nerv erkrankt ist, verschieden ferner, je nach der Intensität und dem Stadium der Krankheit. So werden also bei Entzündung eines sensitiven Nerven Anfangs nach seiner Verbreitung ausstrahlende Schmerzen, später Empfindungslosigkeit oder doch Abschwächung der Empfindung in seinem Gebiete, bei Entzündung rein motorischer Nerven Krämpfe und später Lähmung der entsprechenden Muskeln, bei Entzündung gemischter Nerven (dem häufigsten Falle) eine Combination beider Symptomengruppen beobachtet. Der Schmerz bei der acuten Neuritis ist andauernd und steigert sich fort und fort, ohne seine Natur zu verändern, während andere neuralgische Schmerzen wie der Blitz aufschossen und bald stechend, bald brennend, bald zerrend und drückend sind. Durch Druck werden die Schmerzen bei der Neuritis gesteigert, bei der gewöhnlichen Neuralgie nicht. Die den entzündeten

deten Nerven bedeckende Haut ist, besonders wenn er oberflächlich liegt, geröthet, von höherer Temperatur und etwas angeschwollen. In seltenen Fällen gelingt es auch, eine Anschwellung des Nerven selbst zu constatiren. Die unterscheidenden Symptome sind aber oft sehr schwer herauszufinden, besonders wenn es sich um Neuritis chronica handelt. Dies gilt besonders für den Nerv. ischiadicus, dessen chronische Entzündung gewiss nur zu oft ohne Weiteres als „Ischias“ betrachtet wird. Vgl. pag. 307.

Die Behandlung muss zuerst, wo möglich, der Indicatio causalis sich zuwenden. Oertliche Blutentziehungen werden dann, je nach der Heftigkeit des Falles, ein- oder mehrmal anzuwenden sein, ferner Eisumschläge, späterhin, zumal bei der chronischen Form, Bäder und Ableitungen auf die äussere Haut, besonders durch Blasenpflaster. Innerlich giebt man beruhigende Mittel.

Von den Neubildungen (Geschwülsten) in und an den Nerven — Neuroma, Pseudoneuroma, Tuberculum dolorosum — wurde bereits Bl. I. pag. 432 u. fgd. gehandelt.

Siebenter Abschnitt.

Von den Krankheiten der Knochen.

Erstes Capitel.

Verletzungen der Knochen, Continuitätstrennungen der Knochen, *Laesiones continuitatis ossium*.

A. Von den Verletzungen der Knochen im Allgemeinen.

Continuitätstrennungen der Knochen werden veranlasst:

a) durch scharfe oder doch wegen ihrer grossen Gewalt (Bewegungsgeschwindigkeit) diesen ähnlich wirkende stumpfe Körper¹⁾, oder aber

b) durch eine Gewalt, welche, mit relativ grosser Berührungsfäche einwirkend, den Knochen zerreisst oder zerbricht.

Im ersteren Falle heisst die Verletzung „Knochenwunde“, im letzteren dagegen im Allgemeinen „Knochenbruch“. Erstere ist sowohl in ihrer Localität, als in ihrer Ausdehnung von der unmittelbaren Berührung des verletzenden Körpers abhängig; bei dem Knochenbruch ist dies nicht der Fall.

Wird durch eine Gewalt, welche bei einem Erwachsenen voraussichtlich einen Knochenbruch bewirkt haben würde, in einem Körper, dessen Wachsthum noch nicht vollendet ist, eine Trennung an der Stelle, wo Diaphyse und Epiphyse eines Röhrenknochens aneinander stossen, bewirkt, so nennt man diese Verletzung „traumatische Ablösung (*décollement*) der Epiphyse“.

Die Quetschung der Knochen macht sich fast überall nur durch die nachfolgende Entzündung bemerklich und erheischt in

¹⁾ Vgl. Bd. I. pag. 626 u. f.

therapeutischer Beziehung keine andere Berücksichtigung als die Knochenentzündung. Vgl. Cap. II.

I. Knochenbrüche. *Fracturae* ¹⁾.

Knochenbruch nennen wir eine Continuitätstrennung eines Knochens, welche durch eine Gewalt herbeigeführt ist, die plötzlich die Form des Knochens zu verändern strebte. Die einwirkende Gewalt kann entweder eine absolut äussere sein oder im Organismus selbst durch Muskelzusammenziehung entwickelt werden. Man hat sich vielfach bemüht, eine genaue und in jeder Beziehung genügende Definition eines Knochenbruches zu geben; die deutsche Bezeichnung „Knochenbruch“ sagt aber Alles, was sich darüber ohne Künsteln sagen lässt: Trennung durch Zerbrechen.

Verschiedenheiten der Knochenbrüche. Die *Fracturae* bieten (abgesehen von den Eigenthümlichkeiten, die durch die Körperstelle, an welcher sie vorkommen, bedingt werden) zahlreiche Verschiedenheiten dar, welche sich namentlich auf den Grad der Trennung, auf die Richtung derselben, auf die Stellung der Bruch-Enden gegen einander (die Verschiebung derselben) beziehen.

1) Was die Zahl der zugleich an einem Körper bestehenden *Fracturae* betrifft, so finden sie sich gewöhnlich vereinzelt; zuweilen aber sind mehrere, sogar viele Knochen gleichzeitig gebrochen und zwar entweder an verschiedenen Körpertheilen oder auch an demselben, sofern er mehrere Knochen enthält. Mehrfache Knochenbrüche in letzterem Sinne, *Fracturae compositae*, finden sich namentlich an den Rippen, am Vorderarm und an der Hand, am Unterschenkel und am Fuss.

2) In Bezug auf den Grad der Trennung unterscheiden wir vollständige und unvollständige Knochenbrüche.

a) Als unvollständige Knochenbrüche, *Fracturae incompletae*, Einknickungen, *Infractiones*, werden solche *Fracturae* bezeichnet, die nur einen Theil der Dicke des Knochens durch-

¹⁾ Hauptwerke über die Knochenbrüche sind: E. Gurll, Handbuch der Lehre von den Knochenbrüchen, mit eingedruckten Holzschnitten. Berlin, 1862 u. f. (1. Lief. schon 1860); Malgaigne, *Traité des Fractures et des Luxations*. Tom. I. *Des Fractures* (mit Abbildungen), Paris, 1847. Deutsch von Burger. — Zu vergleichen sind ferner; Middeldorpf, Beiträge zur Lehre von den Knochenbrüchen, Breslau, 1853; Paul, Die conservative Chirurgie der Glieder, Breslau 1854, 2te Aufl. 1859; Ravoth, Klinik der Knochen- und Gelenk-Krankheiten Berlin, 1856.

ngen. Diese von Vielen für unmöglich gehaltene Varietät ist durch neuere Erfahrungen (zumal bei Kindern) ausser Zweifel gesetzt.

Fig. 24 stellt einen, bei einem Kinde von 12 Jahren, von da beobachteten unvollständigen Bruch des Radius dar, welcher durch eine auf die Dorsalseite des Knochens, bei *a*, einwirkende Gewalt entstand. Auf der Volarseite ist die Substantia compacta zerbrochen, bei *b* die Substantia spongiosa getrennt.

Fig. 24.



Vidal hat bei Kindern sogar beobachtet, dass die Substantia compacta im ganzen Umfange des Knochens vollständig getrennt war, während ein Theil der Substantia spongiosa der einwirkenden Gewalt widerstanden hatte, und daher die Continuität des Knochens noch in gewissem Grade unterhielt.

Unvollständige Brüche sind an den Rippen, am Schlüsselbein, am Femur, an der Fibula und Tibia, am Häufigsten aber an den Vorderarmknochen beobachtet worden.

Die Sprünge oder Spalten der Knochen, Fissurae, sind ebenfalls unvollständige Knochenbrüche, welche aber gewöhnlich nur zugleich mit vollständigen Brüchen vorkommen (vgl. Fig. 25 u. 26). Als Fissur bezeichnet zu werden, darf der Bruch weder einen Theil des Knochens von dem übrigen ganz abtrennen, noch auch in der Trennungslinie klaffen.

b) Vollständige Knochenbrüche, Fracturae completae. Der Bruch dringt durch die ganze Dicke des Knochens; die Continuität desselben ist daher vollständig aufgehoben.

Man unterscheidet verschiedene Unterarten der vollständigen Knochenbrüche. Der Knochen ist nur an einer Stelle seiner Länge zerbrochen: Fractura simplex oder an mehreren Stellen: Fractura duplex, triplex, multiplex.

Ist ein Knochen in viele kleine Stücke zerbrochen, so nennt man dies Splitterbruch, Fractura comminuta, die einzelnen Stücke aber Bruchsplitter, Knochensplitter oder schlechtweg Splitter. Man unterscheidet, nach Dupuytren, drei Arten derselben. Primäre Splitter nennt man diejenigen, welche vollständig abgestoßen sind und mit keinem anderen Theile mehr in irgend welcher Verbindung stehen. Nach der älteren Ansicht sind sie als fremde Körper zu betrachten, welche unter keiner Bedingung wieder anheilen können. Nach den Untersuchungen von Cruveilhier dagegen ist letzteres möglich, und aus allgemeinen Gründen lässt sich an dieser Möglichkeit allerdings nicht zweifeln, obgleich sie gewiss selten zur Wirklichkeit wird. Secundäre Splitter sind solche, die noch mit

den benachbarten Theilen in Verbindung stehen, späterhin aber entweder durch die nachfolgende Eiterung abgelöst und somit auf den Zustand der primären Splitter reducirt werden, oder mit der neugebildeten Knochenmasse verschmelzen und diese verstärken. Tertiäre Splitter sind diejenigen, welche erst allmählig durch Entzündung und Nekrose von den Bruch-Enden sich ablösen; ihre Entstehung ist durch eine heftige Quetschung des Knochens bedingt. Sie sind eigentlich keine Knochensplitter, sondern gewöhnliche Sequester (vgl. Nekrose). Streichen wir die letztere Art, wie dies mit Recht geschehen kann, aus der Reihe der Knochensplitter, so lässt sich die Dupuytren'sche Classification auf die Unterscheidung vollkommen und unvollkommen abgelöster Splitter zurückführen.

Von der *Fractura comminuta* hat man die Zerschmetterung eines Knochens, *Fractura quassa s. conquassata*, unterschieden, bei welcher die Knochensplitter ineinander geschoben, einer in den anderen eingekeilt sind, wie dies besonders bei Brüchen spongöser Knochen beobachtet wird.

Fig. 25.



Ist von einem Knochen nur ein kleines Stück, namentlich ein Fortsatz oder ein Theil eines Fortsatzes abgebrochen, so heisst dies Absprengung.

Bei vollständigen Brüchen ist fast immer zugleich das Periost in demselben oder in noch grösserem Umfange, als der Knochenbruch besteht, zerrissen und abgelöst. Bei unvollständigen Brüchen fehlt eine Zerreiſsung der Knochenhaut entweder gänzlich oder ist wenigstens auch nur unvollständig vorhanden. Diejenigen vollständigen Brüche, welche ohne Zerreiſsung des Periost bestehen, nähern sich in vielen Beziehungen, besonders in Betreff der grösseren Leichtigkeit des Heilvorganges, den unvollständigen Knochenbrüchen.

3) Die Richtung des Bruches kann eine verschiedene sein. Man unterscheidet in dieser Beziehung Schrägbrüche, Querbrüche und Längsbrüche.

a) Schrägbrüche, *Fracturae obliquae* (Fig. 25 im unteren Ende), sind die häufigsten und bieten, je nach der Richtung oder dem Grade, in welchem sie gegen die Längsachse des Knochens schräg verlaufen, zahlreiche Verschiedenheiten dar.

Sie entstehen in der Mehrzahl der Fälle nicht durch eine direct einwirkende Gewalt, sondern durch Gegenschlag (vgl. Aetiologie).

Fig. 26.



Zuweilen ist ein Schrägbruch mit einem Querbruch in der Weise combinirt, dass die eine Hälfte des Knochens schräg, die andere quer gebrochen ist (Fig. 26). Hierbei kann die Bruchlinie sich, wie in Fig. 26 auf der äusseren Seite, fast longitudinal oder auch in Schraubenwindungen weit fortsetzen, wodurch keilförmige und anderweitig zugespitzte Bruch-Enden entstehen. Solche Brüche scheinen vorzugsweise durch gewaltsame Rotation des einen Knochen-Endes bewirkt zu werden¹⁾.

Fig. 27.



b) Querbrüche, *Fracturae transversae* (Fig. 25, im oberen Ende beider Knochen), nach Malgaigne: gezähnte Brüche, — weil sie niemals eine geradlinige Bruchfläche, sondern immer deutliche Zähnelung darbieten —, kommen sel-

ter als Schrägbrüche und gewöhnlich nur in Folge einer direct wirkenden äusseren Gewalt vor.

c) Längsbrüche, *Fracturae longitudinales*, — welche von einzelnen Wundärzten gänzlich geleugnet, von anderen für höchstens erklärt, von Sanson als ungemein schräg verlaufende Brüche betrachtet werden, — bestehen gewöhnlich zugleich mit einem andern (queren oder schrägen) Bruche: der Knochen ist mehr oder weniger vollständig in querer Richtung getrennt, das eine Bruch-Ende ist ausserdem der Länge nach gespalten, es findet sich ein oft sehr weit reichender Sprung in ihm; vgl. Fig. 26 u. 27 im unteren Bruch-Ende²⁾. Längsbrüche sind viel häufiger Sprünge oder Spalten im Knochen, als vollständige Knochenbrüche.

¹⁾ Vgl. W. Koch, Einiges über sog. keilförmige und spiralige Fracturen. Archiv f. Clin. Chirurg. Bd. XV. pag. 689 ff.

²⁾ Beide Figuren sind von Vidal nach der Natur gezeichnet; die Knochenbrüche wurden am Cadaver durch gewaltsames Anschlagen des Unterschenkels gegen einen grossen Stein hervorgebracht.

4) **Verschiebung der Bruch-Enden.** Die Bruch-Enden bleiben nur dann in ihrer normalen Lage, wenn die einwirkende Gewalt nicht gross war, wenn in ihrer Nachbarschaft ein oder mehrere andere Knochen sich finden, welche die Verschiebung hindern und gleichsam als Schienen dienen, oder wenn die zackigen Ränder derselben so ineinander greifen, dass sie sich gegenseitig stützen und festhalten, endlich auch, wenn die Muskeln und Bänder des fracturirten Theils sich oberhalb und unterhalb der Bruchstelle, dieselbe gleichsam umfassend, in solcher Weise inseriren, dass sie von allen Seiten her einen gleichmässigen Druck ausüben und sich einander das Gleichgewicht halten. Sonst aber kommt bei allen Knochenbrüchen alsbald eine mehr oder weniger bedeutende Verschiebung der Bruch-Enden zu Stande, theils auf Grund der nach dem Zerbrechen des Knochens noch weiter fort wirkenden äusseren Gewalt, theils durch die Wirkung der Muskeln, deren Spiele die von einander getrennten Knochen-

Fig. 28.



stücke alsdann überlassen sind, theils endlich an den unteren Extremitäten durch das auf dem oberen Bruch-Ende lastende Gewicht des Körpers, wenn der Verletzte den Versuch macht, mit der fracturirten Extremität aufzutreten.

Als besondere Arten der Verschiebung werden, vorzüglich mit Berücksichtigung der Extremitäten-Knochen, folgende unterschieden:

a) *Dislocatio ad directionem s. ad axin.* Die Bruch-Enden bilden einen (meist nach der Seite der schwächeren Muskeln) vorspringenden Winkel. Das Glied erscheint dabei an dieser Seite ausgebogen, oder die, vielleicht auch im normalen Zustande bestehende Biegung des Knochens ist doch bedeutend erhöht; so bildet z. B. das Oberschenkelbein, wenn es fracturirt ist, eine stärkere Convexität nach Vorn, als im normalen Zustande, weil die Muskeln an der hinteren Seite des Schenkels das Uebergewicht haben (Fig. 28¹⁾). Diese Art der Verschiebung findet sich hauptsächlich bei Quer- und bei Splitter-Brüchen, kann aber auch bei anderen Arten der Brüche und mit anderen Arten der Verschiebung combinirt

¹⁾ Fig. 28 (nach einem Präparat von Sédillot) zeigt ausserdem eine unregelmässige und unförmige Callus-Bildung, sowie cariöse Zerstörung des Gelenkkopfes.

vorkommen. Nicht selten entsteht sie erst nachträglich durch unzuweckmässige Lagerung des gebrochenen Gliedes. Wird sie durch die Thätigkeit der Muskeln bedingt, so entspricht stets die Concavität der Krümmung derjenigen Seite des Gliedes, wo die stärkeren Muskeln liegen ¹⁾. Zuweilen wird nur eins der Bruch-Enden verschoben, weil nur an ihm sich hinreichend wirksame Muskeln anheften. Diese winklige Verschiebung der Bruch-Enden ist die einzig mögliche bei Fracturen ohne ZerreiSSung des Periost, ferner bei unvollständigen und bei stark gezähnten Brüchen.

b) *Dislocatio ad latus* kommt hauptsächlich bei Querbrüchen vor. Ist sie vollständig entwickelt, so stehen die Bruchflächen nirgend mehr mit einander in Berührung, indem beide Bruch-Enden nach verschiedenen Seiten oder aber eins derselben sehr stark nach der einen Seite ausweichen. Bei dieser seitlichen Verschiebung besteht gewöhnlich zugleich Verkürzung des gebrochenen Theils, indem das untere Bruch-Ende neben dem oberen in die Höhe gleitet. Ist die *Dislocatio ad latus* (wie bei Querbrüchen gewöhnlich) nur unvollkommen, so dass die Bruchflächen zum Theil einander noch berühren, so kann eine Verkürzung nicht daraus hervorgehen, wohl aber können sich die anderen Arten der Verschiebung damit combiniren. Die Veranlassung der seitlichen Verschiebung ist zuweilen die einwirkende Gewalt selbst, zuweilen das Gewicht des unterhalb der Bruchstelle gelegenen Theiles der Extremität; zuweilen wird durch Muskelzug eines der Bruch-Enden gegen das andere seitlich verschoben.

c) *Dislocatio ad longitudinem*. α) Das eine Bruch-Ende ist neben dem anderen in die Höhe geschoben, so dass das Glied verkürzt ist. Dies ereignet sich besonders bei Schrägbrüchen (natürlich immer zugleich mit einem gewissen Grade der *Dislocatio ad latus*), bei Querbrüchen, wie schon erwähnt, nur dann, wenn eine vollständige *Dislocatio ad latus* besteht. Am Häufigsten wird diese Art der Verschiebung durch Zusammenziehung der Muskeln bedingt, in anderen Fällen durch das Gewicht des Körpers, zuweilen durch weitere Einwirkung der fracturirenden Gewalt. Jedenfalls wird diese Verschiebung durch die Zusammenziehung der Muskeln unterhalten, und oft, nachdem sie beseitigt ist, aufs Neue herbeigeführt. Daher ist die Kraft und der Grad der Spannung der auf das untere Bruch-Ende wirkenden Muskeln in dieser Beziehung von grosser Bedeutung. — β) Das eine Bruch-Ende ist in das andere eingekeilt (*Gom-*

¹⁾ Schon Hippokrates sagt: „Alle Knochen, die von der Natur nach einer Seite hin ausgebogen sind, haben, wenn sie gebrochen werden, die Neigung, sich nach dieser Seite hin zu verschieben.“

phosis), wodurch auch einige Verkürzung der Extremität bewirkt wird¹⁾.
 — γ) Eine scheinbare Verlängerung des Knochens, *Dislocatio ad longitudinem cum elongatione*, *Distractio* s. *Diastasis ossium*, kann dadurch herbeigeführt werden, dass die Bruch-Enden durch die an ihnen befestigten Muskeln in der Richtung der Längsachse des Gliedes nach verschiedenen Seiten gezogen werden, oder das eine an seiner Stelle bleibt, das andere aber fortgezogen wird; dies wird fast ausschliesslich bei Querbrüchen des Olecranon und der Patella beobachtet²⁾.

d) *Dislocatio ad peripheriam*. Das eine Bruch-Ende (gewöhnlich das untere) ist um seine Längsachse gedreht und mit ihm der entsprechende Theil der Extremität, während das andere in normaler Stellung geblieben ist (vgl. Fig. 26). Diese Verschiebung wird gewöhnlich durch das Gewicht des unterhalb der Bruchstelle gelegenen Theiles der Extremität, seltener durch die einwirkende Gewalt oder durch die Zusammenziehung von Muskeln bedingt.

Die verschiedenen Arten der Verschiebung können sich mit einander combiniren; insbesondere besteht Verkürzung fast niemals ohne seitliche Verschiebung. Kommt zu letzteren beiden Arten der Dislocation noch eine winklige Verschiebung hinzu, so entsteht Kreuzung der Bruch-Enden (Reiten des einen Bruch-Endes auf dem anderen, *chevauchement*), welche, abgesehen von der bedeutenden Difformität, den Uebelstand herbeiführt, dass die Bruchflächen einander gar nicht berühren.

Einfache und complicirte Fracturen. Ausser diesen, die mechanischen Verhältnisse des zerbrochenen Knochens betreffenden Veränderungen findet man bei jedem Knochenbruch auch Verletzungen der benachbarten Weichtheile. So lange diese auf Zerreiſſung des Periost und der dem Knochen nahe gelegenen Muskeln beschränkt bleiben, haben sie eine untergeordnete Bedeutung. Sobald aber grössere Gefässe oder Nerven, entweder durch die einwirkende Gewalt selbst, oder durch die sich verschiebenden Bruch-Enden zerriſſen sind, oder die Umgegend der Fractur in hohem Grade gequetscht, ein benachbartes Gelenk verrenkt, endlich mit dem Bruche zugleich eine Zerreiſſung oder anderweitige Verletzung der Haut zu Stande gekommen ist, so dass die Bruchstelle selbst gesehen oder gefühlt werden kann, dann handelt es sich nicht mehr um eine einfache Fractur, wie wir sie bisher vorausgesetzt und auch im Folgenden

¹⁾ Auf diese Art der Verschiebung, welche am Häufigsten bei Brüchen des Schenkelhalses vorkommt, hat bereits J. L. Petit aufmerksam gemacht.

²⁾ Ueber *Diastasis suturarum cranii* vgl. Bd. III.

zunächst zu betrachten haben, sondern um eine viel üblere Verletzung, welche im Allgemeinen als complicirte Fractur bezeichnet wird. Dieser vielfach gebrauchte Name wird aber von verschiedenen Autoren in nicht ganz gleichmässiger Weise angewandt, indem einer Seits die englischen Aerzte z. B. unter „*complicated fracture*“ immer einen Knochenbruch mit gleichzeitiger Verletzung der ihn bedeckenden Haut verstehen, während anderer Seits manche deutsche und französische Schriftsteller unter complicirten Fracturen nicht blos diejenigen begreifen, welche von einer der oben aufgeführten bedeutenden Nebenverletzungen begleitet sind, sondern auch solche, mit denen zugleich irgend eine andere örtliche oder allgemeine Krankheit im Organismus besteht. Jedenfalls versteht man unter einer complicirten Fractur im engeren Sinne auch bei uns eine solche, die mit Verletzung der bedeckenden Weichtheile und dadurch bedingter Blosslegung der Bruchstelle complicirt ist. Vgl. Bd. I. pag. 623 u. f.

Sectionsbefund. Hat man Gelegenheit einen Knochenbruch innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Verletzung zu untersuchen¹⁾, so findet man die Bruch-Enden von einer ansehnlichen Quantität geronnenen Blutes umgeben, welches auch in die Markhöhle des Knochens wie ein Pfropf eindringt und die durch Zerreiſung der Muskeln entstandenen Zwischenräume ausfüllt. Das Periost ist in verschieden grosser Ausdehnung von dem Knochen abgelöst und fast immer zerrissen; die Fetzen desselben sind in das Blutgerinnsel gleichsam eingebettet. Als Quellen der Blutung ergeben sich die Gefässe des gebrochenen Knochens selbst, besonders diejenigen der Marksubstanz, ferner diejenigen der zerrissenen Muskeln und die zufällig in der Nachbarschaft des Knochens liegenden; es kann, wie schon erwähnt, selbst der Haupt-Arterienstamm zerrissen oder anderweitig verletzt gefunden werden. War der Bruch durch eine direct einwirkende Gewalt entstanden, so sind die zwischen der Haut und dem Knochen gelegenen Theile sämmtlich in hohem Grade gequetscht; daher zeigen sich die Bindegewebs-Schichten und oft auch die Muskeln von Blut erfüllt. Ueberall, wo die rauhen Bruch-Enden mit den Weichtheilen in Berührung kommen, findet man Zerreiſung und Quetschung. Aus diesem Befunde lässt sich ermessen, in welcher Ausdehnung, selbst bei einfachen Knochenbrüchen, später Entzündung eintreten muss, sobald die Bruch-Enden nur einiger Maassen ver-toben sind — und bleiben.

¹⁾ Eine solche Gelegenheit bietet sich selten dar; vgl. Gurlt, Handb. pag. 277 u. f.

Aetiologie. Die Ursachen der Knochenbrüche sind theils prädisponirende, theils Gelegenheitsursachen. Erstere sind wiederum örtliche oder allgemeine.

Die örtlichen Prädispositionen sind theils physiologische, theils pathologische. Zu ersteren gehören: 1) oberflächliche Lage der Knochen, 2) grössere Länge, welche ein Zerbrechen durch Hebelwirkung begünstigt, und 3) ihre Function, beim Aufheben schwerer Lasten oder anderen Anstrengungen und beim Fallen des Körpers theils dem Muskelzuge, theils dem Körpergewicht, Widerstand zu leisten. Durch oberflächliche Lage wird zu directen, durch Länge und Function zu indirecten Brüchen die Prädisposition gegeben (vgl. p. 329). Letztere sind bei Weitem die häufigsten und entstehen meist in Folge eines Falles. Daher sind denn Radius und Tibia die am Häufigsten gebrochenen Extremitäten-Knochen, weil man gewöhnlich entweder mit den Händen oder mit den Füßen beim Fallen den Boden berührt. — Die pathologischen Verhältnisse, welche eine locale Prädisposition bedingen, sind: Atrophie der Knochen (z. B. in einem gelähmten Gliede), Knochen-Entzündung und deren Ausgänge (Caries und Nekrose), ein Aneurysma, welches den Knochen verdünnt, eine im Knochen selbst entwickelte, nicht knöcherne Geschwulst.

Auch die allgemeinen (auf den ganzen Organismus sich beziehenden) Prädispositionen sind theils physiologische, theils pathologische. Unter den ersteren wird vor Allem das höhere Alter aufgeführt, indem durch dasselbe Atrophie oder Rarefaction des Knochengewebes, besonders der Substantia compacta und dadurch eine geringere Festigkeit bedingt wird. Diese Prädisposition kommt verhältnissmässig selten in Betracht, weil alte Leute sich seltener den Gelegenheitsursachen der Knochenbrüche aussetzen; wirkt aber eine solche auf ihr Skelet ein, so kann man mit Sicherheit eine Fractur erwarten. Im mittleren Lebensalter sind Knochenbrüche häufiger, weil der Körper während desselben am Meisten solchen Zufällen ausgesetzt wird, welche Knochenbrüche bewirken. Dass nur dies der Grund ihrer relativen Häufigkeit bei Individuen von mittlerem Alter ist, geht deutlich daraus hervor, dass sie beim weiblichen Geschlechte, welches durch die Art seiner Beschäftigung solchen Zufällen weniger ausgesetzt ist, in diesem Alter viel seltener vorkommen. Die äusseren Einflüsse, die Art der Beschäftigung, der Grad der Gefahr, einen Knochenbruch zu erleiden, welcher durch dieselbe bedingt wird, sind überhaupt bei der Beurtheilung der Prädisposition zu Fracturen, welche diesem oder jenem Lebensalter zugeschrieben wird, von der grössten Wichtigkeit. Vor dem zweiten Jahre sind Knochenbrüche

gemein selten¹⁾. Der Grund davon ist, dass die Kinder bis zu dieser Zeit sich noch gar nicht selbstständig oder doch unter Aufsicht bewegen. Auch sind ihre Knochen mehr als jemals zu einer späteren Zeit des Lebens durch das starke Fettpolster geschützt. Jenseit des zweiten Jahres werden Knochenbrüche bei Kindern häufiger und zwar werden sie sich vom zweiten bis zum vierten Jahre während des ganzen Kindesalters in der relativ grössten Häufigkeit, offenbar weil gerade zu dieser Zeit die Kinder sich zwar schon selbstständig und gewöhnlich ohne besondere Aufsicht, aber noch nicht mit voller Sicherheit bewegen. Das Jünglings- und Mannes-Alter, welches durch Erlernung und Ausübung der Gewerbe und durch die Benutzung der vollständig entwickelten Muskelkräfte, durch Raufereien und Kriegsdienst den Mann am Häufigsten in die Lage bringt, sich den Gelegenheitsursachen der Knochenbrüche auszusetzen, ist auch (für das männliche Geschlecht) dasjenige, welches am Häufigsten Fracturen darbietet.

Knochenbrüche sind verschieden häufig in den verschiedenen Jahreszeiten. Da man im Winter mehr Gelegenheit hat, auf ebener Erde zu fallen, als im Sommer, so kommen Knochenbrüche bei alten Leuten häufiger in jener, als in dieser Jahreszeit vor. Für das mittlere Lebensalter verhält es sich umgekehrt, weil für dieses im Sommer während der grossen Bauarbeiten u. dgl. die Gelegenheit zu Knochenbrüchen häufiger vorhanden ist, als im Winter. Dasselbe Verhältniss findet für das kindliche Alter Statt, weil die Kinder im Sommer sehr sich selbst überlassen umherspringen, als im Winter²⁾.

Als pathologische Prädispositionen sind fast alle Dyskrasien aufgeführt worden, besonders die scorbutische, syphilitische, mercurielle, krebsige und arthritische. Viele der Thatsachen, welche zur Begründung dieser Annahme aufgeführt worden sind, halten eine strengere Kritik nicht aus. So erzählt Fabricius Hildanus von einem alten Gichtkranken, der beim Anziehen eines Handschuhes den Arm brach; genaue Untersuchung dieses Falles lehrt, dass der Humerus cariös war. In ähnlicher Weise verhält es sich mit vielen anderen Beobachtungen. Auch beim Krebs ist die Knochenbrüchigkeit keineswegs eine constante, vielmehr eine seltene Erscheinung

¹⁾ Ich habe einmal eine Fractura femoris bei einem Kinde von 1½ Jahren in Folge eines Falles aus der Wiege, einmal Fractura claviculae bei einem einjährigen Kinde, nach einem Fall auf ebener Erde, gesehen.

²⁾ Vgl. Malgaigne, études statistiques sur les fractures et les luxations, in den Annales d'hygiène, Tom. XXII. pag. 241. — E. Gurtt, Beiträge zur Statistik der Fracturen etc. Deutsche Klinik 1857, Monatsbl. 1, und Archiv f. klin. Chirurgie, 1862, Bd. III. pag. 395.

und hängt überdies relativ oft davon ab, dass im Knochen selbst Krebsgeschwülste sich entwickelt haben. Im Allgemeinen ergeben genaue Untersuchungen als eigentlichen Grund der pathologischen Prädisposition immer nur eine locale oder allgemeine Atrophie (Rarefaction) des Knochengewebes¹⁾. Wir werden hierauf im nächsten Capitel zurückkommen.

Die Gelegenheitsursachen, d. h. die unmittelbaren Veranlassungen der Knochenbrüche, sind theils innere, theils äussere.

Innere Ursachen von Knochenbrüchen sind die Contractionen der Muskeln. Diese sind aber, selbst bei grösster krampfhafter Spannung, doch nur selten im Stande, an und für sich eine Fractur zu bewirken, wenn nicht schon eine andere Ursache in der vorstehend geschilderten Weise vorbereitend eingewirkt hat.

Fälle der Art sind u. A. von Goyrand beobachtet worden. Ein Mann brach den Oberarm, indem er einen Korb voll Trauben aufheben wollte. Der Knochenbruch heilte zwar; aber in der Umgegend entstand eine so bedeutende Eiterung, dass man sich zur Exarticulation des Armes bewegen fand. Da zeigte sich dann eine ausgebreitete Nekrose des Knochens. — Derselbe beobachtete einen Bruch des Halses des Oberarmbeins, welcher durch die beim Werfen einer Kugel angewandte Muskelgewalt herbeigeführt war. Es erfolgte Heilung; aber der Kranke starb an einem Osteosarcom, welches sich von der Bruchstelle aus entwickelte und welches also wahrscheinlich schon vorher an dieser Stelle bestanden hatte. — Aehnlich verhielt es sich bei einem jungen Mädchen, die den Humerus brach, indem sie sich leicht aufstützte; ich fand an der Bruchstelle ein Osteosarcom, welches ich durch Resection entfernte (vgl. Cap. III).

Man hat aber in einzelnen Fällen auch bei ganz gesunden Subjecten und an ganz gesunden Knochen durch blosser Muskelcontraction Fracturen entstehen sehen, besonders am Olecranon, an der Patella, an der Ferse, am Oberarm im oberen Drittheil. Vgl. die Fracturen der einzelnen Knochen.

Besonders zu erwähnen sind diejenigen Fracturen, welche innerhalb des Uterus am Skelet des Fötus zu Stande kommen und zuweilen in grosser Anzahl an einem Kinde gefunden werden. Dieselben können, wie Gurlt²⁾ nachgewiesen hat, durch äussere Gewaltthätigkeit veranlasst werden, ohne dass deshalb auch am mütterlichen Körper Spuren der Gewalteinwirkung erkennbar zu sein brauchen. Sehr selten sind die Fälle, in denen Knochenbrüche im Uterus zu Stande kamen, ohne dass eine äussere Gewalt überhaupt eingewirkt

¹⁾ E. Gurlt (Ueber Knochenbrüchigkeit und über Fracturen durch blosser Muskelaction. Deutsche Klinik, 1857) hat die sorgfältigsten Untersuchungen über diese Verhältnisse angestellt.

²⁾ Ueber intrauterine Verletzungen des fötalen Knochengewebes etc. Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe zu Berlin 1857, Februar und März.

tte; wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine fötale Knochenkrankung als prädisponirendes Moment und um einen Druck oder Stoss gegen die in mehreren dieser Fälle nachgewiesenen Exostosen in den Körpern der letzten Lendenwirbel der Mutter. — Dass die Weitem weniger seltenen Knochenbrüche, welche während der Geburt, entweder durch äussere Gewalt, oder durch den Druck des kindlichen Kopfes zu engen Beckens entstehen, mit den vorerwähnten intrauterinen Fracturen nicht zu verwechseln sind, leuchtet von selbst ein.

Die äusseren Ursachen der Knochenbrüche wirken direct oder indirect. Als direct wirkende bezeichnen wir diejenigen äusseren Einwirkungen, welche einen Bruch an der Stelle selbst, auf welche sie einwirken, herbeiführen. Hierher gehören: ein heftiger Schlag, das Aufprallen eines schweren Körpers oder das Aufschlagen des Körpers des Verletzten bei einem Falle auf eine harte Unterlage, das Ueberfahren durch ein Fuhrwerk, endlich die Verletzungen durch Schusswaffen. Je grösser die Gewalt ist, welche auf den Knochen einwirkt, und je mehr dieselbe rechtwinklig gegen die Achse des Knochens einwirkt, desto wahrscheinlicher ist die Entstehung einer Fractur.

Die indirecte Fractur dagegen (sofern sie durch äussere Gewalt entstanden ist, auch Bruch durch Gegenschlag, Gegenbruch, Contrafractur genannt) entsteht in einiger Entfernung von der Stelle, auf welche die äussere Gewalt ausgeübt wurde. Die eine Kraft wirkt auf das eine, die andere auf das andere Ende eines Röhrenknochens ein. Beide streben, dem Knochen eine andere Gestalt zu geben, und führen, da derselbe unnachgiebig ist, endlich ein Zerbrechen an einer zwischen den Orten ihrer Einwirkung gelegenen Stelle herbei. Am Häufigsten entstehen auf diese Weise Knochenbrüche durch Stossen. Man fällt auf die Füsse, auf die Knie, auf die Ellenbogen, auf die Hüften, auf die Schulter, ohne die an diesen Stellen selbst gelegenen Knochen zu zerbrechen. Vielmehr brechen die Unterschenkelknochen, das Schenkelbein, der Schenkelhals, der Oberarm, die Clavicula, mithin solche Theile des Skelets, die den Boden gar nicht berührt haben. Die Bedeutung der hierbei oft stattfindenden Rotation wurde bereits pag. 315 erwähnt.

Dass Brüche durch Muskelzug stets indirecte Fracturen sind, bedarf keiner Erläuterung.

Ebenso ist ersichtlich, dass bei directen Fracturen viel häufiger erhebliche Quetschungen der Weichtheile bestehen, als bei indirecten.

Diagnose. Die Zeichen eines Knochenbruches werden eingetheilt in subjective und objective; letztere haben eine bei Weitem grössere Bedeutung.

A. Subjective Zeichen: 1) Der Kranke soll in dem Augenblick, wo der Bruch zu Stande kommt, ein Krachen vernehmen. Die Aufmerksamkeit des Kranken ist aber gewöhnlich auf ganz andere Dinge gerichtet. 2) Schmerz. Derselbe verhält sich im Allgemeinen wie der Wundschmerz, ist aber dadurch ausgezeichnet, dass er durch Druck auf die verletzte Stelle und durch Bewegungen des verletzten Theiles in hohem Grade gesteigert wird. 3) Gefühl von Taubheit und Steifigkeit in der Umgegend des Bruches, als Folge der vorausgegangenen Erschütterung und Quetschung, daher je nach der Grösse der Gewalt, welche eingewirkt hat, von verschiedener Intensität und Ausdehnung. 4) Unfähigkeit, den verletzten Theil zu bewegen, oder doch Schwierigkeit bei der Ausführung der Bewegungen, — ein unsicheres und inconstantes Zeichen.

B. Objective Zeichen: 1) Veränderungen der äusseren Gestalt des verletzten Theils. 2) Beweglichkeit der Bruch-Enden. 3) Crepitation. 4) Zeichen von Quetschung der Weichtheile, namentlich Sugillationen. 5) Sichtbarkeit oder Fühlbarkeit der Bruchstelle.

1) Die Abweichungen von der normalen Gestalt (Difformität), — verschieden je nach der Dislocation der Bruchstücke (vgl. pag. 316 u. f.), daher bald Verkürzung, bald Verkrümmung, Verdrehung, Hervorstehen einzelner Bruch-Enden u. s. f., — sind nicht immer leicht wahrzunehmen, und oft findet in dieser Beziehung Täuschung Statt. Man muss stets die Vergleichung mit der gesunden Seite vornehmen und sich vergewissern, ob nicht schon durch eine frühere Krankheit oder von Geburt an eine Verkürzung oder anderweitige Difformität der einen oder anderen Extremität bestanden hat.

In Betreff der sowohl zu diesem Behuf, als für die weitere Untersuchung des Verletzten erforderlichen Entkleidung und der dabei zu beachtenden Vorsicht, sind die bei der „Behandlung“ gegebenen Vorschriften zu vergleichen.

2) Die Beweglichkeit der Bruch-Enden ist zuweilen sehr gering, wenn nämlich ein benachbarter Knochen den gebrochenen unterstützt, oder wenn sich die Bruch-Enden mit sehr breiten Flächen berühren, oder endlich, wenn Einkeilung besteht. Schwer wahrzunehmen ist sie, wenn die Bruchstücke gar nicht oder doch schwierig zu fassen sind, wie namentlich bei den Brüchen kurzer Knochen.

3) Die Crepitation bei Knochenbrüchen ist ein trocknes, hartes Knarren oder Krachen, welches theils mit dem Ohre, theils und vorzugsweise mit der aufgelegten Hand wahrgenommen wird. Vgl. Bd. I. pag. 19 u. f. Dieselbe entsteht, sobald die Bruch-Enden durch Bewegung des Kranken oder durch die Hand des Arztes gegen ein-

ander, wenn auch noch so wenig, gerieben werden. Sie muss überall fehlen, wo eine Verschiebung (Bewegung) der Bruch-Enden unmöglich ist, oder dieselben einander gar nicht berühren. Letzteres kann bedingt sein: durch ihre Lage, bei der *Dislocatio ad longitudinem*, ferner durch die Einschiebung von Weichtheilen zwischen die Bruch-Enden, endlich bei Brüchen, welche schon längere Zeit bestehen, durch die entzündliche Erweichung der Bruchflächen. Mangel der Beweglichkeit der Bruch-Enden ist selten der Grund, weshalb die *Crepitation* fehlt, weil eine äusserst geringe Bewegung zu ihrer Entstehung hinreicht. Die Verhältnisse, durch welche auch dieser geringste Grad von Beweglichkeit unmöglich gemacht werden kann, sind: Befestigung der Bruch-Enden durch ihren Zusammenhang mit anderen Knochen (z. B. am Schädel), oder durch Einkeilung oder stark gezähntes Ineinandergreifen der Bruch-Enden selbst, endlich Unversehrtheit des Periost, zumal wenn gleichzeitig eine beträchtliche Anschwellung der Weichtheile in der nächsten Umgebung besteht.

Um die *Crepitation* deutlich wahrzunehmen, fasst man den verletzten Theil mit der einen Hand oberhalb, mit der anderen unterhalb der vermeintlichen Bruchstelle und bewegt beide Hände in entgegengesetzter Richtung, oder man lässt die Bewegungen durch einen Gehülfen ausführen und umgreift während derselben die verdächtige Stelle mit beiden Händen, um die etwa vorhandene *Crepitation* mit aller Aufmerksamkeit zu erforschen.

Lisfranc (*Mémoire sur de nouvelles applications du stéthoscope. Paris 1823*) empfiehlt in zweifelhaften Fällen durch Anwendung der Auscultation, mit Hülfe des Stethoskops, welches man an der vermeintlichen Bruchstelle oder auch entfernt davon setzt, das Vorhandensein oder Fehlen der *Crepitation* zu erforschen. Dies gewährt namentlich bei Rippenbrüchen grossen Vortheil, weil das Geräusch durch die Resonanz des Thorax verstärkt wird; im Uebrigen kann man die *Crepitation*, sobald die Bruch-Enden sich nur ein wenig an einander reiben lassen, auch mittelst des *Tasttones* wahrnehmen.

4) Die *Sugillationen* sind, obwohl oft von Wichtigkeit für die Diagnose, doch im Allgemeinen als das unzuverlässigste unter den objectiven Symptomen zu bezeichnen; sie gestatten einer Seits, wo sie vorkommen, durchaus keinen sicheren Schluss auf das Bestehen einer Fractur, und können anderer Seits, bei unzweifelhaften Knochenbrüchen, gelegentlich ganz fehlen oder doch in einiger Entfernung von der Bruchstelle ihren Sitz haben.

Finden sich die zuerst aufgeführten drei (pathognomonischen) Symptome zusammen vor, so ist die Diagnose eines Knochenbruches nicht. Wenn aber z. B. die Bruch-Enden sich nicht verschoben haben und wenig oder gar nicht beweglich sind, so wird sie oft schwierig.

In solchen Fällen ist auf einen an einer bestimmten Stelle sitzenden und durch Druck auf dieselbe sogleich zu einer unerträglichen Höhe sich steigernden Schmerz grosses Gewicht zu legen. Lassen die übrigen Umstände eine Fractur vermuthen, so berechtigt das Vorhandensein eines solchen fixen Schmerzes, wenn auch Verschiebung, Beweglichkeit und Crepitation gänzlich fehlen, in praxi zur Annahme einer Fractur, und diese Annahme wird fast zur Gewissheit, wenn an derselben Stelle eine Sugillation sich findet (Malgaigne). — Die diagnostischen Schwierigkeiten werden noch grösser, wenn in der Umgegend des Bruches sich starke Anschwellung gebildet hat oder wenn die Weichtheile an und für sich eine bedeutende Dicke besitzen.

5) Kann man die Bruchstelle sehen oder direct fühlen, so ist von diagnostischen Schwierigkeiten keine Rede. Aber dies ist nur selten und immer nur bei Fracturen, welche mit einer bis zur Bruchstelle eindringenden Wunde complicirt sind, der Fall. Um dieselbe Sicherheit bei einfachen Knochenbrüchen zu erreichen, bedient man sich, nach dem Vorgange von Middeldorpf¹⁾, der Acupunctur. Eine glatte scharfe Nadel wird mit Vermeidung edler Theile an der fraglichen Stelle bis auf den Knochen eingesenkt und dann als Sonde benutzt, um theils die Bruchzacken, theils den Zwischenraum zwischen ihnen zu entdecken.

Bleibt man schliesslich doch im Zweifel darüber, ob es sich um Fractur oder „blos um Quetschung“ handle, so muss man, um in therapeutischer Beziehung nichts zu versäumen, stets annehmen, dass Ersteres der Fall sei²⁾.

Zum Behuf der Untersuchung eines jeden Verletzten, bei dem wir das Bestehen eines Knochenbruchs zu vermuthen Grund haben, ohne denselben sofort mit Bestimmtheit erkennen zu können, sind wir nicht blos berechtigt, sondern verpflichtet, die Chloroform-Betäubung anzuwenden, in welcher die ganze Untersuchung nicht blos schmerzlos, sondern, wegen der Erschlaffung der Muskeln, auch viel genauer ausgeführt werden kann. In der Regel gelingt es dann in demselben Chloroform-Schlaf auch sofort die wichtigsten therapeutischen Acte auszuführen.

Verlauf, Heilungsvorgang, Callusbildung. In der Umgegend eines Knochenbruches und in dem zerbrochenen Knochen selbst entsteht immer eine mehr oder weniger heftige Entzündung. Diese führt,

¹⁾ l. c. pag. 31 und „Akidopeirastik“ in Günsburg's Zeitschr. 1856, pag. 321.

²⁾ Ueber die Unterscheidung von Fractur und Luxation werden wir bei letzterer im folgenden Abschnitt sprechen.

wenn die Weichtheile stark gequetscht oder zerrissen sind, besonders aber, wenn die Luft Zutritt zur Bruchstelle hat, zur Eiterung, oft zur Verjauchung. Bei subcutanen Fracturen tritt sie gewöhnlich nur in mässigem Grade auf. Die in den ersten Tagen vielleicht noch allmählig steigende Geschwulst in der Umgegend, sowie der Schmerz nehmen nach und nach wieder ab, Fieber entsteht gar nicht oder erlischt doch bald wieder, und das in der Umgegend der Bruch-Enden und zwischen ihnen entstehende Exsudat wird resorbirt, während die Bruch-Enden selbst, meist unter Wucherung der Knochensubstanz (wie man, nach Analogie der Heilung von Wunden, zu sagen pflegt: *per primam intentionem*) wieder verwachsen.

Die hierbei sich entwickelnde Knochen-Neubildung hat von Alters her den Namen Callus erhalten. Zahlreiche Untersuchungen sind unternommen worden, um die Structur und Bildungsgeschichte dieser Substanz, durch welche, wie durch eine Narbe, die Continuität des Knochens wieder hergestellt wird, genau kennen zu lernen. Im Alterthum glaubte man, dass die Bruch-Enden durch einen aus ihnen ausschwitzenden Knochensaft, wie durch Leim, zusammengeklebt würden. Die Vorstellungen Paré's über diesen Vorgang waren beinahe noch dieselben. Haller meinte, dass aus den Bruch-Enden und dem Knochenmark ein gallertiger Saft ausschwatze, der sich in die Umgegend der Bruchstelle ergiesse, sich organisire, demnächst knorpelig und endlich knöchern werde. Duhamel lehrte, dass zuerst das in der Umgebung des Bruches zerrissene Periost sich wieder vereinige, demnächst ossificire und somit einen knöchernen Ring um die Bruchstelle herum darstelle, mit welchem dann die Medullarmembran sich verbinde, um an der Berührungsstelle gleichfalls zu verknöchern. Bordenave suchte zuerst die Analogie zwischen der Heilung von Wunden in Weichtheilen und der Heilung von Knochenbrüchen geltend zu machen. J. Hunter legte besonderes Gewicht auf den Antheil, welchen das zwischen die Bruch-Enden und in ihre Umgebung ergossene Blut, indem es sich organisire, an der Callusbildung nehmen sollte. Camper beschrieb einen doppelten Callus; der eine liege unter dem Periost, und sei das Resultat der Verknöcherung einer gallertigen Substanz; der zweite, der innere Callus, dagegen beruhe auf der Rarefaction und Expansion des Knochengewebes selbst, welche zuweilen so bedeutend sei, dass der Markcanal des Knochens obliterirt werde.

Mit grosser Ausführlichkeit hat Dupuytren den Vorgang der Callusbildung beschrieben. Auf seine Autorität hin unterscheiden Viele noch heute einen zuerst sich bildenden, provisorischen, d. h.

später wieder durch Resorption schwindenden, und einen definitiven, später gebildeten, aber bleibenden Callus. 1) Provisorischer Callus. Die Weichtheile in der Umgegend der Fractur liefern ein verknöchernendes Exsudat, welches die Bruchstelle ringförmig umfasst. Ein ähnliches Exsudat liefert die Markmembran, welches, wie ein Zapfen, im Innern der Markhöhle des Knochens steckt. Dieser provisorische Callus bildet sich in 30 bis 40 Tagen. Sobald aber der definitive Callus sich entwickelt hat, beginnt die Resorption des provisorischen; der durch ihn verdickte Knochen kehrt zu seinem normalen Volumen zurück, und die Markhöhle wird wieder hergestellt. Der provisorische Callus hat wenig Festigkeit; er kann durch äussere Gewalten, sogar durch die Thätigkeit der Muskeln zerbrochen oder verbogen werden. 2) Definitiver Callus. Dieser wird von den Bruch-Enden selbst geliefert. Er entwickelt sich, der weniger energischen Lebensthätigkeit des Knochengewebes entsprechend, viel langsamer, als der von den gefässreichen Weichgebilden gelieferte provisorische Callus, und ist vor diesem durch grössere Festigkeit, sowie durch seine Permanenz ausgezeichnet.

Diese Beschreibung und Eintheilung der Callusbildung enthält mehrere, durch neuere Beobachtungen nachgewiesene Irrthümer. Der sogenannte provisorische Callus verschwindet bei Weitem nicht immer; insbesondere ist der Verschluss der Markhöhle fast immer ein bleibender. In vielen Fällen aber entwickelt sich der ringförmige provisorische Callus Dupuytren's gar nicht, es findet gar keine Verdickung des Knochens an der Bruchstelle Statt, die Vereinigung wird durch unmittelbare Verwachsung der Bruch-Enden bewerkstelligt. Ferner ist die ganze Lehre Dupuytren's nur auf die Röhrenknochen, welche freilich am Häufigsten brechen, berechnet, auf die übrigen Arten von Knochen aber gar nicht anwendbar. Für die Röhrenknochen hat die Dupuytren'sche Beschreibung insofern oft ihre Gültigkeit, als allerdings zunächst von dem Periost aus die Verknöcherung zu beginnen pflegt. Eine scharfe Unterscheidung aber zwischen provisorischem und definitivem Callus ist durchweg unmöglich.

Im Anschluss an die Lehre von Dupuytren haben Breschet und Villerme besondere Perioden der Callusbildung festzustellen gesucht. Wir theilen sie nachstehend mit, weniger in der Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer solchen Eintheilung, als in der Absicht, bei dieser Gelegenheit die einzelnen Vorgänge der Callusbildung kurz zusammen zu fassen. Die erste Periode umfasst, bei Fractur eines der grösseren Röhrenknochen, 8 bis 10 Tage. Die Bruch-Enden sind zunächst von ergossenem Blute umgeben, während

das Bindegewebe und die Muskeln in der Umgegend, sowie das Knochenmark an der Stelle des Bruches eine grössere Turgescenz und Dichtigkeit erlangen. Das Blut wird allmählig resorbirt, zu der Anschwellung der Weichtheile gesellt sich eine deutliche Röthung, sie werden speckig oder gallertig, und die Bruch-Enden liegen in dieser gleichsam verhärteten Masse eingebettet. Die zweite Periode reicht bis zum 20. oder 25. Tage. Die Anschwellung der Weichtheile lässt allmählig nach, besonders kehren Muskeln und Sehnen zu ihrem normalen Zustande zurück. Dagegen gewinnt das in der Umgegend der Fractur gelegene, infiltrirte Bindegewebe eine grössere Festigkeit, wird dem Faserknorpel ähnlich und stellt eine spindelförmige Geschwulst dar, deren grösste Dicke in der Gegend des Bruches liegt. Das aufgeschwollene Knochenmark ist durch den zwischen den Bruch-Enden liegenden Theil des Exsudates mit der äusseren Exsudatmasse in Verbindung. In dieser Periode hört die Crepitation auf, aber der Callus ist noch biegsam. Die dritte Periode reicht bis zum 30., 40. oder 60. Tage, je nach dem Sitze des Bruches, dem Alter und dem Gesundheitszustande des Verletzten. Die Callusgeschwulst wird knöchern. Die Verknöcherung schreitet von Aussen nach Innen fort und geht wesentlich von dem inzwischen bereits verheilten und beträchtlich verdickten Periost aus. Die vierte Periode reicht bis zum 5. oder 6. Monat und umfasst die Verknöcherung des definitiven Callus nach Dupuytren. Die fünfte Periode, in welcher die Resorption des provisorischen Callus vollendet werden soll, um schliesslich das Periost oder das Knochenmark wieder in ihrem normalen Verhalten erscheinen zu lassen, reicht bis in den 8., 10. oder gar in den 12. Monat.

An fast allen vorerwähnten Angaben der verschiedenen Schriftsteller über die Bildung des Callus ist etwas Wahres. Nicht bloss der Knochen selbst, sondern auch die ihn umgebenden Weichtheile, vor Allem und unter allen Bedingungen das Periost, haben Antheil an der Bildung der neuen Knochenmasse, aber unter verschiedenen Verhältnissen in sehr verschiedenem Grade, immer jedoch in der Weise, dass die eigentliche Knochen-Neubildung nur von dem Knochen und der Knochenhaut ausgeht¹⁾. Die Betheiligung der umgebenden Weichtheile ist besonders deutlich, wenn die Coaptation der Bruch-Enden nicht gelungen ist. Hier ist dann Dupuytren's provisorischer Callus ganz entschieden auch der definitive. Es bilden sich knöcherne Brücken von einem Bruch-Ende zum anderen, wie

¹⁾ Vgl. Osteitis, Periostitis, Osteophyt im folgd. Capitel.

Fig. 29.



Fig. 30.



z. B. an dem Fig. 29 abgebildeten Präparate einer Fractura femoris ¹⁾. Sind die Bruch-Enden durch eine grosse Wunde blossgelegt, so erfolgt meist zunächst Abstossung ihrer oberflächlichen Schichten und dann erst Heilung des Bruches durch Granulationen, welche schliesslich verknöchern. Aber ganz im Gegensatz hierzu giebt es auch Fälle, in denen eine unmittelbare Vereinigung, eine wahre Heilung durch *prima intentio* zu Stande kommt, wie in Fig. 30, welche einen geheilten Bruch des unteren Endes des Radius (aus der Sammlung von Goyrand) darstellt, an welchem sich keine Spur eines sogenannten provisorischen Callus entdecken lässt ²⁾.

Verhältnisse, welche die Callusbildung begünstigen oder beeinträchtigen. Zu einer regelmässigen und vollständigen Vereinigung der Bruch-Enden ist die Erfüllung folgender Bedingungen erforderlich.

1) Die Bruch-Enden müssen einander während der ganzen Zeit der Heilung genau und unbeweglich berühren ³⁾. Dies ist gewöhnlich bei Brüchen der Kniescheibe, des Olecranon und des Processus coronoideus der Ulna nicht der Fall, indem das eine Bruchstück von dem anderen durch Muskelzug entfernt wird. Ebenso können sich ausnahmsweise durch Verschiebung auch die Fracturen anderer Knochen gestalten. Dass hierbei eine Vereinigung, wengleich in unregelmässiger und unvollständiger Weise noch möglich, obschon nicht gerade wahrscheinlich ist, zeigt z. B. Fig. 30. In anderen Fällen wird die Berührung der Bruchflächen durch fremde Körper, oder durch Muskeln und Sehnen, die sich dazwischen geschoben haben, oder durch Synovia, die zwischen sie eindringt (bei intracapsulären Brüchen), verhindert.

¹⁾ Zwischen den beiden Knochenbrücken, die in diesem Falle von einem Bruch-Ende zum anderen schräg hinübergehen, ist eine Sonde hindurch geführt.

²⁾ Die Callusbildung ist hier nur in ihren Umrissen dargestellt. Ueber dieselbe sind zu vergleichen: F. Miescher, *De inflammatione ossium*, Berol. 1836, Flourens, *Théorie expérimentale de la formation des os*, Paris 1847, Voetsch, *Die Heilung der Knochenbrüche per primam intentionem*, Heidelberg 1847, Kölliker's mikroskopische Anatomie, Virchow's Cellularpathologie, 3. Aufl. pag. 403 u. f., R. Hein, über die Regeneration gebrochener und resercirter Knochen, in Virchow's Archiv, Bd. 15.

³⁾ Nach Asthley Cooper wäre sogar nicht bloss eine genaue Berührung, sondern ein gewisser Druck, den ein Bruch-Ende auf das andere ausüben müsste, erforderlich, um eine ganz vollkommene Vereinigung zu erzielen.

Soll die Heilung ohne Difformität erfolgen, so müssen die Bruch-Enden sich nicht bloß genau, sondern auch in gehöriger Richtung berühren. Anderen Falls entsteht, wenn die Callusbildung nicht überhaupt ausbleibt, eine Dymorphostosis. Der Grund dafür, dass man solche difforme Heilungen besonders häufig bei Kindern beobachtet hat¹⁾, liegt einer Seits in den Schwierigkeiten, welche sich einer genauen Diagnose und genügenden Behandlung in diesem Lebensalter entgegenstellen, anderer Seits in der Leichtigkeit, mit welcher die Verwachsung der Knochen-Enden bei Kindern erfolgt, wenn sich auch die Bruchflächen nicht berühren (vgl. Fig. 29).

2) Hinreichende Ernährung der beiden Bruch-Enden, namentlich hinreichende Blutzufuhr. Mangel der Blutzufuhr zu dem durch Bruch des Schenkelhalses vom Schaft des Femur getrennten Schenkelkopf trägt grossen Theils die Schuld, dass die gedachten Brüche häufig nicht heilen. Aus gleichem Grunde heilen Knochenbrüche an derjenigen Seite eines Foramen nutricium, welche der Richtung des Verlaufs und der Verästelung der Art. nutricia entgegengesetzt ist, schwieriger.

Nach Bérard und Gueretin hat die Richtung, in welcher die Art. nutricia verläuft, Einfluss auf die frühere oder spätere Verschmelzung zwischen den Epiphysen und dem Mittelstück des Knochens. Am Humerus verläuft die Art. nutricia in der Richtung von Oben nach Unten, und die Verschmelzung findet dem entsprechend zuerst zwischen der unteren Epiphyse mit dem Mittelstück dieses Knochens Statt. In den Vorderarmknochen verläuft die Art. nutricia von Unten nach Oben, und die Vereinigung der oberen Epiphyse erfolgt auch früher. An den unteren Extremitäten verhält es sich gerade umgekehrt. Am Femur ist die Richtung des Ernährungsgefässes aufwärts, und die Vereinigung der oberen Epiphyse erfolgt auch viel früher als diejenige der unteren. In den Unterschenkelknochen ist der Verlauf abwärts, und die Verschmelzung der unteren Epiphysen erfolgt dem entsprechend viel früher, als die der oberen. — In demjenigen Theile eines Knochens, welcher der zuletzt mit dem Mittelstück verschmolzenen Epiphyse zunächst liegt, wird man daher eher eine Verzögerung oder ein Ausbleiben der Consolidation zu erwarten haben.

Die Lage der Foramina nutricia bietet übrigens zahlreiche Varietäten dar. Vergl. John Adams, On ununited fractures, Medical Times, 1851, April.

Sollte man auch, wie es nach den Angaben von Norris scheinen könnte, auf dieses Verhältniss zu grosses Gewicht gelegt haben, so ist die Bedeutung desselben doch nicht zu verkennen, da man bei jedem Knochenbruch, welcher in der gedachten Beziehung zu der Art. nutricia steht, das im Verhältniss zu ihrer Eintrittsstelle peripherisch gelegene Bruch-Ende, zu welchem also die Blutzufuhr vermindert ist, später und in geringerer Masse Callus liefern sieht.

3) Die Entzündung in den Bruch-Enden und in ihrer Um-

¹⁾ Vgl. v. Bruns, Beiträge zur Behandlung schlecht geheilter Beinbrüche. Deutsche Klinik, 1861, No. 14 u. f.

gend darf nicht erlöschen, weil nur unter ihrem Einfluss die Knochen-Neubildung fort dauert, sie darf aber auch nicht zu heftig werden, weil sonst statt einfacher Knochenwucherung Eiterung oder gar Brand zu befürchten steht. Ist die Bruchstelle der Luft ausgesetzt (nicht subcutan) und lässt sich die nachtheilige Wirkung des Luft-Zutritts nicht ausschliessen, so tritt auch Eiterung ein. Die Callusbildung erfolgt dann viel langsamer und unsicherer.

4) Eine ausreichende Ernährung der Bruch-Enden setzt einen normalen Zustand der Ernährung des ganzen Organismus voraus; namentlich müssen demselben auch genügende, hinreichend kalkhaltige Nahrungsmittel zugeführt werden¹⁾. Ob eine mangelhafte Innervation des Theils, an welchem der Bruch sich findet, die Heilung unmöglich macht, oder auch nur verzögert, ist nicht entschieden. Es liegen allerdings Beobachtungen vor, in denen dies der Fall war, aber es giebt auch Beispiele genug vom Gegentheil. Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, dass ein allgemeines Darniederliegen der Kräfte, das Einwirken der Kälte (Hippokrates) und gewisse Dyskrasien die Callusbildung beeinträchtigen. Mit letzteren verhält es sich in dieser Beziehung, wie bei der Prädisposition zu Knochenbrüchen. Mit Sicherheit kann nur der Scorbut als eine die Callusbildung hemmende Dyskrasie aufgeführt werden. — Auch die Schwangerschaft soll ein Hinderniss der Callusbildung sein; in der Regel aber sieht man Fracturen bei schwangeren Frauen vollkommen gut heilen. Unzweifelhaft ist der üble Einfluss, den das Bestehen von Caries oder Nekrose an dem gebrochenen Knochen auf die Heilung des Bruches ausübt.

Pseudarthrosis, falsches Gelenk. Wenn unter den so eben erörterten ungünstigen Verhältnissen einerseits die Consolidation einer Fractur nicht erfolgt, andererseits aber das Leben des Patienten erhalten bleibt: so entsteht zwischen den Bruch-Enden ein fibröses Gewebe, ähnlich dem Narbengewebe in Weichtheilen, welches bald eine dicke, dem Faserknorpel ähnliche Masse, bald auch einzelne Stränge und Bänder darstellt. Besonders häufig ist dies der Fall, wenn die Bruch-Enden nicht in genaue Berührung gebracht oder doch nicht in derselben erhalten werden konnten, daher ganz gewöhnlich bei Brüchen der Kniescheibe, des Olecranon, des Processus coronoides ulnae, des Schenkelhalses, auch der Condylen des Oberarmes. Je

¹⁾ Die gewöhnliche Kost ist kalkhaltig genug für sehr erhebliche Callusbildung. Dem Kranken Kalkpräparate (Calcaria phosphorica oder Calc. carbonica in kohlensaurem Wasser) zu geben, ist daher überflüssig, zumal diese eben weniger leicht assimiliert werden, als die in den Nahrungsmitteln enthaltenen Kalk-Verbindungen.

ürzer die fibröse Zwischensubstanz ist, und je weniger zur Ausübung der Function des Knochens eine absolute Unbiegsamkeit desselben erheischt wird, desto weniger störend ist diese unvollkommene Heilung. Standen die Bruch-Enden mit einander in genauer Berührung, und erfolgte dennoch keine knöcherne Vereinigung, so treten sie nach und nach, besonders wenn von dem Patienten Bewegungen versucht wurden, in eine gelenkartige Verbindung, welcher jedoch die Phantasie mancher Schriftsteller eine grössere Aehnlichkeit mit einem wirklichen Gelenk zugeschrieben hat, als sie wirklich besitzt. Es unterscheidet sich nämlich jener Zustand, den man eigentliche Pseudarthrose, auch wohl diarthrosen-ähnliche Pseudarthrose genannt hat, nur dadurch von der so eben beschriebenen Heilung durch fibröse Zwischensubstanz, dass die Bindegewebswucherungen sich Bändern ähnlich um die Bruchstelle gruppieren, während durch den Druck und die Reibung, welche die Bruch-Enden gegen einander ausüben, ihre Berührungsflächen sich abglätten, in einzelnen Fällen auch das eine Bruch-Ende eine convexe, das andere eine concave, pfannenähnliche Gestalt annimmt. — Durch solche Pseudarthrosen in der Continuität eines Röhrenknochens wird die Function des Theils im höchsten Grade gestört, besonders wenn es sich um Knochen der unteren Extremität handelt.

Prognose der Knochenbrüche. Wäre es nicht durch Beobachtungen tausendfach erwiesen, dass Knochenbrüche gewöhnlich heilen, so würde man a priori für eine so tief eingreifende Verletzung gewiss keine günstige Prognose stellen. Der Verlauf der einfachen Knochenbrüche ist wesentlich deshalb ein so günstiger, weil sie in die Klasse der von J. Hunter so genannten „nicht exponirten“, nach neuerer Nomenclatur „subcutanen“ Continuitätsstörungen gehören. Vgl. Bd. I. pag. 623 u. f. — Jedoch sei man im einzelnen Falle vorsichtig in der Vorhersage; denn einerseits lassen sich die Folgen der Erschütterung, welche den Körpertheil mit der Fractur zugleich getroffen hat, nicht mit Bestimmtheit im Voraus berechnen, und andererseits führt selbst der einfachste Knochenbruch in seinem Gefolge doch immer eine fast vollständige Aufhebung der Functionen des gebrochenen Theils für lange Zeit. Durch mannigfaltige Verhältnisse wird die Prognose eines Knochenbruches überdies noch besonders getrübt.

Knochenbrüche an den unteren Extremitäten sind viel übler als diejenigen an den oberen, indem die Masse der umgebenden und daher gereizten Weichtheile bei ersteren bedeutender, und die Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat, um die Bruch-Enden

während des Heilungsprocesses in der gehörigen Lage zu erhalten, grösser sind. Ausserdem kommen bei denselben, wie auch bei allen anderen Knochenbrüchen, welche zu ihrer Heilung eine längere ruhige Lage erfordern, alle diejenigen Nachtheile in Betracht, welche das Still-Liegen an und für sich bei schon bestehenden Krankheiten oder Krankheitsanlagen, zuweilen sogar bei sonst gesunden, aber an körperliche Anstrengungen und freie Bewegung gewöhnten Menschen herbeiführt.

Bricht nur ein Knochen eines zweiröhri- gen Gliedes, so ist die Prognose nicht bloß günstiger, als wenn beide gebrochen wären, sondern auch besser, als wenn die Fractur an einem einröhri- gen Gliede sich befände, indem die Verschiebung der Bruch-Enden durch den Widerstand des zweiten Knochens verhindert werden kann.

Brüche in der Nähe eines Gelenkes haben, auch wenn dieses selbst unverletzt geblieben ist, doch eine schlechtere Prognose als andere, weil in Folge der Ausbreitung der Entzündung auf das Gelenk, oder auch bloß wegen der andauernden Ruhe, Gelenksteifig- keit zurückbleiben kann (vgl. Ankylose).

Neben dieser articulären Steifigkeit ist aber auch die, fast noch häufigere muskuläre zu beachten, die nach Fracturen, bald dauernd, bald — und zwar bei Weitem häufiger — vorübergehend zurückbleibt; sie wird im ersteren Falle meist durch Einheilen von Muskeln oder Sehnen in den Callus bedingt, im zweiten durch die längere Ruhe, welche zur Heilung des Bruches erforderlich ist.

Ein Querbruch ist leichter zu behandeln, als ein Schrägbruch. Mehrfache oder gar Splitterbrüche haben eine viel schlechtere Prognose.

Alle Complicationen erhöhen die Gefahr einer Fractur, am Wenigsten noch eine einfache Wunde, in hohem Grade eine Arterien- verletzung in der Nähe der Fractur. Sobald in der Umgebung der Bruchstelle Eiterung entsteht, steigert sich die Gefahr der Verletzung erheblich.

Viele Knochenbrüche sind höchst gefährlich wegen der mit ihnen nothwendig verknüpften Verletzung oder consecutiven Erkrank- ung benachbarter Eingeweide; dies gilt namentlich für alle Fracturen des Schädels und der Rumpfknochen. Abgesehen von diesen Complicationen, können solche Brüche ebenso schnell, sogar schneller heilen, als diejenigen der Extremitäten-Knochen.

Jugend und kräftige Gesundheit sind der Heilung von Knochen- Brüchen ungemein günstig. Bei alten Leuten erfolgt die Wiederver- einigung langsamer, und Anschwellung und Steifigkeit bleiben in der Umgebung der Bruchstelle längere Zeit zurück. — Von den übrigen

Verhältnissen, welche die Callusbildung beeinträchtigen können, war schon pag. 330 u. f. die Rede.

Behandlung¹⁾. Erste Hülfeleistungen. Gewöhnlich findet der Wundarzt den Patienten, welcher einen Knochenbruch erlitten hat, bereits im Bett, — häufig mit einer heftigen Entzündung oder hoch Reizung der die Bruch-Enden umgebenden und von ihnen zerrissenen oder gequetschten Weichtheile, welche vielleicht nur durch den in unzweckmässiger Weise ausgeführten Transport des Verletzten veranlasst worden ist. Von grosser Wichtigkeit ist es daher, dass die ersten Hülfeleistungen bei Knochenbrüchen mit der gehörigen Sorgfalt und Sachkenntniss ausgeführt werden. Ganz besonders kommt dies in Betracht, wenn es sich um eine Fractur an den unteren Extremitäten handelt, weil der Patient aldann nicht im Stande ist, nach eigenem, gewöhnlich richtigem Gefühle die Unterstützung des verletzten Körpertheils selbst zu besorgen. Am Besten ist es, wenn man sogleich die Einrichtung vornehmen und einen genügenden Verband anlegen kann (vgl. pag. 340 u. f.). Ist dies nicht möglich, so muss der Arzt, während Gehülfen den Kranken aufheben, die Bruch-Enden vor Verschiebung zu bewahren suchen, indem er das Glied oberhalb und unterhalb der Bruchstelle umfasst.

Zum Behuf des Transportes bedient man sich einer Tragbahre, einer Bettstelle, im Nothfall zweier Latten, die durch ein an ihnen festgenageltes Stück Leinwand (von einer dem Körper entsprechenden Länge und Breite) verbunden sind, oder auch eines Brettes, einer Thür u. dgl. Oft fehlen (namentlich während einer Schlacht) alle diese Hilfsmittel, und es bleibt nichts übrig, als den Verletzten mit den Händen fortzutragen. Kann der Patient ohne Gefahr an dem Orte der Verletzung gelassen werden, so ist es viel besser, zuerst für zweckmässige Verband- und Transportmittel zu sorgen und ihn bis dahin ruhig liegen zu lassen, als durch einen übereilten Transport die Bruch-Enden einer bedeutenderen Verschiebung und die benachbarten Weichtheile einer heftigeren Reizung auszusetzen²⁾. Das verletzte Glied muss sich während des Transportes in einer solchen Lage befinden, dass weitere Dislocationen der Bruchstücke durch Muskelzug verhütet werden. Zu diesem Behufe construirt man oft zweckmässig aus festen Kissen oder Strohsäcken eine einfache oder doppelte schiefe Ebene (planum inclinatum).

Beim Entfernen der Kleider ist die grösste Sorgfalt anzu-

¹⁾ Vgl. C. Boehm, Therapie der Knochenbrüche, Wien, 1868.

²⁾ Als A. Paré in Paris auf der Strasse das Bein brach, liess er eine Thür aufheben und unter seinen Körper schieben, bevor man ihn transportiren durfte.

empfehlen, um Bewegungen der Bruch-Enden zu verhüten. Deshalb muss man bei Brüchen an der unteren Extremität die Stiefeln fast immer und häufig auch die übrige Bekleidung aufschneiden.

Die Anordnung des Bettes, in welchem der Verletzte liegen soll, ist bei Brüchen der oberen Extremität von geringer, bei solchen an der unteren Extremität dagegen von grosser Bedeutung. Dasselbe muss nicht zu breit, von allen Seiten zugänglich und mit einer festen Matratze, wo möglich einer Rosshaar-Matratze versehen sein¹⁾. Oberhalb des Bettes ist eine Vorrichtung anzubringen, an der sich der Patient ein wenig aufrichten kann; am Einfachsten ein an der Decke des Zimmers oder an einem galgenartigen Gestell oder endlich am Fuss-Ende des Bettes, am Bettpfosten, zu befestigender Strick.

Für alle Kranke, welche durch Fracturen des Rumpfes oder der unteren Extremitäten längere Zeit an's Bett gefesselt sind, ist es von grosser Wichtigkeit, dass man sie mit Leichtigkeit und ohne Erschütterung von ihrem Lager erheben könne, um das Lager glätten und, je nach Bedürfniss, Unterlagen, Bettschüsseln u. dgl. unterschieben zu können. Kann man über eine hinreichende Zahl von Wärtern disponiren, so reichen deren Hände allerdings aus. Anderen Falls sind besondere Apparate wünschenswerth, die man als „Krankenheber“ bezeichnet hat. Einer der einfachsten und zweckmässigsten ist der von v. Siebold angegebene. Derselbe besteht aus einem etwa 2 Meter langen Balken, an dem in verschiedenen Entfernungen breite Gurte befestigt werden können, welche den Kopf, den Thorax und die Lendengegend, das Gesäss und die Beine des Kranken umfassen und über dem Körper des Kranken durch Spannbretter in der Art von einander gehalten werden, dass sie keinen unangenehmen Druck auf denselben ausüben. In der Mitte des Balkens ist ein Flaschenzug befestigt, dessen anderes Ende an der Zimmerdecke oder in einem besonderen Gerüst festsetzt. Durch Vermittelung dieses Flaschenzuges vermag ein Wärter den Kranken mit Leichtigkeit emporzuziehen; oft kann der Kranke dies selbst besorgen²⁾.

Das gebrochene Glied wird, je nach der einzuschlagenden Behandlungsweise freilich sehr verschieden, im Allgemeinen jedoch in

¹⁾ Grosse Kissen aus Gummiplatten, mit Wasser oder Luft gefüllt (hydrostatische Betten) sind den Rosshaar-Matratzen in manchen Fällen noch vorzuziehen, ihres hohen Preises wegen aber nur selten anwendbar. Sie wurden zuerst gefertigt von Hooper, Pall-Mall-East No. 7, London, sind jetzt aber aus jeder Gummiwaaren-Fabrik zu beziehen.

²⁾ Vgl. Gustav Simon, Ueber Schusswunden, Giessen 1852, woselbst auch der v. Siebold'sche Krankenheber abgebildet ist.

Art gelagert, dass es von allen Seiten sicher unterstützt, aber nicht stark gedrückt wird. Diesen Anforderungen entsprechen in vielen Fällen die sogenannten Spreukissen, d. h. Säcke, die mässig fest Häcksel gefüllt sind. In einem solchen Spreusacke bildet die dar- gelagerte Extremität sich sehr bald eine entsprechende Vertiefung, dass der übrige Theil desselben rund herum einen die Lage des Bruches sichernden Wall darstellt¹⁾. Hat man eine gut gepolsterte Unterlage der Dicke der Extremität entsprechende Rinne zur Hand, so benutzt man diese als Unterlage. Für die in vielen Fällen zweckmässige Lagerung mit halber Beugung der benachbarten Gelenke ist eine pultige Vorrichtung, welche aus zwei in einem Charnier-Gelenk verbundenen Brettern besteht, die unter einem verschieden grossen Winkel gegen einander festgestellt werden können, vielfach in Gebrauch. Über eine solche doppelt geneigte Ebene muss natürlich ein entsprechend gearbeitetes Polster gelegt werden, um die Extremität vor Verwundung zu bewahren. — Die zweckmässige Lagerung der Extremität ist zuweilen die ganze Behandlung oder doch einen wesentlichen Theil derselben aus.

Die Indicationen, welche bei der Behandlung eines einfachen Knochenbruches uns entgegen treten, sind:

- 1) die Bruch-Enden, wenn sie sich verschoben haben, wieder in die normale Lage zu bringen, Einrichtung des Bruches, Reductio, Repositio;
- 2) abermalige Verschiebung zu verhindern, die Bruch-Enden in der normalen Lage zu erhalten, Retentio;
- 3) übele Zufälle zu verhüten und zu beseitigen.

Von der Einrichtung eines Bruches ist fast nur bei Brüchen der Extremitäten die Rede, weil eben bei diesen vorzugsweise Verschiebung Statt findet; jedoch kann auch bei Brüchen am Kopf und am Rumpf Verschiebung vorkommen und deren Beseitigung erforderlich und auch ausführbar sein, der Brüche des Unterkiefers nicht zu gedenken, welche sich überhaupt in vielen Beziehungen den Brüchen der Extremitäten-Knochen analog verhalten.

Das Haupthinderniss bei der Einrichtung einer Fractur ist die

¹⁾ Mit Recht empfiehlt Laurencet (Archiv. génér., 1851 u. 52) zu diesem Behufe ein „zweiklappiges Kissen“. Dies ist ein grosser Spreusack, in dessen Mitte ein langgestrecktes Dreieck abgesteppt ist, so dass es bei der Füllung leer bleibt, somit eigentlich zwei Kissen entstehen, die durch ein doppeltes Stück Leinwand verbunden sind. Wird das Glied auf dies Kissen gelegt, so erheben sich die beiden Seitenhälften und üben einen gleichmässigen, doch nie unangenehmen Druck aus. Vgl. Brüche des Unterschenkels.

Spannung der Muskeln. Man hat deshalb auch von Alters her dahin gestrebt, die Bruch-Enden dem Einflusse der Muskeln zu entziehen. Zu diesem Behufe haben bereits Hippokrates, Fabricius ab Aqua pendente, Petit, Pott u. A. empfohlen, die Extremität in eine solche Lage zu bringen, dass die hinderlichen Muskeln erschlaft sind. Dieser Rath lässt sich jedoch nur selten befolgen, indem bei Erschlaffung der einen Muskelgruppe die andere desto mehr gespannt wird. Noch weniger Aussicht auf Erfolg bietet Dupuytren's Methode dar, die Aufmerksamkeit des Kranken durch heftige und plötzliche Fragen oder Anreden abzulenken.

Glücklicher Weise hilft uns jetzt über diese (wie über viele andere, gleich mangelhafte) Bestrebungen, die Erschlaffung der Muskeln herbeizuführen, die segensreiche Einführung der Betäubungsmittel gänzlich hinweg. Auch die gespanntesten Muskeln erschlaffen während der Chloroform-Narkose so vollständig, dass die Reduction eines Beinbruches ohne grosse Gewalt und nebenbei auch noch ohne Schmerz ausgeführt werden kann. Man sollte dieselbe in keinem irgend schwierigen Fall unterlassen.

Wo man, wie dies namentlich bei Gewohnheits-Trinkern der Fall ist, ein stark entwickeltes Stadium excitationis im Beginne der Chloroform-Betäubung zu erwarten hat (vgl. Bd. I. pag. 44), muss man Fürsorge treffen, dass Gehülfen genug bei der Hand sind, um während desselben den ganzen Körper des Verletzten und namentlich den verletzten Theil sicher fest zu halten. Auch der Mennel-Schneider'sche Apparat (vgl. d. folgd. S.) kann dazu angewandt werden.

Die Einrichtung geschieht durch Zug, Extension, und Gegenzug, Contraextension; d. h. ein oder mehrere Gehülfen ziehen an dem unteren, andere an dem oberen Bruch-Ende, während der Wundarzt selbst seine Aufmerksamkeit auf die Bruchstelle richtet, diese gleichsam zwischen den Händen hält und, sobald die Bruch-Enden durch den Zug der Gehülfen in gleicher Höhe angelangt, oder (besonders bei stark gezähnten Brüchen) so stark nach entgegengesetzten Richtungen hin fortbewegt worden sind, dass, wenn beide in der Achse des Gliedes sich befinden, ein Zwischenraum zwischen ihnen entsteht — den Zug unterbrechen lässt und zugleich die Bruch-Enden gegeneinander schiebt — Coaptatio. Von diesem als Norm beschriebenen Hergange der Reduction weicht aber das bei manchen Knochenbrüchen erforderliche Verfahren gänzlich ab, wie sich dies bei den Fracturen des Unterkiefers, des Olecranon und der Kniescheibe besonders deutlich ergeben wird.


Extension und Contra-Extension dürfen niemals in unmittelbarer Nähe des Bruches Statt finden, wie Fig. 31, bei der Reduction eines Unterschenkelbruches nach Hippokrates, abgebildet ist. Durch ein solches Verfahren werden die oberhalb

Fig. 31.



den verletzen Weichtheile einer neuen Quetschung ausgesetzt. Anderer Seits dürfen Extension und Contra-Extension auch nicht in zu grosser Entfernung von der Bruchstelle ausgeübt werden, wie Fig. 32 (Reduction mit Hilfe eines Hebels, der in die Achse eines Rades eingesetzt wird).

Fig. 32.



Welcher Grad von Kraft zum Behufe der Reduction angewandt werden soll, lässt sich im Allgemeinen nicht bestimmen. Extendirt man in einer zweckmässigen Stellung der Extremität und unter Anwendung betäubender Mittel, so werden die Kräfte eines Mannes meist ausreichend sein. Der Zug muss allmählig und stetig, niemals schweife ausgeübt werden. Zur Extension und Contra-Extension können auch Maschinen benutzt werden. Der gebräuchlichste und zweckmässigste Apparat der Art ist der von Mennel und Schneider angegebene¹⁾. Die Contra-Extension kann auch durch Befestigung des Rumpfes am Bettpfosten ersetzt und die Extension durch den Zug eines Gewichtes bewirkt werden, welches mittelst eines über eine Rolle

¹⁾ An einem starken hölzernen Rahmen von entsprechender Grösse wird einer Seits der Contraextensions-Gurt, anderer Seits eine Winde oder ein Flaschenzug befestigt, durch deren Vermittlung die Extension bewirkt wird. Diese Vorrichtung ist ursprünglich für die Reduction des verrenkten Oberarms erfunden. Vgl. Loder's Journal f. Chirurgie etc. 1800 u. 1801.

laufenden Strickes wirkt, der durch Gurte, Binden oder Schlingen an einer passenden Stelle der Extremität befestigt ist.

Die Extension reicht oft hin, um die Reduction zu vollenden. Nur selten ist die Coaptation mittelst seitlichen Druckes schwierig. Für solche Fälle hat Malgaigne vorgeschlagen, die Bruch-Enden mittelst eines durch die Haut eingestossenen Pfriems zu fassen und in die gehörige Stellung zu bringen.

Dass die Reduction gelungen sei, davon überzeugt man sich durch Vergleichung der Gestalt, Richtung und Länge des verletzten Theils mit demjenigen der gesunden Seite.

Im Allgemeinen ist als Grundsatz festzuhalten, dass die Einrichtung bei einer jeden Fractur sobald als möglich vorzunehmen sei. In Betreff frischer Knochenbrüche erleidet diese Regel gar keine Ausnahme. Die bestehende Geschwulst und Schmerzhaftigkeit ist in solchen Fällen nicht bloß kein Grund gegen die Reduction, sondern kann vielmehr gerade nur durch die Reduction beseitigt werden, — cessante causa cessat effectus. Ist aber die Entzündung bereits sehr heftig geworden, die Bruchstelle von einer harten Geschwulst umgeben, die Einrichtung in der Chloroformbetäubung durch einen mässigen Zug nicht zu bewerkstelligen (was jedoch seltene Ausnahmefälle sind), so ist es besser, keine gewaltsamen Versuche zu machen, sondern zunächst die Entzündung direct zu bekämpfen, weil durch jene Versuche leicht eine gefährliche Steigerung derselben herbeigeführt werden könnte.

Erst nachdem die Reduction (Coaptation) vollendet ist, hat man für die Retention zu sorgen. Liesse der ganze Körper für die Dauer der Heilung sich unbeweglich machen, insbesondere die Wirkung der an den Bruch-Enden befestigten Muskeln sich für diese Zeit aufheben, so wäre die Retention auch durch blosser zweckmässiger Lagerung in sehr vollständiger Weise zu bewirken. Eine solche andauernde Ruhe des ganzen Körpers ist aber entweder überhaupt unmöglich, oder doch dem übrigen Organismus nachtheilig. Dagegen muss der Körpertheil, namentlich also diejenige Extremität oder doch der Abschnitt der Extremität, woran der Bruch sich befindet, in absolute Ruhe versetzt werden; es muss Alles aufgeboten werden, um die Bruch-Enden in genauer Berührung unbeweglich an einander zu halten¹⁾.

¹⁾ In den meisten Fällen ist es zu diesem Behuf erforderlich, die beiden Gelenke, mit denen der gebrochene Knochen in Verbindung steht, für die Heilungsdauer unbeweglich zu machen; jedoch kann man bei Fracturen im unteren Drittheil der verschiedenen Gliederabschnitte das nächst-obere Gelenk meist frei lassen.

Im Allgemeinen lassen sich die zur Retention von Knochenbrüchen benutzten Methoden in drei Gruppen eintheilen:

I. Zweckmässige Lagerung, II. Gleichmässige Compression, III. Permanente Extension.

I. Durch zweckmässige Lagerung des gebrochenen Theiles soll der Einfluss der Muskeln und äusserer Einwirkungen auf die Bruchenden verhütet werden. Hierher gehören die Schweben¹⁾ und die Lagerung auf einer einfach oder doppelt geneigten Ebene. Diese Behandlungsweise allein und ohne Unterstützung anderer Apparate kann nur in solchen Fällen ausreichen, wo die Neigung zur Verschiebung gering und die Localität des Bruches diesem Verfahren günstig ist. Wo sie mit anderen Hilfsmitteln zur Retention des Bruches verbunden, ist die zweckmässige Lagerung überall von Vortheil und von grosser Bedeutung.

Die Lagerung fracturirter Glieder in halb gebeugter Stellung, wie wir sie gewöhnlich durch „schiefe Ebenen“ bewirken, wurde bereits von Hippocrates, Fabricius ab Aqua pendente und J. L. Petit als nützlich anerkannt und besonders von Fabricius ganz bestimmt empfohlen. Er sagt wörtlich, man solle einem jeden Gelenk eine zwischen den extremsten Bewegungen in der Mitte stehende Stellung oder Lage geben. In die Praxis eingeführt wurde dies Verfahren besonders von Pott gegen Ende des vorig. Jahrh. — Um die grossen Vorzüge dieser Lagerung zu verkennen, müssen wir darauf aufmerksam sein, dass es viele Fälle giebt, in denen dem Kranken die vollkommen gestreckte Lage weniger beschwerlich ist, und durch die gebeugte sogar heftige Schmerzen verursacht werden. Ueberdies ist es bei Anwendung der halb gebeugten Lage manchmal besonders schwierig, deformirte Heilungen zu verhüten, — eine Rücksicht, die freilich nicht ausser Acht gelassen werden muss, sobald durch die mit der extendirten Lage verbundenen Uebelstände dem Leben des Kranken irgendwie Gefahr droht.

II. Durch einen auf den ganzen Umfang des gebrochenen Gliedes oder doch einen grossen Theil desselben gleichmässig vertheilten Druck, welcher besonders in derjenigen Stellung anzubringen ist, in welcher die Bruch-Enden sich zu vermeiden Neigung zeigen, wird nach vollzogener Coaptation direct der Veranlassung jeder Verschiebung entgegengewirkt. Hierher gehören die Contentiv-Verbände, welche eben von dieser Wirkung (von Contentiv) ihren Namen haben, ferner die Kapsel- und Rinnen-Verbände, namentlich der Kleister-, der Gutta-Percha- und der Gyps-Verband.

Die Verbandstücke, deren man sich für den gewöhnlichen Contentiv-Verband bedient, sind Binden, Schienen und Polster (Rücken-Kissen), wie wir sie Bd. I. pag. 132—153 beschrieben haben. Die Binden sind entweder gewöhnliche Rollbinden, oder „vielfache“, Scultet'sche Binden.

¹⁾ Vgl. Bd. I. pag. 167 u. flgd.

Von Einzelnen (namentlich von Zeis, Deutsche Klinik 1858) sind die elastischen Gummi- (Kautschuk-) Binden für Beinbruchverbände besonders gerühmt worden. Ich kann nur dem Urtheil von Gurlt (l. c. pag. 421) beitreten, dass sie zu kostspielig und gerade durch ihre Elasticität bedenklich sind, weil durch zufällige Spannung beim Anlegen leicht Einschnürung entstehen kann. — Viel eher dürften zu diesem Behuf federnde Stahlreifen (starke Uhrfedern) anzuwenden sein, über deren günstige Wirkung Dr. Dönhoff, nach brieflicher Mittheilung, Versuche gemacht hat.

Fig. 33.



Die Schienen, deren man sich bei der Behandlung von Knochenbrüchen bedient, müssen im Allgemeinen (jedoch nicht immer) länger sein, als das gebrochene Glied (vgl. Bd. I. pag. 153), und an Breite der Dicke desselben ungefähr entsprechen. Man sucht sie in der Regel der Form des Gliedes anzupassen, so dass sie eine mehr oder weniger rinnenförmige Gestalt erhalten. Sie werden im Allgemeinen nicht unmittelbar auf das kranke Glied gelegt, sondern Polster, Spreukissen (Fig. 33), Watte u. dgl. (auch Luftkissen aus Kautschuk) dazwischen eingeschoben. In einzelnen Fällen jedoch ist es nützlich, die Schienen unmittelbar oder doch nur durch Vermittelung eines sehr festen Polsters auf die Bruch-Enden oder wenigstens auf dasjenige Bruch-Ende, welches grössere Neigung zur Verschiebung zeigt, einwirken zu lassen. Eine solche directe Einwirkung der Schienen bildet den Uebergang zu der von Malgaigne empfohlenen Druckschraube, mittelst welcher man geradezu auf das zur Verschiebung geneigte Bruch-Ende einwirken soll. Vgl. „Unterschenkel-Brüche“.

Die Wirksamkeit der Schienen wird in hohem Grade gesichert, wenn man sie auf der Haut festklebt. Zu diesem Behuf wird biegsames (weiches) Eisenblech in Streifen von 2—3 Centimeter Breite geschnitten, welche in der Regel die Länge des verletzten Extremitäten-Theils haben müssen. Diese werden, der Gestalt des Körpertheils entsprechend, gebogen, namentlich so, dass Stellen, welche keinen Druck ertragen, wie Knöchel und Ferse, mit Ausbiegungen umgangen werden. Die zurecht gebogenen Eisenblech-Schienen werden demnächst in der Art vollständig mit Heftpflasterstreifen überzogen, dass man diese spiralig, mit der Pflastermasse nach Aussen, um die Blechstreifen herumwickelt. Solcher Schienen werden dann 2—4 (zu den Seiten, vorn und hinten) auf den fracturirten Theil aufgeklebt und mit einer kunstgerecht angelegten, weichen (wollnen oder baumwollnen) Rollbinde befestigt.

Von der Brauchbarkeit dieses von Bahr (Deutsche Klinik, 1869, pag. 317) angegebenen Verbandes habe ich mich in zahlreichen Fällen in der Charité und in Feld-

zartten überzeugt. Man muss hinreichend starkes aber weiches (nicht federhartes) Leinblech dazu verwenden.

Anlegung des gewöhnlichen Contentiv-Verbandes. Nach dem Brauch legt man zunächst um die Bruchstelle eine mit Wasser oder mit einer sogenannten resolvirenden Flüssigkeit getränkte Comresse. Demnächst wird die ganze Extremität von den Fingern oder Lehnen an mit aufsteigenden Hobeltouren umwickelt, — Ellenbogen oder Knie mit einer Testudo umgeben. An der Bruchstelle häuft man mehrfache Cirkeltouren. Demnächst werden die gepolsterten oder aus Licker, vorher in Wasser aufgeweichter Pappe (Pappdeckel) bereiteten Schienen angelegt und entweder durch absteigende Hobeltouren derselben Binde oder durch eine besondere Binde befestigt. Die Stelle, in welcher die Schienen liegen sollen, wird, sofern sie nicht das ganze Glied umfassen, wesentlich durch die Richtung bestimmt, in welcher die Bruch-Enden auszuweichen geneigt sind. — Für einen Knochenbruch der unteren Extremität ordnet man den Verband in folgender Weise: 1) Ueber das Kissen, auf welchem die Extremität ruhen soll, legt man ein Leintuch (Serviette, Laken oder dgl.). 2) Einige starke Bandschlingen. 3) Das sogenannte Strohladen-Tuch, auf welchem die Schienen liegen. 4) Die vielköpfige Binde (vgl. Bd. I. pag. 145). 5) Compressen oder Longuetten, welche man auf die Bruchstelle oder an solche Punkte, die eines besonders weichen Polsters bedürfen, zu legen gedenkt. Der also vorgerichtete Verband wird unter das, durch Gehülften erhobene und zugleich, je nach Bedürfniss, extendirte Glied geschoben. Hierauf werden die Verbandstücke in der umgekehrten Reihenfolge, als sie auf das Kissen gelegt wurden, in die Extremität angelegt. Hat eins der Bruch-Enden besondere Neigung sich zu verschieben, so sucht man auf dieses durch graduirte Compressen oder kleinere Schienen besonders einzuwirken. Bei der Anlegung der vielköpfigen Binde erfolgt die Anlegung der einzelnen Bindestreifen gleichfalls von Unten nach Oben in der Bd. I. pag. 145 beschriebenen Weise. Ist man mit dem Anlegen der Binden fertig, so werden die Seitenschienen in dem dazu bestimmten Leintuch von dessen Enden her eingerollt, bis das Tuch unter dem Gliede gespannt ist und zwischen jeder eingewickelten Schiene und der Extremität nur noch so viel Platz bleibt, um einen hinreichend dicken Spreusack aufzunehmen. Auf die vordere Seite des Gliedes legt man einen dritten Spreusack (oder ein drittes Kissen) und darüber, wenn es nöthig erscheint, noch eine dritte Schiene. Während der Gehülfe die Seitenschienen in der Art gegen einander drückt, dass die Extremität von den Spreusäcken genau umfasst und gleichsam in sie ein-

gebettet wird, befestigt sie der Wundarzt in dieser Stellung durch Abziehen und Zusammenknüpfen der vorher schon zu Schlingen gestalteten Bänder. Diese müssen so fest angezogen werden, dass sie eine Verwundung der Band-Enden unmöglich machen, ohne eine schmerzhaftere Lücke zu verursachen. Endlich wird das Tuch, welches den obersten Band auf dem Kissen einnahm, von seinen Enden her in einer schraubartigen Richtung spiralförmig aufgerollt (Bd. I. pag. 153), um dadurch die Festigkeit des Verbandes zu vervollständigen.

Durch die Anwendung beschriebenen Verbände sind viele glückliche Resultate erreicht worden; aber sie haben sowohl für den Kranken, als auch für den Arzt mancherlei Uebelstände. Der Kranke muss während der ganzen Behandlung das verletzte Glied ruhig halten und, wenn es sich um die unteren Extremitäten handelt, im Bette liegen, so dass er also allen Nachtheilen einer andauernden horizontalen Lage ausgesetzt ist. Der Verband muss, wenn er unmittelbar nach der Verletzung angelegt wurde, schon am folgenden Tage wieder geöffnet und neu angebracht werden. Eine Besichtigung des gebrochenen Gliedes ist von späterhin von Zeit zu Zeit zu wiederholen, — wenn der Kranke nicht über Schmerzen klagt, etwa alle 8 Tage. Durch diese Sorgfalt und Schonung bei diesem wiederholten Abnehmen und Anlegen des Verbandes gelingt es allein, Heilungen ohne Difformität zu erzielen. Sehr leicht kann bei der Erneuerung des Verbandes durch eine Bewegung der Bruch-Enden, und in Folge davon nicht bloss neuen Schmerzen, sondern auch zu einer Störung des Heilungsprocesses Veranlassung gegeben werden. Endlich wird durch den lange fortgesetzten Druck auf die kranke Extremität eine bedeutende Abmagerung, sogar eine Atrophie der Muskeln herbeigeführt, welche die Extremität oft für lange Zeit unbrauchbar macht. Diese Uebelstände sind schon in alten Zeiten recht wohl bemerkt worden und haben zur Erfindung von mancherlei Modificationen und anderweiten Methoden Veranlassung gegeben.

Hier haben wir vor Allem die „verhärtenden“, „erstarrenden“, „permanenten“ Methoden zu gedenken (Kleister-Verband, Gutta-Percha-Verband, Gyps-Verband), welche wegen ihrer allgemeineren Anwendung bereits Bd. I. pag. 154—166 beschrieben sind. Doch wollen wir die Vorzüge des Gyps-Verbandes vor anderer Art von permanenten Verbänden hervorgehoben.

Um über den Werth des permanenten Verbandes bei der Behandlung von Fracturen ein richtiges Urtheil zu fällen, müssen wir uns vor Allem über die Art seiner Wirkung klar sein. Derselbe ist nämlich im Wesentlichen diejenige eines gut ange-

legten Contentiv-Verbandes, nur mit dem Unterschiede, dass sie dauernd ist, während sie bei jenem bald nachlässt. Der permanente Verband erhält die Bruchstücke also wesentlich durch gleichmässigen peripherischen Druck in ihrer Lage. In manchen Fällen kann er allerdings auch eine extendirende Wirkung dauernd ausüben. Wenn man z. B. um einen fracturirten Unterschenkel einen genau anschliessenden Gypsverband angelegt hat, während noch einige Geschwulst bestand, so müsste, wenn der Verband bloß durch peripherischen Druck wirkte, mit dem Schwinden der Geschwulst und der, wegen der andauernden Ruhe niemals ausbleibenden Abmagerung der Muskeln die Wirksamkeit des Verbandes erlöschen. Dies ist aber, sofern derselbe sich nur einer Seits dem Fuss und den Malleolen, anderer Seits den Condylen der Tibia genau anschmiegt, keineswegs der Fall. Man kann sich oft schon nach vierzehn Tagen durch Percussion des Verbandes überzeugen, dass sich zwischen ihm und dem Gliede eine Luftschicht befindet. Oeffnet man den Verband zu dieser Zeit, so kann man auch direct sehen, dass die fleischigen Theile des Unterschenkels nicht mehr genau von ihm umschlossen werden. Dennoch beobachtet man in diesen Fällen keine Verschiebung der Bruchstücke; die Heilung erfolgt vielmehr regelmässig und ohne Difformität. Offenbar kann die Wirkung des Verbandes hier nur nach Analogie der Fig. 34 (auf pag. 348) erklärt werden. — Die wesentliche Wirkung des permanenten Verbandes, namentlich während der ersten, wichtigsten Periode der Behandlung, beruht jedoch in der gleichmässigen Compression.

Bei der Vergleichung des permanenten Verbandes mit anderen Verbandarten ist vor Allem hervorzuheben, dass es Fälle giebt, in denen er unbedingt den Vorzug verdient¹⁾. Wenn nämlich der Verletzte nicht Einsicht genug besitzt, um sich aus eigenem Antriebe ruhig zu verhalten oder seiner Bewegung nicht Herr ist, so reicht weder der gewöhnliche Contentiv-Verband, noch irgend ein anderer Apparat aus, um die Bruch-Enden in der gehörigen Lage zu erhalten. In diese Kategorie gehören die Knochenbrüche bei Deliranten²⁾, bei Personen, welche an Krämpfen leiden, in der Mehrzahl der Fälle auch bei kleinen Kindern, zumal an den unteren

¹⁾ Wir betrachten im Nachstehenden den Gyps-Binden-Verband als den Typus des permanenten Verbandes und nehmen namentlich auf die Mängel des Kleister-Verbandes (langames Festwerden und Erweichung durch Flüssigkeiten) weiter keine Rücksicht.

²⁾ Das Delirium tremens bricht, wie nach Verletzungen überhaupt, so auch bei Knochenbrüchen, sehr häufig aus. Vgl. Bd. I. pag. 683.

Extremitäten, wo stete Durchnässung mit Harn unvermeidlich ist; endlich sind hierher auch die Fälle zu rechnen, in denen ein mit Fractur Behafteter weiter transportirt werden muss, oder genöthigt ist, eine Reise anzutreten. In allen solchen Fällen muss der permanente Verband angelegt werden. Bei den meisten Fracturen aber kann er entbehrt werden, und es fragt sich nur, welche Vorzüge er vor anderweitigen Behandlungsweisen darbiete und welche Nachtheile ihm zur Last gelegt werden müssen. Der Hauptvorteil, welchen diese Methode darbietet, und durch welchen sie für die Mehrzahl der Fälle alle anderen Behandlungsweisen weit übertrifft, ist, dass die Retention, sofern sie überhaupt durch eine gleichmässige peripherische Compression erzielt werden kann, sofort und dauernd bewirkt wird, wodurch der abermaligen Erregung von Entzündungen der Weichtheile vorgebeugt, und die für die Heilung des Bruches nothwendige gegenseitige Berührung und ruhige Lage der Bruchstücke gesichert wird. Von grosser Bedeutung ist es ferner, dass der Patient sich bewegen, ja sogar, selbst wenn der Bruch an der unteren Extremität sich befindet, nach einiger Zeit aufstehen und mit Hülfe einer Krücke oder eines Stockes umhergehen kann. Dies kommt besonders bei solchen Kranken in Betracht, bei denen andauerndes Still-Liegen im Bett schon bestehende Krankheiten verschlimmern oder als Krankheitsursache wirken könnte. — Bei complicirten Knochenbrüchen gestattet der permanente Verband die durch Eiterung der Weichtheile und Nekrose der Bruch-Enden nothwendig gemachte Behandlung mit besonderen Verbänden, Irrigation u. dgl. m., ohne Verschiebung oder Insultation der Bruch-Enden. Dies ist bei keinem anderen Contentiv-Verband ausführbar. Ausserdem gewährt der permanente Verband die Annehmlichkeit, dass er gar nicht, oder doch nicht oft gewechselt werden muss, wodurch dem Kranken Schmerzen und die Gefahren einer Verschiebung der Bruch-Enden, dem Arzte aber Zeitverlust erspart werden (vgl. pag. 344).


Die Nachtheile, welche den permanenten Verbänden zugeschrieben werden, sind, dass sie bald zu fest und bald zu lose liegen, dem entsprechend bald zur Gangrän, bald zu einer difformen Callusbildung Veranlassung geben, und dass sie, wegen der andauernden Ruhe, in welche sie die der Fractur benachbarten Gelenke versetzen, bleibende Steifigkeit derselben begünstigen. Diese Vorwürfe treffen viel mehr den behandelnden Arzt, als die Verbandmethode. Der permanente Verband will ebenso sehr, wie jeder andere, überwacht werden. Bemerkt man, dass er zu lose liegt, so wird er der Länge nach gespalten und entweder gänzlich erneuert, oder durch Abtragung

ines entsprechend breiten Streifens von dem einen Schnittrande, Eingiessen von Gyps u. dgl. m. seine Weite verringert. Schwellen lie Finger oder Zehen erheblich an, hat der Patient in ihnen undeutliches Gefühl oder das Gefühl von Taubheit, vermag er nicht, sie zu bewegen, oder klagt er gar direct über den Druck des Verbandes, so erneuert man ihn gleichfalls oder spaltet ihn und befestigt ihn durch Binden oder Riemen in der Art, dass die Schnittränder mehr oder weniger von einander abstehen und der Anschluss der Verbandkapsel an die Extremität folglich weniger fest ist. Es muss jedoch ausdrücklich hervorgehoben werden, dass in letzterer Beziehung die grösste Sorgfalt nothwendig ist, da selbst unter den Händen geschickter und vorsichtiger Wundärzte durch zu fest angelegte Verbände dieser (wie freilich auch anderer) Art mehrmals Brand bedingt worden ist. In Rücksicht hierauf verdient in schwierigen und zweifelhaften Fällen das, zuerst von Seutin angegebene Verfahren, den Verband, sobald er erstarrt ist, zu spalten und somit eine zweiklappige Kapsel darzustellen, den Vorzug. — Um Gelenksteifigkeit zu verhüten, wird man beim Wechseln des Verbandes das eingeschlossene Gelenk jedes Mal in eine andere Stellung bringen, sobald aber die Fixation desselben nicht mehr nothwendig erscheint, denjenigen Theil des Verbandes, welcher das Gelenk umfasst, gänzlich entfernen, um passive Bewegungen vornehmen zu können.

III. Endlich kann man die permanente Extension, entweder allein oder in Verbindung mit den vorerwähnten Verbänden, in Anwendung bringen, um Verschiebung der Bruch-Enden zu verhüten. Die Ausübung der permanenten Extension ist fast immer mit Schwierigkeiten verknüpft. Daher sind denn auch zahllose Verfahrensweisen, Apparate und Maschinen sowohl im Allgemeinen, als auch für die Brüche einzelner Knochen im Besonderen angegeben worden. Es leuchtet ein, dass überall, wo eine wirksame Extension Statt finden soll, auch eine entsprechend kräftige Contra-Extension ausgeübt werden muss.

Diese Regel ist nur im frühesten Alterthume vernachlässigt worden, und schon Hippokrates tadelt das bis dahin gebräuchliche Verfahren, an dem Fusse des gebrochenen Beines mittelst eines über eine Rolle laufenden Strickes ein schweres Gewicht zu befestigen, ohne für die Fixation des oberen Bruchendes Sorge zu tragen. Er empfahl statt dessen einen Apparat, der Fig. 34 abgebildet ist. Ein gepolsterter Ring umfasst den gebrochenen Unterschenkel unterhalb des Knies, ein zweiter oberhalb der Knöchel. Diese werden durch stark federnde Stäbe, welche gebogen zwischen sie eingesetzt werden, von einander gedrängt und somit das untere Ende des Unterschenkels von dem oberen möglichst entfernt gehalten, mithin einer Dislocation ad longitudinem vorgebeugt. Petit befestigte Schlin-

Fig. 34.



gen zum Behuf der Extension am Fuss und übte die Contra-Extension mittelst eines Tuches aus, welches den Oberschenkel an der Grenze des Perineum umfasste und an Kopf-Ende der Bettstelle befestigt wurde. Desault glaubte die Contra-Extension zweckmässiger anzubringen, indem er eine breite Binde um die Brust dicht unter den Achseln anlegte und diese mit Bändern am Kopf-Ende des Bettes befestigte. Er selbst aber und Vermandois benutzten statt dessen später eine lange Schiene, an welcher zugleich Extension und Contra-Extension Statt finden sollte. Diese Schiene musste bedeutend länger sein, als die gebrochene Extremität. An ihrem oberen Ende wurde durch ein zwischen den Beinen durchgeführtes Tuch die Contra-Extension, an dem unteren die Extension mittelst einer an der Knöchelgegend angelegten Schlinge ausgeübt.

Als Bedingungen für den guten Erfolg der permanenten Extension stellt Boyer mit Recht folgende auf. 1) Die Verbandstücke, mit denen Extension und Contra-Extension ausgeführt werden sollen, müssen ihre Wirkung auf möglichst grosse Oberflächen vertheilen und niemals strangartig das Glied umfassen. 2) Dieselben dürfen keinen directen Druck auf diejenigen Muskeln ausüben, welche durch die Extension verlängert werden sollen. 3) Die Extension muss in der Richtung der Achse des gebrochenen Knochens Statt finden. — Aber auch bei sorgfältiger Beachtung dieser Regeln veranlasst die permanente Extension dem Kranken oft so grosse Qualen, dass sie weder in einem solchen Grade, noch so lange Zeit hindurch ausgeübt werden kann, als erforderlich wäre, um Heilung ohne Difformität zu erreichen. Sie hat deshalb als allgemeine Methode nur bei wenigen Wundärzten¹⁾ Eingang gefunden und ist jetzt eigentlich nur noch bei der Behandlung der Brüche des Schlüsselbeins und des Oberschenkels in Gebrauch, bei denen wir auf die Art ihrer Anwendung speciell eingehen werden.

Im Allgemeinen sollen hier nur die beiden Methoden der permanenten Extension erwähnt werden, durch welche man in neuester Zeit ihre allgemeinere Anwendbarkeit zu erzielen gesucht hat.

¹⁾ In neuester Zeit wandte sie noch Jobert ganz allgemein an. Vgl. *Abeille médicale*. 1845, Juni.

a) Permanente Extension mit hohlen Ringen und Schnüren von vulkanisirtem Kautschuk, welche aufgeblasen werden. Handelt es sich z. B. um einen Bruch der unteren Extremität, so wird ein ring- oder wurstförmiges Luftkissen über den Fuss bis zur Knöchelgegend gestreift und alsdann aufgeblasen. Man schliesst es sich genau an, ohne irgendwo einen harten Druck auszuüben, welchem ausserdem durch eine vorgängige Einwickelung des Fusses mit einer Kautschukbinde vorgebeugt werden kann. An dem gedachten ringförmigen Luftkissen befinden sich zwei gleichfalls hohle und mit Luft zu füllende Fortsätze, durch welche, indem man sie am Fuss-Ende des Bettes befestigt, die Extension ausgeübt wird. Sie sind fest und doch ungemäss elastisch und gestatten eine ganz allmähliche Verstärkung und Verminderung der Extension, je nachdem man sie mehr oder weniger mit Luft füllt. Mit diesen kostspieligen Apparaten ist in gross-m Maassstabe noch nicht experimentirt worden. Es steht aber zu befürchten, dass sie bei starker Anfüllung mit Luft gleichfalls Schmerzen erregen, bei geringer Anfüllung dagegen nicht hinreichend wirksam sein werden. Leider ist es eine immer wieder erhärtete Wahrheit, dass alle solche Verbandstücke, welche nachgeben, sehr bald aufhören wirksam zu sein, während diejenigen, welche nicht nachgeben, sehr bald schmerzhaft und unerträglich werden.

b) Am Leichtesten wird die permanente Extension mittelst aufgeklebter Heftpflasterstreifen und angehängter Gewichte ertragen. Diese Methode ist zuerst bei Gelenk-Entzündungen (vgl. d. folg. Abschnitt), wie es scheint von Swift in Easton (1830), dann von Wallace in Philadelphia (1844), bei Fracturen aber besonders von J. H. James in England und von Gurdon Buck in America in neuerer Zeit empfohlen und angewandt worden. Wie mit vielen nützlichen Erfindungen, geht es auch mit dieser: sie verbreiten sich so schnell, dass es bald zweifelhaft wird, wer der Erfinder sei. Vgl. die Referate von R. Volkmann in Virchow und Hirsch, Jahresber. p. 1866—69, Bd. II. — Das zweckmässigste Verfahren ist folgendes. Man klebt die Enden einer langen HeftpflasterSchlinge, von der Bruchstelle beginnend, bis zum Ende der Extremität zu beiden Seiten auf der Haut fest, indem man an solchen Stellen, welche für Druck besonders empfindlich sind (wie die Malleolen), Wattenbäusche unterlegt und für genaues Anschmiegen der Pflasterstreifen durch kunstgerechtes Umwickeln mit einer weichen Rollbinde sorgt. Demnächst wird die Schlinge, welche an der unteren Extremität z. B. unter der Sohle einen losen Steigbügel darstellt, mittelst eines eingeschobenen Brettchens so weit aus einander gespannt, dass sie auf die Ränder des Fusses und auf die Knöchel keinen Druck ausübt; in der Mitte des Brettchens wird ein Strick befestigt, der über eine am Fuss-Ende des Bettes angebrachten Rolle läuft und durch angehängte Gewichte (Sandsack, Schrotbeutel u. dgl., von 5 bis höchstens 20 Pfund) in dem Grade gespannt wird, dass einer Seits ein hinreichender Zug an der Extremität ausgeübt, anderer Seits aber der Rumpf des Kranken nicht fortgezogen wird. Das Gewicht des auf einer Matratze liegenden Körpers reicht meist aus, um die Contraextension zu bewirken. Das gegen einen Klotz am Fuss-Ende des Bettes sich anstemmende (unverletzte) Bein des Kranken unterstützt dieselbe. Erforderlichen Falls kann auch ein am oberen Bettpfosten zu befestigender Perinealgurt hinzugefügt werden. — Um den Heftpflasterstreifen grössere Dauerhaftigkeit zu geben, lässt man das Pflaster (Emplastrum adhaesivum und Empl. cerussae zu leichten Theilen) auf sogenanntes Englisches Leder streichen. Die Streifen müssen — 6 Centim. breit sein. Die Rollen bekommt man bei jedem Eisenwaarenhändler. Man wähle recht grosse und leicht bewegliche. — Um eine bestimmte Richtung der

Extremität zu sichern, kann die Hinzufügung anderer Apparate erforderlich sein. Namentlich bedarf man einer zweiten Rolle, um welche der Strick dann zunächst läuft, dicht über der Matratze am Fuss-Ende der Betstelle, wenn der Zug in horizontaler Richtung geschehen soll. In letzterem Falle muss man auch ein grösseres Gewicht anhängen, da nicht blos durch die zweite Rolle, sondern auch durch die Reibung der Extremität auf dem Lager der Widerstand erheblich gesteigert wird.

Wäre die permanente Extension für den Patienten auf die Dauer nicht oft unerträglich, so würde sie (vorausgesetzt, dass überhaupt ein andauerndes Still-Liegen in dem gegebenen Falle nicht für schädlich erachtet werden muss) im Allgemeinen folgende Vorzüge vor den Binden- und Kapsel-Verbänden darbieten: 1) der Kreislauf in dem fracturirten Gliede wird möglichst wenig behindert, 2) die Bruchstelle und deren Umgebungen bleiben fortdauernd unter den Augen des Arztes, so dass jede daselbst Statt findende Veränderung sogleich in entsprechender Weise behandelt werden kann.

In vielen Fällen können oder müssen mehrere Behandlungsweisen, namentlich zweckmässige Lagerung (Schwebe u. dgl.) mit Contention oder Extension zum Behuf der Retention einer Fractur combinirt werden; oft ist auch ein Wechsel während der Behandlung erspriesslich, so dass man z. B. von der permanenten Extension zum Gypsverbande und von diesem zu aufgeklebten Eisenschienen übergeht.

Die dritte Aufgabe des Arztes bei der Behandlung der Knochenbrüche ist, den Heilungsprocess zu leiten und üble Zufälle zu verhüten oder zu beseitigen. Hauptsächlich handelt es sich um die Verhütung einer zu heftigen Entzündung und die Beförderung der Resorption der nie fehlenden Blutergüsse. Früher wandte man zu diesem Behufe allerlei Pflaster an, welche in manchen Fällen durch den von ihnen ausgeübten gleichmässigen Druck nützlich gewesen sein mögen, aber doch leicht entbehrt oder durch einfachere Mittel ersetzt werden können. Das sicherste Mittel zur Verhütung der Entzündung ist die möglichst frühzeitige Einrichtung und sorgfältige Retention des Bruches; denn der wesentliche Grund einer zu heftigen Entzündung ist die Einbohrung der Bruch-Enden in die umgebenden Weichtheile. Dies gilt in vollem Umfange für die einfachen Fracturen durch indirecte Gewalt (also für die grosse Mehrzahl der Knochenbrüche). Bei directen, sowie bei complicirten Fracturen hängt die Quetschung, und somit auch die Entzündung der Weichtheile, keineswegs blos von der Verschiebung der Bruchstücke ab. Hier kommt es bei der Behandlung auf den schwer zu erkennenden Grad der Quetschung an. Jedoch kann man im Allgemeinen annehmen, dass die Weichtheile in allen solchen Fällen erheblich gequetscht sind. Nächst der Einrichtung und der durch den

Verband ausübenden gleichmässigen Compression kommt daher zur Beförderung der Resorption der grossen, weitverbreiteten Blutergüsse die Anwendung der Kälte in Betracht. Diese erheischt jedoch grosse Vorsicht, weil sie, im Uebermaass angewandt, das Absterben der stark gequetschten Theile begünstigen könnte. So lange die Kälte dem Verletzten angenehm ist und die Schmerzen lindert, ist sie anzuwenden, — aber nie länger. Bei Kranken, deren Urtheil man nicht trauen kann, richte man sich nach der bestehenden oder fehlenden Temperatur-Erhöhung des verletzten Körpertheils. — Muss der Kranke während der Heilung still liegen, so ist ihm eine etwas schmalere Diät vorzuschreiben und für regelmässige Darmausleerungen zu sorgen.

Der Zeitpunkt, zu welchem man dem Kranken den Gebrauch des gebrochenen Gliedes wieder gestatten und den Verband ganz beseitigen kann, ist je nach dem Alter des Patienten und je nach dem Sitze und der Art des Bruches sehr verschieden. Jedoch hat die Erfahrung im Allgemeinen gelehrt, dass bei Erwachsenen zur Heilung eines Bruches, auch unter den günstigsten Verhältnissen, an der oberen Extremität mindestens 1—2 Monate, an der unteren Extremität 2—3 Monate erforderlich sind. Bei Kindern ist etwa die Hälfte der angegebenen Zeit nöthig.

Complicirte Knochenbrüche und deren Behandlung. Die Verletzungen und Erkrankungen, welche als Complicationen eines Knochenbruches, im weiteren Sinne, auftreten können, sind: Wunden, Verletzung von bedeutenden Gefässen, von Nerven, von Gelenken, Quetschungen, Geschwüre in der Nähe der Bruchstelle, Decubitus, Krämpfe, Jauchung oder Eiterung an der Bruchstelle mit nachfolgender septischer oder purulenter Infection, endlich alle möglichen, mit der Fractur selbst gar nicht weiter im Zusammenhang stehenden zufälligen Erkrankungen des ganzen Organismus. Auch nennt man häufig solche Knochenbrüche complicirte, bei denen fortdauernd eine grosse Neigung zur Verschiebung der Bruch-Enden besteht, oder bei denen die Bruch-Enden zerschmettert sind (*Fractura comminuta*).

1) Fortdauernde Neigung zur Verschiebung findet sich viel häufiger bei Brüchen der unteren, als der oberen Extremität, besonders bei Fracturen des Femur und der Tibia, und zwar fast immer auf Grund der Muskelspannung. Ausser der Anwendung einer Lage, durch welche die betreffenden Muskeln möglichst erschlafft werden, und der bereits angegebenen Druck- und Extensions-Apparate, hat man besonders hartnäckigen Fällen die subcutane Durchschneidung der vorzugsweise gespannten Muskeln (oder aber ihrer Sehnen) in Vorschlag gebracht. In dieser Absicht ist besonders die Achillessehne

mehrmals mit glücklichem Erfolge durchschnitten worden¹⁾. Der Gypsverband leistet aber auch in dieser Beziehung so viel mehr als alle älteren Verbandarten, dass man diese operative Hülfe wohl nicht mehr oft nöthig haben wird.

2) *Fractura comminuta*. Gewöhnlich entstehen Zerschmetterungen der Knochen durch direct einwirkende Gewalt, selten durch Gegenschlag. Letzterer vermag in der Regel nur an spongiösen Knochen und Gelenk-Enden, namentlich am Schenkelhalse (A. Cooper) und am unteren Ende des Radius (Dupuytren) Zerschmetterungen zu bewirken. Jedoch ist man in Betreff der Beschränkung der Comminutiv-Brüche durch Gegenschlag früher zu weit gegangen; dieselben kommen namentlich auch an der Tibia, und zwar nicht bloß an deren Epiphysen, sondern auch im Mittelstück des Knochens häufig genug durch indirecte Gewalt zu Stande, wie bereits pag. 11 erwähnt ist. Die Comminutiv-Brüche sind wesentlich verschieden, je nach dem Zustande der die Bruchstelle umgebenden Weichtheile, namentlich des Periost. Letztere können unverseht sein und die Bruchstücke (Splitter, vgl. pag. 313) vollständig in ihrer Lage erhalten, während anderer Seits die Auseinandersprengung soweit gehen kann, dass es, selbst wenn man die ganze Bruchstelle vor Augen hat, unmöglich wird, die einzelnen Stücke wieder in die richtige Lage zu bringen. Zermalmungen der letzteren Art können bei vollständiger Integrität der Haut zu Stande kommen, aber nicht ohne erhebliche Quetschung, meist mit Zerreißung der Muskeln und übrigen Weichtheile. Als eine besondere Art der *Fractura comminuta* ist die Zertrümmerung durch Zusammenpressen von vorzugsweise spongiösen Knochen aufzuführen, wie sie sich, bald durch directe, bald durch indirecte Gewalt bedingt, namentlich an den Wirbelkörpern, aber auch an anderen kurzen Knochen und an den Epiphysen der Röhrenknochen findet, an den letzteren vorzugsweise mit gleichzeitiger Einkeilung (vgl. pag. 317) und vorzugsweise begünstigt durch vorausgegangene senile Atrophie des Knochengewebes. — Kann der zerschmetterte Knochen mit den Fingern erreicht werden, so ist die Diagnose sehr leicht. Man fühlt eine Crepitation, wie beim Druck auf einen Sack voll Nuss-Schalen. Entstand ein solcher Bruch durch Gegenschlag, so zeigen die ihn bedeckenden Weichtheile gewöhnlich keine besonderen Veränderungen, die einzelnen Knochensplitter behalten ihren Zusammenhang mit dem Periost und den übrigen Weichtheilen und werden fernerhin zureichend ernährt, um wieder mit

¹⁾ Vgl. Ménière, Gaz. méd. de Paris, 1841, pag. 512.

einander verwachsen zu können. In solchen Fällen ist die mit der Fractur verknüpfte Gefahr nicht sehr viel grösser, als bei einem einfachen Bruche, vorausgesetzt, dass in der Constitution und dem Allgemeinbefinden des Kranken keine Veranlassung zur Eiterung gegeben ist. Die Behandlung ist alsdann von derjenigen eines gewöhnlichen Bruches nur durch die hier nothwendige vorzugsweise Sorgfalt in der Ueberwachung der Entzündung verschieden. Ist aber die Zerschmetterung eines Knochens durch eine direct einwirkende Gewalt veranlasst, so sind die denselben umgebenden Weichtheile mindestens sehr heftig gequetscht, wahrscheinlich auch, selbst wenn die Haut unversehrt geblieben ist, in hohem Grade zerrissen und gänzlich von den Fragmenten abgelöst, so dass oft gar keine Aussicht zur Wiedervereinigung vorhanden, vielmehr Brand und Verjauchung zu befürchten ist. In solchen Fällen kommt alsbald operative Hülfe in Frage. Vgl. Bd. IV. Amputationen und Resectionen.

3) Quetschung. Eine leichte Quetschung an der Stelle des Bruches veranlasst nur eine etwas bedeutendere Anschwellung, höchstens ganz oberflächliche Gangrän der Cutis, daher die Bildung von Blasen, die mit gelber oder bräunlicher Flüssigkeit gefüllt sind. Der höchste Grad von Quetschung dagegen bedingt mit grosser Schnelligkeit tiefgreifenden Brand. Zwischen diesen Extremen liegen viele Abstufungen (vgl. Bd. I. pag. 644 ff.). Eine ausgedehnte Quetschung, sogar eine heftige Erschütterung kann die Veranlassung einer ausgedehnten Phlegmone, einer eitrigen Infiltration werden; eine heftige, aber wenig ausgedehnte Quetschung kann brandige Zerstörung der Haut und des unterliegenden Bindegewebes bedingen, so dass nach dem Abfallen der Schorfe die Bruch-Enden blossliegen. Jedenfalls also verschlimmert eine heftige Contusion in hohem Grade die Prognose eines Knochenbruches. Die Amputation wird erforderlich, sobald die Weichtheile in der Umgebung eines Bruches zermalmt sind, wenn auch die Haut unversehrt geblieben ist. Besteht ein geringerer Grad der Quetschung, so muss man die Fractur so genau als möglich einrichten, durch einen geeigneten Verband retiniren und die Entzündung bekämpfen. Hier sind kalte Irrigationen, Umschläge von Eis, von Goulard'schem Wasser u. dgl. m. anzuwenden. Haben sich Blasen gebildet, so müssen diese geöffnet, die Epidermis jedoch zurückgelassen werden. Zur Verhütung der Eiterung bedeckt man alle excorürten und verwundeten Stellen mit einem antiseptischen Verbands. Vgl. Bd. I. pag. 150 u. f.

Ein drückender Verband würde bei der, fast immer mit grosser Schnelligkeit entstehenden, bedeutenden Geschwulst eine Einklemmung

der letzteren oder eine zur Gangrän führende Compression der grossen Gefässe an der Stelle, wo die Geschwulst sich entwickelt, zur Folge haben. Die zweckmässige Lagerung des Gliedes, besonders in halbgebeugter Stellung auf einer Rinne oder in einer Schwebel, und wenn diese nicht ausreicht, ein dick mit Watte gepolsterter Gypsverband (sog. Wattenverband, nach Burggraefe), oder permanente Extension mittelst aufgeklebter Heftpflasterstreifen sind die Hilfsmittel, deren man sich zum Behuf der Retention in den ersten Tagen bedienen darf. Später, wenn die Geschwulst gesunken und die Entstehung von Abscessen nicht mehr zu befürchten ist, oder die vorhandenen Abscesse bereits geöffnet sind (womit hier, wie überall, nicht gezögert werden darf), finden Kapselverbände von Gyps oder Gutta-Percha ihren Platz, in denen an den eiternden Stellen Fenster angebracht werden.

Der von Szymanowski angegebene, von mir in vielen Fällen erprobte Gitterverband ist bei ausgedehnter Zerstörung der Weichtheile besonders nützlich. Wird man durch die Ausdehnung einer eiternden Fläche (oder Höhle) an einem fracturirten (oder resecirten) Gliede genöthigt, in dem gewöhnlichen Gypsverbände sehr grosse Fenster anzulegen, so vermindert sich dadurch die Haltbarkeit des Verbandes proportional der Grösse jener Lücken, namentlich wenn dieselben nicht bloss nach der Länge des Gliedes eine erhebliche Ausdehnung haben, sondern auch in querer Richtung sich weit um das Glied erstrecken müssen. Unter solchen Verhältnissen kann man dem Verbande seine volle Haltbarkeit, selbst bei grösster Ausdehnung des Fensters, sichern, wenn man über dem Fenster in der Längsrichtung des Gliedes eine Latte von hinreichender Stärke befestigt. Dies geschieht, indem man am oberen und am unteren Ende des Fensters dicke Bäusche von Werg oder Watte, welche mit Gypsbrei getränkt sind, aufträgt, die Latte in diese vor ihrer Erhärtung eindrückt, dann aber die Latten-Enden und die Bäusche von allen Seiten mit Bindenstreifen, welche in Gypsbrei getränkt sind, umwickelt. Ist ein vollständig quer um das Glied laufendes Fenster wünschenswerth, durch welches der gewöhnliche Gypsverband in zwei mit einander gar nicht mehr in Verbindung stehende, daher auch völlig unwirksame Kapseln zerlegt werden würde, so hat man nur nöthig, diese durch 2 oder 3 Latten (Besenstiele) in der eben beschriebenen Weise in Verbindung zu setzen, um einen Verband zu erhalten, der bei grosser Festigkeit und Dauerhaftigkeit eine freie Einsicht in die Bruchstelle und ihre Umgebungen, sowie die Anwendung aller nur wünschenswerthen topischen Mittel (Umschläge, Bäder etc.) gestattet. —

Bei der Anlegung des Gitterverbandes verfährt man in der Art, dass man zuerst in der gewöhnlichen Weise (vgl. Bd. I. pag. 159 ff.) die beiden Kapseln oberhalb und unterhalb der frei zu lassenden Stelle bildet und die Latten demnächst, während durch Gehülfen oder Apparate (vgl. pag. 339 u. f.) die Theile in der richtigen Lage erhalten werden, mittelst der oben beschriebenen Gypsbrei-Bäusche auf den Kapseln befestigt. — Statt der hölzernen Latten kann man auch einen Eisendraht (sogen. Telegraphendraht) anwenden. Derselbe währt den Vortheil, dass man ihn vor der Einfügung in den Verband nach Bedürfniss biegen und dadurch die (oft unförmigen) Gypsbäusche vermeiden kann. In gleicher Weise lassen sich schmale Rippen von hinreichend dickem Eisenblech verwenden. Am Vollkommensten wird der beabsichtigte Zweck erreicht, wenn man einen gegenförmig gestalteten, abgerundeten Bügel aus Eisen auf zwei Lehrschiene, welche der Gestalt der zu verbindenden Extremitätenfläche ungefähr entsprechend gebogen sind, festnieten lässt und letztere in den beiden Kapseln mit eingypst. Jedoch kann der Verband in diesem Falle nicht improvisirt werden, wenn man nicht etwa eine Anzahl solcher Bügel vorräthig hält.

4) Wunden entstehen bei Knochenbrüchen entweder durch dieselbe Gewalt, welche den Knochenbruch herbeiführte, oder durch ein scharfes Bruch-Ende. Substanzverluste, welche durch die oben erwähnte Ablösung von Brandschorfen bei bedeutender Quetschung veranlasst werden, verhalten sich wie eiternde Wunden. Wesentlich ist vor Allem der Unterschied zwischen Wunden, durch welche die Bruchstelle blossgelegt wird, und solchen, die nicht bis zu der Tiefe des Bruches eindringen. Letztere haben auf den Heilungsprocess der Fractur keinen Einfluss, während durch erstere die Prognose im Allgemeinen verschlimmert wird, obgleich allerdings auch bei ihnen die Heilung in derselben Weise wie bei einfachen Fracturen erfolgen kann, wenn die Wunde klein, gar nicht oder wenig gequetscht, kurz zur Heilung durch prima intentio geeignet und der Verletzte übrigens gesund ist. Gewöhnlich aber steht zu befürchten, dass, ohne eine entsprechende Therapie, Eiterung nicht ausbleibt, dass die von Eiter umspülten Bruch-Enden zum Theil nekrotisch werden, und die Heilung daher sehr viel langsamer und unter den Gefahren, welche jeder mit einem Knochen in Zusammenhang stehende, der Luft ausgesetzte Eiterherd darbietet, erfolge. Handelt es sich in einem solchen Falle um eine Fractura comminuta oder um einen in's Gelenk dringenden Bruch, so ist, wenn die Weichtheile in der Umgegend des Bruches stark gequetscht sind, mit grosser Wahrscheinlichkeit Brand zu er-

warten und dann nur durch Amputation die Erhaltung des Lebens möglich. Sonst aber ist die erhaltende Methode in Anwendung zu ziehen. Die Fractur wird eingerichtet und in der bei der Complication durch Quetschung angegebenen Weise, namentlich also mit gefensternten Gyps- und Gitterverbänden, behandelt. Lose Knochensplinter werden ausgezogen, zu welchem Behuf die Erweiterung der Wunde (zuerst von Paré empfohlen) erforderlich sein kann. Ragt ein Bruch-Ende, besonders ein schräg abgesprengtes (von der Gestalt des Mundstücks einer Klarinette, *en bec de flûte*), weit hervor, so kann die Reduction schwierig oder gar unmöglich werden, wenn man nicht zum Absägen des hervorragenden Endes seine Zuflucht nimmt. Diese Operation aber kann unbedenklich, gewöhnlich sogar mit dem besten Erfolge ausgeführt werden. Ist die Reduction gelungen, so sucht man die Wunde wo möglich durch erste Vereinigung zum Verschluss zu bringen. Bei der grossen Gefahr, welche namentlich in der Tiefe eines zerbrochenen Röhrenknochen durch Eiterung herbeigeführt wird (vgl. Osteomyelitis im nächsten Capitel), hat man sich von jeher bemüht, die Eiterung zu verhüten oder doch auf ein möglichst geringes Maass zu beschränken. Frühzeitiger sorgfältiger Verschluss der Wunde, welchen A. Cooper durch das Auflegen eines mit dem Blute des Patienten getränkten Charpiebausches erzielen wollte, sowie das möglichst seltene Wechseln des Verbandes sind in der Hoffnung, durch Abschluss des Luftzutritts die Eiterung zu verhüten, empfohlen worden. Abgesehen davon, dass ein hermetischer Verschluss der Wunde sehr oft in Widerspruch steht mit dem notwendigen Abfluss des Eiters und der kunstgerechten Entleerung der Eiterherde, welche sich in der Umgebung bilden, hat die Behandlung mit den sogen. Oclusions-Verbänden doch immer nur in leichteren Fällen zum Ziele geführt und sich namentlich in den letzten Stadien der Heilung, wenn die Granulationen sich schon zur Vernarbung anschickten, vollständig bewährt. Eine erhebliche Verminderung der Gefahren der complicirten Knochenbrüche (im engeren Sinne des Worts) ist erst durch die Einführung der antiseptischen Methode von Lister erreicht worden, welche sich aus den Bd. I. pag. 48 und pag. 150 u. f. im Allgemeinen beschriebenen Arten zusammensetzt. Die Wunde und die von dieser aus zugängige Bruchstelle werden möglichst früh, am Besten sogleich nach ihrer Entstehung, mit einer wässrigen Lösung von reiner Karbolsäure (1 auf 40) reichlich getränkt und ausgespült; dies wird wiederholt, nachdem die Reduction geschehen ist. Während des Anlegens des Verbandes muss dafür Sorge getragen werden, dass die Wunde mit einer in 1 p. c. Karbol-

säure-Lösung getränkten Comresse bedeckt und dadurch der Zutritt der Luft und aller in der Luft schwebenden Keime unmöglich gemacht wird. Der zum Behuf der Retention anzulegende Verband muss die Gegend der Wunde, wenn letztere nicht ganz unerheblich ist, von Anfang an freilassen, damit das etwa noch ausfliessende Blut und das demnächst unter dem antiseptischen Verbande immer hervorquellende seröse Wundsecret nicht etwa den Retentions-Verband tränke und dort der Zersetzung verfallt. Alle aus der Wunde sich ergiessenden Flüssigkeiten müssen vielmehr von den die Wunde bedeckenden und umgebenden antiseptischen Stoffen aufgenommen werden; auch muss man, wenn die Beschaffenheit der Wunde den Ausfluss des Wundsecrets nicht absolut sicher stellt, ein Gummirohr (Drainage-Rohr) bis zur Bruchstelle einlegen, um jede Retention von Flüssigkeiten in der Wunde zu verhüten. Während der Retentions-Verband, so lange er sich wirksam und nicht anderweitig nachtheilig erweist, unverändert bleibt, muss der Wundverband, je nach der Schnelligkeit, mit welcher das Wundsecret hindurchdringt, täglich 1 bis 2 Mal mit strengstem Ausschluss der Möglichkeit des Eindringens irgend welcher Fäulniskeime (also auch stets unter dem „Spray“) gewechselt werden. Vgl. Bd. I. pag. 150. Gerade bei der Behandlung complicirter Fracturen kommt es auf die minutiöseste Sorgfalt in der Handhabung der antiseptischen Methode wesentlich an, viel mehr als auf die Wahl dieser oder jener Form, in welcher die Karbolsäure (die wir vor der Hand allerdings als das beste Antisepticum anerkennen müssen) angewandt wird¹⁾. Bei strenger und sorgfältiger Durchführung der antiseptischen Methode gelingt es, complicirte Knochenbrüche zur Heilung zu bringen, bei denen früher jeder erfahrene Chirurg die Amputation für unvermeidlich gehalten haben würde, selbst solche, bei denen die Splitterung bis in ein Gelenk dringt, sofern nur die Quetschung der umgebenden Weichtheile diese nicht ganz lebensunfähig gemacht hat. In der Mehrzahl der Fälle gelingt die Heilung ohne erhebliche, oder auch ganz ohne Eiterung, ohne Fieber, ohne Schmerz.

5) Verletzung eines grossen Gefässes ist bei Knochenbrüchen nicht bloss in offener Wunde, sondern auch ohne äussere Wunde möglich. Im letzteren Falle bildet sich, wenn eine grössere Arterie verletzt ist, ein Aneurysma spurium primitivum (vgl. pag. 76 ff.). Die Masse des zwischen die Muskeln ergossenen Blutes kann in solchen Fällen sehr bedeutend sein, wenn auch nur eine

¹⁾ Vgl. J. Lister, Lancet 1870, August 27.

kleine Arterie zerrissen ist. Jedenfalls ist aber eine solche Arterienverletzung eine bedenkliche Complication; wenn auch heut zu Tage selbst die Zerreiſung der Hauptpulsader eines Gliedes bei gleichzeitigem Bestehen einer Fractur nicht mehr für eine absolute Indication zur Amputation erachtet werden darf, so erhöht doch eine solche Complication die Gefahr in sehr bedeutendem Grade. Dass so schnell als möglich Verschluss des verletzten Gefässes bewirkt werden muss, unterliegt keinem Zweifel. Besteht eine Wunde, so wird man in dieser zu unterbinden suchen, wenn sie auch dazu erweitert werden muss. Ist dies nicht möglich oder besteht gar keine Wunde, so ist die indirecte Unterbindung anzuwenden; vgl. pag. 154 u. f. Im letzteren Falle wird wegen der zeitweise verminderten Blutzufuhr die Heilung der Fractur beeinträchtigt, ausserdem aber durch die Anwesenheit der Extravasate die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Brand folgen werde. Weniger gefährlich sind Verletzungen von Venen, sofern es nur gelingt, einem allzu bedeutenden Blutergusse vorzubeugen und Eiterung zu verhüten. Jedoch kommt es hierbei sehr wesentlich auf die Lage und die Grösse der Vene an; vgl. pag. 228 u. f.

6) Zerreiſungen und Zerrungen von Nerven können unter denselben Verhältnissen, wie Verletzungen von Gefässen, besonders bei Splitterbrüchen vorkommen; vgl. pag. 286 u. f. Die bei Fracturen (namentlich in früheren Zeiten, wo man ziemlich allgemein daran festhielt, dass die Reduction der Bruchstücke nicht frühzeitig vorgenommen werden dürfe) häufig beobachteten Zuckungen und Muskelkrämpfe an dem fracturirten Gliede sind grossen Theils aus Nervenverletzungen abzuleiten. Aber ebensowenig wie beim Tetanus (vgl. pag. 291) handelt es sich hier vorzugsweise um Verletzungen bedeutender Stämme. Verhütet werden solche Krämpfe durch frühzeitige Reduction und einen guten Verband, der abermalige Verschiebungen unmöglich macht. Wo die Beschaffenheit des Bruches eine solche Therapie nicht zulassen sollte, würde man sich auf die Palliativbehandlung durch zweckmässige Lagerung und Beruhigungsmittel (hypodermatische Injectionen von Morphinum, Chloralhydrat u. s. f.) zu beschränken haben.

Der Erschütterung des Nervensystems, welche mit den meisten Fracturen zugleich stattfindet, ist es zuzuschreiben, dass unmittelbar nach der Verletzung immer ein gewisser Grad von Wundstupor (Shock, vgl. Bd. I. pag. 683), weiterhin aber Delirium potatorum als Complicationen von Knochenbrüchen relativ häufig beobachtet wird.

7) Verletzungen der Gelenke kommen bei Knochenbrüchen

in mannigfaltiger Form vor. Schon der Sitz einer Fractur in der Nähe eines Gelenkes bedingt nicht blos Schwierigkeiten bei der Reduction, sondern hat auch oft Entzündung des Gelenkes und weiterhin Gelenksteifigkeit zur Folge. Diese Gefahren bestehen in weit höherem Grade, sobald die Bruchlinie, wenn auch nur mit einer feinen Spalte, in das Gelenk eindringt, — eigentliche Gelenkbrüche. Auch Verrenkung kommt als Complication von Knochenbrüchen in zweierlei Weise vor: entweder das Gelenk-Ende selbst, an welchem der Bruch sitzt, ist auch zugleich verrenkt, oder der Bruch befindet sich in einiger Entfernung von dem verrenkten Gelenke. Im ersten Falle ist die Verletzung eine viel üblere (wie bei den Krankheiten der Gelenke genauer zu erörtern ist), im zweiten hat das Bestehen der Verrenkung auf den Heilungsprocess des Knochenbruches keinen oder doch nur einen untergeordneten Einfluss, aber das Bestehen der Fractur kann die Möglichkeit der Reposition der Verrenkung beeinträchtigen, besonders wenn das verrenkte Bruch-Ende (namentlich am Schulter- und Hüftgelenk) nicht gehörig gefasst und bewegt werden kann.

In allen diesen Fällen erheischt die Gelenkverletzung vorwiegende Berücksichtigung. Vgl. d. folgd. Abschnitt.

8) Emphysem. Bei einer mit Hautwunde complicirten Fractur kann das Emphysem von dem Eindringen der äusseren Luft und deren zufälliger Zurückhaltung zwischen den Geweben abhängig sein. Dies hat keine besondere Bedeutung. In anderen Fällen aber handelt es sich um das sogenannte spontane Emphysem (vgl. pag. 62); die Gase, welche im Bindegewebe sich verbreiten, sind das Resultat der Zersetzung, welche in den Geweben auf Grund der erlittenen Erschütterung mit überraschender Schnelligkeit eintritt. Weiterverbreitung des Emphysems erfolgt, wenn die brandige Zersetzung mit solcher Schnelligkeit auftritt, dass vorher noch kein plastisches Exsudat die Bindegewebsmaschen undurchgängig gemacht hat. Wo dies Emphysem bei Fracturen in grosser Ausdehnung und schnell sich entwickelt, ist (wie namentlich Malgaigne hervorgehoben hat) nur in der Amputation Heil zu suchen. Zuweilen schreitet es mit solcher Schnelligkeit fort (sogen. *gangrène foudroyante*), dass auch auf dies äusserste Mittel verzichtet werden muss.

9) Das Durchliegen, Decubitus, ist eine sehr üble Complication, namentlich bei Fracturen, welche eitern und Fieber erregen. Gerade bei fiebernden Kranken kommt aber Decubitus leicht zu Stande. Vgl. Bd. I. pag. 302. Handelt es sich um eine einfache Fractur, so sieht man Decubitus nur bei sehr langem Still-Liegen und bei älteren oder sehr heruntergekommenen Subjecten. Der Kranke kann an

dieser Complication noch sterben, während sein Knochenbruch in voller Heilung begriffen ist. Man muss diesen üblen Zufall auf alle Weise zu verhüten suchen. Radicale Hülfe ist aber nur möglich, wenn man den Druck auf die besonders bedrohten Theile, Os sacrum, Ferse u. s. f. gänzlich vermeidet. Dies kann durch permanente Verbände, welche dem Kranken Bewegungen gestatten, auch wohl durch Schweben, aber nicht durch die von Pott empfohlene Seitenlage erzielt werden. Bei letzterer wird die Gegend des grossen Trochanter in gleicher Weise, wie sonst diejenige des Os sacrum bedroht. — Dass Druckbrand auch durch zu feste Verbände entstehen kann, bedarf keiner Erläuterung.

10) Lungenkatarrhe, Blutandrang zum Kopf, hartnäckige Verstopfung treten während der Heilung von Knochenbrüchen nicht selten hervor. Sie sind oft ausschliesslich durch die ruhige Lage bedingt. Sobald diese vermieden werden kann, ist ihre Verhütung, resp. Beseitigung, leicht. Uebrigens bekämpft man sie mit den aus der inneren Therapie bekannten Mitteln.

11) Auf etwa bestehende Diathesen und Dyskrasien hat man bei Individuen, welche eine Fractur erlitten haben, sorgfältig zu achten. Dies gilt besonders in Betreff der Syphilis.

Nachbehandlung. Die Dauer der Behandlung ist, wie schon bemerkt, je nach dem Alter des Verletzten, der Art und dem Sitze des Bruches verschieden. Ist die erfahrungsmässig für den vorliegenden Bruch mindestens erforderliche Zeit hindurch das Glied im Verbande gewesen, so versucht der Wundarzt nach vorsichtiger Entfernung desselben, ob die Consolidation bereits erfolgt ist. Ergiebt sich bei dem Versuch, die ehemaligen Bruch-Enden gegen einander zu bewegen, eine hinreichende Festigkeit, so hebt man die Extremität auf, ohne das untere Bruch-Ende zu unterstützen. Hält der Callus auch diese Probe aus, so ist kein Verband mehr erforderlich; jedoch darf der Verletzte noch nicht wagen, die Extremität frei zu gebrauchen, insbesondere nicht mit dem fracturirten Bein auftreten. Er muss sich vorläufig der Krücken oder eines Lauf-Barrens¹⁾ bedienen und jedenfalls die Extremität noch mit einer Binde umwickeln, um das, sonst nach jeder Fractur eintretende Oedem zu verhüten. Erst wenn er auf ebenem Boden sicher auftreten gelernt hat, darf er auf die Strasse gehen oder Treppen steigen. Zurückgebliebene Gelenksteifigkeit muss durch passive Bewegungen, Einreibungen von Fett, Bäder (auch sogen. Thierbäder) und Douchen bekämpft werden. Die Muskeln sucht man,

¹⁾ Von derselben Construction, wie die Turn-Barren, aber länger und auf Klötzen stehend, daher in jedem Zimmer aufzustellen.

so lange der Wille sie noch nicht wieder völlig beherrscht, durch galvanische Reizung zu stärken. Diese Behandlung wird um so sicherer zum Ziele führen, je mehr die Steifigkeit und Schwäche der Extremität bloß von der Atrophie der Muskeln oder von Veränderungen, welche ausserhalb der Gelenke ihren Sitz haben, abhängig ist. Sind dagegen Muskeln oder Sehnen in den Callus eingeheilt und dadurch befestigt, so gelingt die Wiederherstellung der Beweglichkeit sehr viel schwieriger. Sie kann endlich unmöglich werden, wenn in den der Fractur zunächst liegenden Gelenken wahre Ankylose entstanden ist.

Behandlung des difformen Callus. So lange der Callus noch einige Biegsamkeit darbietet, kann man durch kräftige Extension und sofort angelegten erhärtenden oder extendirenden Verband eine fehlerhafte Gestalt desselben beseitigen. Dupuytren hat zuerst Versuche der Art in grösserem Maassstabe und mit glücklichem Erfolge gemacht. Die Anwendung der Chloroformnarkose hat dieser Methode in neuester Zeit eine viel grössere Ausdehnung zu geben gestattet; namentlich hat A. Wagner¹⁾ auf diese Weise zuerst bei schon weit vorgeschrittener Consolidation noch glückliche Erfolge erzielt. Wo man aber mit diesem relativ milden Mittel nicht auskommt oder nach der Lage und Beschaffenheit der Bruchstelle keinen Erfolg davon erwarten kann, muss man sich zu etwas stärkeren Eingriffen entschliessen.

Vor Allem hat man das Zerbreehen des Callus, das Wiederzerbreehen des difform geheilten Knochens, häufig unternommen, um die Fractur demnächst in einer besseren Stellung zu heilen. In den meisten Fällen lässt sich dies mit den Händen ausführen (Dieffenbach), nöthigenfalls mit Benutzung künstlich angefügter langer Hebelarme, welche sich mir sehr nützlich erwiesen haben (s. unten). Früher hat man sich oft dazu besonderer Apparate bedient; ihr Typus ist der von Bosch und Oesterlen angegebene, später vielfach, namentlich von Blasius und zuletzt von v. Bruns modificirte Dymorphosteopalinklastes. Dieses Geräth hat Aehnlichkeit mit einer kleinen Buchdruckerpresse. Zwei gepolsterte Riemen umfassen das Glied dicht oberhalb und dicht unterhalb des Callus; an ihnen ist in einiger Entfernung ein Balken befestigt, durch den eine Druckschraube sich vertical gegen die Axe des Gliedes auf und ab bewegt. Diese Schraube lässt man vermittelst einer Pelotte kräftig gegen die ehemalige Bruchstelle wirken bis der Callus wiederum bricht.

¹⁾ Ueber die Behandlung deform geheilter Knochenbrüche durch gewaltsame Streckung. Königsberger medicinische Jahrbücher 1859. Bd. I. Als lateinisches Programm 1858 gedruckt.

Man erhält auf diese Weise eine Fractur ohne Complication Hautwunde. Besteht nicht blos winklige Verkrümmung, sondern auch Dislocatio ad longitudinem oder Kreuzung der Bruch-Ende kann das Zerbrechen allein die bestehende Verkürzung nicht besei-

In 19 Fällen von difform geheilten Fracturen ist mir das Wiederzerbrechen Anwendung eines Dymorphosteopalinklastes gelungen. v. Bruns (Deutsche 1861) konnte in den 5 Fällen, in denen ihm das Zerbrechen mit unbeweglichen Händen nicht gelang, mit dem Osteoklasten auch nicht zum Ziele kommen. Wichtigkeit scheint es mir aber, die Hebelarme, an denen man beim Zerbrechen mit den Händen wirkt, nach Bedürfniss künstlich zu verlängern, wodurch man die Gewalt ungemein erhöht, ohne die Weichtheile durch stärkeren Druck zu gefährden. Von grösster Bedeutung ist dieses Hilfsmittel, wenn das eine Bruch-Ende sehr kurz war, z. B. bei einer nahe oberhalb des Fussgelenks. In 3 Fällen der Art habe ich dieses Verfahren bestem Erfolge in nachstehender Weise angewandt. Das obere Ende einer 2 Fuss langen Holzschiene wurde mittelst eines sehr dicken Gypsverbandes am untersten Theile des Unterschenkels und dem Fuss befestigt, wobei das Fussgelenk zugleich unbeweglich gemacht wurde, die ehemalige Bruchstelle aber frei blieb. Nach völliger Erhärtung des Gypsverbandes ergriff ich, während ein Gehülfe den Unterschenkel fixirte, das freie Ende der Schiene und vermochte mit der Hand den Unterschenkel unter krachendem Geräusch zu zerbrechen und dem Unterschenkel seine normale Gestalt zu geben. Die Heilung erfolgte unter einem sofort angelegten Gypsverband ohne irgendwelche Störung.

Die Durchschneidung des Callus, mit glücklichem Erfolge zuerst von Wasserfuhr d. Ä. ausgeführt, bietet vor dem Zerbrechen, sofern dies ausführbar ist, keine besonderen Vorzüge dar und keinen Nachtheil mit sich, dass man statt eines einfachen Knochenbruches eine complicirte Knochenwunde erhält. Andererseits ist aber zu erwägen, dass bei dem gewaltsamen Zerbrechen des Callus mit dem Osteoklasten eine erhebliche Quetschung der umgebenden Weichtheile kaum zu vermeiden ist. Für diejenigen Fälle, in denen eine solche Quetschung voraussichtlich erfolgen müsste, sowie für diejenigen, welche wegen grosser Festigkeit des Callus der Methode des abermaligen Zerbrechens überhaupt nicht zugänglich sind, eignet sich der von B. v. Langenbeck angegebene Mittelweg, den Knochen (d. h. den difformen Callus) an einer geeigneten Stelle mittelst eines kleinen Einschnitts bloss zu legen, demnächst zu durchbohren, von dem Bohrloch aus mittelst einer Stichsäge ohne weitere Verletzung der Weichtheile so weit zu durchsägen, dass der durch die Säge getrennte Theil ohne Schwierigkeit und ohne weitere Verletzung der Weichtheile zerbrochen werden kann, — subcutane Osteotomie. Gefährlicher ist offenbar die von Meyer in Würzburg mehrfach mit glücklichem Erfolge geübte Art der Osteotomie. Derselbe berechnet genau die Grösse eines Keils, welcher mit

basis gegen die convexe Seite der Verkrümmung des difformen Callus richtet, aus der Continuität des Knochens entfernt werden muss, um nachher bei genauer Berührung und Vereinigung der Sägeflächen die normale Richtung des Knochens wieder herzustellen. Im Vergleich mit anderen Resectionen in der Continuität sind aber diese Operationen deshalb weniger gefährlich, weil an der ehemaligen Bruchstelle keine Markhöhle besteht (vgl. Osteomyelitis).

Wo es sich nicht um eine winklige Verbiegung, sondern nur um einen stark hervorragenden difformen Callus handelt, kann man den hervorragenden Theil desselben nach Durchschneidung der Weichteile absägen. Wo winklige Verbiegung zugleich besteht, kann man das Zerbrechen des Knochens hierauf folgen lassen. Letzteres ist mindestens ebenso gefährlich als das Durchschneiden des ganzen Callus, und die Abtragung einer prominirenden Callusgeschwulst darf ebenfalls nicht als eine ganz ungefährliche Operation betrachtet werden. Unter Anwendung der antiseptischen Methode verlieren jedoch alle diese Operationen zum grossen Theil ihren gefährlichen Charakter, wie Lister bereits praktisch erwiesen hat.

Das Haarseil ist von Weinhold angewandt worden, um den Callus durch Erregung einer neuen Entzündung wieder biegsam zu machen. Er bediente sich dazu der Nadeltrepphine, d. h. einer starken lanzenförmigen Nadel, welche in der Nähe ihrer Spitze ein Ohr besitzt. Durch rotirende Bewegungen (vgl. Trepanation, Bd. III.) wird diese Nadel, nachdem sie bis auf den Callus an einer geeigneten Stelle eingesetzt ist, durch denselben hindurch gebohrt und demnächst an der entgegengesetzten Seite des Gliedes mit ihrer Spitze hervorgestossen. Nun wird das Haarseil eingefädelt, die Nadel auf demselben Wege zurückgezogen und somit ersteres durch das ganze Glied und mitten durch den Callus hindurchgeführt. In dem Falle von Weinhold wurde der Callus, nachdem das Haarseil 7 Wochen gelegen hatte, so weich, dass die Extremität durch einen Extensionsapparat beinahe auf ihre normale Länge zurückgeführt werden konnte.

Behandlung der Pseudarthrose. — Ist das falsche Gelenk noch frisch, handelt es sich mithin mehr um eine Verzögerung der Consolidation, so muss man den Verband wieder anlegen und gehörig befestigen, um ruhige Lage der Bruch-Enden herbeizuführen. Ausserdem sucht man alle diejenigen Verhältnisse, welche die Callusbildung beeinträchtigen könnten, zu beseitigen. Scheint die Verzögerung der Heilung auf einer zu geringen Entzündung an der Bruchstelle zu beruhen, so sucht man diese durch Reiben der Bruchenden gegen einander und durch reizende Einreibungen (Aufselseln von Jodtinctur, nach Buchanan, Blasius u. A.) auf die der Bruchstelle entsprechende Haut zu erhöhen.

Das Reiben der Bruch-Enden an einander ist schon von Celsus empfohlen worden. Die Wirksamkeit dieses Verfahrens dürfte jedoch grössten Theils auf die noch

frischen Fälle beschränkt bleiben. — Als eine Art von Reibung der Bruch-Enden gegen einander ist es auch zu betrachten, wenn man bei verzögerter Callusbildung an der unteren Extremität den Kranken auf dem mit einem festen Verbands umgebenen Gliede absichtlich auftreten lässt, wie dies bereits Hunter und in neuester Zeit Seutin und Velpeau mit Glück gethan haben.

Viel schwieriger ist die Behandlung der veralteten, vollkommen ausgebildeten „falschen Gelenke“. Hier ist die Entzündung gänzlich erloschen; gelingt es auch, sie aufs Neue zu erregen, so ist es doch sehr fraglich, ob in der, die Bruch-Enden gewöhnlich verbindenden Zwischensubstanz, in Folge der aufs Neue angeregten Entzündung auch Knochen-Neubildung erfolgen werde. Ueberall, wo die fibröse Zwischensubstanz eine beträchtliche Dicke besitzt, ist zu fürchten, dass sie der, von den Bruch-Enden aus, nach einer absichtlichen Reizung derselben, gelieferten verknöcherungsfähigen Schicht ein Hinderniss darbieten werde. Daher ist denn auch die vollständige Entfernung dieser Zwischensubstanz, theils durch Resection, theils durch Erregung von Eiterung in ihr mittelst eines durchgezogenen Haarseils u. dgl. m. versucht worden. Bei ganz veralteten Pseudarthrosen wird man aber, auch wenn es gelingt, knöcherne Vereinigung zu erzielen, dennoch die Brauchbarkeit des Gliedes nicht vollständig wieder herstellen können, wenn bereits Atrophie der Muskeln und Knochen besteht. Am Auffallendsten ist dies, wenn die Pseudarthrose schon im jugendlichen Alter sich gebildet hat.

Die einzelnen Verfahrensweisen zur Behandlung der Pseudarthrose bezwecken demnach:

a) entweder bloß die Erregung von Entzündung in den Bruch-Enden, wie das Anbohren der Bruch-Enden, das Einschlagen von Elfenbeinzapfen, das Einziehen eines Haarseils, das Zerreißen der Zwischensubstanz, die Acupunctur u. dgl. m., oder

b) die Zerstörung der Zwischensubstanz, wie die Resection und die Kauterisation; letztere kann jedoch ebenso gut wie das Haarseil, je nach der Anwendungsweise, auch zu der ersteren Gruppe gezählt werden.

Das Anbohren der Bruch-Enden geschieht, nach vorgängiger Durchschneidung der Weichtheile nahe an der Bruchstelle, mit einem gewöhnlichen scharfen Bohrer, namentlich einem sogenannten Drillbohrer, oder einer kleinen Nadeltrephine. Die Bohrkanäle sind rechtwinklig gegen die Achse des Knochens gerichtet, die Bohrspähne lässt man in ihnen zurück, damit sie als fremde Körper eine dauerndere Entzündung erregen. — Das Einschlagen von Elfenbeinzapfen (Dieffenbach) führt man mittelst des Hammers aus, nachdem eine kleine Incision durch die Weichtheile gemacht und der

nochen an der entsprechenden Stelle angebohrt ist. Wird die durch die Anwesenheit der Elfenbeinzapfen erregte Entzündung zu heftig, so zieht man sie alsbald wieder aus; sonst aber wartet man ab, bis sie durch Eiterung vollständig gelockert sind. — Das Zerreißen oder Zerbrechen der Zwischensubstanz, eigentlich schon von Celsus empfohlen, geschieht, nach Günther, indem man die Bruchstelle in geeigneter Weise stark hin und her biegt, als wollte man einen difformen Callus zerbrechen.

Die Acupunetur, welche Malgaigne ohne Erfolg anwandte, und die hypodermatische Injection von Liquor ammonii caustici, mit welcher Bourquet (Gaz. des hôpit., 1863, No. 61) bei einer Pseudarthrose des Femur Heilung erzielte, bedürfen keiner besonderen Beschreibung. — Auch bei der Kauterisation hat man sich nach den allgemeinen Vorschriften zu richten. — Eigenthümlich ist das Verfahren von Mayor, ein Mittelding zwischen Kauterisation und Einführung eines fremden Körpers. Er schob zwischen die Bruch-Enden einen dicken Troiquart und liess die Canüle 8 Stunden lang liegen, während welcher Zeit mehrmals ein bis zur Temperatur des siedenden Wassers erhitzter Eisenstab in sie eingeführt wurde.

Das Durchziehen eines Haarseils ist zuerst von Physik (in Philadelphia) bei einer Pseudarthrose des Humerus mit Glück versucht worden. Später haben Percy, Dohlhoff, Harris u. A. günstige Resultate, zuweilen jedoch auch sehr üble Zufälle davon beobachtet.

Abweichend von der gewöhnlichen Anwendung des Haarseils ist das Verfahren von Sommé. Er beabsichtigt mittelst eines Silberdrahtes allmählig die Durchschneidung der fibrösen Zwischensubstanz zu bewirken und gleichzeitig durch die Anwesenheit des Drahtes Entzündung zu erregen. Die kranke Extremität wird an der Stelle der Pseudarthrose an deren einer Seite mit einem langen Troiquart durchbohrt, das Stilet wird zurückgezogen, durch die Canüle aber das eine Ende eines langen Silberdrahtes hindurchgeführt. Alsdann wird auch die Canüle entfernt und der Troiquart auf der anderen Seite der Pseudarthrose in derselben Richtung durch das Glied gestossen, so zwar, dass seine Spitze durch dieselbe Ausstichöffnung, wie beim ersten Male, hervortritt. Auch auf diesem Wege lässt man den Silberdraht der Canüle folgen. Die Zwischensubstanz ist mithin von einer Drahtschlinge umfasst. Die Weichtheile, welche sich zwischen den beiden Einstichpunkten befinden, werden nun in der Richtung von dem einen derselben zum anderen bis an den Knochen durchschnitten, die Drahtschlinge aber dann allmählig immer fester zusammengedreht, so dass durch sie die von ihr umfassten Theile, insbesondere also die fibröse Zwischensubstanz, zusammengeschnürt und durchschnitten werden.

In dem von Sommé (in Antwerpen) behandelten Falle erfolgte die Consolidation

durch dicken Callus ohne Verkürzung in 6 Wochen, obgleich der Draht noch nicht alle umfassten Theile durchschnitten hatte. Nach 3 Monaten konnte Patient gehen.

Zur Ausführung der Resection macht man in der Gegend der Pseudarthrose einen Einschnitt in der Richtung des Knochens und bis auf diesen, löst, sofern dies nothwendig, die Bruch-Enden von ihren Umgebungen und schneidet mit der Säge von jedem Bruch-Ende ein Stückchen ab, so dass die Zwischensubstanz gänzlich entfernt wird. Der Einschnitt muss an einer solchen Stelle gemacht werden, wo möglichst wenig Weichtheile über dem Knochen liegen und grössere Gefässe und Nerven sicher vermieden werden können. Das Absägen kann mit einer Amputationssäge ausgeführt werden, wenn es möglich ist, die Bruch-Enden aus der Wunde hervorzudrängen. Wo dies Schwierigkeiten macht, oder bedeutende Zerrungen veranlassen würde, thut man besser, sich der Stichsäge, der Kettensäge oder des Osteotoms zu bedienen. Auch kann man sich in schwierigen Fällen mit der Resection eines Bruch-Endes begnügen und von dem anderen blos die Zwischensubstanz abschaben. Die Schwierigkeiten der Ausführung und die unter allen Umständen nicht unerheblichen Gefahren dieser Operation steigern sich, wenn die Pseudarthrose am Vorderarm besteht und somit 4 Knochen-Enden reseziert werden müssen. Am Unterschenkel genügt die Vereinigung der Tibia.

Whyte hat 1760 dies Verfahren zuerst empfohlen, Rhea Barton und Dupuytren haben glückliche Erfolge damit erzielt. Hewson verlor einen wegen Pseudarthrose des Oberschenkels der Resection unterworfenen Kranken am 16ten Tage.

Besondere Schwierigkeiten macht, nachdem die Zwischensubstanz durch Resection entfernt und die Bruch-Enden dadurch angefrischt sind, der bedeutende Abstand der letzteren von einander. Diesem Uebelstande haben schon Boyer durch besondere Verbände und Mott durch eine mit Draht ausgeführte Knochen-Naht abzuhelfen gesucht, welche in neuester Zeit auch von Anderen wiederholt angewandt worden ist. Vgl. Sanborn, The silver wire in ununited fractures, with a case. Americ. Journ. of med. sc. April 1860. — B. v. Langenbeck bediente sich zu diesem Behuf zweier Schrauben von Stahl, die, analog den Dieffenbach'schen Zapfen, in die resezirten Knochen-Enden rechtwinklig gegen ihre Längsachse eingebohrt und dann in der gewünschten Stellung durch Schraubenmutter an einer durchbrochenen Stahlplatte befestigt werden, welche mit einem besonderen Kapsel-Verbande in Verbindung steht, der ausserdem noch für die sichere Haltung des Gliedes sorgen soll.

Bei der Vergleichung der zur Heilung falscher Gelenke vorgeschlagenen Operationen muss in Betreff der Gefährlichkeit dem Reiben der Bruch-Enden der Vorzug eingeräumt werden. Aber dies Verfahren ist, wie bereits erwähnt, in allen schon längere Zeit bestehenden Fällen unzureichend. Demnächst ist als das mildeste Verfahren das Einschlagen von Elfenbeinzapfen zu empfeh-

n¹⁾; wo aber eine Zwischensubstanz von bedeutender Dicke (eigentlich Länge) besteht, wird auch dies nicht zum Ziele führen. Alsdann dürfte entweder das Günther'sche Verfahren der Zerreiſung²⁾ oder die von Sommé empfohlene allmälige Durchschneidung anzuwenden sein, welche letztere vor dem gewöhnlichen Haarſeil den Vorzug verdient, weil dabei eine weniger heftige Entzündung der umgebenden Weichtheile und somit auch geringere Gefahr bedingt wird. Ueber die Electropunctur liegen noch keine Erfahrungen vor. Durch die Resection wird zwar die Zwischensubstanz am Vollständigſten entfernt; aber dies Verfahren ist von allen das eingreifendſte, da der Kranke fast allen Gefahren einer mit Wunde complicirten Fractur ausgesetzt ist³⁾. Ausserdem kann bei der Resection die Heilung doch immer nur mit beträchtlicher Verkürzung erfolgen, was bei Fracturen an den unteren Extremitäten ein grosser Uebelstand ist. Entsteht durch die Resection eine beträchtliche Diastase der angefrischten Knochen-Enden, welche sich beim Verbande nicht völlig ausgleichen lässt, so kann, trotz des bedeutenden Eingriffs, die Callus-Bildung ausbleiben. Bevor man sich zur Anwendung der Resection bei einer Pseudarthrose entschliesst, ist also sehr wohl zu erwägen, ob die Beschwerden, welche sie mit sich führt, so bedeutend und die Aussichten auf vollständigen Erfolg so sicher sind, dass man das Leben des Kranken aufs Spiel setzen darf.

Soll keine Operation unternommen, sondern nur palliative Hilfe geleistet werden, so muss man das mit einer Pseudarthrose behaftete Glied mit einer sehr gut gepolsterten festen Kapsel umgeben. Das ist dann ein wahrhaft permanenter Verband, ein äusseres Skelet statt eines inneren. Durch solche Bandagen kann die Brauch-

¹⁾ Mit dem glücklichsten Erfolge habe ich dies Verfahren bei einer seit Jahr und Tag unvereinigt gebliebenen Unterschenkel-Fractur, die ein Matrose in stürmischer Nacht auf dem Schiff erlitten hatte, 1856 in meiner Klinik angewandt. Ebenso 1864 bei einer seit fast einem Jahr und 1865 bei einer seit mehr als 3 Monaten bestehenden Pseudarthrose des Unterschenkels. — Der Grund weshalb das Einschlagen von Elfenbeinzapfen wirksamer ist, als das blosses Anbohren, dürfte darin zu suchen sein, dass ersteres kleine Fissuren in der Umgebung des Bohrlochs und somit heftigere Irritation veranlasst.

²⁾ Ich habe die subcutane Zerreiſung dreimal und zwar mit dem vollständigsten Erfolge und ohne üble Zufälle angewandt. — Auch v. Bruns (Deutsche Klinik, 1861) rühmt dieselbe besonders als ganz gefahrlos und sehr wirksam.

³⁾ Alle operativen Eingriffe an den Knochen-Enden bei Pseudarthrose sind weniger gefährlich, als dieselben an gesunden oder frisch verletzten Knochen sein würden, weil durch die vorausgegangene Entzündung voraussichtlich das Markrohr vergeschlossen wird und Osteomyelitis daher weniger zu fürchten ist. Vgl. pag. 363.

barkeit eines Armes in ziemlich hohem Grade wiederhergestellt werden. Sehr selten aber gelingt es, eine mit Pseudarthrose behaftete untere Extremität durch einen solchen Apparat wieder zum Gehen tauglich zu machen. Hier muss vielmehr der unter der Bruchstelle gelegene Theil des Gliedes als gar nicht vorhanden betrachtet werden und ein Apparat zur Anwendung kommen, der nach denselben Principien zu construiren ist, wie ein nach der Amputation in der Höhe der Bruchstelle anzuwendendes künstliches Bein (vgl. Amputationen, Bd. IV). — Ein Fall, in welchem man dem Kranken durch Amputation des Beines an der Stelle der Pseudarthrose einen die Gefahr und Unannehmlichkeit der Operation aufwiegenden Vortheil verschaffen könnte, ist wohl sehr selten.

II. Knochenwunden. *Vulnera ossium.*

Knochenwunden sind fast immer Hieb-, Stich- oder Schusswunden; sehr selten kommen (abgesehen von der kunstgemässen Durchsägung der Knochen bei Operationen) Schnittwunden vor.

Ich habe eine schräge Durchschneidung des unteren Endes des Humerus und gleichzeitiger Eröffnung des Gelenkes beobachtet, welche durch die mittelst Dampfkraft getriebene Säge einer Schneidemühle verursacht war.

A. Hiebwunden der Knochen kommen am Häufigsten am Schädel vor¹⁾. Knochenwunden durch Hieb sind nicht möglich ohne entsprechend ausgedehnte Verwundung der Weichtheile. Der verletzte Knochen ist daher immer der Luft ausgesetzt, während beim Knochenbruch eine subcutane Continuitätstrennung bestehen kann. Wehrt man daher auch auf den ersten Blick die mit einem scharfen Säbel herbeibrachte Hiebwunde (nach Analogie der an den Weichtheilen beobachtenden Verhältnisse) weniger gefährlich erscheinen könnte, als ein durch eine Art von Zerreißung herbeigeführter Knochenbruch, so verhält sich dies in den meisten Fällen, besonders aber, wenn die Hiebwunde durch die ganze Dicke des Knochens gedrungen ist, das gerade umgekehrt. Besonders gefährlich sind solche Verletzungen bei denen nicht bloß der Knochen quer durchgehauen, sondern auch ein erheblicher Theil der Weichtheile, welche den verletzten Knochen umgeben, gleichzeitig getrennt ist.

Lamotte (*Traité de chirurgie*. Paris 1771, Tom. II.) erzählt von einem Säbelhieb, welcher das untere Ende der Ulna quer trennte und ausserdem noch einen kleinen Einschnitt in dem entsprechenden Theile des Radius veranlasst hatte.

¹⁾ In Betreff der von Alters hergebrachten Unterscheidungen und Benennungen verschiedener Formen von Hiebwunden vgl. Schädelwunden, Bd. III.

diesem Falle erfolgte die Heilung so langsam, dass der erfahrene Lamotte meint, in dieser Zeit hätte ein complicirter Bruch derselben Art gewiss zweimal heilen können.

Jedenfalls heilen solche Wunden viel langsamer, als analoge Knochenbrüche. Um dies zu erklären, sagt man, das verletzende Instrument wirke fast immer in solcher Weise auf die von ihm durchdrungenen Knochen quetschend ein, dass eine Schicht derselben nekrotisch werde. Dies ist richtig, aber darauf beruht nicht der ganze Unterschied; der Heilungsvorgang wird wesentlich noch dadurch modificirt, dass bei Hiebwunden in der Regel zugleich zahlreiche Fissuren im Knochen entstehen²⁾ und dass gleichzeitig mit dem Knochen auch das Periost und die übrigen den Knochen umgebenden Weichgebilde getrennt werden, und zwar genau der Stelle der Knochenwunde entsprechend. Dies ist in gleicher Ausdehnung bei complicirten Knochenbrüchen seltener der Fall. Im Gegentheil werden die Bruch-Enden gewöhnlich durch einzelne Fetzen der Weichtheile noch einiger Maassen in Verbindung erhalten, zuweilen bleibt bei Fracturen sogar ein grosser Theil des Periost unversehrt; auch kann die zackige Beschaffenheit der Bruchflächen dazu beitragen, dass kein bedeutenderer Grad von Verschiebung eintritt (Lamotte). Pseudarthrosen sind nach Hiebwunden daher auch relativ häufiger als nach Fracturen.

Man muss die Vereinigung der Knochenwunde sowohl, als auch diejenige der Weichtheile so vollständig als möglich herbeiführen, die Hautwunde durch die blutige Naht, die übrigen Theile durch eine zweckmässige Lagerung und einen geeigneten Verband (wie bei Fracturen) in genauer Berührung erhalten und im Uebrigen streng antiseptisch verfahren. — Auf solche Weise ist es sogar gelungen, gänzlich vom Körper getrennte Knochenstücke wieder anzuheilen. Häufiger ist dies bei abgehauenen Phalangen, seltener an grösseren Knochen beobachtet worden.

Lapeyronie behandelte einen Mann, welchem durch einen Beilhieb das Oberarmbein und der grösste Theil der dasselbe umgebenden Muskeln abgehauen war; nur ein Lappen, welcher die grösseren Gefässe enthielt, stellte die Verbindung zwischen dem oberen und unteren Ende des Armes her. Man rieth zur Amputation; Lapeyronie aber, ermunthigt durch frühere Erfahrungen ähnlicher Art, vereinigte die Wunde

²⁾ Mag auch die Berührungsfläche eines Säbels noch so gering (die Schneide noch so scharf) und die Geschwindigkeit des Hiebes noch so gross sein, so wird doch die von ihm dem Knochen mitgetheilte Bewegung, wegen des grossen Widerstandes, den der Knochen leistet, sich nur sehr selten auf die getroffene Stelle desselben beschränken, mithin in mehr oder weniger grossem Umfange Erschütterung und durch diese nicht blos Quetschung, sondern auch Continuitätstrennungen in Gestalt von Fissuren bedingen. Vgl. Bd. I. pag. 626 u. fgd.

und lagerte das Glied auf einen gefensterten Verband, um die eintretenden Veränderungen genau beobachten zu können, — und der Erfolg war glücklich. Stevenson (Edinburgh med. and surg. Journ., July 1837) publicirt einen ähnlichen Fall. Durch einen Säbelhieb war der Arm fast vollständig abgehauen, so dass nur ein Hautlappen die Verbindung zwischen dem oberen und unteren Ende herstellte: der Biceps und die Art. brachialis waren durch den Hieb getrennt, und dennoch erfolgte Heilung. Solche Fälle müssen allerdings mit grosser Vorsicht aufgenommen werden; aber man muss sich ebenso sehr hüten, sie ohne Weiteres als Fabeln zu betrachten.

B. Schusswunden der Knochen¹⁾. Die meisten Verletzungen der Knochen durch Büchsen-, Flinten- und Pistolen-Schüsse sind nicht Wunden, sondern entweder Quetschungen (Contusionen), oder Zersplitterungen, Zerschmetterungen, welche in die Kategorie der Splitterbrüche gehören. Viel seltener bedingt eine Kugel eine röhrenförmige Knochenwunde, indem sie den Knochen entweder von einer Seite zur anderen durchdringt oder in dem Knochen stecken bleibt. Solche Röhren-Wunden werden besonders dann beobachtet, wenn die Kugel mit grösster Gewalt, namentlich aus nächster Nähe, in den Knochen eindringt und wenn letzterer mehr schwammige, als feste Knochensubstanz enthält; daher an den Knochen der Hand- und Fusswurzel, an den Schädel- und Beckenknochen und im oberen Drittheil der Tibia. Abgesehen von der durch die Localität etwa bedingten Gefahr, bieten diese Wunden viel günstigere Verhältnisse dar, als Fracturen von gleicher Ausdehnung und Beschaffenheit; sie können, wenn auch nicht durch erste Vereinigung, doch schnell und ohne Hinterlassung einer Difformität heilen. — Die Behandlung besteht in Reinhalten der Wunde, Ausspülen mit Karbolsäure-Lösung und antiseptischem Verbands, ferner in der Sorge für zweckmässige Lagerung, damit der Eiter gehörigen Abfluss und der verwundete Theil Ruhe habe. Wenn die Kugel in der Wunde zurückgeblieben ist, so entsteht hier, wie bei den Schusswunden der Weichtheile, die Frage, ob ihre künstliche Entfernung dringend nothwendig oder nur unter gewissen Verhältnissen vorzunehmen sei. Wo dieselbe mit Leichtigkeit ausgeführt werden kann und voraussichtlich keine Gefahren bedingt, da ist Niemand zweifelhaft. Ebenso wenig wird man anstehen, in solchen Fällen, wo das Zurücklassen der Kugel grosse Gefahren bedingen würde, sofort zur Ausziehung zu schreiten, selbst wenn dieselbe Schwierigkeiten darbieten sollte. Im Uebrigen aber thut man gut, nicht durch gewaltsame Entfernungsversuche vielleicht noch üblere Verletzungen hinzuzufügen, vielmehr die Periode der

¹⁾ Vgl. die Bd. I. pag. 654 citirten Werke von Stromeyer, G. Simon, Esmarch, Fischer, namentlich auch Esmarch, Verbandplatz und Feldlazareth, Vorlesungen für angehende Militärärzte, mit 4 Tafeln und 48 Holzschnitten, Berlin 1868.

Eiterung abzuwarten, wo dann die vom Eiter umspülte Kugel gewöhnlich viel leichter entfernt werden kann, zuweilen auch wohl von selbst herausfällt, — oder, wenn um sie herum schnell Granulationen aufwachsen, sie ganz sich selbst zu überlassen, da zahlreiche Erfahrungen gelehrt haben, dass Einheilen von Kugeln ohne alle Gefahr erfolgen kann¹⁾. Am Leichtesten dürfte dies mit kleinen runden Kugeln geschehen; bei den jetzt gebräuchlichen Geschossen ist ein solcher Vorgang noch nicht beobachtet, nach der Art ihrer Bewegung auch nicht wahrscheinlich.

III. Traumatische Epiphysenlösung, Absprennung der Epiphysen, Divulsio s. Diastasis epiphysium.

Von dieser verhältnissmässig sehr seltenen Art der Knochenverletzungen finden sich zwar bereits bei Hippokrates Andeutungen, aber erst seit Paré hat man sich genauer mit ihr beschäftigt. Eine wissenschaftliche Bearbeitung beginnt erst mit Reichel²⁾ und Bertraudi³⁾; die genaueste Darstellung verdanken wir Rognetta⁴⁾.

Aetiologie. Ablösung der Epiphysen von den Diaphysen kann nur erfolgen, wenn zwischen beiden noch keine knöcherne Verbindung besteht, daher gewöhnlich nur vor der Zeit der Pubertät. Später können zwar auch Trennungen an der Stelle, wo Epiphyse und Diaphyse mit einander verschmolzen sind, eintreten; dies sind dann aber gewöhnliche Knochenbrüche, die nur durch ihre Localität, insofern sie nämlich in der Nähe von Gelenken bestehen, manches Eigenthümliche erhalten. Ausnahmsweise lässt die physiologische Verschmelzung an der Verbindungsstelle der Epiphysen auch längere Zeit auf sich warten oder erfolgt unvollständig, so dass auch noch in späteren Lebensjahren eine Ablösung möglich ist; am Häufigsten wird aber die in Rede stehende Verletzung unzweifelhaft im kindlichen Alter beobachtet, namentlich zwischen dem 9. und 15. Jahre. Bei künstlichen Entbindungen können durch zu heftiges Ziehen an den Beinen oder am Arm Ablösungen der Epiphysen veranlasst werden. Gewöhnlich ist ein Schlag, ein Stoss, ein Fall die Veranlassung. Man nahm bisher allgemein an, dass zur Entstehung einer Epiphysenlösung die Einwirkung einer directen Gewalt auf die Epiphyse selbst noth-

¹⁾ Vgl. Gust. Simon, Ueber die Einheilung von Gewehrkugeln in spongiösen Knochen. Prager Vierteljahrsschrift 1853, Bd. I. Heft I. pag. 164.

²⁾ De epiphysium ab ossium diaphysi deductione. Lipsiae 1759.

³⁾ Opere anatomiche etc. Tom. V.

⁴⁾ Sur la divulsion traumatique des épiphyses, Gaz. méd. 1834, pag. 433.

wendig sei. Nach experimentellen Untersuchungen von Michniowsky kann man dieselbe jedoch am Leichtesten durch Hyperextension des Gelenkes zu Stande bringen. Wahrscheinlich können auch gewaltsame Torsionen eines Gliedes Epiphysenlösung bewirken¹⁾. Sehr wahrscheinlich ist es, dass dieselbe durch krampfartige Zusammenziehungen der Muskeln sollte zu Stande kommen können. Es geht eine sehr grosse Gewalt dazu, um die in grosser Ausdehnung, unregelmässigen Vertiefungen sehr genau befestigte Knorpelschicht zu zerreißen oder abzulösen. Bei genauer Erwägung der anatomischen Verhältnisse erscheint das Zustandekommen einer Verrenkung oder eines Knochenbruches in der Nähe des Diaphysen-Endes viel wahrscheinlicher, als die Trennung der überall sehr kurzen, für äusseren Gewalten kaum irgend einen Angriffspunkt darbietenden Epiphyse vom Mittelstück des Knochens. Hiermit stimmt die Erfahrung überein, dass die Ablösung der Epiphysen eine sehr seltene Verletzung ist.

Experimentelle Untersuchungen über gewaltsame Epiphysenablösungen hat Michniowsky an lebenden Thieren angestellt (Peterb. med. Zeitsch. X. pag. 300, Auszug aus der grösseren in russischer Sprache veröffentlichten Abhandlung). Niemals gelang es ihm durch directe Gewalt eine Epiphyse abzusprennen, was aber durch Hyperextension. Die Trennungslinie fand sich nie im Epiphysenknorpel sondern immer zwischen der Verkalkungsschicht desselben einerseits und den jüngsten Knochenlamellen der Diaphyse andererseits. Die Bruchfläche der Epiphyse war siebelförmig, die der Diaphyse convex. Das Periost war gewöhnlich nur in einem Theile des Knochenumfangs und in einiger Entfernung (bis zu 5 Centimeter) von dem Epiphysenknorpel zerrissen, so dass es die Bruchstelle wie eine Scheide umgab. In der Hälfte der letzteren und zwischen den Bruchflächen fanden sich eine Menge feine borstenförmiger Knochenplättchen, welche für die Heilung ein Hinderniss abzugeben schienen. Bei extracapsulärer Epiphysenlösung war der Heilungsvorgang übrigens nicht wesentlich von dem bei gewöhnlichen Knochenbrüchen beobachteten verschieden, bei intracapsulären dagegen erfolgte die Vereinigung gewöhnlich nur durch fibrinöse Zwischensubstanz. Analog den Knochenrücken, kann man auch die Epiphysentrennung in vollständige und unvollständige unterscheiden.

Die Diagnose ist oft viel schwieriger, als bei einem gewöhnlichen Knochenbruche. Verschiebung kann ganz fehlen und Crepitation ist entweder sehr undeutlich oder gar nicht vorhanden. Die Unterscheidung von einem Knochenbruche wird durch die Localität der Verletzung, das Alter des Kranken, die Richtung der Trennungslinie und die weniger ruhige, mehr „schurrende“ oder „knurrende“ Crepitation begründet. Jedoch muss die Möglichkeit einer Verwechslung mit Knochenbruch nicht bloss, sondern auch mit Verrenkung und mit Gelenkquetschung um so mehr zugegeben werden, als in de

¹⁾ Volkman, Beitrag über Krankheiten des Bewegungsapparates im Jahresbericht von Virchow u. Wierock für 1866. Bd. II. pag. 326.

Mehrzahl der bis jetzt bekannten Fälle die eigentliche Natur der Verletzung erst bei der Section erkannt worden ist. Allerdings dürfte aber bei sorgfältiger Untersuchung die Luxation sich immer ausschliessen lassen, da sie nur in solchen Fällen in Frage kommen könnte, wo die Verschiebung eine bedeutende wäre und daher sicherlich die mittelst des Tastsinns auch durch die unversehrten Weichtheile hindurch zu erkennende Gestalt des dislocirten Theils die Entscheidung an die Hand geben würde. In nicht mehr frischen Fällen kommt auch die Möglichkeit der Verwechslung einer traumatischen (gewaltsamen) Epiphysenlösung mit einer spontanen (entzündlichen, durch Vereiterung des Epiphysenknorpels bedingten) in Frage. Die Entscheidung wird leicht sein, wenn letztere auf einem deutlich ausgeprägten Allgemeinleiden beruht und an mehreren Gelenk-Enden gleichzeitig auftritt; aber es giebt auch Fälle der Art, die ganz local sind und bei denen nur durch Kenntniss der Entstehungsgeschichte und des Verlaufs die Diagnose gesichert werden kann. Vgl. Cap. II.

Die **Prognose** der gewaltsamen Epiphysenlösung an sich könnte nicht schlimmer sein, als diejenige einer Fractur an derselben Stelle, und die Heilung würde voraussichtlich in derselben Weise erfolgen; aber aus den bisher genau beobachteten Fällen lässt sich entnehmen, dass diese Art der Continuitätstrennung, bei der wir schon von ätiologischer Seite die Einwirkung einer bedeutenden Gewalt voraussetzen mussten, in der That fast immer mit anderweitigen Verletzungen complicirt ist, welche nicht blos die Heilung, sondern oft auch das Leben des Verletzten erheblich gefährden.

Die **Behandlung** muss dieselbe sein, wie bei Knochenbrüchen an der entsprechenden Stelle.

B. Von den Verletzungen der einzelnen Knochen im Besonderen.

a. Knochenbrüche am Kopfe¹⁾.

1) Brüche der Nasenbeine.

Man rechnet hierher nicht blos die Brüche der eigentlichen Nasenbeine, sondern auch diejenigen der Nasalfortsätze des Oberkiefers. Diese Brüche bestehen in sehr verschiedener Richtung und Ausdeh-

¹⁾ Die **Schädelbrüche**, welche wegen ihrer Beziehung zum Gehirn ein besonderes locales Interesse darbieten, werden im Zusammenhange mit den übrigen Schädelverletzungen (Bd. III.) beschrieben.

nung, sind oft mit Wunden, Zerreiſſung der Nasenschleimhaut oder Quetschung der Weichtheile complicirt, häufig auch mehrfach und nicht selten Splitterbrüche. Zuweilen veranlasst die Gewalt, welche diesen Bruch hervorbringt, zugleich eine Erschütterung des Gehirns oder auch einen Sprung in der Lamina cribrosa des Siebbeins und in Folge dessen Gehirnsymptome. Auch kann durch eine complicirte Fractur der Nasenbeine ein fremder Körper (z. B. die Spitze eines Stocks), indem er die Lamina cribrosa durchbohrt, in's Gehirn eindringen. Vgl. Bd. III.

Die **Ursache** dieser Brüche ist immer directe Gewalt. Von deren Richtung hängt auch die Form des Bruches und die Dislocation der Bruchstücke ab.

Die **Diagnose** hat nur dann Schwierigkeiten, wenn, bei bedeutender Geschwulst, der Bruch einfach ist, weil bei einem solchen meist keine Verschiebung der Bruch-Enden besteht. Alsdann hat aber auch der Bruch keine besondere Bedeutung und ein Uebersehen desselben (wenn nur die zugleich bestehende Quetschung richtig behandelt wird) keinen Nachtheil. Erstreckt sich der Bruch bis zum Canalis nasolacrymalis, so findet sich am unteren Augenlid eine Ecchymose; zuweilen sieht man dann blutige Thränen aus dem entsprechenden Nasenloch abfließen oder auch beim Druck auf den Thränensack aus den Thränenpunkten hervorquellen. In einem solchen Falle muss Verschluss oder doch Verengerung des Thränen-Nasenganges und in Folge davon die Entwicklung einer sogenannten Thränenfistel befürchtet werden. Ist die Fractur complicirt oder ein Splitterbruch vorhanden, so ist die Diagnose wegen der bedeutenden Difformität und der Verschiebung der Bruchstücke nach Innen sehr leicht. Gewöhnlich kann man sich mit dem zufühlenden Finger nicht blos von der Beweglichkeit überzeugen, sondern auch Crepitation wahrnehmen. Sind die Bruchstücke nach Innen verschoben (eingedrückt), so besteht in der Regel auch ein Bruch (oder eine Verbiegung) der Nasenseidewand, und es erfolgt eine beträchtliche Blutung wegen Zerreiſſung der gefässreichen Nasenschleimhaut. Alsdann kann sich auch Emphysem im Unterhautzellgewebe entwickeln, namentlich, wenn das Nasenloch durch die Bruchstücke und Blutgerinnsel verstopft ist und der Kranke den Versuch macht, dies Hinderniss durch stärkeres Schnauben zu überwinden.

Eine mechanische **Behandlung** ist nur nothwendig, wenn Verschiebung Statt findet. Man rückt die Bruch-Enden alsdann mit Hilfe eines in die Nase eingeführten weiblichen Katheters oder einer geschlossen eingeführten Kornzange in die gehörige Lage. Neigung

in abermaliger Verschiebung besteht gewöhnlich nicht. Um sie zu verhüten, muss man Charpiebäusche in die Nasenhöhle einstopfen. Hat man Grund, die Dislocation eines Bruchstücks in den Canalis nasolacrimalis anzunehmen, so sucht man diesen durch Einführen einer Laforest'schen Sonde von der Nasenhöhle aus frei zu machen. Nur vollständig abgelöste Knochensplitter sind zu entfernen. Bei gleichzeitig bestehenden Wunden sucht man erste Vereinigung zu erzielen, zu welchem Behuf die Abtragung und Glättung der gezackten oder gequetschten Wundränder nützlich sein kann.

Von der Behandlung etwa vorhandener Cerebralaffectationen wird bei den Schädelverletzungen (Bd. III.) gehandelt, von der zur Stillung gefährlicher Blutungen in seltenen Fällen nöthigen Tamponade bei den Krankheiten der Nasenhöhle (Bd. III.).

2) Brüche des Jochbogens.

Der Jochbogen ist durch seine oberflächliche Lage der Einwirkung directer Gewalt in hohem Grade ausgesetzt; nur durch eine solche entstehen die überhaupt seltenen Brüche desselben.

Bei einfachem Bruch sind die Bruch-Enden gewöhnlich gegen die Schläfengrube eingedrückt, zuweilen in der Art, dass die Einbiegung der Gestalt des verletzenden Körpers entspricht. Sehr selten sind Fracturen durch eine vom Munde aus wirkende Gewalt, wobei dann Verschiebung der Bruch-Enden nach Aussen Statt findet. Ist durch eine doppelte Fractur das Mittelstück abgelöst, so könnte es durch den Masseter abwärts gezogen werden. Zuweilen ist auch, wenn ein schwerer Körper mit breiter Oberfläche eingewirkt hat, das ganze Jochbein aus seinen Verbindungen mit den benachbarten Knochen gelöst und dann gewöhnlich gegen die Augenhöhle hin verschoben, so dass Compression des Bulbus oder Behinderungen der Bewegung des Auges, auch Zerrung des Nervus infraorbitalis dadurch bedingt werden kann. In solchen Fällen verläuft aber die Bruchlinie häufig ganz oder doch zum Theil nicht durch den Jochbogen, sondern durch den Oberkiefer (Bruch der äusseren Wand der Kieferhöhle).

Die **Diagnose** ist, bei Berücksichtigung der Difformität, Beweglichkeit und Crepitation, gewöhnlich leicht. — Auch hier ist an die Möglichkeit einer gleichzeitigen Hirnerschütterung zu denken.

Die **Reduction** ist bei einfacher Einwärtsbiegung der Bruch-Enden ohne Verletzung der Haut nicht schwierig. Auf das Jochbein vermag man theils von der Augenhöhle aus, theils durch die Mundhöhle mittelst des Fingers einzuwirken. Besteht eine Wunde, so kann man die

eingedrückten Knochenstücke mit einem durch dieselbe eingeführten Hebel erheben. Eines Verbandes bedarf es nicht.

Die **Behandlung** ist übrigens diejenige der Quetschung.

2) Brüche des Oberkiefers.

Der Bruch befindet sich gewöhnlich am Alveolar- oder Gaumenfortsatz, an ersterem vorzugsweise in Folge ungeschickter Zahnoperationen. Ausgedehnte Brüche des Oberkiefers lassen stets heftige Erschütterung des ganzen Schädels voraussetzen. Oft treten dabei die Erscheinungen der *Commotio cerebri* in den Vordergrund. Die Bruchlinien können sich auch auf den Schädel fortsetzen, wo dann der Kieferbruch oft zur Nebensache wird. — Die Ursache eines Oberkiefer-Bruches ist fast immer eine directe Gewalt; jedoch haben Richerand und J. Cloquet Fälle beobachtet, in denen die Gewalt nicht den Oberkiefer, sondern das Kinn oder den Schädel getroffen hatte und dennoch Brüche des Oberkiefers entstanden.

Die **Diagnose** ist bei der Beweglichkeit und oberflächlichen Lage der Bruchstücke leicht.

Prognose. Gefährlich ist diese *Fractur* nur, wenn sehr heftige Erschütterung oder Quetschung Statt gefunden hat. Die Heilung erfolgt meist schnell, in 2—4 Wochen, aber oft unvollständig, besonders am Gaumenfortsatz, wenn der *mucös-periosteale* Ueberzug zerstört ist, wo dann leicht eine Fistel zwischen Mund- und Nasenhöhle zurückbleiben kann. Vgl. Bd. III.

Ueber Versenkung des Augapfels in die *Higmore's-Höhle* bei Brüchen des Oberkiefers (und der angrenzenden Knochen) vgl. v. Becker im *Archiv f. Augenheilkunde* Bd. XII. Abth. 1. pag. 289 u. f. und v. Langenbeck ebenda, Bd. XIII. Abth. 2. pag. 447 u. f.

Behandlung. Die *Reposition* gelingt gewöhnlich, entweder blos mit den Fingern, oder mit Hilfe eines in die Nase eingeführten Katheters. Zum Behuf der *Retention* kann man bei Brüchen des Alveolarfortsatzes die zu beiden Seiten der Bruch-Enden stehenden Zähne (wenn sie festsitzen) durch Draht aneinander befestigen (*Hippokrates*). Grössere Bruchstücke des *Proc. alveolar.* suchte man früher zu *fixiren*, indem man zwischen die Zahnreihen Korkstücke legte und dann den Unterkiefer gegen den Oberkiefer durch eine Halfterbinde, Schleuder oder ein dreieckiges Tuch andrückte (*Boyer*). Dieser Verband ist sehr beschwerlich und wenig wirksam. Viel mehr leistet das Auflegen einer in heissem Wasser erweichten, hufeisenförmigen *Guttapercha-Schiene*, gegen welche man, ehe sie völlig erstarrt ist, den Unterkiefer fest anbeissen lässt, um sie sicher anzufügen. Schlimmsten

Falls muss man auch auf den Unterkiefer eine solche Schiene legen, durch zwischengeklebte Guttapercha-Stücke einen Abstand zwischen beiden bewirken und den Unterkiefer dann in der oben beschriebenen Weise feststellen (Morel-Lavallée). Der Kranke wird längere Zeit hindurch nur mit flüssigen Nahrungsmitteln ernährt, welche nöthigen Falls mittelst eines Schlundrohrs eingeflösst werden. Complicirte Apparate für die Retention (wie namentlich der von F. v. Graefe angegebene) haben sich nicht bewährt (vgl. Bruch des Unterkiefers).

Sind die den knöchernen Gaumen bedeckenden Weichtheile bei Brüchen mit Substanzverlust erhalten, so kann von dem Periost aus Ersatz des Knochens geliefert werden. Man muss daher die etwa bestehenden Wunden dieser Weichtheile sorgfältig vereinigen. Vgl. „Uranoplastik“, Bd. III.

4) Brüche mehrerer der unbeweglich verbundenen Gesichtsknochen.

Da sämtliche Gesichtsknochen mit Ausnahme des Unterkiefers durch Nähte mit einander verbunden sind, so kann eine, das Antlitz treffende Gewalt auch dies ganze Skelet der oberen Gesichtshälfte wie einen Knochen zerbrechen. Die Verhältnisse eines solchen Bruches lassen sich im Allgemeinen nicht gut schildern. Es können unzählige Variationen, besonders wenn zugleich die Weichtheile zerrissen sind, Statt finden, wie dies besonders bei Verletzungen durch grobes Geschoss beobachtet wird. — Die Behandlung wird, abgesehen von den mechanischen Hülfeleistungen, die in der Regel zugleich bestehende Verwundung oder Quetschung der Weichtheile und die Erschütterung des ganzen Kopfes zu berücksichtigen haben.

5) Brüche des Unterkiefers.

Der Unterkiefer bricht nächst den Nasenbeinen unter allen Gesichtsknochen am Häufigsten, jedoch im Vergleich zu den Knochen der Extremitäten immer noch selten; denn die Brüche der Gesichtsknochen überhaupt betragen nur etwa 2 Procent aller Fracturen.

Man unterscheidet Brüche des Körpers, der Aeste und der Fortsätze des Unterkiefers.

Der Körper des Knochens kann entweder in seiner ganzen Dicke zerbrechen, analog dem Schräg- oder Querbruch eines Röhrenknochens; oder es bricht nur der Alveolarrand ab, analog einem Längsbruch.

Brüche durch die ganze Dicke des Körpers des Unterkiefers finden sich gewöhnlich in den Seitentheilen, relativ häufig in der Nähe der Winkel, zuweilen auch in der Art, dass der Mentaltheil

des Knochens durch zwei Bruchlinien ganz ausser Zusammenhang mit dem übrigen Knochen gesetzt ist, — Doppelbruch des Unterkiefers. Die Verschiebung der Bruch-Enden hängt in der Mehrzahl der Fälle wesentlich (aber nicht ausschliesslich) von der Richtung ab, in welcher die äussere Gewalt eingewirkt hat (vgl. Entstehung); im Allgemeinen ist sie um so bedeutender, je weiter entfernt vom Kinn die Trennung erfolgt. Das vordere Bruch-Ende wird in der Regel (sofern die Richtung der Bruchlinie es gestattet) durch die vom Zungenbein aufwärts verlaufenden Muskeln abwärts und zugleich nach Hinten gezogen, während das hintere an seiner Stelle bleibt oder durch Masseter, Temporalis und Pterygoideus internus etwas nach Vorn und Oben vorgeschoben wird. Das eine Bruch-Ende, gewöhnlich das hintere (äussere), kann somit eine Strecke weit vor dem anderen und parallel mit ihm stehen. Wenn beim Doppelbruch die Bruchlinien schräg von Oben und Vorn nach Unten und Hinten verlaufen, so wird das dem Kinn entsprechende Bruchstück nicht blos nach Unten, sondern auch nach Hinten gezogen.

Bei Brüchen des Alveolarfortsatzes findet sich, wenn Zahnfleisch und Periost nicht in gleicher Ausdehnung zerrissen sind, keine bedeutende Verschiebung. Dieselbe pflegt gleichfalls gering zu sein bei Brüchen der Aeste des Knochens, indem die Bruch-Enden durch die umgebenden Muskeln, besonders durch Masseter und Pterygoideus internus, in ihrer Lage erhalten werden.

Ist der *Processus condyloideus* abgebrochen, so wird er durch den *Pterygoideus externus* nach Vorn und Innen gezogen, während das durch den ganzen übrigen Unterkiefer gebildete untere Bruchstück durch die anderen Kaumuskeln etwas nach Oben und Hinten verschoben wird. — Der abgebrochene *Processus coronoideus* wird durch den *Temporalis* (oft nur sehr wenig) aufwärts gezogen.

Die Entstehung der Brüche des Körpers des Unterkiefers ist eine dreifache. 1) Die Gewalt wirkt von Vorn ein in einer solchen Richtung, dass sie die Convexität des Knochens nach Hinten biegt. Alsdann brechen zuerst die an der concaven (Zungen-) Seite des Knochens gelegenen Knochenlamellen. Auf diese Weise wirken Fall oder Schlag auf's Kinn, z. B. Hufschlag eines Pferdes. 2) Die veranlassende Gewalt drückt den Unterkiefer von beiden Seiten her zusammen und vermehrt seine vordere Convexität auf's Aeusserste¹⁾.

¹⁾ Um durch Druck auf's Kinn den Unterkiefer zu zerbrechen, bedarf es einer Belastung mit 1100 Pfund, während schon 150 Pfund Belastung des einen *Angulus mandibulae* (in der Richtung gegen den anderen) ausreichen, um den Unterkiefer

Auf diese Weise entstehen gewöhnlich nur einfache Brüche. 3) Die einwirkende Gewalt concentrirt sich auf eine bestimmte Stelle des Unterkiefers und veranlasst an dieser einen directen Bruch. Hierher gehören die Brüche durch Geschosse, durch Säbelhieb u. dgl. m. Auch der Hufschlag des Pferdes (die häufigste Ursache der Unterkieferbrüche) kann in dieser Weise wirken. — Die Brüche des Alveolar-, Kronen- und Gelenk-Fortsatzes entstehen immer durch directe Gewalt, an ersterem besonders durch rohes Zahnausziehen (zuweilen in grosser Ausdehnung) oder durch Geschosse.

Die **Diagnose** der Unterkieferbrüche ist gewöhnlich leicht. Sofern sie den Körper der Mandibula betreffen, werden sie an der abweichenden Stellung der Zähne und der Difformität der Basis des Knochens, der Beweglichkeit und der Crepitation erkannt. Ist der Processus condyloideus abgebrochen, so verschiebt sich das Kinn nach der verletzten Seite. Die Dislocation des oberen Bruch-Endes kann, da der Processus condyloideus fast unmittelbar unter der Haut liegt, von Aussen, die des Processus coronoideus, da er nach Innen nur von der Schleimhaut bedeckt ist, von der Mundhöhle aus gefühlt werden. Brüche der Unterkiefer-Aeste hat man zu vermuthen, wenn nach der Einwirkung einer äusseren Gewalt an einer bestimmten Stelle eines Ramus mandibulae bei Bewegungen des Kiefers und bei der Berührung Schmerzen entstehen; abnorme Beweglichkeit des oberen Bruch-Endes und Crepitation sichern die Diagnose.

Die **Prognose** ist bei einfachen Brüchen des Unterkiefers im Allgemeinen günstig. Unter den Complicationen findet sich am Häufigsten Zerreiſung der Mundschleimhaut, oft auch eine äussere Wunde oder erhebliche Quetschung der äusseren Weichtheile, welche brandige Zerstörung derselben zur Folge haben kann. In solchen Fällen entsteht heftige, gewöhnlich von Fieber begleitete Entzündung. Ist der Boden der Mundhöhle geöffnet, so gesellt sich der Ausfluss der Mundflüssigkeit als eine lästige Complication hinzu. Die Speichelsecretion wird fast durch jeden Bruch des Unterkiefers, wegen der damit verbundenen Reizung der Mundschleimhaut, in höherem Grade angeregt. Häufig findet Zerreiſung des Nervus dentalis inferior Statt, von welcher J. L. Petit (allzu theoretisch) heftige Schmerzen, Krämpfe der Lippen, sogar allgemeine Krämpfe, Brausen vor den Ohren, Entzündung der Augen und bedeutende Salivation ableitete. Neuere Autoren (bereits Boyer) haben, ausser der leicht zu erklärenden Lähmung der Mm. triangularis und quadratus

einer Leiche in seiner Mitte zu fracturiren. Vgl. O. Weber, chirurg. Erfahrungen etc. Berlin 1859, pag. 81.

menti und mehr oder weniger grossen Schmerzen, keine weiteren Zufälle aus der Zerreissung dieses Nerven hervorgehen sehen. Die durch Zerreissung der Arteria alveolaris inferior bedingte Blutung ist meist unerheblich; nur wenn sie bei einem Bruch des Astes (namentlich bei Schussverletzungen) vor dem Eintritt in ihren Knochen canal verletzt wird, ist eine gefährliche Blutung zu erwarten. Ob eine solche aber aus der Art. alveolaris inferior oder aus dem Stamm der Art. maxillaris interna herrührt, wird schwer zu entscheiden sein. Blutung aus dem Ohr ist niemals von dem Bruche des Unterkiefers abzuleiten, sondern deutet auf eine Fractur im Schläfenbein. Oft wird durch die Erschütterung des Gehirns, welche der den Unterkiefer treffende Schlag zugleich bewirkt hat, die grösste Gefahr bedingt.

Die meisten Unterkieferbrüche, besonders aber die doppelten Schrägbrüche, hinterlassen eine, zuweilen bedeutende, die Function jedoch in der Regel nicht störende Difformität.

Pseudarthrosen nach Bruch des Unterkiefer-Körpers (sogar bei sorgfältiger Behandlung beobachtet) sind meist nur in geringem Grade hinderlich.

Die Coaptation eines Bruches des Processus condyloideus gelingt schwerlich jemals vollkommen. Die zurückbleibende Difformität hat aber keine bedeutenden Nachtheile.

Brüche des Processus coronoideus heilen niemals durch wirklichen Callus; die mangelhafte Vereinigung setzt den M. temporalis oft fast ganz ausser Thätigkeit. Die Bewegungen des Unterkiefers leiden dadurch aber nicht, da Masseter und Pterygoideus internus die Functionen des Temporalis mit übernehmen.

Bei Fracturen des Unterkiefers, welche mit äusserer Wunde oder einem hohen Grade von Quetschung complicirt sind, werden oft einzelne Theile der Bruch-Enden nekrotisch. Man hat auf diese Weise sogar den ganzen Processus condyloideus verloren gehen sehen.

Einfache Fracturen der Mandibula sind gewöhnlich schon nach 4 Wochen consolidirt; auch complicirte Brüche des Unterkiefers heilen im Allgemeinen leichter als solche an den Extremitäten.

Behandlung. Die Reduction der Unterkieferbrüche ist gewöhnlich leicht. Beim Bruche des Alveolarfortsatzes schiebt man die Bruchstücke mit den Fingern zurecht. Bei einfachen Quer- und Schrägbrüchen des Mittelstücks reicht das Andrücken des ganzen Unterkiefers gegen den Oberkiefer allein oder in Verbindung mit einem in der Kinngegend anzubringenden Zuge nach Vorn aus. Der letzt-erwähnte Zug ist auch bei Doppelbrüchen zu empfehlen. Sollte die Reduction sehr schwierig sein, so kann man eine Contra-Extension

ausüben, indem man die in den Mund geführten Finger gegen den vorderen Rand des Unterkieferastes oder des Processus coronoideus anstemmt (J. L. Petit). Lose Zähne sind bei der Reduction sorgfältig zu schonen und wieder fest zu drücken, da sie wieder einheilen können. Bei den Brüchen der Aeste und oberen Fortsätze kann von Beduction gewöhnlich nicht die Rede sein.

Die Retention wird bei Brüchen des Alveolar-Randes durch den Boyer'schen Verband (s. unten), oder durch Befestigung der Zähne des abgebrochenen Theils an den benachbarten Zähnen mittelst Silberdraht, endlich auch in schwierigen Fällen durch den Robert'schen Verband ausgeführt. Letzterer hat sich in Fällen bewährt, wo ein sehr grosser Theil des Alveolar-Randes fracturirt war, und bietet den Vorzug dar, dass der Patient während der Behandlung den Unterkiefer bewegen kann, ohne dass dabei eine Verschiebung des Bruchstückes zu befürchten ist. Robert legt nämlich auf den fracturirten Kieferrand, resp. auf die Kaufläche der Zähne eine entsprechend gebogene Bleiplatte und führt eine Schlinge von Silberdraht mit Hülfe einer starken Nadel, das eine Ende an der vorderen, das andere an der hinteren Seite des Unterkiefers von der Mundhöhle aus um die gedachte Bleiplatte und den Kiefer herum, so dass beide Enden aus einer Hautwunde in der Gegend der Basis mandibulae zum Vorschein kommen. Hier werden sie fest zusammengedreht und somit durch Vermittelung der Bleiplatte der abgebrochene Alveolar-Rand sicher gegen den Körper des Knochens angedrückt. Statt der Bleiplatte dürfte eine Silberplatte oder ein entsprechend geformtes Stück Guttapercha zu substituiren sein.

Bei einfachen Brüchen des Unterkieferkörpers mit geringer Neigung zur Verschiebung bedarf man kaum irgend eines Verbandes¹⁾; oder es reicht doch das Befestigen der Zähne der Bruch-Enden an einander durch Silberdraht, Seidenfäden u. dgl. (sofern die Zähne festsitzen) oder ein gewöhnliches Kinn Tuch aus; bei bedeutender Neigung zur Verschiebung oder Lockerung der Zähne muss man zu anderen Verbänden seine Zuflucht nehmen.

Verband von Boyer²⁾. Zwei lange Korkstücke, beiderseits rinnenförmig ausgehöhlt, um die Zahnreihen aufzunehmen, werden rechts und links zwischen die Zähne geschoben, so dass zwischen ihnen vorn ein hinreichender Raum bleibt, um den alsbald in ver-

¹⁾ Vgl. die von Schönleben (de fractura mandibulae, Gryphiae 1860) angeführten Fälle aus meiner Klinik, denen ich aus eigener Erfahrung jetzt noch mehr als ein Dutzend hinzufügen könnte.

²⁾ Durch Boyer allgemeiner eingeführt, aber schon früher in Gebrauch.

mehrter Menge abgesonderten Speichel ausfliessen zu lassen und die Einführung flüssiger Nahrungsmittel zu gestatten. Eine Longuette wird der Basis mandibulae entsprechend, eine andere an der vorderen Fläche des Unterkiefers angelegt und beide durch ein aufwärts um den Kopf und ein nach Hinten geführtes Kinn Tuch, eine Schleuder- oder doppelte Halfter-Binde befestigt. — Die Korkstücke werden zweckmässig durch Guttapercha ersetzt, wie wir bei den Oberkiefer-Brüchen (pag. 376) genauer beschrieben haben.

Durch diesen Verband wird ebenso viel geleistet, wie durch die Apparate von Rütenik, Bush, Houzelot u. A., welche dem Kranken die Bewegung des Unterkiefers, die bei dem Boyer'schen Verbande absichtlich vermieden wird, ohne Verrückung der Bruchstücke gestatten sollen, diesen Zweck aber nur unvollkommen und unter erheblichen Beschwerden erreichen. — Der Mechanismus dieser Apparate, als deren Typus der Rütenik'sche Verband betrachtet werden kann, ist folgender. Eine dem Alveolar-Rande des Unterkiefers entsprechend gebogene silberne Rinne wird auf die Zähne des Unterkiefers aufgesetzt. Ein in ähnlicher Form ausgeschnittenes, hinreichend gepolstertes Brett legt man unter die Basis mandibulae. Diese beiden Theile des Verbandes werden durch doppelt gebogene stählerne Haken, die einer Seits mit ihren umgebogenen Enden die Rinne umfassen, anderer Seits durch Schrauben an dem Brette in verschiedener Stellung befestigt werden können, in Verbindung gesetzt und in beliebigem Grade gegen einander gedrängt. Eine Verschiebung des Brettes wird ausserdem durch Bänder, welche von seinen nach Hinten vorspringenden Enden zum Nacken geführt und dort zusammengeknüpft werden, verhütet.

Die von Robert angewandte Drahtschlinge würde, zum Behuf der Verbindung der auf den Zähnen liegenden Rinne mit der unter dem Kiefer liegenden Holzplatte, vor den Rütenik'schen Haken den Vorzug grösserer Sicherheit haben.

Szymanowski hat den Gyps-Verband in folgender Weise für Unterkieferbrüche eingerichtet. Eine gewöhnliche Schleuder-Binde, deren Mittelstück, so weit es den Unterkiefer umfasst, mit Gyps-Brei getränkt und bestrichen ist, wird in mehreren Schichten angelegt. Dann wird dem Verletzten ein Stäbchen, in welchem, je nach dem Abstände der Zähne (d. h. je nach der Weite des vom Unterkiefer gebildeten Bogens) zwei Einkerbungen eingeschnitten sind, nach Art eines Gebisses in den Mund gelegt, so dass die beiden Einkerbungen genau auf die Zähne passen. An jedem Ende des Stäbchens, welches auf beiden Seiten etwas aus dem Munde hervorragt, ist ein Faden befestigt. Diese Fäden werden auf der inzwischen erhärteten Schleuder unter dem Kinn mässig fest zusammen geknotet und durch die erst jetzt hinzuzufügende letzte Lage der Schleuder vollkommen befestigt. — Dieser Verband dürfte in der Mehrzahl der Fälle die Retention bewirken, während er dem Patienten sogar das Kauen

in einigem Maasse gestattet. Bei einer Doppel-Fractor könnte man, wenn es die Stelle des Bruches zulässt, durch Hinzufügung eines zweiten Stäbchens, welches vor oder hinter dem ersten in gleicher Weise zu befestigen wäre, die Wirkung vervollständigen. In Betreff der Unbequemlichkeit dürfte der Gypsverband hinter dem Rütenischen u. a. nicht zurückstehen.

Welchen Verband man auch wählen mag, jedenfalls fördert es die Heilung wesentlich, wenn der Verletzte vierzehn Tage bis drei Wochen sich des Kauens und Sprechens gänzlich enthält.

Nächst diesem mechanischen Theil der Behandlung ist die Sorge für möglichst grosse Reinlichkeit von grosser Bedeutung. Je mehr Speichel und anderweitige Secrete (namentlich Eiter oder gar Jauche) in der Mundhöhle sich ansammeln, desto sorgfältiger muss durch häufiges Ausspülen und Ausspritzen dafür gesorgt werden, dass diese Flüssigkeiten nicht in den Magen, oder gar, bei sehr elenden Kranken während des Schlafes, in die Luftwege gerathen. Meist muss man antiseptische Flüssigkeiten (Kali hypermangan. u. dgl.) zu Hülfe nehmen.

Wenn bei complicirten Brüchen des Unterkiefers Zersplitterung besteht, so muss für Entfernung der Splitter gesorgt werden. Unregelmässige gequetschte Wunden (besonders bei Fracturen durch Geschosse) erheischen oft plastische Operationen.

Ist der Bruch eines Unterkiefer-Astes (namentlich bei Schussverletzungen) mit bedeutender Blutung complicirt, welche auf Verletzung der Art. maxillaris interna schliessen lässt, so muss man, um die directe Unterbindung ausführen zu können, nöthigenfalls den Ramus mandibulae resciren¹⁾ — in derselben Weise, wie man dies beim anatomischen Präpariren der genannten Arterie auszuführen pflegt. Erscheint eine solche Operation unzulässig, so wäre die Carotis, freilich nicht mit ebenso sicherer Aussicht auf dauernden Erfolg, zu unterbinden. Vgl. pag. 166.

Ueber Brüche des Zungenbeins und der Kehlkopfknorpel vgl. Bd. III.

b. Knochenbrüche am Rumpf.

1) Brüche der Wirbel.

Die Seltenheit von Fracturen der Wirbel erklärt sich aus der geschützten Lage derselben, der geringen Länge, welche jeder einzelne Wirbel besitzt, und der beweglichen Verbindung, in welcher die Wirbel unter einander und mit den benachbarten Knochen stehen²⁾. Unter

¹⁾ Vgl. Stromeyer, Maximen der Kriegsheilkunst, Hannover 1855, pag. 572.

²⁾ Die Frequenz der Wirbelfracturen beträgt nur 0,333 Procent; jedoch sind einfache Wirbelbrüche, welche Heilung zulassen, vielleicht häufiger, als man gewöhnlich glaubt, indem viele unerkant bleiben (Wernher).

den einzelnen Theilen eines Wirbels bricht im Allgemeinen am Häufigsten der Wirbelkörper; unter den verschiedenen Abschnitten der Wirbelsäule liefern die Halswirbel die meisten Brüche des Bogens, Brust und Lendenwirbel vorwiegend Brüche des Körpers. Die Dornfortsätze brechen häufiger an den unteren Hals- und an den Brustwirbeln, an letzteren meist mehrere zugleich. Oft sind auch mehrere Theile eines Wirbels und oft mehrere Wirbel auf ein Mal zerbrochen. Der Grad der Trennung variirt von der Fissur bis zur Zermalmung.

Als **Veranlassung** eines Wirbelbruches wird gewöhnlich eine direct einwirkende Gewalt angesehen: ein Fall von bedeutender Höhe, das Aufschlagen eines sehr schweren Körpers, endlich Geschosse. Jedoch sind Fälle genug bekannt, in denen nachweisbar durch Gegenschlag oder durch Muskelgewalt Bruch eines Wirbels, ja sogar eines Wirbelkörpers, entstanden war¹⁾. Die von Malgaigne zuerst nachgewiesene Thatsache, dass die Wirbelsäule gerade an denjenigen Stellen, an denen sie sich am Stärksten zu biegen pflegt (zwischen dem 3. und 7. Halswirbel, in den letzten Rücken- und den ersten Lenden-Wirbeln), am Häufigsten bricht, kann daher zu Gunsten der Ansicht, dass die meisten Brüche der Wirbelkörper durch übermässige Zusammenziehung der Rückenmuskeln entstehen, gedeutet werden.

Die **Diagnose** eines Wirbelbruchs bietet der tiefen Lage wegen oft Schwierigkeiten dar. Der Bruch eines Dornfortsatzes wird, abgesehen von dem Schmerz und der Sugillation, an der Beweglichkeit des abgebrochenen Stückes erkannt. Ein einfacher Bruch der einen Hälfte des Wirbelbogens oder Bruch eines Querfortsatzes ist mit Sicherheit nicht zu erkennen, aber auch sehr selten. Auf Bruch eines Wirbelbogens auf beiden Seiten könnte man aus der grossen Beweglichkeit des ganzen Dornfortsatzes schliessen. Sind Bruchstücke in den Canal der Wirbelsäule hineingedrängt, so findet sich, dem comprimierten Theile des Rückenmarkes entsprechend, Lähmung der von den unterhalb dieser Stelle abgehenden Nerven versorgten Theile. Besteht ein Bruch durch die ganze Dicke eines Wirbelkörpers, so findet auch fast immer Verschiebung der Fragmente Statt, und der Verletzte ist dann sogleich in entsprechender Ausdehnung, je nach dem Sitze des Bruches, gelähmt, hat nicht blos Schmerzen an der Bruchstelle, sondern auch ein Gefühl von Schwere, Einschlafen, Ameisenkriechen oder dgl., zuweilen selbst heftige Schmerzen, in anderen Fällen aber eine vollständige Empfindungslosigkeit in den

¹⁾ Vgl. Malgaigne, *Traité des Fractures*, pag. 418, Reveillon in *Archiv. général. de médecine*, Tom. XIII. p. 449, Philippeaux in *Revue méd.-chirurg.* 1851 u. 1852.

gelähmten Theilen. Die Difformität besteht in einem starken Hervorragen oder in einer bedeutenden Depression des betreffenden Dornfortsatzes. Im Bereich der oberen Halswirbel kann man die Dislocation der fracturirten Wirbelkörper mit dem in die Rachenhöhle eingeführten Finger an deren hinterer Wand fühlen, zuweilen auch bei Spiegel-Beleuchtung sehen. Sind die Bruchstücke gegen einander beweglich, so entsteht bei Bewegungen des Rumpfes oder beim Druck auf die Bruchstelle Crepitation. Jedoch kommen auch Brüche der Wirbelkörper vor, bei denen die Bruchstücke (namentlich in verticaler Richtung) in einander eingekellt und deshalb unbeweglich sind. Man kann sich eine Vorstellung von solchen Fracturen machen, wenn man auf einen ausgeschnittenen Theil der Wirbelsäule, den man aufrecht stellt, in verticaler Richtung mit grosser Gewalt einen Schlag führt. — In den Fällen, wo an der Bruchstelle des Wirbelkörpers Beweglichkeit besteht, verläuft die Bruchlinie gewöhnlich nur wenig schräg von Hinten nach Vorn, nahe der Bandscheibe, so dass es den Anschein hat, als hätte man letztere abreißen wollen und dabei einen Theil des Wirbelkörpers mit abgerissen.

Als **Complicationen** der Wirbelbrüche finden sich ganz gewöhnlich Verletzungen oder Erkrankungen des Rückenmarkes und der Nervenwurzeln. Hierher gehören namentlich Erschütterung, Compression, Zerreissung, Quetschung und Entzündung des Rückenmarkes.

Die Complication mit Verrenkung der Wirbel wird bei letzterer erläutert.

Erschütterung des Rückenmarkes (*Commotio medullae spinalis*) erfolgt häufiger ohne, als mit Bruch der Wirbel. Ihre Symptome sind die der unvollständigen oder vollständigen Lähmung. Dieselben treten unmittelbar nach der Verletzung auf und nehmen, wie bei der Hirnerschütterung (vgl. Bd. III.), stetig an Intensität ab, sofern sie nicht durch Betheiligung der *Medulla oblongata* sofort zum Tode führen.

Compression wird veranlasst durch Verschiebung der Bruchstücke bei completen Fracturen, Bluterguss zwischen die *Dura mater medullae* und die Wandung des Canals der Wirbelsäule oder auch im Innern der *Dura mater*. Solche Blutergüsse innerhalb des Canals der Wirbelsäule können aber auch ohne Fractur bestehen. Die Erscheinungen der Lähmung entwickeln sich bei der Compression entweder sogleich nach der Verletzung oder erst allmähig. Ersteres ist der Fall, wenn die dislocirten Bruchstücke das Rückenmark comprimiren, letzteres, wenn ein Bluterguss die Veranlassung ist. Im Verlaufe der traumatischen Entzündung kann auch Compression durch

Exsudat bedingt werden. — Ist die Lähmung nicht unmittelbar nach der Verletzung aufgetreten, so darf hiernach keineswegs aus ihr auf einen Wirbelbruch geschlossen werden.

Zerreissung des Rückenmarkes kommt ohne Fractur der Wirbel fast niemals vor. Ist sie vollkommen, so bedingt sie sogleich eine vollständige Lähmung der weiter abwärts gelegenen Theile; ist sie unvollständig, so folgt ihr zunächst nur eine auf die entsprechenden Nervenprovinzen beschränkte Lähmung, z. B. bei Zerreissung der vorderen Stränge Aufhebung der Bewegungen, bei derjenigen der hinteren Stränge Vernichtung der Empfindlichkeit.

Auf jede, wenn auch noch so beschränkte Zerreissung des Rückenmarkes, häufig auch auf die Erschütterung und fast immer auf die Compression dieses Organs folgt eine höchst gefährliche Entzündung desselben (*Myelitis traumatica*). Dieselbe entwickelt sich innerhalb der ersten 5 bis 6 Tage, unter sehr schwankenden Erscheinungen, meist jedoch mit heftigen Schmerzen, oft auch Krämpfen, demnächst Lähmung, wenn solche nicht schon durch die Verletzung selbst bedingt war, und unter heftigem Fieber. Die Entzündung verbreitet sich leicht an dem Rückenmarke auf- und abwärts. Je weiter sie aufwärts steigt, desto ausgebreiteter wird die Lähmung.

Hat die Zerreissung oder Compression des Rückenmarkes ihren Sitz in der Lendengegend, so hat sie Paralyse der unteren Extremitäten, der Blase und des Sphincter ani zur Folge, wodurch *Retentio urinae*, später unwillkürlicher Abgang des Harns und *Incontinentia alvi* bedingt wird. Der Penis ist gewöhnlich in halber *Erection*. — Bei Verletzungen in der Rückengegend ist ausserdem die Haut im Umfange des Bauches unempfindlich, die Bauchmuskeln gelähmt, so dass man die Darmwindungen durch die Bauchdecken hindurch erkennen kann und der Bauch aufgetrieben erscheint; auch empfindet der Verletzte oft heftige Schmerzen in der *Regio epigastrica*. Durch die Lähmung der Bauchmuskeln wird die *Respiratio abdominalis*, durch die bei etwas höherem Sitz der Fractur hinzukommende Lähmung der entsprechenden *Intercostalmuskeln* auch die *Respiratio thoracica* beeinträchtigt. — Ist der *Cervicaltheil* des Rückenmarkes verletzt, so sind auch die oberen Extremitäten mehr oder weniger gelähmt, die *Respiration* erfolgt ausschliesslich durch Bewegungen des Zwerchfells, welche endlich gleichfalls unmöglich werden, wenn eine vollständige Zerreissung, Compression oder dgl. am obersten Theile des Rückenmarkes (oberhalb des zweiten Halswirbels) besteht.

Die Diagnose einer Rückenmarksverletzung ist, wie aus

den hier gegebenen groben Umrissen hervorgeht, ganz physiologisch zu deduciren, — eine angewandte Physiologie des Rückenmarkes.

Die **Prognose** der Wirbelbrüche ist desto bedenklicher, je mehr und je weiter aufwärts das Rückenmark in Mitleidenschaft gezogen ist. Dies kann schon bei einfachen und nur die Fortsätze betreffenden Brüchen in gefährlicher Weise der Fall sein; sobald aber ein vollständiger Bruch des Wirbelbogens oder gar des Wirbelkörpers besteht, ist es unvermeidlich. *Commotio medullae spinalis* geht gewöhnlich ohne üble Folgen oder doch nur mit Hinterlassung einer Hyperämie vorüber. Nur wenn der höchste Grad der Rückenmarks-Erschütterung Statt fand, kann sofort der Tod darauf folgen. Dies dürfte jedoch ohne gleichzeitige Erschütterung des Gehirns kaum möglich sein. Die üblen Folgen der Compression können nur dann glücklich vorüber geführt werden, wenn die Ursache der Compression sich beseitigen lässt. Ueberdies bleibt nachfolgende Entzündung zu fürchten. Besteht Zerreißung des Rückenmarkes, so sind die Aussichten noch viel übler. Vollständige Zerreißung des Rückenmarkes ist durchaus unheilbar. Die Myelitis, aus welcher Ursache sie auch entsprungen sein mag, ist immer eine sehr gefährliche Krankheit, und zwar desto gefährlicher, je weiter aufwärts sie sich erstreckt. Ihr gewöhnlicher Ausgang ist der Tod. Derselbe erfolgt, je nach dem verschiedenen Sitze der Entzündung, zu verschiedener Zeit: nach 1 bis 1½ Monaten, wenn sie in der Lendengegend, nach 3 bis 7 Tagen, wenn sie in der Cervicalgegend, jedoch unterhalb des 3. Halswirbels, ihren Sitz hat. Verletzungen des Rückenmarkes oberhalb des 3. Halswirbels haben, wenn sie nicht ganz unbedeutend sind, den Tod fast immer sogleich zur Folge, indem dadurch alle Respirationsbewegungen unterbrochen werden. — Stirbt der Kranke nicht unmittelbar an einer Rückenmarksverletzung und bleibt die durch dieselbe veranlasste Lähmung bestehen, so entwickelt sich gewöhnlich später eine zum Tode führende Gangrän (*Decubitus*) derjenigen Theile, welche die Last des, jeder selbstständigen Bewegung beraubten Körpers zu tragen haben. Die Lähmung der Blase führt bald zur Zersetzung des stagnirenden Harns, diese wiederum zur Verschwärung (*Diphtheritis*) der Blasenschleimhaut. Sind die Respirationsbewegungen beeinträchtigt, so entstehen bald Stasen und Katarrhe in der Lunge (*hypostatische Pneumonie*).

Bei der **Behandlung** der Wirbelbrüche muss die ganze Sorgfalt des Arztes auf die Erhaltung der Integrität des Rückenmarkes gerichtet sein. Schon der Transport und die Lagerung des Verletzten erheischen die grösste Vorsicht und Sorgfalt. Die Einrichtung der

... Processus spi-
... Vertebrae nicht
... im Tornortsatz.
... eines Hebel
... oder durch
... Hüften die
... wieder in die nor-
... wurde dadurch
... als
... atonischen
... nachhafter
... schon zu stark
... die Retention

Bei Wirbelbrüchen
... werden die verletzten
... und örtliche Blutentziehungen.
... in einer höchst
... nicht anbringen. Deshalb hat
... auch ihre Uebel-
... in dieser Lage den Katheter
... und die Unbequemlichkeit
... möglichst unbe-
... die energische An-
... Bei Zurückhaltung des
... durch den Katheter 2 bis
... und grösste Reinlichkeit beim
... durchlöchernte Matratze. Unterschieben dicker
... zu sorgen. Decubitus zu verhüten oder zu bekämpfen
... und endlich, wenn der Kranke die Entzündung des Rückenmarkes
... die zurückbleibende Lähmung zu behandeln.
Auch im günstigsten Falle darf der Verletzte erst, wenn alle localen
... geworden sind, und auch dann nur ganz
... in die aufrechte Stellung übergehen.

Bei der Compression des Rückenmarkes wird von der grossen
Mehrzahl der Aerzte ausser der Reposition der Bruchstücke, sofern
diese unthunlich, eine anderweitige mechanische Behandlung nicht
empfohlen. Viguerie, Heister u. A. haben den Vorschlag gemacht,
an der entsprechenden Stelle einen Wirbelbogen auszusägen, um er-
cesses Blut aus dem Canale der Wirbelsäule zu entfernen. Cline
... zuerst ausgeführt,

nach ihm Tyrrel, Barton, Holscher u. A. Auch A. Cooper empfiehlt diese Operation; jedoch ist bis jetzt noch kein Leben durch sie gerettet worden. Minder gefährlich wäre vielleicht das Durchschneiden der Ligam. interspinalia und flava, wodurch sowohl das Ablassen eines Ergusses, als das Unterschieben eines Elevatorium zum Behuf der Reposition ermöglicht wird.

2) Brüche des Kreuzbeins.

Die Seltenheit dieses Bruches erklärt sich wesentlich aus der Dicke des Kreuzbeins und der durch das Hervorragen der hinteren Hüftbeinstachel geschützten Lage desselben.

Die Veranlassungen sind fast immer direct einwirkende: Fall, Schlag u. dgl. — Die Fractur verläuft meist quer und findet sich relativ häufiger im mittleren oder unteren Theile. Das untere Bruchstück kann theils durch die einwirkende Gewalt, theils durch die Wirkung des Glutaeus maximus und Coccygeus nach Vorn verschoben werden. Jedoch kommen auch Verticalbrüche (in der Richtung der Foramina sacralia) zuweilen vor¹⁾. — Bei einem vollständigen Bruche des Kreuzbeins sind immer die Sacral-Nerven mehr oder weniger verletzt. Deshalb findet sich in der Regel partielle Lähmung der unteren Extremitäten, Lähmung der Blase und des Mastdarms; letzterer kann überdies durch das nach Vorn verschobene untere Bruch-Ende zerrissen oder gequetscht werden.

Die Diagnose ist zuweilen schwierig, besonders wenn der Bruch nicht ganz unten sitzt und die Beweglichkeit des unteren Bruch-Endes gering ist. Um sich von letzterer zu überzeugen, führt man den Finger in den Mastdarm gegen die vordere Fläche des Kreuzbeins, während die andere Hand auf die hintere Fläche desselben aufgelegt wird. Dieser Handgriff ist auch bei der Reposition anzuwenden. Uebrigens lässt sich, ausser ruhiger Lage (auf der Seite oder auf dem Bauch) und Anwendung eines entsprechenden antiphlogistischen Verfahrens, zur Begünstigung der Heilung Nichts thun. Retentio urinae erheischt den Catheterismus, mangelnder Stuhlgang milde Purgirmittel. — In den meisten Stücken stimmen die Kreuzbeinbrüche mit den Wirbelbrüchen überein; jedoch ist ihre Prognose um so viel weniger schlimm, als die Bedeutung der Cauda equina derjenigen des eigentlichen Rückenmarks nachsteht.

¹⁾ Voillemier (Bulet. de l'Acad. de méd. 1860) glaubt die letzteren aus der Einwirkung indirecter Gewalt ableiten zu können.

3) Brüche des Steissbeins.

Das Steissbein bricht sehr selten, wegen seiner grossen Beweglichkeit und geringen Oberfläche — leichter bei alten Leuten, wo seine einzelnen Stücke unter einander und mit dem Kreuzbeine verwachsen sind. Die gewöhnliche Veranlassung ist ein Fall oder Schlag. Die Beweglichkeit des unteren Bruchstückes, welche durch den in den Mastdarm eingeführten Finger leicht erkannt wird, und die durch Bewegungen der Gesässmuskeln gesteigerten Schmerzen an der Stelle des Bruches sichern die Diagnose. Immer besteht zugleich heftige Quetschung der benachbarten Weichtheile, welche zur Eiterung, auch zu Caries oder Nekrose des Steissbeins führen kann. — Behandlung wie bei Kreuzbein-Brüchen.

4) Brüche des Brustbeins.

Diese keineswegs gewöhnliche Fractur verläuft, abgesehen von Schussverletzungen, am Häufigsten in querer Richtung im Mittelstück des Knochens. Die Veranlassung ist in der Regel eine direct einwirkende Gewalt. Dieselbe muss bedeutend sein, wenn das fast ausschliesslich spongiöse Gewebe des Brustbeins in seiner ganzen Dicke zerbrechen soll. Deshalb kommt mit dem Knochenbruch zugleich auch Zerreissung der bedeckenden Haut vor. Jedoch kann ein Bruch des Brustbeins auch durch Gegenschlag, z. B. bei einem Fall auf die Mitte des Rückens, wobei der Körper stark hintenüber gebeugt wird (David), auch durch gewaltsames Zusammenbiegen des Rumpfes nach Vorn (Billroth), ja sogar durch heftige Zusammenziehungen der am Brustbein befestigten Muskeln (bei heftigem Erbrechen, bei der Geburt, Chaussier) oder auch der Rückenmuskeln (bei absichtlich starkem Hintenüberbeugen des Rumpfes bei Gauklern, Taget) bewirkt werden. Die indirecten Brüche sind stets Querbrüche und kommen fast ausschliesslich an der Verbindungsstelle zwischen Manubrium und Corpus sterni oder in deren Nähe vor, weshalb es zweifelhaft bleibt, ob es sich um Fractur oder Knorpel-Zerreissung (gewöhnlich sagt man: „Luxation“) handelt¹⁾.

Die **Symptome** eines Brustbeinbruches sind, sobald Verschiebung besteht, sehr augenfällig; anderen Falls führen nur Schmerz und Sugillationen auf die Spur des Bruches. Bei einfachen Quer- und Schräg-Brüchen erscheint in der Regel das untere Bruch-Ende nach Vorn geschoben. Diese Verschiebung kann bald eine wirkliche, bald aber auch eine scheinbare sein, indem das obere Bruchstück nach

¹⁾ Vgl. „Verrenkungen des Brustbeins“.

Hinten gerückt ist und durch den Luftdruck bei jeder Inspiration weiter nach Hinten gedrängt wird¹⁾. Bei einer *Fractura comminuta* sind oft beide Bruchstücke gegen die Brusthöhle hin eingedrückt. Directe Brüche setzen eine sehr bedeutende Gewalt voraus und sind deshalb gewöhnlich von einer Erschütterung der Brusteingeweide und des im vorderen Mittelfellraum gelegenen Bindegewebes begleitet, welche einen Bluterguss bald in die Pleurahöhle, bald in das Cavum mediastini, bald auch innerhalb der Lunge selbst, und demnach Entzündung und Eiterung an allen diesen Orten zur Folge haben kann. Auch Wirbel- und Rippen-Brüche können zugleich bestehen; jedoch ist es, nach meinen Erfahrungen nicht richtig, wenn Billroth²⁾ diese Complication als die Regel ansieht. Bei directen Brüchen mit Eindruck der Bruch-Enden erfolgen Zerreibungen der hinter dem Brustbein gelegenen Weichtheile³⁾ und deshalb noch bedeutenderer Bluterguss und heftigere Entzündung, als nach einer blossen Erschütterung, daher denn auch Abscesse im vorderen Mittelfellraume und nachträglich Caries und Nekrose des Brustbeines selbst.

Prognose. Einfache Sternalbrüche sind nicht gefährlich; durch die oben aufgeführten Complicationen können sie höchst bedenklich, selbst tödtlich werden. Bei mangelhafter Reduction und difformer Heilung hinterlassen sie oft Athembeschwerden, Hustenreiz, Opression, Herzklopfen (J. L. Petit). Diese Störungen beruhen zum Theil auf der Raumbengung der Brusthöhle, zum Theil wohl auch auf Compression des einen oder beider Zwerchfells-Nerven.

Behandlung. Ist der Bruch einfach, so lässt man den Kranken auf dem Rücken liegen, mit erhöhtem Kopf und Becken und verhindert Bewegungen des Thorax so viel als möglich durch eine fest angelegte breite Binde (Handtücher). Springt das untere Bruch-Ende hervor, so drängt man es mittelst einiger Compressen zurück. Zuweilen ist zum Behuf der Reduction eine förmliche Extension und Contra-Extension nothwendig, welche am Vollständigsten dadurch erreicht wird, dass man die Wirbelsäule des ausgestreckt liegenden Kranken über eine fest gepolsterte dicke Rolle hintenüber beugt. Bevor man dazu schreitet, muss man sich überzeugt haben, dass kein

¹⁾ So verhielt es sich bei einer von Prof. Pohl beobachteten *Fractura sterni* in der Höhe des sechsten Intercostalraums.

²⁾ Pitha u. Billroth; Handbuch, Bd. III., H. pag. 116.

³⁾ Sanson beobachtete eine ausgedehnte Zerreibung des Herzens bei einem Bruche des Brustbeins, der durch den Stoss einer Wagendeichsel veranlasst war. Auch von Anderen sind Zerreibungen des Herzens (jedoch sehr selten) bemerkt worden. — Bei einem Bruch des verknöcherten Schwertfortsatzes kann durch das eingedrückte Bruch-Ende die Leber zerrissen werden.

Wirbelbruch besteht. Kommt man auch damit nicht zum Ziele und erscheint die Erhebung des eingedrückten Bruchstücks wegen der bestehenden übeln Zufälle nothwendig (was sehr selten sein dürfte), so soll man eine Knochenschraube (Tire-fond) einbohren, jedoch ohne das Brustbein zu durchbohren, und mit dieser die Erhebung vornehmen. Die Coaptation muss so genau als möglich ausgeführt werden. Zu abermaliger Verschiebung ist voraussichtlich keine Neigung vorhanden. Durch Compressen und die angegebene Binde sucht man sie zu verhüten. Genügt dies nicht, so kann man die Schraube des Tire-fond im Brustbein stecken lassen und sie in entsprechender Höhe in einem Gypsverbande (Szymanowski) oder in einem den Thorax umfassenden Bügel befestigen. — Die Entzündung sucht man durch Eisumschläge zu beschränken.

5) Brüche der Rippen.

Die Rippen brechen sehr oft, am Häufigsten die mittleren; indem die oberen durch das Schultergerüst und die Brustmuskeln geschützt sind, die unteren aber durch ihre grosse Beweglichkeit dem Zerbrechen ausweichen. Die Frequenz der Rippenbrüche beträgt beinahe 17 Proc. aller Fracturen; nur Vorderarmbrüche sind noch häufiger¹⁾. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass ganz gewöhnlich mehrere, oft viele Rippen zugleich brechen, welche von Manchen als ebenso viele Fracturen gezählt werden. Meist haben Rippenbrüche ihren Sitz im mittleren Theile des Knochens²⁾. Die Bruchlinie verläuft häufiger quer als schräg. Selten sind Doppelbrüche. Comminutiv-Fracturen entstehen fast nur durch Geschosse. Bei alten Leuten brechen die Rippen ungemein viel öfter als in früheren Lebensaltern.

Die **Veranlassung** eines Rippenbruches ist entweder eine direct einwirkende Gewalt, oder eine solche, welche die Spannung des von der Rippe gebildeten Bogens bedeutend steigert. Directe Brüche sind häufiger; man nennt sie auch „Rippenbrüche nach Innen“, weil durch die einwirkende Gewalt die Bruch-Enden meist mehr oder weniger gegen die Brusthöhle hin eingedrückt werden. Zerreissungen der Pleura und der Lunge sind bei diesen Brüchen nicht selten. Die durch Gegenschlag entstandenen „Rippenbrüche nach Aussen“ haben diese Complicationen nur bei beträchtlicher Verschiebung. In einigen Fällen hat man Rippenbrüche durch Muskelgewalt, bei starken Hustenanfällen entstehen sehen, meist bei alten Leuten.

¹⁾ Vgl. Gurlt, Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. II, Heft I. (1862).

²⁾ So nach J. L. Petit u. A., nach Malgaigne häufiger weiter nach Vorn.

Die **Diagnose** eines Rippenbruches ist oft schwierig. Die meisten bestehen ohne Verschiebung der Bruch-Enden, indem letztere mit ihren Zacken genau in einander greifen, und durch die Intercostalmuskeln in ihrer normalen Lage erhalten werden. Dies gilt nicht bloß für die ziemlich häufigen unvollkommenen oder doch ohne Zerreißen der Knochenhaut zu Stande gekommenen Rippenbrüche, sondern auch für viele complete, namentlich auch für manche Schussfracturen¹⁾. Alsdann kann sich die Diagnose, wenn die Bruchstelle nicht etwa blossliegt, nur auf den fixen Schmerz stützen, welcher in Folge eines Stosses oder Falles an einer umschriebenen Stelle des Thorax auftritt und durch Berührung mit dem längs der Rippe hinziehenden Finger, sowie durch angestrengte Respirationsbewegungen, besonders Husten, zu unerträglicher Höhe gesteigert wird. Circumscribte Sugillationen können ihr einen höheren Grad von Gewissheit geben. Die Crepitation, zu deren Erforschung hier die Auscultation besonders nützlich ist, löst alle Zweifel. Besteht Verschiebung der Bruch-Enden nach Aussen, so ist der winklige Vorsprung leicht zu erkennen. Ebenso wenig Schwierigkeiten wird in der Regel die Diagnose eines Rippenbruches mit Eindruck der Bruch-Enden machen. Die Vertiefung an der Stelle der Fractur, die abnorme Beweglichkeit, gewöhnlich auch deutliche Crepitation, endlich die Symptome der Verletzung von Brustfell und Lunge lassen keinen Zweifel. Letztere können in sehr verschiedenem Grade bestehen: bald nur Zerreißen der Pleura und Quetschung der Lunge mit nachfolgender Entzündung, deren Symptome dann einen wesentlichen Theil der Diagnose ausmachen; bald Bluterguss in die Brustfellhöhle mit oder ohne Zerreißen der Art. intercostalis; bald Zerreißen der Lunge mit Austritt von Blut und Luft in die Pleurahöhle (Haemopneumothorax), auch Luftaustritt ins Bindegewebe, Emphysem, welches, wenn die Lunge an der verletzten Stelle durch alte pleuritische Adhäsionen mit der Thoraxwand verwachsen ist, auch ohne Pneumothorax in grosser Ausdehnung bestehen kann; bald Zerreißen oder doch Quetschung des Zwerchfells, der Leber, der Milz u. s. f. Diese Complicationen verhalten sich in diagnostischer Beziehung ebenso, wie wenn sie durch eine anderweitige Verletzung herbeigeführt wären. Vgl. „Krankheiten des Thorax“ (Bd. III).

Prognose. Ein einfacher Rippenbruch ohne alle Complicationen

¹⁾ Stromeyer (Maximen der Kriegsheilkunst, 1861, pag. 426) hebt hervor, dass nicht-penetrirende Schussfracturen der Rippen meist übersehen werden, wenn der Schusscanal lang ist, weil die Fragmente mehr im Zusammenhange bleiben und Emphysem dabei nicht entsteht.

Ist keine bedenkliche Krankheit, zumal wenn er incomplet ist, oder doch ohne Verschiebung besteht. Die Heilung erfolgt ohne alle Behandlung in etwa 3 Wochen. In manchen Fällen können die Verletzten schon nach wenigen Tagen wieder umhergehen, sogar arbeiten. Die günstigste Prognose haben im Allgemeinen die Brüche der mittleren Rippen; Brüche der obersten und untersten Rippen setzen eine grössere Gewalt voraus und sind daher meist von bedeutenderer Erschütterung und Quetschung begleitet. Brüche mit Verschiebung nach Innen sind tödlicher, als solche ohne Verschiebung oder mit Verschiebung der Bruch-Enden nach Aussen oder übereinander. Jede *Fractura comminuta* einer Rippe, und jeder Rippenbruch, der mit Wunde, hämorrhagischem Erguss oder Pneumonie complicirt ist, muss als eine lebensgefährliche Krankheit betrachtet werden. Keineswegs ist aber bei solchen Complicationen alle Hoffnung aufzugeben. Besteht kein Zutritt der Luft durch eine äussere Wunde und erstreckt sich die Zerrung der Lunge nicht allzu tief (was freilich erst an den übeln Folgen erkannt wird), so sieht man die Verletzten, wenn auch nach langen Leiden, doch noch häufig genesen. Pneumothorax und Emphysem sind von nicht geringer prognostischer Bedeutung, wenn sie nach Ablauf einiger Tage abzunehmen beginnen; dann kann man hoffen, dass die Lungenwunde geschlossen ist, und darf die Resorption der angesammelten Luft sicher erwarten.

Behandlung. Gewöhnlich ist, da keine Verschiebung besteht, auch keine Reduction und überhaupt keine weitere mechanische Behandlung erforderlich, als dass man die Bewegungen der fracturirten Rippen möglichst zu beschränken sucht, was sich durch Umspannung der betreffenden Thoraxhälfte mit Heftpflasterstreifen, auch durch Binden- und Tuchverhältnisse in gewissem Grade erreichen lässt¹⁾; vor Allem aber ist dem Kranken absolute Ruhe in liegender Stellung zu empfehlen. Findet sich beträchtliche Verschiebung nach Aussen, so versucht man die Reduction durch vorsichtigen, directen Druck. Bei Verschiebung nach Innen würde in der Regel die Reduction nur mit einer Knochenschraube (*Tire-boul*) oder vermittelt eines scharfen Hakens, den man unter die eingedrückten Bruch-Enden führt, mit einiger Aussicht auf Erfolg versucht werden können. Diese von Malgaigne empfohlene, gleichsam subcutane Reduction ist anderen Verfahrungsweisen, zu deren Ausübung die Bruchstelle durch einen Einschnitt blosszulegen wäre, unbedingt vorzuziehen, aber auch keineswegs ganz gefahrlos und ebensowenig sicher in Betreff der Erreichung

¹⁾ Vgl. Hilton, *Lancet* 1852, pag. 236.

des beabsichtigten Zweckes. Sind beide Bruch-Enden gleichmässig und nicht tief eingedrückt, so gelingt die Reduction zuweilen, wenn man auf das Sternal- und Vertebral-Ende der gebrochenen Rippe einen Druck ausübt, als wollte man den durch sie gebildeten Bogen stärker spannen, zugleich aber den Kranken möglichst tief inspiriren lässt (Lionnet). Solche Reductions-Versuche dürfen aber weder oft wiederholt, noch lange fortgesetzt werden, weil durch sie ein neuer Entzündungsreiz hinzugefügt, vielleicht sogar zuweilen eine üblere Verschiebung bewirkt wird. Für die Retention eines eingedrückten Bruchstückes soll man sich, nach Szymanowski, der Knochenschraube, wie bei *Fractura sterni*, bedienen; auch hier ist aber sorgfältig zu erwägen, ob das anzuwendende Mittel nicht viel schlimmer ist, als das zu beseitigende Uebel. Schon das Einbohren könnte zu tieferer Depression, die Anwesenheit des Instrumentes zu verderblicher Entzündung führen. Jedenfalls hat man bei subcutanen Rippenbrüchen alle solche Eingriffe zu unterlassen. Bei Complicationen mit einer reinen Wunde sucht man diese so schnell und so sicher als möglich zu schliessen. Besteht *Fractura comminuta* mit Wunde, so müssen durch letztere, welche nöthigenfalls zu erweitern ist, alle losen Splitter ausgezogen werden. Die Resection der Bruch-Enden ist nicht zu empfehlen. — In Betreff der Behandlung der übrigen Complicationen vgl. „Brustwunden“, Bd. III.

6) Brüche der Rippenknorpel.

Fast ausschliesslich die 5 mittleren Rippen erleiden in ihrem knorpeligen Theile zuweilen eine Fractur. Eine solche verläuft immer vollkommen quer; die Bruchflächen sind glatt und eben; die Veranlassung ist stets eine directe Gewalt. Die Verschiebung ist in der Regel unbedeutend und findet immer zuerst und oft ausschliesslich nach der Dicke, demnächst auch nach der Länge Statt. Das Sternal-Ende bleibt dabei an seinem Platze, das Costal-Ende rückt nach Hinten (Innen). Die Reduction ist gewöhnlich leicht zu bewirken, wenn man den Verletzten tief inspiriren lässt, während man das Sternal-Ende nach Hinten drückt; die Retention ist schwierig. Die Heilung erfolgt, unter Verdickung der Bruchstelle, entweder durch Bindegewebe oder durch Entwicklung von Knochengewebe, in Gestalt eines die Bruchstelle umfassenden Ringes. Niemals regenerirt der Knorpel¹⁾. Die Behandlung ist wie bei Rippenbrüchen einzuleiten.

¹⁾ Vgl. Klopsch, *De fracturis cart. cost. Vratislaviae MDCCCLV.*

7) Brüche der Beckenknochen.

Die grosse Festigkeit und die geschützte Lage der Beckenknochen macht die Brüche derselben sehr selten¹⁾. Es gehört eine sehr grosse Gewalt dazu, um einen solchen Bruch zu Stande zu bringen. Dem entsprechend fehlen dabei auch nie die Erscheinungen heftiger Erschütterung im Bereich des unteren Rumpfes. Fast immer hat die Gewalt direct eingewirkt, z. B. ein Schlag mit einem schweren Körper (Hufschlag), Einpressen des Rumpfs, Verschüttung, Ueberfahren mit einem schweren Wagen, Fall von beträchtlicher Höhe, Verletzungen durch Geschosse. Bei letzteren namentlich fehlen selten Verletzungen der Bauch-Eingeweide, die aber auch bei anderen Beckenfracturen häufig genug sind. Bruchstücke können sogar in den Darm oder in die Blase eindringen. — Jedoch giebt es auch indirecte Beckenbrüche in Folge eines Falles auf die Füsse.

Für die Behandlung der Beckenbrüche gilt als allgemeine Regel, dass der Kranke bis zur vollständigen Consolidation (meist Monate lang) vollkommen ruhig liegen muss, und dass die im Bereich der Beckenorgane bestehenden Complicationen, insbesondere Entzündungen oder Harn-Infiltrationen, mit der grössten Sorgfalt zu behandeln sind (vgl. Bd. IV.). In Bezug auf die andauernde ruhige Lage des Kranken muss ausdrücklich hervorgehoben werden, dass es hiermit bei den Brüchen der Rumpfknochen und besonders bei den Beckenbrüchen seine ganz eigenthümlichen Schwierigkeiten hat. Es grenzt oft an das Unmögliche, den Kranken in dieser oder jener Lage zu erhalten, wenn seine eigene Willenskraft dazu nicht ausreicht. In dieser Beziehung gewähren Schwebevorrichtungen und der Gypsverband, soweit er anwendbar ist, oft grosse Vortheile.

Die Beckenbrüche sind wesentlich verschieden, je nach dem Theil der Beckenknochen, welcher gebrochen ist. Wir unterscheiden: Brüche des Darmbeins, des Schoossbeins, des Sitzbeins und Brüche der Pfanne.

a) Brüche des Darmbeins.

Brüche des Os ileum entstehen nur in Folge direct einwirkender Gewalt. Abbrechen der Crista ilei allein kommt vorzugsweise zu der Zeit vor, wo sie noch als Epiphyse in knorpeliger Verbindung mit dem übrigen Knochen steht²⁾. Häufiger bricht die Spina anterior superior in mehr oder weniger grosser Ausdehnung ab; gewöhnlich wird sie

¹⁾ Nach Gurlt's Tabelle beträgt ihre Frequenz wenig über 0,3 Procent.

²⁾ Ich habe diese Fractur jedoch bei einem kräftigen Manne selbst beobachtet.

ann nach Unten und Vorn gezogen durch Sartorius und Tensor *asciae latae*. Ist die ganze *Crista* abgebrochen, so erleidet sie nur ausnahmsweise eine Verschiebung, weil gewöhnlich die an ihrer äusseren Seite entspringenden Fasern der Gesässmuskeln denjenigen des *Iliacus internus*, und beide zusammen den von oben her inserirten Bauchmuskeln das Gegengewicht halten.

Sanson hat einmal ein 4 Finger breites und ebenso langes Bruchstück vom oberen Rande des Darmbeins bis in die Nähe des Thorax verschoben gesehen.

Die Diagnose der Darmbein-Brüche kann Schwierigkeiten darbieten, indem die Bruchstelle bei der tiefen Lage vielleicht dem zufühlenden Finger unzugänglich ist. Jedoch wird man abnorme Beweglichkeit und *Crepitation* gewöhnlich entdecken, wenn man die Bauchmuskeln hinreichend erschläft, indem man den Verletzten in liegender Stellung untersucht, den Thorax nach der kranken Seite neigen und den Oberschenkel gegen den Rumpf beugen lässt. Fast immer bestehen bei Darmbeinbrüchen bedeutende Quetschungen und anderweitige Nebenverletzungen. Wenn die Prognose nicht durch diese getrübt wird (was freilich häufig der Fall), so ist sie günstig. Die Reduction erfolgt in der für die Diagnose angegebenen Stellung. Die Lagerung der Beine auf einem Keilkissen oder auf einer unter die Kniekehle zu schiebenden dicken Rolle ist zur Retention meist ausreichend. Besteht Neigung zur Verschiebung, so muss man eine breite Becken-Binde hinzufügen, die am Besten sogleich durch Gyps befestigt wird (vgl. *Fractura colli femoris*).

b) Brüche des Schoossbeins.

Brüche des Schoossbeins betreffen entweder den Körper oder einen der Aeste und bestehen bald einfach, bald doppelt; im letzteren Falle findet sich entweder ein Doppelbruch eines Schoossbeins oder beide Schoossbeine sind zugleich gebrochen. Meist handelt es sich um eine direct einwirkende Gewalt. Jedoch haben A. Cooper und Goyrand Fälle von Brüchen des *Os pubis* in Folge eines Sturzes auf das *Tuber ischii*, also durch Gegenschlag, beobachtet.

Die bedeutendsten Verschiebungen der Bruchstücke, namentlich in die Beckenhöhle hinein, erfolgen meist durch die fracturirende Gewalt. Aber auch der Muskelzug kann dabei von Belang sein. Ist ein Stück des Schambeins ganz abgelöst, so kann es durch *Pectineus*, *Adductores* und *Obturator externus* nach Unten, Vorn und Aussen gezogen werden. Sind beide Schoossbeine in ihren horizontalen und absteigenden Aesten gebrochen, so werden sie nach Vorn und Unten *dislocirt*. Hierdurch kann eine so bedeutende *Compression*

der Harnröhre (und der Vagina) bewirkt werden, dass man zur operativen Entfernung des Bruchstücks schreiten muss. Compression oder Zerreißung der Harnröhre durch verschobene Bruchstücke gehören, besonders bei Splitterbrüchen, zu den gewöhnlichen Complicationen. Die einwirkende Gewalt kann auch zugleich die Blase zersprengt, sogar den Darm zerrissen haben. Jedenfalls muss man immer eine heftige Erschütterung des ganzen unteren Rumpfes voraussetzen.

Die Diagnose ist bei vollständigen Brüchen wegen der oberflächlichen Lage des Knochens leicht, sobald man nur die an ihm befestigten Muskeln erschläßt. Schwieriger wird eine bloße Einknickung zu erkennen sein, welche, nach Wernher, besonders an dem Ramus descendens häufig vorzukommen scheint. — Die Prognose ist, wegen der fast immer zugleich bestehenden Erschütterung und Zerreißung der Beckenorgane, viel bedenklicher als bei Fracturen des Os ileum. Ueberdies hat die veranlassende Gewalt oft auch noch Commotion des Rückenmarkes zur Folge gehabt.

Die Behandlung erheischt dieselbe Lage wie beim Bruch des Darmbeins. Die Reduction kann bei Weibern durch den in die Vagina eingeführten Finger erleichtert werden. Abgelöste Bruchstücke, welche die Harnblase, die Harnröhre oder die Scheide verletzen oder zusammendrücken, müsste man, wenn ihre Verschiebung anderweitig nicht beseitigt werden könnte, nach dem Beispiele von Desault und Maret, durch eine Incision blosslegen und entfernen; ebenso ein nekrotisches Bruchstück. Der Verband beschränkt sich auf eine breite Leibbinde, welche um das Becken gelegt wird. — Den schwierigsten Theil der Behandlung bildet immer die Berücksichtigung der bestehenden Complicationen, besonders der Harn-Infiltration (vgl. Bd. IV.).

c) Brüche des Sitzbeins.

Brüche des Sitzbeins entstehen nur durch bedeutende und direct wirkende Gewalt und sind deshalb stets von heftiger Quetschung der bedeckenden und Erschütterung der umgebenden Weichtheile, auch wohl von Splitterung des Knochens begleitet.

Die Diagnose wird gewöhnlich für leicht gehalten; sie kann aber, wenn keine beträchtliche Verschiebung Statt findet und in Folge der Quetschung bereits bedeutende Geschwulst eingetreten ist, sehr schwierig sein. Die Verschiebung, welche man a priori, wegen der starken Muskeln, welche vom Tuber ischii abwärts verlaufen, für sehr augenfällig und constant halten möchte, kann gänzlich fehlen, wenn (wie gewöhnlich) die das Tuber ischii umfassenden starken Fasern des Ligamentum sacro-tuberosum unversehrt geblieben sind. Liegt

der Bruch an einer dem Finger zugänglichen Stelle, so lässt sich auch Beweglichkeit und Crepitation entdecken, wozu das Einführen des Fingers in den Mastdarm oder in die Vagina von Nutzen sein kann. Die Function der vom Tuber ischii entspringenden Muskeln, somit auch die Fähigkeit zu gehen, ist nur dann aufgehoben, wenn das Tuber ischii gänzlich abgebrochen und zugleich die dasselbe umfassende Bandmasse zerrissen ist.

Die Prognose der Sitzbeinbrüche ist, abgesehen von etwaigen Nebenverletzungen, günstig. — Nachdem die etwa bestehende Verschiebung durch directen Druck beseitigt ist, reicht ruhige Lage mit leicht gebeugtem Schenkel zur Behandlung aus. Um das abgebrochene Tuber sicher in der gehörigen Lage zu erhalten, kann man eine Spica coxae hinzufügen und durch Gyps befestigen.

Sich selbst überlassen, kann das abgebrochene Tuber ischii durch ligamentöse Zwischensubstanz anheilen oder nekrotisch werden, auch wohl zur Entstehung eines „discontinuirlichen Osteom's“ Veranlassung geben. (Vgl. Bd. I. pag. 408).

d) Bruch der Pfanne.

Der Bruch der Pfanne, *Fractura acetabuli*, kann sowohl durch directe Gewalt, als auch durch Gegenschlag (durch Fall auf den Trochanter oder auf die Füße) zu Stande kommen. Richtung und Ausdehnung des Bruches sind sehr verschieden: bald ist es nur ein einfacher Sprung, bald sind die Körper der drei Knochen, welche in der Pfanne zusammenstossen, von einander getrennt (A. Cooper), bald ist der Boden der Pfanne abgelöst oder zerschmettert; der Oberschenkelkopf kann sogar durch die auf solche Weise entstandene Lücke in die Beckenhöhle eindringen (A. Cooper, Gama). Endlich kann bloss der Rand der Pfanne abbrechen, wodurch oft eine Verrenkung des Oberschenkels bedingt wird, die sich leicht, jedoch unter Crepitation, einrenken, aber sehr schwer zurückhalten lässt¹⁾.

Der Bruch des Bodens der Pfanne, bei welchem der Gelenkkopf in die Beckenhöhle eingedrungen ist, könnte mit einer Verrenkung des Oberschenkels verwechselt werden; aber die Beweglichkeit des letzteren, die Crepitation und das Fehlen einer Geschwulst, wie sie der verrenkte Oberschenkelkopf an der von ihm eingenommenen Stelle bilden müsste, sichern die Diagnose. Ausserdem wäre eine Verwechslung mit Schenkelhalsbrüchen oder mit Quetschung des Hüftgelenks möglich. Die Unterscheidung von ersteren wird bei den Fracturen des Femur erörtert werden. Von einer starken Quetschung

¹⁾ Vgl. unsere Beschreibung der „Luxatio femoris“ im folgd. Abschnitt.

kann man Pfannenbrüche, bei welchen Crepitation nicht entdeckt werden kann, mit Sicherheit nicht unterscheiden.

Die Prognose ist, abgesehen von Complicationen, nur dann übel, wenn der Gelenkkopf die Pfanne durchbohrt hat. Einfache Pfannenbrüche heilen in 2 bis 3 Monaten, gewöhnlich sogar ohne difformen Callus, der sonst die Bewegungen im Hüftgelenk sehr beeinträchtigen würde.

Behandlung. Von Reduction kann bei Pfannenbrüchen, sofern nicht zugleich Luxation besteht, niemals die Rede sein. Der Kranke wird auf eine geneigte Ebene gelagert, um die Muskeln des Oberschenkels zu erschaffen. Bei einem Bruch des Pfannenrandes mit Luxation des Oberschenkels ist permanente Extension in halbgebeugter und abducirter Lage des Beins nothwendig, um das Wiederausweichen des Schenkelkopfes zu verhüten.

c. Brüche der oberen Extremität.

1) Brüche des Schulterblatts.

Die grosse Beweglichkeit des Schulterblatts und seine Bedeckung durch dicke Muskeln schützen dasselbe vor der Einwirkung äusserer Gewalten. Brüche der Scapula sind daher im Allgemeinen selten (abgesehen von den Schussverletzungen, etwa 1 Procent aller Fracturen). Die oberflächlich gelegenen Theile, Acromion und unterer Winkel, brechen verhältnissmässig am Häufigsten, demnächst der Körper des Knochens und die Spina, am Seltensten Processus coracoides und Collum scapulae.

a) Brüche des Körpers der Scapula verlaufen bald longitudinal, bald quer, bald sind es Splitterbrüche. Sie entstehen stets durch directe Gewalt und sind daher immer mit bedeutender Quetschung, oft auch mit Wunden complicirt. Bei Schussfracturen können die Bruchsplitter erheblich dislocirt werden. Dringt die Kugel von Hinten ein, so können Splitter in die Lunge hinein und sogar durch die vordere Brustwand wieder hinausgetrieben werden (Pitha). Von Verschiebung durch Muskelzug kann kaum die Rede sein, da die breiten Muskeln, welche den Knochen auf beiden Seiten bedecken, an den Bruchstücken gleichmässig befestigt sind. Jedoch wird der untere Winkel, wenn er abgebrochen ist, durch den Serratus anticus major und den Latissimus dorsi nach Vorn gezogen. Diese Verschiebung macht einen diagnostischen Irrthum fast unmöglich. Bei den übrigen subcutanen Brüchen des Körpers der Scapula kann hingegen die

Diagnose zweifelhaft sein, besonders wenn, wegen bedeutender Geschwulst, Crepitation nicht zu fühlen ist. Mit der Behandlung verhält es sich umgekehrt: sie hat nur bei den Brüchen des unteren Winkels Schwierigkeit. Bei den übrigen nämlich genügt es, wenn man während der Heilung den Arm unbeweglich erhält, was sich leicht dadurch bewirken lässt, dass man ein Polster zwischen den Arm und den Thorax legt und den Arm am Thorax mit einer Binde befestigt. Ist dagegen der untere Winkel abgebrochen, so lässt sich das verschobene Bruchstück nicht wieder nach Hinten in seine normale Lage schieben. Man hat deshalb das obere Bruchstück, d. h. die übrige Scapula ihm zu nähern gesucht und zum Behuf der Retention in dieser Stellung die Hand der kranken Seite auf der gesunden Schulter befestigt. Desault legte zu diesem Behuf ein keilförmiges Kissen mit der Basis nach Unten zwischen Schulter und Arm und befestigte letztere mit einer Binde. Aber trotz dieses beschwerlichen Verbandes heilt der Bruch des unteren Winkels doch immer mit einiger Difformität. Da letztere unschädlich ist, so thut man gewiss besser, diese Fractur ganz so, wie die übrigen Brüche des Körpers des Schulterblatts zu behandeln, zugleich bestehende Quetschung, Wunden, Splitterung aber sorgfältig zu berücksichtigen. Abgelöste Knochenstücke sind zu entfernen, Abscesse, welche oft gegen die Achselhöhle hin ihren Weg nehmen, frühzeitig zu öffnen; bei bedeutender Eiterung zwischen Schulterblatt und Thorax ist durch Trepanation des ersteren dem Eiter ein directer Ausweg zu eröffnen.

b) **Brüche des Acromion** sind unter allen Fracturen der Scapula die häufigsten. Sie haben ihren Sitz an verschiedenen Stellen dieses Fortsatzes und sind gewöhnlich Querbrüche. Die an der Basis des Acromion vorkommenden Fracturen entstehen zuweilen durch Gegen Schlag; alle übrigen fast ausschliesslich durch directe Gewalt. Wenn das Acromion ganz abgebrochen ist, so wird das Schulterblatt durch das Gewicht des Arms und die Wirkung des Deltoides abwärts gezogen, der Kopf steht gegen die kranke Schulter hin geneigt, die Schulter ist abgeflacht. Man fühlt deutlich den durch das obere Bruch-Ende gebildeten Vorsprung und entdeckt Crepitation, wenn man den Oberarm aufwärts schiebt und das Acromion hinabdrückt. Die Prognose dieses Bruches ist weit weniger bedenklich, als die eines Bruches des Körpers der Scapula, weil er eine viel weniger heftige Gewalt voraussetzt als letzterer und daher bei Weitem seltener complicirt ist. Die Heilung erfolgt zuweilen durch Callus, gewöhnlich aber durch eine fibröse Zwischensubstanz, so dass eine Pseudarthrose entsteht, welche jedoch die Function der Schulter fast gar nicht be-

einträchtig. Die Behandlung der Brüche des Acromion beabsichtigt das untere Bruch-Ende zur normalen Höhe durch Emporschieben des Humerus zu erheben und in dieser Stellung unbeweglich zu erhalten. Hierzu genügt eine lange Binde, welche man von der gesunden Schulter aus mit mehreren Touren um den Ellenbogen der kranken Seite und demnächst in Zirkeltouren um den Thorax und Oberarm anlegt. Bei mageren Subjecten legt man zwischen den Arm und den Rumpf ein Kissen. Nach A. Cooper wird der beabsichtigte Zweck vollständiger erreicht, wenn man den Deltoides ausser Thätigkeit setzt. Zu diesem Behuf schiebt man ein keilförmiges Kissen, mit seiner Basis nach Unten gerichtet, zwischen Arm und Rumpf und befestigt ersteren daran mit einer Binde, während man durch eine Mitella für die Erhebung des Armes sorgt. Andere haben sich der bei Schlüsselbein-Brüchen empfohlenen complicirteren Verbände von Desault etc. bedient, welche jedoch, ohne mehr zu nützen, viel grössere Beschwerde machen.

c) **Brüche der Spina scapulae**, früher mehrfach bestritten, in neuester Zeit mit voller Entschiedenheit beobachtet¹⁾, entstehen immer durch directe Gewalt und sind bei der oberflächlichen Lage dieses Theils leicht zu erkennen. Das abgebrochene Stück ist beweglich und an der Bruchstelle besteht Schmerz, der durch Bewegungen, besonders Erhebung des Arms, und durch Berührung gesteigert wird. Gewöhnlich findet dabei eine stärkere Quetschung Statt, als bei Brüchen des Acromion. Einer mechanischen Behandlung bedarf es in der Regel nicht. Sollte man eine solche anwenden wollen, so müsste man eine graduirte Compresse in die Fossa supraspinata, eine andere in die Fossa infraspinata legen und beide durch Gypsbinden, die in Achtertouren um die Schulter laufen und sich auf dem kranken Schulterblatte kreuzen, befestigen.

d) Der **Processus coracoides** liegt zu sehr geschützt und versteckt, um häufig äusseren Gewalten ausgesetzt zu sein; er bricht höchst selten. Der Pectoralis minor, Biceps und Coraco-brachialis würden ihn abwärts ziehen, wenn nicht die gewöhnlich unverletzt bleibenden starken Ligamenta coraco-acrominale und coraco-claviculare eine solche Verschiebung hinderten. Besteht keine bedeutende Geschwulst, so kann man leicht die Beweglichkeit des abgebrochenen Fortsatzes und Crepitation entdecken. Bedenklich ist diese Fractur nur deshalb, weil sie eine bedeutende äussere Gewalt voraussetzt, welche immer zugleich eine heftige Quetschung bedingen muss. —

¹⁾ Vgl. Malgaigne in seiner Revue médico-chirurgicale 1852, Novbr.

er mechanische Theil der Behandlung beschränkt sich darauf, dass man die am Rabenschnabelfortsatz befestigten Muskeln in Erchlaffung versetzt. Man nähert den Arm mit gebeugtem Ellenbogengelenk dem Rumpf und befestigt ihn in dieser Stellung durch eine Citella.

e) **Brüche des Collum scapulae** entstehen durch Gegenschlag bei einem Fall auf die vorgestreckte Hand, auf den Ellenbogen oder die Schulter¹⁾. Ob sie wirklich so selten sind, wie man gewöhnlich annimmt, oder ob diese Annahme (wie A. Cooper vermuthet) darauf beruht, dass man sie häufig mit Verrenkungen im Schultergelenk verwechselt hat, ist noch unentschieden. Letzteres dürfte in neuester Zeit doch nicht leicht vorgekommen sein. Die Difformität, welche durch diesen Bruch bedingt wird, hat allerdings Aehnlichkeit mit der bei Schulter-Verrenkungen bestehenden. Das Gewicht des Arms zieht durch Vermittelung des Kapselbandes und des langen Kopfes des Biceps den abgebrochenen Gelenkfortsatz des Schulterblatts abwärts, während Pectoralis major, Teres major und Latissimus dorsi ihn gegen die Achselhöhle hin einwärts verschieben. Die Schulter erscheint daher abgeflacht; man findet dicht unter dem Acromion eine Vertiefung, die Achse des Arms ist schräg nach Unten und Aussen gerichtet, der Ellenbogen steht in einiger Entfernung vom Rumpf. Die Unterscheidung von einer Luxation ist jedoch sehr wohl möglich. Schon das schlaffe Herabhängen des Arms und die Möglichkeit den Ellenbogen dem Rumpf zu nähern und auch wieder weiter von ihm zu entfernen, stehen im Gegensatz zu den Erscheinungen bei der Verrenkung; auch fühlt man gewöhnlich in der Achselhöhle einen unregelmässigen Körper, welcher keine Aehnlichkeit mit der Gestalt des

¹⁾ Die Bruchlinie des gewöhnlichen Bruches des Schulterblatthalses verläuft nicht durch den in der Anatomie als „Collum scapulae“ beschriebenen Theil des Knochens, sondern an der inneren Seite (medianwärts) vom Rabenschnabelfortsatz, so dass letzterer also an dem abgebrochenen Stück sitzt und mit diesem bewegt werden kann. Vgl. Gurtt, Knochenbrüche, Theil II. pag. 537. — Nach Lotzbeck (Deutsche Klinik 1867, No. 46) kommen aber auch Brüche des anatomischen Halses der Scapula vor, welche sich durch die geringere Grösse des Bruchstücks, besonders aber dadurch unterscheiden, dass der Rabenschnabelfortsatz nicht mit dem abgebrochenen Gelenktheile des Schulterblatts zusammenhängt und den Bewegungen desselben nicht folgt. Letzteres würde freilich auch dann nicht der Fall sein, wenn dieser Fortsatz für sich abgebrochen wäre. — In dem einzigen genau untersuchten und von Gurtt l. c. abgebildeten Falle von Bruch des anatomischen Halses verlief übrigens die Bruchlinie in der Art schräg durch die Gelenkfläche, dass etwa $\frac{4}{5}$ der letzteren von dem übrigen Schulterblatt abgelöst waren.

Gelenkkopfs hat. Vor Allem aber sind die Ergebnisse eines Reductionsversuches charakteristisch. Die Reduction erfolgt nämlich bei diesem Bruche ohne alle Schwierigkeit, bei der Luxation mehr oder weniger schwierig; die Difförmität kehrt aber beim Bruch, auch nach der vollständigsten Reduction, sogleich wieder, wenn man den Arm sich selbst überlässt, bei der Luxation nicht, sobald die Reduction gelungen ist. Umfasst man nach der Reduction die Schulter mit der einen Hand und macht mit der anderen am Oberarm rotirende Bewegungen, so entsteht beim Bruch des Collum scapulae Crepitation. — Um die Reduction auszuführen, umfasst man den Oberarm dicht unter der Achselhöhle und zieht ihn stark auswärts, während man den Ellenbogen mit der anderen Hand gegen den Thorax drückt und aufwärts schiebt. Zur Retention dient, je nach der Beschaffenheit des Falles, entweder ein Verband, der dem Desault'schen Princip für die Behandlung der Clavicular-Brüche entspricht, oder einer der Verbände für den Bruch des Collum humeri, namentlich der von Port angegebene Gypsverband oder der Middeldorpf'sche Triangel. Zur Heilung sind, nach A. Cooper, 10 bis 12 Wochen erforderlich. Lange Zeit bleibt dann noch beträchtliche Steifigkeit im Schultergelenk zurück. Entsteht die Fractur, wie gewöhnlich, durch eine sehr heftige Gewalt, so können überdies die Folgen der Contusion gefährlich werden und eine besondere Behandlung erheischen.

2) Brüche des Schlüsselbeins.

Die oberflächliche Lage, die doppelte Krümmung und die Function des Schlüsselbeins, der ganzen oberen Extremität eine feste Stütze am Rumpfe zu gewähren, erklären hinlänglich die grosse Häufigkeit der Fracturen desselben¹⁾. Es nimmt auf der Frequenzscala der Knochenbrüche die vierte Stelle ein, mit etwa 15 Procent.

Die meisten Clavicularbrüche entstehen durch Gegenschlag, in Folge eines Falls auf die Schulter, den Ellenbogen oder die Hand, während der Arm vom Rumpfe entfernt oder vorgestreckt ist. Diese indirecten Fracturen haben gewöhnlich in der Mitte des Knochens ihren Sitz und verlaufen meist schräg. Durch direct einwirkende Gewalt veranlasste Brüche können an jeder beliebigen Stelle vorkommen und sind entweder Quer- oder Splitterbrüche. Entstehen Brüche durch Gegenschlag in Folge eines sehr gewaltsamen Stosses,

¹⁾ Sehr selten brechen beide Schlüsselbeine zugleich, wie ich einmal bei einer jungen Dame beobachtet habe, die vom Pferde zunächst mit der einen Schulter gegen einen Baum geschleudert worden und dann mit dem anderen Arm voraus auf die Erde gefallen war.

so erfolgt unmittelbar nach dem Brechen des Knochens eine beträchtliche Verschiebung der Bruch-Enden über einander (vgl. pag. 317). Selten kommt es hierbei zu Zerreiſſung der Haut oder der grossen Nerven und Gefässe. Gewöhnlich sind Brüche durch Gegenschlag einfach, die durch directe Gewalt bedingten dagegen oft mit heftiger Contusion, Zerreiſſung der Haut, selten mit Verletzung des Plexus brachialis oder der Vasa subclavia complicirt¹⁾. Höchst selten dringt ein zackiges Bruchstück der Clavicula in den über die erste Rippe emporragenden Theil des Pleurasackes und verletzt die Lunge²⁾.

Die Schlüsselbeinbrüche sind wesentlich verschieden, je nachdem sie an der inneren oder an der äusseren Seite des Ligamentum coraco-claviculare bestehen. Bei letzteren werden die Bruch-Enden durch genanntes Band und durch den Processus coracoides in der normalen Stellung erhalten, und es entsteht entweder gar keine oder doch nur unbedeutende Verschiebung nach der Dicke des Knochens³⁾; die Bewegungen des Armes sind nicht gestört. Bricht dagegen die Clavicula zwischen dem Ligam. coraco-claviculare und dem Brustbeine, so wird das äussere Bruchstück durch das Gewicht des Armes, der an ihm durch den Deltoides befestigt ist, abwärts und demnächst durch die Mm. pectoralis major, teres major und latissimus dorsi nach Innen, folglich unter das innere Bruchstück gezogen. Das weiter fortwirkende Gewicht des Armes zieht das Acromial-Ende immer weiter abwärts, so dass dem äusseren Bruchstück eine schräge Richtung aufwärts und einwärts ertheilt wird. Das äussere Bruch-Ende wird somit in dreifacher Weise verschoben; 1) ad latus, abwärts, 2) ad longitudinem, einwärts, 3) ad directionem, in einem nach Unten offenen, stumpfen Winkel gegen das innere Bruchstück, welches letztere entweder gar keine Verschiebung erfährt, oder durch den Sternocleido-

¹⁾ Diese Complicationen finden sich fast nur bei Schussfracturen, welche aber anderer Seits auch ganz einfach, sogar ohne Splitterung vorkommen.

²⁾ Aus mündlicher Mittheilung von Prof. Rühle kenne ich einen solchen Fall, in welchem gleich nach der Verletzung sich bedeutendes Emphysem entwickelte, ohne dass eine Rippe gebrochen war.

³⁾ Verschiebung ad latus bei Bruch der Clavicula zwischen dem Ligamentum coraco-claviculare und dem Acromion beschrieb Guéretin. Es war ein Bruch durch Gegenschlag, genau dem inneren Bande des Processus coracoides entsprechend. Das äussere Bruchstück, vom Processus coracoides unterstützt, war nicht verschoben, das innere dagegen durch die Wirkung des Pectoralis major und des vorderen Theils des Deltoides um zwei Linien abwärts gerückt. — Ich habe sogar viel stärkere Verschiebung des inneren Bruchstücks beobachtet. — Auch Pitha gedenkt solcher Fälle.

mastoideus und die Hebelwirkung des elastischen Ligamentum interclaviculare etwas emporgezogen wird.

Die **Diagnose** ist gewöhnlich leicht. Handelt es sich um einen Bruch in der Mitte (an der vorderen Convexität) des Schlüsselbeins, so findet man, nach einem Fall auf Schulter, Ellenbogen, oder Hand, den Arm wie gelähmt herabhängend, nach Innen rotirt, mit der gesunden Hand sorgfältig unterstützt; Kopf und Rumpf nach der Seite der Fractur geneigt. Der Arm kann weder nach Vorn gebracht, noch erhoben, insbesondere die Hand nicht bis auf den Kopf gebracht werden¹⁾. Die kranke Schulter steht ein wenig tiefer und der Mittellinie des Körpers näher. Das innere Bruch-Ende macht unter der Haut einen deutlichen Vorsprung. Verläuft der Bruch schräg von Oben und Innen nach Unten und Aussen, so wird die Haut durch das äussere Bruch-Ende erhoben und die schräge Stellung des letzteren (vgl. oben) ist sehr viel deutlicher. Das äussere Bruch-Ende ist sehr beweglich, das innere nur wenig. Wenn man die Dislocation in der sogleich anzugebenden Weise beseitigt und demnächst die Bruch-Enden gegen einander bewegt, so vernimmt man deutlich Crepitation. — Bei incompletten Brüchen bemerkt man eine schmerzhaft hervorstechende Hervorragung, eine Vermehrung der vorderen Convexität des Schlüsselbeins; aber Beweglichkeit und Crepitation fehlen gänzlich.

Ist die Fractur absichtlich verheimlicht worden oder unbeachtet geblieben, so kann nicht bloss bei incompletten, sondern auch bei vollständigen Brüchen die Callus-Geschwulst für ein Pseudoplasma (namentlich Enchondrom) gehalten werden. Wird die Anamnese genau festgestellt, so klärt sich der Irrthum auf. Ich kenne mehrere Fälle der Art bei Knaben von 8—10 Jahren.

Bei Brüchen, welche nach Aussen vom Ligament. coraco-claviculare liegen, findet sich in der Regel weder Difformität, noch Funktionsstörung²⁾. Bei genauerer Untersuchung aber lässt sich nicht bloss lebhafter Schmerz an der Bruchstelle, sondern auch einige Beweglichkeit der Bruch-Enden und zuweilen Crepitation entdecken.

Prognose. Lebensgefährlich werden Schlüsselbein-Brüche nur

¹⁾ Alle diese Angaben beziehen sich nur auf die Fractur des Schlüsselbeins zwischen dem Lig. coraco-claviculare und der Articul. sternoclavicularis und sind, wegen der keineswegs seltenen Variationen der Richtung des Bruches, nicht so allgemein gültig, wie man seit Desault glaubt. Es kommen sogar Fälle vor, in denen die Verletzten, trotz eines vollständigen Bruches in der Mitte des Schlüsselbeins, den Arm in jeder Richtung zu erheben vermögen, wie ich selbst beobachtet habe.

²⁾ In Betreff der Ausnahmen vgl. die Note zu pag. 405.

durch besondere Complicationen. Einfache Brüche der Clavicula heilen sogar ohne Kunsthülfe, freilich mit einer mehr oder weniger bedeutenden Difformität. Letztere lässt sich auch bei der sorgfältigsten Behandlung oft nicht ganz vermeiden, kann aber mit der Zeit verschwinden, besonders wenn der Bruch im kindlichen Alter sich ereignete. Brüche am Acromial-Ende, nach Aussen vom Lig. coracoclaviculare, heilen auch ohne mechanische Hülfe gewöhnlich ohne Difformität. — Die Heilung erfolgt in etwa 4 Wochen.

Behandlung. Zum Behuf der Reduction fasst man entweder, hinter dem Verletzten stehend, beide Schultern und zieht sie kräftig nach Hinten, wobei nöthigen Falls das Knie als Widerhalt gegen den Rücken des Patienten gestemmt wird; oder man lässt die Contra-Extension am anderen Arme durch einen Gehülften ausüben und zieht mit der einen Hand das obere Ende des Humerus vom Rumpf ab, während man mit der anderen den Ellenbogen gegen den Rumpf und zugleich aufwärts drängt.

Für die Retention der Schlüsselbeinbrüche sind von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten die verschiedenartigsten Verbände in Anwendung gebracht worden, indem man, den oben (pag. 405) angeführten Verschiebungen des äusseren Bruchstücks entsprechend, bald die Schultern nach Hinten zu ziehen oder auch durch besondere Maschinen nach Hinten zu drücken, bald die kranke Schulter zu heben und nach Vorn zu drängen, bald auch blos die Schulter zu heben oder aber zugleich, den Arm als Hebel benutzend, am Acromial-Ende der Clavicula eine permanente Extension auszuüben sich bestrebte.

Hippokrates glaubte, dass es ausreichend sei, die Schulter blos nach Hinten und Aussen zu ziehen. Deshalb lagerte er den Kranken so, dass nur der mittlere Theil des Rückens unterstützt wurde, die Schultern nicht, welche daher durch ihr eigenes Gewicht nach Hinten und Aussen fielen. Aehnlich verfuhr in neuester Zeit Robert (in Paris). Paul von Aegina liess ausserdem unter die Achselhöhle eine starke wollene Pelotte legen. In derselben Absicht legte Guy de Chauliac eine starke Binde in Achtertouren um beide Schultern, welcher Verband lange Zeit der herrschende war. Petit suchte ihn fester und wirksamer zu machen, indem er die um die Schultern laufenden Ringe der Achtertouren mit einem starken Bande quer über den Rücken nochmals zusammenzog. Brünninghausen, Evers, Hofer, Cooper u. A. legten auf den Rücken ein viereckiges Kissen, gegen welches die Schultern mittelst gepolsterter Riemen nach Hinten gezogen wurden. Auf dieselbe Weise wirken das „eiserne Kreuz“ von Heister, die Brasdor'sche „Schnürbrust“, der Verband von

Brefeld. Alle diese Verbände sind unzureichend gegen die Dislocatio ad latus und ad directionem.

Schon Galen und 15 Jahrhunderte später Benjamin Bell haben die Nothwendigkeit erkannt, das äussere Bruchstück zu gleicher Höhe mit dem inneren zu erheben. Desault hat zuerst allen drei Richtungen der Dislocation zugleich entgegen zu wirken gesucht. Sein noch jetzt vielfach genannter, seltener angewandter Verband wird in folgender Weise angelegt. Ein keilförmiges Kissen wird, mit der Basis nach Oben, unter der Achselhöhle der kranken Seite mittelst einer um die gesunde Schulter geführten Binde befestigt. Der Wundarzt fasst hierauf den Ellenbogen, nähert ihn dem Rumpf und schiebt ihn zugleich nach Vorn. Das Oberarmbein wirkt solcher Gestalt als zweiarmiger Hebel; sein stark nach Aussen gedrängtes oberes Ende übt an dem äusseren Bruchstücke der Clavicula eine Extension aus, und indem man den Arm durch einen Druck am Ellenbogen aufwärts schiebt, wird dasselbe zur gleichen Höhe mit dem inneren erhoben. Zum Behuf der Retention bedient man sich zweier langen Binden, deren eine in horizontalen Touren den Arm und den Rumpf umfasst und den Ellenbogen genau an die Brust angedrückt hält, während die andere in schräg verlaufenden Touren von der gesunden Schulter unter dem Ellenbogen der kranken Seite hinweg und zur gesunden Schulter zurücksteigt, wodurch der Arm und mithin auch das äussere Bruch-Ende aufwärts gedrängt wird. Für das Anlegen der letzteren Binde gab Desault folgende Vorschrift. Man beginnt von der Achselhöhle der gesunden Seite, führt die Binde schräg über die Brust zur kranken Schulter und an der hinteren Seite des Oberarms abwärts unter den Ellenbogen der kranken Seite, steigt dann schräg über die Brust aufwärts zur gesunden Achselhöhle, von wo man ausgegangen war, demnächst schräg über den Rücken zur kranken Schulter und von dieser an der vorderen Seite des Oberarms gerade abwärts um den Ellenbogen der fracturirten Seite und über den Rücken zu dem ursprünglichen Ausgangspunkte zurück, — und so wieder von Vorn. Diese complicirten Touren sind weit entfernt, dem Verbande grössere Haltbarkeit zu geben; derselbe lockert sich ungemein leicht, ist daher, wenn ihn der Patient nicht sorgfältig überwacht, selbst bei Anwendung von Klebemitteln, sehr unzuverlässig, überdies bei Personen mit vollen Brüsten und bei Kindern und Brustkranken gar nicht anzuwenden und immer, auch bei kräftigen Männern, sehr beschwerlich. Diese Uebelstände haben zu vielfachen Modificationen des Desault'schen Verbandes geführt, von denen wir nur die hauptsächlichsten hervorheben.

Boyer wandte statt des aus alter Leinwand angefertigten, festen Desault'schen Kissens ein mit Watte ausgestopftes Keilkissen an, um die Achselhöhle einem weniger heftigen Drucke auszusetzen; dies Kissen erwies sich aber bald als zu nachgiebig. Ricord hat statt dessen ein Luftkissen aus vulkanisirtem Kautschuck vorgeschlagen. An die Stelle der ersten Bindenlage, durch welche Desault bloss das Kissen am Thorax zu befestigen beabsichtigte, setzte Boyer zwei Bänder, die über der gesunden Schulter zusammengeknüpft wurden. Delpech befestigte dasselbe an eine Art Weste. Dupuytren ersetzte die dritte Lage der Desault'schen Bidentouren durch einfachere schräg laufende, von der gesunden Schulter über den Rücken, unter dem Ellenbogen der kranken Seite hindurch und wieder zurück zur gesunden Schulter. Boyer liess statt der Binden ein breites ledernes Armband um den Arm schnallen, welches anderer Seits an einem breiten Leibgurte festgeschnallt wurde. Delpech erzielte eine noch grössere Sicherheit und Festigkeit durch eine aus festem Leder gemachte Schleuder: ein breiter gepolsterter Riemen läuft um den Oberarm dicht über dem Ellenbogengelenk und um den Thorax, ein zweiter um den Vorderarm in der Nähe des Ellenbogens und von da zur gesunden Schulter; da wo sich die beiden Riemen kreuzen, sind sie an einander festgenäht. Durch diese mittelst Schnallen mehr oder weniger fest anzuziehenden Riemen wird der Arm in der beabsichtigten Stellung in der That sicherer als durch den Desault'schen Verband erhalten. Mayor empfiehlt statt der Riemen zusammengelegte Tücher anzuwenden und hält das dreieckige Kissen für überflüssig.

Velpeau¹⁾ rath, die Hand der kranken Seite auf die gesunde Schulter zu legen, so dass der Ellenbogen vor dem Schwertfortsatz zu stehen kommt, und den Arm in dieser Stellung durch festzuklebende Binden zu fixiren (vgl. Fig. 35). Hierbei wird kein Kissen in die Achselhöhle gelegt; der Humerus wirkt als einarmiger Hebel.

Nach der Vorschrift von Velpeau, soll man mit dem Bindenkopfe unter der Achsel der gesunden Seite beginnen, über den Rücken zur Schulter der verletzten Seite gehen, dann über die vordere und äussere Fläche des Oberarms herab zum Ellenbogen und wieder unter die Achsel der gesunden Seite; diese Gänge werden vier bis fünf Mal wiederholt und durch Cirkeltouren gedeckt, welche den Arm und den Thorax umkreisen und über welche schliesslich noch ein die Ellenbogenspitze umfassender Gang der ersteren Art gelegt werden kann. — Die Bindengänge liegen besser, wenn man die über die Schulter laufenden Touren mit Cirkeltouren um den Thorax alterniren lässt, wobei es sich fast von selbst macht, dass man beim Uebergang von der absteigenden Tour zur Cirkeltour den Bindenkopf in der Art umwendet, dass die

¹⁾ Médecine opératoire. Paris 1839, Tom. I. pag. 229.

Fig. 35.



vordere Fläche der Binde zur hinteren wird. — Die Wirksamkeit dieses Verbandes ist grösser und die Unbequemlichkeit viel geringer, als man auf den ersten Blick glauben sollte.

Der Desault'sche Verband ist im Princip unzweifelhaft der richtigste. Aber er ist, selbst wenn man die pag. 409 angegebenen Modificationen benutzt, schwer zu überwachen und schwer zu ertragen. Auch die Feststellung des Kopfes schräg nach der kranken Seite hin, um die Portio clavicularis des Kopfnickers zu erschaffen und dadurch Verschiebung des inneren Bruch-Endes zu verhüten, ist von geringer Wirksamkeit und wird bald unerträglich. Die Befestigung des ganzen Verbandes durch Nähte oder Klebemittel, namentlich durch Gyps erhöht und sichert seine Wirksamkeit, vermindert aber nicht die Beschwerlichkeit.

Für das Anlegen des Gypsverbandes gab Szymanowski¹⁾ folgende Vorschrift. Um die gesunde Schulter wird ein aus einem Tuch gebildeter hinreichend weiter Ring gelegt. Gegen diesen wird die kranke Schulter durch, über den Rücken hin und zurück laufende Gypsbinden, angezogen. Der im rechten Winkel flectirte Vorderarm und die Hand

¹⁾ Der Gypsverband etc., St. Petersburg 1857.

werden durch Bindenstreifen wie in einer Mitella befestigt, der ganze Verband aber und namentlich die kranke Schulter werden schliesslich durch einen im Genick sich anschmiegenden und von da am kranken Arm abwärts steigenden Gypskragen befestigt, dessen einzelne Lagen aus einem grossen Stück Zeug zurecht geschnitten werden.

Da die grossen Beschwerden aller bisher erfundenen Verbände nicht gezeugnet werden können und überdies die Difformität durch dieselben (wenn überhaupt Neigung zur Verschiebung besteht) nur selten vermieden wird, erscheint es gerechtfertigt, wenn man dem schon von Larrey angenommenen Rathe Flajani's und Pelletan's folgt, überhaupt gar keinen Verband anzulegen, sondern den Kranken 2—3 Wochen ruhig im Bett liegen und hierbei den Arm auf einem Kissen so lagern zu lassen, dass der Ellenbogen höher liegt, als die Schulter. Will oder kann der Kranke nicht ruhig liegen, so wird, wenn man durch eine genau angelegte Mitella (vgl. Bd. I. pag. 148) das Herabsinken der kranken Schulter verhütet, eine ebenso gute Heilung erzielt, wie durch die complicirten Verbände, — freilich immer mit Difformität; aber diese ist meist unerheblich und stets unschädlich.

Bei unruhigen und unzuverlässigen Kranken legt man statt der Mitella zweckmässig den von Wernher angegebenen Verband an. Man lässt den Kranken ein Camisol oder eine Weste (welche die Bruchstelle frei lassen) anziehen, und näht dies Kleidungsstück fest zu. Der Vorderarm wird spitzwinklig gebeugt und durch ein rings um die Brust geführtes Handtuch befestigt. Nachdem der Bruch eingerichtet ist, wird das Tuch dicht um den Arm straff angezogen und in der Art an die Weste angenäht, dass der Arm keinerlei Bewegungen machen kann.

Hat die Fractur ihren Sitz zwischen dem Ligam. coracoclaviculare und dem Acromion, so genügt es in der Regel, wenn man den Arm schonen und durch eine Mitella unterstützen lässt. Bei Verschiebung des inneren Bruch-Endes nach Unten müsste man besonders den Pectoralis major und die vordere Portion des Deltoides zu erschlaffen suchen, zu welchem Behuf die von Velpeau angegebene Stellung (Fig. 35) die zweckmässigste sein würde.

Bei complicirten Fracturen des Schlüsselbeins und namentlich bei Schussverletzungen ist die ruhige Lage doppelt dringend geboten, zumal mit Rücksicht auf mögliche Nachblutungen.

3) Brüche des Oberarmbeins.

Das Oberarmbein bricht kaum halb so häufig als das Schlüsselbein. Der Bruch kann sich bald in seinem oberen Ende Fig. 36 a, bald in seinem unteren c, bald endlich in seinem Mittelstück b ereignen.

Fig. 36.



A. Bruch des Mittelstücks des Oberarmbeins.

Entstehungsart. Die Diaphyse des Humerus bricht am Häufigsten in ihrem mittleren Theile, gewöhnlich in Folge einer direct einwirkenden äusseren Gewalt; jedoch sind auch einige Fälle bekannt, in denen ein solcher Bruch durch Muskelgewalt zu Stande kam.

Gerade am Humerus sind Fracturen durch willkürliche Muskelaction am Häufigsten beobachtet worden. Mit Ausschluss der Fälle, in welchen der Knochen bereits krank war (vgl. pag. 321), fand Gurlt unter fünf und achtzig Fracturen durch Muskelzug sieben und fünfzig, welche den Oberarm betrafen. Mehr als die Hälfte dieser Oberarmbrüche durch Muskelaction verdanken ihre Entstehung dem kräftigen Fortwerfen (Schleudern) eines Steines, Balles oder dgl. Sie kamen ausschliesslich bei jugendlichen Individuen von starkem Körperbau vor und lassen sich wohl in folgender Weise erklären. Die gewaltsame Bewegung, in welche die Hand zum Behuf des Fortschleuderns des von ihr gefassten Gegenstandes versetzt wird, theilt sich derselben erst durch Vermittelung des ganzen Armes mit, dessen Muskeln in diesem Augenblick, namentlich im Bereich des Oberarms, sämmtlich gespannt sind. Somit wirkt am Humerus im Augenblick des Schleuderns die ganze Länge des Arms bis zur Insertion des Deltamuskels nach Art eines Hebels, so dass derselbe, wenn er biegsam wäre, nahe unter dieser Stelle sich nach Vorn biegen müsste. Statt dieser Biegung erfolgt an dem starren Knochen das Zerbrechen, gerade so, wie an einem dünnen Stock, der bei einem kräftigen Hiebe durch die Luft, dicht an der Hand abbricht. Dem Stocke wird durch die Hand, dem Oberarm durch die im Bereich der Tubercula angehefteten Muskeln die Bewegung mitgetheilt. (Unter den von Gurlt zusammengestellten 28 Fällen, welche vorstehende, zuerst von Double gegebene Erklärung zulassen, ist ein von Vidal beobachteter, in welchem die Fractur bei einem gesunden Menschen gleichfalls durch das Schleudern eines Steines veranlasst wurde, nicht mitaufgeführt.) — Beim Fechten, Ringen und ähnlichen Anstrengungen sind gleichfalls, obschon seltener, Oberarm-Brüche durch Muskelzug beobachtet worden.

Die Verschiebung der Bruch-Enden ist verschieden, je nach der Richtung und der Stelle des Bruches. Besonders leicht entsteht sie bei Schrägbrüchen. Jedoch sind Querbrüche mit geringfügiger Dislocation viel häufiger. Sitzt der Bruch unterhalb der Insertion des Deltamuskels, so kommt oft keine bedeutende Verschiebung zu Stande, weil der Brachialis internus und der Triceps die Bruch-Enden gleichmässig umfassen. Es kann aber auch das obere Bruch-Ende durch den Deltoides nach Vorn und Aussen, das untere nach Hinten und Oben durch den Triceps verschoben werden. Befindet sich die Bruchstelle oberhalb der Insertion des Deltamuskels, so wird das untere Bruch-Ende durch denselben nach Aussen, das obere durch Pectoralis major, Teres major und Latissimus dorsi nach Innen gezogen.

mit Ausnahme der sehr seltenen Fälle, in denen Einkerbung beobachtet (Liston), ist die **Diagnose** leicht. Man findet Difformität, abnorme Beweglichkeit, Crepitation und fixen Schmerz an der Stelle der Verletzung nebst mehr oder weniger vollständiger Unfähigkeit zu aktiven Bewegungen des Arms.

Abgesehen von Complicationen ist die **Prognose** gut. Bei mässiger Behandlung erfolgt die Heilung in etwa 6 Wochen, — Pseudarthrosen an dieser Stelle relativ häufig beobachtet erklärt sich wohl daraus, dass man bei geringfügiger Verschiebung den Bruch übersehen oder nicht genügend behandelt hat.

Behandlung. Je nach dem Grade der Verschiebung und der Richtung der Verschiebung, wählte man früher entweder den gewöhnlichen Schienenverband an, oder befestigte den Humerus am Thorax, indem man diesen als Schiene benutzte und zwischen ihn und den Brustkorb ein Polster legte. Die Zahl und Anordnung der Schienen sind vielfältig modificirt worden. Jedenfalls vermeidet man, den Arm der Art. brachialis mit einer Schiene zu belasten. Unter allen Methoden ist auch bei einfachen Brüchen die halbgebeugte Stellung des Ellenbogengelenks zu empfehlen, theils zur Erschlaffung der Muskeln, theils um Steifigkeit im Ellenbogengelenk zu verhüten, oder sie wenigstens in einer Stellung eintreten zu lassen, durch welche die Bewegbarkeit des Arms in möglichst geringem Grade beeinträchtigt wird. Um die Vortheile der halbgebeugten Lage mit der permanenten Fixation zu verbinden, hat Middeldorpf, nach Analogie des Cooperschen Planum inclinatum (für Fractura femoris), den Triangelverband construirt. Man lässt drei schmale Brettchen in der Weise aneinandersetzen, dass eines dem Oberarm von der Achselhöhle bis zur Handfläche, das zweite dem Vorderarm sammt der Hand an Länge entspricht, während das dritte die, nach stumpfwinkliger Zusammenfügung der beiden ersten noch offenbleibende Seite des Dreiecks bildet. Diese dritte Seite kommt an den Thorax zu liegen (bis zum Becken hinab), und Oberarm und Vorderarm auf den beiden anderen Brettchen, die durch vorgängiger Polsterung, ihren Platz finden¹⁾. Durch breite, gepolsterte Gurte, deren Wirkung man durch eine Spica ascendens unterstützen kann, wird der Triangel auf der Brust gesichert und um den Thorax befestigt. Nach Einrichtung des Verbandes befestigt man dann den von Unten auf mit einer Flanellbinde

¹⁾ Statt aus Brettchen kann man den Triangel auch aus Blech oder aus (concaven) Holzschienen construiren. Vgl. Middeldorpf, l. c., und A. Preu, De fracturis humeri et eorum cura. Dissert. inaug. Vratislaviae 1860.

umwickelten, nöthigen Falls auch mit Seitenschiene versehenen Arm auf den beiden äusseren Brettern.

Der Gyps-Verband macht für die grosse Mehrzahl der Fälle sowohl diese sinnreiche Vorrichtung (von der ich selbst die schönsten Erfolge gesehen habe), als auch die älteren, zum Theil sehr lästigen, Verbandmethoden überflüssig.

Glauht man, namentlich bei complicirten Brüchen, mit dem gefensternten Gyps-Verbande nicht auskommen zu können, so verdient der Middeldorpf'sche Triangel den Vorzug vor anderen Verbänden. Jedoch wird in solchen Fällen (zumal bei Schussverletzungen) wenigstens in der ersten Zeit ruhige Lage im Bett meist erforderlich sein, wo dann ein entsprechend gestaltetes dickes Spreukissen, welches zwischen den Thorax und den an diesem befestigten Arm eingeschoben wird, vollständig ausreicht (Stromeyer).

B. Brüche am oberen Ende des Humerus.

Anatomische Verhältnisse. Man unterscheidet die Brüche am oberen Ende des Humerus in solche, die unterhalb der Tubercula ihren Sitz haben, Brüche des chirurgischen Halses (Fig. 36 a), ferner solche, welche die Tubercula betreffen, und endlich Brüche des anatomischen Halses und des Oberarmkopfes selbst.

Bei dem Bruch des chirurgischen Halses fehlt zuweilen jede Verschiebung, oder sie ist doch sehr gering; in anderen Fällen wird das obere Bruch-Ende durch die *Mm. supra- und infraspinatus* in der Art verschoben, dass seine untere Fläche sich nach Aussen und Vorn wendet, während das untere Bruchstück durch *Pectoralis major*, *Teres major* und *Latissimus dorsi* nach Innen, durch die übrigen vom Schultergerüst zum Arm verlaufenden Muskeln aufwärts gezogen wird. Diese erheblichen Schwankungen der Dislocation sind davon abhängig, ob die Bruchstücke noch von dem unversehrt gebliebenen Periost und den Ausbreitungen der Faserkapsel in Zusammenhang gehalten werden, oder nicht. Häufig kommt Einkeilung des unteren Bruchstücks in das obere vor, — gewöhnlich in der Art, dass der innere Umfang des Schaftes vorzugsweise in die Medullarsubstanz des Gelenk-Endes eingedrungen ist, wobei die Verschiebung sehr unbedeutend sein kann.

Selten ist ein Bruch des chirurgischen Halses mit Luxation des oberen Bruchstücks complicirt. Letzteres tritt dann unter den *Pectoralis major*; die Bruchfläche des unteren Bruch-Endes rückt an die Gelenkfläche der Scapula.

Bei Splitterbrüchen des oberen Endes des Humerus setzt sich die Splitterung in jugendlichen Individuen fast niemals über die Epiphysenlinie fort (vgl. Bd. IV.).

Die traumatische Ablösung der oberen Epiphyse des Humerus verhält sich ähnlich, wie ein Bruch des chirurgischen Halses.

Beim Bruch quer durch die Tubercula kommt es nicht zu bedeutender Verschiebung, weil die starken Sehnenansätze des Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor und Subscapularis, sowie die mit ihnen zusammenhängenden Theile der Gelenkkapsel die Bruch-Enden genau an einander befestigen.

Selten kommen Brüche der Tubercula ohne Betheiligung des übrigen Knochens (ohne Unterbrechung seiner Längsaxe) vor. Am Seltensten findet sich wohl ein isolirter Bruch des Tuberculum minus, dessen Symptome am Lebenden noch gar nicht beschrieben sind¹⁾. Bei einem Bruch des Tuberculum majus an seiner Basis wird dasselbe durch die daran befestigten Muskeln (Supra- und Infraspinatus und Teres minor) aufwärts und nach Aussen gezogen, sofern deren sehnige Ausbreitungen in die Gelenkkapsel nicht hinreichend Widerstand leisten. Jedenfalls wird der Humerus, der Einwirkung der gedachten Muskeln entzogen, nach Innen rotirt und die Bruchfläche des unteren Bruch-Endes stark aufwärts und nach Innen geschoben, so dass selbst Durchbohrung der Kapsel dadurch erfolgen kann. Das Tuberculum wird unter dem Acromion, der Gelenkkopf in der Nähe des Processus coracoideus gefühlt. Ist nur ein Stück des Tuberculum majus abgebrochen, so fehlt jede Verschiebung.

Wenn der Gelenkkopf des Humerus von dem übrigen Knochen getrennt ist — Bruch des anatomischen Halses, Intracapsularbruch —, so kann das untere Bruchstück durch Deltoideus, Supra- und Infra-spinatus ein wenig aufwärts und nach Aussen geschoben werden; jedoch ist die Verschiebung immer sehr gering. Der Gelenkkopf liegt entweder frei, höchstens durch ein wenig Bandmasse gehalten, in der Gelenkkapsel, oder er hat dieselbe verlassen, indem sie beim Zustandekommen des Bruches (wahrscheinlich schon vorher) zerriss. Im letzteren Falle besteht Complication des Intracapsularbruchs mit Luxation des Gelenkkopfes bald in dieser, bald in jener Richtung, so dass derselbe an verschiedenen Stellen in der Umgegend des Gelenks gefunden werden kann. — Der Bruch des anatomischen

¹⁾ Vgl. Thudichum, Die am oberen Ende des Humerus vorkommenden Knochenbrüche, Giessen 1851, eine durch schöne Holzschnitte ausgezeichnete, sehr genaue Darstellung aller hier in Betracht kommenden Verhältnisse.

Halses kann aber auch mit Einkeilung des Gelenkkopfs in die spongiöse Substanz des unteren Bruch-Endes (zwischen die Tubercula) verbunden sein. Besteht eine solche in irgend erheblichem Grade, so hat sie ein Absprengen beider Tubercula oder doch des Tuberculum majus zur Folge. Die abgebrochenen Tubercula hängen dann weder mit dem Kopfe, noch mit dem Schafte des Knochens irgendwie zusammen, während der Zusammenhang zwischen Kopf und Schaft durch die Einkeilung in sehr vollständiger Weise hergestellt sein kann. Die Einkeilung vermag auch ohne Absprengung der Tubercula einen so hohen Grad zu erreichen, dass die Oberfläche des Gelenkkopfes tiefer steht als die Spitze des Tuberculum majus.

**Schematische Uebersicht der Brüche am oberen Ende des Humerus,
nach Thudichum (l. c.).**

I. Bruch des anatomischen Halses.

A. Intracapsular-Bruch ohne Einkeilung.

a) Einfacher Intracapsular-Bruch. Der Gelenkkopf liegt frei oder durch wenig Bandmasse gehalten in der Kapsel.

b) Intracapsular-Bruch mit Dislocation (Luxation) des Kopfes.

B. Intracapsular-Bruch mit Einkeilung.

a) Einfacher Intracapsular-Bruch mit Einkeilung. Der Kopf ist in die spongiöse Substanz zwischen den Tuberkeln eingetrieben und abgeplattet.

b) Complication mit Bruch der Tubercula (beider oder bloß des grösseren).

II. Fractur des Tuberculum majus.

III. Fractur des Tuberculum minus.

IV. Trennung der Epiphyse von dem Schafte.

A. Loslösung der Epiphyse.

B. Bruch durch die Vereinigungslinie der Epiphyse.

V. Bruch des chirurgischen Halses.

A. Extracapsular-Bruch ohne Einkeilung.

a) Einfacher Extracapsular-Bruch.

b) Extracapsular-Bruch mit Luxation des Gelenkkopfes.

B. Extracapsular-Bruch mit Einkeilung. Das untere Bruch-Ende ist ganz oder mit einem Theile seines Umfanges, meist dem inneren, in den Gelenk-Kopf (resp. -Hals) eingeeilt.

Heilung. Der Bruch des chirurgischen Halses (Extracapsularbruch) heilt wie alle anderen Knochenbrüche durch Callus. Auch bei einem Sternbruch des Gelenkkopfes, bei welchem alle einzelnen Bruchstücke mit dem ausserhalb der Gelenkkapsel gelegenen Theile des Knochens in Zusammenhang geblieben sind, kann vollständige Callusbildung erfolgen. Wenn aber durch einen Bruch des anatomischen Halses der Gelenkkopf von dem übrigen Knoche-

getrennt ist, so erfolgt die Heilung durch Callus nicht, weil der abgebrochene Gelenkkopf nicht in der gehörigen Stellung fixirt werden kann und einer ausreichenden Blutzufuhr entbehrt. Alsdann bildet sich entweder eine fibröse Zwischensubstanz, eine Pseudarthrose, bei welcher der (in der Gelenkhöhle zuweilen unbeweglich befestigte) Gelenkkopf, halbkugelförmig ausgehöhlt, auf dem oberen Ende des Humerus aufsitzt; oder der Gelenkkopf wird von unten her durch stalaktitenförmige Knochenwucherungen umfasst. Bestände gar kein Zusammenhang mehr zwischen dem abgelösten Gelenkkopfe und dem übrigen Knochen, so wäre Nekrose mit nachfolgender Eiterung und Durchbruch der Gelenkkapsel zu erwarten. Jedoch ist dies bei einfachen Brüchen noch nicht beobachtet.

Bei allen Brüchen des Oberarmhalses mit Einkeilung erfolgt Heilung durch Callus, aber mit Verkürzung des Armes und mit dauernd zurückbleibender Functionsstörung.

Die **Veranlassungen** der Brüche am oberen Ende des Humerus sind fast immer *directe* Gewalten. Daher die Häufigkeit der Complication mit bedeutender Quetschung. Jedoch kann auch ein Fall auf die Hand oder auf den Ellenbogen, ein Zug am Arme, ja sogar Muskelzug einen solchen Bruch herbeiführen, wengleich sehr viel seltener, als unterhalb der Insertion des Deltoides. — Epiphysenlösung ist wiederholt in Folge gewaltsamer Eingriffe bei der Entbindung (beim sogen. Lösen der Arme), freilich aber auch auf Grund anderweitiger Gewalteinwirkungen vorgekommen.

Diagnose. Beim Bruch durch die Tubercula, ferner beim Bruch des anatomischen Halses und des Gelenkkopfes selbst besteht fast gar keine Difformität. Die Schulter hat oft ihre normale Gestalt, und der Verdacht einer Fractur wird nur durch die Schmerzhaftigkeit und die Unmöglichkeit von Bewegungen herbeigeführt. Diese subjectiven Zeichen haben wenig Werth, da sie in gleicher Weise bei blosser Contusion der Schulter bestehen können. Erst die Crepitation beseitigt alle Zweifel. Man vernimmt sie, wenn man den Oberarm zu rotiren versucht, während die andere Hand das Schultergerüst fixirt. Jedoch kann bei Verrenkungen des Humerus Crepitation sich auch finden, wenn ein Stückchen der Tubercula oder des Gelenkran- des der Scapula abgebrochen ist. Bei dem Sternbruch des Gelenkkopfes muss man durch Druck auf diesen selbst Crepitation zu erzeugen suchen. — Bei Brüchen des chirurgischen Halses ist die Difformität meist sehr bedeutend. Die Achse des Oberarms steht schief nach Oben und Innen nach Unten und Aussen, das obere Ende des unteren Bruchstücks ragt in der Achselhöhle hervor; 2 bis 3 Finger

breit unterhalb des Acromion besteht eine deutliche Einbiegung. Zieht man das untere Bruch-Ende nach Aussen und rotirt den Arm, so fühlt man Crepitation. Die differentielle Diagnose zwischen diesem Bruch und einer Verrenkung im Schultergelenk ergibt nachstehende Tabelle. (Vgl. Luxatio humeri.)

Symptome.	Bruch.	Verrenkung.
Abflachung (Einbiegung) der Schulter	in einiger Entfernung vom Acromion.	unmittelbar unter dem Acromion.
Vorsprung in der Achselhöhle	unregelmässig und von geringem Umfange.	gleichmässig gewölbt, von bedeutendem Umfange.
Stellung des Ellenbogens .	in geringer Entfernung vom Rumpf.	in bedeutender Entfernung vom Rumpf.
Annäherung des Ellenbogens an den Rumpf	erfolgt leicht und ohne bedeutende Schmerzen.	schwierig und mit bedeutenden Schmerzen.
Reduction	leicht, aber nicht dauernd.	wenn sie gelingt, auch dauernd.

Bei der Epiphysentrennung fehlt die raue Crepitation, und das obere Ende des Humerusschaftes wird, wenn es sich überhaupt entdecken lässt, als glatter, rundlicher Körper gefühlt. Dadurch kann die Diagnose erheblich erschwert werden.

Prognose. Brüche des oberen Endes des Humerus sind bedenklicher als diejenigen des Mittelstücks, theils wegen der Nähe und Betheiligung des Gelenkes, theils wegen der häufig vorliegenden Unmöglichkeit, solche Brüche genau zu reduciren.

Behandlung. Bei Brüchen des Gelenkkopfes und Brüchen durch die Tubercula ist Reduction nicht erforderlich, — wenn Einkeilung besteht, sogar schädlich. Bei Brüchen des chirurgischen Halses reicht ein leichter Zug aus, um das untere Bruch-Ende in gleiche Höhe mit dem oberen zu bringen, und die Coaptation erfolgt durch einen in der Richtung von Innen nach Aussen auf das untere Bruch-Ende in der Nähe der Bruchstelle ausgeübten Druck. Jedoch ist diese Reduction immer unvollkommen, weil das obere Bruch-Ende sich jeder Einwirkung entzieht. — Ist der Gelenkkopf nicht blos abgebrochen, sondern ausserdem luxirt, so ist die Reduction doppelt schwierig. Dieselbe kann nur durch directen Druck auf den Gelenkkopf und gewaltsames Zurückschieben desselben in die Gelenkhöhle, während am Arme extendirt wird, ausgeführt werden¹⁾. — Besteht ein Bruch

¹⁾ Auf diese Weise hat zuerst Richet (Union médicale 1852, No. 124) die Reduction glücklich bewirkt. Auch Watson (Americ. Journ. of med. sciences, Oct. 1855) erzählt 2 Fälle der Art. In allen war der chirurgische Hals des Humerus gebrochen.

eines der Tubercula, so rotirt man den Oberarm in der Art, dass die an dem abgebrochenen Höcker inserirenden Muskeln erschlaft sind, und sucht — beim Tuberculum majus — den Höcker durch directen Druck an seine Stelle zu schieben und dort zu befestigen.

Zur Retention genügt in Fällen, wo keine Reduction vorgenommen wird, dass man das halbgebeugte Glied durch eine Mitella unterstützt, allenfalls zwischen Arm und Rumpf ein Polster schiebt und mittelst eines Tuches oder einiger Bidentouren den Arm am Rumpfe befestigt. Von grösster Wichtigkeit ist die Behandlung der Quetschung, welche die Weichtheile der Schulter und besonders auch das Gelenk erlitten haben. — Für den Bruch des chirurgischen Halses hat man eine grosse Menge von Verbänden eronnen, welche grösstentheils sehr unvollkommen den beabsichtigten Zweck erreichen. Desault hat auch hier das Verdienst, zuerst einen zweckmässigeren Verband angegeben zu haben. Auf das obere Bruch-Ende vermögen wir nicht einzuwirken; deshalb rieth Desault, das untere in eine dem oberen möglichst entsprechende Stellung zu bringen. Zu diesem Behufe legt er zwischen Arm und Brust ein, je nach der Conformation des Thorax, verschieden dickes und verschieden gestaltetes, keilförmiges Kissen mit seiner Basis nach Unten, umgiebt die Bruchstelle mit Schienen und befestigt diese, sowie den Oberarm, mittelst einer Rollbinde am Rumpf. Der Vorderarm wird durch eine Mitella unterstützt. Velpeau empfiehlt statt dessen seinen bei den Schlüsselbein-Brüchen (pag. 409) beschriebenen und abgebildeten Verband. A. Cooper umwickelt den Arm mit einer Rollbinde vom Ellenbogen aufwärts, legt innen und aussen Schienen an, welche durch eine zweite Binde befestigt werden, schiebt dann zwischen Thorax und Oberarm ein Kissen und unterstützt den Vorderarm durch eine Mitella. Dieser Verband ist noch weniger sicher als der Desault'sche. Viel mehr leisten: der Middeldorpf'sche Triangel¹⁾ und der Gyps-Verband, mit dem man nach Art der Spica humeri ascendens (bei gehöriger Polsterung der Achselhöhle) das ganze Schultergelenk umfassen und befestigen muss, nachdem vorher die Extremität von Unten auf, mit gebeugtem Ellenbogen und halb abducirtem Oberarm, in ihm eingehüllt und unbeweglich gemacht ist. Von besonderem Vortheil ist es, den Gypsverband in Gestalt einer stumpfwinklig gebogenen Schiene vom Oberarm aus am Thorax hinabsteigen zu lassen, wie Port

¹⁾ Vgl. pag. 413. — Einen ähnlichen Apparat hat Gély für die Behandlung der Fract. colli humeri angegeben. — Schon Duverney wollte den Arm rechtwinklig gegen den Rumpf stellen.

empfiehlt¹⁾, wodurch derselbe dem Triangel sehr ähnlich wird. Eine lederne Schiene derselben Gestalt, welche mit einem Schenkel am Thorax, mit dem anderen am Oberarm befestigt wird, hat schon J. Erichsen²⁾ empfohlen. — Jedoch wird auch durch die zweckmässigsten und sorgfältigsten Verbände Difformität nicht immer verhütet. Die Function des Arms wird aber durch letztere selten gestört. Die Consolidation erfolgt in etwa 50 Tagen.

Bei complicirten Fracturen am oberen Ende des Humerus kann es nützlich, sogar erforderlich sein, die Resection sofort vorzunehmen (vgl. „Gelenkbrüche“ im folgd. Abschnitt). Läge der abgelöste Oberarmkopf frei im Gelenk und erregte als fremder Körper Entzündung und Eiterung, so wäre das Gelenk, wie bei der Resection, zu eröffnen und der Gelenkkopf auszuziehen.

C. Brüche am unteren Ende des Humerus.

a) Bruch durch die ganze Breite des Humerus.

In Betreff der **Entstehung** ist zu bemerken, dass dieser Bruch bei Weitem häufiger bei jugendlichen als bei älteren Individuen vorkommt, mithin, namentlich bei vollkommenem queren Verlauf, nicht selten als Epiphysentrennung aufzufassen sein dürfte.

Symptome. Bei Brüchen durch die ganze Breite des Knochens, deren Bruchlinie oberhalb der Condylen verläuft, zieht der Triceps gewöhnlich das untere Bruchstück nebst dem ganzen Vorderarm nach Hinten und Oben³⁾. Ersteres erleidet hierbei eine solche Drehung um seine Querachse, dass der Gelenktheil nach Hinten, die Bruchfläche aber nach Vorn gerichtet wird, so dass letztere gemeinsam mit dem oberen Bruch-Ende einen nach Vorn vorspringenden Winkel bildet. Mit einem mehr oder weniger quer verlaufenden Bruch kann ein durch das untere Bruch-Ende vertical bis in's Gelenk dringender Längsbruch bestehen (Doppelbruch beider Condylen). Die hierdurch gebildeten zwei unteren Bruchstücke können von einander entfernt stehen. Alsdann ist der Querdurchmesser des

¹⁾ Studien über Kriegsverbandlehre. München, 1867.

²⁾ Handb. d. Chirurgie, übersetzt von Thamhain, Halle 1864, Bd. I. pag. 132.

³⁾ Das ganze untere Bruchstück kann durch die fracturirende Gewalt auch nach Vorn getrieben werden. Dies beobachtete ich dreimal bei jungen Menschen, die von bedeutender Höhe gefallen waren. Das obere Bruchstück ragte mit dem äusseren Winkel aus einer an der hinteren Seite des Arms quer verlaufenden Wunde hervor; das untere, durch einen ins Gelenk dringenden Längsbruch in zwei Theile zersprengt und überdies zersplittert, stand vor jenem.

unteren Endes des Oberarms beträchtlich vermehrt. — Bei allen diesen Brüchen des unteren Endes des Humerus steht das Olecranon nach Hinten hervor und höher als gewöhnlich. Vorn entdeckt man den durch die Bruch-Enden (oder durch eines derselben) gebildeten Vorsprung. Der Arm ist im Ellenbogengelenk leicht gebeugt, Crepitation oft schwer zu entdecken. Daher kann eine solche Fractur mit Verrenkung des Vorderarms nach Hinten verwechselt werden. Die Difformität, welche bei beiden Arten von Verletzungen in ähnlicher Weise besteht, begünstigt eine solche Verwechslung (Dupuytren, A. Cooper).

Differentielle Diagnose des Bruches am unteren Ende des Humerus und der Vorderarm-Verrenkung nach Hinten.

Fractur.

1) Die Knochenvorsprünge am unteren Ende des Humerus sind in ihren normalen Beziehungen zum Olecranon geblieben.

2) Der von den Bruch-Enden gebildete winkelige Vorsprung an der vorderen Seite des Arms steht über der Armbeuge und besitzt eine geringe Breite.

3) Bei Bewegungen des Arms, welche sich im Ellenbogengelenk zwar mit Mühe und mit Schmerzen, aber doch in einiger Ausdehnung ausführen lassen, gelingt es, Crepitation zu vernehmen.

4) Die Veranlassung ist ein Fall auf den Ellenbogen oder eine directe Gewalt.

5) Die Reduction ist leicht; aber die Difformität kehrt alsbald wieder, wenn man die Retention nicht gehörig ausübt.

Luxation.

1) Die Condylen des Humerus stehen weiter nach Vorn und sind daher weiter vom Olecranon entfernt.

2) Der durch den Processus cubitalis gebildete Vorsprung an der vorderen Seite des Arms steht tiefer als die Armbeuge und ist breit und abgerundet.

3) Bewegungen im Ellenbogengelenk, namentlich auch Pronation, sind unmöglich, oder doch äusserst schmerzhaft. Crepitation wird bei diesen Versuchen nicht wahrgenommen.

4) Die Verletzung entsteht durch einen Fall auf die Hand bei ausgestrecktem Vorderarm.

5) Die Reduction gelingt nur mit einigem Kraftaufwande; aber dann hört auch jede Neigung zur Wiederverschiebung auf.

Die **Prognose** bei Brüchen am unteren Ende des Humerus ist übler, als beim Bruch des Mittelstücks, weil auch im günstigsten Falle sehr lange Zeit nach der Heilung beträchtliche Steifigkeit im Ellenbogengelenk zurückbleibt. Dringt die Fractur in das Gelenk ein, so tritt die Gefahr der Gelenkentzündung hinzu. Besondere Beachtung erheischt der Nervus radialis. Derselbe kann an der Stelle, an welcher er sich um den Humerus zur Dorsalseite wendet, verletzt sein oder später durch den Callus comprimirt werden¹⁾. In beiden Fällen kann Lähmung desselben (motorische Lähmung der Exten-

¹⁾ Vgl. Busch, Med. Centralzeitung. 1863. pag. 726, Ollier, Gaz. hebdomadaire, 1865. pag. 515. Einen Fall der Art habe ich gleichfalls beobachtet.

soren am Vorderarm, Gefühls lähmung im Bereich der Dorsalfäche der 3 Vorderfinger) folgen.

Behandlung. Die halbgebeugte Stellung ist besonders in Rücksicht auf das Gelenk am Meisten zu empfehlen. Die Schienen werden auf die vordere und hintere Seite des Oberarms gelegt; die hintere Schiene muss winkelig gebogen sein und mit ihrem unteren Stück einen Theil des Vorderarms umfassen (Cooper und Goyrand). Ist das untere Bruch-Ende durch einen Längsbruch gespalten, so sind überdies Seitenschienen erforderlich. Bei einfachen Querbrüchen können auch letztere allein ausreichen (Henkel). Der Gyps-Verband, welcher jedoch, mit Rücksicht auf das Gelenk, sehr sorgfältig überwacht werden muss, macht die Schienen-Verbände überflüssig. Bei jugendlichen Individuen beginnt man zur Verhütung der Gelenksteifigkeit schon in der zweiten Woche Bewegungen im Ellenbogengelenk zu machen, bei älteren in der dritten Woche.

Für complicirte Brüche ist der Middeldorpf'sche Triangel oder ein Gitter-Verband zu empfehlen. Wenn wegen bedeutender Quetschung, Wunde oder Splitterung die Anwendung dieser Verbände nicht zulässig ist, so muss der Verletzte im Bett bleiben und das Glied halb gebeugt auf ein von der Schulter zur Hand schräg aufsteigendes Kissen legen, auf welchem man die Bruch-Enden durch Spreusäcke und Scultet'sche Binden in der gehörigen Lage zu erhalten sucht. Auch Rinnen von Blech oder Drahtgeflecht, sowie Schweben können hierbei von Nutzen sein. Ist das Gelenk durch eine Fractur und gleichzeitig durch eine äussere Wunde geöffnet, so muss möglichst bald reseziert werden. Die Aussichten auf Heilung ohne Resection sind bedeutend schlechter. (Vgl. Bd. IV.)

Den durch Callus comprimirten Nervus radialis sucht man aus demselben mit Meissel und Hammer frei zu machen und behandelt ihn im Uebrigen nach den bei den „traumatischen Lähmungen“ anzugebenden Regeln.

b) Ablösung der unteren Epiphyse des Humerus.

Ein intracapsulärer Querbruch des Processus cubitalis humeri, durch welchen Trochlea und Rotula (Eminentia capitata) von dem übrigen Knochen getrennt werden müssten, scheint nicht vorzukommen¹⁾. Dagegen wird eine solche Trennung als Epiphysenlösung

¹⁾ Laugier (Archiv. général. 1853. Jan.) hat einen Fall von Fractur der Trochlea ohne Bruch des Condylus beobachtet. Crepitation war sehr deutlich. Bei der Streckung stellte sich der Vorderarm in einen stumpfen Winkel nach innen. Die übrigen Erscheinungen eines Condylenbruchs fehlten.

bei Kindern (bis zum 12. Jahr) allerdings beobachtet; denn grade in dieser Linie liegt der Epiphysknorpel. Der Umstand, dass die Rotula bei Kindern relativ viel grösser ist, als bei Erwachsenen, scheint das Zustandekommen einer solchen Trennung zu begünstigen. Die abgelöste Epiphyse wird durch die einwirkende Gewalt innerhalb der Gelenkkapsel bald nach Vorn (beim Fall auf das Olecranon), bald nach Hinten (beim Fall auf die Hand) verschoben; ihr folgen die Vorderarmknochen, so dass die Erscheinungen einer Verrenkung entstehen, jedoch mit auffälliger, passiver Beweglichkeit des Gelenks und bei gewissen Bewegungen hörbarer Crepitation. — Die Reduction gelingt leicht durch Zug; zur Retention genügt ein leichter Schienenverband, zur Bekämpfung der Gelenk-Entzündung, nächst der absoluten Ruhe (Immobilisirung), Eis.

Vgl. R. W. Smith, observ. on disjunction of the lower epiphysis of the humerus. Dublin quart. journ. 1858. Febr., und Pitha, im „Handbuch der allgem. u. speciell. Chirurgie“, Bd. IV. I. pag. 54, woselbst auch zwei sehr instructive Beobachtungen mitgetheilt sind.

c) Brüche einzelner Condylen.

α) Brüche des Condylus internus.

Der Condylus internus bricht sehr selten so ab, dass die Bruchlinie durch die Trochlea, mithin durch das Gelenk, verläuft. Relativ häufiger wird der extracapsuläre Bruch (Fractur des Epicondylus) beobachtet. In beiden Fällen entsteht der Bruch in Folge eines Falles auf den Ellenbogen und zwar häufiger im jugendlichen Alter, als später.

Symptome. Bei dem intracapsulären Bruche schiebt sich in gestreckter Stellung das obere Ende der Ulna mit dem abgebrochenen Condylus internus nach Hinten und bildet einen Vorsprung, der eine Verrenkung simuliren kann; das untere Ende des Humerus springt nach Vorn hervor. Während der Beugung nimmt die Ulna sammt dem inneren Condylus ihren normalen Platz wieder ein und die Difformität verschwindet. Legt man, während im Ellenbogengelenk Bewegungen gemacht werden, die Finger auf das untere Ende des Humerus, so fühlt man Crepitation. — Verläuft die Bruchlinie ausserhalb des Gelenks, so lässt sich Crepitation nur durch directe Bewegung des inneren Condylus hervorrufen, und die Dislocation der Ulna nach Hinten fehlt gänzlich. Das Bruchstück wird durch die daran haftenden Muskeln meist abwärts und nach Vorn gezogen. Oft erschwert bedeutende Geschwulst die Diagnose. Zuweilen besteht sehr grosse Schmerzhaftigkeit wegen Zerrung des Nervus ulnaris.

Behandlung. Abgesehen von der immer erforderlichen Bekämpfung

der Entzündung, hat man den Vorderarm in rechtwinkliger Beugung gegen den Oberarm durch eine Mitella oder sicherer durch einen Gypsverband zu befestigen. Von der zweiten Woche ab macht man passive Bewegungen, um Gelenksteifigkeit zu verhüten.

β) Brüche des *Condylus externus* (Fig. 36 c.).

Noch seltener als der innere bricht der äussere *Condylus*, gleichfalls relativ häufiger bei Kindern als bei Erwachsenen und stets durch einen Fall auf den Ellenbogen. Das abgelöste Knochenstück bildet einen Vorsprung, dessen Berührung schmerzhaft ist. Bewegungen im Ellenbogengelenk und Drehungen der Hand erregen Schmerz und Crepitation. Läuft die Bruchlinie (wie gewöhnlich) durch das Gelenk und ist nicht etwa das Periost ganz unversehrt geblieben, so weicht der Radius mit dem abgebrochenen *Condylus* nach Hinten. Oft findet sich auch bei diesem Bruch bedeutende Geschwulst. Die Vereinigung erfolgt manchmal bloß durch ligamentöse Zwischensubstanz. Die Behandlung besteht darin, dass man den Vorderarm in rechtwinkliger Beugung gegen den Oberarm befestigt. Bei grosser Neigung des abgebrochenen Stückes nach Hinten auszuweichen, muss man den Gypsverband anwenden oder eine rechtwinklig gebogene Schiene an die hintere Seite des Gelenkes legen. Passive Bewegungen im Ellenbogengelenk müssen frühzeitig begonnen werden, die activen lassen sich, wegen der Unebenheiten, die im Gelenk oft zurückbleiben, nicht immer ganz vollständig wieder herstellen.

4) Brüche der Vorderarmknochen.

Die Vorderarmbrüche bieten beträchtliche Verschiedenheiten dar, je nachdem beide Knochen oder nur einer, je nachdem sie in dieser oder in jener Höhe gebrochen sind. In letzterer Beziehung unterscheiden wir namentlich die Fracturen des *Olecranon*, des *Processus coronoideus ulnae*, des *Collum radii* und des unteren Endes des *Radius*. An Häufigkeit stehen die Vorderarmbrüche allen anderen voran; sie betragen fast 20 Procent aller Fracturen.

A. Brüche beider Vorderarmknochen.

Diese Fractur hat gewöhnlich in der Mitte des Vorderarms, zuweilen auch weiter unten ihren Sitz, selten in seinem oberen Viertel. Bald brechen beide Knochen in gleicher Höhe, bald in verschiedener. Zuweilen, und zwar nicht bloß bei Kindern, ist der Bruch an beiden oder doch an dem einen Knochen unvollständig. Die Richtung des Bruches ist zuweilen schräg, häufiger quer, oft mit stark eingreifenden

Zacken. — Die Veranlassung ist gewöhnlich eine directe Gewalt; jedoch können beide Vorderarmknochen auch in Folge eines Falles auf die Hand brechen (wie dies z. B. A. Bérard an sich selbst erfuhr).

Symptome. Die Bruch-Enden werden, mit Ausnahme des oberen Stücks der Ulna, durch die Pronatoren in den Zwischenknochenraum gezogen, welchen sie verengen und aus welchem sie die Muskeln verdrängen. *Dislocatio ad directionem*, d. h. winklige Verbiegung beider Knochen in gleicher Richtung, entsteht entweder durch die einwirkende Gewalt oder durch Muskel-Contraction. Im ersteren Falle kann sie bald in dieser, bald in jener Richtung Statt finden; im zweiten erfolgt sie stets nach der Seite der Flexoren, da diese stärker sind. Auch *Dislocatio ad longitudinem* und Kreuzung der Bruchstücke kommen vor, letztere namentlich, wenn der Arm in halber Pronation verletzt wurde. Die hierdurch bedingte Difformität, welche die sonst abgeplattete Gestalt des Vorderarms in eine mehr cylindrische umwandelt, ferner die Beweglichkeit und Crepitation der Bruch-Enden und die Behinderung activer Bewegungen begründen die Diagnose, welche nur, wenn der Bruch hoch oben oder ganz tief unten sitzt, oder wenn die Bruchzacken fest ineinander greifen und somit jede Verschiebung verhindern, schwierig sein kann.

Prognose. Einfache Vorderarmbrüche sind nicht bedenklich. Werden sie jedoch nicht zweckmässig behandelt, so bleibt Verschiebung der Bruch-Enden gegen die Achse des Gliedes bestehen, es erfolgt difforme Heilung und namentlich Unmöglichkeit oder doch Schwierigkeit der Supination.

Die Angabe früherer Autoren, dass die neben einander stehenden Bruch-Enden der beiden Knochen unter einander verwachsen könnten, vermöchte schon Goyrand nicht zu bestätigen, obgleich er diesem Gegenstande besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Die Behinderung der Drehbewegungen, namentlich der Supination hat ihren Grund vielmehr darin, dass das untere Bruchstück des Radius durch den Pronator quadratus und mehr noch vielleicht durch die allgemein übliche Methode, den Verband in halber Pronation anzulegen, pronirt wird, während das obere in supinirter Stellung verharrt und in derselben durch Supinator brevis und Biceps erhalten wird, so dass beim Zusammenheilen eine erhebliche *Dislocatio ad peripheriam* zurückbleibt, welche die Wirkung der Supinatoren illusorisch macht. — Vgl. Benno Schmidt, Ueber ein Supinationshinderniss nach der Heilung von Vorderarmbrüchen. Archiv der Heilkunde, 1866, Heft 2, und Lannelongue, sur la fract. de la part. moyenne du radius, Gaz. des hôp. 1866, No. 95. — Nach Volkman (Berl. klin. Wochenschr. 1868, No. 18) kann bei etwas schiefer Zusammenheilen der Knochen auch das Ligament. interos. zum Supinationshinderniss werden.

Behandlung. Man entfernt den Arm vom Rumpf, stellt den Vorderarm in rechtwinklige Beugung gegen den Oberarm und in Supination. Ein Gehülfe verrichtet am Oberarm die Contra-Extension,

ein anderer die Extension an der Hand. Sitzt der Bruch im unteren Dritteltheil, so lässt man die Hand gegen den Ulnar-Rand neigen. Der Arzt, auf der äusseren Seite des Gliedes stehend, schiebt dann die Bruch-Enden in die richtige Lage. Nachdem es hierdurch gelungen ist, dem Vorderarme seine normale Gestalt wieder zu geben, bedarf man eines Verbandes, durch welchen besonders einer Verschiebung gegen die Mittellinie des Gliedes hin vorgebeugt wird. Zu diesem Behuf legte man sonst ganz allgemein auf die Dorsal- und Volarseite des Vorderarms eine graduirte Comresse von hinreichender Dicke, oder, nach Pouteau, Cylinder aus Leinwand, Werg oder Watte von 2—3 Ctm. Durchmesser, und auf diese dann gut gepolsterte Schienen, welche an Breite der Dicke des Arms entsprechen und bis zu den Fingern hinabreichen müssen, und, während eine gehörige Extension Statt findet, mittelst einer Rollbinde befestigt werden. Es ist jetzt allgemein anerkannt, dass die Pouteau'schen Cylinder (graduirten Compressen) nutzlos, sogar gefährlich¹⁾ sind; der angegebene Schienenverband genügt. Bei Tage ruht der Vorderarm in einer Mitella, Nachts auf einem schräg aufsteigenden Kissen. Der Verband darf niemals einen schmerzhaften Druck ausüben und muss alle Woche ein Mal gewechselt werden bis zum 35., höchstens 40. Tage, wo die Consolidation erfolgt zu sein pflegt. Nach denselben Principien ist auch der Gypsverband anzuwenden, der aber, um Steifigkeit in den benachbarten Gelenken zu verhüten, während der Heilung auch mehrmals gewechselt werden muss. — Besteht bedeutende Quetschung oder eine anderweitige Complication, welche das Anlegen eines festen Verbandes nicht gestattet, so legt man den Vorderarm auf ein Spreukissen oder in eine Schwebel und sucht durch aufgeklebte Blechschienen u. dgl. der Verschiebung zu begegnen.

B. Brüche des Radius.

a) Brüche des oberen Dritteltheils des Radius.

In seinem oberen Dritteltheil bricht der Radius am Seltensten. Die Veranlassung dieses Bruches ist immer eine directe und bedeutende Gewalt. — Bei einem Bruch durch den Hals des Radius oder einer Epiphysen-Trennung an dieser Stelle wird das untere Bruch-Ende durch den Biceps nach Vorn und durch die Pronatoren gegen die Ulna hin gezogen. Durch Rotationen der Hand kann man sich (bei complete Brüchen) überzeugen, dass das Capitulum radii den Be-

¹⁾ Die Gefahr beruht auf der leicht möglichen Compression der Vorderarmarterien.

wegungen der Hand nicht folgt; auch wird, wenn die Bruch-Enden nicht zu weit von einander entfernt sind, Crepitation vernommen. Ist bloß das Köpfchen des Radius abgebrochen, so entsteht durch die Verschiebung des übrigen Knochens nach Vorn eine Difformität, wie bei der Verrenkung des Radius nach Vorn. Aber der Umstand, dass man das Capitulum radii an seiner normalen Stelle fühlen kann und die bei gebeugtem Vorderarm durch Rotationen der Hand hervorzurufende Crepitation sichern die Diagnose. Die Prognose dieses Bruches ist keineswegs ganz günstig, weil durch die bedeutende Gewalt, welche er voraussetzt, immer zugleich heftige Quetschung der Weichteile bedingt sein muss. Ueberdies bleibt das benachbarte Gelenk leicht für längere Zeit steif. — Behandlung im Allgemeinen wie beim Bruche beider Vorderarmknochen. Das untere Bruch-Ende muss nach Aussen und nach Hinten gedrängt werden, wenn der Bruch oberhalb der Insertion des Biceps sich befindet; gegen beide Bruch-Enden ist in gleicher Richtung einzuwirken, wenn die Fractur unterhalb der Tuberositas ihren Sitz hat.

b) Brüche in der Mitte des Radius.

Auch diese Brüche entstehen gewöhnlich durch directe Gewalt. Die Richtung ist in der Regel quer. Beide Bruch-Enden werden gegen die Ulna hin, in das Spatium interosseum verschoben. Durch die Verschiebung des unteren Bruchstücks wird eine veränderte Richtung des Handgelenks bedingt, welche um so auffälliger ist, je tiefer unten der Bruch seinen Sitz hat. Während nämlich das Handgelenk im normalen Zustande an der Radialseite tiefer steht, als an der Ulnarseite, mithin schräg von Oben und Innen nach Unten und Aussen¹⁾ gerichtet ist, nähert es sich alsdann der horizontalen Richtung, wodurch zugleich ein abnormes Hervorragen des Capitulum ulnae bedingt wird. Nicht selten kommt bei Fracturen des Radius Luxation der Ulna vor (und umgekehrt). Auch mehrfache Brüche des Radius sind beobachtet.

Einbiegung und Beweglichkeit an der Bruchstelle, Verminderung des Querdurchmessers in dieser Gegend, Vergrößerung des Diameter antero-posterior in derselben, Unmöglichkeit activer Pronation und Supination, Fehlen der Mitbewegungen des Radiusköpfchens bei Drehungen der Hand, die dabei auftretende, durch den auf das Capitulum radii aufgesetzten Finger deutlich zu erkennende Crepitation,

¹⁾ Bei der Beschreibung der Brüche des Radius werden wir der Kürze wegen „Vorn“ mit „Volar-Seite“, „Hinten“ mit „Dorsal-Seite“, „Aussen“ mit „Radial-Seite“, „Innen“ mit „Ulnar-Seite“ als gleichbedeutend ansehen.

endlich der fixe Schmerz an der Bruchstelle begründen die Diagnose; freilich kann das eine oder andere dieser Symptome auch fehlen. Prognose und Therapie im Wesentlichen wie bei den Brüchen beider Vorderarmknochen.

c) Brüche des unteren Dritttheils des Radius.

Häufigkeit. Brüche des Radius an seinem unteren Ende sind viel häufiger, als man früher glaubte und zum Theil noch glaubt; sie betragen, nach den Untersuchungen von Goyrand, beinahe ein Dritttheil aller an den Extremitäten überhaupt vorkommenden Knochen-

Fig. 37.



brüche. Die geringe Dicke der Corticalsubstanz an dem unteren Ende des Radius¹⁾ und der Umstand, dass ein Fall auf die ausgestreckte Hand (die Gelegenheitsursache dieser Brüche) oft vorkommt, erklären hinlänglich ihre auffallende Häufigkeit. Sie werden nicht selten mit Verstauchungen verwechselt, worauf schon Pouteau und Desault aufmerksam gemacht haben. Genauere Untersuchungen über diesen Bruch verdanken wir Gline, A. Cooper, Goyrand²⁾ und Dupuytren. Letzterer ging freilich in Betreff der Annahme ihrer Häufigkeit zu weit, indem er die Möglichkeit einer Verrenkung im Handgelenk gänzlich läugnete und alle als Luxatio manus beschriebenen Fälle für Brüche des Radius erklärte. In neuester Zeit haben sich besonders Malgaigne, Diday, Voillemier³⁾, Linhart⁴⁾ und Lecomte mit dieser Fractur beschäftigt.

Varietäten. Der Verlauf der Bruchlinie beim Bruch im unteren Ende des Radius ist bald schräg (gewöhnlich von Oben und Hinten nach Unten und Vorn) bald quer, wobei dann ferner Einkeilung bestehen oder aber das untere Bruchstück auch nochmals vertical zersprengt sein kann. Ausserdem kommen Splitterbrüche und vollständige Zerschmetterungen vor. Relativ selten dringt die Bruchlinie in das Gelenk ein.

Bei dem Schrägbruch⁵⁾, welcher von Oben und Hinten nach

¹⁾ Fig. 37 stellt die Länge nach durchschnittene untere Hälfte eines gesunden Radius dar. *a* hintere Fläche. *b* die Gegend, von welcher ab an derselben das compacte Knochengewebe auffallend dünn wird. *c* die weiter abwärts noch etwas dickere compacte Schicht der vorderen Fläche.

²⁾ Gaz. méd. 1831 und Journ. hebdom. 1836.

³⁾ Archives générales de médecine 1842.

⁴⁾ Zeitschrift der Wiener Aerzte 1852, April.

⁵⁾ Malgaigne, Voillemier und Linhart behaupten, dass Schrägbrüche nicht vorkommen. Es scheint diese Differenz jedoch zum Theil auf eine verschiedene

ten und Vorn verläuft (Fig. 38 bei c), findet, nach Goyrand, die Verschiebung in folgender Weise Statt. Das untere Bruchstück wird durch den Stoss, welcher den Bruch hervorrief, zu-

Fig. 38.



gleich aber durch die Zusammenziehung der Muskeln aufwärts und nach Hinten, d. h. also gegen die Dorsalseite des Vorderarms verschoben. Da dasselbe mittelst einer Bandscheibe (Fibrocartilago triangularis intermedia) an der Ulna befestigt ist, so ist eine Verschiebung in der Richtung der Achse des Vorderarms unmöglich. Es muss vielmehr einen Bogen beschreiben, für welchen jene Bandscheibe den Halbmesser darstellt. Daher rückt der obere End des unteren Bruchstückes gegen die Ulna hin und der äussere Rand springt etwas stärker hervor, so dass die untere Gelenkfläche des Radius, welche im normalen Zustande ein wenig nach Innen und Vorn gerichtet ist, gerade nach Unten und zuweilen sogar ein wenig nach Hinten und Aussen sieht. Das untere Ende der Ulna wird auf der Beugeseite stärker hervorspringend gefühlt, während auf der Dorsalseite der durch die Ulna im normalen Zustande gebildete Vorsprung durch das untere Bruch-Ende des Radius undeutlich wird. Dies Hervorspringen des Capitulum ulnae an der vorderen Seite ist bei schlecht geheilten Fracturen, besonders wenn die Hand in Supination gebracht wird, sehr deutlich. Durch die angegebene Verschiebung wird eine Einbiegung am Radialrande des Vorderarms, nicht oberhalb des Handgelenks, sowie eine Verminderung des Querdurchmessers des Vorderarms an dieser Stelle bedingt.

Je schief der Bruch verläuft, desto bedeutender ist die Verschiebung der Bruch-Enden; bei Querbrüchen und bei Ablösung der Epiphyse besteht fast ausschliesslich Dislocatio ad latus. In solchen Fällen ist die Verwechslung mit Verrenkung der Hand leicht möglich.

Verläuft der Bruch von Oben und Vorn nach Unten und Hinten, so ist die Verschiebung gerade die entgegengesetzte. Hierbei dringt der Bruch häufiger in das Gelenk ein; der hintere Theil der Gelenkfläche bildet dann das untere Ende des oberen Bruchstückes, welches gewöhnlich auf die Dorsalseite der Handwurzel verschoben wird.

Die Hand folgt immer dem unteren Bruchstück des Radius, die Richtung ihrer Achse wird dem entsprechend verändert. Statt schräg

Benennung hinauszulaufen, indem von Linhart wenigstens zugestanden wird, dass allerdings der Bruch an der einen oder anderen Seite höher hinauf zu reichen pflege, diese Verschiedenheit der Höhe des Bruchstückes sei jedoch zu unbedeutend, um die Benennung Schrägbruch zu rechtfertigen.

endlich der fixe Schmerz an der Bruchstelle begründen die Diagnose; freilich kann das eine oder andere dieser Symptome auch fehlen. Prognose und Therapie im Wesentlichen wie bei den Brüchen beider Vorderarmknochen.

c) Brüche des unteren Dritttheils des Radius.

Häufigkeit. Brüche des Radius an seinem unteren Ende sind viel häufiger, als man früher glaubte und zum Theil noch glaubt; sie betragen, nach den Untersuchungen von Goyrand, beinahe ein Drittel aller an den Extremitäten überhaupt vorkommenden Knochen-

Fig. 37.



brüche. Die geringe Dicke der Corticalsubstanz an dem unteren Ende des Radius¹⁾ und der Umstand, dass ein Fall auf die ausgestreckte Hand (die Gelegenheitsursache dieser Brüche) oft vorkommt, erklären hinlänglich ihre auffallende Häufigkeit. Sie werden nicht selten mit Verstauchungen verwechselt, worauf schon Pouteau und Desault aufmerksam gemacht haben. Genauere Untersuchungen über diesen Bruch verdanken wir Cline, A. Cooper, Goyrand²⁾ und Dupuytren. Letzterer ging freilich in Betreff der Annahme ihrer Häufigkeit zu weit, indem er die Möglichkeit einer Verrenkung im Handgelenk gänzlich läugnete und alle als Luxatio manus beschriebenen Fälle für Brüche des Radius erklärte. In neuester Zeit haben sich besonders Malgaigne, Diday, Voillemier³⁾, Linhart⁴⁾ und Lecomte mit dieser Fractur beschäftigt.

Varietäten. Der Verlauf der Bruchlinie beim Bruch im unteren Ende des Radius ist bald schräg (gewöhnlich von Oben und Hinten nach Unten und Vorn) bald quer, wobei dann ferner Einkeilung bestehen oder aber das untere Bruchstück auch nochmals vertical zersprengt sein kann. Ausserdem kommen Splitterbrüche und vollständige Zerschmetterungen vor. Relativ selten dringt die Bruchlinie in das Gelenk ein.

Bei dem Schrägbruch⁵⁾, welcher von Oben und Hinten nach

¹⁾ Fig. 37 stellt die der Länge nach durchschnittene untere Hälfte eines gesunden Radius dar. *a* hintere Fläche. *b* die Gegend, von welcher ab an derselben das compacte Knochengewebe auffallend dünn wird. *c* die weiter abwärts noch etwas dickere compacte Schicht der vorderen Fläche.

²⁾ Gaz. méd. 1831 und Journ. hebdom. 1836.


³⁾ Archives générales de médecine 1842.

⁴⁾ Zeitschrift der Wiener Aerzte 1852, April.

⁵⁾ Malgaigne, Voillemier und Linhart behaupten, dass Schrägbrüche nicht vorkommen. Es scheint diese Differenz jedoch zum Theil auf eine verschiedene

Unten und Vorn verläuft (Fig. 38 bei c), findet, nach Goyrand, die Verschiebung in folgender Weise Statt. Das untere Bruchstück wird durch den Stoss, welcher den Bruch hervorrief, zugleich aber durch die Zusammenziehung der Muskeln aufwärts und nach Hinten, d. h. also gegen die Dorsalseite des Vorderarms verschoben. Da dasselbe mittelst einer Bandscheibe (Fibrocartilago triangularis intermedia) an der Ulna befestigt ist, so ist eine Verschiebung in der Richtung der Achse des Vorderarms unmöglich. Es muss vielmehr einen Bogen beschreiben, für welchen jene Bandscheibe den Halbmesser darstellt. Daher rückt der obere Rand des unteren Bruchstückes gegen die Ulna hin und der äussere Rand springt etwas stärker hervor, so dass die untere Gelenkfläche des Radius, welche im normalen Zustande ein wenig nach Innen und Vorn gerichtet ist, gerade nach Unten und zuweilen sogar ein wenig nach Hinten und Aussen sieht. Das untere Ende der Ulna wird auf der Beugeseite stärker hervorspringend gefühlt, während auf der Dorsalseite der durch die Ulna im normalen Zustande gebildete Vorsprung durch das untere Bruch-Ende des Radius undeutlich wird. Dies Hervorspringen des Capitulum ulnae an der vorderen Seite ist bei schlecht geheilten Fracturen, besonders wenn die Hand in Supination gebracht wird, sehr deutlich. Durch die angegebene Verschiebung wird eine Einbiegung am Radialrande des Vorderarms, dicht oberhalb des Handgelenks, sowie eine Verminderung des Querdurchmessers des Vorderarms an dieser Stelle bedingt.

Fig. 38.



Je schief der Bruch verläuft, desto bedeutender ist die Verschiebung der Bruch-Enden; bei Querbrüchen und bei Ablösung der Epiphyse besteht fast ausschliesslich Dislocatio ad latus. In solchen Fällen ist die Verwechselung mit Verrenkung der Hand leicht möglich.

Verläuft der Bruch von Oben und Vorn nach Unten und Hinten, so ist die Verschiebung gerade die entgegengesetzte. Hierbei dringt der Bruch häufiger in das Gelenk ein; der hintere Theil der Gelenkfläche bildet dann das untere Ende des oberen Bruchstückes, welches gewöhnlich auf die Dorsalseite der Handwurzel verschoben wird.

Die Hand folgt immer dem unteren Bruchstück des Radius, die Richtung ihrer Achse wird dem entsprechend verändert. Statt schräg

Benennung hinauszu laufen, indem von Linhart wenigstens zugestanden wird, dass allerdings der Bruch an der einen oder anderen Seite höher hinauf zu reichen pflege, diese Verschiedenheit der Höhe des Bruchstückes sei jedoch zu unbedeutend, um die Benennung Schrägbruch zu rechtfertigen.

nach Innen zu verlaufen, wird sie derjenigen des Vorderarms parallel oder neigt sich sogar nach Aussen, so dass das Capitulum ulnae deutlich hervortritt.

War die Gewalt hinreichend stark, um auch die Bandscheibe abzureissen und den vorderen Umfang der Gelenkkapsel des Handgelenks zu sprengen, so wird das untere Bruchstück noch weiter aufwärts verschoben und tritt ganz ausser Verbindung mit dem Capitulum ulnae, welches seiner Seits dann direct mit dem Carpus in Berührung kommt¹⁾. Dann entsteht eine bedeutende Verkürzung des Radius. Die Fractur lässt sich leicht reduciren, auch erfolgt Consolidation: aber die Bänder heilen nicht, und es bleibt deshalb eine abnorme Beweglichkeit zurück, welche ausgedehnte Verschiebungen der Vorderarmknochen gegen einander gestattet²⁾.

Häufig besteht bei Brüchen am unteren Ende des Radius Einkeilung (wie Voillemier gezeigt hat), und zwar entweder in der Art, dass das obere Bruch-Ende in das untere eingekleimt ist, oder mit gegenseitiger Einkeilung der Bruchstücke. Im ersteren Falle kann, wenn die Gewalt, welche den Bruch hervorrief, sehr bedeutend war, das untere Bruchstück und das Eindringen des oberen in mehrere Stücke zersprengt werden, so dass der Griffelfortsatz abgelöst wird und die Bruchlinien in das Gelenk eindringen (vgl. Fig. 39, 40 und 41)³⁾.




¹⁾ Einen Fall der Art hat Diday beschrieben. Derselbe giebt die Verschiebung des ganzen Bruchstücks als die gewöhnliche an.

²⁾ Goyrand beobachtete sogar einen Fall, in welchem der Kranke ausser Stande blieb, die Hand zu supiniren, ohne zugleich eine Verrenkung des unteren Endes des Radius zu erleiden, welche durch Pronation aber sofort wieder beseitigt wurde.

³⁾ Fig. 39. *a* oberes Bruch-Ende, aus der Vertiefung *b* des unteren, in welches es 8 Mm. tief eingekleimt war, herausgezogen. *c* abgebrochener Proc. styloid. radii. *d* untere Gelenkfläche der Ulna. — Fig. 40. Gelenk-Ende des Radius, von Unten gesehen. *a* Capitulum ulnae. *b* Bruchlinien des Gelenktheil des Radius. *c* abgesprengter Processus styloides radii. — Fig. 41. Dasselbe Präparat

Gegenseitige Einkeilung der Bruch-Enden pflegt zu entstehen, wenn die Hand schräg aufschlägt; sie ist häufiger als die Einkeilung des oberen Bruch-Endes in das untere. Das untere Bruch-Ende wird dabei nach Hinten umgekehrt; während die hintere Wand des oberen Bruch-Endes in das untere eindringt, gleitet seine vordere Wand vor dasselbe. Der äussere Rand des oberen Bruch-Endes dringt in das untere in einer Linie ein, deren Verlängerung den Processus styloides radii ablösen würde; der innere Rand aber bedeckt das untere Bruchstück (Fig. 42)¹⁾.

Fig. 42.



Der Schein eines Schrägbruches kann bei solcher Einkeilung der Bruch-Enden mit Umwendung des unteren Bruchstücks nach Hinten leicht entstehen, da der hintere Rand des letzteren höher liegt, als der vordere Rand des unteren Endes des oberen Bruchstücks. Selbst bei anatomischer Untersuchung, nach erfolgter Heilung des Bruches, kann ein solcher Irrthum unaufgeklärt bleiben, wenn man unterlässt, die Bruchstelle der Länge nach zu durchsägen (vgl. Fig. 43 u. 44)²⁾.

Fig. 43.




Fig. 44.



Fig. 45.



Fig. 46.



von der Dorsalseite gesehen. Die Bruch-Enden befinden sich noch im Zustande der Einkeilung. *a* Processus styloides radii. *b* vorspringender Rand des unteren Bruch-Endes. Zwischen *c* und dem Processus styloides radii befindet sich die Gelenkfläche des Radius, welche in eine horizontale Stellung gedrängt ist. *e* Processus styloides ulnae.

¹⁾ Fig. 42. *a* vordere Fläche des Radius, *b* hintere Fläche. *c* Querer Vorsprung, der durch das bis nahe an's Gelenk hinabrückende Bruch-Ende bedingt wird. *d* Hinterer Vorsprung, gebildet durch den Rand des unteren Bruchstücks. Derselbe liegt höher als der vordere. *e* Crista radii. *f* Gelenkfläche. *g* Processus styloides radii.

²⁾ Fig. 43. Unteres Ende des Radius von der vorderen Seite gesehen. *a* Bruchränder an der inneren Seite, welche einen Zwischenraum zwischen sich lassen. *b* Basis des Processus styloideus, welche von den übrigen Knochen abgelöst ist. *d* Vorsprung des Processus styloideus, über welchem bei der Untersuchung eine Vertiefung gefühlt wurde. — Fig. 44 zeigt dieselbe Fractur von der hinteren Seite.

Bei Umwendung des unteren Bruchstücks nach Vorn ist gleichfalls gegenseitige Einkeilung beobachtet worden; jedoch ist diese Art des Bruches sehr viel seltener (vgl. Fig. 45 u. 46)¹⁾.

Die scheinbare Differenz in den Angaben von Goyrand und Voillemier beruht darauf, dass jeder von beiden die von ihm beobachtete Varietät des Bruches als die allein vorkommende hinstellt. Es giebt aber, wie an anderen Knochen, so auch hier, Schrägbrüche mit Verschiebung (Goyrand) und Querbrüche mit Einkeilung (Voillemier). Die Verschiebung kann durch Muskelzug bewirkt werden; die Einkeilung verdankt ihre Entstehung immer der fracturirenden Gewalt.

Die **Veranlassung** eines Bruches im unteren Drittheil des Radius ist fast immer ein Fall auf die Hand. Bei einem Fall auf die Volarfläche entsteht entweder ein Schrägbruch, der von Oben und Hinten nach Unten und Vorn verläuft, oder ein Querbruch mit Um-drehung des unteren Bruchstückes nach der Dorsalseite und mit gegenseitiger Einkeilung der Bruch-Enden. Bei einem Fall auf die Dorsalfläche der Hand sollen Fractur und Verschiebung in umgekehrter Richtung zu Stande kommen.

Soll eine direct einwirkende Gewalt diesen Bruch hervorrufen, so muss sie mit sehr grosser Kraft einwirken, wodurch dann Zermalmung der Weichtheile Statt findet; so z. B. bei Schusswunden.

Durch Versuche an Leichen und klinische Beobachtungen hat Voillemier nachgewiesen, dass auch durch eine übermässige Beugung oder Streckung im Handgelenk Brüche am unteren Ende des Radius entstehen können. Nach den Untersuchungen von Lecomte²⁾ hinge dieser Bruch sogar immer von der bei einem Fall auf die Hohlhand stattfindenden Hyperextension der Hand ab.

Hier sieht man, dass die Bruch-Enden über einander geschoben sind; das untere Bruchstück ist mit der Gelenkfläche nach Hinten gewandt. Die Linie *a* läuft über das vorn ganz abgelöste Knochenstück, welches über der Basis des Processus styloideus in Fig. 43 zwischen *d* und *b* sich befindet. Das obere Bruchstück ist zugleich nach der Seite *b*, also gegen die Ulna hin geneigt, bei *d* befindet sich die Gelenkfläche für das Capitulum ulnae.

¹⁾ Fig. 45. Umwendung des unteren Bruch-Endes nach Vorn. Der Knochen ist nach erfolgter Heilung der Länge nach durchschnitten. *a* Vordere Fläche des Radius, *b* hintere Fläche. *c* Grenze der dickeren compacten Schicht des Knochens. *d* Winkliger Vorsprung an der ehemaligen Bruchstelle. *e* Processus styloides. — Fig. 46. Das untere Bruchstück ist nach Vorn gedreht. *a* Vordere Fläche des Radius. Substantia compacta des oberen Bruchstückes bis *d* in das untere eingekleilt, erscheint zwischen *b e* ungemain verdickt; der Bruchstelle *c* entsprechend ist sie auch an der hinteren Fläche verstärkt. *f* Processus styloides.

²⁾ Recherches nouvelles sur les fractures indirectes de l'extrémité inférieure du radius. Archives générales de médecine. Decembre 1860.

In den Fällen, in denen ein Sturz auf die Dorsalseite die Fractur veranlasst haben soll, wäre, nach Lecomte, anzunehmen, dass die Hand Anfangs mit der Volarseite den Boden berührte, bei der weiter fortwirkenden Gewalt des Sturzes aber auf die Dorsalseite umgewandt wurde. Lecomte konnte durch experimentelle Nachahmung des Falls auf die Dorsalseite keine Fractur am unteren Ende des Radius erzeugen. Die Gewalt, welche beim Sturz auf die Dorsalseite der Hand nur ein, höchstens zwei *Capitula ossium metacarpi* treffen kann, wird auf die zweite Reihe der Handwurzelknochen fortgepflanzt und veranlasst eine starke Beugung der Hand, welche in der *Articulatio binorum ordinum* geschieht. Die Gewalt concentrirt sich auf dieses Gelenk allein, sie wirkt nicht auf den Radius. Bei einem Fall auf die Volarseite der Hand kann, nach Lecomte, der Stoss sich nicht direct auf den Radius fortpflanzen, so dass der Radius unter Einwirkung zweier Gewalten, des Widerstandes des Bodens und des Gewichtes des Körpers, zerbrüche. Den Boden berühren beim Fall auf die vorgestreckte Hand keineswegs das *Os naviculare* und das *Os pisiforme*, sondern die Bases der Metacarpalknochen. Bei starker Streckung im Handgelenk, in welcher beim Sturz die *Vola manus* den Boden berührt, pflanzt sich die einwirkende Gewalt in directer Richtung nicht gegen den Radius, sondern gegen die vordere Wand des Kapselbandes fort. Diese (*Ligamentum carporadiale anterius*) ist sehr stark, hat zahlreiche Insertionen an der Handwurzel und ist im ganzen vorderen Umfange des Radius angeheftet. Sie wird stark gespannt bei der Streckung im Handgelenk und noch mehr gespannt, wenn die Streckung mit grosser Gewalt ausgeführt wird, oder die dem Radius zugewandten Flächen der Handwurzelknochen mit grosser Gewalt gegen dasselbe vorgetrieben werden, wie es beim Fall auf die Volarseite der Hand geschieht. Das Band leistet, vermöge seiner grossen Stärke, gewöhnlich Widerstand; nicht ZerreiSSung des Bandes erfolgt, sondern Abreissung des unteren Endes des Radius. Uebermässige Streckung im Handgelenk ist also, nach Lecomte, nothwendig zum Zustandekommen einer Fractur im unteren Ende des Radius.

Diagnose. Gewöhnlich empfindet der Patient im Augenblicke der Verletzung selbst ein Krachen am Handgelenk. Alsbald stellt sich eine circumscribte Geschwulst ein. Sofern diese nicht allzu bedeutend ist, kann man die charakteristischen Formveränderungen an dem unteren Ende des Vorderarms wahrnehmen. Derselbe bekommt statt seiner sonst abgeflachten Gestalt eine beinahe cylindrische, welche, je nach der Art des Bruches, noch verschiedene Eigenthümlichkeiten darbietet. — Beim Schrägbruch (von Oben und Hinten nach Unten und Vorn) wie bei Einkerbung mit Umdrehung des unteren Bruch-Endes nach Hinten findet sich folgende Difformität: Hervorragung nach Hinten und Aussen in der Gegend des Handgelenks, Einbiegung auf der Dorsalseite des Vorderarms, 15 bis 25 Millim. oberhalb des Gelenkes, und eine breite Quersfurche an der Palmarseite des Gelenkes, welche durch den Rand des oberen Bruch-Endes und die durch dasselbe emporgehobenen Beugeschnen begrenzt wird; das *Capitulum ulnae* bildet einen Vorsprung an der vorderen Seite, welcher besonders in der Supination deutlich ist; die Hand ist nach Vorn geneigt (gebeugt), und zwar um so mehr, je stärker die Gegend des Hand-

Fig. 47.



Fig. 48.



gelenkes nach Hinten hervorspringt¹⁾. — Bei einem Schrägbruch von Oben und Vorn nach Unten und Hinten, sowie bei Umdrehung des unteren Bruch-Endes nach Vorn ist die Hand nach Hinten geneigt, und die Gelenk - Gegend bildet einen Vorsprung an der vorderen Seite. — Beim Sternbruch besteht in der Gegend des Gelenkes ein Vorsprung nach Aussen.

Bei allen Brüchen am unteren Ende des Radius besteht eine Einbiegung am Ra-

dialrande des Vorderarms, dicht oberhalb des Gelenkes, ein auffallender Vorsprung an der Ulnarseite (durch den *Processus styloides ulnae* bedingt, Fig. 48), Stellung der Hand in Adduction gegen das untere Bruchstück, d. h. Ulnarflexion. Nur wenn das *Ligamentum laterale internum* zerrissen oder der *Processus styloides ulnae* abgebrochen ist, folgt die Hand völlig der Verschiebung des unteren Bruch-Endes.

Besteht noch keine Geschwulst oder ist dieselbe wieder geschwunden, so kann man die Bruchstelle fühlen; jedenfalls besteht an der Bruchstelle heftiger Schmerz, welcher durch Druck in hohem Grade gesteigert, durch Bewegungen im Handgelenk aber nicht erheblich vermehrt wird. Ueberdies findet sich bedeutende Schmerzhaftigkeit dicht unter dem Griffelfortsatz der Ulna, wegen der Zerrung des inneren Seitenbandes.

Bei Querbrüchen, mit Einschluss der Ablösung der Epiphyse, wäre eine Verwechslung mit Verrenkung im Handgelenk möglich. Bei einer solchen ist aber die Stellung des *Processus styloides radii* im Verhältniss zur Handwurzel stets eine abnorme, während

¹⁾ Fig. 47 und 48. Abbildungen eines Querbruches des unteren Radius-Endes mit leichter Einkeilung, von Richert nach der Natur gezeichnet. Fig. 48 zeigt die Abweichung der Mittellinie des Vorderarms in der Gegend des Handgelenks.

derselbe bei dem in Rede stehenden Bruch in der normalen Stellung zur Hand bleibt, von der Achse des Radius aber abweicht.

Crepitation ist nur bei Splitterbrüchen deutlich. Sie kann bei diesen durch Druck mit dem Finger hervorgerufen werden; in allen übrigen Fällen, folglich in der Mehrzahl, ist sie schwer zu entdecken. Besteht Einkeilung, so fehlt sie in der Regel gänzlich.

Ein Symptom, auf welches man bei Brüchen des Radius früher Werth legte, die Unbeweglichkeit des Capitulum radii bei Versuchen, durch Drehungen an der Hand den ganzen Radius zu bewegen, findet sich bei Brüchen am unteren Ende dieses Knochens fast niemals. Die Bruchstücke berühren sich so innig, und mit so breiten Flächen, dass, auch ohne Einkeilung, das obere Bruch-Ende den Bewegungen des unteren doch folgt.

Als Cardinalsymptome eines Bruches am unteren Ende des Radius können wir somit aufstellen: 1) die durch Abweichung der Hand und des Handgelenkes von der Achse des Vorderarms bedingte Difformität, 2) den Schmerz, welcher nicht im Handgelenk, sondern am unteren Ende des Radius seinen Sitz hat und durch Druck beträchtlich gesteigert wird, 3) den Vorsprung des unteren Endes der Ulna.

Die **Prognose** ist bei Brüchen im unteren Ende des Radius bedenklicher, als bei solchen im Mittelstück, wegen der, besonders bei älteren Individuen, häufig zurückbleibenden Steifigkeit des Handgelenks. Jedoch gibt es Fälle genug, in denen die Beweglichkeit des gedachten Gelenkes auch bei alten Leuten sich vollständig wieder herstellt. Wird keine Behandlung eingeleitet, so bleibt eine, zuweilen nicht unerhebliche Difformität zurück, welche jedoch die Function der Hand meist wenig beeinträchtigt. Waren zugleich die Bänder des Handgelenks zerrissen, so kann eine abnorme Beweglichkeit zurückbleiben. Anderer Seits kann Steifigkeit im Handgelenk oder auch Steifigkeit der Finger die Folge sein, wenn man den Verband zu lange liegen lässt und nicht frühzeitig passive Bewegungen vornimmt. Die Steifigkeit der Finger, welche mit permanenter Krümmung verbunden sein kann (Goyrand), erklärt sich aus der Festheftung der Sehnen im Callus.

Behandlung. Zum Behuf der Reduction dient die Extension an der Hand, insbesondere am Daumen, mit gleichzeitiger Ulnarflexion. Bonnet empfiehlt die Extension bei stark gebeugter Hand, wovon jedoch nur bei bedeutender Verschiebung des unteren Bruch-Endes nach Hinten und Oben besonderer Erfolg zu erwarten sein möchte. Druck auf die Weichtheile der Dorsal- und Volar-Seite des Vorderarms ist hier keineswegs in der Weise wirksam, wie bei Brüchen der

Vorderarmknochen in ihrer Mitte, indem an dieser Stelle ein Spatium interosseum und somit auch Verschiebung der Bruch-Enden in dasselbe hinein nicht besteht. Die Coaptation erfolgt, indem man die Bruch-Enden in der ihrer Verschiebung entgegengesetzten Richtung gegen einander drückt.

Für die Retention sind zahlreiche Verbände erfunden worden. Cline und A. Cooper suchten der Neigung des Handgelenks nach der Radialseite entgegen zu wirken, indem sie die Hand aus einer den Vorderarm in halber Pronation umfassenden Mitella frei hervorbängen liessen, damit sie, durch ihr Gewicht nach der Ulnarseite hinabsinkend, das untere Bruch-Ende abwärts zöge. Dupuytren wollte dieselbe Aufgabe durch eine in der Gegend des Handgelenks knieförmig gebogene (sogen. Pistolen-) Schiene lösen.

Nach Goyrand soll es sich um die Bekämpfung einer dreifachen Verschiebung handeln: 1) der Dislocatio ad latus, indem das untere Bruch-Ende nach Hinten (sehr selten nach Vorn) verschoben wird, 2) der Dislocatio ad longitudinem und 3) der winkligen Verbiegung durch Eindringen der Bruch-Enden in das Spatium interosseum. Goyrand selbst hob die ersterwähnte Verschiebung bereits als die wichtigste hervor; die 3. ist, wie wir schon sahen, von gar keiner Bedeutung. Jener Dislocatio ad latus zu begegnen, legt er ein dickes viereckiges Kissen (Polster) auf die Dorsalseite (bei der seltneren Verschiebung nach Vorn, auf die Volarseite) des unteren Bruch-Endes, darüber eine gewöhnliche Schiene, auf die entgegengesetzte Seite aber ein mit seiner Spitze gegen die Hand gerichtetes keilförmiges Kissen, auf welches gleichfalls eine Schiene zu liegen kommt.

Diday empfiehlt, auf die Palmarseite eine bis zum Handgelenk reichende Schiene zu legen, die Dorsalschiene bis zur Mitte des Metacarpus hinabsteigen und den Ulnarrand derselben von der Höhe des Handgelenks ab stärker hervorragen zu lassen, so dass die daran befestigte Hand nach Innen und Hinten gezogen wird. Ausserdem legt er auf die Dorsalseite des unteren Bruchstücks eine dicke Comresse, um es nach Vorn zu schieben.

Velpeau meinte, dass auch ohne Verband die Hand, wenn sie nur 6 Wochen lang vollständig geschont würde (!), ihre Brauchbarkeit wieder erlange. Bei bedeutender Verschiebung bediente er sich des gewöhnlichen Vorderarm-Verbandes mit der Abänderung, dass er die hintere graduirte Comresse bis zum Metacarpus hinabsteigen, die vordere aber keilförmig zugespitzt am Handgelenk endigen liess, dann auf jeder Comresse eine Pappschiene durch eine mit Dextrin bestrichene Binde befestigte.

Der Gedanke einer permanenten Extension, welcher schon der Anwendung einer winklig gebogenen Schiene zu Grunde liegt, ist besonders von Huguier weiter ausgeführt worden. Derselbe befestigt durch vollständige Einwickelung der Hand mittelst

einer Binde 4 Schlingen an derselben¹⁾, 2 an der vorderen, 2 an der hinteren Seite. Compressen und Schienen werden mit Binden in der Art auf der Dorsal- und Volarseite des Vorderarms und der Hand befestigt, dass letztere weit über die Fingerspitzen hinausragen; an ihren Enden sind Knöpfe zur Befestigung der Schlingen und an ihren Rändern Einschnitte, damit sie durch die Touren der Binde sicherer in ihrer Lage gehalten werden. Sollte dies zur Verbütung der Verschiebung nicht ausreichend erscheinen, so giebt Huguier dem hinteren Ende der Dorsalschiene in einer an der hinteren Seite des Oberarms angelegten Hülfschiene einen Stützpunkt und lässt die Volarschiene sich gegen die vordere Fläche des Oberarms anstemmen, wobei die unter ihr liegende Comresse gegen den Oberarm hin hervorragt, um letzteren vor dem Druck der Schiene zu schützen.

Voillemier, ausgehend von der Ansicht, dass eine andere Verschiebung als die Umwendung des unteren Bruchstücks nicht vorkomme und dass von einer Verschiebung in das Spatium interosseum gar nicht die Rede sein könne, lässt die graduirten Compressen ganz fort und legt, nachdem er durch directe Einwirkung auf die Bruchstelle die Reduction vorsichtig zu bewirken gesucht hat, Longuetten, die eine auf die Dorsal-, die andere auf die Volarseite. Erstere wird nahe dem Handgelenk mehrfach zusammengelegt, um ein das untere Bruch-Ende nach Vorn schiebendes Kissen darzustellen. Die vordere Schiene reicht nur bis zur Bruchstelle, die hintere bis zu den Fingern. So bei der gewöhnlichen Richtung der Bruchlinie. Wäre das untere Bruchstück nach Vorn umgewendet, so müsste der Verband gerade in entgegengesetzter Weise angelegt werden.

Nélaton folgt im Allgemeinen den Ansichten von Voillemier, beabsichtigt aber die Reduction allmählig durch den Verband zu bewirken. Zu diesem Behuf legt er auf die Dorsalseite der Handwurzel und des unteren Bruch-Endes mehrere graduirte Compressen in querer Richtung. Auf die vordere Seite dagegen werden der Länge nach graduirte Compressen gelegt, deren untere Enden, 1 Centim. oberhalb des durch das obere Bruch-Ende gebildeten Vorsprungs, zu einem dicken Wulst zusammengefaltet sind. Hierauf werden lange Schienen in der gewöhnlichen Weise durch eine Binde befestigt. Die Dorsalschiene berührt den Vorderarm nur in seinem oberen Theile, weiter unten wird sie durch die auf das untere Bruch-Ende gelegten Compressen von ihm entfernt gehalten. Die Palmarschiene dagegen ruht auf den oberhalb des Handgelenks angelegten Compressen, so dass zwischen ihr und dem unteren Ende des Vorderarms ein leerer Raum bleibt. Werden die Schienen nun durch die angelegte Rollbinde fest an den Arm angeedrückt, so treiben sie die Bruchstücke in

¹⁾ Der Verband würde besser halten, wenn man Binden und Schlingen mit Heftpflaster bestriche und aufklebte.

umgekehrter Richtung jede in den ihr gegenüber liegenden leeren Raum und somit in die normale Stellung. Auch bei diesem Verbands muss die Anordnung desselben die umgekehrte sein, wenn das untere Bruchstück nach Vorn umgewendet ist. Ist die Seitenabweichung sehr bedeutend, so legt Nélaton ausserdem die von Dupuytren empfohlene, knieförmig gebogene Schiene an.

Bonnet befestigt, da er für die Retention wie für die Reposition starke Beugung der Hand als das geeignetste Mittel ansieht, das untere Ende des Vorderarms und die Hand über einem convex gepolsterten Kissen, welches einen Halbkreis von 3 bis 4 Centimeter Halbmesser bildet.

Betrachten wir diese verschiedenen Behandlungsweisen vom praktischen Standpunkte, so muss zuerst die Nothwendigkeit einer möglichst vollständigen Reduction hervorgehoben und in dieser Beziehung namentlich gegen das Verfahren von Nélaton protestirt werden. Selbst wenn Einkeilung besteht, kann durch die, mittelst des gewöhnlichen Extensionsverfahrens bewirkte Reduction die Wahrscheinlichkeit einer Heilung ohne Difformität nur erhöht werden. Für die Retention sind vor Allem die Pouteau'schen Cylinder und graduirten Compressen als nutzlos zu bezeichnen. Die Verschiebung des oberen Bruch-Endes gegen die Ulna hin, welche durch dieselben verhütet werden sollte, fehlt in der Regel ganz, da die Knochen hier ohnehin nahe an einander liegen, und erheischt jedenfalls keine Berücksichtigung¹⁾. Lässt sich die Reduction gut ausführen, so ist der von Voillemier angegebene Verband der zweckmässigste. Gelingt die Reduction nicht, und muss man daher durch den Verband selbst die Dislocation zu bekämpfen suchen, so ist in der von Nélaton empfohlenen Weise zu verfahren.

Bei Schrägbrüchen mit Kreuzung der Bruch-Enden ist die Dupuytren'sche Schiene zu empfehlen. Diese Verbände können auch bei Zersplitterung des Gelenk-Endes des Radius von Nutzen sein, sofern diese nicht wegen der bestehenden Complicationen die Retention erheischen.

Bei Ablösung der unteren Epiphyse des Radius braucht man, wegen der geringen Neigung zur Verschiebung, nur gepolsterte oder mit Heftpflaster umwickelte Schienen auf die Volar- und Dorsalseite des unteren Radius-Endes zu legen und mit einer Binde zu befestigen. Die Dorsalschiene lässt man bis zum Handrücken, die Volarschiene bis an die Grenze des Handballens hinabreichen.

¹⁾ Vgl. Linhart l. c.

Bei allen einfachen Brüchen des unteren Radius-Endes müssen frühzeitig passive Bewegungen der Hand und der Finger vorgenommen werden, um Steifigkeit zu verhüten. Schon nach 3 Wochen kann man den Verband ganz entfernen. Bis dahin aber muss derselbe schon mehrmals erneuert und bei jeder Erneuerung müssen mit Vorsicht passive Bewegungen versucht werden.

C. Brüche der Ulna.

Brüche der Ulna sind viel seltener als diejenigen des Radius. Man unterscheidet den Bruch des Körpers der Ulna (auch „Bruch der Ulna“ schlechtweg genannt) und die Brüche ihrer Fortsätze, des Olecranon nämlich und des Processus coronoides.

a) Brüche des Körpers der Ulna.

Der Bruch kann zwar an verschiedenen Stellen, namentlich auch im dicksten Theile des Knochens (mit gleichzeitiger Luxatio radii), vorkommen, findet sich aber in der Mehrzahl der Fälle am unteren Ende, welches dünner ist und oberflächlicher liegt.

Die **Veranlassung** ist fast immer directe Gewalt, ein Schlag, z. B. der Hufschlag eines Pferdes, auch der Biss eines grösseren Thieres u. dgl. m. Jedoch können auch Brüche der Ulna durch Gegenschlag entstehen, in Folge eines Falles auf die vorgestreckte Hand, namentlich beim Fall auf die Dorsalseite.

Ich habe drei Brüche des unteren Dritttheils der Ulna behandelt, welche durch Fall hintenüber auf die Dorsalseite der Hand entstanden waren. Der eine der Verletzten fiel, mit schwerem Gepäck auf dem Rücken, auf dem Glatteis, die anderen beiden auf ebener Erde. — Hamilton Labatt sah bei einem gesunden Mädchen von 18 Jahren eine Fractur der Ulna in Folge der Anstrengungen beim Auswringen der Wäsche, also durch übermässige active Drehung.

Diagnose. Verschiebung findet sich nur am unteren Bruch-Ende, welches durch den Pronator quadratus gegen den Radius hingezogen werden kann; dass zwischen Humerus und Ulna bestehende Charniergelenk gestattet eine Verschiebung des oberen Bruch-Endes nicht. Man entdeckt, selbst wo keine Verschiebung besteht, abnorme Beweglichkeit und Crepitation, wenn man die Finger an der inneren Fläche und dem hinteren Rande der Ulna hingleiten lässt.

Die Complication mit Verrenkung des Radiusköpfchens werden wir bei letzterer erläutern.

Die **Reduction** geschieht, wie beim Bruch beider Vorderarmknochen; nur neigt man die Hand möglichst stark nach dem Radialrande. Auch der Verband ist derselbe.

Bei nachlässiger Behandlung könnte das untere Bruch-Ende mit dem Radius verwachsen, wodurch die Drehbewegungen des Vorderarms vernichtet werden würden. Jedoch scheint eine solche difforme Callusbildung sehr selten und immer erst nach längerer Zeit einzutreten (Chassaiguac).

b) Brüche des Olecranon.

Trotz seiner oberflächlichen Lage bricht das Olecranon selten. Der Bruch kann an der Spitze, an der Basis oder auch in der Mitte seinen Sitz haben und verläuft fast immer quer, sehr selten schräg. Auch Splitterbrüche kommen vor. Complication mit beträchtlichem Bluterguss in's Gelenk ist sehr gewöhnlich; auch heftige Quetschung und Wunden compliciren diese Fractur nicht selten.

Veranlassung ist fast immer directe Gewalt. In einigen Fällen brach das Olecranon durch Contraction des Triceps.

Die **Diagnose** ist gemeinhin leicht. Nach einem Fall oder Schlag auf den Ellenbogen entsteht daselbst Geschwulst und Schmerzhaftigkeit; der Vorderarm wird halbgebeugt gehalten, und der Kranke kann ihn nicht willkürlich strecken, während der Wundarzt ihn ohne Schwierigkeit in diese Stellung bringen kann. Bei genauerem Zufühlen entdeckt man die Bruchlinie und die Beweglichkeit des abgebrochenen Stücks, welches, trotz der Beugung des Vorderarms, höher liegt, als die Condylen. Der Zwischenraum an der Bruchstelle ist durch einen Erguss von Blut und Synovia erfüllt, durch welchen eine ansehnliche, weiche Geschwulst bedingt wird. Streckt man den Vorderarm und drängt das abgebrochene Stück hinab, so gelingt es, die Bruch-Enden in Berührung zu bringen und Crepitation hervorzurufen, indem man das obere Bruchstück von einer Seite zur andern schiebt. Bei bedeutender Geschwulst und beträchtlichem Hervortreten des Olecranon an der hinteren Seite könnte der Verdacht einer Verrenkung des Vorderarms nach Hinten entstehen. Die Möglichkeit der passiven Beugung und Streckung im Ellenbogengelenk sichert die Diagnose.

Die Verschiebung ist in der Regel nicht bedeutend, weil die fibrösen Fasern, mit denen die Triceps-Sehne das ganze Olecranon umfasst, gewöhnlich nicht vollständig zerreißen. Jedoch kommen auch Fälle vor, in denen der Zwischenraum zwischen dem abgebrochenen Stück des Fortsatzes und der übrigen Ulna bis zu 5 Centim. beträgt. Manchmal wird derselbe erst durch unvorsichtige Bewegungen oder anderweitige Insultationen nachträglich vergrößert, indem die bis dahin unversehrten Sehnenfasern, welche die Bruch-Enden an einander hielten, zerreißen.

Die **Prognose** ist günstig, wenn keine Complicationen bestehen.

Es gelingt gewöhnlich, die Brauchbarkeit des Armes zu erhalten, obgleich nur höchst selten knöcherne Vereinigung zu Stande kommt. Die fibröse Zwischensubstanz giebt aber dem Olecranon einen hinreichend festen Halt, um jede Bewegung, auch eine kräftige Extension zu gestatten. Dass nur der Mangel der Berührung beider Bruchflächen die Bildung eines normalen Callus verhindert, ist durch Versuche und Beobachtungen erwiesen. A. Cooper brachte Hunden Längsbrüche des Olecranon bei und sah diese durch einen vollständigen Callus heilen. Hat der Bruch seinen Sitz nahe an der Basis des Olecranon, so wird eine Verschiebung durch die dasselbe hier umfassenden Bandfasern fast gänzlich verhindert; in diesen Fällen erfolgt dann auch in der Regel Vereinigung durch knöchernen Callus.

Bedenklich ist die Prognose, wenn heftige Quetschung oder eine in das Gelenk eindringende äussere Wunde, oder wenn Splitterung besteht. In solchen Fällen sieht man Eiterung im Gelenk und in seiner Umgebung, sowie auch bedenkliche nervöse Symptome (Tetanus) folgen¹⁾. Auch an die Möglichkeit der Weiterverbreitung der Entzündung in dem spongiösen Gewebe der Ulna muss gedacht werden (Pitha).

Behandlung. Man will einer Seits die Bruch-Enden in möglichst nahe Berührung bringen, anderer Seits aber Steifigkeit im Ellenbogengelenk verhüten. Genaue Berührung der Bruch-Enden würde man am Vollständigsten bei ganz gestrecktem Arme erreichen. Diese Stellung aber setzt den Kranken im höchsten Grade der Gefahr der Ankylose aus und ist überdies sehr schwer zu ertragen. Daher gab und giebt es denn zwei Parteien. Die Einen wollen vor Allem genaue Vereinigung erzielen und bringen daher den Arm in vollständige Streckung (Dupuytren, A. Cooper), die Andern fürchten die Gelenksteifigkeit bei einer solchen Behandlung und geben daher der gebeugten Haltung den Vorzug (Desault, Earle, Boyer), oder lassen jeden Verband fort (Camper, Kluyskens).

Um den Arm in gestreckter Stellung zu befestigen, wandte Dupuytren einen Verband an, wie er Bd. I. pag. 149 beschrieben und abgebildet ist, welchen er aber durch oberhalb des Olecranon angelegte graduirte Compressen und durch eine gerade Schiene, welche auf der vorderen Seite des Armes mit einer Binde befestigt

¹⁾ Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass jede Fractur des Olecranon in das Gelenk dringt, dass mithin dieser Bruch ohne alle Gelenkverletzung gar nicht vorkommt und, sobald er mit einer die Bruchstelle blosslegenden Wunde complicirt ist, auch eine Eröffnung des Ellenbogengelenks involvirt.

wurde, verstärkte. — In derselben Absicht legte Wardenburg zwei schmale Bänder zu den Seiten des Olecranon nach der Länge des Armes von der Schulter bis zur Hand an. Oberhalb des Olecranon werden dieselben mittelst mehrerer Cirkeltouren befestigt. Alsdann werden die oberen Enden der Bänder gegen die Hand hin umgeschlagen und durch Zug an denselben das abgebrochene Olecranon möglichst stark abwärts geschoben. Eine von der Hand aufsteigende Binde befestigt diese Band-Enden gegen den Vorderarm, während durch eine dritte von der Schulter abwärts steigende Binde die Wirksamkeit des Triceps beeinträchtigt werden soll. — Aehnlich ist die Wirkungsweise der Verbände von A. Cooper, Böttcher und Feiler, obgleich sie weniger sicher wirken, als der Bindenverband von Wardenburg. A. Cooper legt zwei Bandstreifen der Länge nach neben das Olecranon, befestigt sie durch Cirkeltouren oberhalb und unterhalb des Olecranon und bindet dann das obere Ende jedes Streifens mit dem unteren zusammen¹⁾. In die Ellenbeuge legt er überdies eine gepolsterte Schiene. Böttcher's Verband besteht in einem gepolsterten Riemen, der oberhalb des Olecranon um den Arm festgeschnallt wird und dessen Verschiebung nach Oben durch zwei an ihm befestigte schmalere Riemen, welche am Vorderarm abwärts und dann zwischen Daumen und Zeigefinger hindurchgehen, verhütet wird. Auf der vorderen Seite des Ellenbogengelenks befestigt man eine gepolsterte Schiene durch Bindentouren. Feiler legt zuerst über das Olecranon quer eine Longuette an, deren Enden in der Ellenbeuge gekreuzt werden, wickelt den ganzen Arm mit einer Binde ein und befestigt darüber erst den Ledergurt, dessen abwärts steigende Riemen an einen Handschuh angeschnallt werden²⁾. Ueberdies empfiehlt er eine schwache Beugung im Ellenbogengelenk. Dieselbe geringe Beugung, etwa bis zu 160°, empfehlen auch: Desault, Bell, Earle, während Richter eine etwas stärkere Beugung, Boyer und Roux sogar eine Beugung bis zum rechten Winkel anrathen.

Die mittlere Beugung verdient jedenfalls den Vorzug, da sie am Wenigsten Ankylose befürchten lässt, da ferner, wenn diese eintritt, das Glied sich doch in einer möglichst brauchbaren Stellung befindet, und da die Coaptation nach einigen Tagen (indem der Triceps, seines Insertionspunktes beraubt, alsdann vollständig erschlafft) in mässiger Beugung ebenso gut gelingt, wie in vollständiger Exten-

¹⁾ Vgl. die Abbildung des entsprechenden Verbandes beim „Bruch der Kniescheibe“.

²⁾ Derselbe Verband ist neuerdings noch ein Mal erfunden worden von E. A. Clark in St. Louis (Humboldt Med. Archiv. 1868. July).

sion. — Während der ersten Tage ist es zweckmässig, einen festen Verband an der Bruchstelle nicht in Anwendung zu ziehen, sondern das Gelenk nur (durch einen gefensterten Gypsverband oder durch aufgeklebte Blechschienen) zu fixiren und Eis aufzulegen, um die (wegen der unvermeidlichen Gelenkverletzung) fast immer bestehende und oft sehr heftige Entzündung zu bekämpfen. Erst wenn die Geschwulst beseitigt ist, schreite man zur Coaptation. Die Befestigung des abgebrochenen Olecranon selbst geschieht am Besten durch Heftpflaster- oder Gypsbinden-Streifen, durch welche man zugleich der sonst leicht eintretenden seitlichen Verschiebung vorbeugen kann. Bleibt die Entzündung des Gelenkes aus, so legt man den Verband früher an; ebenso bei Tobsüchtigen¹⁾. — Jedenfalls müssen nach Ablauf eines Monats vorsichtige Bewegungen im Ellenbogengelenk vorgenommen werden. Dieselben schon in den ersten Tagen, mit Hinweglassung jedes Verbandes, ausführen zu lassen, erscheint bedenklich, obgleich dies, zuerst von Peter Camper empfohlene Verfahren neuerdings an Kluyskens²⁾ einen eifrigen Lobredner und durch dessen Beobachtungen thatsächliche Unterstützung gewonnen hat. — Sollte durch andauernde Contraction des Triceps das obere Bruch-Ende zu weit von dem unteren entfernt gehalten werden, so wäre entweder die Malgaigne'sche Klammer, wie beim Bruch der Patella (siehe unten), anzulegen, oder die subcutane Durchschneidung der Triceps-Sehne vorzunehmen, welche Dieffenbach in veralteten Fällen mit gutem Erfolge ausgeführt hat. Erstere dürfte wohl ausreichen. — Brüche des Olecranon, welche mit einer die Bruchstelle blosslegenden Wunde oder Zerstörung der bedeckenden Weichtheile complicirt sind, muss man, da durch Vermittlung der Bruchstelle stets das Gelenk geöffnet ist, wie schwere Gelenkverletzungen behandeln. Vgl. d. folgd. Abschnitt.

Bruch des Processus coronoides ulnae.

Bis jetzt sind nur ein Paar Dutzend Fälle von Bruch des Proc. coronoides ulnae beschrieben; einige davon sind noch zweifelhaft.

Am Ausführlichsten haben von diesem Bruch gehandelt: A. Cooper, Lörinser (Zeitschrift der Wiener Aerzte, 1851, August), Zeis (Ueber Fractur d. Proc. coronoid.

¹⁾ Bei einem Manne, der bald, nachdem er einen mit penetrierender Wunde complicirten Splitterbruch des Olecranon erlitten, am Delirium tremens bedenklich erkrankte, hat mir ein sofort angelegter (gefensteter) Gypsverband vortreffliche Dienste geleistet. (Greifswalder Klinik, 1858.)

²⁾ Kluyskens, Sur le traitement des fractures de la rotule et de l'olécrane. Annales de la Société de méd. de Gand, 1851.

ulnae und über die Hüften daraus hervorgehende Luxation des oberen Endes des Radius. Breslau 1859) und Lotzbeck (Die Fractur des Proc. coronoid. der Ulna. München 1865, ärztl. Intellig.-Bl. 1866, No. 8).

Der Kronenfortsatz bildet den Vereinigungspunkt des Ringbandes des Radius und des Ligamentum laterale externum. Da ersteres eine Fortsetzung des Ligamentum laterale internum darstellt, so kann man sagen, dass er von den Ausstrahlungen beider Seitenbänder umfasst werde. Hierdurch behält der abgebrochene Kronenfortsatz noch einen gewissen Halt; das Gelenk aber verliert aus demselben Grunde beträchtlich an Festigkeit, wenn dieser Fortsatz abbricht.

Die **Veranlassung** dieses Bruches muss immer eine, in der Richtung des Oberarms auf den gestreckten Vorderarm einwirkende Gewalt sein, da nur in dieser Stellung der untere Theil des Processus cubitalis humeri auf dem Processus coronoides ruht, während der vordere die Ulna gar nicht berührt. Jedoch darf der Vorderarm nicht auf's Aeusserste gestreckt sein, weil sonst das Olecranon sich in der Fossa humeri maxima anstemmt und die einwirkende Gewalt daher den Kronenfortsatz nicht allein trifft. Die gewöhnliche Veranlassung ist daher ein Fall auf die vorgestreckte Hand.

Liston sah ausnahmsweise eine Fractur des Processus coronoides bei einem Knaben, der lange an einer Mauer mit den Händen angeklammert gehangen hatte. Hier handelte es sich offenbar um eine Fractur durch Muskelzug bei der übermässigen Anstrengung der Armmuskeln, in specie des Brachialis internus, um das Gewicht des Körpers zu tragen. — Kühnholz (Ephémérides méd. de Montpellier, 1826) beschreibt Brüche des Kronenfortsatzes durch directe Gewalt, „durch welche allein die Basis des Fortsatzes abbrechen könne und durch welche dann zugleich immer auch bedeutende Verletzungen der benachbarten Theile herbeigeführt würden.“ In solchen Fällen ist die Fractur des Kronenfortsatzes wohl Nebensache.

Diagnose. In der Regel besteht zugleich mit dem Bruch des Processus coronoides Verrenkung des Vorderarms nach Hinten, obgleich nach den Versuchen von Lorinser das Abschlagen des Kronenfortsatzes an einer Leiche die Erzeugung einer Verrenkung wenig erleichtert, vielmehr eine Zerreiſung der Seitenbänder hierzu erforderlich ist. Es ist aber höchst wahrscheinlich, dass eine Gewalt, welche, in der Richtung des gestreckten Armes einwirkend, einen Bruch des Kronenfortsatzes herbeizuführen vermag, auch immer die Seitenbänder überwinden und somit Verrenkung beider Vorderarmknochen oder der Ulna allein nach Hinten zur Folge haben wird. Wir werden hierauf bei den Vorderarm-Verrenkungen zurückkommen.

Ein einfacher Bruch des Kronenfortsatzes würde, abgesehen von der specifischen Schmerzhaftigkeit beim Druck auf die Bruchstelle und der sehr erheblichen Anschwellung des Gelenkes, folgende

Symptome darbieten: Unfähigkeit des Kranken, den Arm vollkommen zu beugen; Fühlbarkeit und Beweglichkeit des Processus coronoides in der Ellenbeuge, besonders wenn die Geschwulst erst gesunken ist; endlich eine starke Ecchymose, welche in der Gegend des Kronenfortsatzes zwischen dem zweiten und vierten Tage hervortritt¹⁾. Besteht zugleich Verrenkung des Vorderarmes nach Hinten, so wird sich diese dadurch von der gewöhnlichen Verrenkung unterscheiden, dass sie durch den leichtesten Zug vorübergehend eingerichtet werden kann, oder sogar durch blosse Beugung des Armes verschwindet, beim Nachlass des Zuges (oder der Beugung) aber sogleich wieder eintritt.

Die **Prognose** ist in Bezug auf die spätere Brauchbarkeit des Armes keineswegs unbedenklich. Tritt knöcherne Vereinigung ein, so kann der Callus die vollständige Beugung hindern. Bei blos ligamentöser Verbindung ist zwar die Beugung des Armes vollständig ausführbar; aber die zurückbleibende Neigung zur Verschiebung der Vorderarmknochen nach Hinten beeinträchtigt in hohem Grade die Brauchbarkeit der Extremität.

Zeis (l. c.) beobachtete einmal nachträgliche Verrenkung des Radiusköpfchens nach Aussen und erläutert deren Entstehung in folgender Weise. Wenn die Heilung der Fractur nicht vollständig gelungen ist, hat das Köpfchen des Radius die ganze Kraft der andrängenden Rotula humeri auszuhalten, besonders bei Anstrengungen des Kranken, um die Gelenksteifigkeit zu überwinden. Bei Beugeversuchen zieht nun der Musculus biceps brachii den oberen Theil des Radius nach Oben und Vorn; dies ist der Uebergang zur Luxation nach Aussen. Ist die seitliche Luxation des Radius erfolgt, so drückt der Humerus auf den eben erst angeheilten Processus coronoides und drängt diesen möglichst nach Unten. Eine analoge Beobachtung ist, nach Zeis, bereits von Pennek (Lancet, Vol. I. pag. 267) gemacht.

Bei der **Behandlung** muss man die Bildung einer möglichst kurzen fibrösen Zwischensubstanz zu erzielen suchen. Hierzu sind zwei sehr verschiedene Wege eingeschlagen worden. A. Cooper legt den Arm in eine am Ellenbogen rechtwinklig gebogene Rinne und fixirt ihn in dieser Stellung 3 Wochen lang. Dagegen will Lorinser den Arm in möglichst starke Streckung versetzen, so dass die Spitze des Olecranon in die Fossa humeri maxima tritt und daher eine Verrückung aufwärts (nach Hinten) unmöglich wird. Hierbei sollen die gespannten Fasern des Brachialis internus den Kronenfortsatz hinabdrücken und der Bruchfläche der Ulna nähern. Brassard²⁾ hatte diese Stellung bereits für die Reposition empfohlen und (gewiss überflüssiger Weise) das Einwickeln des Oberarmes mit einer Rollbinde

¹⁾ Paul (Die chirurgischen Krankheiten des Bewegungsapparates, Jahr 1861, p. 145) legt, auf Grund eigener Beobachtung, besonderen Werth auf diese Ecchymose.

²⁾ Sulla frattura del apofisi coronioide del cubito. Milano 1811.

hinzugefügt, in der Absicht, den Brachialis internus dadurch ausser Thätigkeit zu setzen. Lorinser will in dieser Stellung den Arm während der ganzen Heilungszeit lassen. Es bleibt jedoch zweifelhaft, ob in derselben die Vereinigung vollständiger als in halbgebeugter Stellung zu Stande kommen werde. Dagegen steht mit Sicherheit ein hoher Grad von Gelenksteifigkeit zu befürchten, wenn man den Arm wochenlang in dieser gestreckten Stellung fixirt. Lorinser's eigene Beobachtung bestätigt dies, da sein Kranker nach $2\frac{1}{2}$ Jahren erst den Vorderarm bis zu einem rechten Winkel beugen konnte. — Wir würden demnach dem Cooper'schen Verfahren den Vorzug geben, wenn nicht etwa eine entschiedene und andauernde Neigung zur Verschiebung des Vorderarmes nach Hinten auf keine andere Weise als durch vollständige Streckung sich überwinden liesse.

5) Brüche an der Hand¹⁾.

a) **Brüche der Handwurzelknochen** ohne Complication werden selten beobachtet, vielleicht seltener, als sie wirklich vorkommen, da durch Versuche, mittelst übermässiger Beugung des Handgelenks an der Leiche Verrenkung desselben zu erzeugen, sehr oft solche Brüche entstehen. Jedenfalls setzen diese Brüche eine bedeutende Gewalt voraus und sind daher ganz gewöhnlich mit heftiger Quetschung, Wunde u. dgl. m. complicirt. Die Diagnose ist, wenn keine Wunde besteht, schwierig, dann aber auch nicht von Belang, da es keiner anderen Behandlung, als der durch die Nebenverletzungen bedingten, bedarf. Bei Splitterbrüchen, Verletzungen durch Geschosse, Maschinenräder u. dgl. m. ist die frühzeitige Entfernung der vollkommen (auch vom Periost) gelösten Splitter, ausserdem aber sorgfältige Feststellung des Vorderarms und der Hand in einem Verbande zu empfehlen.

b) **Brüche der Mittelhandknochen** sind gleichfalls selten, und relativ oft complicirt. Am Häufigsten bricht noch der fünfte Mittelhandknochen. Veranlassung dieser Brüche ist meist eine direct einwirkende Gewalt; man hat sie aber auch nach einem Fall auf die Knöchel der Hand (bei geschlossener Hand) beobachtet. Alsdann bricht vorzugsweise das Os metacarpi des Mittelfingers, welches am Meisten hervorragt. Die Bruchstelle befindet sich gewöhnlich in der Mitte des Knochens. Jedoch hat man auch Querbrüche in der Nähe des Capitulum, wahrscheinlich auch Ablösung der Epiphyse, beobachtet, in welchen Fällen Verwechslung mit Verrenkung der ersten Phalanx möglich wäre. Die Verschiebung beschränkt sich gewöhnlich auf

¹⁾ Die Fracturen der Hand betragen etwa 10 Procent aller Knochenbrüche.

Dislocatio ad directionem. Die Beugemuskeln, welche hier das Uebergewicht über die Streckmuskeln haben, ziehen das untere Bruchstück an seinem unteren Ende gegen die *Vola manus*, wodurch die Bruchstelle selbst mittelst hebelartiger Bewegungen gegen die Dorsalseite hervorgeedrängt wird. — Die Behandlung besteht in der Reduction durch Zug am Finger und Gegenzug am Handgelenk, demnächst Retention durch den von Malgaigne angegebenen Verband. Man legt zwei starke hölzerne Schienen quer über die Dorsal- und Volarseite der Mittelhand und befestigt sie durch Heftpflasterstreifen, Gutta-Percha oder Gyps. Dies gewährt den grossen Vortheil, dass alle Fingergelenke während der ganzen Behandlung bewegt werden können, und Steifigkeit derselben daher nicht zu befürchten ist.

Früher befestigte man die Finger in gestreckter Stellung an den bis zu ihrer Spitze hinabreichenden Schienen (Boyer). Hierdurch wird einer difformen Heilung keineswegs vorgebeugt, wohl aber die Steifigkeit der Fingergelenke begünstigt. Vidal empfahl deshalb die Schienen nur bis zur ersten Phalanx reichen zu lassen, die beiden anderen Phalangen zum Behufe der Erschlaffung der Flexoren zu beugen und eine dicke Pelotte auf die Dorsalseite der Bruchstelle, eine andere auf die Volarseite der *Capitula ossium metacarpi*, beide unter die Schienen zu legen. Cooper begnügte sich, die Hand über einer dicken Pelotte in gebeugter Stellung zu befestigen.

Einfache Brüche der Mittelhandknochen heilen in 20 bis 30 Tagen; bei complicirten kann, wenn (wie gewöhnlich) mehrere Knochen zersplittert und die Weichtheile in grossem Umfange zerstört sind, die Exarticulation der Hand nothwendig werden.

c) **Brüche der Phalangen der Finger** kommen fast immer nur in Folge direct einwirkender Gewalt vor. Daher die Häufigkeit der Complication mit Quetschung, Wunde, Zerschmetterung. Die Diagnose macht keine Schwierigkeiten. Findet Verschiebung Statt, so ist daran oft die einwirkende Gewalt mehr Schuld als der Muskelzug, durch welchen sonst, bei dem Uebergewicht der Flexoren, Verschiebung nach der Beugeseite herbeigeführt werden würde.

Ist der Bruch einfach, so hat er keine Bedeutung, und die Behandlung ergiebt sich nach den allgemeinen Regeln von selbst. Man legt in schwach gebeugter Stellung Dorsal- und Volarschienen an und benutzt die benachbarten Finger als Seitenschienen; statt der Binden nimmt man Heftpflaster-, Gyps- oder Gutta-Percha-Streifen. Bei Complicationen dagegen entsteht die Frage, ob nicht wegen der wahrscheinlich zurückbleibenden Steifigkeit und Difformität, wegen des vorauszuhsehenden Brandes oder aus Besorgniss vor Tetanus, statt aller weiteren Behandlung, sogleich im nächst oberen Gelenk amputirt werden soll. Die früher wegen complicirter Fracturen häufig ausgeübten Amputationen und Exarticulationen der Finger sind aber mit Recht

in neuerer Zeit (zuerst von Blandin und Bérard) verworfen worden, weil auf dieselben ebenso üble örtliche und allgemeine Zufälle folgen können, wie auf die complicirten Fracturen selbst, und weil überdies ein, wenn auch steif und difform geheilter Finger gewöhnlich für den Patienten weniger Unannehmlichkeiten hat, als der Mangel desselben. Auch in den scheinbar verzweifeltsten Fällen gelingt zumal durch antiseptische Verbände die Heilung meist noch sehr vollständig. (Vgl. auch Bd. IV.)

Bei der Behandlung einfacher Fingerfracturen, deren Consolidation in 25 bis 30 Tagen erfolgt, muss man schon nach 14 Tagen passive Bewegungen vornehmen, um der Gelenksteifigkeit vorzubeugen.

d. Brüche der unteren Extremität¹⁾.

1) Brüche des Oberschenkelbeins.

Brüche des Femur sind beinahe ebenso häufig wie diejenigen des Humerus; sie machen über 6 Procent aller Knochenbrüche aus. Am Häufigsten bricht die Diaphyse, demnächst der Schenkelhals, am Seltensten das untere Ende, etwa in dem Verhältniss wie 40 : 20 : 1.

Zuweilen bricht das Femur an zwei der genannten Stellen zugleich, so dass z. B. Bruch des Halses mit Bruch der Diaphyse an demselben Oberschenkel besteht.

A. Brüche des Mittelstücks des Oberschenkelbeins.

Die Bruchlinie verläuft meist schräg von Oben und Hinten nach Unten und Vorn, besonders bei Erwachsenen und wenn der Bruch durch Gegenschlag entstand. Quer verläuft der Bruch gewöhnlich bei Kindern, oder wenn er durch directe Gewalt veranlasst war. Brüche durch Muskelzug sind wegen der grossen Festigkeit des Femur und der schrägen Anheftung der Muskeln sehr selten.

Gurlt (Handbuch, I. pag. 239 u. f.) führt 14 Fälle von Fractura femoris durch Muskelzug auf, unter denen 9 durchaus keine Prädisposition erkennen lassen.

Die gewöhnliche **Veranlassung** ist ein Fall auf die Füsse oder auf die Kniee. Eine directe Gewalt muss sehr bedeutend sein, um diesen Bruch zu veranlassen, wie z. B. das Auffallen einer sehr schweren Last, Ueberfahren, zumal bei hohl liegendem Oberschenkel auf unebenem Boden, das Eindringen oder Aufschlagen einer Kugel. Dabei fehlt dann nie bedeutende Quetschung oder Verwundung der Weichtheile.

Symptome. Die Verschiebung ist (wie schon Hippokrates wusste) immer sehr beträchtlich, — ausser bei Kindern, wo die meist quere Richtung des Bruches und die geringe Kraft der Muskeln

¹⁾ Brüche der Beckenknochen s. pag. 396 u. flgd.

gemeinbin nur eine Dislocatio ad directionem bedingen, — indem durch die an der hinteren Seite des Schenkels gelegenen Beugemuskeln die natürliche Biegung des Knochens vermehrt, das untere Ende des Femur nach Hinten gezogen und beide Bruch-Enden nach Vorn gedrängt werden. Bei Erwachsenen wird gewöhnlich das untere Bruch-Ende zunächst nach Hinten geschoben; sobald aber die Bruchflächen sich nicht mehr berühren, rückt es durch den Zug der Adductoren nach Innen und Oben, während das obere nach Aussen und Vorn hervorragt. Ueberdies wird das untere Bruch-Ende durch das Gewicht des Fusses, welcher nach Aussen umfällt, in dieser Richtung rotirt; es entsteht somit auch noch eine Dislocatio ad peripheriam. Hat die Fractur ihren Sitz im oberen Theil des Mittelstücks, so wird das obere Bruch-Ende durch Iliopsoas und Pectineus nach Vorn dislocirt.

Der fixe Schmerz an der Bruchstelle, die Unmöglichkeit willkürlicher Bewegungen, die abnorme Beweglichkeit der Bruch-Enden, die Crepitation, die durch Messung vom Trochanter major zum Capitulum fibulae leicht und sicher zu constatirende Verkürzung¹⁾, die veränderte Richtung und Lage des Beins mit gewöhnlich nach Aussen gewandter Fusspitze, endlich das sichtbare oder doch fühlbare Hervorragen der Bruch-Enden sichern die Diagnose. — Bei der Untersuchung des Verletzten ist nie zu vergessen, dass Doppelbrüche des Femur nicht unerhört selten sind; namentlich muss man daran denken, dass mit dem Schaft des Knochens zugleich auch der Schenkelhals gebrochen sein kann (v. Piha).

Die **Prognose** ist in Betreff der Wiederherstellung der normalen Länge und Gestalt des Schenkels nicht ganz günstig, weil es sehr schwierig ist, die zur Verschiebung sehr geneigten Bruch-Enden in der richtigen Lage zu erhalten. Dies gilt vorzugsweise für Schrägbrüche, namentlich in der oberen Hälfte des Knochens. Zu den Schwierigkeiten der Retention gesellt sich bei den complicirten Schenkelbrüchen noch die Gefahr der Osteomyelitis und ausgebreiteter und tiefer Eiterungen in der Nähe des Rumpfes. So insbesondere bei Schusswunden, welche Zerschmetterung des Knochens herbeigeführt haben, bei denen deshalb viele Wundärzte die frühzeitige Amputation für erforderlich halten. Vgl. Bd. IV.

Behandlung. In Betreff der Reduction ist zunächst zu unter-

¹⁾ Die Beine eines Menschen haben nicht ganz selten von Geburt an oder in Folge von, in der Jugend überstandenen Knochenkrankheiten (Entzündung, Necrose) eine verschiedene Länge. Vgl. Linhart, Zeitschrift der Wiener Aerzte, 1851, pag. 96, und B. v. Langenbeck, Ueber krankhaftes Längenwachsthum der Röhrenknochen, Berl. klinische Wochenschr. 1869, No. 26.

Fig. 49.



scheiden, ob man einen frischen Bruch zu behandeln hat, oder ob bereits bedeutende Entzündung eingetreten ist. Im letzteren Falle muss man die Entzündung erst möglichst zu beseitigen suchen und demnächst bei gebeugter Stellung des Hüft- und Kniegelenks die Einrichtung vornehmen. Bis dahin bringt man das Bein auf eine doppelt geneigte Ebene oder in eine Extensions-Vorrichtung. Frische Brüche müssen sofort eingerichtet werden.

Bei der Reduction selbst kommt es vor Allem auf eine sichere Contra-Extension an. Zu diesem Behuf bedient man sich, namentlich wenn man sofort einen Gypsverband anzulegen beabsichtigt, am Besten einer besonderen Vorrichtung, einer sogen. Beckenstütze (Fig. 49), auf welcher der Steiss des Verletzten ruht, während ein zwischen seinen Beinen aufsteigender Stab das Abgleiten des Körpers verhütet, wenn an den Beinen gezogen wird.

Apparate der Art sind von vielen Chirurgen fast gleichzeitig ersonnen worden. Die Priorität der Veröffentlichung dürfte R. Volkmann gebühren. Vgl. v. Pitha und Billroth, Handbuch Bd. II. 2. pag. 393. Die Fig. 49 abgebildete, von mir angegebene Beckenstütze, welche Esmarch („Verbandplatz und Feldlazareth“, Berlin, 1868, pag. 20) empfiehlt und welche auch in der Armee eingeführt ist, kann an einem Tisch angeschraubt oder auch (für den Gebrauch in Krankenhäusern) an einem starken Brett ein für alle Mal befestigt werden, auf welchem man dann auch die zur Unterstützung des Rückens und des Kopfes des Patienten erforderlichen Polster anbringt. Das Becken-Ende des Rumpfs wird von einer in beliebiger Höhe feststellbaren dreieckten Platte getragen, welche bei Anlegung des Gypsverbandes mit in den Verband aufgenommen und nach der Erstarrung, indem man den Kranken nach Hinten zieht, entfernt wird. Platte und Stützstange werden vor der Anwendung mit Watte oder Flanellbinden gepolstert.

Hat man keine Beckenstütze zur Hand oder beabsichtigt man die Fractur mittelst permanenter Extension zu behandeln, so legt man ein der Länge nach glatt zusammengefaltetes, durch untergelegte Watte gepolstertes Handtuch mit seinem Mittelstück auf die entsprechende Seite des Perineum und führt die beiden Enden, das eine vorn, das andere hinten, am Rumpf aufwärts, knotet sie mit einem Strick zusammen und befestigt sie am Bettpfosten oder lässt sie durch Gehülfen festhalten. Um die Verschiebung des Beckens zu verhüten, muss ein Gehülfe die Crista ilei zu beiden Seiten nach Hinten, d. h. gegen die Matratze andrücken, oder man sucht, wenn kein Gehülfe zur Hand ist, durch ein langes Tuch, welches unter der Bettstelle durch und quer über das Becken verläuft, eine Befestigung zu bewirken.

Der Gehülfe, welchem die Extension übertragen ist, zieht zuerst in der Richtung des unteren Bruch-Endes, demnächst in derjenigen der Achse des Oberschenkels. Der Wundarzt sucht durch seitlichen Druck mit seinen Händen die Coaptation zu bewirken und sich von ihrem Gelingen zu überzeugen. Ob sie gelungen sei, ist oft schwer zu erkennen und ohne genaue Messung niemals mit Bestimmtheit zu sagen. Das blosse Augenmaass kann hierüber nicht entscheiden, weil die Verschiebungen des Beckens in hohem Grade Täuschungen veranlassen; man muss die Entfernung von der Spitze des Trochanter major zum Capitulum fibulae genau messen und die Extension lieber etwas über die Länge der gesunden Extremität hinaus fortsetzen. Nicht blos die Länge, sondern auch die normale Stellung des Beins muss wieder hergestellt werden; namentlich hat man die Dislocatio ad peripheriam durch entsprechende Rotation des unteren Bruchstücks zu corrigiren. Dabei ist im Allgemeinen zu beachten, dass Hallux, innerer Rand der Patella und Spina anter. super. ilei in einer Flucht stehen müssen. Wegen der grossen Kraft der Oberschenkel-Muskeln ist die Hülfe der Chloroformnarkose höchst wünschenswerth; ohne diese sind oft mehrere Gehülfen erforderlich, um die Extension vollständig zu bewirken. Fehlen solche, oder reichen ihre Kräfte nicht aus, so muss man Reductions-Apparate zu Hülfe nehmen, deren viele erfunden sind, die man aber gerade in solchen Fällen, wo Gehülfen fehlen (auf dem Lande), auch nicht immer vorräthig haben wird. Einen Apparat der Art kann man jedoch leicht extemporiren, wenn man nur eine Rolle zur Hand hat. Diese befestigt man oberhalb des Fuss-Endes des Bettes und lässt einen Strick über sie hinlaufen, dessen eines Ende am Bein bis zu den Condylen des Femur hinauf befestigt wird, während an das andere ein hinreichend schweres Gewicht gebängt wird, um den erforderlichen Grad der Extension zu erreichen. Die Befestigung des Strickes am Bein geschieht durch Vermittelung einer, am Besten auf der inneren Seite mit Heftpflaster bestrichenen longitudinal angelegten Bandschlinge, die ihrer Seits durch zahlreiche Bindengänge angedrückt wird. Die Contra-Extension wird in der oben beschriebenen Weise am oberen Bettpfosten bewirkt. Bei Weitem bequemer ist freilich der Schneider-Mennel'sche Apparat, bei Einschaltung eines Flaschenzuges auch wirksamer.

Zum Behuf der Retention reicht nur sehr selten ein gewöhnlicher Contentiv-Verband aus.

Nach den Vorschriften des Hippokrates wurde das gebrochene Bein in eine dasselbe vom Sitzbein bis zum Fuss umfassende Rinne gelagert, die durch Tücher in der Weise zusammengeschnürt wurde, dass seitliches Ausweichen unmöglich gemacht

werden sollte. Hieran schliessen sich die mit Schnallen versehenen Rinnen von Schneider, Theden, Brünninghausen u. A. Lange Zeit bediente sich die Mehrzahl der Wundärzte eines Verbandes aus 3 Schienen, zwei seitlichen und einer vorderen; letztere gewöhnlich nur von der Länge des Oberschenkels, während die beiden seitlichen von der Crista ilei und von der Tuberositas ischiä bis zur Fusssohle reichten. Zwischen die Schienen und das Glied legte man lange Häckselkissen. Die Seitenschienen wurden in ein grosses Strohladentuch eingeschlagen und der ganze Verband durch Bandschlingen befestigt. Durch die vordere Schiene suchte man das obere Bruch-Ende abwärts zu drücken. Dies gelingt um so schwieriger, je näher dem kleinen Trochanter der Bruch sich befindet, weil der *Musculus iliopsoas* desto mehr dieses Bruch-Ende emporzieht. Die richtige Stellung des Fusses suchte man zu erhalten, indem man mit einer Binde oder einem Tuch die Fusssohle steighügelartig umfasste, die Enden auf dem Fussrücken kreuzte und sie dann zu beiden Seiten an dem Verbands befestigte. Auf solche Weise konnte die Retention immer nur für kurze Zeit und bei kräftiger Muskulatur überhaupt nur unvollständig gelingen.

Viel mehr leistet der Kleisterverband, sofern man nur im Stande ist, die Retention bis zum Trocknen desselben durch anderweitige Verbände oder fortgesetzte Extension zu erhalten. — Die Vorzüge der schnell erstarrenden Gutta-Percha- und Gyps-Verbände haben sich hier besonders bewährt. Der Verband muss aber, um sicher zu wirken, nicht blos den Oberschenkel, sondern auch das Becken umfassen. Zu diesem Behuf muss man ihn, wenn man sich der Rollbinden bedient, mit einer *Spica coxae ascendens* beenden. Diese ist, da man Bewegungen des Kranken während der Anlegung und Erstarrung des Verbandes sorgfältig verhüten will (um nicht abermalige Verschiebung herbeizuführen), ohne Benutzung einer Beckenstütze nicht leicht anzulegen. Schneller gelangt man zum Ziele, wenn man den ganzen Verband in Gestalt einer vorn gespaltenen Hose vorher zurechtschneidet, mehrere solcher Stücke mit Gyps getränkt und bestrichen über einander auf einem Tisch ausbreitet und den Verletzten dann, während Extension und Contra-Extension gehörig ausgeübt werden, auf diesen Verband legt und ihn durch Zusammenklappen der Ränder schliesst. Für diese Gypshose müssen vorher Maasse genommen werden. Die Verbandstücke müssen oben breiter sein, um das Becken vollständig zu umfassen. Der Schenkeltheil und der Beckentheil werden von einander durch einen queren Einschnitt bis auf diejenige Breite getrennt, welche dem Umfange der hinteren und der äusseren Seite des Schenkels entspricht (etwa $\frac{3}{4}$ des Schenkelumfangs). Alle Maasse, namentlich für die oberflächlicheren Schichten, müssen reichlich genommen sein, da der Gyps viel aufträgt. Der Schenkeltheil aller Verbandstücke wird an den Rändern nach Art Scultet'scher Binden quer eingeschnitten, damit er sich glatt anlegt. Durch gleichmässiges Andrücken und Streichen muss ein vollständiges

Anschmiegen an den fracturirten Schenkel erzielt werden¹⁾. Mit Hülfe einer Beckenstütze lässt sich der Gypsverband an der fracturirten Extremität mit Einschluss des Beckens auch in der gewöhnlichen Weise leicht und schliesslich doch mit noch grösserer Genauigkeit als die „Gypshose“ anlegen. Knie- und Hüftgelenk können dabei ebenso gut gebeugt wie gestreckt gehalten werden. Auf die Vortheile der ersteren Stellung werden wir später zurückkommen; jedoch ist sie vielen Patienten sowohl im Liegen (wobei die Extremität durch ein Keilkissen gestützt werden muss), als bei den späteren Gehversuchen lästig, und die Heilung lässt sich in der That auch in gestreckter Stellung sowohl des Knie-, als des Hüftgelenks ebenso gut erreichen.

Ausreichend ist der Gypsverband jedenfalls für die Querbrüche des Oberschenkels und für alle Schenkel-Fracturen bei Kindern und bei schwächlichen Subjecten. Aber auch für die Mehrzahl der Schrägbrüche bei kräftigen Männern genügt er²⁾; nur bei besonders starker Muskulatur und in Fällen, wo bereits bedeutende Anschwellung eingetreten ist, die Gypskapsel daher bald zu weit wird, ist er unzureichend.

In solchen Fällen kann nur durch Anwendung der permanenten Extension einer beträchtlichen Difformität vorgebeugt werden. Von den zu diesem Behuf erfundenen Methoden und Apparaten sollen hier nur die wichtigsten erwähnt werden.

Als Typus für das gewöhnliche Verfahren der älteren Chirurgen kann das von den arabischen Aerzten des Mittelalters geübte betrachtet werden. Sie befestigten den *Bumpf* mit einer zwischen den Schenkeln hindurchgeführten Binde an dem oberen, und das Knie oder den Fuss der kranken Seite an dem unteren Ende der Bettstelle. Petit, Heister, Duvernoy verfahren noch ebenso, in neuester Zeit nur Jobert (vgl. pag. 348). Desault und Vermandois (in der Mitte des 18. Jahrh.) suchten durch Befestigung der kranken Extremität an einer, dieselbe an Länge überragenden Schiene die permanente Extension auszuüben. Diese Methode ist mannigfaltig modificirt worden und hat fast allen Verfahrungsweisen, bei denen die Extension in gestreckter Lage des Gliedes Statt findet, zum Vorbilde gedient.

Abweichend davon suchte Hagedorn die hinreichende Extension der kranken Extremität dadurch zu sichern, dass er das gesunde Bein als Strebepfeiler benutzte. Eine hölzerne Schiene wird an der äusseren Seite der gesunden Extremität durch breite Gurte, die um das Becken, sowie um den Ober- und Unterschenkel laufen, in der Art befestigt, dass die Fusssohle sich gegen ein rechtwinklig am unteren Ende

¹⁾ Durch diese von Szymanowski (vgl. Bd. I. pag. 159) angegebene „Gypshose“ habe ich in recht schwierigen Fällen gute Erfolge erreicht.

²⁾ Ich habe mich von der genügenden Wirkung des Gypsverbandes bei Fractura femoris um so unparteiischer überzeugt, als ich früher fast ganz allgemein die sogleich zu beschreibende Aequilibrial-Methode angewandt und deren Wirksamkeit, namentlich auch gegenüber dem Kleisterverbande, besonders gerühmt habe.

der Schiene eingefügtes breites Brett anstemmt. An demselben Brett wird die kranke Extremität durch Riemen, welche oberhalb der Knöchel und oberhalb des Knies befestigt sind, in der Weise angezogen, dass auch ihre Fusssohle dasselbe berührt. Auf den ersten Blick leuchtet die Beschwerlichkeit dieses Apparates ein, da er beide Beine zur Unbeweglichkeit verdammt und die Entleerung des Harns und der Fäces höchst mühselig macht. Er ist aber auch unzureichend, weil die Verschiebung des Beckens, welche durch den dasselbe umfassenden Gürtel keineswegs verhütet wird, die beachtete gleiche Länge beider Schenkel zu einer illusorischen macht. Diesem Uebelstande wird durch die Verlängerung der auf der gesunden Seite anzulegenden Schiene bis unter die Achsel (Dzondi) nicht abgeholfen, da auch die Schulter sich verschiebt und die, durch diese Zuthat noch beträchtlich erhöhten Beschwerden unerträglich werden.

Bei Weitem die grösste Bequemlichkeit und Sicherheit gewährt die permanente Extension mittelst longitudinal von der Bruchstelle bis zu den Malleolen aufgeklebter Heftpflasterstreifen und daran angehängter, durch eine Rolle wirkender Gewichte, wie wir pag. 349 beschrieben haben, — je nach Bedürfniss mit oder ohne Hinzufügung eines Contraextensionsgurtes. In der Regel ist dabei die schräge Richtung, in welcher das Bein sich befindet, wenn man die Rolle 20 bis 30 Centimeter über dem Fussende der Matratze anbringt, nützlich, theils wegen der Neigung des oberen Bruchstücks zur Dislocation nach Vorn, theils wegen des günstigen Einflusses, welchen bei entzündlicher Schwellung des Oberschenkels die Erhebung des Fusses ausübt. Seitenschienen und Apparate zur Verhütung der Dislocatio ad peripheriam können nach Bedürfniss hinzugefügt werden. Unter letzteren ist der von R. Volkmann¹⁾ angegebene „Eisenbahnapparat“ besonders empfehlenswerth. Den Hauptbestandtheil desselben bildet ein der Fusssohle entsprechend gestaltetes Fussbrett, an welchem in der Fersenengegend ein etwa 30 Centim. langer vierkantiger (besser cylindrischer) Holzstab horizontal und quer gegen die Achse des Unterschenkels befestigt ist, der seiner Seits eine an die hintere Seite des Unterschenkels sich anfügende Hohlchiene trägt, in welcher sich für die Ferse ein Loch befindet²⁾. Um der natürlichen Richtung der Fussspitze nach Aussen zu entsprechen, lässt man die Verbindung zwischen Fussbrett und Querstab in der Art beweglich einrichten, dass sie durch eine Druckschraube beliebig festgestellt werden kann. Dieser Apparat wird an Fuss und Unterschenkel, nach vorgängigem

¹⁾ Berl. klin. Wochenschrift, 1870, No. 20. — Meine Empfehlung gründet sich nicht blos auf Erfahrungen der letzten Jahre, sondern auch auf frühere, die ich mit einer ähnlichen Vorrichtung bei Behandlung von Hüftgelenks-Entzündungen gemacht habe. — Ueber v. Dumreicher's Eisenbahnapparat vgl. „Unterschenkelbrüche“.

²⁾ Nach zahlreichen eigenen Erfahrungen halte ich es für sicherer und bequemer, der Hohlchiene eine solche Länge zu geben, dass sie bis über die Bruchstelle hinauf reicht.

Aufkleben der Heftpflaster, mit einer weichen Binde befestigt. Unter den Querstab werden zwei prismatisch gestaltete, glatt gehobelte Latten, mit einer Kante nach Oben, in der Richtung des Unterschenkels auf die Matratze gelegt, so dass beim Zuge an den Heftpflasterstreifen der Querstab und mit ihm das ganze Bein auf den Kanten der Latten gleitet. Die Schnur, an welcher die Gewichte hängen, muss bei Anwendung dieses Apparates über 2 Rollen laufen, wie pag. 350 erläutert wurde.

Während man bei der permanenten Extension in gestreckter Lage die Kraft des Muskelzuges, welche die Verschiebung der Bruch-Enden bedingt, direct zu überwinden sucht, beabsichtigt man bei der halb gebeugten Lage die in Betracht kommenden Muskeln zu erschaffen und dadurch unwirksam zu machen. Der Urheber dieser Methode ist Pott. Er liess den Patienten auf der Seite der Fractur liegen mit halb gebeugtem Ober- und Unterschenkel, schob ein Kissen unter den Oberschenkel und befestigte denselben ausserdem auf einer etwas ausgehöhlten hölzernen Schiene. Bei diesem Verfahren war die Gegend des Trochanter major einem gefährlichen Druck ausgesetzt, wurde bald schmerzhaft, und der Kranke wandte sich dann allmählig immer mehr auf den Rücken, wobei nothwendiger Weise das obere Bruch-Ende eine Drehung erfuhr, an welcher das untere nicht Theil nahm, so dass eine Dislocatio ad peripheriam eintrat, deren Folge nach beendeter Heilung eine starke Auswärtsdrehung der Zehen sein musste. — Van Aitken empfahl eine halb sitzende Stellung mit gegen das Becken gebeugtem Oberschenkel. Dies Verfahren ist späterhin mit dem Pott'schen in der Weise verschmolzen worden, dass man den Kranken mit gebeugtem Oberschenkel auf dem Rücken liegen liess und unter die Kniekehlen entweder eine dicke Rolle oder eine doppelt geneigte Ebene schob, auf welcher dann der Oberschenkel in aufsteigender und der Unterschenkel in absteigender Richtung ruhte. Zwei unter einem rechten Winkel zusammengenagelte Bretter, wie sie Bell zuerst angegeben hat, durch darüber gelegte Kissen gehörig gepolstert, bilden die einfachste, überall zu extemporirende, doppelt geneigte Ebene. Ein grosses keilförmiges Kissen, wie es Böttcher empfahl, leistet nicht mehr. Dagegen ist für wiederholten Gebrauch die von A. Cooper angegebene Modification zweckmässig, bei welcher die beiden Bretter durch ein Charniergelenk verbunden sind und in beliebigem Winkel auf einem dritten Brette festgestellt werden können. Unter diese „schiefen Ebenen“ muss man immer in querer Richtung Bretter in der Art legen, dass letztere auf der Bettstelle einen festen Stützpunkt finden und somit den genannten Apparaten eine sichere,

unnachgiebige Unterlage gewähren. Mit grosser Vorsicht ist auch bei der gebeugten Lage jeder anhaltende Druck zu vermeiden; die geneigten Ebenen sind daher überall auf's Sorgfältigste zu polstern. — Die Lage des Verletzten gewinnt erheblich an Sicherheit, wenn man mit der doppelt geneigten Ebene, auf welcher Unter- und Oberschenkel ruhen, ein drittes Brett verbindet, welches den Rumpf und Kopf trägt. Auf diese Weise wird der ganze Apparat vollkommen unabhängig von dem sonstigen Lager des Verletzten: er ist dann ein dreitheiliges Bruchbett mit den entsprechenden Polstern für jeden Theil. Stanelli¹⁾ hat ein solches „Triclinum mobile“ construiert, welches zugleich zum Transport dienen kann. Alle Apparate der Art müssen in dem Oberschenkeltheil eine Oeffnung für die Entleerung von Harn und Fäces besitzen. Das Polster muss fünftheilig sein: ein Stück für Rücken und Kopf, eins für jeden Oberschenkel (mit der erwähnten Oeffnung), eins für jeden Unterschenkel.

Auf den bisher beschriebenen Apparaten werden beide Extremitäten neben einander mit gebeugten Hüft- und Kniegelenken gelagert. Amesbury dagegen lässt bloß das kranke Bein in diese Stellung bringen, wozu ein viel schmaleres Brettergestell nothwendig ist. Die Hinterbacke der kranken Seite soll dabei das Bett nicht berühren, so dass durch das Körpergewicht die Extension ausgeübt wird. Dupuytren hat dies Verfahren noch weiter ausgebildet, indem er das untere Ende des für den Unterschenkel bestimmten Brettes gabelförmig ausschneiden liess, so dass der untere Theil des Unterschenkels frei schwebt und theils durch sein Gewicht, theils durch ein um ihn geschlungenes und an den gabelförmigen Enden des Brettes befestigtes Tuch am Hinaufgleiten gehindert wird. Dadurch wird die Lage des Knies auf dem Scheitel der geneigten Ebene gesichert und somit eine der durch das Körpergewicht ausgeübten Extension das Gleichgewicht haltende Contra-Extension bewirkt. Um endlich die permanente Extension des Gliedes in dieser gebeugten Lage noch zu vervollständigen, lässt Smith oberhalb der Condylen des Femur einen Gurt anschnallen, an welchem mittelst einer über eine Rolle laufenden Schnur durch Gewichte ein kräftiger Zug ausgeübt werden kann. Ausserdem empfiehlt er, wie auch Andere, die geneigte Ebene, statt aus Brettern, aus zwei hinreichend tiefen gepolsterten Rinnen, die Ober- und Unterschenkel gleichmässig umfassen, zusammenzusetzen. Von diesen Rinnen ist aber jedenfalls nur die für den Oberschenkel bestimmte von Nutzen; auch diese kann entbehrt werden, wenn man den Schenkel mittelst Binden oder Tüchern, allenfalls mit Hinzufügung von Seitenschiene gleichmässig an der geneigten Ebene befestigt. — Die Retention wird keinesweges mehr gesichert, wenn bloß das verletzte Bein auf der schiefen Ebene liegt, und die Lage ist bei Weitem unbehaglicher.

¹⁾ Rudolf Stanelli (in Moskau), das Triclinum mobile oder die aufrichtbare schiefe Ebene, betrachtet im I. Theil als Bruchbett für die Heilung der Oberschenkel- und Schenkelhalsbrüche und als Lagerungsapparat bei Hüftkrankheiten, im II. Theil als Grundlage eines neuen Systems für den Verband und Transport Schwerverwundeter im Kriege. — 2. verm. u. umgearb. Aufl., Berlin, 1871, mit 11 Tafeln.

Sauter und Mayor haben die permanente Extension zuerst durch Anwendung von Schweben zu erreichen gesucht. Namentlich will Mayor das ausgestreckt liegende Bein in schräg aufwärts gerichteter Stellung (auf einem Brett) oder aber die bereits beschriebene schiefe Ebene, auf welcher das Bein befestigt ist, durch mehrere Stricke schwebend an der Decke oder an einem besonderen Gerüste aufhängen. — Praktische Bedeutung hat die Ausführung der permanenten Extension mittelst Anwendung der Schweben erst durch Mojsisovics gewonnen. Nach dem von ihm unter dem Namen „Aequilibriumsmethode“ beschriebenen Verfahren¹⁾ ist die Lagerung des Patienten folgende (Fig. 50). Der Rumpf wird durch eine in gekreuzten Touren um das Becken geführte Binde *B* gegen das Bett fixirt. Demnächst wird die kranke Extremität, im Hüft- und Kniegelenk rechtwinklig gebeugt, an dem über dem Bett des Kranken aufgestellten Gerüst *A* aufgehängt. Dies geschieht mittelst einer wohl gepolsterten Wadenschiene *D*, welche durch einen hölzernen oder eisernen Bügel, welcher über ihr angebracht ist, so ausgespannt erhalten wird, dass sie auf die Wade nur einen ganz gleichmässigen Druck ausüben kann. Schiene und Bügel zugleich werden von einem Tuche *E* umfasst, welches durch den Strick *F* fest zusammengeknotet wird. Dieser Strick läuft durch die an dem Längsbalken des Gerüsts angebrachten Rollen *GG* und trägt an seinem anderen Ende einen mit Sand gefüllten Sack *P* oder ein anderweitiges Gewicht von hinreichender Schwere, um dem Rumpfe des Verletzten, welcher dem durch den Strick *F* auszuübenden Zuge entgegenwirkt, das Gleichgewicht zu halten. Durch eine breite Binde *LL*, welche den Fussrücken umfasst und auf demselben gut gepolstert sein muss, wird das untere Ende des Unterschenkels an einem, in den unteren Pfosten des Gerüsts eingeschlagenen Nagel *M* befestigt. Den kranken Oberschenkel umfasst eine grosse, breite, gut gepolsterte Pappschiene *CC*, welche durch einige Bandschlingen hinreichend befestigt werden kann. Dieselbe reicht mit einem breiten starken Fortsatz soweit gegen das Gesäss hinab, dass sie auf die Gegend des grossen Trochanter einen gelinden Druck ausübt. Anderer Seits steht sie in der Kniekehle durch einen biegsamen Fortsatz mit der Wadenschiene *D* in Verbindung, wodurch die gegenseitige Lage beider gesichert wird. In einem zweiten Tuche *N* hängt man, nach gehöriger Unterlegung von Polstern, auch den gesunden Schenkel nahezu in derselben Höhe auf als den kranken. Dies geschieht durch den Strick *O*, mit

¹⁾ Vgl. Mojsisovics, Darstellung der Aequilibriumsmethode zur sichern Heilung der Oberschenkelbrüche ohne Verkürzung. Wien 1840 und 1851.

dem die Enden des Tuches zusammengeknotet sind, an dem seitlichen Fortsatze des Gerüsts *H*, welcher in der Lücke des grossen Balkens

Fig. 50.



bei *KK* in eine beliebige Stellung geschoben und sowohl nach Rechts, als auch nach Links gewandt werden kann, in der beabsichtigten Stellung aber durch den Keil *J* befestigt wird. Es leuchtet ein, dass das Gerüst *A.C.* so aufgestellt werden muss, dass der Längsbalken sich gerade oberhalb der zerbrochenen Extremität befindet. Statt des Tuches *E* kann man den an der Schiene *D* zu befestigenden und leicht aus starkem Eisendraht herzustellenden Bügel benutzen, indem man an ihn sogleich den Strick *F* befestigt. — Statt durch die Binde *L* das Fuss-Ende der Extremität abwärts zu ziehen, kann man, nach Middeldorp¹⁾, zur Verhütung ihres Emporgleitens, welches sonst die Wirkung des durch das Gewicht *P* ausübenden Zuges gänzlich vereiteln würde, einen an der Wadenschiene *D* zu befestigenden, in der Richtung des Unterschenkels unter der Ferse hervorragenden Hebelarm benutzen, an welchem ein Gewicht von solcher Schwere zu befestigen ist, dass es dem durch *P* ausgeübten Zuge in der angegebenen Richtung Widerstand leistet. Letztere Modifica-

¹⁾ Vgl. Günsburg's Zeitschrift, 1832, auch Middeldorp's „Beiträge“.

tion ist empfehlenswerth, weil durch dieselbe der für jeden Druck sehr empfindliche Fussrücken gänzlich vom Drucke befreit bleibt. — Die Herstellung dieses Verbandes und seine Anlegung erscheinen auf den ersten Blick umständlich und schwierig, sind aber in der That, wenn nur die gewöhnlichen Handwerker zu Gebote stehen, recht leicht. Die Lage des Kranken erscheint unerträglich, die Erfahrung aber lehrt, dass dieselbe, wenn auch nicht gerade bequem, doch weniger belästigend ist, als die Lage in irgend einem anderen der für die permanente Extension empfohlenen Apparate. Selbst ältere Individuen ertragen sie, nach meinen Erfahrungen, recht wohl. — Die Wirkungsweise der Aequilibriummethode leuchtet fast von selbst ein. Die gebeugte Lage des Hüftgelenks erschläfft den Ileopectus vollständig und verhütet daher seine Einwirkung auf das obere Bruchstück; die Beugung im Kniegelenk beseitigt die Einwirkung der zum Unterschenkel verlaufenden Flexoren und der Gastrocnemii auf das untere Bruch-Ende. Die permanente Extension wird durch das Gewicht *P* mittelst des Unterschenkels am unteren (d. h. dem Knie näher liegenden) Bruch-Ende, die Contra-Extension durch das Gewicht und die Befestigung des Rumpfes am Becken-Ende des Femur bewirkt. Die Coaptation wird durch seitlichen Druck mittelst der Schiene *C* (welche beliebig verstärkt, je nach Bedürfniss fester angelegt, auch durch anderweitige Verbandstücke ersetzt werden kann) unterhalten.

Alle Verbände für Schenkelfracturen, welche das Hüft- und Kniegelenk in gebeugter Stellung fixiren, erweisen sich besonders vortheilhaft, wenn eine vorwiegende Neigung des oberen Bruchstückes zur Verschiebung nach Vorn (durch den Zug des Ileopectus) besteht. In manchen Fällen überwiegt jedoch die Neigung zur Verschiebung nach Aussen. Dann ist es auch von Vortheil das übrige Bein gleichfalls in abducirte Stellung zu bringen. Als allgemeinere Methode hat dies Renz¹⁾ empfohlen und zu diesem Behuf seine „Spreizlade“ construirt, eine Beinlade, welche das Becken und beide Beine in gespreizter (und gestreckter) Stellung aufzunehmen bestimmt ist. Unzweifelhaft wird für manche Fälle eine Combination der gespreizten mit der Beuge-Stellung erwünscht sein. *Sofern sich dies nicht durch einen entsprechenden Gypsverband sollte erreichen lassen, würde man eines Apparates bedürfen, dessen Schenkeltheil mit dem Beckentheil durch ein Nussgelenk verbunden wäre, welches sich durch eine Druckschraube in beliebiger Stellung fixiren liesse.

¹⁾ W. Th. Renz, Ein Collegen-Gruss aus dem Reserve-Lazareth zu Wildbad. September 1870.

in demselben Grade seltener geworden, wie die Amputationen bei complicirten Fracturen des Femur (vgl. Bd. IV.). Im Allgemeinen muss man auch bei diesen Verletzungen, selbst wenn sie eine Zeit lang vernachlässigt und durch den Transport vielleicht sehr verschlimmert sind, die mechanische Behandlung obenan stellen. Da aber die Entzündung der Weichtheile oft nicht gestattet, die Reduction auf einen Schlag auszuführen, so sind gerade hier die verschiedenen Methoden der permanenten Extension, namentlich der Zug mit Gewichten mittelst aufgeklebter Bindenstreifen (vgl. pag. 349 u. 454), von grösster Bedeutung. Für schwierige Fälle ist sehr bequem (wenn auch weniger wirksam als der eben erwähnte Zug) die von Smith angegebene „vordere Schiene“, ein langes Parallelogramm von Eisendraht, an Breite ungefähr der Dicke des Beins entsprechend, welches an der vorderen Fläche des ganzen Beins mit weichen Binden befestigt wird und mittelst zweier Bügel an der Decke des Zimmers (des Wagens) oder an einem Galgen aufgehängt werden kann. Die hierzu erforderliche Schnur lässt man in der Art schräg aufsteigen, dass ein Zug gegen den Fuss hin ausgeübt wird. Dieser Zug wirkt stärker, wenn man das Bein von der Bruchstelle abwärts mit 2 longitudinal aufgeklebten Pflasterstreifen am Fuss-Ende der Schiene befestigt und im Uebrigen nur durch Bindenstreifen tragen lässt, welche von einer Längsseite der Schiene zur anderen hinter dem Bein lose ausgespannt werden, wie dies Bloxam¹⁾ empfiehlt. — Bedient man sich eines Gyps- oder Kapsel-Verbandes, einer Beinlade, geneigten Ebene, kurz eines Apparates, in welchem das Bein nicht schwebt, sondern mit seiner hinteren Seite aufliegt, so erheischt der Abfluss des Eiters besondere Fürsorge. Der Gypsverband darf nicht gepolstert sein und muss sofort mit Fenstern versehen werden. Die Polsterungen aller Kapseln und Laden müssen so eingerichtet sein, dass sie keine Flüssigkeit aufsaugen und leicht entfernt werden können. Zu letzterem Behuf ist es besonders empfehlenswerth vieltheilige Polster anzuwenden, die aus gleich grossen genau aneinander passenden Stücken bestehen (wie grobe Mosaik) und daher leicht entfernt und gewechselt werden können (G. Simon). — Im Uebrigen gelten die für die Behandlung complicirter Knochenbrüche im Allgemeinen gegebenen Regeln; namentlich erweist sich auch hier die antiseptische Methode als höchst werthvoll.

¹⁾ The treatment of fractures of the lower extremities in the wards under the care of Mr. Paget, St. Bartholomeus hospit. reports, 1867, III pag. 385.

B. Brüche am oberen Ende des Oberschenkelbeins.

„Brüche am oberen Ende des Femur“ nennt man diejenigen, welche oberhalb der Trochanteren vorkommen, oder diese selbst betreffen. Da über isolirtes Abbrechen des Trochanter minor nichts bekannt ist, handelt es sich demnach um: 1) Abbrechen des Trochanter major ohne Störung der Continuität der Axe des Schenkelbeins, 2) Brüche durch den Trochanter major, mit Trennung der Continuität des ganzen Schenkelbeins, 3) Brüche des Schenkelhalses.

a) Brüche des Trochanter major.

Nur durch directe Gewalt und sehr selten wird der Trochanter major abgebrochen. Die Verschiebung kann, je nach der Richtung und der Stelle des Bruches, verschieden sein, auch ganz fehlen. Verläuft z. B. die Bruchlinie an der Basis des Trochanter schräg von Oben und Innen nach Unten und Aussen, so können der Vastus externus und die Glutei einander sich in der Art das Gleichgewicht halten, dass keine Verschiebung zu Stande kommt. Dasselbe kann sich beim Abbrechen eines Theils des Rollhügels ergeben, wenn die denselben umfassenden sehnigen Anheftungen der Muskeln unversehrt geblieben sind. Gewöhnlich aber wird der abgebrochene Trochanter durch die Mm. glutei medius und minimus, sowie durch die kleinen Rotatoren des Schenkels aufwärts und etwas nach Hinten gezogen.

Sobald Verschiebung besteht, ist die Diagnose leicht; fehlt sie, so kann der Bruch gänzlich verkannt werden (A. Key).

Gefahr wird nur durch bedeutende Quetschung der Weichtheile, Betheiligung des Gelenks, oder eine bis auf die Bruchstelle eindringende Wunde bedingt.

Behandlung. Besteht Verschiebung, so muss man die Reduction ausführen, indem man den Schenkel abducirt und nach Aussen rotirt, den Trochanter aber abwärts und nach Vorn schiebt. Zur Retention ist ausser ruhiger Lage eine mit Gyps getränkte Spica coxae, welche von Oben und Hinten auf den grossen Trochanter drücken muss, zu empfehlen. Wenn keine Verschiebung besteht, so wird letztere sofort angelegt.

b) Brüche durch den grossen Trochanter mit Trennung der Continuität des Schenkelbeins.

Dieser Bruch verläuft gewöhnlich in schräger Richtung von der äusseren Seite des grossen Rollhügels zum untersten Theile des inneren Umfanges des Schenkelhalses, weshalb diese Fractur auch als eine Art des Schenkelhalsbruches bezeichnet wird. Das obere

Bruch-Ende erleidet fast gar keine Verschiebung, das untere dagegen wird in verschiedener Weise, je nach der Höhe, in welcher die Bruchlinie verläuft, dislocirt. Der Bruch kann in der Art erfolgen, dass die hintere Hälfte des grossen Trochanter nebst dem kleinen Trochanter, dem Schenkelhalse und dem Schenkelkopfe das obere, die vordere Hälfte des grossen Trochanter mit dem Schaft des Schenkelbeins das untere Bruchstück bilden. An letzterem sitzt dann kein einziger derjenigen Muskeln, welche nach Aussen rotiren. Dagegen wird das untere Bruchstück und somit der ganze Schenkel durch den Gluteus maximus stark aufwärts und nach Hinten gezogen, durch die vordere Portion des Gluteus medius aber, welche am vorderen Theile des Trochanter major inserirt, und durch den Tensor fasciae latae nach Innen rotirt¹⁾.

Diese Fractur kann in jedem Lebensalter Statt finden. Sie entsteht immer in Folge direct einwirkender Gewalt.

Die Diagnose hat, sobald die Verschiebung bedeutend ist, gar keine Schwierigkeiten. Aber auch, wenn sie unbeträchtlich ist, lassen die Unebenheiten am grossen Trochanter, die Unbeweglichkeit des oberen Bruchstücks bei Versuchen das Glied zu rotiren, die grosse Schmerzhaftigkeit jeder Bewegung und die beträchtliche Empfindlichkeit der Bruchstelle für jede Berührung keinen Zweifel zu.

Behandlung. Die Reduction muss in gestreckter Stellung vorgenommen werden. Wollte man die halbe Beugung anwenden, so würde das obere Bruchstück der Bewegung des unteren nicht folgen und die Bruchfläche des letzteren daher auf die vordere Fläche des ersteren zu stehen kommen. Der Zug muss, je nach dem Grade der Verschiebung, verschieden stark sein. Bei der Retention hat man der Verschiebung des unteren Bruch-Endes nach Hinten und Aussen und der Rotation desselben entgegen zu wirken. A. Cooper befestigte zu diesem Behuf ein dickes Kissen hinter dem oberen Theil des unteren Bruch-Endes durch einen breiten starken Beckengurt; ein zweites, etwas grösseres Keilkissen wurde unter den oberen Theil des Oberschenkels gelegt, Unterschenkel und Fuss aber, um der Rotation zu begegnen, zwischen drei gepolsterten Brettern oder auch durch Zusammenbinden beider Füsse und Kniee befestigt. Ebenso wirksam dürften die Schienen des gewöhnlichen Contentiv-Verbandes sein, wenn man nur die äussere bis über die Crista ilei hinauftragen lässt und dieselbe durch einen Beckengurt befestigt; bei Weitem wirk-

¹⁾ Auf die Eigenthümlichkeiten dieses Bruches hat zuerst Guthrie aufmerksam gemacht. Vgl. die Aufsätze von Syme in Edinburgh medical Journal 1826 und 1857, Octob., Canstatt's Jahresbericht pro 1857, Bd. IV, pag. 71.

samer aber ist der in der oben angegebenen Weise anzulegende Gypsverband. Die Heilung erfolgt in etwa 60 Tagen und zwar durch knöchernen, zuweilen sehr üppigen und daher difformen Callus.

c) Brüche des Schenkelhalses, *Fracturae colli femoris*¹⁾.

Schenkelhalsbrüche haben, nach der üblichen Beschreibung, entweder ausserhalb oder innerhalb des Kapselbandes ihren Sitz. Man unterscheidet hiernach intracapsuläre (Fig. 51) und extracapsuläre (Fig. 52) Schenkelhalsbrüche. Oft aber verläuft ein

Fig. 51.



Fig. 52.



Theil der Bruchlinie innerhalb, ein anderer Theil ausserhalb des Kapselbandes. Ein solcher, zum Theil intra-, zum Theil extracapsulärer Schenkelhalsbruch, würde der Fig. 52 abgebildete sein, wenn er etwas mehr schräg verlief. Abgesehen von dieser anatomischen Verschiedenheit, welche sich am Lebenden bei Weitem nicht immer mit Bestimmtheit erkennen lässt, unterscheidet man die Schenkelhalsbrüche, je nachdem sie mit oder ohne Einkeilung bestehen. Einkeilung kommt sowohl bei intra-, als auch bei extracapsulären Brüchen vor, bei letzteren jedoch häufiger.

Die Stelle des Bruches und die Richtung der Bruchlinie sind weder bei intra-, noch bei extracapsulären Schenkelhalsbrüchen immer genau dieselben.

¹⁾ Vgl. die anatomische Beschreibung des Hüftgelenkes, Bd. IV.

Der Bruch des Schenkelhalses innerhalb des Kapselbandes verläuft meist quer gegen die Achse des Schenkelhalses und dicht am Schenkelkopfe (Fig. 53). Ist der Schenkelhals sehr brüchig, so kann er sammt dem Gelenkkopfe vollständig zermalmt werden. Bei jugendlichen Individuen kann auch die Schenkelkopf-Epiphyse abgelöst werden.

Fig. 53.



Der Bruch des Schenkelhalses ausserhalb der Kapsel kann nur an der Basis des Schenkelhalses, also in nächster Nähe der Trochanteren vorkommen, weil nur dieser Theil des Schenkelhalses ausserhalb des Kapselbandes liegt. Der Verlauf der Bruchlinie ist dann von Oben und Aussen nach Unten und Innen. Zuweilen verläuft auch ein Theil derselben durch den grossen Trochanter, in welchem Falle der Bruch dem pag. 462 unter b) beschriebenen „Bruch durch den grossen Trochanter“ sich anschliesst. Ein sehr schräg verlaufender Bruch kann auch den kleinen Trochanter mit ablösen, so dass dieser, obwohl es sich um einen Bruch durch den Schenkelhals handelt, doch an dem oberen Bruchstücke sitzt (Vidal).

Durch Geschosse werden die verschiedenartigsten Brüche am oberen Gelenk-Ende des Femur veranlasst; insbesondere können der Schenkelhals, der Schenkelkopf, der grosse Trochanter und die Pfanne zugleich durch eine Kugel zersplittert sein.

Arten der Verschiebung. Das obere Bruch-Ende erleidet bei Schenkelhalsbrüchen keine Verschiebung, da an demselben keine Muskeln sich befestigen, mit Ausnahme des so eben erwähnten seltenen Falles, dass der kleine Trochanter zum oberen Bruchstück gehört, wo dann die Wirkung des Ileopectus dasselbe nach Vorn emporziehen kann. Das untere Bruchstück dagegen steht stets unter dem Einfluss mächtiger und zahlreicher Muskeln, welche dasselbe vorzugsweise aufwärts und nach Hinten verschieben, zugleich aber gewöhnlich nach Aussen rotiren, wozu überdies das Gewicht des Fusses und des ganzen Gliedes beträchtlich beiträgt. Vgl. pag. 449.

Bei dem intracapsulären Bruche wird die longitudinale Verschiebung durch das Kapselband in sehr engen Grenzen gehalten. Bei einem vollständig extracapsulären Bruche würden die Muskeln einen freieren Spielraum haben, wenn nicht gerade bei diesem die Einkleidung des oberen Bruch-Endes in die Medullarsubstanz zwischen den Trochanteren in der Regel Statt fände. Dieselben Verhältnisse,

B. Brüche am oberen Ende des Oberschenkelbeins.

„Brüche am oberen Ende des Femur“ nennt man diejenigen, welche oberhalb der Trochanteren vorkommen, oder diese selbst betreffen. Da über isolirtes Abbrechen des Trochanter minor nichts bekannt ist, handelt es sich demnach um: 1) Abbrechen des Trochanter major ohne Störung der Continuität der Axe des Schenkelbeins, 2) Brüche durch den Trochanter major, mit Trennung der Continuität des ganzen Schenkelbeins, 3) Brüche des Schenkelhalses.

a) Brüche des Trochanter major.

Nur durch directe Gewalt und sehr selten wird der Trochanter major abgebrochen. Die Verschiebung kann, je nach der Richtung und der Stelle des Bruches, verschieden sein, auch ganz fehlen. Verläuft z. B. die Bruchlinie an der Basis des Trochanter schräg von Oben und Innen nach Unten und Aussen, so können der Vastus externus und die Glutei einander sich in der Art das Gleichgewicht halten, dass keine Verschiebung zu Stande kommt. Dasselbe kann sich beim Abbrechen eines Theils des Rollhügels ergeben, wenn die denselben umfassenden schnigen Anheftungen der Muskeln unversehrt geblieben sind. Gewöhnlich aber wird der abgebrochene Trochanter durch die Mm. glutei medius und minimus, sowie durch die kleinen Rotatoren des Schenkels aufwärts und etwas nach Hinten gezogen.

Sobald Verschiebung besteht, ist die Diagnose leicht; fehlt sie, so kann der Bruch gänzlich verkannt werden (A. Key).

Gefahr wird nur durch bedeutende Quetschung der Weichtheile, Betheiligung des Gelenks, oder eine bis auf die Bruchstelle eindringende Wunde bedingt.

Behandlung. Besteht Verschiebung, so muss man die Reduction ausführen, indem man den Schenkel abducirt und nach Aussen rotirt, den Trochanter aber abwärts und nach Vorn schiebt. Zur Retention ist ausser ruhiger Lage eine mit Gyps getränkte Spica coxae, welche von Oben und Hinten auf den grossen Trochanter drücken muss, zu empfehlen. Wenn keine Verschiebung besteht, so wird letztere sofort angelegt.

b) Brüche durch den grossen Trochanter mit Trennung der Continuität des Schenkelbeins.

Dieser Bruch verläuft gewöhnlich in schräger Richtung von der äusseren Seite des grossen Rollhügels zum untersten Theile des inneren Umfanges des Schenkelhalses, weshalb diese Fractur auch als eine Art des Schenkelhalsbruches bezeichnet wird. Das obere

Bruch-Ende erleidet fast gar keine Verschiebung, das untere dagegen wird in verschiedener Weise, je nach der Höhe, in welcher die Bruchlinie verläuft, dislocirt. Der Bruch kann in der Art erfolgen, dass die hintere Hälfte des grossen Trochanter nebst dem kleinen Trochanter, dem Schenkelhalse und dem Schenkelkopfe das obere, die vordere Hälfte des grossen Trochanter mit dem Schaft des Schenkelbeins das untere Bruchstück bilden. An letzterem sitzt dann kein einziger derjenigen Muskeln, welche nach Aussen rotiren. Dagegen wird das untere Bruchstück und somit der ganze Schenkel durch den Gluteus maximus stark aufwärts und nach Hinten gezogen, durch die vordere Portion des Gluteus medius aber, welche am vorderen Theile des Trochanter major inserirt, und durch den Tensor fasciae latae nach Innen rotirt¹⁾.

Diese Fractur kann in jedem Lebensalter Statt finden. Sie entsteht immer in Folge direct einwirkender Gewalt.

Die Diagnose hat, sobald die Verschiebung bedeutend ist, gar keine Schwierigkeiten. Aber auch, wenn sie unbeträchtlich ist, lassen die Unebenheiten am grossen Trochanter, die Unbeweglichkeit des oberen Bruchstücks bei Versuchen das Glied zu rotiren, die grosse Schmerzhaftigkeit jeder Bewegung und die beträchtliche Empfindlichkeit der Bruchstelle für jede Berührung keinen Zweifel zu.

Behandlung. Die Reduction muss in gestreckter Stellung vorgenommen werden. Wollte man die halbe Beugung anwenden, so würde das obere Bruchstück der Bewegung des unteren nicht folgen und die Bruchfläche des letzteren daher auf die vordere Fläche des ersteren zu stehen kommen. Der Zug muss, je nach dem Grade der Verschiebung, verschieden stark sein. Bei der Retention hat man der Verschiebung des unteren Bruch-Endes nach Hinten und Aussen und der Rotation desselben entgegen zu wirken. A. Cooper befestigte zu diesem Behuf ein dickes Kissen hinter dem oberen Theil des unteren Bruch-Endes durch einen breiten starken Beckengurt; ein zweites, etwas grösseres Keilkissen wurde unter den oberen Theil des Oberschenkels gelegt, Unterschenkel und Fuss aber, um der Rotation zu begegnen, zwischen drei gepolsterten Brettern oder auch durch Zusammenbinden beider Füsse und Kniee befestigt. Ebenso wirksam dürften die Schienen des gewöhnlichen Contentiv-Verbandes sein, wenn man nur die äussere bis über die Crista ilei hinauftragen lässt und dieselbe durch einen Beckengurt befestigt; bei Weitem wirk-

¹⁾ Auf die Eigenthümlichkeiten dieses Bruches hat zuerst Guthrie aufmerksam gemacht. Vgl. die Aufsätze von Syme in Edinburgh medical Journal 1826 und 1857, Octob., Canstatt's Jahresbericht pro 1857. Bd. IV. pag. 71.

samer aber ist der in der oben angegebenen Weise anzulegende Gypsverband. Die Heilung erfolgt in etwa 60 Tagen und zwar durch knöchernen, zuweilen sehr üppigen und daher difformen Callus.

c) Brüche des Schenkelhalses, *Fracturae colli femoris*¹⁾.

Schenkelhalsbrüche haben, nach der üblichen Beschreibung, entweder ausserhalb oder innerhalb des Kapselbandes ihren Sitz. Man unterscheidet hiernach intracapsuläre (Fig. 51) und extracapsuläre (Fig. 52) Schenkelhalsbrüche. Oft aber verläuft ein

Fig. 51.



Fig. 52.



Theil der Bruchlinie innerhalb, ein anderer Theil ausserhalb des Kapselbandes. Ein solcher, zum Theil intra-, zum Theil extracapsulärer Schenkelhalsbruch, würde der Fig. 52 abgebildete sein, wenn er etwas mehr schräg verlief. Abgesehen von dieser anatomischen Verschiedenheit, welche sich am Lebenden bei Weitem nicht immer mit Bestimmtheit erkennen lässt, unterscheidet man die Schenkelhalsbrüche, je nachdem sie mit oder ohne Einkeilung bestehen. Einkeilung kommt sowohl bei intra-, als auch bei extracapsulären Brüchen vor, bei letzteren jedoch häufiger.

Die Stelle des Bruches und die Richtung der Bruchlinie sind weder bei intra-, noch bei extracapsulären Schenkelhalsbrüchen immer genau dieselben.

¹⁾ Vgl. die anatomische Beschreibung des Hüftgelenkes, Bd. IV.

Der Bruch des Schenkelhalses innerhalb des Kapselbandes verläuft meist quer gegen die Achse des Schenkelhalses und dicht am Schenkelkopfe (Fig. 53). Ist der Schenkelhals sehr brüchig, so kann er sammt dem Gelenkkopfe vollständig zermalmt werden. Bei jugendlichen Individuen kann auch die Schenkelkopf-Epiphyse abgelöst werden.

Fig. 53.



Der Bruch des Schenkelhalses ausserhalb der Kapsel kann nur an der Basis des Schenkelhalses, also in nächster Nähe der Trochanteren vorkommen, weil nur dieser Theil des Schenkelhalses ausserhalb des Kapselbandes liegt. Der Verlauf der Bruchlinie ist dann von Oben und Aussen nach Unten und Innen. Zuweilen verläuft auch ein Theil derselben durch den grossen Trochanter, in welchem Falle der Bruch dem pag. 462 unter b) beschriebenen „Bruch durch den grossen Trochanter“ sich anschliesst. Ein sehr schräg verlaufender Bruch kann auch den kleinen Trochanter mit ablösen, so dass dieser, obwohl es sich um einen Bruch durch den Schenkelhals handelt, doch an dem oberen Bruchstücke sitzt (Vidal).

Durch Geschosse werden die verschiedenartigsten Brüche am oberen Gelenk-Ende des Femur veranlasst; insbesondere können der Schenkelhals, der Schenkelkopf, der grosse Trochanter und die Pfanne zugleich durch eine Kugel zersplittert sein.

Arten der Verschiebung. Das obere Bruch-Ende erleidet bei Schenkelhalsbrüchen keine Verschiebung, da an demselben keine Muskeln sich befestigen, mit Ausnahme des so eben erwähnten seltenen Falles, dass der kleine Trochanter zum oberen Bruchstück gehört, wo dann die Wirkung des Ileopectus dasselbe nach Vorn emporziehen kann. Das untere Bruchstück dagegen steht stets unter dem Einfluss mächtiger und zahlreicher Muskeln, welche dasselbe vorzugsweise aufwärts und nach Hinten verschieben, zugleich aber gewöhnlich nach Aussen rotiren, wozu überdies das Gewicht des Fusses und des ganzen Gliedes beträchtlich beiträgt. Vgl. pag. 449.

Bei dem intracapsulären Bruche wird die longitudinale Verschiebung durch das Kapselband in sehr engen Grenzen gehalten. Bei einem vollständig extracapsulären Bruche würden die Muskeln einen freieren Spielraum haben, wenn nicht gerade bei diesem die Einkerbung des oberen Bruch-Endes in die Medullarsubstanz zwischen den Trochanteren in der Regel Statt fände. Dieselben Verhältnisse,

Fig. 54.



Fig. 55.



welche die Einkeilung bei Brüchen am unteren Ende des Radius so leicht zu Stande kommen lassen, finden sich auch bei extracapsulären Schenkelhalsbrüchen. Der abgebrochene Schenkelhals (Fig. 54) stellt einen Keil dar, dessen Spitze nach Aussen und Unten gerichtet ist und welcher gerade an dieser Spitze ausschliesslich aus fester, corticaler Knochensubstanz besteht. Die Bruchfläche des unteren Bruchstücks dagegen bietet jener Spitze gegenüber fast ausschliesslich spongiöses Gewebe dar, in welches der Keil des oberen Bruchstückes durch dieselbe Gewalt, welche den Bruch veranlasst, mit Leichtigkeit eingetrieben werden kann.

Gewöhnlich wird hierbei, wenn das obere Bruchstück tief in das untere eingekeilt ist, der grosse Trochanter in mehrere Stücke zersprengt. Die Festigkeit der Einkeilung ist zuweilen so gross, dass die Verletzten noch grosse Strecken zu gehen vermögen.

Fig. 55 zeigt eine vollständige Einkeilung des durch einen extracapsulären Bruch abgelösten Schenkelhalses *c* in die spongiöse Substanz zwischen den Trochanteren mit Zersplitterung des Trochanter major *b*. Knochen-Neubildungen (*aa*) umgeben die Bruchstelle in weitem Umfange.

Bei dem intracapsulären Bruche können die Bruch-Enden mit zackigen Vorsprüngen nach Art einer gezähnten Naht aneinander haften, so dass die Verschiebung unbedeutend ist oder ganz fehlt und die Patienten in einzelnen Fällen noch Stunden oder gar Tage lang gehen können, dann aber plötzlich die Fähigkeit, sich des Gliedes zu bedienen, verlieren, sobald die Befestigung der Bruch-Enden an einander aufhört. Jedoch dürfte das blosse Ineinandergreifen der Vorsprünge und Rauigkeiten der Bruch-Enden schwerlich allein zu reichen, um die Verschiebung des unteren Bruch-Endes für längere Zeit zu hindern und dem Patienten den Gebrauch der Extremität zu gestatten. Vielmehr sind in dieser Beziehung von grosser Bedeutung: 1) die auch bei intracapsulären Schenkelhalsbrüchen häufige Einkeilung, 2) die Unversehrtheit des am Schenkelhalse bis zum Rande des Gelenkkopfes hinaufsteigenden, den Schenkelhals gleichsam umfassenden, Theiles des Kapselbandes, der sogenannten Retinacula (nach Weitbrecht). Durch letztere bleiben die Bruch-Enden sogar gewöhnlich in losem Zusammenhang, wenn nicht durch unvorsichtige

Bewegungen, Seitens des Verletzten oder des untersuchenden Arztes, diese für die Heilung höchst wichtigen Verbindungen zerstört werden.

Heilungsvorgang. Der extracapsuläre Schenkelhalsbruch kann, wenn die einwirkende Gewalt nicht zugleich eine anderweitige tödtliche Verletzung herbeigeführt hat (was häufig der Fall ist), und die Kräfte des Patienten überhaupt ausreichen, wie jede andere Fractur, durch knöchernen Callus heilen. Oft befinden sich die Bruchstücke, der Einkeilung wegen, in genauer Berührung und somit unter relativ günstigen Verhältnissen für die Consolidation.

Ganz anders verhält es sich bei den Brüchen innerhalb des Kapselbandes. A. Cooper und neuerdings Packard¹⁾ konnten kein einziges sicher verbürgtes Beispiel von Heilung dieses Bruches durch knöchernen Callus auffinden. Cooper hielt dieselbe auch nur in den, nach seiner Ansicht, höchst seltenen Fällen für möglich, wo wegen schrägen Verlaufes des Bruches oder Erhaltung der Retinacula keine Verschiebung Statt gefunden habe. Die Ursache der ausbleibenden Callusbildung suchte er in dem Mangel an Berührung zwischen den Bruchflächen und in der unzureichenden Ernährung des abgelösten Schenkelkopfes, welcher nur durch das Ligamentum teres (unzulängliche) Blutzufuhr erhalte. Von Anderen wurden auch noch die Anwesenheit von Synovia zwischen den Bruchflächen und die schon vorher bestehende Rarefaction des Knochengewebes (vgl. Aetiologie), mit Recht als Ursachen des Ausbleibens der Consolidation aufgeführt. Der wesentlichste Grund liegt aber gewiss in der mangelhaften Ernährung des oberen Bruchstücks, d. h. des Gelenkkopfes. Das Periost, welches bei der Callusbildung eine so wesentliche Rolle spielt, fehlt hier gänzlich, und wenn auch nicht bloß durch das Ligamentum teres, sondern ausserdem durch den eingestülpten, den Schenkelhals umfassenden Theil der Kapsel (die sog. Retinacula) Blutgefäße zum Schenkelkopf gelangen, so sind diese doch theils an und für sich unzureichend, theils oft in grosser Ausdehnung zerissen; die durch das Ligamentum teres zugeleiteten Blutgefäße kommen wenig in Betracht, da dies Band in den bisher untersuchten Fällen meist zerstört gefunden wurde. Nichtsdestoweniger werden zahlreiche Fälle von vollständig geheilten intracapsulären Schenkelhalsbrüchen aufgeführt. Amesbury, van Houte, Stanley, Brulatour, Goyrand u. A. haben solche beschrieben, in vielen anatomischen Museen werden Belegstücke der Art aufbewahrt, und Richelot und Chassaignac²⁾ geben sogar an, dass unter 50 Fällen

¹⁾ American journal of med., 1867, pag. 377.

²⁾ In ihrer französischen Uebersetzung der Werke A. Cooper's. Paris 1837.

im Durchschnitt einmal knöcherne Verbindung zu Stande komme. Wäre durch die Anwesenheit verdichteter Knochensubstanz im Innern des Schenkelhalses und stalaktitenförmiger Knochen-Neubildungen in der Umgebung desselben auch immer der Beweis geliefert, dass eine intracapsuläre Fractur bestanden habe, so würden in der That die Beweisstücke für das Vorkommen knöcherner Vereinigung nicht ganz selten sein. Der Anschein eines geheilten intracapsulären Bruches kann aber sehr leicht durch anderweitig entstandene Entzündungen (vgl. *Arthrophlogosis deformans*) herbeigeführt werden. Der Verdacht gegen die Gültigkeit der meisten jener Belegstücke muss in hohem Grade steigen, wenn über die Verhältnisse der vorausgegangenen Verletzung ein genauer Nachweis nicht geliefert werden kann, oder wenn dieselben anatomischen Veränderungen sich gar an beiden Schenkelbeinen in gleicher oder doch ähnlicher Weise entwickelt vorfinden. Anderer Seits kann die Möglichkeit einer vollständigen Callusbildung nicht geleugnet werden.

Fig. 56.



Weiss man aus den Erscheinungen am Lebenden, dass ein Schenkelhalsbruch bestand, und findet man später an der Leiche eine durch den intracapsulären Theil des Schenkelhalses verlaufende Knochennarbe, d. h. eine Scheibe dichter, fester Knochensubstanz ohne anderweitige Spuren von Gelenk- oder Knochen-Entzündung, so ist man berechtigt, für einen solchen Fall die Vereinigung eines Schenkelhalsbruches durch Callus anzunehmen.

Ein Beispiel der Art liefert der Fig. 56 abgebildete Fall von Goyrand.

Ich habe einen ähnlichen Fall selbst beobachtet und behandelt und mehrere Jahre nach der Heilung anatomisch zu untersuchen Gelegenheit gehabt. Das Präparat zeigt auf dem Längsdurchschnitt eine quer durch den Schenkelhals verlaufende weisse Linie, welche aus fester Knochensubstanz besteht. Knochenneubildungen in der Umgegend sind nicht vorhanden; der Schenkelhals ist verkürzt und schräg nach Vorn gewandt. Dass es sich nicht etwa um einen eingekeilten Schenkelhalsbruch ausserhalb des Kapselbandes handelte, beweist die unmittelbare Nähe der Knochennarbe am Schenkelkopf und die vollkommen quere Richtung derselben.

Jedenfalls erfolgt knöcherne Verheilung der intracapsulären Schenkelhalsbrüche nur mit Difformität. Der Schenkelhals wird desto kürzer und der Gelenkkopf steht desto mehr rechtwinklig gegen den Schaft, je beträchtlicher die Einkeilung der Bruch-Enden war.

In der Regel hinterlassen intracapsuläre Schenkelhalsbrüche eine Pseudarthrose, deren anatomische Verhältnisse verschieden sein können. Beide Bruch-Enden schleifen sich an einander

ab, und der Schenkelhals wird dadurch beträchtlich verkürzt. Besonders geht ein grosser Theil des Schenkelkopfes durch Resorption verloren; in einzelnen Fällen schwindet er ganz. Gewöhnlich stellt er eine kappenförmig auf dem unteren Bruch-Ende aufsitzende Knochenschale dar; seltener wird er von einer ausgehöhlten Fläche des unteren Bruch-Endes umfasst. Die Bruchflächen erhalten einen Ueberzug von compacter Knochensubstanz, unregelmässige Faserzüge gehen von einem Bruchstück zum anderen; das Kapselband wird ungemein verdickt, verknöchert an einzelnen Stellen und giebt dem Gliede wesentlich eine Stütze, welche durch die unzureichende Befestigung der Bruch-Enden unter einander nicht bewirkt wird. Vgl. Fig. 57 (nach A. Cooper). Zuweilen sind die Knochen-Neubildungen in der Umgegend des Kapselbandes so bedeutend, dass sie ein pfannenartiges Dach über dem Trochanter major darstellen, gegen welches dieser sich anstemmen und mittelst dessen der Rumpf auf dem Trochanter ruhen kann (J. Powell).

Fig. 57.



Aetiologie. Prädisposition zu Schenkelhalsbrüchen bedingt das höhere Alter. Dies gilt besonders für die intracapsulären Brüche.

Dupuytren sah solche niemals bei Individuen unter 50 Jahren, Asthley Cooper fand unter 225 intracapsulären Schenkelhalsbrüchen nur 2 bei Individuen unter 50 Jahren; jedoch kommen sie ausnahmsweise auch viel früher vor. Langstaff sah einen intracapsulären Bruch bei einem Manne von 32 Jahren, Stanley sogar bei einem 18jährigen Menschen. In beiden Fällen ist die Diagnose durch die Section gesichert; im letzteren war bereits knöcherne Vereinigung eingetreten. Desportes (vgl. Gurll, Ueber Knochenbrüchigkeit etc. pag. 42. Handbuch I. pag. 230) beschreibt einen beiderseitigen Bruch des Schenkelhalses, der bei einem Negerknaben in Folge heftiger Muskelcontractionen während des Tetanus entstand.

Die grössere Häufigkeit der Schenkelhalsbrüche bei älteren Individuen beruht auf der senilen Osteoporose. Die Corticalschicht wird beträchtlich dünner, die Lamellen der Medullarsubstanz schwinden unter Erweiterung der Markräume; der Schenkelhals erscheint wie mit Knochenmark getränkt; die spongiöse Substanz kann leicht mit dem Messer in verschiedenen Richtungen durchschnitten und herausgehoben werden; sie leistet auch einer unbedeutenden Gewalt keinen Widerstand und kann daher die papierdünne Corticalschicht in keiner Weise unterstützen¹⁾. So reicht denn oft das eigene Körpergewicht hin, um diesen dünnwandigen Cylinder zu zerbrechen. Am Stärksten

¹⁾ Vgl. pag. 320 u. f. und die Erläuterungen über Osteoporose im nächsten Capitel.

ausgeprägt finden sich diese Altersveränderungen an dem Schenkelhalse alter Frauen. Bei diesen ist der Schenkelhals auch noch anderweitig für die Fractur prädisponirt. Zunächst ragt der Trochanter major stärker hervor als bei Männern und wird mithin bei einem Falle heftiger und directer getroffen als bei letzteren. Ferner ist die mehr rechtwinklige Anfügung des Schenkelhalses an den Schenkelschaft von Bedeutung; ein Stoss, welcher sich von den Füßen her in der Richtung des Schenkelschaftes aufwärts fortpflanzt, kann den Widerstand des Schenkelhalses leichter überwinden, als im männlichen Körper, wo derselbe ihm in schräger Richtung entgegensteht. Gründe genug für die vorherrschende Häufigkeit intracapsulärer Schenkelhalsbrüche bei alten Frauen.

Die Gelegenheitsursache eines extracapsulären Schenkelhalsbruches ist in der Regel ein Fall auf den grossen Trochanter, seltener ein Fall auf die Kniee oder auf die Füsse¹⁾. Der extracapsuläre Bruch setzt zu seiner Entstehung eine bedeutendere Gewalt voraus, als der Bruch innerhalb des Kapselbandes. Den intracapsulären Bruch sieht man bei alten Leuten durch sehr geringfügige Gewalt, namentlich auch in Folge blossen Fehltretens oder Stolperns ohne Fall entstehen.

Diagnose. Nicht blos die Unterscheidung der Schenkelhalsbrüche unter einander, sondern auch die Diagnose eines Schenkelhalsbruches überhaupt bietet oft beträchtliche Schwierigkeiten dar. Im höchsten Grade ist dies der Fall, wenn Einkeilung besteht, wobei der Verletzte in einzelnen Fällen sogar die Extremität bewegen und gehen kann²⁾. Der heftige Schmerz, die schwer zu constatirende und oft höchst unbedeutende Verkürzung, das von dem Patienten im Augenblick der Verletzung vielleicht wahrgenommene Krachen sind noch sehr unzureichende Beweise für das Bestehen eines Schenkelhalsbruches.

Die einzelnen Symptome, auf welche man zu achten hat, sind folgende.

1) Verkürzung. Dieselbe beträgt bei frischen Brüchen innerhalb des Kapselbandes höchstens 5 Centim., zuweilen aber auch nur einige Millim. Bei veralteten Brüchen kann sie in Folge der Dehnung der Kapsel bis zu 10 Centim. steigen. Bei Brüchen ausser-

¹⁾ Nach den Versuchen von Heppner (Beobacht. u. Untersuch. über eingekeilte Schenkelhalsbrüche, Oestr. med. Jahrb. III. 1869), scheint weniger der Schlag gegen den Trochanter, als der Gegenschlag des Acetabulum gegen den Gelenkkopf die Veranlassung des extracapsulären Bruches zu sein.

²⁾ Ich muss ausdrücklich bemerken, dass ich eine extracapsuläre Fractur des Schenkelhalses durch Fall auf die Knie oder auf die Füsse noch nicht gesehen habe.

halb des Kapselbandes ist die Verkürzung selten beträchtlich, da gewöhnlich Einkeilung besteht; sie beträgt alsdann meist kaum 2 Cent. Bei Brüchen ohne Einkeilung kann sie, wenn dieselben ganz ausserhalb des Kapselbandes verlaufen, von Anfang an 6 Cent. und darüber betragen. Man darf also weder die Verkürzung an sich als pathognomonisches Zeichen eines Schenkelhalsbruches überhaupt, noch aber den Grad der Verkürzung als charakteristisch für die Unterscheidung der beiden Varietäten der *Fractura colli femoris* ansehen. In letzterer Beziehung ist von Wichtigkeit, dass bei Brüchen innerhalb der Kapsel die Verkürzung mit dem allmäligen Nachgeben derselben allmählig zunehmen kann, während bei extracapsulären Fracturen eine allmähliche Zunahme derselben nicht vorkommt, eine plötzliche aber nur möglich ist, wenn eine bestehende Einkeilung oder Befestigung durch das unversehrt gebliebene Periost gelöst wird.

Um sich von der Verkürzung zu überzeugen, legt man den Verletzten horizontal mit ausgestreckten Beinen auf ein festes Lager und bringt das Becken in eine solche Stellung, dass beide *Spinae ilei anteriores superiores* in gleicher Höhe stehen und somit eine Linie, welche man von der einen Spina zur anderen zieht, gegen eine vom Schwertfortsatze zur Schoossbeinfuge gezogene Linie vollkommen rechtwinklig verläuft. Diese Vorsicht in Betreff der Stellung des Beckens ist von der grössten Wichtigkeit, weil der Kranke gewöhnlich unbewusst das Becken nach der Seite der Verletzung neigt und daher eine scheinbare Verlängerung der in der That verkürzten Extremität bestehen kann. Sobald beide *Spinae anteriores superiores* in gleicher Höhe stehen, lässt sich durch Messung einer von der Spina der kranken Seite zu dem Köpfchen der Fibula oder zu dem äusseren Knöchel geführten Linie über die bestehende Verkürzung entscheiden. Eine Messung von der Spitze des Trochanter major zur *Crista ilei* kann Täuschungen veranlassen, da der Trochanter bei der *Fractura colli femoris* nach Hinten rückt, die Höhe der *Crista ilei* aber an verschiedenen Stellen nicht gleich ist. — Durch Zug an der kranken Extremität kann man (sofern keine Einkeilung besteht) mit Leichtigkeit die normale Länge herstellen; aber die Verkürzung kehrt wieder, sobald der Zug nachlässt.

2) Rotation des Schenkels nach Aussen. Das gebrochene Bein liegt gewöhnlich auf seiner äusseren Seite, mit leicht gebeugtem Hüft- und Kniegelenk, so dass die Ferse der kranken Extremität den Zwischenraum zwischen der Achillessehne und dem inneren Knöchel des gesunden Beins berührt oder diesem doch in

Fig. 58.



ihrer Lage entspricht (Fig. 58). Diese Rotation nach Aussen vermag der Patient nicht zu beseitigen; der Hand des Wundarztes gelingt es ohne Schwierigkeit. Vgl. pag. 465.

Sehr selten findet sich Rotation des verletzten Beins nach Innen. — Dupuytren glaubte dieselbe aus der Richtung des Bruches erklären zu können: verlief die Bruchlinie in der Art schräg, dass das obere Bruch-Ende eine vor dem unteren schräg abwärts ragende Spitze bildet, so entstehe Rotation nach Aussen; fände das umgekehrte Verhältniss Statt, so erfolge Rotation nach Innen. Nach Goyrand gleitet die Bruchfläche des Schenkelhalses, d. h. des unteren Bruch-Endes, hinter den Schenkelkopf, so dass die vordere Fläche des Schenkelhalses sich gegen die äussere Fläche des Schenkelkopfes anstemmt, und der Trochanter folglich nach Vorn gewandt ist. In dieser Stellung ist der Schenkelhals zwischen der Kapsel und dem Gelenkkopf eingeklemmt und wird vielleicht auch noch durch die Spannung der vorderen Bündel des Gluteus medius in derselben fixirt. Dass diese Erklärung für den gegebenen Fall richtig war, wird dadurch in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Rotation nach Innen nicht wiederkehrte, vielmehr die gewöhnliche Rotation nach Aussen eintrat, nachdem die Extremität durch Extension einmal in die normale Stellung gebracht war. Bevan (vgl. Cannstatt's Jahresbericht pro 1852. Bd. IV. pag. 63) glaubt, auf Grund der anatomischen Untersuchung eines Falles, in welchem Rotation nach Innen bestand, dass dieselbe sich immer finden müsse, sobald jeder Zusammenhang zwischen dem Schenkelkopf und dem Schenkelerschaft aufgehoben sei; denn alsdann könnten die in der Fossa trochanterica inserirenden Muskeln nicht mehr Rotation nach Aussen bewirken, sondern bloss einen Zug aufwärts ausüben, und Tensor fasciae latae und Gluteus medius müssten um so mehr Rotation nach Innen bewirken, als ihnen nicht bloss keine Antagonisten mehr entgegenstünden, sondern durch die Verschiebung des Trochanter nach Hinten und Oben ihre Insertionspunkte am Femur verhältnissmässig weiter nach Aussen zu liegen kämen als im normalen Zustande. Hierbei ist das Gewicht des Fusses gar nicht berücksichtigt! — In verschiedenen Fällen sind wohl auch verschiedene Erklärungen möglich.

3) Veränderung der Gestalt der Hüfte. Der Trochanter major steht, zumal beim extracapsulären Bruch, mehr nach Hinten, auch höher und ragt daher bei der Ansicht von Vorn weniger hervor als auf der gesunden Seite. Wenn er durch Einkeilung des oberen Bruch-Endes oder durch directe Gewalt zersprengt ist, besteht um ihn eine sehr beträchtliche Geschwulst. Die Hüfte erscheint im Ganzen abgeflacht, die Hinterbackenfalte weniger deutlich, als an der gesunden Seite.

4) Bewegungen des Trochanter major. Sucht man den Oberschenkel zu rotiren, so bewegt sich der grosse Trochanter in einem Kreise von kleinerem Halbmesser als auf der gesunden Seite, und zwar um so auffallender, je näher dem Trochanter selbst (je mehr extracapsulär) der Bruch seinen Sitz hat. Dies, wegen der bedeutenden Schmerzhaftigkeit, ohne Chloroform fast immer schwer oder gar nicht zu constatirende Symptom verliert seinen Werth beinahe gänzlich, wenn Einkeilung besteht.

5) Crepitation. Mit Leichtigkeit vernimmt man bei Brüchen ausserhalb des Kapselbandes ohne Einkeilung Crepitation, sobald rotirende Bewegungen an dem Schenkel gemacht werden. Bei Brüchen innerhalb des Kapselbandes gelingt dies fast immer erst, nachdem man der Extremität wieder ihre normale Länge gegeben hat. Zu diesem Behuf empfehlen Viele, den Kranken sich aufrichten und auf dem gesunden Beine stehen zu lassen (Fig. 58), damit durch das Gewicht der kranken Extremität selbst die nöthige Extension erfolge. Vor einem solchen Verfahren ist dringend zu warnen. Durch diese und ähnliche, zur Vervollständigung der Diagnose vorgenommenen Manipulationen und Bewegungen wird sehr leicht grosser Schaden angerichtet, indem die vielleicht noch unversehrte fibröse Bekleidung des Schenkelhalses zerrissen und damit die Möglichkeit seiner Ernährung vernichtet, oder indem Lösung einer für den Heilungsvorgang günstigen Einkeilung herbeigeführt wird.

6) Sugillationen finden sich namentlich bei Brüchen ausserhalb des Kapselbandes, wenn die veranlassende Gewalt den grossen Trochanter getroffen hat.

7) Schmerz besteht bei Schenkelhalsbrüchen immer, bei den meisten in bedeutendem Grade. Bei Brüchen innerhalb der Kapsel ist in ruhiger Lage die Schmerzhaftigkeit gering, tritt aber mit grosser Heftigkeit in der Umgegend der Insertion des Ileopsoas auf, sobald Bewegungen vorgenommen werden. Bei Brüchen ausserhalb der Kapsel bestehen Schmerzen in der Hüfte und im oberen Theile des Schenkels, welche durch die geringste Bewegung und durch jeden Druck auf den grossen Trochanter aufs Aeussérste gesteigert werden. Bei intracapsulären Brüchen sind die Schmerzen nicht heftig, wenn man im Hüftgelenk blos Beugung und Streckung vorsichtig versucht; beim extracapsulären Bruche sind auch diese Versuche sehr schmerzhaft.

8) Unfähigkeit zu Bewegungen. Im Allgemeinen können die Verletzten die kranke Extremität gar nicht bewegen oder doch nicht in gestreckter Stellung erheben. Sagt man dem Kranken, er

solle das Bein aufheben, so beugt er, wenn ein intracapsulärer Bruch besteht, mit dem Hüftgelenk zugleich das Kniegelenk und zieht die Ferse, ohne sie im Geringsten zu erheben, auf dem Bette hingleitend, gegen das Gesäss. Bei extracapsulären Brüchen ist gewöhnlich der Versuch zu solchen Bewegungen schon so schmerzhaft, dass sie gänzlich unterlassen werden. Bestehen die bereits oben (pag. 465 ff.) erörterten Verhältnisse, durch welche eine Verschiebung der Bruchenden verhindert wird, so kann der Kranke bei extracapsulärem Bruche das Bein bewegen, sogar auf demselben stehen oder selbst einige Schritte weiter gehen. Gewöhnlich ist dieser Zustand aber nur von sehr kurzer Dauer; dann fällt der Kranke, wird von heftigen Schmerzen und Muskelkrämpfen im Bein ergriffen, und ist fernerhin unfähig, Bewegungen mit der verletzten Extremität vorzunehmen.

Differentielle Diagnose. Schenkelhalsbrüche können mit Verrenkungen des Oberschenkels, mit Beckenbrüchen und mit Contusionen des Hüftgelenks verwechselt werden.

Bei Verrenkung des Oberschenkels nach Innen und Oben auf den horizontalen Ast des Schoossbeins besteht zwar, wie beim Schenkelhalsbruch, Verkürzung und Rotation nach Aussen; aber der Schenkelkopf bildet eine deutlich hervorragende Geschwulst in der Inguinalgegend. Bei der Verrenkung nach Hinten besteht Rotation nach Innen, und der Schenkelkopf ist deutlich durch die Weichtheile hindurch im hinteren Umfange des Gelenkes zu fühlen. Bei Verrenkung auf das Foramen obturatorium findet man Verlängerung des Beins. — Bei allen Verrenkungen gelingt die Reduction nur mit Anwendung beträchtlicher Gewalt; ist sie aber einmal ausgeführt, so kehrt die Verschiebung nicht wieder. Bei der Fractur hingegen kann man das Bein ohne grosse Gewalt zur normalen Länge und in die normale Stellung zurückführen; die Verschiebung kehrt aber sogleich wieder, wenn die Extension nachlässt. In Betreff der Einkeilung vgl. pag. 466 ff.

Zwischen Fractur des Schenkelhalses oder des Beckens kann man nur in solchen Fällen schwanken, wo eine sehr bedeutende Gewalt eingewirkt hat, denn nur durch diese kommt ein Beckenbruch zu Stande (vgl. pag. 396 u. f.). Hat bei einem solchen Dislocation des Schenkels Statt gefunden, oder kann Crepitation gehört werden, so fehlen auch niemals Zeichen einer Verletzung oder Functionsstörung der im Becken gelegenen Organe. Die Entfernung zwischen Trochanter major und Spina ant. sup. oss. ilei kann bei Beckenbrüchen niemals merklich verändert sein, es wäre denn, dass eine Fractur der Darmbeinschaukel bestände, welche anderweitig leicht zu erkennen ist.

Der Kreis, welchen der Trochanter major bei Rotation des Schenkels beschreibt, ist bei Beckenbrüchen der normale, ausgenommen, wenn Fractura acetabuli besteht. Diese unterscheidet sich durch den Sitz der Crepitation und die grössere Beweglichkeit, — vorausgesetzt, dass nicht Eindrängung des Caput femoris durch die zersprengte Pfanne besteht, welche aber mit einem Schenkelhalsbruch wegen der Unmöglichkeit einer Verlängerung des Schenkels durch leichten Zug und wegen der gänzlichen Unbeweglichkeit nicht verwechselt werden kann. Die genaue Erforschung des Sitzes der Crepitation ist für die Unterscheidung dieser Fracturen von Wichtigkeit¹⁾.

Bei Weitem häufiger handelt es sich darum, die Unterscheidung von einer Contusion des Hüftgelenks festzustellen. Bei dieser kann ebenso, wie bei Fractur des Schenkelhalses, der Kranke ausser Stande sein, die Extremität zu erheben. Durch Verschiebung des Beckens kann der Schein einer Verkürzung entstehen; das seinem Gewicht folgende Bein kann leicht gebeugt und nach Aussen rotirt liegen; jede Berührung des Trochanter, jeder Zug an der verletzten Extremität kann sehr schmerzhaft sein. Gewiss sind viele Fälle von „vollkommen geheilten Schenkelhalsbrüchen, in welchen auch nicht das geringste Hinken zurückblieb“, als Contusion zu deuten. Soll eine genaue Diagnose gestellt werden, so wäre die schon oben angegebene manuelle Untersuchung und genaue Messung vorzunehmen, wobei jedoch stets im Auge zu behalten ist, dass die dazu erforderlichen Bewegungen, sofern ein Schenkelhalsbruch besteht, leicht mehr schaden, als die Feststellung der Diagnose nutzt. — Natürlich ist von solchen diagnostischen Schwierigkeiten nicht die Rede, sobald Crepitation vernommen wird, mithin bei der grossen Mehrzahl der extracapsulären Schenkelhalsbrüche.

Im Allgemeinen wird man selten irren, wenn man dem Ausspruche von Hodgson²⁾ folgt: „Wenn ein älteres Individuum in Folge eines Falles auf die Hüfte unfähig ist, das betreffende Bein zu gebrauchen, so ist es höchst wahrscheinlich, dass ein Schenkelhalsbruch besteht; dies um so mehr, wenn bei dem Falle keine besonders grosse Gewalt auf den Trochanter eingewirkt hat, wie sie nothwendig wäre, um eine Quetschung von solchem Grade herbeizuführen, dass der Schenkel dadurch unbrauchbar würde.“

¹⁾ Vgl. Beaugrand, Sur la possibilité de confondre les fractures du bassin avec les fractures du col du fémur. Journal des connaiss. méd. 1851, Mars.

²⁾ Vgl. Bransby Cooper, Cases of fracture of the cervix femoris. Goy's Hospital reports. Vol. VII. part. II.

Schon in den nächsten Tagen klärt sich die Diagnose auf: bei der Contusion vermindern sich allmählig alle Funktionsstörungen und Beschwerden, bei der Fractur nehmen sie eher zu.

Als Zeichen eines Schenkelhalsbruches mit Einkeilung heben wir hervor: 1) Auffallend geringe Verkürzung des Beins. 2) Heftige Schmerzen an der Bruchstelle. 3) Möglichkeit, das ausgestreckte Bein aufzuheben und mit demselben aufzutreten, sofern nicht der Trochanter major zugleich zersprengt ist. 4) Beträchtliche Geschwulst und Sugillation in der Umgegend des Trochanter major. Ist derselbe zersprengt, so geht die Geschwulst unmittelbar von ihm aus. 5) Die Extension vermag, wenn sie nicht mit grosser Gewalt ausgeübt wird, die bestehende Verkürzung nicht zu beseitigen.

Die Unterscheidungsmerkmale zwischen den beiden Arten der Schenkelhalsbrüche sind, nach A. Cooper und Malgaigne¹⁾, in der nebenstehenden Tabelle (pag. 477) einander gegenübergestellt, wobei wir jedoch in Betreff des diagnostischen Werthes der einzelnen Symptome auf die vorstehenden Erörterungen verweisen müssen und in praktischer Beziehung ausdrücklich hervorheben, dass man niemals zur Feststellung der Diagnose Manipulationen vornehmen darf, welche durch Lösung der Einkeilung oder Zerreißung der Retinacula nachtheilig werden könnten (vgl. pag. 466).

Complicationen. Schenkelhalsbrüche sind nicht selten complicirt, zumal extracapsuläre, vorzugsweise mit heftiger Quetschung und der dadurch bedingten Entzündung, — mit Wunde namentlich bei Schussverletzungen. (Vgl. Bd. IV.) Alle Intracapsular-Brüche haben einen gewissen Grad von Gelenk-Entzündung nothwendig zur Folge. Dass mit einem Schenkelhalsbruch zugleich an demselben Femur ein Bruch der Diaphyse bestehen kann, hebt v. Pitha mit Recht hervor.

Prognose. Auch im günstigsten Falle heilen Schenkelhalsbrüche mit Zurücklassung einiger Difformität, besonders einiger Verkürzung und behinderter Beweglichkeit des Beins. Die Häufigkeit der Einkeilung bei extracapsulären Brüchen lässt bei diesen öfter eine Heilung mit unbedeutender Verkürzung erwarten. Auch kann hier eher auf einen soliden Callus gerechnet werden. Bei intracapsulären Brüchen ist dies nicht der Fall, und die Verkürzung der Extremität nimmt oft nachträglich bedeutend zu. (Vgl. pag. 471).

Ganz anders sind die Verhältnisse in Bezug auf die durch Schenkelhalsbrüche bedingte Lebensgefahr. Die extracapsulären Brüche

¹⁾ Traité des fractures etc. Paris 1851, pag. 701.

Bruch des Schenkelhalses ausserhalb der Gelenk-Kapsel.

1. In jedem Lebensalter.
2. Gleich häufig bei beiden Geschlechtern.
3. Fall, Schlag oder Stoss von beträchtlicher Heftigkeit auf den grossen Trochanter.
4. Alle Zeichen bedeutender Quetschung in der Gegend des Trochanter major.
5. Sehr heftige Schmerzen in der ganzen Umgegend des Gelenks und des Trochanter major, welche beim Druck auf den letzteren ungemein gesteigert werden und alle passiven und activen Bewegungen unmöglich machen.
6. Verkürzung tritt sofort ein, nimmt an den folgenden Tagen gar nicht oder doch kaum merklich zu und beträgt bald kaum 5, bald aber auch 6 bis 7 Centimeter.
7. Crepitation kann ohne vorherige Extension durch blosses Rotiren des Schenkels erzeugt werden.
8. Der Trochanter dreht sich blos um die Längsachse des Schenkelhalses.
9. Der grosse Trochanter springt stärker nach Hinten hervor, vorausgesetzt, dass er nicht zerprengt oder abgebrochen ist.

Bruch des Schenkelhalses innerhalb der Gelenk-Kapsel.

1. Fast immer im höheren Alter, selten vor dem 50. Jahre.
2. Viel häufiger bei alten Frauen.
3. Keine bedeutende Gewalt, meist Fall auf den Fuss oder auf das Knie oder auf die Hinterbacken.
4. Keine oder geringe Sugillationen und geringe Geschwulst.
5. Bei rubiger Lage geringer Schmerz, bei Bewegungen des Gliedes hauptsächlich in der Gegend des kleinen Trochanter und von da zum Knie hin ausstrahlend, jedoch nicht so heftig, dass active und passive Bewegungen ganz unmöglich würden.
6. Verkürzung zu Anfang oft ganz unmerklich, kann erst nach mehreren Tagen eintreten; Anfangs höchstens 5 Centimeter, später bis zu 10 Centimeter.
7. Crepitation kann erst entdeckt werden, nachdem man dem Gliede seine normale Länge gegeben hat.
8. Beim Rotiren des Schenkels beschreibt der grosse Trochanter einen etwas kleineren Kreis als im normalen Zustande.
9. Der grosse Trochanter erscheint eingedrückt, dem Hüftbeinkamme um so viel, als die Verkürzung beträgt, näher gerückt.

Alter.

Geschlecht.

Veranlassung.

Quetschung.

Schmerz.

Verkürzung.

Crepitation.

Rotation des Trochanter.

Stellung des Trochanter.

sind, da sie die Einwirkung einer viel grösseren Gewalt voraussetzen, welche ohne heftige Erschütterung des ganzen Körpers nicht möglich ist, besonders bei alten Leuten, viel gefährlicher, als die intracapsulären. Tödtlich ist oft die, von Vielen zum Behuf der Behandlung für nothwendig erachtete, andauernde ruhige Lage.

Behandlung. Alle die bei der Beschreibung der Fracturen im Mittelstück des Femur aufgeführten Verfahren und Verbände sind auch für die Schenkelhalsbrüche in Vorschlag gebracht worden.

Von den für die Fracturen des Schenkelhalses speciell angegebenen Verbänden heben wir nur die wichtigsten hervor.

Brüninghausen sucht vor Allem die Rotation nach Aussen zu beseitigen. Deshalb rotirt er das Bein nach Innen, extendirt es bis zur Länge des gesunden Beins, bindet Kniee und Füsse zusammen und legt an die äussere Seite des Schenkels eine von der Crista ilei bis zum Knie reichende gepolsterte Schiene, deren oberes Ende durch einen Beckengurt, und deren unteres Ende durch einen beide Kniee umfassenden Riemen befestigt wird. — Der Verband von A. Cooper, welchen er jedoch nur für den Bruch ausserhalb des Kapselbandes empfiehlt, ist dem vorstehenden ähnlich. Er streckt beide Beine, bindet die Füsse zusammen und umgiebt das Becken mit einem breiten Gürtel, der auch den Trochanter major umfasst und somit das untere (zugleich äussere) Bruch-Ende gegen das obere (innere) andrückt. — Guyot will der Verschiebung der Bruch-Enden entgegen wirken, indem er den Trochanter nach Aussen zieht. Zu diesem Behuf verfährt er ähnlich, wie Desault beim Bruch der Clavicula. Nachdem das Bein extendirt und die Rotation nach Aussen beseitigt ist, schiebt er ein dickes Kissen zwischen die Schenkel und bindet die Kniee möglichst fest zusammen. Auf diese Weise könnte vielleicht bei intracapsulären Brüchen ein Vortheil erzielt werden; bei extracapsulären dagegen kann dies Verfahren nur schädlich wirken. Sowohl die fibröse Bekleidung des Schenkelhalses wird dadurch zerrissen, als auch die so häufig bestehende Einkeilung gelöst und somit Alles beseitigt, was die Heilung begünstigen könnte.

Die Schweben- und Rinnen-Verbände von Mayor und die Aequilibriumsmethode von Mojsisovics bieten bei Schenkelhalsbrüchen keine Vortheile dar, meist sind sie geradezu nachtheilig. Die Dislocation des oberen Bruch-Endes nach Vorn und Oben, welcher durch sie vorzugsweise kräftig entgegengewirkt wird, besteht bei der Fractura colli femoris durchaus nicht. Das obere Bruch-Ende ist vielmehr gar nicht dislocirt, und es muss daher, wenn man dem Schenkel eine rechtwinklige Stellung gegen den Rumpf giebt, sofern nicht etwa die bestehende Einkeilung mehr zum Heile des Patienten wirkt, als der Arzt, die vordere Fläche des unteren Bruch-Endes mit der Bruchfläche des oberen Bruch-Endes in Berührung, und somit in eine möglichst unzweckmässige Stellung kommen.

Der Bruch innerhalb des Kapselbandes verheilt fast niemals durch Callus; feste ligamentöse Verbindung zwischen den Bruch-Enden kommt aber auch zu Stande, wenn dieselben bewegt werden. Weshalb also den Kranken den Qualen und Gefahren einer Monate lang fortzusetzenden Extension und ruhigen Lage unterwerfen? Von

diesem Gesichtspunkte ausgehend, liess A. Cooper die Kranken nur 10 bis 15 Tage auf der doppelt geneigten Ebene liegen, dann aber aufstehen, zunächst auf einem hohen Stuhle sitzen, um eine zu starke Beugung des Schenkels zu verhüten, späterhin mit Krücken und demnächst mit einem Stocke gehen, so dass sie endlich das verkürzte Glied wieder gebrauchen lernten. Ein Schuh mit dicker Sohle und hohem Absatz trug dazu bei, die Verkürzung auszugleichen.

Diejenigen, welche knöcherne Vereinigung erzielen zu können glauben (Dupuytren, Sanson u. A.), empfehlen das Still-Liegen auf der doppelt geneigten Ebene, für Erwachsene 3 bis 4 Monate lang, bei jugendlichen Individuen 70 bis 80 Tage. Es dürfte vortheilhaft sein, hierbei immer beide Beine auf die schiefe Ebene zu legen, weil dadurch einer Verschiebung des Beckens, welche sonst alle Bemühungen des Arztes vergeblich machen könnte, sicherer vorgebeugt wird. Auch darf die für den Oberschenkel bestimmte Ebene nicht steil ansteigen, weil sonst die Bruchflächen nicht aufeinander passen. Ausserdem wäre ein Druck auf den grossen Trochanter entweder mittelst des bereits erwähnten Cooper'schen Gürtels oder durch eine lange Schiene, welche an der äusseren Seite des Schenkels befestigt wird, hinzuzufügen. — Mit bei Weitem grösserer Sicherheit und Bequemlichkeit bewirkt der Gypsverband die Retention. Die permanente Extension mittelst aufgeklebter Heftpflasterstreifen hat sich auch hier bewährt. Der Zug muss in horizontaler Richtung erfolgen, ohne dass der Fuss erheblich gehoben wird. Vgl. pag. 349 u. 354.

Erlaubt es das Allgemeinbefinden des Kranken, so ist es gewiss nützlich, ihn nicht so früh, wie A. Cooper vorschreibt, aufstehen zu lassen, nicht blos in der Hoffnung auf knöcherne Vereinigung, sondern weil die ligamentöse Zwischensubstanz um so kürzer und fester ausfällt, je weniger sie während ihrer Entwicklung gedehnt und gezerrt wurde, was für die künftige Brauchbarkeit des Gliedes von grosser Bedeutung ist.

Bei der Behandlung des Schenkelhalsbruches ausserhalb des Kapselbandes muss man stets nach knöcherner Vereinigung trachten, daher die Bruch-Enden in gehörige Berührung bringen und in derselben zu erhalten suchen. Hat man Grund anzunehmen, dass Einkeilung besteht, so ist nur die Rotation nach Aussen zu beseitigen und ihre Wiederkehr durch einen Verband zu verhüten. Besteht keine Einkeilung, so hat man erst durch eine regelmässige Extension die normale Länge der Extremität herzustellen und dann durch einen sehr genauen und sorgfältig zu überwachenden Verband die Bruch-

Enden möglichst vollkommen in Berührung zu erhalten. In diesen Fällen schien, um die Brauchbarkeit der Extremität in möglichst hohem Grade wieder herzustellen, schon nach früheren Erfahrungen, die permanente Extension in ausgestreckter Lage des Beins das vorzüglichste Mittel zu sein. Hierzu empfahl sich besonders der Desault'sche Verband. An die innere und äussere Seite des Beins wird je eine lange Schiene gelegt; beide werden durch Binden an der kranken Extremität befestigt, die äussere, welche beträchtlich länger ist als die Extremität, trägt ausserdem an ihrem oberen Ende einen zwischen den Beinen hindurch geführten Contraextensions-Gurt. An ihrem unteren Ende trägt die letztere ein Querbrett, an welchem der Fuss zur Ausübung der Extension befestigt wird. Bei empfindlichen Kranken war dieser Verband aber nicht anwendbar. Man musste sich bei ihnen auf die doppelt geneigte Ebene oder den Kleister-Verband beschränken. Erstere führte alle Uebelstände einer andauernden Rückenlage mit sich; letzterer vermochte in den ersten Tagen der Verschiebung nicht vorzubeugen und musste daher Anfangs durch den Desault'schen Verband oder andere Extensions-Vorrichtungen verstärkt werden, wodurch es aber bei Weitem nicht immer gelang, den beabsichtigten Zweck zu erreichen. Die permanente Extension mittelst Gewichten, welche an longitudinal aufgeklebten Heftpflasterstreifen ziehen, überhebt uns dieser Schwierigkeiten.

In der Mehrzahl der Fälle wird durch den Gypsverband die Retention so sicher, wie durch irgend einen anderen Verband, bewirkt, und der Kranke kann, sobald der Gyps erstarrt ist, sich nicht blos im Bett hin und her drehen, sondern nach einiger Zeit auch, sofern seine Kräfte dazu ausreichen, aufstehen und auf Krücken umhergehen. Bei alten oder sehr empfindlichen Personen muss man den Gypsverband freilich doppelt weich polstern und doppelt sorgfältig überwachen, um Druckbrand zu verhüten. Gerade bei Solchen ist er aber von der grössten Bedeutung, weil er sie vor der andauernden Rückenlage bewahrt, welche, wenn schon Leiden der Respirations- und Circulations-Organen bestehen (wie namentlich der bei alten Leuten so häufige Bronchialkatarrh), geradezu das Leben gefährdet.

Die Dauer der Heilung ist, wenn Einkeilung besteht, 70 Tage. Bei extracapsulären Brüchen ohne Einkeilung darf man vor Ablauf von 3 Monaten den Verband nicht verlassen, weil die Berührung der Bruchflächen hier immer eine weniger innige ist, die Callusbildung daher nicht so regelmässig erfolgen kann und eine grosse Festigkeit des Callus erforderlich ist, da durch ihn allein das Gewicht des Körpers getragen werden muss. Dies gilt in noch höherem Grade

für die intracapsulären Brüche, sofern man bei ihnen überhaupt auf knöcherne Vereinigung rechnen darf.

Wenn man bei sorgfältiger Untersuchung nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden vermag, ob ein Schenkelhalsbruch innerhalb oder ausserhalb des Kapselbandes verläuft, so hat man die Behandlung einzurichten, als ob es sich um einen extracapsulären Bruch handle, da hierdurch, wenn der Bruch ein intracapsulärer wäre, kein Schaden gestiftet wird, während bei einem extracapsulären die Heilung wesentlich beeinträchtigt werden kann, wenn man denselben etwa in der von A. Cooper für den Intracapsular-Bruch empfohlenen Weise (vgl. pag. 479) ohne Anwendung mechanischer Hülfe behandeln wollte.

Von den complicirten Fracturen namentlich auch den Schussverletzungen des Schenkelhalses wird wegen ihrer innigen Beziehungen zum Hüftgelenk bei den Krankheiten des letzteren (Bd. IV. die Rede sein.

C. Brüche des unteren Endes des Oberschenkelbeins¹⁾.

Am unteren Ende des Femur findet man: 1) Schräg- und Querbrüche durch die ganze Dicke und Breite des Knochens, Brüche oberhalb der Condylen (auch Ablösung der unteren Epiphyse des Femur), 2) Brüche der Condylen selbst.

1) Brüche dicht oberhalb der Condylen

ereignen sich am Häufigsten in Folge eines Falles auf die Kniee, seltener nach einem Fall auf die Füße bei ausgestreckten Beinen. Auch durch directe Gewalt kann an dieser Stelle eine Fractur entstehen. Alsdann hat die Bruchlinie eine quere Richtung oder es findet sich ein Splitterbruch²⁾. Endlich wurde auch Zerreißung des Knochens durch Muskelgewalt beobachtet, indem der Körper sich mit Gewalt

¹⁾ Eine ausführliche Abhandlung über diese Brüche hat Ulysse Trélat geliefert (Archives générales de méd. 1854. Vgl. Cannstatt's Jahresbericht pro 1854, Bd. IV. pag. 50). Er stellte 35 Fälle zusammen, unter denen 14mal Bruch beider Condylen, 12mal Bruch eines einzelnen Condylus, 9mal Bruch dicht über den Condylen, quer oder schräg durch die ganze Dicke des Schaftes sich findet.

²⁾ Ich sah einen Querbruch an dieser Stelle mit beträchtlicher Splitterung auf- und abwärts bei einem kräftigen jungen Menschen, in Folge des Auffallens eines schweren Sacks voll Getreide auf den mit gebeugtem Knie angestemmtten Schenkel. Der Verletzte war, nach seiner und der Angehörigen Angabe, noch 2 Stunden Weges mit dem gebrochenen Beine gegangen. Es bestand also gewiss Einkeilung. Als ich ihn, 14 Tage nach der Verletzung, zu sehen bekam, war die Bruchstelle von einem, den ganzen Oberschenkel erfüllenden Jaucheherde umgeben, das untere Bruch-Ende nach Hinten verschoben, Crepitation sehr deutlich.

fortbewegte, während der Unterschenkel fixirt war¹⁾. Entsteht dieser Bruch durch indirecte Gewalt, so ist die Richtung gewöhnlich schräg von Hinten und Oben nach Vorn und Unten. Die Verschiebung pflegt dann bedeutend zu sein, zuweilen in der Art, dass das obere Bruchstück mit seiner Spitze die *Mm. cruralis*, *rectus femoris* und die Haut durchbohrt. Das untere Bruchstück kann mit seiner Bruchfläche nach Hinten umgekehrt werden durch die Wirkung des *Gastrocnemius* und *Popliteus*. Jedoch besteht diese Umdrehung bei Weitem nicht in allen Fällen und meist nur unvollständig. *Adductor magnus* und *Biceps* halten durch ihre, die Bruchstelle umfassenden Insertionen der Wirkung der erstgenannten Muskeln das Gleichgewicht. Bei sehr schrägem Verlaufe des Bruches widersetzen sich überdies die *Mm. vasti femoris* einer solchen Umkehrung. Verläuft die Bruchlinie schräg von Vorn und Oben nach Hinten und Unten, so wird das untere Bruchstück durch den Muskelzug mit seiner zackigen Bruchfläche (Spitze) nach Vorn gedrängt, während das hintere in die Kniekehle geräth und dort die grossen Gefässe verletzen oder comprimiren kann. Mit einer mehr oder weniger queren Fractur oberhalb der Condylen besteht nicht selten zugleich ein verticaler (Längs-) Bruch, der bis in's Gelenk eindringt, das untere Ende des Femur in zwei Hälften spaltet, beide Condylen also von einander und von dem übrigen Knochen trennt²⁾, ähnlich wie dies am unteren Ende des Humerus vorkommt (vgl. pag. 420). — Einkeilung kann bei den verschiedensten Richtungen der Bruchlinie vorkommen. — Auch Rotation des unteren Bruchstücks (*Dislocatio ad peripheriam*) kann mit den übrigen Arten der Verschiebung combinirt sein.

Die Diagnose ist nicht immer leicht. Beträchtliche Verkürzung, Vorspringen des einen Bruch-Endes oberhalb der Kniescheibe, abnorme Beweglichkeit, *Crepitation* — lassen, sofern nicht Einkeilung besteht, über die Art der Verletzung allerdings keinen Zweifel. Häufig greifen aber die Bruchzacken so in einander ein, dass bei gleichzeitiger Unversehrtheit eines Theils des Periosts und der Gelenkbänder jede Verschiebung, auch die abnorme Beweglichkeit und die *Crepitation* fehlen kann; man glaubt oft, blos eine Gelenkentzündung vor sich zu haben.

¹⁾ Von dieser „Zerreissung“, welche Trélat besonders aufführt, sind solche Fälle zu unterscheiden, in denen die Fractur bei ganz unerheblichen Anstrengungen zu Stande kam, wovon sich bei Gurlt (*Handbuch I. pag. 241*) 3 Beispiele finden.

²⁾ Bruch beider Condylen, nach Trélat.

Die Prognose ist nicht bloß in den Fällen, wo eine der sehr häufigen Nebenverletzungen (Zerreißung der Bänder des Kniegelenks, der Muskeln, der grossen Blutgefässe, Durchbohrung der Haut) besteht, sondern wegen der Nähe des Kniegelenks und wegen des gewöhnlich schrägen, oft splitternden Verlaufes der Bruchlinie überhaupt viel schlechter, als bei Brüchen im Mittelstück des Femur. In Cooper's Fällen erfolgte die Heilung mit beträchtlicher Verkürzung und einem solchen Hervorstehen des oberen Bruch-Endes, dass die Kniescheibe durch dasselbe abwärts gedrängt und die Wirksamkeit der an ihr befestigten Muskeln daher in hohem Grade beeinträchtigt wurde. Nach Trélat erfolgte überhaupt nur in der Hälfte der Fälle Heilung, und diese erforderte zu ihrer Vollendung mehr als 200 Tage. Sehr wesentlich ist, ob der Bruch sich innerhalb oder ausserhalb der Kapsel befindet. Je weiter er sich von derselben entfernt, desto mehr verhalten sich diese Fracturen wie Brüche des Mittelstücks.

Bei der Behandlung des Bruches dicht oberhalb der Condylen des Femur soll man, nach der Angabe der meisten Wundärzte, vorzüglich der Umdrehung des unteren Bruch-Endes nach Hinten entgegen zu wirken suchen. Aus diesem Grunde empfehlen die Freunde der gestreckten Lage einen grossen Tampon in die Kniekehle zu legen; die Lobredner der halbgebeugten Stellung halten diese Methode gerade bei dem in Rede stehenden Bruche für vorzüglich, weil Gastrocnemius und Popliteus dadurch erschlafft werden. A. Cooper berichtet in keinem der von ihm beschriebenen Fälle diese, a priori gefürchtete Verschiebung und hat auch gegen sie keine besondere Behandlung eingeleitet. Nach seinen Erfahrungen ist die gestreckte Lage die günstigste. In einem seiner 3 Fälle sprang das obere Bruch-Ende stark hervor, sobald man das Knie beugte, während die normale Stellung bei gestrecktem Kniegelenk leicht zu bewirken war. Mit Rücksicht auf die voraussichtlich eintretende Steifigkeit im Kniegelenk empfiehlt sich gleichfalls die Behandlung in ausgestreckter Lage, da ein steifes Bein jedenfalls brauchbarer ist, wenn es gerade, als wenn es im Kniegelenk gebeugt steht. Durch welche Verbände und Apparate in gestreckter Stellung die permanente Extension ausgeübt werden kann, haben wir schon bei den Brüchen des Mittelstücks des Femur (pag. 453 ff.) erläutert. — Bei einem Querbruch befinden sich die Bruchflächen in gestreckter Stellung des Gliedes in möglichst genauer Berührung. Das untere Bruch-Ende wird gegen das obere durch den Muskelzug gleichsam angepresst. Dies ist bei halb gebeugter Lage in viel geringerem Grade der Fall. A. Cooper empfiehlt deshalb auch für diese Brüche die permanente Extension in gestreckter

aber, auf welche sich die ganze Gewalt dieser Muskeln concentrirt, befindet sich in diesem Augenblick nicht mit ihrer ganzen hinteren Fläche, sondern nur mit einem kleinen Theile derselben auf der Fossa patellaris des Femur. Ihr oberes Ende wird durch die Streckmuskeln bei halb gebeugtem Knie nach Hinten und Oben gezogen. Ihr unteres Ende kann nicht nachgeben, da es in entgegengesetzter Richtung durch das Ligamentum patellae befestigt wird. Die Kniescheibe befindet sich somit unter ähnlichen Verhältnissen, wie ein Stab, den wir vor dem Knie mit den Händen zerbrechen. Ueberwindet die Kraft der Extensoren die Cohäsion der Patella, so entsteht ein Querbruch derselben. Leistet letztere Widerstand genug, so zerreisst zuweilen das Ligamentum patellae oder (viel seltener) die gemeinsame Sehne der Streckmuskeln, oder (am Seltensten) die Spina tibiae bricht ab. Vermögen alle diese Theile der Zusammenziehung der Extensoren zu widerstehen, so kann endlich der beabsichtigte Zweck der Aufrechterhaltung des Körpers erreicht oder, bei unzureichender Kraft der Extensoren, auch der Fall, welcher verhütet werden sollte, nicht verhindert werden. Dieser Mechanismus ist bereits von J. L. Petit richtig erkannt worden.

Selten kommt ein Querbruch der Kniescheibe durch Muskelzug bei gestreckter Stellung des Beins zu Stande. Es gehört dazu eine sehr grosse Muskelkraft. Desault erzählt einen Fall der Art. Ein Kranker, an welchem der Steinschnitt gemacht war, wurde von so gewaltigen Convulsionen ergriffen, dass beide Kniescheiben zerbrachen. Auch bei Tänzern hat man im Augenblick des Emporspringens vom Boden diesen Bruch entstehen sehen. — Aeusserst selten brechen beide Kniescheiben zugleich; eher noch eine nach der anderen in verschiedenen Jahren, wovon ich 2 Beispiele beobachtet habe.

Verschiebung. Bei Quer- und Schrägbrüchen, sowie auch bei den meisten Splitterbrüchen, ziehen die Extensoren das obere Bruchstück aufwärts. Ist der die vordere Fläche der Patella überkleidende fibröse Ueberzug gar nicht oder nicht gänzlich zerrissen, so beträgt die Verschiebung des oberen Bruch-Endes (somit auch der Zwischenraum zwischen beiden Bruch-Enden) nur einige Millimeter. Wenn jener Ueberzug dagegen gänzlich zerrissen ist, so kann das obere Bruchstück um mehrere Centimeter aufwärts gezogen werden. Durch Beugung im Kniegelenk wird der Abstand zwischen den Bruch-Enden beträchtlich vermehrt. Auch bei Längsbrüchen, wo sonst keine Verschiebung der Bruchstücke besteht, kann dieselbe durch Beugung im Kniegelenk herbeigeführt werden (de la Motte), indem die an den Seitentheilen der Kniescheibe angehefteten Bündel der Mm. vasti gespannt werden.

3) Brüche am Unterschenkel.

Die Fracturen der Unterschenkelknochen galten früher für die häufigsten aller Brüche. Genauere Untersuchungen¹⁾ haben ergeben, dass sie allerdings über 15 Procent aller Fracturen ausmachen, aber doch von den Vorderarm- und Rippen-Brüchen an Häufigkeit übertroffen werden.

Wenn man von Unterschenkelbrüchen schlechtweg spricht, so versteht man darunter die Brüche der Tibia und der Fibula; daher auch der sehr gebräuchliche Ausdruck „Bruch beider Unterschenkelknochen“. Die Brüche der Kniescheibe haben mit den übrigen Unterschenkelbrüchen nichts gemein, bieten dagegen grosse Uebereinstimmung mit den Brüchen des Olecranon dar.

A. Brüche der Kniescheibe.

Die Brüche der Kniescheibe (deren Frequenz kaum 2 Procent aller Fracturen beträgt) sind meist Querbrüche; es kommen aber auch Schräg-, Längs- und Splitterbrüche an ihr vor. Der Bruch ist bald einfach, bald complicirt mit Contusion oder Wunde, welche letztere, sobald sie die Bruchstelle blosslegt, indirect auch das Gelenk öffnet. Ohne Erguss in's Gelenk besteht dieser Bruch niemals.

Ätiologie. Die Veranlassung eines Kniescheibenbruches ist bald ein Schlag, ein Fall auf's Knie, bald Muskelcontraction. Brüche, die durch letztere entstehen, nennt man auch Brüche durch Zerrei- sung des Knochens. Die Längsbrüche, ferner die complicirten und die Splitterbrüche der Patella entstehen immer in der erstgedachten Weise, setzen folglich eine directe Gewalt voraus; Quer- und Schräg- brüche können allerdings auch durch eine solche entstehen, werden aber viel häufiger durch eine plötzliche und heftige Zu- sammenziehung der an der Kniescheibe sich befestigenden Muskeln veranlasst. Diese Entstehungsweise der Quer- und Schräg- brüche ist oft verkannt worden, indem man den Fall, welcher die unmittelbare Folge des Bruches (wegen der sogleich eintretenden Beugung des Unterschenkels) sein muss, häufig für die Ursache desselben angesehen hat. Die Fractur entsteht in solchen Fällen durch das Bestreben, den Körper in dem Augenblicke, wo ihm durch Ausgleiten oder auf andere Weise ein Sturz hintentüber droht, im Gleichgewicht zu erhalten. Dabei machen die Extensoren des Unter- schenkels eine plötzliche heftige Zusammenziehung, die Kniescheibe

¹⁾ Vgl. Gurlt, Normal-Statistik etc., Arch. f. klin. Chirurgie, 1862. Bd. III. pag. 393.

aber, auf welche sich die ganze Gewalt dieser Muskeln concentrirt, befindet sich in diesem Augenblick nicht mit ihrer ganzen hinteren Fläche, sondern nur mit einem kleinen Theile derselben auf der Fossa patellaris des Femur. Ihr oberes Ende wird durch die Streckmuskeln bei halb gebeugtem Knie nach Hinten und Oben gezogen. Ihr unteres Ende kann nicht nachgeben, da es in entgegengesetzter Richtung durch das Ligamentum patellae befestigt wird. Die Kniescheibe befindet sich somit unter ähnlichen Verhältnissen, wie ein Stab, den wir vor dem Knie mit den Händen zerbrechen. Ueberwindet die Kraft der Extensoren die Cohäsion der Patella, so entsteht ein Querbruch derselben. Leistet letztere Widerstand genug, so zerreißt zuweilen das Ligamentum patellae oder (viel seltener) die gemeinsame Sehne der Streckmuskeln, oder (am Seltensten) die Spina tibiae bricht ab. Vermögen alle diese Theile der Zusammenziehung der Extensoren zu widerstehen, so kann endlich der beabsichtigte Zweck der Aufrechterhaltung des Körpers erreicht oder, bei unzureichender Kraft der Extensoren, auch der Fall, welcher verhütet werden sollte, nicht verhindert werden. Dieser Mechanismus ist bereits von J. L. Petit richtig erkannt worden.

Selten kommt ein Querbruch der Kniescheibe durch Muskelzug bei gestreckter Stellung des Beins zu Stande. Es gehört dazu eine sehr grosse Muskelkraft. Desault erzählt einen Fall der Art. Ein Kranker, an welchem der Steinschnitt gemacht war, wurde von so gewaltigen Convulsionen ergriffen, dass beide Kniescheiben zerbrachen. Auch bei Tänzern hat man im Augenblick des Emporspringens vom Boden diesen Bruch entstehen sehen. — Aeusserst selten brechen beide Kniescheiben zugleich; eher noch eine nach der anderen in verschiedenen Jahren, wovon ich 2 Beispiele beobachtet habe.

Verschiebung. Bei Quer- und Schrägbrüchen, sowie auch bei den meisten Splitterbrüchen, ziehen die Extensoren das obere Bruchstück aufwärts. Ist der die vordere Fläche der Patella überkleidende fibröse Ueberzug gar nicht oder nicht gänzlich zerrissen, so beträgt die Verschiebung des oberen Bruch-Endes (somit auch der Zwischenraum zwischen beiden Bruch-Enden) nur einige Millimeter. Wenn jener Ueberzug dagegen gänzlich zerrissen ist, so kann das obere Bruchstück um mehrere Centimeter aufwärts gezogen werden. Durch Beugung im Kniegelenk wird der Abstand zwischen den Bruch-Enden beträchtlich vermehrt. Auch bei Längsbrüchen, wo sonst keine Verschiebung der Bruchstücke besteht, kann dieselbe durch Beugung im Kniegelenk herbeigeführt werden (de la Motte), indem die an den Seitentheilen der Kniescheibe angehefteten Bündel der Mm. vasti gespannt werden.

Diagnose. Bald nach der Verletzung findet man beträchtliche Geschwulst, welche nicht blos in dem schlaffen Bindegewebe vor der Patella ihren Sitz hat, sondern wesentlich auf einem Erguss in die Synovialkapsel beruht. Vor der Patella bildet sich auch bald eine ansehnliche Ecehymose. Die Schmerzhaftigkeit ist Anfangs nicht sehr gross, wird aber mit der Zunahme der Geschwulst und der damit gleichen Schritt haltenden Entzündung im Kniegelenk bedeutender. Durch diese Geschwulst kann, besonders wenn der fibröse Ueberzug der Kniescheibe erhalten und die Verschiebung daher unbedeutend ist, die Unterscheidung von Contusion des Kniegelenks schwierig werden, insbesondere beim Längsbruch. Bei Querbrüchen ist der Abstand der Bruch-Enden oft so beträchtlich, dass man die Haut zwischen ihnen tief in das Gelenk eindrücken kann. Selten kann man die Bruch-Enden einander hinreichend nähern, um Crepitation hervorzurufen.

Charakteristisch sind beim Querbruch der Kniescheibe die Bewegungen, welche der Verletzte mit der Extremität ausführt. Er vermag sich nach dem Falle wohl wieder zu erheben, aber er kann sich weder allein aufrecht erhalten, noch vermag er vorwärts zu schreiten oder gar eine Treppe zu steigen, ohne sogleich auf's Neue zu fallen. Geht er dagegen rückwärts, indem er das verletzte Bein, ohne es zu erheben, auf dem Boden hinzieht, so fällt er nicht. Dies verhält sich bei Zerreißung des Ligamentum patellae oder des Tendo extensor. und beim Bruch der Spina tibiae ganz ebenso. Bei beiderseitigen Verletzungen der Art kann von solchen Bewegungen natürlich keine Rede sein.

Heilungsvorgang. Kniescheibenbrüche können durch knöchernen Callus heilen, wenn die Bruchstücke in genauer Berührung erhalten werden. Dies ist bei Längsbrüchen gewöhnlich leicht; bei diesen ist daher die knöcherne Vereinigung die Regel. Querbrüche dagegen heilen gewöhnlich durch eine fibröse Zwischensubstanz, welche, je nach dem Abstände zwischen den Bruch-Enden, mehr oder weniger lang, und je nach der Ruhe, welche man dem Fasergewebe während seiner Entwicklung gegönnt hat, verschieden fest ist. Zuweilen bleibt auch bei genauer Berührung der Bruch-Enden (wahrscheinlich aus inneren Ursachen) die Callusbildung aus, in welchem Falle sich dann eine diarthrosen-ähnliche Pseudarthrose bilden kann¹⁾.

Prognose. Lebensgefährlich ist ein einfacher Kniescheiben-

¹⁾ Chassaignac hat einen Fall der Art beobachtet. Das untere Bruch-Ende stellte einen Gelenkkopf dar, welcher von einer Aushöhlung des oberen wie von einer Gelenkhöhle umfasst wurde. Die Pseudarthrose bestand bereits lange Zeit.

bruch an sich niemals. Complicationen mit Wunde, Quetschung etc. können ihn wegen der unmittelbaren Nähe des Kniegelenks und der Gefahr seiner Entzündung in hohem Grade bedenklich machen. In Bezug auf die Brauchbarkeit des Beins ist die Prognose nie ganz günstig. Wird knöcherne Vereinigung erzielt, so ist Steifigkeit im Kniegelenk zu fürchten; bei fibröser Verbindung der Bruchstücke kann, je nach der Länge derselben, die Wirksamkeit der Extensoren in verschiedenem Grade beeinträchtigt werden. Längsbrüche sind, unter sonst gleichen Verhältnissen, weniger bedenklich als Querbrüche.

Dass Bruch beider Kniescheiben, auch nachdem beide wieder (ligamentös) verheilt sind, Unfähigkeit zur Locomotion hinterlasse (Demarquay, nach mündlicher Mittheilung, vgl. auch *Gaz. des hôpit.* 1866, No. 134), habe ich in drei von mir beobachteten Fällen nicht bestätigen können.

Behandlung. Die zweckmässigste Lage für die Behandlung von Querbrüchen der Kniescheibe ist diejenige, durch welche die Extensoren möglichst stark erschlaft werden. Dies erreicht man durch Beugung im Hüftgelenk¹⁾ und Streckung im Kniegelenk. Man legt das Bein auf eine schräg aufsteigende Ebene, so dass die Ferse 30 bis 50 Ctm. höher zu liegen kommt als die Hüfte.

Das hierzu erforderliche Gerüst kann leicht aus Brettern zusammengenagelt oder mit Hilfe eines umgekehrten Stuhles und einiger Kissen hergestellt werden. Die französischen Wundärzte lassen hierbei den Rumpf horizontal liegen. C. J. M. Langenbeck dagegen lagerte das Bein horizontal, liess den Rumpf aber im Hüftgelenk gegen das Bein rechtwinklig beugen, d. h. also den Kranken im Bett sitzen. Asth. Cooper hält die richtige Mitte, indem er den Kranken mit etwas erhöhtem Kopfe und Rumpfe und mit gleichzeitig schräg aufwärts gerichtetem Beine liegen lässt.

In dieser Lage hat der Patient aber oft sehr bald unerträgliche Schmerzen in der Fersengegend und am Kreuzbein, in kurzer Zeit kann Decubitus entstehen, und die ruhige Lage muss doch mindestens 6 Wochen lang innegehalten werden, wenn man eine leidliche Vereinigung erzielen will. Man muss daher die Art der Lage von Zeit zu Zeit wechseln, kann sogar zeitweise den Patienten auf der Seite der Verletzung mit stark gegen den Leib angezogenem Oberschenkel und schwach gebeugtem Kniegelenk liegen lassen (Sabatier). Zweckmässiger ist es freilich, zur Verhütung nachtheiliger Bewegungen, die Extremität von Anfang an auf der schiefen Ebene in

¹⁾ Dass durch die Beugung im Hüftgelenk nur der *Rectus femoris* und auch dieser, da seine beiden Köpfe dicht über dem Pfannenrande entspringen, nur in geringem Grade erschlaft wird, ist von anatomischer Seite leicht zu verstehen. Deshalb aber die Beugung im Hüftgelenk ganz zu verwerfen, dazu liegt (auch wenn man von dem Vorzuge, welchen die schräg aufsteigende Lage des Beins in Betreff der Förderung des Blutabflusses gewährt, ganz absieht) doch kein Grund vor.

eine vorher zu polsternde Rinne aus Drahtgeflecht (Fig. 59), Blech oder dgl. zu lagern, oder sie mit einem gefensterten Gypsverbande zu umgeben.

Ausser dieser, die Coaptation der Bruch-Enden begünstigenden Lage und einer die Bewegungen im Kniegelenk verbindenden Fixation der Extremität, kann in den meisten Fällen während der ersten 6 bis 8 Tage eine mechanische Behandlung nicht angewandt werden, weil vor Allem der Erguss und die Entzündung im Kniegelenk zu bekämpfen sind. Dazu reichen in den meisten Fällen Eisbeutel aus. Blutentziehungen sind nur sehr selten erforderlich. — Jedenfalls indicirt aber in erster Linie das Gelenkleiden, dann erst der Bruch als solcher.


Bei Längsbrüchen ist eine weitere mechanische Behandlung entweder gar nicht nothwendig, oder sie beschränkt sich auf einen Contentiv-Verband, der durch Heftpflasterstreifen, eine Gypsbinde und dgl. m. leicht hergestellt wird.

Bei den Querbrüchen dagegen tritt uns eine mechanische Indication sehr deutlich entgegen, nämlich die durch Contraction der Extensoren bewirkte Verschiebung des oberen Bruchstücks zu beseitigen. Dies hat man, abgesehen von der oben erörterten Lage des Gliedes, theils durch Abwärtsdrücken und Abwärtsschieben des oberen Bruchstücks, theils auch durch Compression der Oberschenkelmuskeln, durch welche die Wirkung der Extensoren aufgehoben werden sollte, zu erreichen gesucht.

Die Reposition erfolgt durch Hinabschieben des oberen Bruchstücks meist ohne grosse Schwierigkeit, wenn man bis zum 6ten Tage nach der Verletzung wartet, wo dann der Anfangs krampfhaft gespannte Quadriceps extensorius erschlafft zu sein pflegt. — Aus der grossen Zahl der für die Retention beim Querbruch der Patella empfohlenen Verbände heben wir nur die bekanntesten hervor.

In älterer Zeit wurde vielfach der Chiaster angewandt, ein Verband, der mit einer etwa 5 Meter langen Binde in Achtertouren, welche

Fig. 59.



sich in der Kniekehle kreuzen und vorn abwechselnd oberhalb und unterhalb der Kniescheibe verlaufen, angelegt wird. Um seine Wirkung auf das obere Bruch-Ende zu verstärken, legte man oberhalb desselben eine dicke Compressse oder eine Pappschiene unter die Bindentouren. — Wirksamer ist die Testudo (vgl. Bd. I. pag. 144).

Die „vereinigende Binde“ (Bd. I. pag. 149) war lange Zeit auch bei Querbrüchen der Patella in Gebrauch.

Desault legte oberhalb und unterhalb der Kniescheibe Longuetten an, welche er mittelst des Chiaster, den er mit einer zweiköpfigen schmalen Binde ausführte, befestigte. Darüber kam noch „die vereinigende Binde“ und eine Schiene an der hinteren Seite des Gliedes, durch welche dasselbe in gestreckter Stellung erhalten werden sollte.

C. J. M. Langenbeck suchte vorzüglich die Wirkung der Streckmuskeln zu bekämpfen, indem er, ausser der oben angegebenen Lage, zwei Rollbinden anwandte, von denen die eine auf-, die andere abwärtssteigend, vom Fuss und von der Schenkelbeuge her, angelegt wurde, so dass beide an der Kniescheibe zusammentrafen.

Fig. 60.



A. Cooper beginnt seinen Verband (Fig. 60) mit einer vom Fuss aufsteigenden Rollbinde, legt dann zu beiden Seiten der Kniescheibe zwei starke Seitenbänder parallel der Achse des Gliedes an und befestigt dieselben durch mehrere Cirkeltouren oberhalb und unterhalb der Kniescheibe in der Art, dass ihre Enden frei bleiben. Diese werden dann von Oben und Unten her zusammengeschlagen und zu beiden Seiten der Kniescheibe zusammengeschnürt, so dass die oberhalb und unterhalb des gebrochenen Knochens liegenden Cirkeltouren und folglich auch die Bruch-Enden gegen einander gedrängt werden. Statt dieses complicirten Verbandes wandte A. Cooper auch einen gepolsterten Gurt an, welcher oberhalb der Kniescheibe fest um den Oberschenkel geschnallt wird, und von dessen Seiten zwei Riemen zur Fusssohle hinabsteigen, die dort zusammengeschnallt werden, um das durch den

ringförmigen Gurt fixirte obere Bruchstück abwärts zu ziehen. Ausserdem befestigte A. Cooper die Extremität stets noch auf einer gut gepolsterten Rinne.

B. Bell legte einen starken gepolsterten Riemen oberhalb und einen gleichen unterhalb der Kniescheibe fest an und näherte diese einander durch kleinere vertical

von einem zum anderen verlaufende, mit Schnallen versehene Riemen. Der obere circumäre Riemen wird ausserdem durch einen an der vorderen Seite des Unterschenkels abwärts steigenden Gurt an dem vorderen Ende eines genau am Fusse befestigten Pantoffels oder Schuhs abwärts gezogen.

Boyer lagerte die Extremität in eine gut gepolsterte hölzerne Rinne, an deren Rändern einzelne Nägel stark hervorspringen. An diesen werden Riemen befestigt, welche quer über die Extremität verlaufend, die Lage derselben sichern. Zwei Riemen aber umfassen bogenförmig, der eine das obere, der andere das untere Bruch-Stück und drängen ersteres abwärts, letzteres aufwärts.

Baudens (Gaz. des hôp. 1851 No. 76 und 1852 No. 61) hat statt der Boyerschen Rinne einen nach Oben und nach Vorn offenen hölzernen Kasten (Beinlade) angewandt, die Nagelköpfe durch Löcher in den Seitenwänden des Kastens und die Riemen durch Bindestreifen ersetzt, das Ganze aber als einen „neuen Apparat“ beschrieben.

Alle diese Verbände sind sehr beschwerlich und wenig wirksam. Auch wenn man Kleister, Gutta-Percha und Gyps zu Hülfe nimmt, bleibt es doch zweifelhaft, ob es bei beträchtlicher Neigung zur Verschiebung, besonders also, wenn der fibröse Ueberzug der Kniescheibe gänzlich zerrissen ist, gelingen werde, das obere Bruchstück gehörig zu fixiren. Ueberdies wird durch die zum Hinabschieben des oberen Bruchstückes angebrachten Verbandstücke gewöhnlich ein gefährlicher Druck und überdies eine Wendung der Bruchfläche desselben nach Vorn bedingt und somit, wenn es auch gelingt, der Kraft der Extensoren Widerstand zu leisten, doch keine genaue Vereinigung erreicht (Malgaigne). Manche Autoren (Peter Camper, Jobert, Kluykens) haben daher auf jeden Verband verzichtet, dem Patienten blos eine zweckmässige Lage empfohlen und auch diese nicht allzu lange einhalten lassen, aus Besorgniss vor Gelenksteifigkeit. So sehr aber auch gegen diese die geeigneten Vorsichtsmaassregeln in gleicher Weise wie bei der Fractur des Olecranon zu ergreifen sind, so ist es doch anderer Seits von grosser Wichtigkeit, wenn auch keine knöcherne Vereinigung, so doch wenigstens eine möglichst kurze und feste fibröse Zwischensubstanz zu erzielen. Deshalb darf man denn auch, wenn die Bruchstücke eine erhebliche Diastase zeigen, dem Verletzten nicht blos ein längeres Still-Liegen, sondern auch die Anwendung eingreifenderer Vereinigungsmittel wohl zumuthen. Unter letzteren sind namentlich die von Malgaigne angegebenen stählernen Hakenklammern zu erwähnen. Ein scharfer Doppelhaken wird durch die Haut in den oberen Rand des oberen Bruchstückes, ein zweiter in den unteren Rand des unteren Bruchstückes eingeschoben. Jeder Doppelhaken ist an einer Stahlplatte befestigt, und beide Platten können

in beliebiger Stellung zu einander durch eine Schraube befestigt werden. Sobald die Haken eingeschoben und die Bruchstücke coaptirt sind, fixirt man die Platten und somit, durch Vermittelung der Haken, auch die Bruchstücke unbeweglich durch das Anziehen der Schraube. Der Apparat bleibt 14 bis 20 Tage liegen, sofern nicht entzündliche Erscheinungen zu früherer Entfernung auffordern. Von theoretischer Seite lässt sich einwenden, dass das Einschieben der Haken eine bedenkliche Knochen-Entzündung herbeiführen werde. Die Erfahrung hat aber gelehrt, dass dieser Apparat, bei richtiger Handhabung, in der Regel unschädlich, dagegen selbst bei veralteten Brüchen und Pseudarthrosen der Patella viel wirksamer ist, als alle anderen Verbände. Wo eine beträchtliche Verschiebung zu bekämpfen ist, sollte man daher dieser Befestigungsweise den Vorzug geben. Natürlich wird es aber auch bei ihrer Anwendung zweckmässig sein, vorher die Entzündung zu mässigen und den Erguss in das Gelenk zu beseitigen, wie wir bereits im Allgemeinen hervorgehoben haben. — Um vor allen Gefahren der Hakenklammern ganz sicher zu stellen, empfiehlt U. Trélat¹⁾ sie nicht in die Bruchstücke, sondern in zwei oberhalb und unterhalb der Kniescheibe (im erweichten Zustande) aufgelegte Guttapercha-Platten einzusetzen. Dadurch wird aber ihre Wirkung im höchsten Grade beeinträchtigt.

Wenn keine besondere Neigung zu starker Verschiebung besteht, so genügt die Fixation der Extremität in gestreckter Lage und die Befestigung der Bruchstücke mit Heftpflasterstreifen.

Bei complicirten Brüchen der Patella treten alle auf die Vereinigung der Bruchstücke abzielenden Behandlungsweisen in den Hintergrund. Hier handelt es sich oft nur noch um die Erhaltung des Beines, oder gar um die Erhaltung des Lebens. Jedoch hat man die Gefahren dieser Verletzungen früher wohl überschätzt, was zum grossen Theil durch die unzweckmässige Behandlung der Gelenkwunden überhaupt verschuldet sein mag. Man kann daher die frühere Lehre, bei jeder mit einer zur Bruchstelle führenden, mithin auch in's Gelenk penetrirenden Wunde complicirten Patellarfractur müsse sofort im Oberschenkel amputirt werden, nicht mehr als gültig anerkennen. Schussverletzungen der Art mögen im Kriege beim Mangel geeigneter Transportmittel noch immer die Amputation erheischen. Im gewöhnlichen Leben wird man unter Anwendung sorgfältiger Immobilisation und antiseptischer Verbände das Glied zu erhalten suchen.

¹⁾ Gazette des hôpitaux, 1862, pag. 523.

Die von Theden und von Beck¹⁾ bei Zerschmetterungen der Knie Scheibe (mit gleichzeitiger Hautwunde) vorgeschlagene Exstirpation derselben scheint, nach den vorliegenden Erfahrungen, in der That bessere Resultate zu ergeben, als man a priori erwarten sollte²⁾.

B. Brüche der Tibia und Fibula, Unterschenkelbrüche im engeren Sinne.

Der Bruch „beider Unterschenkelknochen“ (vgl. pag. 455) gehört zu den häufigsten Knochenbrüchen. Gewöhnlich hat er seinen Sitz an der Grenze zwischen dem mittleren und unteren Drittel. Beide Knochen brechen bald in derselben, bald in verschiedener Höhe. Querbrüche kommen fast ausschliesslich bei Kindern vor. Gewöhnlich, zumal bei Erwachsenen, verläuft der Bruch der Tibia schräg von Oben und Aussen nach Unten und Innen oder von Hinten und Oben nach Vorn und Unten. Besonders zu erwähnen sind die V-förmig und die spiralförmig (spiralig) verlaufenden Bruchlinien, welche oft mit ihrem unteren Ende in's Fussgelenk eindringen. Die Fractur kann auch mehrfach oder gesplittert und mit heftiger Quetschung oder Zerreißung der Haut complicirt sein, welche bald durch die einwirkende Gewalt, bald durch das Hervordringen der scharfen Spitze des oberen Bruch-Endes bedingt sind.

Die Veranlassung eines Unterschenkelbruches ist in der Regel ein Fall oder eine directe Gewalt. Fractur beider Unterschenkelknochen durch Muskelzug ist äusserst selten. Brüche durch directe Gewalt sind häufiger Querbrüche, ebenso oft aber auch Splitterbrüche und ganz gewöhnlich mit beträchtlicher, weit verbreiteter Quetschung, mit Wunde u. s. w. complicirt. Bricht die Tibia unter der Einwirkung einer directen Gewalt, während der Verletzte aufrecht steht, oder versucht derselbe nachher aufzustehen, so bricht die Fibula meist nachträglich auch, indem sie allein zu schwach ist, um das Gewicht des Körpers zu tragen. Bei einem Fall auf die Füße wird die — einer Seits von der Last des Körpers, anderer Seits von dem den Fuss treffenden Schläge in der Richtung ihrer Längsachse auf's Aeusserste zusammengepresste — Tibia gewöhnlich etwas unterhalb ihrer Mitte in schräger, seltener in spiralförmig gewundener Richtung zerbrochen. Die Fibula bricht nachträglich etwas höher oder (weniger oft) etwas tiefer durch den so eben erläuterten Mechanismus. Brüche der Unterschenkelknochen kommen auch durch eine

¹⁾ Beck, Die Schusswunden, pag. 335; vgl. Simon, Ueber Schusswunden, pag. 97.

²⁾ Vgl. R. Volkmann's Referate in dem Jahresbericht von Virchow u. Hirsch, p. 1868. Bd. II. pag. 365, p. 1869. Bd. II. pag. 354.

plötzliche gewaltsame Ablenkung der Fussspitze nach Aussen (Torsion) zu Stande. Wenn hierbei der äussere Knöchel und die Ligamenta tibio-fibularia Widerstand leisten, so bricht die Tibia in ähnlicher Weise, wie man ein Stück Holz, wenn man seine beiden Enden in entgegengesetzter Richtung um seine Längsachse dreht, zerbrechen kann. Der Fractur der Tibia folgt diejenige der Fibula durch denselben Mechanismus. Versuche am Cadaver und klinische Beobachtungen lehren, dass vorzugsweise bei alten Leuten in dieser Art Unterschenkelbrüche zu Stande kommen, was sich daraus erklärt, dass jenseits des 50sten Lebensjahres die Bänder fester und die Knochen brüchiger sind¹⁾.

Verschiebung findet bei Querbrüchen der Unterschenkelknochen gewöhnlich nur ad latus und ad directionem Statt. Das untere Bruchstück rückt nach Hinten; zugleich erfolgt eine winklige Verbiegung durch den überwiegenden Zug der Wadenmuskeln. Bei Brüchen im unteren Drittel rückt ausserdem das untere Bruchstück durch den Zug der Peronei nach Aussen. — Bei Schrägbrüchen fehlt fast niemals Dislocatio ad longitudinem. Das untere Bruchstück gleitet hinter dem oberen in die Höhe und die Spitze des oberen erhebt die äusseren Bedeckungen. Bewegt sich das letztere unter der Last des Körpers abwärts, so durchbohrt es die Haut, ja sogar bisweilen die Kleider und kann selbst bis in den Boden eindringen. — Alle diese Verschiebungen werden viel mehr durch andere mechanische Verhältnisse, als durch Muskelzug bewirkt. — Brüche beider Knochen im oberen Dritttheil des Unterschenkels entstehen fast nur durch directe Gewalt und verlaufen gewöhnlich quer. Bei ihnen besteht meist nur Verschiebung ad latus und auch diese gewöhnlich in geringerem Grade. Bei den viel seltneren Schrägbrüchen in dieser Gegend ist die Verschiebung beträchtlicher. Verläuft die Bruchlinie von Oben und Hinten nach Unten und Vorn, oder schräg von Aussen nach Innen, so wird das obere Bruchstück durch die mittelst des Ligamentum patellae an ihm befestigten Extensoren nach Vorn gezogen. Hat dagegen die Bruchlinie die Richtung von Oben und Vorn nach Unten und Hinten, so ziehen die Flexoren das obere Bruchstück nach Hinten, was besonders bei einem Versuch zur Streckung im Kniegelenk in die Augen fällt. — Hat die Fractur ihren Sitz am unteren Ende des Unterschenkels, so verschiebt sich das untere Bruchstück durch den Zug der Wadenmuskeln nach Hinten und Oben, zuweilen

¹⁾ Recherches sur la fracture du peroné, par Maisonneuve, Arch. génér. de méd. 1840, Tom. VII. pag. 165 u. 483. — W. Koch, Archiv f. klin. Chirurg. Bd. XV, pag. 689. — Filehne, Berl. klin. Wochenschr. 1874. No. 13.

in sehr beträchtlichem Grade. Sind beide Malleolen abgebrochen, so rückt der mittlere Theil des unteren Endes der Tibia auf der Gelenkfläche des Talus nach Vorn, der ganze Fuss aber mit den Malleolen nach Hinten. Auch diese Verschiebung, welche mit oder ohne Zerreiſſung der Gelenkkapsel bestehen kann, erreicht zuweilen einen sehr hohen Grad. Bemerkenswerth ist der von A. Cooper beschriebene Verlauf der Bruchlinie, welcher Fig. 61 dargestellt ist. Von der Tibia ist nur ein kleines Stück ihres äusseren Theiles und zwar fast vertical abgebrochen, so dass der Bruch in's Gelenk dringt. Die Fibula ist ein wenig höher schräg gebrochen. Das abgelöste Stück der Tibia bleibt an dem unversehrten Malleolus externus sitzen. Die übrige Tibia wird sammt dem oberen Bruchstück der Fibula nach Innen und Unten dislocirt. Die Bruchfläche der Fibula kommt entweder auf die obere Fläche des Talus zu stehen, oder der Talus drängt sich zwischen die beiden Unterschenkelknochen, so dass diese ihn gabelförmig umfassen. Im letzteren Falle besteht also eine Verrenkung des Fusses gerade aufwärts in das Spatium interosseum. Nicht minder ausgedehnte Verschiebungen finden sich nach Aussen und Innen, nach Vorn und Hinten, wenn beide Malleolen abgebrochen

Fig. 61.



Fig. 63.

Fig. 62.



sind. Vgl. Fig. 62 und 63. Die Gelenkkapsel muss in allen diesen Fällen immer zerrissen sein.

Von der Complication der Brüche in der Nähe des Fussgelenks mit Verrenkung im Fussgelenk wird weiter unten bei den isolirten Brüchen der Tibia und der Fibula, sowie bei den „Verrenkungen des Fusses“ genauer die Rede sein.

Sobald ein hoher Grad von Beweglichkeit an der Bruchstelle besteht, tritt bei allen Unterschenkelbrüchen durch das Gewicht des Fusses noch Dislocatio ad peripheriam hinzu, indem durch dasselbe das untere Bruchstück nach Aussen rotirt wird.

Die **Diagnose** der Brüche beider Unterschenkelknochen bietet nur selten Schwierigkeiten dar. Abnorme Beweglichkeit, Crepitation, Difformität, Verkürzung, Hervorragen des oberen Bruchstücks sind die, gewöhnlich leicht wahrzunehmenden, entscheidenden Symptome.

Die **Prognose** der Unterschenkelbrüche ist im Allgemeinen weniger schlimm als diejenige der Oberschenkelbrüche; der Unterschenkel ist weniger fleischig, die Bruchstelle weiter vom Rumpfe entfernt, die Retention leichter zu bewirken. Jedoch macht bei Schrägbrüchen das Hervorstehen des oberen Bruch-Endes oft Schwierigkeiten, und alle Fracturen in der Nähe des Fussgelenks sind nicht blos wegen der zu befürchtenden Gelenksteifigkeit, sondern auch wegen der mit ihnen fast immer verbundenen bedeutenden Quetschung der Weichtheile in hohem Grade bedenklich. Letztere kann nicht blos zu einer heftigen, über das ganze Fussgelenk sich erstreckenden Entzündung, sondern auch zu einer schnell um sich greifenden brandigen Zerstörung Veranlassung geben.

Behandlung. Die Reduction geschieht nach den allgemeinen Vorschriften (pag. 337 u. f.) Dass sie gelungen sei, erkennt man, indem man die Crista tibiae ihrer ganzen Länge nach mit dem Finger verfolgt, die Länge der fracturirten Extremität mit derjenigen der gesunden vergleicht und darauf achtet, dass die grosse Zehe in einer vom inneren Rande der Kniescheibe vertical abwärts geführten Linie sich befinden muss.

Zum Behuf der Retention sind bei allen nicht complicirten Unterschenkelbrüchen ohne besondere Neigung zur Verschiebung Gyps- oder Gutta-Percha-Verbände die zweckmässigsten Mittel, weil solche in diesen Fällen vollkommen ebenso viel leisten, als alle andere Verbände, und dem Kranken doch viel grössere Bequemlichkeit und Freiheit gestatten. Will man sich dieser erstarrten Verbände nicht bedienen, oder besteht eine Complication, welche ihre Anwendung unzulässig macht, so hat man die Auswahl unter einer grossen Anzahl von Behandlungsweisen, die theils nur durch zweckmässige Lagerung,

theils durch seitlichen und directen Druck, theils endlich durch permanente Extension wirken, wie bei Besprechung der Therapie der Knochenbrüche im Allgemeinen bereits angegeben wurde.

Zur „zweckmässigen Lagerung“ des Beines bedient man sich eines Spreuküssens oder einer gut gepolsterten Schwebel (Bd. I. pag. 167). — Für complicirte Fracturen verdient Middeldorpf's Gutta-Percha-Schwebel den Vorzug. Diese besteht aus einer hinreichend grossen und starken Gutta-Percha-Platte, welche (im erweichten Zustande) muldenförmig um die hintere Hälfte des Unterschenkels herumgebogen, zugleich seitliche Abweichungen hindert und ganz undurchdringlich und unveränderlich ist. Zum Behuf des Aufhängens werden an den vier Ecken Schnüre befestigt.

Pott liess die Verletzten auf der Seite, mit halbgebeugtem Hüft- und Kniegelenk liegen. Dupuytren und neuerdings Middeldorpf¹⁾ haben dies Verfahren mit Vortheil angewandt und empfohlen.

Bei den meisten Unterschenkelbrüchen ist die Lagerung des Beines mit gestrecktem Knie, sofern nur letzteres nicht unbeweglich fixirt wird, ebenso bequem wie die halbgebeugte Lage. Nothwendig erscheint letztere, wenn die Bruchlinie im oberen Drittheil des Unterschenkels schräg von Oben und Vorn nach Unten und Hinten verläuft, wobei es sehr schwierig wäre, der durch Biceps, Semitendinosus und Semimembranosus bewirkten Verschiebung des oberen Bruch-Endes nach Hinten in gestreckter Lage entgegen zu wirken.

Unter den durch seitlichen Druck wirkenden Verbänden sind (ausser den erstarrenden) zu nennen: 1) Der gewöhnliche Contentiv-Verband, welcher in der pag. 343 u. f. beschriebenen Weise angelegt wird und nur durch eine zur Sicherung der Lage des Fusses hinzugefügte steigbügelartige Binde vervollständigt zu werden pflegt. 2) Die von Sharp und Bell empfohlenen Schienen, welche die Gestalt eines Strumpfbrettes haben, an ihren inneren (dem Unterschenkel und dem Fuss zugewandten) Flächen ausgehöhlt sind und in der den Knöcheln entsprechenden Gegend Löcher besitzen, um jeden Druck auf diese zu vermeiden. 3) Die Petit'sche Beinlade²⁾, ein der Länge des Unterschenkels entsprechender, schmaler Kasten, dessen Höhe ungefähr der Länge des Fusses gleichkommt, oben und an einem Ende offen; die Seitenwände mit der unteren Wand durch Charniere verbunden,

¹⁾ Kalluschke, De situ laterale in fracturis ossium cruris adhibendo. Diss. inaug. Vratislaviae 1860.

²⁾ Dieser, früher als „Heister'sche Beinlade“ beschriebene Apparat wird mit Recht nach Petit benannt, da er von diesem 16 Jahre früher, als Heister ihn rühmte, beschrieben ist. Vgl. Petit, Maladies des os, Tom. II. Paris 1723.

³⁾ Erdelen, Chirurgie. 7. Aufl. II.

so dass sie ganz heruntergeklappt werden können. In den Kasten legt man zuerst einen Spreusack, darüber ein Stück Wachstaffet (oder anderes wasserdichtes Zeug) und Scultet'sche Binden, darauf dann den fracturirten Unterschenkel, der mit der vielköpfigen Binde umgeben, auch wohl noch durch Compressen oder Watte geschützt, dann aber mit dem von den Seiten emporgeschlagenen Wachstaffet umhüllt wird. Ausserhalb des Wachstaffets legt man zu beiden Seiten hinreichend dicke Spreusläcke, so dass die Seitenwände, wenn sie emporgeklappt werden, wie Schienen, den Unterschenkel zwischen sich nehmen. Die schmale Wand am Fuss-Ende des Kastens dient als Fussbrett, indem man den Fuss mit weichen Bindenstreifen daran befestigt. An diesem Brette werden auch die Seitenwände, wenn sie heraufgeklappt sind, durch Haken festgehalten. Zur Erneuerung des Verbandes klappt man eine oder beide Seitenwände herunter, entfernt die beschmutzten Verbandstücke innerhalb des Wachstaffets, ersetzt sie durch neue, lagert die Spreusäcke wieder gehörig und schliesst die Lade wie früher.

Bei sehr grosser Neigung zur Verschiebung reichen alle diese Verbände nicht aus. Dies ist besonders bei dem schräg von Hüften und Oben nach Vorn und Unten verlaufenden Bruche der Fall. Alsdann sucht man durch mehrfache Compressen und besondere kleine Schienen einen Druck auf das vorspringende obere Bruch-Ende auszuüben. Vollständiger und sicherer wird dies durch den von Malgaigne angegebenen Apparat erreicht. An einem Bügel oder Riemen, welcher von dem übrigen Verbande ausgeht, befestigt Malgaigne über der Stelle, an welcher das obere Bruch-Ende hervorspringt (Fig. 64, *b*), eine Stahlplatte, durch welche eine Schraube verläuft, mittelst deren ein stählerner Stachel durch die Haut hindurch in das vorspringende Bruch-Ende eingebohrt werden kann.

Fig. 64.



Fig. 64, 65 und 66 sind aus der Bd. I. pag. 157 citirten Abhandlung von
 terhoeven entlehnt. Der Malgaigne'sche Apparat ist hier mit einem Gutt-

Fig. 65.





Fig. 66.



Percha-Verbande combinirt, dessen unterstes Stück mittelst eines ungeschnallten Knochens befestigt ist. Der stählerne Stachel *b*, zu dessen sicherer Haltung der Eisenstab *f* in einen Knopf eingefügt werden kann, steckt mit seinem cylindrischen oberen Ende in dem unteren Ende der Schraube *c* so, dass bei den Drehungen derselben der Stachel sich nicht mit dreht, sondern einfach vorwärts geschoben wird. Nach Malgaigne's ursprünglicher Vorschrift bildet der Stachel mit der Schraube ein Stück. Die aufwärts gerichteten Spitzen an der convexen Fläche der Stahlplatte *d* dienen zur Befestigung an einem Riemen oder an einem Bügel, wie in Fig. 64. Die Drehungen der Schraube *c* werden mittelst des auf das obere vierseitige Ende derselben aufzusetzenden Handgriffs *a* ausgeführt, welcher abgenommen werden kann.

Unzweifelhaft hängt der Vorsprung des oberen Bruch-Endes von der durch Muskelzug bedingten Verschiebung des unteren nach Oben und Hinten ab. Daher ist es ganz rationell, zur Beseitigung desselben nicht einen Druck auf das obere, sondern einen Zug am unteren Bruch-Ende zu empfehlen. Dies ist denn auch die Beweisführung derjenigen, welche für die Behandlung der Unterschenkelbrüche vorzugsweise die permanente Extension anwenden wollen, — und gewiss mit Recht; wäre es nur möglich, sie mit der gehörigen Energie in solchen Fällen durchzuführen, in denen eine bedeutende Neigung zur Verschiebung besteht. Dieselbe wird aber viel seltener und schwieriger ertragen, als der auf eine kleine Stelle beschränkte und erfahrungsmässig sehr wirksame Druck der Malgaigne'schen Schraube.

v. Dumreicher (Die Behandlung der schiefen Knochenbrüche an den unteren Extremitäten mit einem neuen Extensionsapparat. Prager Vierteljahrsschrift, 1857, Bd. II, pag. 1 ff., hat zur Ausführung der permanenten Extension (sowohl am Ober- als am Unterschenkel) einen sehr complicirten und kostspieligen Apparat (Eisenbahnapparat angegeben, dessen Wirksamkeit grade in den eben erwähnten Fällen unläugbar ist. Ein Petit'scher Blechstiefel (d. h. eine an der Ferse rechtwinklig gebogene Blechschiene, welche mit der oberen Hälfte den hinteren Umfang des Unterschenkels, mit der unteren die Fusssohle umfasst), ruhend auf 2 Stahlbögen, die mittelst ver-

schiebbarer Füsse an 2 Eisenschienen befestigt sind, wird dick mit Watte gepolstert und dient zur Aufnahme des unteren Theiles der gebrochenen Extremität, welche mittelst Binden an den Stiefel und durch diesen unbeweglich an die genannten beiden Eisenschienen fixirt wird. Auf letzteren bewegt sich, mittelst 4, auf den glatten Eisenschienen leicht hin und her gleitender Räder, das obere Stück der gebrochenen Extremität, welche mittelst Binden an eine Schiene befestigt wird, die unbeweglich an zwei, je 4 Rädchen verbindende Stahlbügel fixirt ist. Die Eisenschienen selbst ruhen, mittelst ungleich hoher, durch ähnliche Stahlbügel mit einander verbundener Pfeiler auf 4 Rädern, welche, nach Art von Eisenbahnradern, auf zwei, auf einer schiefen Holzebene von 5—6° Neigungswinkel angebrachten Stahlschienen leicht auf- und abgleiten. Ein durch eine Oese in jedem der die Räder verbindenden Stahlbügel hindurchlaufender Leitungsdraht verhindert das Abgleiten der Räder von den Schienen. Die Höhe der ungleich langen Füsse, welche die Räder tragen, ist so gewählt, dass die in den Stiefel gelagerte Extremität vollkommen horizontal liegt. Das untere Extremitätenstück, mittelst des Stiefels unbeweglich an die Eisenstäbe fixirt, folgt der Neigung der letztern, auf der schiefen Ebene abwärts zu gleiten; sein eigenes Gewicht wirkt als wesentlicher Factor mit und extendirt das untere Bruchstück gegen das obere, welches, mittelst leicht hin- und hergleitender Räder auf den Eisenstäben ruhend, dem Zuge nach abwärts nicht zu folgen braucht.

Die permanente Extension mittelst aufgeklebter Pflasterstreifen ist hier schwer durchzuführen, weil die Strecke, auf welchen man die Streifen festkleben kann (von den Malleolen bis zur Bruchstelle) in der Regel nicht lang genug ist, um denselben hinreichenden Halt zu gewähren. Man muss immer die Befestigung des Fusses an einem Fussbrett oder in einem Gypsverbande (Heineke) zu Hülfe nehmen, an welchen dann extendirt wird.

Stromeyer hat das hartnäckig hervorstehende Bruch-Ende, welches die Haut zu durchbrechen drohte, blossgelegt und abgesägt. Der Erfolg war günstig. — In Fällen, wo die Wadenmuskeln einen allzu beträchtlichen Zug an dem unteren Ende ausüben, ist die Durchschneidung der Achillessehne als ein schnell wirksames und, sofern die Umgebungen derselben nicht etwa stark gequetscht sind, auch unschädliches Mittel zu empfehlen.

Die sehr häufige Complication der Unterschenkelbrüche mit Zerreissung oder Durchbohrung der Haut erheischt, wenn keine bedeutende Quetschung dabei besteht und die Reduction in der gewöhnlichen Weise gelingt, keine Abweichung von der schon angegebenen Behandlung. Ist das keilförmig zugespitzte obere Bruch-Ende in der Wunde fest eingeklemmt, so muss man diese erweitern. Gelingt die Reduction desselben nicht vollständig oder tritt die Verschiebung sogleich wieder ein, so sägt man die hervorragende Spitze ab. Ist letztere bereits vom Periost entblösst, so muss sie jedenfalls abgesägt werden, da durch ihre Nekrose die Heilung der Wunde ungewein verzögert werden würde. Bei hartnäckigem Hervorstehen eines Bruch-Endes hat man auch die Knochen-Naht und -Ligatur (mit

Eisen- oder Silberdrähten) angewandt und davon wiederholt günstigen Erfolg, zuweilen auch Einheilen der eingelegten Drähte beobachtet¹⁾.

Bei Unterschenkelbrüchen, welche mit bedeutender Quetschung complicirt sind, soll man, nach der bisher herrschenden Anschauung, nicht sofort einen festen Verband anlegen. Meist kommt aber der Arzt in solchen Fällen erst hinzu, wenn schon bedeutende Anschwellung entstanden ist. Dann kann man dreist einen die Geschwulst umfassenden Gypsverband anlegen, den man, wenn die Geschwulst noch steigt, nachdem er erstarrt ist, spaltet und durch Einsetzen kleiner Holzkeile erweitert. Anderen Falls wird der Unterschenkel auf einem Häckselsack bequem gelagert und der Verschiebung der Bruch-Enden, durch das Anlegen der vorher gut zu polsternden Sharp'schen hölzernen Schienen vorgebeugt. Zur Befestigung derselben sind gewöhnliche Bandschlingen ausreichend. Für solche Fälle dürfte auch der namentlich von Max Müller²⁾ allgemeiner empfohlene „halbe Gypsguss“ besonders werthvoll sein.

Wenn beträchtliche Eiterung besteht, so erweisen sich, nächst dem. pag. 354 beschriebenen Gitterverbande, die in neuester Zeit besonders von Stromeyer und C. O. Weber³⁾ wieder empfohlene Petit'sche Beinlade und die Schweben besonders nützlich.

Es versteht sich von selbst, dass ausser diesen mechanischen Hülfen die Behandlung der Quetschung nach allgemeinen Regeln mit grösster Sorgfalt einzuleiten ist und dass man, wenn Eiterung eintritt, wie bei einer Phlegmone, frühzeitig durch Einschnitte für Entleerung des Eiters zu sorgen hat. Ist alle Entzündungsgeschwulst beseitigt, so kann man unbedingt zur Anwendung eines gefensternten Gutta-Percha- oder Gyps-Verbandes schreiten. Ich habe von der frühzeitigen Anlegung des Gypsverbandes nur günstige Erfolge gesehen.

Die Consolidation eines Bruches beider Unterschenkelknochen erfolgt, sofern die Bruchstelle nicht eitert, in 40—50 Tagen. Brauchbarkeit des Beins ist vor Ablauf des dritten Monats nicht in Aussicht zu stellen. Bei Brüchen in der Nähe des Fussgelenkes geht noch längere Zeit darüber hin, bis die Beweglichkeit des letzteren, sofern sie überhaupt wieder zurückkehrt, sich vollständig einstellt.

¹⁾ Val. Bérenger-Féraud, de la ligature des os dans les fractures compliquées. Bull. gén. de thérap., 1868, Janv., Août. In den angeführten Fällen wurden die Knochen-Enden mit Eisendraht zusammengebunden; die Drahtschlinge heilte ein.

²⁾ Beitrag zur Verwendung des halben Gypsgusses in der Chirurgie. Archiv f. klin. Chirurgie, 1864, Bd. VI. pag. 159.

³⁾ Chirurgische Erfahrungen und Untersuchungen. Berlin 1859, pag. 129 u. f.

C. Brüche der Tibia.

1) Brüche im Mittelstück der Tibia.

Das Mittelstück der Tibia bricht selten allein, — am Häufigsten noch in Folge einer direct einwirkenden Gewalt, in welchem Falle der Bruch bald longitudinal (als Fissur), bald quer verläuft oder gesplittert ist, — seltener durch Gegenschlag in Folge eines Falles auf die Füße, wo dann die Bruchlinie eine schräge Richtung hat. Verschiebung fehlt hierbei ganz, besonders im ersteren Falle, oder ist doch sehr gering; niemals besteht Dislocatio ad longitudinem. Beim Querbruch springt das obere Bruch-Ende gewöhnlich etwas hervor, indem das untere nach Hinten verschoben wird.

Die **Diagnose** kann schwierig sein, da der Verletzte wenn die Fibula das Körpergewicht allein zu tragen vermag, vielleicht aufstehen und weiter gehen kann. Eine genaue Untersuchung der Crista tibiae lässt jedoch auch die geringste Verschiebung erkennen. Wird das obere Ende des Unterschenkels fixirt und an dem unteren der Versuch zu Bewegungen gemacht, so kann auch abnorme Beweglichkeit an der Bruchstelle und Crepitation entdeckt werden. Fissuren lassen sich von Quetschung des Knochens nicht unterscheiden.

Die **Prognose** ist, abgesehen von Complicationen, namentlich auch starker Knochen-Quetschung (welche leicht zu gefährlicher Osteomyelitis führt), günstig. Die Heilung erfolgt bei Anwendung der gewöhnlichen Verbände, obgleich die Verschiebung des unteren Bruch-Endes nach Hinten sich nicht immer ganz beseitigen lässt.

2) Brüche im oberen Ende der Tibia.

Die Brüche des oberen Endes der Tibia sind wesentlich verschieden, je nachdem sie die ganze Dicke des Knochens betreffen oder nur einen Theil derselben absprengen. Im letzteren Falle dringen sie oft in schräger Richtung in's Kniegelenk. Meist entstehen sie durch directe Gewalt (Hufschlag, Geschosse) und sind daher häufig complicirt.

Uebersaus selten wird die Tuberositas tibiae durch Muskelzug abgerissen, wovon Paul Vogt (Berl. klin. Wochenschrft. 1869. No. 22) ein lehrreiches Beispiel beschrieben hat. Viel eher entsteht, unter dem hierzu erforderlichen Zuge des Quadriceps extensorius, eine Fractur der Patella oder eine Zerreißung entweder des Ligamentum patellae oder des Tendo extensorius. Vgl. pag. 486.

Die **Prognose** ist übel, wenn der Bruch in's Gelenk eindringt. Aber auch anderen Falls erstreckt sich die Entzündung oft auf das Gelenk, in Folge der Quetschung, welche dies durch die immer sehr

bedeutende Gewalt erleidet. Die abgerissene Tuberositas scheint schwer wieder anzuhellen. Langsame Heilung beobachtet man bei fast allen Fracturen im oberen Ende der Tibia. Man erklärt dies aus der Grösse des Blutergusses, der sich in dem gefässreichen Knochengewebe bildet; vielleicht trägt das Ueberwiegen der Substantia spongiosa die Schuld.

Die Behandlung muss, je nach der Beschaffenheit des Bruches, verschieden sein. Ein Schrägbruch, welcher in das Gelenk eindringt und nur einen Theil der Dicke des oberen Gelenk-Endes der Tibia abgesprengt hat, muss wie ein Schrägbruch in den Condylen des Femur behandelt werden. Die gestreckte Lage und ein immobilisirender Verband sind die geeigneten Mittel. Die abgerissene Tuberositas muss man in gestreckter Lage des Beins, durch Pflasterstreifen oder Klebeverbände genau angedrückt gegen den Schaft der Tibia halten. Für die übrigen Brüche gelten dieselben Regeln, wie beim Bruch beider Unterschenkelknochen im oberen Drittel.

Frühzeitig, jedoch nicht vor Erlöschen aller Entzündungs-Erscheinungen, muss man passive Bewegungen im Kniegelenk vornehmen, um Steifigkeit zu verhüten. Bestehen zugleich anderweitige Complicationen, namentlich eine penetrirende Wunde, so ist vor Allem die Frage über Amputation oder Resection zu erledigen (vgl. Bd. IV.).

3) Brüche des unteren Endes der Tibia¹⁾.

Brüche am unteren Ende der Tibia können, obgleich selten, ohne Verletzung der Fibula bestehen. Der Bruch dringt entweder durch die ganze Dicke des Knochens oder löst nur den Malleolus, in seltenen Fällen auch bloß das an die Fibula grenzende Stück von dem übrigen Knochen ab. Letztere Brüche sind nahezu Längsbrüche und dringen immer in das Gelenk ein. Verläuft ein Schrägbruch von Oben und Aussen nach Unten und Innen durch die ganze Dicke des Knochens, so neigt sich das obere Ende des unteren Bruchstücks nach Vorn und Aussen, der Malleolus internus rückt nach Innen und Hinten; der Fuss dreht sich in der Art um seine Längsachse, dass seine Plantarfläche nach Innen und sein äusserer Rand nach Unten sieht, wobei gleichzeitig die Ferse erhoben und die Fussspitze gesenkt wird. Der Malleolus externus springt hierbei auffallend hervor. — Verläuft dagegen die Bruchlinie schräg von Oben und Innen nach Unten und Aussen, d. h. schräg gegen die Fibula abwärts, so erfolgt

¹⁾ Die Grenze zwischen Fractur und Luxation ist nirgend schwieriger zu ziehen als am Fussgelenk. Neben der Beschreibung der Brüche der Malleolen ist daher diejenige der Verrenkungen des Fusses zu vergleichen.

nur Dislocatio ad directionem. Ist blos der Malleolus internus abgebrochen, so besteht gewöhnlich gar keine Verschiebung, indem die Bänder ihn hinreichend in seiner Lage befestigen. Trennt ein Längsbruch das an den Malleolus externus zunächst grenzende Stück der Tibia von dem übrigen Knochen (wie Fig. 61, mit Bruch der Fibula, abgebildet ist), so drängt sich der Talus zwischen Fibula und Tibia ein und es erfolgt eine Art von Verrenkung des Fusses nach Oben mit Erhebung des inneren Fussrandes.

Gewöhnlich entstehen Brüche des unteren Endes der Tibia durch Gegenschlag, namentlich durch Fall auf die Füße. Die zuletzt erwähnte Varietät kann nur auf diese Weise zu Stande kommen, die übrigen können auch durch directe Gewalt veranlasst werden.

Die **Prognose** ist, besonders wenn der Bruch in's Gelenk eindringt, in derselben Weise und aus denselben Gründen bedenklich, wie bei dem Bruch beider Knochen an dieser Stelle.

Die **Behandlung** besteht, nach vollbrachter Reduction, abgesehen von der fast immer zu bekämpfenden Gelenkentzündung, in einem einfach fixirenden Verbands.

D. Brüche der Fibula.

Die Fibula bricht viel häufiger allein, als die Tibia. Nach Dupuytren machen die Brüche des unteren Endes der Fibula beinahe den vierten Theil aller Unterschenkelbrüche aus. Allerdings finden sich grade am unteren Ende der Fibula isolirte Brüche am Häufigsten, obgleich man zu weit geht, wenn man behauptet, dass Brüche der Fibula durch Gegenschlag oder überhaupt isolirte Brüche der Fibula nur an ihrem unteren Ende vorkämen¹⁾.

Die **Entstehungsweise** der Brüche im unteren Drittel des Wadenbeins ist im Wesentlichen schon von Pott richtig erkannt, von Dupuytren aber genauer erörtert worden. Wenn bei einem Fall oder Sprung, oder beim Vorwärtsschreiten auf unebenem Boden der Fuss nach Innen oder nach Aussen umkippt, so entsteht allerdings in der Regel eine einfache Verstauchung. Wenn aber dabei eine beträchtliche Gewalt im Spiele ist, so zerreißen entweder die äusseren Seitenbänder²⁾ oder die Fibula zerbricht in ihrem unteren Ende, und zwar durch dreierlei Mechanismen.

¹⁾ Sogar durch blosses Stolpern kann ein Bruch im oberen Ende der Fibula entstehen. — Eine Abreissung des Capitulum fibulae durch Muskel beschreibt Lotzbeck (Allgem. militair-ärztl. Zeitg., 1866, No. 47 u. f.).

²⁾ Häufig reißen die Seitenbänder in der Art von den Malleolen ab, dass kleine Stück der Knochenrinde an ihnen sitzen bleiben, mithin, streng genommen, eine Fractur be-

I. Wenn die Fusssohle nach Aussen umgewandt wird, so stösst die äussere Fläche des Fersenbeins gegen die Spitze des äusseren Knöchels. Eine merkliche Verschiebung des Wadenbeins in der Richtung nach Oben ist wegen seiner Befestigung am Condylus externus tibiae nicht möglich. Dasselbe bricht daher — gewöhnlich nahe oberhalb des Malleolus, wo sich sein dünnster Theil befindet. Eine hinreichende Erhebung des äusseren Fussrandes gegen die Spitze des Malleolus ist aber nur möglich, wenn das innere Seitenband des Fussgelenkes zerreisst oder die Spitze des Malleolus internus abbricht. Die Umwendung des Fusses kann so weit gehen, dass die obere Fläche des Talus nach Innen sieht und die äussere mit der unteren Gelenkfläche der Tibia in Berührung kommt. Bei einem Fall von beträchtlicher Höhe kann, nachdem die Fibula in in solcher Weise gebrochen und der Fuss umgewandt ist, das untere Ende der Tibia auch noch die Weichtheile durchbohren, der Fuss aber in der angegebenen Stellung an der äusseren Seite des Unterschenkels weiter hinaufrücken, so dass schliesslich die Spitze des Malleolus internus niedriger steht als die Fusssohle.

Fig. 67.



Fig. 67 a.



Fig. 67 und 67 a stellen einen Bruch der Fibula dar, welcher durch diesen Mechanismus unter Abbrechen der Spitze des inneren Knöchels entstanden ist: die Bruchstelle liegt etwas höher und die Verschiebung ist stärker als gewöhnlich.

II. Beim Umkippen der Fusssohle nach Innen erfolgt weniger leicht eine Fractur. Wird diese Umwendung aber auf's Äusserste gesteigert, so stemmt sich der obere Rand der äusseren Fläche des Talus gegen die Gelenkfläche des äusseren Knöchels. Die äusseren Seitenbänder, welche bei dieser Umwendung des Fusses im höchsten Grade gespannt sind, ziehen die Spitze des äusseren Knöchels einwärts. So entsteht dicht oberhalb des Malleolus eine Fractur der Fibula, welche eine Umdrehung des Fusses bis zu einem solchen

Grade gestattet, dass die innere Fläche des Talus der unteren Gelenkfläche der Tibia zugewandt wird.

III. Der Fuss wird mit grosser Gewalt um seine verticale Achse, d. h. um die Längsachse des Unterschenkels gedreht¹⁾. Erfolgt diese Drehung in der Richtung nach Aussen, so stemmt sich der hintere Rand der inneren Fläche des Talus gegen den inneren Knöchel, seine äussere Fläche aber drängt den vorderen Rand des Malleolus externus in dem Grade auswärts und nach Hinten, dass die Fibula zerbrechen muss²⁾. Bei der Entstehung des Bruches durch Drehung des Fusses um die verlängert gedachte Achse des Unterschenkels nach Innen ist der Mechanismus derselbe; nur stemmt sich der vordere Rand der inneren Gelenkfläche des Talus gegen den inneren Knöchel, und der Druck auf den äusseren Knöchel erfolgt von der hinteren Seite.

Symptome und Diagnose. a) Bei Brüchen in den oberen drei Vierteln findet sich in der Regel fast gar keine Verschiebung; der Bruch kann oft nur auf Grund der vorausgegangenen Insultation, des fixen Schmerzes und der Anschwellung vermuthet werden.

b) Bei Brüchen im unteren Viertel folgt der Fuss, seiner Stütze an der äusseren Seite beraubt, im Allgemeinen dem Zuge der Mm. peronei, d. h. er wird nach Aussen verschoben und drängt den äusseren Knöchel vor sich her. Diese Verschiebung wird demnächst durch die Wirkung aller vom Unterschenkel zum Fuss gehenden Muskeln verstärkt. Ist das innere Seitenband zerrissen, oder die Spitze des Malleolus internus abgebrochen, so kann der Fuss ausserdem durch die Wadenmuskeln nach Hinten gezogen werden.

Selten lässt eine genaue Untersuchung Zweifel darüber, ob eine Fractur bestehe oder nicht. Der Fuss hat eine Drehung erfahren, durch welche die Sohlenfläche nach Aussen und der äussere Fussrand nach Oben gewandt ist; der innere Knöchel ragt auffallend hervor, die beiden Knöchel stehen zu weit von einander, und oberhalb des äusseren Knöchels sieht man eine Einbiegung (*coup de hache*, nach Dupuytren). Diese Difformität, Anfangs zuweilen unbedeutend, nimmt immer mehr zu, wenn nichts zu ihrer Beseitigung geschieht und erreicht den höchsten Grad, wenn der Kranke auf dem fracturirten Beine zu gehen versucht. Alsdann kann es so weit kommen, dass de

¹⁾ Maisonneuve, Recherches sur la fracture du péroné. Arch. génér. de méd., Févr. Avril 1840. — Es ist für den Effect gleichgültig, ob wirklich der Fuss gedreht wird, oder ob die Drehung im Unterschenkel erfolgt, während der Fuss fixirt ist.

²⁾ In dieser Weise hat Asthley Cooper selbst einen Bruch der Fibula erlitten, indem sein Fuss zwischen zwei Eisstücken stecken blieb.

innere Knöchel den Boden berührt. Steigert man absichtlich die fehlerhafte Stellung des Fusses, so entstehen sehr heftige Schmerzen, welche durch Zurückbringen des Fusses in seine normale Stellung beseitigt werden. Diese Reduction lässt sich leicht ausführen; gewöhnlich vernimmt man dabei Crepitation.

Wenn die Geschwulst bedeutend und über das ganze Fussgelenk ausgedehnt, die Verschiebung dagegen gering ist, so werden diese charakteristischen Symptome des Bruches der Fibula zuweilen undeutlich. Alsdann sichert man die Diagnose, indem man auf beide Malleolen einen kräftigen Druck ausübt, als wollte man sie einander nähern. Besteht der fragliche Bruch, so wird dadurch, unter lebhaftem Schmerz, der Fuss in seine normale Stellung gebracht. Da der Raum zwischen beiden Malleolen vergrössert ist, gelingt es auch, den Talus, indem man den ganzen Fuss fasst, nach Rechts und Links hin und her zu bewegen, wobei man in dem Augenblick, wo der Talus gegen den (feststehenden) inneren Knöchel anschlägt, ein klappendes Geräusch hören kann¹⁾. Lebt man auf die Spitze des äusseren Knöchels einen kräftigen Druck aus, während die Finger der anderen Hand oberhalb desselben auf der Fibula ruhen, so werden letztere, wenn eine Fractur besteht, eine Bewegung des unteren Bruch-Endes oder doch Crepitation wahrnehmen.

Prognose. Brüche in den oberen drei Viertheilen der Fibula heilen, wenn keine bedeutende Complication besteht, auch ohne Zuthun der Kunst. Brüche in der Nähe des Malleolus dagegen erheischen eine sehr sorgfältige Behandlung, wenn nicht eine beträchtliche Difformität und ein unsicherer, hinkender Gang zurückbleiben soll.

Behandlung. Für Brüche in den oberen drei Viertheilen ist es nur nothwendig, der Extremität einen gewissen Halt zu geben. Contentiv-Verbände, wie beim Bruch beider Unterschenkelknochen, namentlich einer der erstarrenden Verbände, sind ausreichend.

Bei Brüchen in der Nähe des Malleolus dagegen hat man die Verschiebung des Fusses nach Aussen und nach Hinten zu bekämpfen. Pott suchte dies durch Lagerung des Beins in halbgebogener Stellung auf der äusseren Seite zu erreichen. A. Cooper befolgte dieselbe Methode, lagerte aber das Bein auf eine der Gestalt des Unterschenkels und des Fusses entsprechende Sharp'sche Schiene. Boyer empfiehlt den gewöhnlichen Contentiv-Verband mit der Modi-

¹⁾ Auf dies, wie es scheint, zuerst von Sanson angegebene Symptom hat besonders Aubry (als *bruit de choc*) aufmerksam gemacht. Vgl. Gascon, sur les fractures indirectes du péroné. Paris, 1866.

fication, dass die innere Schiene nur bis zum Malleolus, die äussere bis zur Fusssohle reichen und mittelst eines dicken Polsters gegen diese Seite des Fusses einen Druck ausüben soll.

Dupuytren lehrte folgendes Verfahren. Zur Reduction wird das kranke Bein im Hüft- und Kniegelenk rechtwinklig gebeugt; die Contra-Extension geschieht am unteren Ende des Oberschenkels, die Extension an dem mit zwei Händen an der Ferse und am Metatarsus umfassten Fusse, und zwar zuerst gerade abwärts, dann stark nach Innen, wobei ein Gehülfe den unteren Theil des Unterschenkels nach Aussen drückt, damit das Anziehen des Fusses nach Innen sicherer geschehen kann. — Der zur Retention bestimmte Verband besteht aus einem langen Kissen, einer starken hölzernen Schiene und zwei Binden. Das Kissen muss länger sein, als der Unterschenkel. Es wird auf die innere Seite desselben gelegt und in der Gegend des inneren Knöchels mehrfach zusammengebogen, so dass hier ein Wulst von 8—10 Centim. Dicke entsteht. Auf dieses Kissen legt man die den Unterschenkel um mehrere Zoll überragende Schiene und befestigt diese sammt dem Kissen durch eine Binde am Unterschenkel. Durch eine zweite Binde wird der Fuss gegen das untere Ende der Schiene in adducirter Stellung angezogen, — die Fusssohle nach Innen und der äussere Fussrand etwas nach Unten gerichtet. Der Bindenkopf wird zuerst an dem unteren Ende der Schiene befestigt. Dann geht man mit der Binde unter der Fusssohle durch zum äusseren Fussrande, über die Fussbeuge zur Schiene, dann oberhalb der Ferse abermals um die Fussbeuge zur Schiene zurück, dann wieder um die Fusssohle u. s. f. Auf diese Weise wird eine Art von 8 beschrieben, deren Ringe einer Seits den unteren Theil des Unterschenkels, anderer Seits den vorderen Theil des Fusses umfassen. Die Kreuzungsstelle der Bindengänge liegt auf der Schiene. Der Unterschenkel wird dann, im Kniegelenk halbgebogen, auf seine äussere Seite gelagert. — Bei Verschiebung des Fusses nach Hinten legt Dupuytren Kissen und Schiene an die hintere Seite des Beins. Besteht Verschiebung nach Hinten und zur Seite zugleich, so soll man die Behandlung entweder gegen die vorherrschende Verschiebung richten oder sowohl auf die innere, als auch auf die hintere Seite des Unterschenkels je ein Kissen und eine Schiene legen. — Dieser Verband ist zwar durchaus rationell und entschieden wirksam, — aber sehr beschwerlich und leicht verschiebbar. Der Gypsverband reicht vollständig aus, wenn man nur die richtige Stellung des Fusses so lange sichert, bis der Verband vollkommen erstarrt ist.

Maisonneuve legte unter den Dupuytren'schen Verband eine mit Dextrin getränkte Binde, und nahm ihn ab, sobald diese trocken war. Durch die starr gewordene Binde wurde dann die richtige Stellung des Fusses erhalten.

Die Complicationen erheischen oft eine besondere Behandlung, so das Hervorstehen des unteren Endes der Tibia aus einer Wunde oder anderweitige in's Gelenk dringende Wunden, vollständige Verrenkung des Fusses, beträchtliche Quetschung u. dgl. m. Zur Amputation sollte man sich nur in solchen Fällen entschliessen, wo die Weichtheile in sehr grosser Ausdehnung vollständig zerrissen oder zerquetscht sind. Sonst bewirke man möglichst bald die Reduction, nöthigenfalls nach vorherigem Absägen der hervorragenden Bruchstücke (Resection), vereinige die zur ersten Vereinigung geeigneten Wunden genau und verfähre streng antiseptisch.

3) Brüche am Fuss.

Die Knochen des Fusses zerbrechen sehr selten¹⁾ und fast immer in Folge einer direct einwirkenden bedeutenden Gewalt. Daher sind sie ganz gewöhnlich mit erheblichen Quetschungen und Wunden complicirt, welche an sich von grösserer Bedeutung sind, als die Fractur. Meist sind es auch Splitterbrüche, und in der Mehrzahl der Fälle werden mehrere Knochen des Fusses zugleich gebrochen. Besonders zu erwähnen sind nur die

Brüche des Fersenbeins.

welche zwar auch durch directe Gewalt, durch einen Schuss, ein Wagenrad, einen Fall auf die Ferse veranlasst werden können, viel häufiger aber durch plötzliche, heftige Zusammenziehung der Wadenmuskeln bei einem Fall oder Sprung auf die Fussspitze oder bei einem Fall vornüber, während die Fussspitze fixirt ist, entstehen.

Nach dieser verschiedenen Entstehung unterscheiden wir: a) Brüche des Fersenbeins durch Zerschmetterung (durch directe Gewalt), b) Brüche des Fersenbeins durch Zerreißung (durch Muskelzug).

a) Brüche durch Zerschmetterung. Die einfachsten unter ihnen entstehen durch einen Fall auf die Ferse. Die dünne Corticalschicht des Knochens kann einer bedeutenden Gewalt nicht Widerstand leisten, und das spongiöse Gewebe lässt sich in jeder Richtung leicht zerquetschen. Nicht selten werden die einzelnen Bruchstücke in einander eingekleilt. Anderer Seits kommen aber auch einfachere, mehr spaltförmige Brüche vor (s. unten).

¹⁾ Die Frequenz dieser Brüche beträgt, nach Gurli's Statistik, wenig über 2 Procent.

Symptome. Der Kranke empfindet heftigen Schmerz oder hat das Gefühl von Taubheit in der Ferse. Er kann sich nach dem Falle, welcher den Bruch veranlasste, entweder gar nicht wieder erheben oder doch nicht auftreten. Der Fuss ist etwas nach Aussen gewandt, so dass der Verdacht einer *Fractura fibulae* entstehen könnte. Zu beiden Seiten des Fusses unter den Knöcheln und an einem Theile der Fusssohle besteht Geschwulst, an der Ferse und an der Achillessehne dagegen nicht. Die Knöchel stehen tiefer, als am gesunden Fuss, die Ferse erscheint breiter und die Wölbung der Fuss-Sohle abgeflacht. Diese charakteristischen Symptome werden oft durch Geschwulst verdeckt. *Crepitation* ist selten deutlich.

Legouest (*Des fractures du calcaneum. Archiv. génér. de méd., 1860, Août*) weicht von der vorstehenden Beschreibung, welche sich wesentlich auf Beobachtungen von Dupuytren und Nélaton stützt, gänzlich ab. Nach seinen Untersuchungen entstehen Brüche des Fersenbeins in Folge eines Falles auf die Füsse vorzugsweise in der Richtung von Hinten nach Vorn, so zwar, dass die Bruchspalte, je weiter nach Vorn, desto mehr klafft. Von dieser verticalen Spalte gehen dann mehr oder weniger seitliche Nebenspalten aus. Beim Fall auf die Füsse treibt nämlich das Körpergewicht den Talus nach Vorn und Unten. Seinem Vordringen gegen die Fusssohle hin leistet das *Ligamentum calcaneo-naviculare plantare* Widerstand. Nun bricht entweder der *Processus lateralis calcanei* oder der *Astragalus* wird auf das *Os naviculare* verrenkt. In beiden Fällen aber wird zugleich der *Calcaneus* in seinem vorderen Theile zersprengt. Dabei soll das äusserere Ende der grossen Gelenkfläche des Talus auf das Fersenbein wie ein Keil wirken, und diese Wirkung soll sich bis zur Zermalmung des Fersenbeins durch den in dasselbe eindringenden Talus steigern können. Ganz ähnlich ist, nach Legouest, der Mechanismus von Fersenbeinbrüchen durch übermässige Beugung und Abduction. Der Kopf des Talus wird, von der einen Seite durch das Kahnbein, von der anderen durch Tibia und Fersenbein eingezwängt, abwärts und nach Hinten getrieben. In dieser Richtung leisten ihm das *Ligamentum calcaneo-naviculare*, die innere Facette des vorderen Fortsatzes des Fersenbeins und der seitliche Fortsatz desselben Widerstand. Unter diesen Verhältnissen muss der Kopf des Talus entweder nach Innen auf das Kahnbein rücken oder den Seitenfortsatz des *Calcaneus* und dann auch den inneren Theil seines vorderen Fortsatzes fracturiren; ist die Gewalt noch nicht erschöpft, so wird die Wucht des Talus schliesslich auch noch den äusseren Theil des *Calcaneus* zersprengen. Uebermässige Beugung des Fusses (d. h. Erhebung der Fussspitze) und Fall auf die Ferse ohne Verschiebung des Talus bedingen vorzugsweise Zermalmung des inneren Theiles des *Calcaneus*. Fall auf die Fusssohle mit Verrenkung des Talus nach Innen bedingt eine weniger ausgiebige Zermalmung des inneren Theiles des *Calcaneus*, drängt aber seinen äusseren Theil (vorderen Fortsatz) stark nach Aussen. Von der grössten Bedeutung ist, nach Legouest, die Wirkung des äusseren Endes der hinteren Gelenkfläche des Talus auf die Vertiefung am vorderen Fortsatz des *Calcaneus*.

Das Breiterwerden des Fusses unter den Malleolen ist, nach Legouest, nicht gradweise verschieden je nach dem Grade der Zermalmung des Fersenbeins, sondern nach dem Grade der Auseinanderdrängung der Bruchstücke durch den zwischen sie eingekeilten Talus. Die abnormen Vorsprünge unter und vor den Malleolen

werden gebildet an der inneren Seite durch den Kopf des Talus und die Bruchstücke des Processus lateralis calcanei und des inneren Theiles des Processus anterior, an der äusseren Seite durch das äussere Bruchstück des letzteren Fortsatzes, welches nicht bloss bis zum äusseren Knöchel, sondern über diesen hinaus emporsteigen kann, so dass der Verdacht einer Fractura fibulae entsteht. Beide Malleolen bleiben aber in ihrer normalen Lage. Die Einkeilung des Talus zwischen die Bruchstücke erklärt, weshalb die Crepitation ganz fehlen kann und weshalb bei ruhiger Lage im Bett, sobald der Fuss mit der Ferse das Lager berührt, heftige Schmerzen entstehen, indem durch Vermittelung des Talus das Gewicht des Beines auf die Bruchstelle einwirkt.

Behandlung. Ist der Bruch durch Ueberfahren, durch Aufschlagen eines schweren Körpers oder durch Schussverletzungen entstanden, so haben die Weichtheile gewöhnlich in so hohem Grade gelitten, dass die Fractur fast zur Nebensache wird. Aber auch bei einfachen Brüchen durch directe Gewalt ist nicht zu gewaltsamen Reductionsversuchen zu rathen. Man kennt weder die Gestalt, noch die Zahl, noch die relative Stellung der Bruchstücke, und es wäre daher leicht möglich, dass ein kräftiger Zug auf's Gerathewohl die Sache verschlimmerte. Vor Allem ist auch hier sorgfältig antiseptisch zu verfahren, der auf die äussere Seite gelagerte Fuss mit Eisbeuteln zu umgeben, und erst später die Abweichung des Fusses nach Aussen durch Gypsverband oder Sharp'sche Schienen zu bekämpfen.

Nach Legouest (l. c.) müsste man immer die Einrichtung des Bruches, d. h. vor Allem die Entfernung des Talus aus der Bruchspalte zu bewirken suchen. Dazu wäre ein kräftiger Zug in der Richtung der Axe des Fusses und eine gewaltsame Adduction desselben erforderlich. Vielleicht würde man selbst einen Pfriemen in den Talus einsetzen müssen, um ihn fort zu bewegen (!). Dann müssten graduirte Compressen dicht unter den Malleolen durch Achtertouren befestigt und das Glied auf die äussere Seite gelagert werden. Oft wird die Reduction wegen des hohen Grades von Einkeilung, ähnlich wie bei den analogen Fracturen des unteren Radius-Endes, nicht leicht oder gar nicht gelingen. Wie rasche Beugung der Hand über dem Knie oft zur vollkommenen oder theilweisen Reduction der Radiusfractur ausreicht, so kann man, nach Legouest, hoffen, durch ein ähnliches Manöver am Fuss bei Fersenbeinbrüchen bessere Erfolge zu erzielen, als durch Unterlassen eines jeden Reductionsversuches.

b) Brüche durch Zerreiſsung haben ihren Sitz hinter der Articulatio talo-calcanea, also am Processus posterior calcanei; die Bruchlinie verläuft fast immer perpendicular gegen die Längsachse des Fusses. Das hintere Bruchstück, an welchem die Achillessehne sitzt, erleidet durch die Zusammenziehung der Wadenmuskeln eine Verschiebung aufwärts, welche jedoch meist unbedeutend ist, weil die Plantar-Aponeurose und die im Zusammenhange mit ihr von der unteren Fläche des hinteren Bruch-Endes entspringenden Muskeln (oft auch das starke Ligam. calcaneo-cuboideum) dasselbe befestigen.

Symptome. Im Augenblick eines Falles auf die Füsse oder einer heftigen Zusammenziehung der Wadenmuskeln, fühlt der Kranke

an der Ferse deutliches Krachen und heftigen Schmerz. Er fällt, vermag nicht aufzustehen, noch weniger aufzutreten. — Die Fussspitze steht aufwärts gerichtet. Durch Bewegung des hinteren Bruch-Endes lässt sich zuweilen Crepitation erzeugen. Bei Verschiebung desselben nach Oben bildet die Ferse einen weniger deutlichen Vorsprung als am gesunden Fuss, und der untere Rand des vorderen Bruchstücks ist in der Fusssohle zu fühlen.

Bestehen keine Complicationen, so ist die Prognose nicht bedenklich. Die Heilung erfolgt in 30—40 Tagen; die Angabe, dass die Vereinigung immer nur durch Bandmasse erfolge, ist unbegründet.

Behandlung. Die Reduction geschieht bei gebeugtem Knie und abwärts gezogener Fussspitze. Zum Behuf der Retention muss man den Fuss in dieser Stellung fixiren; ausserdem sollen die Wadenmuskeln in ihrer Wirksamkeit möglichst geschwächt und das hintere Bruch-Ende direct abwärts gedrückt werden. Zur Erfüllung dieser Indicationen kann man sich derselben Verbände bedienen, welche bei Zerreißung der Achillessehne empfohlen sind. Vgl. Bd. IV. Gewöhnlich ist es aber bei beiden Arten von Verletzung vollkommen zureichend und für den Kranken bei Weitem bequemer, wenn man nur für Abwärtswendung der Fussspitze sorgt (wodurch das vordere Bruch-Ende dem hinteren möglichst genähert wird), und den Kranken dann mit gebeugtem Kniegelenk ruhig auf der Seite liegen lässt. Um den Fuss in der gedachten Stellung zu befestigen, genügt eine gut gepolsterte, schwach gebogene Schiene, welche vom Fussrücken zur vorderen Seite des Unterschenkels aufsteigt und mit Binden am Unterschenkel und am Fuss befestigt wird. Lässt man die zur Befestigung des oberen Endes der Schiene bestimmte Binde bis zur Ferse hinabsteigen, schützt aber die Achillessehne vor Druck durch graduirte Compressen, die zu ihren Seiten angelegt werden, so könnte dadurch auch den übrigen Indicationen Genüge geleistet werden. Eine solche Belastung des fracturirten Beins mit Binden ist aber mindestens überflüssig, da die Wadenmuskeln nach wenigen Tagen von selbst erschlaffen, worauf dann das abgebrochene Knochenstück durch einen Gyps-Verband in der richtigen Stellung befestigt werden kann.

Ueber die sehr seltenen, meist mit erheblicher Dislocation verbundenen Fracturen des Talus (Astragalus) wird bei den Verrenkungen desselben das Nöthige erwähnt. Vgl. d. fgd. Abschn., Cap. II, IV, d, 6.

Zweites Capitel.

Entzündliche und destructive Prozesse an den Knochen.


Während der Brand der Knochen als Nekrose (im engeren Sinne), die Verschwärung derselben als Knochenfrass oder Caries und ihre Verbiegungen unter verschiedenen Namen schon längst bekannt gewesen sind, hat man unter den eigentlich entzündlichen Processen an den Knochen früher nur die Knochenhaut-Entzündung, Periostitis, genauer berücksichtigt. Wenn nun auch der Knochenbrand keineswegs immer entzündlichen Ursprungs und der Knochenfrass ebenso wenig als die Verschwärung der Weichtheile mit der Entzündung zu identificiren ist, endlich auch nicht behauptet werden soll, dass die bei Knochenverbiegungen (Rachitis und Osteomalacie) auftretenden Veränderungen des Skelets einfach entzündliche wären; so giebt doch die Knochen-Entzündung den Schlüssel für das Verständniss aller dieser Prozesse, welche deshalb hier mit der Knochen-Entzündung in einem Capitel zusammengefasst werden sollen.

I. Entzündung der Knochensubstanz. Osteitis, Ostitis.

Lange hielt man die Entzündung der Knochensubstanz für eine seltene Krankheit und glaubte eine genügende Erklärung dafür in der „geringen Vitalität“ derselben zu finden. Genauere Untersuchungen haben gezeigt, dass man die Ostitis nur nicht immer erkannt hatte, wo sie wirklich vorhanden war. Man übersah ihre Symptome in Folge der vorwiegenden Entwicklung der Krankheits-Erscheinungen, welche von den mit der Ostitis gleichzeitig vorhandenen Erkrankungen der benachbarten Gewebe abhängen.

Anatomische Veränderungen. Die Untersuchungen von Gerdy und von Nélaton beziehen sich auf die mit blossem Auge sichtbaren Veränderungen der Knochen an Amputationsstümpfen und an den Bruch-Enden complicirter Knochenbrüche. Das Periost, welches mit zahlreichen Gefässen durchzogen und angeschwollen ist, lässt sich nach diesen Autoren, von dem entzündeten Knochen leichter als im normalen Verhalten ablösen. Der entblösste Knochen erscheint glatt, glänzend und hart, und hat eine leicht rosenrothe Färbung, die von mehr oder weniger rothen, durch die Oberfläche des Knochens hindurch leuchtenden Flecken herrührt. Diese Flecke haben eine, der Axe der Diaphyse parallele Richtung und werden nach der Wundfläche des Knochens hin immer dichter und zahlreicher (Fig. 68, a).

Fig. 68.



Nach Entfernung der peripherischen Knochen-schichten gelangt man auf kleine Höhlen oder Canäle, die ausser einem strotzend mit Blut gefüllten Gefässe noch eine durchsichtige, dem flüssigen Knochenfette ähnliche Masse enthalten. Diese Canäle befinden sich in verschiedenen Entfernungen von der Knochenoberfläche; einige sind sogar ganz oberflächlich gelegen und setzen sich nach Aussen in eine auf der äusseren Oberfläche des Knochens verlaufende Rinne fort. Hat die Entzündung der Knochen-substanz längere Zeit gedauert, so sieht man auf einem Querschnitt des Knochens zahlreiche rundliche Lücken, die Oeffnungen der durchschnittenen und erweiterten Gefässcanäle.

Fig. 68, Stück eines amputirten Os femoris am 25. Tage nach der Operation (Präparat von Nélaton). Bei *a* sind die rothen Flecke im Knochen-

gewebe (erweiterte Gefässcanälchen) angedeutet, bei *b* kleine Abscesse in der Medullar-substanz; bei *c* die durchaus vereiterte Medullarsubstanz.

Nach diesen, jetzt allgemein anerkannten Beobachtungen, mit denen auch viele ältere (z. B. von Howship) im Wesentlichen übereinstimmen, haben wir als eine der Ostitis eigenthümliche Erscheinung die Vergrösserung vorhandener Räume, besonders der Gefässcanälchen, zu betrachten. In den erweiterten Gefässcanälen finden sich nicht blos die von Blut ausgedehnten alten Gefässe, sondern es entstehen auch neue Capillargefässe, welche in zellenreichem neuen Bindegewebe liegen und von jungen, mit molekulärem Fett gefüllten Zellen umgeben sind. Diese halbflüssige, gallertartige Masse wird gewöhnlich schlechtweg als „rothes Mark“ beschrieben. — Virchow hat Veränderungen der Knochenkörperchen und ihrer nächsten Umgebung nachgewiesen, welche die Resorption der knöchernen Substanz erklärlicher machen. Nach seinen Beobachtungen füllen sich die Knochenzellen (oder -Körperchen) und ihre Strahlen mit feinkörnigem Fett, die Zellwand selbst wird zerstört und weiterhin entsteht an der Stelle des Knochenkörperchens eine Lücke im Knochengewebe, die, grösser als das Knochenkörperchen selbst, mit einer weichen, Anfangs mehr breiigen, endlich löslichen Masse erfüllt ist. Die Erweichungsherde entsprechen dem Gebiete eines Knochenkörperchens und seiner Ausläufer. Alles dies verhält sich also analog den mikroskopischen Veränderungen in anderen entzündeten Geweben, namentlich in der Hornhaut. Nach

den Untersuchungen von R. Volkmann¹⁾ entstehen die im entzündeten Knochen auftretenden Lücken (Lacunen) jedoch keineswegs regelmässig aus Knochenkörperchen, sondern selbstständig, als „lacunäre Einschmelzung“.

Jedenfalls ist der entzündete Knochen, auf Grund einer Wucherung der in ihm enthaltenen zelligen Elemente, poröser als der normale, und es lässt sich daher vom anatomischen Standpunkte aus mit Recht sagen, dass die Knochen-Entzündung in der Regel mit „Osteoporose“ beginne.

In der Regel begleiten auch chemische Veränderungen die histologische Metamorphose des entzündeten Knochens. „Der entzündete Knochen verliert seinen phosphorsauren Kalk; seine Gallerte, mit Salzsäure behandelt, hat wenig Zusammenhalt, ist wie mussig und offenbar verändert. Calcinierte Stücke entzündeter Knochen sind so porös und ihre erdigen Bestandtheile so von einander getrennt, dass sie bei dem geringsten Druck in Staub zerfallen.“

Ganz im Gegensatz zu den bisher betrachteten Fällen finden sich (wenngleich seltener) auch solche, in denen die Vascularisation des Knochens im Beginne der Entzündung zwar auch erhebliche Fortschritte macht, eine Wucherung des rothen Marks und die davon abhängige Rarefaction des Knochengewebes aber ausbleibt, vielmehr eine schichtweise Neubildung von Knochengewebe in den Markräumen und Gefässcanälchen und damit eine Verdichtung des Knochengewebes von Anfang an vorherrscht. Man nennt diese Form die sklerosirende Knochenentzündung (*ostéite condensante*, nach Gerdy). Dieselbe verläuft immer chronisch und sehr selten als selbstständiger Krankheitsprocess, wie bei der berühmten Hyperostosis cranii (vgl. Bd. III.); viel häufiger ist man berechtigt die Sklerose nur als einen Entzündungsausgang zu betrachten, wie die analogen Vorgänge der Hypertrophie und Induration in Weichtheilen.

Verlauf und Symptome. Die Entzündung eines Knochens äussert sich oft erst lange nach einer Verletzung oder nach der Einwirkung einer anderweitigen Schädlichkeit durch deutliche Symptome.

Die Symptome der Knochen-Entzündung zeigen theils nach den Ursachen, theils nach dem Sitze und der Verbreitung manche Verschiedenheiten. Da in vielen Fällen die Weichtheile ringsum gleichzeitig ergriffen sind, so möchte es schwer sein, die Symptome der Entzündung der Knochensubstanz stets sofort oder auch nur überhaupt herauszufinden. Der Schmerz hat allerdings etwas Eigenthümliches.

¹⁾ Zur Histologie der Caries und Ostitis. Archiv f. klin. Chirurg. IV.

Bald ist er dumpf, bohrend, drückend, tiefsitzend und intermittirend, bei wechselnder Temperatur sich steigend, bald reissend, heftig, jeden Abend exacerbirend. Besonders heftig werden die Schmerzen gewöhnlich erst, wenn die nächstliegenden Weichtheile in den Entzündungsprocess hineingezogen werden; dann tritt bei acutem Verlauf stets Fieber hinzu. Die kranken Knochen sind gegen äusseren Druck bald ganz unempfindlich, bald können sie auch nicht die leiseste Berührung ertragen; oft können lange Zeit hindurch noch Bewegungen mit dem erkrankten Gliede ausgeführt werden, dann wieder erträgt es auch nicht die geringste Erschütterung. Bisweilen ist der Schmerz fix und circumscrip't; in vielen anderen Fällen dagegen weithin ausstrahlend, ergreift den ganzen Knochen, oder wird von dem Kranken auch an eine ganz andere Stelle, z. B. an das entgegengesetzte Gelenk-Ende verlegt. Die tiefsitzenden Schmerzen werden gewöhnlich auf die entzündete Markhaut, die mehr oberflächlichen, reissenden auf das entzündete Periost bezogen; da sich im Knochen selbst Nerven ausbreiten, so können sie ebenso gut von diesen herrühren. — Ist der entzündete Knochen von wenig Weichtheilen bedeckt, so findet man, bei acuter Entzündung eine dauernde deutliche Temperaturerhöhung über demselben. — Die Anschwellung um und über entzündeten Knochen ist ebenso verschieden wie der Schmerz. Das Schwierigste ist gleich von vorn herein zu entscheiden, ob eine solche Anschwellung dem Knochen selbst angehört, oder ob sie nur in den Weichtheilen sitzt¹⁾. Meist ist sie diffus, entsteht sehr allmähig und behält die Form des Knochens bei; tritt sie mehr acut auf, so wird sie bald zu einer unförmigen Geschwulst. Gewöhnlich nimmt man an, dass, je tiefer der Entzündungs-herd sitze, um so beträchtlicher auch die Anschwellung des Knochens und der Weichtheile sei. — Die an einen entzündeten Knochen sich ansetzenden Muskeln verlieren ihre Kraft und ihr Volumen, — wahrscheinlich jedoch nur dann, wenn die Bewegungen des Gliedes schmerzen oder der Entzündungsprocess auf die Ansatzpunkte derselben übergreift. Der Kranke, welcher instinctmässig die betreffenden, zu einer bestimmten Bewegung erforderlichen Muskeln nicht contrahirt, hält das Glied, da er es mit anderen Muskeln nicht bewegen kann, für schwerer, — „von bleiernem Gewicht“.

Der Verlauf der Knochen-Entzündung ist, selbst in den acuten Formen, meist langsam und, wie ihr Schmerz, höchst intermittirend. Ohne dass gerade schon eine sehr deutliche Anschwellung des er-

¹⁾ Dass die eigentliche Knochensubstanz nicht anschwillt, bedarf keiner Erläuterung; die dem Knochen zugehörige Geschwulst beruht entweder auf Periostschwellung oder Osteophytbildung.

griffenen Gliedes eingetreten wäre, können bei einer weitverbreiteten, in der Tiefe sitzenden Knochen-Entzündung gleichzeitig Abmagerung, Kraftlosigkeit, immerwährendes Fieber, Schlaflosigkeit, Appetitmangel, Diarrhöen vorhanden sein; diese begleitenden Erscheinungen erlauben sogar einen Schluss auf die Ausbreitung und den möglichen Ausgang des im Knochen vorhandenen Processes.

Das Symptom, welches im weiteren Verlaufe alle diagnostischen Zweifel beseitigt, ist in der Regel das sogenannte Pseudoerysipelas, eine Phlegmone in der Umgebung des entzündeten Knochens, welche in der Mehrzahl der Fälle zur Eiterung und Abscessbildung führt. Das wiederholte Auftreten selbst kleiner Abscesse in den tieferen Weichtheilen lässt, wenn sie auch wieder vernarben, auf die Entzündung eines benachbarten Knochens schliessen.

Haben sich Abscesse in den Weichtheilen gebildet, so können dieselben entweder mit dem entzündeten kranken Knochen selbst zusammenhängen (*abcès ossifluens*, Gerdy), oder nur in den benachbarten Geweben liegen (*abcès circonvoisins*, Gerdy); der Abscess kann ferner in unmittelbarer Nähe nach Aussen zum Durchbruch kommen, oder er wandert, je nach der Oertlichkeit, namentlich durch die Fascien geleitet, eine mehr oder weniger grosse Strecke von seiner Ursprungsstelle fort und kommt oft in weiter Entfernung von derselben als Senkungs-Abscess, *Abscessus congestivus*, zum Durchbruch. Der letztere Process wird besonders durch den chronischen Verlauf und einen geringeren Entzündungszustand der den Knochen umgebenden Weichtheile begünstigt. Der von entzündeten Knochen kommende Eiter enthält eine grössere Menge phosphorsauren Kalks ($\frac{1}{200} - \frac{1}{170}$), als der in Weichtheilen gebildete Eiter ($\frac{1}{300}$).

Die **Ausgänge** der Knochen-Entzündung sind, je nach der Ausbreitung, nach der Oertlichkeit und nach den individuellen Verhältnissen, höchst verschieden.

1) Zertheilung. Das Vorkommen dieses Ausganges ist weniger durch anatomische Untersuchung, als durch Wahrnehmungen am Lebenden begründet. „Der vorher gefässreiche Knochen gewinnt allmählig sein normales Ansehen wieder; eine neue Ablagerung von Kalksalzen füllt die entstandenen Lücken aus, die erweiterten Canäle erhalten wieder ihr früheres Lumen, so dass man bei der späteren Untersuchung eines Amputationsstumpfes mit blossem Auge kaum einen Unterschied von gesundem Knochen wahrzunehmen vermag“ (Nélaton). Um das normale Verhalten wieder herzustellen, sollen wenigstens mehrere Monate nöthig sein. Wahrscheinlich handelt es sich bei der sogenannten Zertheilung immer nur um Knochenneubil-

dung. Der Knochen erscheint nach Ablauf der Entzündung härter, spröder; die neu entstandenen oder vergrösserten Hohlräume sind ausgefüllt. An der Knochenoberfläche finden wir an diesen Stellen neugebildete (accidentelle) Knochensubstanz, welche, sofern sie ein Product der Auflagerung, d. h. der Knochen-Neubildung Seitens des Periost ist, den Namen Osteophyt erhält, auch wohl als „Exostose“, oder, wenn sie innerhalb des Markraumes sitzt, als „Enostose“ bezeichnet wird. In einzelnen Fällen findet, unter dem Einfluss der Entzündung, auch eine Steigerung des Längenwachstums statt¹⁾. Jedenfalls hat der Knochen nach Ablauf der Entzündung an Umfang und an Schwere zugenommen, an Umfang durch äusserliche Knochen-Neubildung, welche durch das Periost vermittelt wurde, an Schwere durch Ausfüllung früher vorhandener Lücken, der Knochenkörperchen, Gefässcanälen und Markräume. Was die älteren Schriftsteller als Expansion der Knochen bezeichnen, ist nur die Vermehrung ihres Volumens durch Auflagerung neuer Schichten. Dagegen ist die Verdichtung des Knochens, Sclerosis, keine blos scheinbare, sondern beruht auf der Ausfüllung der im Knochengewebe bestehenden, im normalen Zustande nur weiche Gewebe enthaltenden Canäle durch feste Knochensubstanz.

2) Eiterung tritt als Ausgang der Knochen-Entzündung in drei verschiedenen Formen auf: a) an der von Periost entblössten Oberfläche des Knochens; b) als diffuse Eiterung in den Gefässcanälen (von der später zu beschreibenden Osteomyelitis nicht zu unterscheiden); c) als circumscripte Abscessbildung in der compacten Knochensubstanz, als geschlossener Knochenabscess (den wir unter V. gesondert beschreiben werden).

Die Vorgänge der Eiterung und Granulationsbildung an der Oberfläche eines Knochens kann man an einem granulierenden Amputationsstumpf oder an einem blossliegenden Bruch-Ende eines Knochens besonders bequem beobachten. Zuerst tritt eine allmähig immer dunkler werdende Röthung der Knochensubstanz auf, indem die zerstreuten durchscheinenden rothen Flecke und Canäle grösser werden, zusammenfliessen und sich der glatten, bis dahin noch an keinem Punkt durchbrochenen Knochenfläche nähern. Die peripherische Knochenschicht wird immer durchsichtiger, die Resorption der Knochensubstanz schreitet weiter gegen die Peripherie hin fort und bildet zuletzt, bald nur an einer, bald an mehreren Stellen.

¹⁾ B. v. Langenbeck, über krankhaftes Längenwachsthum der Röhrenknochen. Berl. klin. Wochenschrft. 1869. Juni 28. — Vgl. pag. 520.

kleine, kaum sichtbare Lücken, durch welche sich die rothen Granulationen aus der Tiefe hervordrängen. Der noch vorhandene Rest der höchst feinen peripherischen Knochenlamelle wird schnell vollständig aufgesogen; die einzelnen knospenartig hervorquellenden Granulationen rücken zusammen und bilden eine eiternde Fläche, an welche die von dem Periost ausgehenden Granulationen sich anlegen. Dieser ganze Process kann ganz ohne Abstossung irgend eines Knochenstückchens vor sich gehen; bisweilen jedoch wird der letzte Rest der blattartig verdünnten peripherischen Knochenschicht von den gegen sie andrängenden Granulationen gleichsam abgehoben und kann dann ohne Blutung entfernt werden. In Fällen, wo durchaus keine Abstossung bemerkt werden kann, hat man früher eine solche dennoch vorausgesetzt und dieselbe sehr treffend als *Exfoliatio insensibilis* bezeichnet. Da aber auch mit Hülfe des Mikroskopes von einer Abstossung kleiner Knochenstückchen bei dem so eben beschriebenen Vorgange der oberflächlichen Knocheneiterung durchaus nichts bemerkt werden kann, so erscheint jene Annahme ungerechtfertigt. Derselbe Process, welcher in der Tiefe durch Resorption der Knochensubstanz sich Raum schafft für neue Zellen und Gefässe, durchbohrt auch den letzten bedeckenden Knochenrest. Eine partielle Nekrose desselben tritt besonders dann leicht ein, wenn derselbe nicht feucht erhalten und zu lange der Luft ausgesetzt wurde. Beim Verbande ist darauf sorgfältig Rücksicht zu nehmen. (Vgl. Nekrose.)

3) Knochen-Neubildung findet sich vorzugsweise bei chronischen Knochen-Entzündungen, aber auch bei acut verlaufenden, fast immer in der Umgegend des Entzündungs- oder Eiterungsherdens, sowohl an der Oberfläche des Knochens (Periostauflagerung), als auch in der Markhöhle. Nach mechanischen Verletzungen tritt Knochen-Neubildung mit grosser Regelmässigkeit auf (vgl. „Callus“, pag. 326 u. f.). Man nennt die auf Entzündung beruhenden Knochen-Neubildungen im Allgemeinen „Osteophyten“. Sie finden sich in der Umgebung cariöser und nekrotischer Knochen, in der Nähe von Unterschenkelgeschwüren und anderen Krankheitsherden, sofern diese in irgend einem Stadium ihres Bestehens eine Reaction im Knochengewebe veranlassen. Die Osteophyten nehmen gewöhnlich ausgebreitete, nicht genau umschriebene Stellen eines Knochens ein und erscheinen in den verschiedenartigsten Formen (schwammig, zottig, splittrig-blättrig, warzig, zackig, stalaktitenförmig, knorrig), besonders in der Nähe der gefässreichen Knochenabschnitte, namentlich der sogenannten *Lineae asperae*, der Gelenk-Enden etc. — Anfangs durchaus spongiös, nehmen sie allmählig unter stetiger Schrumpfung

(Sklerose), ein compactes Gefüge an und können, wenn sie keine erhebliche Grösse hatten, ganz verschwinden, wie z. B. der sogen. provisorische Callus.

Fig. 69 zeigt bei *a* Osteophyten, deren Form und Dicke auf dem Querschnitt (Fig. 70) bestimmter erkannt werden kann; bei *b* erweiterte Gefässcanälchen.

Fig. 69.



Fig. 70.



Krankhaft gesteigertes Längenwachsthum der (Röhren-) Knochen¹⁾ findet sich nur bei chronischen Entzündungen und auch bei diesen ziemlich selten, da dieselben oft gar keinen oder grade den entgegengesetzten Einfluss auf das Knochenwachsthum ausüben (vgl. Rachitis). Merkwürdig und unerklärt ist die Thatsache, dass in den zweiröhriigen Gliederabschnitten bei entzündlichem Leiden des einen Knochens auch der andere in pathologisch gesteigertem Maasse mitwachsen kann, obschon häufiger das Gegentheil stattfindet, woraus z. B. bei Nekrose der Tibia nicht selten Schiefstellung des Fusses hervorgeht. In einzelnen Fällen sah man die Neigung zum stärkeren Wachsthum sich sogar über ein Gelenk hinaus fortsetzen, z. B. von der erkrankten Tibia auf das gesunde Femur. Vielleicht kommt für alle diese Fälle die „Entlastung der Gelenkflächen durch Verminderung des articulären Druckes“ wesentlich in Betracht, wie R. Volkmann²⁾ hervorhebt.

4) Bei der Sklerose zeigt sich die Knochensubstanz verdichtet durch die innerhalb der vorher erweiterten Gefässcanälchen entstan-

¹⁾ „Elongation“, nach Rokitsansky. Dieser Vorgang war allerdings schon früher bekannt, hat aber doch erst durch B. v. Langenbeck (vgl. pag. 518) praktische Bedeutung gewonnen.

²⁾ Jahresbericht p. 1869. Bd. II. pag. 356. — Vgl. auch den folgd. Abschnitt.

dene Knochen-Neubildung. Der Knochen hat daher auf der Durchschnittfläche das Ansehen eines durchsägten Steines, eines Stückes Elfenbein (daher: „Eburneatio“). Bei der Behandlung mit Salzsäure verliert ein sklerotisches Knochenstück $\frac{2}{3}$, ein osteoporotisches $\frac{7}{10}$ an Gewicht. Das spezifische Gewicht des sklerosirten Knochens ist vermehrt, obgleich die Gefässeanälchen oft erweitert sind. Die gleichzeitig an anderen Stellen bestehende Osteoporose kann aber so sehr das Uebergewicht haben, dass das spezifische Gewicht des ganzen Knochens dennoch vermindert ist. — Das Volumen des Knochens kann bei der Sklerose (zuweilen sogar erheblich) vermehrt sein oder auch ganz unverändert bleiben.

5) Verschwärung des Knochens, Knochenfrass, Caries, ist ein Entzündungsausgang, welcher so beträchtliche Eigenthümlichkeiten darbietet, dass wir ihn gesondert betrachten müssen (s. unten VI.). — Ebenso:

6) Nekrose, Knochenbrand, — nicht einmal immer entzündlichen Ursprungs (s. unten VII.), und

7) Osteoporose, welche in ihren verschiedenen Formen besonders erörtert werden muss (s. unten VIII.).

Aetiologie. Prädisposition zu Knochen-Entzündungen bedingt die Zeit des Knochenwachstums, daher nicht bloß die Jugend im Allgemeinen, sondern besonders auch die Zeit der ersten und zweiten Dentition, und die Pubertätsentwicklung, mit welchen gewöhnlich ein stärkeres Wachstum des Skelets zusammenfällt.

Knochen-Entzündung ist häufig die Folge localer Veranlassungen, wie Contusionen, Wunden, Fracturen, lange dauernder Druck; ausserdem entzündet sich auch der Knochen leicht in der Nähe entzündeter Weichtheile. Die Erbsen einer Fontanelle können den Humerus, eine in's äussere Ohr gebrachte Papierkugel das Felsenbein in Entzündung versetzen; ebenso pflanzen sich die Entzündungen der Synovialhäute und des Periost, der Bandverbindungen zwischen den Wirbeln etc. leicht auf die benachbarten Knochen fort.

Den äusseren Schädlichkeiten sind oberflächlich gelegene Knochen am Meisten ausgesetzt, z. B. die Kopfknochen, die Fuss- und Handknochen, das Schienbein etc. — Die Epiphysen der langen Knochen sind öfter entzündet als die Diaphysen.

Unter die allgemeinen Veranlassungen der Knochen-Entzündung rechnet man besonders Scropheln, Syphilis, Scorbut, Rheumatismus, Gicht. Jeder dieser Processe ergreift gern besondere Knochenabschnitte.

Zur **Behandlung** der Knochen-Entzündung sind nur dann innere Mittel erforderlich, wenn die Ursache derselben in einer von den erwähnten constitutionellen Erkrankungen liegt. Man wendet gegen diese die anderweitig bekannten Mittel an und richtet sich bei der örtlichen Behandlung nach dem Grade der Entzündung.

Der meist langsame Verlauf der Knochen-Entzündungen ist auch bestimmend für die locale Behandlung: ruhige Lage des erkrankten Theiles, Eis, kalte Irrigationen, öfter wiederholte Schröpfköpfe, Blutegel. Die localen Blutentziehungen werden Anfangs alle 3—4 Tage, später in längeren Zwischenräumen wiederholt; Eis macht sie meist entbehrlich. Wenn Verhärtungen oder Verdickungen zurückbleiben, wendet man auch Jodsalben, Vesicatore, Mercurialpflaster, alkalische und Schwefelbäder, flüchtige Einreibungen, vor Allem aber, besonders über den von dicken Weichtheilen bedeckten Knochen, Ableitungen an (Haarseil, Fontanelle etc.). — Bei sehr heftigen Schmerzen nimmt man Narcotica zu Hilfe.

Ist durch eine Lappenwunde, einen Substanzverlust, oder durch Periostitis suppurativa oder irgendwie anders der Knochen eine Strecke weit ganz entblösst worden, so ist Nichts übereilter als zu glauben, dass derselbe nothwendiger Weise in seinen oberflächlichen Schichten nekrotisch werden müsse, und ihn deshalb gleichsam Preis zu geben. Derselbe muss im Gegentheil mit der grössten Sorgfalt feucht erhalten werden durch Umschläge oder durch Verbände mit milden Oelen und Salben; die Hauptaufgabe bei der Behandlung der Knochen-Entblösungen ist, die Oberfläche des Knochens vor der Austrocknung der oberflächlichen Schichten (durch Verdunstung) zu bewahren, da sonst allerdings Nekrose folgt.

II. Entzündung der Knochenhaut. Periostitis.

Anatomische Veränderungen. Im Beginne und bei einem geringen Grade der Entzündung findet man die Blutgefässe des Periost strotzend gefüllt (hyperämisch); die Knochenhaut selbst erscheint für das blosse Auge nicht verdickt, obgleich das Mikroskop eine üppige Wucherung seiner zelligen Elemente, namentlich an der dem Knochen zugewandten Seite schon jetzt erkennen lässt. Das umgebende Bindegewebe und die oberflächliche Schicht des Knochens zeigen dieselbe Blutüberfüllung. Die Verbindung zwischen dem Periost und dem Knochen ist durch die bereits erwähnte Zellenwucherung gelockert, ersteres kann von letzterem ohne Schwierigkeit abgezogen werden, während es mit den umgebenden Weichtheilen bei Weitem inniger,

als im normalen Zustande zusammenhängt und in dieselben ohne scharfe Grenze übergeht. Der Knochenstumpf eines kurze Zeit nach der Amputation Verstorbenen zeigt einen solchen Zustand. Späterhin und bei heftigerer Entzündung ist das Periost intensiver geröthet und durch Wucherung verdickt. Die Ablösung des Periost vom Knochen erfolgt dann noch leichter, da eine mächtige Zellschicht (früher als „fibrinöses Exsudat“ gedeutet) zwischen Periost und Knochen eingelagert ist. Bei längerer Dauer und chronischem Verlaufe der Knochenhaut-Entzündung ist weniger die Röthung als die Verdickung dieser Membran auffallend; sie zeigt alsdann eine beträchtliche Festigkeit (schwierige Induration) und hängt mit dem Knochen innig zusammen (Periostitis fibrosa). Sehr häufig entstehen in Folge chronischer Periostitis Auflagerungen von corticaler Knochensubstanz zwischen dem Periost und dem alten Knochen, — Osteophyten. Man bezeichnet die auf solche Weise entstandene Volumenzunahme des Knochen als Hyperostose und nennt eine in solcher Weise verlaufende Knochenhaut-Entzündung Periostitis ossificans. Nicht in allen Fällen sind die Osteophyten dauernde Gebilde; viele schrumpfen im Laufe der Zeit wieder ein, wenn sie nicht durch irgendwelche Irritation unterhalten werden. — Entsteht Eiterung, so erscheint das verdickte Periost durch die von ihm aufschliessenden Granulationen schwammig, zottig. Eiterung ist viel seltener auf der äusseren, als auf der inneren, dem Knochen zugewandten Seite. Benachbarte Abscesse bedingen, wenn sie bis zum Periost vorgerückt sind, zunächst eine Verdickung desselben. Allmählig wird dann die Knochenhaut zerstört und der Eiter gelangt direct zum Knochen. Aehnlich geschieht es zuweilen bei chronischen Geschwüren am Unterschenkel, in deren Grunde das Schienbein blossgelegt wird. In der Mehrzahl der Fälle aber wird das an seiner äusseren Seite mit Eiter in Berührung kommende Periost verdickt; ein Theil desselben verknöchert, und es entstehen auf diese Weise flache, oft sehr ausgedehnte Osteophyten, die man auch als Elephantiasis ossium beschrieben hat. Der durch eine primäre Periostitis erzeugte Eiter liegt, wie alle periostealen Zellenwucherungen, regelmässig zwischen dieser Membran und dem Knochen und bildet daher einen subperiostealen Abscess. Das Periost selbst wird, während an seiner inneren Seite Eiter sich bildet, verdickt vom Knochen abgedrängt, oft zu flachen Hügeln emporgehoben, und nur durch zufällig bestehende oder entstehende Oeffnungen kann der Eiter nach Aussen in das umgebende Bindegewebe gelangen, worauf dann zu der purulenten Periostitis eine Phlegmone hinzutritt. Bleibt der Eiter längere Zeit

unter dem Periost eingeklemmt, so wird dasselbe brandig. Ganz gewöhnlich, jedoch nicht immer stirbt alsdann auch die ihrer Blutzufuhr Seitens des Periost beraubte oberflächliche Knochenschicht ab, Periostosis necrotica nach Pearson¹⁾. — In relativ seltenen Fällen tritt die Periostitis (bei äusserst acutem Verlauf) von vorn herein mit der Tendenz zur Jauchung auf, so dass man das Periost selbst nekrotisirt, den Knochen weithin entblösst und von Jauche umspült findet, — Periostitis maligna.

Symptome. Verlauf. Liegt der von acuter Periostitis befallene Knochen oberflächlich, so stellt sich bei einiger Heftigkeit der Krankheit, ausser bedeutender Schmerzhaftigkeit und Funktionsstörung, auch Röthung der Haut und teigige Anschwellung ein, welche unmittelbar am Entzündungsherde die grösste Festigkeit besitzt (sogen. Pseudoerysipelas). Sehr allmählig entsteht Fluctuation, nachdem schon lange vorher Eiterbildung unter dem Periost, oft sogar schon Durchbruch des Eiters durch das Periost Statt gefunden hat. Nur durch das frühzeitige Auftreten einer erheblicheren Geschwulst ist die Periostitis vor einer Ostitis ausgezeichnet. Die Unterscheidung beider ist daher, namentlich bei tiefgelegenen Knochen, fast immer unmöglich.

Bei heftiger Periostitis entsteht Fieber und durch die bedeutenden Schmerzen Schlaflosigkeit. Dass dieselben wesentlich durch die Spannung des Periost Seitens des unter ihm liegenden „Exsudats“ bedingt sind, beweist die Thatsache, dass ein das Periost spaltender Einschnitt die Schmerzen fast augenblicklich beseitigt. Bei Periostitis maligna erreicht das Fieber in kurzer Zeit die beträchtlichste Höhe, so dass die Localerscheinungen fast in den Hintergrund treten; fast immer erfolgt dann bald der Tod durch septische Infection. Vgl. III. und IV.

Die **Aetiologie** der Periostitis ist fast ganz diejenige der Ostitis. Eine besondere Prädisposition bedingt das jugendliche Alter, die Wachstumszeit des Knochens. Unter den Dyskrasien ruft vorzugsweise die syphilitische, häufig aber auch die scrophulöse und in manchen Gegenden der Scorbut, selten der Rotz, Periostitis hervor. Besonders bekannt sind die Formen der syphilitischen Periostitis, welche durch weiche gefässreiche Wucherungen, die in den Knochen hineinwachsen (Gummata), ausgiebige Zerstörungen des letzteren hervorrufen. Unter den örtlichen Ursachen sind zunächst Erkältungen zu

¹⁾ Unter Periostosis wird von verschiedenen Autoren nicht immer dasselbe verstanden, von den meisten Chirurgen jedoch eine durch Periostitis bedingte, spindelförmige Verdickung eines Knochens. Vgl. Bd. I, pag. 407.

erwähnen, durch welche die sogenannte rheumatische Periostitis veranlasst wird, dann chemische und mechanische Zerstörung oder Verletzung, z. B. durch Aetzmittel, durch das Glüheisen, durch die Säge (bei Amputationen) u. dgl. m. Endlich kann die Periostitis auch eine mitgetheilte oder consecutive sein. Eine oberflächliche Ostitis führt nothwendig zur Periostitis. Auch bei der Entzündung des Knochenmarks entwickelt sich ganz gewöhnlich Entzündung der Knochenhaut. Wie von Aussen her Entzündungen und Eiterungen sich auf das Periost ausbreiten können, wurde schon oben angedeutet.

Die **Prognose** der Periostitis ergibt sich aus den „anatomischen Veränderungen“ und dem „Verlauf“.

Behandlung. Bei der acuten Periostitis wird im Beginne der Krankheit eine allgemeine und örtliche antiphlogistische Behandlung, je nach der Heftigkeit der Entzündung, vor Allem aber die Anwendung des Eises fast allgemein empfohlen. Das beste Mittel und das einzige, durch welches schnell der furchtbare Schmerz gelindert und in vielen Fällen wohl auch der Nekrose des Knochens vorgebeugt wird, ist ein tiefer Einschnitt bis durch das Periost. Bei einer Periostitis an den Fingern zögert kein erfahrener Arzt, zugleich zu diesem Hilfsmittel zu greifen. Die Unsicherheit der Diagnose, vielleicht auch die unzureichende Sicherheit im Operiren hält Manchen davon ab, das gleiche Verfahren einzuschlagen, wenn die Periostitis am Femur ihren Sitz hat. Aber hier wie dort ist nur von der Incision Heil zu erwarten. Die weitere Behandlung ist dann die einer offenen (granulirenden) Wunde. Die in allen solchen Fällen (am Meisten bei der malignen Periostitis) drohende Gefahr der septischen Infection erheischt die sorgfältigste Durchführung der „antiseptischen Methode“. Findet man den subperiostealen Abscess bereits aufgebrochen, so muss man durch Dilatiren der Aufbruchsstelle, Gegenöffnungen, Drainage und desinficirende Einspritzungen und Ueberrieselungen die Gefahr abzuwenden und die Kräfte zu unterstützen suchen. Vgl. Bd. I. pag. 264 u. f.

Bei chronischem Verlauf ist eine länger fortzusetzende antiphlogistische, zertheilende, die Resorption befördernde Behandlung anzuwenden, auf die alsdann gewöhnlich bestehenden Dyskrasien aber sorgfältige Rücksicht zu nehmen. Ruhige Lage, Schutz vor äusseren Insulten, feuchtwarme Umschläge und Bäder sind besonders zu empfehlen. Auch bei chronischer Periostitis lassen sich die Schmerzen oft durch einen tiefen Einschnitt am Besten beseitigen.

III. Entzündung des Knochenmarks. Osteomyelitis.

Die Entzündung des Knochenmarks ist erst in neuerer Zeit bestimmt beschrieben, aber offenbar schon in früheren Jahrhunderten beobachtet worden¹⁾. Genauer erörtert haben den anatomischen Befund und den Verlauf namentlich Reynaud²⁾, Gerdy, Nélaton, Stromeyer, Roux d. J.³⁾, H. Demme⁴⁾, R. Volkmann⁵⁾.

Bei anatomischer Betrachtung ergibt sich Osteomyelitis als eine häufige Krankheit, da Knochenentzündung ohne alle Beteiligung des Markes überhaupt nicht vorkommt. Von praktischer Seite bezeichnen wir als Osteomyelitis jedoch nur solche Fälle, in denen die Entzündung des Markes die wesentlichen Erscheinungen hervorruft, was vorzugsweise an solchen Knochen der Fall ist, die auch für das Auge deutlich unterscheidbare Markmassen enthalten, namentlich also an den Diaphysen der Röhrenknochen. Nur von einer solchen acuten zur Eiterung führenden Osteomyelitis ist im Nachstehenden die Rede.

Aetiologie. Man unterscheidet eine traumatische und eine spontane Form der Osteomyelitis. Durchsägung der Knochen bei Amputationen und Resectionen, Knochenbrüche, besonders complicirte,

¹⁾ In einem von Viany redigirten *Cours du démonstrateur royal de St. Cosme* (Jean Louis Petit) aus dem Ende des 17. Jahrh. finden sich, nach Vidal, zwei in dieser Beziehung höchst merkwürdige Beobachtungen.

I. Ein Mann von 30 Jahren erhält an der vorderen Seite der Tibia einen heftigen Schlag. Anfangs scheint es sich nur um eine gewöhnliche Contusion zu handeln. Am 7ten Tage aber wird er plötzlich von Schüttelfrost befallen, welcher in unregelmässigen Zwischenräumen wiederkehrt. Er bekommt eine ikterische Hautfärbung und stirbt. Man findet bei ihm einen Leberabscess, ausserdem aber Eiteransammlung in den Zellen des spongiösen Gewebes der Tibia, welche durch die Erschütterung veranlasst war.

II. Bei der Belagerung von Namur erhielt ein Ingenieur einen Flintenschuss am unteren Theile des Beines, durch welchen der Knochen zerschmettert wurde. Die Kugel liess sich nicht ausziehen, und er starb. Man fand Eiterung in den Condylen der Tibia und einen Leberabscess; „also,“ sagt der Verfasser, „auch in den Knochenzellen kann es zusammentragen, wo die Materie gar keinen Abfluss haben kann.“

Wahrscheinlich sind in beiden Fällen die Lungen nicht untersucht worden, obgleich Petit die Ansicht ausspricht, dass bei einer von den Knochen ausgehenden Metastase in der Leber, bei einer von den fibrösen Geweben ausgehenden in den Lungen metastatische Eiterablagerungen Statt finden.

²⁾ *Archives génér. de méd.* 1831, Tom. XXVI. pag. 161.

³⁾ *Gaz. méd. de Paris* 1860, No. 17 u. f. — *Canstatt's Jahresbericht pro 1860*, Bd. IV. pag. 151 u. f.

⁴⁾ *Archiv f. klin. Chirurgie*, Bd. III.

⁵⁾ v. Pitha und Billroth, *Handbuch*, Bd. II. 2. pag. 273 u. f.

zumal solche, bei denen abgelöste Splitter der Corticalsubstanz oder fremde Körper in die Markhöhle eingedrungen oder Quetschungen des Markes auf andere Weise entstanden sind, bedingen die erstere. Aber, während oft genug die schwersten Knochenverletzungen (complicirte, namentlich Schuss-Fracturen) ohne Erscheinungen der Osteomyelitis verlaufen, haben anderer Seits leichte Quetschungen und blosser Erschütterungen zuweilen Osteomyelitis zur Folge, was man dann aus einer besonderen Prädisposition oder einem Genius epidemicus zu erklären sucht.

Anatomische Veränderungen. Im Beginne ist das Knochenmark dunkel geröthet und gleichsam aufgequollen. Später nimmt es eine gelbgraue Färbung an, bis endlich Abscessbildung (Fig. 68, *b, b, b*) oder häufiger eitrig-eitrige Infiltration (Fig. 68, *c*) zu Stande kommt. Einzelne Theile des Knochenmarks werden brandig, wobei das aus den zersprengten Fettzellen freigewordene Fett sich in Tröpfchen ansammelt. Handelt es sich um einen Amputationsstumpf, so quillt das Mark unter dem Drucke des Eiters aus dem durchsägten Ende des Knochens hervor. Der Anschein eines solchen Hervorquellens kann auch entstehen, wenn aus dem blossliegenden Knochenmarke (wie dies zuweilen geschieht) wirkliche Granulationen emporwachsen. Gleichzeitig mit der Entzündung des Markes wird das Periost von der Aussenfläche des Knochens durch consecutive Periostitis purulenta abgelöst, gewöhnlich genau in dem Umfange, in welchem innerhalb des Knochens Eiterung besteht. Auch das dazwischen gelegene Knochenstück erleidet Veränderungen: die Blutzufuhr wird ihm von beiden Seiten abgeschnitten, da die in dasselbe eindringenden Gefässe entweder obliteriren oder zerstört werden. Dasselbe wird daher, wenn der Kranke nicht schon vorher zu Grunde geht, in mehr oder weniger grossem Umfange, jedoch nur selten in der ganzen Ausdehnung der Diaphyse, nekrotisch. In der Umgegend des nekrotischen Stücks erfolgt gewöhnlich Knochen-Neubildung. Vgl. VII.

In der Regel gesellt sich zu einer nicht ganz circumscribten Osteomyelitis Entzündung des zunächst gelegenen Gelenkes, bei grosser Ausdehnung auch der beiden Gelenke, an deren Bildung der kranke Knochen theilhaftig ist. Meist entsteht in dem erkrankten Gelenke seröse Exsudation, seltener Eiterung. Sind bei jugendlichen Individuen Epiphyse und Diaphyse noch nicht durch Knochensubstanz verbunden, so erfolgt bei Osteomyelitis der Diaphyse gewöhnlich eine eitrig-eitrig-eitrig Ablösung der Epiphyse. Aber dies ist keineswegs immer der Fall, wie denn auch andererseits „eitrig-eitrig-eitrig Ablösung“ nicht nothwendig Osteomyelitis voraussetzt. Vgl. IV.

Die **Symptome** der Osteomyelitis sind in vieler Beziehung dunkel. Insbesondere dürfte ihre Unterscheidung von Ostitis und Periostitis, wenn der erkrankte Knochen nicht blossliegt, oft unmöglich sein. Besteht Osteomyelitis an einem Amputationsstumpfe, so ist das Hervorquellen des Knochenmarks aus der Schnittfläche des Knochens charakteristisch. Aber Verjauchung und Abstossung des Markes erfolgen oft so schnell, dass man statt eines hervorragenden Pfropfes eine, von eitrigen oder jauchigen Massen bedeckte Vertiefung an der Stelle der durchschnittenen Markhöhle vorfindet. Der ganze Amputationsstumpf schwillt in der Regel prall ödematös an, und die Lösung der etwa eingetretenen Vereinigung der Amputationswunde gewährt die Möglichkeit den Knochen selbst zu besichtigen.

Liegt der Knochen, dessen Marksubstanz entzündet ist, wie namentlich in den „spontanen“ Fällen, nicht bloss, so muss auf die subjectiven Symptome Gewicht gelegt werden. Die Kranken klagen, bevor äusserlich irgend eine Veränderung an dem erkrankten Theile wahrgenommen werden kann, über einen sehr heftigen, fixen Schmerz in der Tiefe des Gliedes, der alsbald weithin ausstrahlt, in der Bettwärme lebhaft gesteigert und durch keinerlei Behandlung (auch durch tiefe Einschnitte nicht) gemindert wird. Das subjective Gefühl der Schwere und die Unfähigkeit zu Bewegungen sind hier gerade besonders charakteristisch. Von grosser diagnostischer Bedeutung ist es, dass die Krankheit mit lebhaftestem, meist durch Schüttelfrost eingeleiteten Fieber beginnt, während alle übrigen Erscheinungen der Knochen- und Knochenhaut-Entzündung, namentlich die pralle ödematöse Anschwellung der Weichtheile in weiter Umgebung des Entzündungsherdens oder gar der Aufbruch sich erst viel später hinzugesellen.

Der **Verlauf** ist in den schlimmeren Fällen sehr schnell, der gewöhnliche Ausgang derselben ist Pyämie. Die wiederkehrenden Schüttelfröste, die ikterische Färbung der Haut, der typhöse Zustand des Patienten (daher der, allerdings in mehrfachem Sinne gebrauchte Name „*typhus des membres*“) sind Symptome, welche nicht der Knochenmarks-Entzündung als solcher, sondern dem Fieber angehören und daher auch als „pyämische“ gedeutet werden können. Führt die purulente Infection nicht zum Tode, so entsteht in der Regel auch noch eine mehr oder weniger heftige Entzündung in den benachbarten Gelenken (vgl. pag. 358), Eiterung in den umgebenden Weichtheilen, endlich Nekrose des Knochens im Bereich des erkrankten Markes, jedoch nicht immer in genau entsprechender Ausdehnung. Die Eiterungen (Abscesse) in den Weichtheilen stehen zuweilen durch

lange enge Fistelgänge, welche die Corticalsubstanz des Knochens durchsetzen mit dem Inneren der Markhöhle in Verbindung; häufiger ist ein Zusammenhang (eine Continuität, zwischen denselben und der vereiterten Marksubstanz gar nicht vorhanden. Sowohl diese parostealen Abscesse, welche schliesslich spontan aufbrechen und bald verjauchen, als auch die nachfolgenden Gelenk-Entzündungen bedingen oft noch spät einen tödtlichen Ausgang.

Unzweifelhaft giebt es aber auch Fälle, in denen die Osteomyelitis einen milderen Verlauf und einen günstigen Ausgang hat. Dann mässigt sich das Anfangs immerhin erhebliche Fieber, die örtlichen Erscheinungen treten allmählig ganz zurück, und der weitere Verlauf unterscheidet sich nicht wesentlich von dem einer chronischen Knochenentzündung¹⁾.

Die **Behandlung** hat zunächst die Beseitigung der etwa erkennbaren Veranlassungen (Splitter, fremde Körper) in's Auge zu fassen und dann ein örtlich antiphlogistisches Verfahren einzuleiten.

Vor Allem ist die Anwendung der Kälte zu empfehlen. Blutentziehungen sind, mit Rücksicht auf den später nur allzu leicht eintretenden Collapsus, zu vermeiden. — Demme rühmt das Aufpinseln einer durch Zusatz von Jod verstärkten Jodtinctur²⁾.

Die bei Periostitis so dringend zu empfehlenden frühzeitigen Einschnitte bis auf den Knochen gewähren hier keinen Vortheil, können sogar schaden, indem sie der Luft den Zutritt zu den infiltrirten Weichtheilen gestatten und in der Regel Verjauchung derselben herbeiführen. Dagegen sind die Einschnitte zur Entleerung des in und unter den Weichtheilen angesammelten Eiters (der Abscesse) hier, wie überall, empfehlenswerth.

Ob durch Amputation noch Etwas zu erreichen ist, wenn die Erscheinungen der Pyämie auftreten, ist zweifelhaft. Jedenfalls müsste immer der kranke Knochen ganz entfernt (exarticulirt) werden.

¹⁾ An Amputationsstümpfen kommt es nach glücklichem Ablauf einer solchen Osteomyelitis zu ringförmigen Nekrosen, d. h. es lösen sich Knochenzylinder ab, die an der Sägefläche einen die ganze Dicke des Knochens enthaltenden Ring darstellen, weiter aufwärts aber immer dünner werden und zuletzt nur aus der die Markhöhle unmittelbar begrenzenden Schicht bestehen.

²⁾ Zu der officinellen Jodtinctur wird noch ebensoviel Jod, als sie schon enthält, hinzugefügt. Das überschüssig zugesetzte Jod löst sich freilich nicht; aber es kann durch Schütteln leicht suspendirt werden. Die Wirkungen dieser „Tinctura Jodi fortior“ sind viel stärker als die der officinellen Jodtinctur.

IV. Knochenentzündungen vor Vollendung des Wachstums¹⁾.

Viel häufiger, als die Knochen des Erwachsenen, sind diejenigen des noch wachsenden Kindes entzündlichen Processen unterworfen. Eine besondere Disposition dazu scheinen diejenigen Stellen des Skelets zu besitzen, an welchen der Knochenknorpel am Längsten seine knorpelige Beschaffenheit behält, und (gewöhnlich bis gegen das 20ste Lebensjahr) den sogenannten Epiphysenknorpel darstellt. Wir werden in der Rachitis (unter VIII.) eine Krankheit kennen lernen, welche vorzugsweise an diesen Stellen eigenthümliche, mit der Knochen-Entzündung nahe verwandte Störungen der Ernährung hervorruft. Bei Weitem häufiger sind die Fälle, in denen es zu erheblichen und anatomisch erwiesenen Veränderungen der Structur nicht kommt, die Angaben der kleinen Patienten jedoch, welche, zumal nach einiger Anstrengung, über lebhafte Schmerzen in der Gegend dicht oberhalb und dicht unterhalb der Gelenke (namentlich am Kniegelenk) klagen, eine andere Deutung, als dass es sich um ein entzündliches Leiden der Epiphysenknorpel (Osteochondritis) handele, kaum zulassen. Endlich giebt es aber auch eine Reihe von Fällen, in denen das Auftreten der Entzündung an diesen Stellen mit den, durch die anatomischen Verhältnisse des wachsenden Knochens bedingten Eigenthümlichkeiten und oft mit dem Ausgang in die verderblichsten Destructionen anatomisch erwiesen ist. Ob in diesen Fällen primär stets das in der Verknöcherung begriffene Gebiet der Epiphysenlinie erkrankte, wie Wernher annimmt, oder ob die an dieser Stelle auftretenden Zerstörungen (namentlich die Lösung der Epiphyse von der Diaphyse) regelmässig nur Folgen einer vorausgegangenen Osteomyelitis oder einer Entzündung des ganzen Knochens in allen seinen Theilen, also einer Panostitis, seien, oder ob endlich sowohl Fälle von primärer Osteochondritis vorkommen, welche sich auf das Knochenmark fortsetzen, als auch Fälle von

¹⁾ Vgl. Chassaignac, Sur les abcès souspériostiques aigus, Mém. de la société de chirurgie, T. IV.; Gosselin, Sur les ostéites épiphysaires des adolescents (kommt aber auch bei Kindern vor), Archiv. générales de méd. 1858; Klose, Ueber Epiphysentrennung (Meningo-osteophlebitis), Prag. Vierteljahrsschrift 1859; Wernher, Handbuch der Chirurgie, 2te Aufl. Bd. I. pag. 751 u. f.; ferner: G. Frank, Ueber entzündliche Epiphysentrennung, Inaugural-Dissertation (unter Wernher's Leitung), Giessen 1860; G. Fischer, Mittheilungen aus der chirurgischen Universitäts-Klinik zu Göttingen. Hannover 1861. pag. 82 u. f.; Lücke, die primäre infectiöse Knochenmark- und Knochenhaut-Entzündung, Deutsche Ztschrft. f. Chirurgie, Bd. IV. pag. 218 u. f. — Vgl. Osteomyelitis, pag. 526.

ursprünglicher Entzündung der Diaphyse, namentlich Osteomyelitis mit Uebergreifen der Zerstörungen auf die Epiphysenlinie (wie ich, nach eigenen Beobachtungen annehmen muss), — darüber ist noch nicht mit Sicherheit entschieden.

Jedenfalls giebt die acute Knochen-Entzündung vor Vollendung des Wachsthums ein durch das Vorherrschen der Fiebererscheinungen besonders ausgezeichnetes Bild, welches, wie es mit dem für die acute Osteomyelitis entworfenen übereinstimmt, so auch zu dem dort bereits erwähnten Namen *Typhus des membres* Veranlassung gegeben hat. Mit Recht deutet Lücke diese Form der Knochen-Entzündung als eine Infectionskrankheit, da sie von Anfang an mit den sonst nur solchen Erkrankungen eigenthümlichen Erscheinungen eines schweren Allgemeinleidens auftritt.

Auf diese malignen Fälle von Knochen-Entzündung jugendlicher Individuen bezieht sich wesentlich unsere nachstehende Beschreibung, da die leichteren und namentlich die chronischen Fälle einer solchen nicht bedürfen.

Sitz. Am Häufigsten ist diese Form der Entzündung wachsender Knochen am unteren Ende des Femur und am oberen Ende der Tibia beobachtet worden, demnächst am oberen Ende des Femur und am unteren Ende der Tibia, seltener an anderen Knochen, am Seltensten in der Gegend des Ellenbogengelenks, in einigen Fällen an mehreren Epiphysen gleichzeitig, wie ich selbst wiederholt gesehen habe.

Aetiologie. Die grösste Disposition findet sich in den Jahren, in welchen das Skelet am Stärksten wächst, namentlich also zur Zeit der ersten und zweiten Dentition und Pubertäts-Entwicklung. Mit Skrophulosis besteht kein Zusammenhang, vielleicht aber mit hereditärer Syphilis (Wegner). Anstrengungen und Erschütterungen sind als Gelegenheitsursachen nachgewiesen, Erkältungen, hier wie überall, als solche vermuthet. Alle ätiologischen Momente der Osteitis können zur Geltung kommen.

Die **anatomischen Veränderungen** beziehen sich theils auf den Epiphysenknorpel selbst, theils auf die umgebenden Theile. In den am frühesten untersuchten Fällen findet man den Epiphysenknorpel geröthet und schwammig aufgelockert. Ist die Krankheit weiter vorgeschritten (in ihr zweites Stadium), so ist der Knorpel von Eiter durchsetzt oder enthält einen Abscess, bald in seiner Mitte, bald nahe dem Periost (*abcès souspériostique aigu*, nach Chassaignac). Weiterhin findet man den Knorpel von den Knochenstücken, die er verbinden soll, und von dem ihn bedeckenden, meist vielfach vom Eiter durchbrochenen Periost gänzlich ab- und selbst mehr oder weniger aufgelöst. Die Knochenflächen der Epi- und der Diaphyse, welche

zunehmend in beweglicher Verbindung stehen, erscheinen rauh; die Zerstörung erstreckt sich soweit, als die Verkücherung nicht ging. Die Entzündung und die nachfolgende Nekrose erstrecken sich aber auch auf die bereits verkücherten Theile. Man findet sie geröthet, parös, von Eiter getränkt, von Abscessen durchsetzt. Letztere, vorzugsweise in den grösseren Gefässcanälen entwickelt, dringen einer Seits in die Markröhre, anderer Seits gegen die benachbarte Gelenkhöhle vor. Aus ihrem Durchbruch entsteht dann Osteomyelitis und eitrige Gelenk-Entzündung. Letztere findet sich aber auch in Fällen, wo ein solcher Durchbruch nicht erfolgt ist. Jedenfalls ist der Gelenkknorpel in allen höheren Graden des Uebels verflüssigt und seine Verbindung mit dem knöchernen Gelenk-Ende gelockert. In Fällen, welche mit Osteomyelitis und Periostitis der Diaphyse begonnen haben, ist der Befund derselbe, wie wir ihn bei diesen geschildert haben.

Symptome und Verlauf. In den mildesten Fällen (*Gosselin's ostéite épiphysaire chronique non suppurée*), treten bei jugendlichen Subjekten Schmerzen in der Gegend eines oder mehrerer Epiphysenknorpel auf, welche durch Druck auf diese Stelle und durch Anstrengungen der Extremität gesteigert werden, bei ruhigem Verhalten aber von selbst oder unter Anwendung von Kälte und Blutentziehungen wieder verschwinden, um nach einiger Zeit wiederzukehren, wieder zu verschwinden u. s. w.

In den schweren Fällen ist der Verlauf fast immer ein sehr acuter, wobei die Symptome des regelmässig mit einem Schüttelfrost beginnenden fieberhaften Allgemeinleidens in solchem Grade in den Vordergrund treten, dass man einen Typhus vor sich zu haben glaubt¹⁾. Allerdings ist aber das erste und auch im weiteren Verlaufe das vorwiegende örtliche Symptom, der sehr heftige Schmerz in der Nähe eines Gelenkes, der oft schon durch leichten Druck, jedenfalls aber durch Erschütterungen und active Bewegungen in solchem Grade gesteigert wird, dass der Kranke letztere gänzlich vermeidet. Dass die Krankheit nicht vom Gelenke selbst ausgeht, wird dadurch erwiesen, dass Druck auf das Gelenk und passive Bewegungen desselben, wenn nur jede Erschütterung des Knochens vermieden wird, keine Vermehrung des Schmerzes bedingen. In der Umgebung des erkrankten Knochens entsteht Oedem (meist erst nach

¹⁾ In allen zu meiner Kenntniss gekommenen (mehr als 20) Fällen war die Krankheit von den zuerst hinzugerufenen Aerzten (darunter medicinische Autoritäten) für Typhus oder acuten Gelenkrheumatismus gehalten worden. — Zu dem Fieber stellt sich, wie auch sonst, oft Darmkatarrh, in Folge dessen dann Diarrhoe auftreten können, die ich nicht für charakteristisch halten möchte.

einigen Tagen); die bedeckende Haut wird über oberflächlich liegenden Epiphysen frühzeitig geröthet (analog dem Pseudoerysipelas bei Ostitis), über tief liegenden Epiphysen bleibt ihre Farbe unverändert, woraus Klose mit Unrecht eine „charakteristische graue, erdfahle Färbung“ gemacht hat.

Der Beginn des zweiten Stadiums wird durch den Eintritt der Eiterung bezeichnet. An der erkrankten Stelle kann, wenn sie oberflächlich liegt, oft nur unter den heftigsten Schmerzen (weshalb denn auch Chloroform zu benutzen), Fluctuation gefühlt und durch die eingeführte Acupunctur-Nadel der raue Knochen und die Ablösung des Periostes erkannt werden. Ein Einschnitt entleert unverhältnissmässig viel Eiter, von meist noch guter Beschaffenheit. Die eingeführte Sonde vermag oft schon zwischen Epi- und Diaphyse einzudringen. Dass die Verbindung zwischen beiden gelöst oder doch gelockert sei, kann zu dieser Zeit meist auch schon durch den Versuch passiver Bewegungen, welche aber gleichfalls sehr schmerzhaft sind, festgestellt werden. Aus der Beweglichkeit der Epiphyse und der deutlich erkannten Eiterung zwischen ihr und der Diaphyse darf man aber noch nicht schliessen, dass jene der Nekrose verfallen sei. Die auf den normalen anatomischen Verhältnissen beruhende Rauigkeit der mit der Nadel oder Sonde zu fühlenden Knochenflächen kann leicht zu der Ansicht verleiten, man habe es mit nekrotischen Knochenstücken zu thun. Wenn die Epiphyse mit den übrigen Knochen durch das Periost noch hinreichend in Verbindung erhalten wird, und die Krankheit sich nicht weiter ausbreitet; so kann, nach langwieriger Eiterung, oft erst nach mehrfachen Recidiven desselben Processes an anderen Epiphysen (zuweilen sogar an derselben), Verwachsung erfolgen, analog der Heilung eines Knochenbruchs, meist mit Difformität. Wo das Periost ganz fehlt, wie an den oberen Epiphysen des Humerus und des Femur, da ist solche Heilung unmöglich. Solche Epiphysen sind der Nekrose verfallen und erregen eitrige Gelenk-Entzündung, die noch vor ihrem Aufbruch zur Auflösung der abgetrennten Epiphyse führen kann. Auf solche Weise sind wohl die Fälle zu erklären, in denen man in vereiterten Hüft- und Schultergelenken den Gelenkkopf ab- oder gar aufgelöst fand¹⁾.

In der Mehrzahl der schweren Fälle scheint sich die Entzündung

¹⁾ Letzteres habe ich selbst am Hüftgelenk eines einjährigen Kindes beobachtet, bei dem ich, der unverkennbaren Gelenk-Eiterung wegen, die Resection machen wollte, mich aber, da kein Gelenkkopf mehr da war, mit dem Einschnitt begnügen konnte, durch den eine kolossale Eitermasse entleert und die vollständige Genesung herbeigeführt wurde (1863). Vgl. Greifswalder medic. Beiträge, Bd. II. pag. 80.

in verderblicher Weise sehr schnell auf die benachbarten Diaphysen zu verbreiten, — oder letztere von Anfang an bald mehr im Bereich des Marks, bald vorwiegend des Periosts¹⁾ zu befallen. Der unter dem Periost angesammelte Eiter umspült den Knochen, bedingt weitere Ablösung der Knochenhaut und dadurch Nekrose (vgl. VII.). Unter verstärktem Fieber steigert und verbreitet sich in solchen Fällen die Anschwellung. Besteht noch keine Oeffnung nach Aussen, so erfolgt nun der Aufbruch und meist bald Verjauchung und Tod. Diesen sah man frühestens am sechsten Tage, meist erst viel später eintreten. In den schnell tödtlichen Fällen scheint Fettembolie der Lungengefäße (durch Aufnahme von Fett aus dem zerstörten Knochenmark in die Knochenvenen bedingt) die gewöhnlichste Todesursache zu sein²⁾.

Sehr häufig findet sich im zweiten Stadium Eiterung im benachbarten Gelenk. Diese kann 1) aus einer einfachen Verbreitung der Entzündung auf das Gelenk hervorgehen, 2) aus der Nekrose einer gänzlich abgelösten intracapsulären Epiphyse, 3) aus dem Eindringen des Eiters in das Gelenk, welcher in Folge eines Durchbruchs (meist auf dem Wege einer mit verjauchten Thromben erfüllten Knochenvene, Klose), bald unabhängig von dem Aufbruch nach Aussen, bald auch mit diesem zugleich, — so dass dann indirect auch das Gelenk nach Aussen communicirt, — erfolgen kann.

Häufig treten, bevor noch an der primären Stelle des Leidens der Aufbruch erfolgt oder das benachbarte Gelenk in Mitleidenschaft gezogen ist, meist also in der ersten Woche der Krankheit, secundäre Erkrankungen auf, bald als Periostitis an einem weit entfernten Knochen (wie ich z. B. sah, am rechten Fuss, bei primärer Erkrankung der linken Tibia u. dgl. m.), oder an oder in einem Gelenk, aber auch im Herzbeutel, Brustfell, in den Lungen, Nieren u. s. f. in Form von Eiterergüssen. Abgesehen von der aus der Dignität des Organs entspringenden Gefahr, verlaufen diese meist relativ günstig.

Die **Prognose** ergibt sich hiernach als dubia ad malam vergens, muss aber im einzelnen Falle nach der Heftigkeit und Ausdehnung der localen, so wie vorzüglich nach der Intensität der allgemeinen Erscheinungen speciell festgestellt werden.

Die **Behandlung** muss im Beginne des Uebels darauf ausgehen, den Uebergang in Eiterung zu verhüten durch absolute Ruhe, Eis, auch wohl topische Blutziehungen (wie bei einer acuten Gelenkentzündung). Tritt die Krankheit dennoch in ihr zweites Stadium,

¹⁾ Vgl. Periostitis maligna, pag. 524.

²⁾ Vgl. Lücke, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. IV. pag. 228.

so ist bis auf den Knochen zu incidiren, wie bei Periostitis. Erfolgt trotzdem die Ablösung der Epiphyse und der Durchbruch in's Gelenk, so ist die Resection angezeigt (vgl. Krankh. der Gelenke). Für die Amputation dürfte sich, wenn sie nicht der Resection substituirt wird, nur selten ein Grund finden, da bei einmal eingetretener Verjauchung der Weichtheile, durch welche die Ausführung der Resection unzulässig werden würde, auch die purulente Infection nicht fehlen wird, der man durch die Amputation nicht Halt zu gebieten vermag (Wernher). Erfolgt Totalnekrose der Diaphyse und erscheint die Extraction (Exstirpation) derselben oder des ganzen Knochens, wegen des schlechten Kräftezustandes oder wegen der Eiterung in dem benachbarten Gelenk oder in den umgebenden Weichtheilen, unzulässig; so ist die Amputation indicirt, wenn der Kräftezustand des Kranken überhaupt noch Aussicht auf Erhaltung des Lebens giebt¹⁾. Solche Fälle hat auch wohl Chassaignac im Sinne, wenn er die Amputation ganz allgemein empfiehlt.

Gelingt es durch frühzeitige Einschnitte das Uebel aufzuhalten, so ist, um Recidive zu verhüten und das Wiederanheilen der Epiphyse zu ermöglichen, eine höchst sorgfältige Nachbehandlung erforderlich. Zur Sicherung der durchaus nöthigen absoluten Ruhe eignen sich besonders gefensterete Gypsverbände, mit denen Bäder und Irrigationen, vor Allem aber antiseptische Verbände combinirt werden können. — Die innere Behandlung muss eine roborirende sein.

V. Knochenabscess.

In seltenen Fällen kommt es zu wahrer Abscessbildung inmitten der Knochensubstanz²⁾. Der Knochenabscess wurde meist in den Diaphysen der Röhrenknochen und vorzugsweise in den Knochen der unteren Extremität beobachtet³⁾. Das Leiden kommt gewöhnlich erst zur Behandlung, nachdem bereits Durchbruchcanäle nach Aussen,

¹⁾ Ich sah von der Amputation des Oberschenkels bei Erkrankung der Tibia mit eitriger Füllung und Aufbruch des Kniegelenks wiederholt die besten Erfolge.

²⁾ Vgl. Brodie, Lectures on pathology and surgery (1846), Klose in Günzburg's Zeitschrift für klinische Medicin, II. 5.

³⁾ Meine eigenen Erfahrungen beziehen sich nur auf 2 Abscesse im unteren Ende der Diaphyse der Tibia, 3 in deren oberem Ende, 1 im unteren Ende der Diaphyse des Femur und 1 im unteren Ende des Radius, alle bei jugendlichen Subjecten, jedoch jenseit der Jahre der Pubertätsentwicklung. Ich rechne Fälle, in denen eine granulirende Knochenhöhle noch nekrotische Knochenstücke (Sequester) enthält, oder nach deren Entfernung persistirt, nicht hierher (wie Manche thun), sondern zur Nekrose.

Knochenfisteln, „Kloaken“ (vgl. Nekrose), entstanden sind. Der Abscessbildung im Knochen gehen, Jahre lang, remittirende Schmerzen vorher, die zuletzt unerträglich werden und den Gebrauch des Gliedes gänzlich verhindern. Gleichzeitig schwillt der kranke Knochen an, er wird, nach Klose, „osteoporotisch aufgetrieben und zwar meistens in jener Richtung hin, wo er durch anliegende Weichtheile am Wenigsten an dieser Auftreibung behindert wird.“ Nach Wernher¹⁾ bildet sich allmählig am kranken Knochen eine Geschwulst aus, die Anfangs gegen Druck unempfindlich ist, später aber auch nicht die leiseste Berührung erträgt und oft über ein Dritttheil der ganzen Länge des Knochens einnimmt. Die entzündliche Schwellung der Weichtheile geht, nach Klose, nie zur Eiterbildung über, sondern führt zu einer Verwachsung der Fascien und der Haut mit dem Knochen, während, nach Wernher, das aufgelockerte und verdickte Periost des kranken Knochens mit der Steigerung der Schmerzen öfter durch kleine, mit der grösseren Eiterhöhle nicht communicirende Abscesse abgehoben wird. Was die Beschaffenheit der den Abscess umgebenden knöchernen Theile betrifft, so fanden Rokitansky und Wernher zunächst dem Abscesse immer Verdichtung und Elfenbeinhärte des Knochens, sahen ihn sogar mit einer deutlich unterscheidbaren, sehr festen Periostose bedeckt, während Klose Erweichung der Knochensubstanz nach Aussen und nach Innen hin beobachtete.

Diese Verschiedenheit der Angaben hat darin ihren Grund, dass die Beschreibungen aus verschiedenen Perioden desselben Processes gegeben sind. Klose's Auseinandersetzung lässt deutlich die noch im Fortschreiten begriffene Entzündung des Knochens erkennen, während die Angaben von Rokitansky und Wernher sich auf den abgelaufenen Process, die Sklerose, beziehen.

Klose fand daher auch, dass sowohl die äusseren wie die inneren Lamellen des kranken Knochens sich erweichen und verdünnen, so dass sie oft kaum die Dicke eines Kartenblattes und dabei eine auffallende Nachgiebigkeit und Weichheit zeigten. Sticht man mit einer Explorativnadel in die Weichtheile und in den Knochen ein, so lässt sich, nach Klose, der letztere leicht durchstossen; man kann mit der Nadelspitze kleine Kreisbewegungen im Knochen vornehmen und stösst dabei hin und wieder auf einzelne harte Stellen, die Nadel bewegt sich in den „erweiterten Zellen der Diploë, die mit einem Exsudat gefüllt sind, welches später in Eiterung übergeht.“

Wie bei der Abscessbildung in Weichtheilen, scheinen auch hier Anfangs kleine disseminirte Eiterherde sich zu entwickeln, welche schliesslich zu einem einzigen grossen Abscess zusammenfliessen, der die Grösse eines Eies erreichen kann. — Die innerste Lamelle der

¹⁾ Handbuch der Chirurgie, Bd. I. pag. 863, in der 2ten Aufl. pag. 747 u. f.

corticalen Substanz wird nach der Markhöhle entweder nur vorge-
drängt, so dass letztere fast gänzlich vernichtet werden kann, oder sie
wird an mehreren Stellen durchbrochen, und die Eiterung setzt sich
nach dem Markgewebe fort, in welchem Falle dann die Markhöhle
mit dem Knochenabscess communicirt. Auf dieselbe Weise kommt
auch der Durchbruch nach Aussen zu Stande, weniger gewiss auf
Grund „der corrodirenden Eigenschaften des Eiters“ (Klose), als
vielmehr durch eine fortschreitende Entzündung. Ist der Durchbruch
nach Aussen erfolgt, so werden die Wandungen der Abscesshöhle
von einer glatten Abscessmembran ausgekleidet, welche sehr reich an
neuen Gefässen ist. — Bisweilen erstreckt sich die Eiterhöhle bis zu
den Epiphysen hin fort, die dann erweicht und aufgetrieben sind.
Es kann sogar Durchbruch in das angrenzende Gelenk erfolgen.

Die objectiven Symptome des Knochenabscesses lassen sich
also, wie folgt, zusammenfassen. Der kranke Knochen ist unförmig
aufgetrieben, hat eine unebene Oberfläche, die mit der gespannten,
oft sogar glänzenden Haut und mit den darunter liegenden Weich-
theilen fest zusammenhängt. Mit einer Explorativnadel kann man an
einzelnen Stellen bis zu einer ziemlichen Tiefe in den Knochen ein-
dringen. Die Sonde lässt die Wände der schon bestehenden Fistel-
gänge rauh fühlen, in der Tiefe gelangt sie zu einem weiten Raume,
ohne auf einen harten oder rauhen Körper (Sequester) zu stossen.
Die an der Spitze umgebogene Sonde kann weit nach Oben und
Unten vorgeschoben, auch wohl gedreht werden.

Klose sah die Knochenabscesse nur nach Bildung der Fistel-
gänge, aber keinen Knochenabscess ohne Fistelgänge, was um so
auffällender ist, als Wernher ausdrücklich erwähnt, dass es der
Natur allein, wegen der fortschreitenden Verdickung und Verknöche-
rung des Periost, selten zu gelingen scheine, solche Abscesse zu
öffnen. Die Krankheit macht, wie Wernher bereits angegeben hat
und ich völlig bestätigen kann, lange (bis zu mehreren Jahren aus-
gedehnte) Perioden des Stillstandes und des Nachlasses, bis unter
erneuten bohrenden, klopfenden Schmerzen die Geschwulst wieder
zunimmt, Schlaf und Appetit gestört und die Kräfte bis zur augen-
scheinlichen Lebensgefahr erschöpft werden; sie endet daher tödtlich
oder zieht den Verlust des Gliedes nach sich, wenn die Kunst nicht
durch Perforation der Abscesswandungen zu Hülfe kommt¹⁾. Nach
Klose dagegen beruht die Lebensgefahr besonders in der nie ver-

¹⁾ In einem der von mir behandelten Fälle bestand das Leiden schon 10, in einem
anderen 14 Jahre. Ausgiebige Eröffnung der Abscesshöhle führte zur vollstän-
digen Heilung.

siegenden Eiterung der Abscesswandung selbst und der Fistelgänge. Für Wernher beruht die Hülfe in der Eröffnung des Abscesses, für Klose in der Ausbohrung der Fistelgänge mit Schonung der Abscesswandungen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Fälle der einen, wie der anderen Art vorkommen.

Jedenfalls erfordert der Knochenabscess eine operative Behandlung sowohl vor als nach der Bildung von Fistelgängen. Die Eiterhöhle muss, sobald sie sicher erkannt ist, geöffnet werden. Ist der Abscess bereits nach Aussen durchbrochen und haben sich Fistelgänge gebildet, so muss man diese hinlänglich erweitern, um bessere, zur Vernarbung geeignete Granulationen zu erzielen¹⁾. Die Abscesshöhle selbst, welche glatt, und nicht wie die Fistelgänge mit rauhen Knochenvorsprüngen und Leisten ausgekleidet ist, muss man hierbei sorgfältig vor Verletzung schützen. Dann wird die Wunde gereinigt, mit einem antiseptischen Verbandsverband versehen und der kranke Theil, wenn die Schmerzen heftig sind, in Eis gehüllt. Neue Granulationen verschliessen allmählig die Fistelgänge sowohl wie die Abscesshöhle, deren gefäss- und fettreiche, schlaaffe Granulationen sich inzwischen meist losgestossen haben. — Oft treten noch nach einiger Zeit hie und da kleine Abscesse in den Weichtheilen oder zwischen Periost und Knochen auf, die bisweilen in einer Verletzung des Periost, der Sehnen oder Fascien durch die angewandten Instrumente ihren Grund haben; man soll daher den äusseren Umfang der Fistelöffnung recht sorgfältig und glatt entblößen. — Bedenkliche Zufälle scheinen nach der Operation niemals einzutreten; vielmehr erholt sich der heruntergekommene Kranke, wie auch ich stets sah, sehr bald.

VI. Knochenfrass, Knochenverschwärung. Caries.

Wir bezeichnen als Caries die Verschwärung der Knochen, also einen fortschreitenden (um sich fressenden), destructiven Process, dessen Wesen in ausgeprägten Fällen von der Nekrose sich dadurch unterscheidet, dass ein Absterben grösserer, deutlich erkennbarer Knochenstücke nicht, wohl aber ein sogenannter moleculärer Zerfall stetig dabei stattfindet. Manche Autoren werfen Caries und Knochen-Entzündung zusammen, andere verstehen darunter jede Knochen-Eiterung, noch andere eine besondere Art des Knochenbrandes (M. A. Severinus). Bei der Beschreibung der Verschwärung im Allgemeinen (Bd. I.) haben wir darauf hingewiesen, dass zwischen

¹⁾ In Betreff der zur Operation der Knochenabscesses zu verwendenden Instrumente und Verfahrensweisen vgl. „Nekrose“ pag. 556 u. f.

Brand und Verschwärung überhaupt eine innige Verwandtschaft besteht. Gewöhnlich findet sich auch Caries und Nekrose zugleich (*Caries necrotica*), und die Benennung geschieht in dem einzelnen Falle nur nach dem vorherrschenden Krankheitsprocess.

Anatomische Veränderungen. Der cariöse Knochen erscheint auf dem Durchschnitt stärker geröthet, blutreicher, weicher und brüchiger, in Folge der bis zum höchsten Grade entwickelten Porosität (*Rarefaction*), welche mit der Wucherung der Gefässe und des Markgewebes gleichen Schritt hält; er zeigt alle bei *Ostitis* beschriebenen Veränderungen auf's Aeusserste gesteigert. Oft ist er von Eiter und Jauche durchweg getränkt, oder aber von grösseren Höhlen (*Cavernen*) durchsetzt. Solche Verschwärungsherde im Innern des Knochens, sogenannte *Caries centralis* (Fig. 71), sind von vielen Seiten als tuberculöse *Cavernen* gedeutet worden, was aber, wie wir bei den Knochentuberkeln sehen werden, nur selten zutrifft. *Caries centralis* ist nicht mit *Caries occulta* identisch. Letzteren Namen führt die Knochenverschwärung, so lange kein Durchbruch nach Aussen erfolgt ist, während sie nach dem Aufbruch als *Caries aperta* s. *manifesta* bezeichnet wird. In der Umgebung der cariösen Stelle findet man den Knochen weithin entzündet, d. h. in hohem Grade porös und meist auch im Umkreise mit Periostauflagerungen (*Osteophyten*) besetzt. Dies ist in Betreff der etwa vorzunehmenden Operationen von Bedeutung.

Fig. 71.



R. Volkmann (l. c. pag. 312 u. f.) unterscheidet 3 Formen der Caries: 1) *Einaches Knochengeschwür*, ulceröse Usur der Knochen, an den des Knorpelüberzuges beraubten, gegen einander gepressten Gelenk-Enden in entzündeten Gelenken (vgl. Gelenk-Entzündung), 2) *malacische oder fungöse Caries*, die gewöhnliche, sonst schlechtweg als „Knochenfrass“ bezeichnete Form, 3) *skrophulöse und tuberculöse Caries*, welche der eben erwähnten *Caries centralis* mit Cavernenbildung entspricht.

Symptome. Ueber dem cariösen Knochen erhebt sich, sofern er nicht allzu tief liegt, nachdem Erscheinungen der Knochen-Entzündung vorhergegangen sind, eine diffuse, harte Geschwulst, von normal gefärbter Haut bedeckt. Allmählig wächst die Geschwulst, die umgebenden Weichtheile scheinen ohne scharfe Grenze in sie überzugehen. An einem Punkte aber verliert sich ihre Härte, es tritt endlich an

dieser Stelle Fluctuation auf. Nun röthet sich die Haut, sie wird durch den von der Tiefe her fortschreitenden Verschwärungsprocess schliesslich durchbrochen, worauf dünner, mit einzelnen Flocken gemischter Eiter ausfliesst, welcher einen faden, widerlichen, dem faulenden Fleisch oder ranzigem Speck ähnlichen Geruch verbreitet. Fast immer folgen bald, unter ähnlichen Vorgängen, in der Umgebung noch mehrere Durchbrüche. Die auf solche Weise entstandenen Geschwüre sind sinuös, die Fleischwärtchen, welche sich in ihnen vorfinden, lassen bei der geringsten Berührung missfarbiges Blut austreten. Liegt der cariöse Knochen tief oder von festen Fascien überzogen, so kann es sehr lange dauern, bis der Ausbruch erfolgt, und die Zerstörung des Knochens unter unscheinbaren Symptomen einen sehr hohen Grad erreichen. Schliesslich stellt dann jedes zu einem tiefliegenden Knochen führende Geschwür einen Fistelgang dar, durch welchen die Sonde, der Windungen wegen, nicht immer den kranken Knochen zu erreichen vermag. Gelingt dies, so fühlt man ihn bald rauh, brüchig, so dass er bei der Untersuchung mit der Sonde die Empfindung des Krachens veranlasst, bald weich wie Butter (*Caries carnea*). Bei jeder Berührung blutet er, das aus ihm hervorgehende Blut ist auffallend hellroth. Kann man nicht direct zu dem cariösen Knochen gelangen, so leitet die Beschaffenheit und unverhältnissmässig grosse Menge des Eiters, bei gleichzeitiger Schmerzhaftigkeit einer bestimmten Knochenstelle, zur Annahme des Caries. Das Aussehen des kranken Knochens, von welchem freilich nur ausnahmsweise die Rede sein kann, ist dunkelbraun, fleischig, oft wie mit speckigen Granulationen besetzt. Das eitrige Secret des kranken Knochens, die cariöse Jauche, ist dünn, wässerig, stinkend, ätzend durch ihren Ammoniakgehalt, oft durch Blut und zersetzte Substanzen gefärbt, oft auch, besonders wenn die Caries bis in die Markhöhle eines Knochens vorgedrungen ist, sehr fetthaltig. Sie theilt mit allem schlechten Eiter, sowie mit allen in Zersetzung begriffenen eiweisshaltigen Substanzen die Eigenschaft, silberne Instrumente, Bleipflaster u. dgl. m. schwarz zu färben. Zuweilen sind ihr kleine Knochenstückchen beigemischt (*Caries necrotica*); in vielen Fällen sind diese so klein, dass sie erst durch mikroskopische oder chemische Untersuchung erkannt werden können. Einen stärkeren Kalkgehalt als gewöhnlicher Eiter besitzt die cariöse Jauche stets. Der häufig in Form von Flocken beigemischte „käsige eingedickte Eiter“ wurde früher auch wohl als „Tuberkelmaterie“ gedeutet und aus seiner Anwesenheit irrthümlich geschlossen, dass die Caries durch Erweichung von Tuberkeln veranlasst sei.

Oft gelangt der von einem cariösen Knochen herrührende Eiter nicht auf dem kürzesten Wege, sondern auf einer, durch den Verlauf von Sehnenhäuten, Muskeln, Gefässen etc. ihm vorgezeichneten Strasse zur Körperoberfläche, mithin an einer, von dem eigentlichen Sitze der Krankheit weit entfernten Stelle. Hier sammelt er sich dann allmählig unter der Haut in verhältnissmässig grosser Menge an, um endlich in der bereits erwähnten Weise die Haut zu durchbrechen. Einen Abscess der Art nennt man, wie bereits früher erwähnt, *Senkungs-Abscess*, *Congestions-Abscess*, *Abscessus congestivus*. Derselbe stellt eine langsam wachsende, fluctuirende Geschwulst dar, über welcher die Haut Anfangs unverändert ist und in welcher, da der cariöse Knochen weit davon entfernt liegt, keine Schmerzen empfunden werden. Mit dem Beginne der Verschwärung der Haut tritt auch eine umschriebene Röthung und eine beträchtliche Schmerzhaftigkeit des Senkungs-Abscesses selbst auf. Nachdem der Durchbruch erfolgt ist, stellen sich gewöhnlich *colliquative* Erscheinungen und das sogenannte hektische Fieber ein.

Immer ist der **Verlauf** der Caries ein sehr langwieriger und ihr Einfluss auf das Allgemeinbefinden, abgesehen von den der Caries oft zu Grunde liegenden Dyskrasien, schon wegen des erheblichen Säfteverlustes und der Aufnahme jauchigen Eiterserums in's Blut, selbst bei geringer Ausdehnung des Uebels, ein sehr nachtheiliger, oft lebensgefährlicher, wie wir dies bei den Folgen der Eiterung Bd. I. p. 245 u. f. geschildert haben.

Die **Diagnose** der Caries hat nur dann Schwierigkeiten, wenn man weder mit dem Finger, noch mit der Sonde zu dem cariösen Knochen gelangen kann. Alsdann hat man besonders zu beachten: 1) einen fixen Schmerz in einem zur Entwicklung der Caries seiner Structur nach geneigten, also vorwiegend spongiösen Knochen, 2) die Entstehung eines *Congestions-Abscesses*, 3) die oben erwähnte Beschaffenheit des Eiters, sofern solcher bereits ausfliesst, 4) das Bestehen eines der oben erörterten ätiologischen Momente der Caries, 5) zuweilen eine *Difformität* des leidenden Knochens. (In Betreff der Unterscheidung von Nekrose vgl. pag. 554.)

Die **Heilung** der Caries kann ohne alles Zuthun der Kunst, aber immer nur sehr langsam, erfolgen. Dies geschieht insbesondere nicht selten um die Zeit der Pubertät, wenn die Caries im kindlichen Alter entstanden ist. Der Eiter wird dann allmählig besser, die geschwürige Knochenoberfläche bedeckt sich mit guten Granulationen, die Kräfte des Kranken nehmen wieder zu, und die Geschwürsöffnungen werden endlich durch weissliche, an den Knochen festgeheftete Narben ver-

geschlossen. Manchmal findet hierbei eine Volumen-Verminderung an dem kranken Knochen Statt, indem das vorher durch Entzündung porös gewordene Gewebe desselben unter Ablagerung von Kalksalzen sich verdichtet (Eburneatio, Sclerosis). In anderen Fällen dagegen bleibt das Volumen des cariösen Knochen nach der Heilung normal, oder wird sogar vermehrt, indem auf der granulirenden Knochenfläche noch Neubildung von Knochensubstanz Statt findet. Das ganze cariöse Knochenstück kann aber auch brandig werden, worauf dann in der Umgegend eine Demarcations-Entzündung sich entwickelt, durch welche das todte Knochenstück abgestossen wird, wie wir dies bei der Nekrose ausführlicher zu schildern haben.

Die **Aetiologie** der Caries fällt mit derjenigen der Ostitis im Allgemeinen zusammen. Alle Theile des Skelets können von Caries ergriffen werden; Lobstein erwähnt sogar eines Falles, in welchem sich wirklich alle Knochen eines Skelets zugleich cariös fanden. Jedoch ist sie in spongiösen Knochen häufiger. Verletzungen der Knochen können allerdings zur Erzeugung der Knochenverschwörung etwas beitragen, namentlich, wenn sie wiederholt oder andauernd dieselbe Stelle treffen (vgl. Bd. I. pag. 327). Jedoch ist dies, abgesehen von der ulcerösen Usur der Gelenk-Enden, welche aus dem fortwährenden Drucke zu erklären ist, bei sonst gesunden Individuen ein seltener Fall. Von der grössten Bedeutung dagegen sind für die Aetiologie des Knochenfrasses die Dyskrasien und Diathesen, besonders Scropheln¹⁾ und Syphilis²⁾. — In vielen Fällen geht die Verschwörung von benachbarten Weichtheilen auf den Knochen über.

Behandlung. In der grossen Mehrzahl der Fälle haben wir eine *Indicatio causalis* zu erfüllen: die bestehende Dyskrasie zu beseitigen. In dieser Beziehung handelt es sich vorzugsweise um eine anti-scrophulöse oder antisiphilitische Kur. Ohne auf die gegen jede dieser Dyskrasien einzuschlagende Behandlung genauer eingehen zu wollen, müssen wir doch hervorheben, dass man gegen die scrophulöse

1) Die scrophulöse Caries ist gewöhnlich eine centrale und kommt vorzugsweise an den Knochen der Hand- und Fusswurzel, an den Gelenk-Enden und an den kleinen Röhrenknochen des Metacarpus und der Phalangen bei Kindern und jugendlichen Subjecten zur Entwicklung. An den Phalangen wird sie auch als *Paedarthrocace* oder als *Spina ventosa* bezeichnet.

2) Die siphilitische Caries tritt fast immer als *Caries necrotica* auf und bevorzugt keineswegs die spongiösen Knochen; sie findet sich namentlich an den Schädelknochen, den Nasenbeinen, den Gaumenbeinen und den Gaumenfortsätzen des Oberkiefers, den Muscheln, der Tibia (dem eigentlichen Schienbein) u. s. f. Meist tritt sie in circumscribten Herden auf mit beträchtlicher Sklerose sowohl des Knochens als des Bindegewebes in der Umgebung der cariösen Stelle.

aries am Wenigsten durch Arzneimittel vermag, während bei guter Ernährung durch den Entwicklungsgang des Körpers selbst, so lange der Kranke die Jahre der Pubertät noch nicht überschritten hat, Heilung, wenn auch langsam, erfolgen kann.

Die örtliche Behandlung beschränkt sich entweder darauf, durch Blutentziehungen, Ableitungen (Haarseil, Fontanellen), erweiternde Umschläge und Bäder die Entzündung zu mässigen, durch aromatische (antiseptische) Salben und Einspritzungen die Eiterung zu verbessern¹⁾, durch Incisionen und Dilatationen für freien Abfluss des Eiters zu sorgen; oder sie will durch bedeutendere operative Eingriffe den cariösen Knochen gänzlich entfernen, was theils mit schneidenden Instrumenten (Säge u. s. f.), theils durch Glüheisen und Aetzmittel geschehen kann. Soll die Entfernung mit Instrumenten vorgenommen werden, so handelt es sich um Amputation, Resection, Trepanation. Durch die Anwendung des Glüheisens, der concentrirten Säuren und anderer Aetzmittel beabsichtigt man, den Ausgang der Caries in Nekrose herbeizuführen. Begreiflicher Weise wird, wegen der Localität des kranken Knochens, zuweilen eine eingreifende örtliche Behandlung überhaupt unmöglich, so z. B. bei Caries der Wirbel, wo man sich, abgesehen von der allgemeinen Behandlung und der richtigen Lage des Kranken, bloß auf topische Blutentziehungen und Blutleitungsmitel zu beschränken hat. Wo aber eine operative Beseitigung des cariösen Knochenstücks möglich und wegen der durch die Krankheit selbst bedingten Gefahren nützlich erscheint, rathet man im Allgemeinen dem Messer und der Säge vor den Aetzmitteln und dem Glüheisen den Vorzug gegeben werden. Besonders hervorzuheben sind schon hier die segensreichen Resectionen der cariösen Gelenk-Enden, auf welche wir bei den Gelenk-Krankheiten zurückkommen werden. Viel seltener und mit geringerer Aussicht auf dauernden Erfolg kann man sich (namentlich an den kurzen Knochen des Tarsus) darauf beschränken, bloß die cariöse oder doch poröse medullarsubstanz aus der noch unversehrten Corticalschicht mit Hohleiseln, scharfen Löffeln u. dgl. m. herauszuschälen. Sédillot, welcher dies Verfahren als „Aushöhlung der Knochen“ beschrieben

¹⁾ Eines besonderen Rufes erfreuen sich die Injectionen von Jodlösungen aller Art, von Opodeldoc und neuerdings diejenigen von Villate'scher Mischung, welche sich bei Thieren vielfach bewährt hat und namentlich von Notta gerühmt wird. Letztere ist jedoch ein gefährliches Mittel, wegen der in ihr freierwirdenden und in's Blut dringenden Essigsäure (O. Weber); die Zusammensetzung ist: Acet. plumbi 30, Zinc. sulf. 15, Acet. puri 200.

hat¹⁾, dehnt dasselbe auch auf die centrale Caries der Gelenk-Enden aus, indem er die bestehenden Knochenfisteln hinlänglich erweitert und mit dem scharfen Löffel die spongiöse Substanz, unter Zurücklassung der überknorpelten Rinde, ausschält.

Für die Senkungs-Abscesse empfahl man bisher im Allgemeinen eine expectative Behandlung. Wenn man die Ueberzeugung gewonnen hatte, dass die zu Grunde liegende Caries erloschen sei, so erschien ihre Eröffnung erst unbedenklich. Anderen Falls wollte man lieber den Aufbruch hinzuhalten suchen, da durch den offenen Abscess alsbald Luft bis zu den cariösen Knochen vordringe und dort den Krankheitsprocess in der Art steigere, dass bald, statt geruchlosen Eiters, übelriechende Jauche in grosser Menge ausfliesse, und die Kräfte des Kranken, dem entsprechend, schneller sinken. Bei strenger Durchführung der antiseptischen Methode können Senkungs-Abscesse, wie alle anderen Abscesse, unbedenklich geöffnet werden. Vgl. Bd. I. pag. 280.

VII. Knochenbrand. Necrosis²⁾.

Die Aetiologie des Knochenbrandes fällt beinahe ganz mit derjenigen des Brandes überhaupt (Bd. I. pag. 288 u. f.) zusammen. Vor Allem sind auch hier diejenigen Ursachen, welche den Knochen direct lebensunfähig machen (Zermalmung, Verbrennung) von solchen zu unterscheiden, die erst durch Vermittelung von Krankheitsprocessen, mithin indirect dies Resultat haben. Die zur Nekrose führenden Veranlassungen aber wirken ein: 1) auf das Periost, 2) auf das Mark, 3) auf die Knochensubstanz selbst, 4) auf alle diese Theile zugleich. Die Knochensubstanz erhält nur durch Vermittelung des Periostes und des Markes Nahrungsmaterial. Es bedarf manchmal

¹⁾ De l'évidement des os. 2. édit. Paris 1867.

²⁾ „Necrosis“ heisst eigentlich schlechtweg Ertödung, Absterben, Brand, und wird in diesem Sinne jetzt sehr allgemein gebraucht (vgl. Bd. I. pag. 287). Louis benannte zuerst den Knochenbrand mit diesem Namen, jedoch mit der Beschränkung, dass die ganze Dicke eines Röhrenknochens vom Brande ergriffen sein musste. Nach Chopart (de necrosi ossium, Paris, 1786) gehört zur Nekrose, dass der abgestorbene Knochen durch einen neugebildeten ersetzt werde. Will man nicht den Brand überhaupt als Necrosis bezeichnen, so fasst man, nach dem Vorgange von Weidmann (de necrosi ossium, Francofurti, 1793), den Begriff Nekrose so auf, dass Knochenbrand überhaupt darunter verstanden wird, gleichgültig in welcher Ausdehnung derselbe eintritt und ohne Rücksicht darauf, ob Wiederersatz des verloren gegangenen Knochenstücks Statt findet oder nicht. Wir werden bei der nachfolgenden Darstellung das Wort Nekrose in diesem Sinne gebrauchen.

nur der Verstopfung (Thrombose) einer Arteria nutricia¹⁾ oder der Ablösung des Periostes durch eine Erschütterung, einen Bluterguss, ein Exsudat, um in der entsprechenden Ausdehnung Knochenbrand hervorzurufen. — Jedoch ging man zu weit, wenn man annahm, dass an jedem von Periost entblössten Knochen auch nothwendig „Exfoliation“ erfolge, d. h. eine gewisse Schicht, ein Blatt desselben, absterbe und ausgestossen werde. Wo dieser Process des Absterbens und der Abstossung deutlich beobachtet werden kann, wo sich nachher wirklich ein Sequester aufweisen lässt, da spricht man von einer Exfoliatio sensibilis. Dieser wird eine Exfoliatio insensibilis entgegengesetzt, welche überall da Statt finden soll, wo ein Knochen von Periost entblösst wurde, ohne dass abgestorbene Knochenstückchen zum Vorschein kamen. Diese Exfoliatio insensibilis wurde und wird aber ungemein viel häufiger diagnosticirt, als sie wirklich besteht. Ausgehend von der irrthümlichen Annahme, dass der des Periostes beraubte Knochen immer absterben müsse, hat man ganz gewöhnlich eine Exfoliation vorausgesetzt, wo nur Knochen-Entzündung und die von dieser abhängige Osteoporose bestand²⁾. — Für die aus Entzündungen hervorgehenden Fälle von Nekrose ist die ganze Aetiologie der Knochen-Entzündung mit Einschluss der Periostitis und Osteomyelitis von Bedeutung. (Vgl. auch Knochen-Tuberkel). — Alle inneren oder allgemeinen Veranlassungen der Caries können auch Nekrose zur Folge haben.

Die Nekrose wird in allen Lebensaltern beobachtet, jedoch häufiger im jugendlichen. Alle Theile des Skelets können nekrotisch werden, vom Schenkelbein an bis zu den Gehörknöchelchen. Jedoch haben Prädispositionen dazu namentlich die breiten, platten Knochen und die compacte Knochensubstanz. Am Häufigsten zeigt sich die Nekrose an der äusseren Tafel der flachen Schädelknochen.

¹⁾ Dass embolische Verstopfung der Arteriae nutriciae zur Nekrose führen kann, ist erwiesen (vgl. Volkmann Archiv f. klin. Chirug. Bd. IV.), obwohl die darauf bezüglichen Experimente von Hartmann (Virchow's Archiv, Bd. VIII. pag. 114) nicht ganz beweisend sind.

²⁾ Tenon (Sur l'exfoliation des os. Recueil des mém. de l'Acad. d. scienc. 1758, 59,60) hat hierüber bereits entscheidende Versuche gemacht. Er legte bei einem Thiere einen Schädelknöchel bloss und liess ihn der Luft ausgesetzt. Ein dünnes Knochenblatt wurde schwarz, starb ab und ward am 30ten Tage ausgestossen. Ein anderes Knochenstück wurde blossgelegt, aber mit einem Kataplasma bedeckt. Es wurde nicht missfarbig, bedeckte sich am 10ten Tage mit einem dünnen Häutchen, und es folgte keine Exfoliation. Ähnliche Versuche sind von Cruveilhier gemacht worden, und habe ich selbst häufig Gelegenheit gehabt, diesen Vorgang am Menschen zu beobachten. Vgl. pag. 518 u. f.

Nach Bécclard¹⁾ wäre die Frequenz-Scala der Nekrose an den Extremitäten-Knochen folgende: Tibia, Femur, Humerus, Vorderarm-Knochen, Schlüsselbein, Fibula, Mittelfuss- und Mittelhand-Knochen. Dabei sind aber die ungemein häufigen Nekrosen der Phalangen (sogen. Panaritium, vgl. Bd. IV.), ganz übersehen. An allen Röhrenknochen wird die Diaphyse häufiger von Nekrose befallen, als die Epiphysen; jedoch ist es irrtümlich, mit Boyer zu behaupten, dass die Gelenk-Enden der Röhrenknochen niemals von Nekrose ergriffen würden²⁾. Eben so wenig lässt sich die Behauptung rechtfertigen, dass nur die Substantia compacta der Nekrose unterworfen sei; es giebt Beispiele genug von ausschliesslicher Nekrose der Substantia spongiosa, und die Fälle von gleichzeitigem Absterben der compacten und spongiösen Substanz gehören zu den häufigen. — Gleichzeitige oder successiv eintretende Nekrose mehrerer Knochen beruht oft (jedoch nicht immer) auf dyskrasischen Verhältnissen; mehrfache (disseminirte) Nekrose an einem und demselben Knochen hat ihren Grund meist in vorausgegangener Erschütterung desselben.

Verlauf und Heilungsprocess Das nekrotische Knochenstück erregt als fremder Körper Entzündung in seiner Umgebung, wenn diese auch bis dahin noch nicht bestanden hat. Das Product dieser Entzündung ist theils Eiterung, theils Knochen-Neubildung. Durch die Eiterung (Verschwärung) wird das todte Knochenstück, welches die Form und Festigkeit des lebenden Knochens behält, aus seinen Umgebungen gelöst; durch die Neubildung von Knochensubstanz wird der Verlust mehr oder weniger vollständig ersetzt³⁾. Man bezeichnet das abgestorbene Knochenstück als Sequester, die Lösung desselben als Ausstossung oder Abstossung (Eliminatio, Exfoliatio).

Die Lösung des Sequesters erfolgt, wie die Trennung eines jeden Brandschorfes, durch Demarcations-Entzündung (vgl. Bd. I. p. 297 u. f.); der Sequester aber unterscheidet sich von einer gewöhnlichen Eschara dadurch, dass er nicht der Fäulniss verfällt. Die Entzündung des Knochens in der Umgebung des Sequesters bedingt Erweiterung der Gefässcanälchen durch Zellenwucherung, Entwicklung neuer Gefässe auf Kosten der Knochensubstanz, somit allmählig Continuitätstrennung

¹⁾ Bullet. de la faculté de médecine de Paris, 1813.

²⁾ Wir besitzen schon sehr genaue Beobachtungen über Nekrose des oberen Gelenk-Endes der Tibia von Brodie, des oberen Gelenk-Endes des Humerus von Weidmann, der oberen zwei Drittel des Femur von A. Cooper, des unteren Gelenk-Endes der Tibia von Bécclard u. dgl. m. Vgl. pag. 533.

³⁾ Dass ein nekrotisches Knochenstück einheilt, ist, wenn es überhaupt vorkommt, jedenfalls ein äusserst seltener Vorgang.

in dieser letzteren. Die aus dem entzündeten Knochen emporwachsenden Granulationen verdrängen allmählig den Sequester, der umspülende Eiter macht ihn beweglicher und hilft seine Ablösung und Ausstossung vollenden. Der Wiederersatz geht theils von dem entzündeten Knochen, theils von dem benachbarten Periost aus.

Am Einfachsten zeigen sich diese Verhältnisse bei einer *Necrosis partialis superficialis*. — Complicirter ist der Vorgang, wenn die ganze Dicke eines Knochens brandig wird, d. h. bei einer *Necrosis totalis*. In dieser Beziehung bieten die verschiedenen Arten der Knochen einige bemerkenswerthe Verschiedenheiten dar.

Für die Nekrose der flachen Knochen nehmen wir das Schulterblatt als Beispiel. Es handle sich um eine gänzliche Zerstörung des Periostes an der hinteren Seite des Schulterblatts und Nekrose des ganzen Knochens, während das Periost der vorderen Seite unversehrt geblieben ist. Alsdann wird letzteres gefässreich, verdickt, löst sich von dem Knochen, indem zwischen beiden eine gallertige Bindegewebswucherung entsteht, welche demnächst von den Rändern her, wo das Periost und der Knochen ursprünglich am dicksten sind, verknöchert. In der Gegend des Schulterblatts erscheint nun ein Abscess, in dessen Tiefe man den todtten Knochen beweglich fühlt. Derselbe tritt entweder allmählig von selbst hervor, oder kann herausgezogen werden, jedoch mit Zurücklassung seiner Ränder, welche inzwischen zerstört oder auch wohl in dem sie umfassenden Falze des Periostes erhalten wurden. Unterdessen hat sich, bedeckt von dem todtten Knochen, der neue Knochen bereits entwickelt, die Muskel-Insertionen sind mehr oder weniger vollständig auf ihn übergegangen und die zurückbleibende Functionsstörung kann eine verhältnissmässig unbedeutende sein. — Ist dagegen das Periost der hinteren Fläche des Schulterblatts unversehrt, das vordere dagegen zerstört, so geht die Knochen-Neubildung von der hinteren Seite aus, und die Abstossung erfolgt auf der Seite der *Fossa subscapularis*, zwischen ihr und den Rippen. — Endlich kann aber auch auf beiden Seiten des nekrotischen Knochens das Periost erhalten sein. Alsdann wird der Sequester durch neugebildete Knochenschichten von beiden Seiten her umschlossen, eingekapselt. An den Rändern hängen die 3 Blätter, aus denen alsdann die *Scapula* besteht, Anfangs noch zusammen, allmählig aber erfolgt Ablösung des Sequester auch an diesen Stellen und endlich Ausstossung desselben, nachdem er gewöhnlich, wegen der *Rarefaction*, die sein Gewebe durch die der Nekrose vorausgegangene Entzündung erfahren hat, in mehrere

Stücke zerfallen ist, — durch grössere Oeffnungen in den neugebildeten Knochentafeln.

Die Nekrose der Röhrenknochen (vgl. Fig. 72, 73, 74, 75) bietet die grösste Mannigfaltigkeit dar. Nehmen wir an, ein Röhren-

Fig. 72.

Fig. 73.

Fig. 74.

Fig. 75.



Fig. 72—75 Copien aus Bourgery's *Traité de l'anatomie etc.* — Fig. 72. Nekrose des Humerus im Mittelstück des Knochens. Der Sequestrer ist aus der unvollkommen und unregelmässig gebildeten Knochenlade entfernt. — Fig. 73. Nekrose des Humerus in seiner ganzen Dicke und beinahe in seiner ganzen Länge. Die Todtenlade ist sehr fest und vollständig. Der in ihr enthaltene Sequestrer kann durch die Kloaken hindurch gesehen werden. — Fig. 74. Totale Nekrose des Mittelstücks der Tibia. Die Capsula sequestralis noch wenig entwickelt. — Fig. 75. Nekrose des unteren Endes des Femur. Der Knochen ist im unteren Drittheil quer durchgesägt und ein Stück *C* aus der Capsula sequestralis ausgeschnitten, um auf dem Durchschnitt die Dicke und die spongiöse Structur derselben zu zeigen. In dem unteren Ende *B* steckt der noch festsitzende Sequestrer *b*. Das obere Ende *A* zeigt in der Nähe der Schnittlinie eine grosse, durch 2 Trepankronen bewirkte Oeffnung.

knochen sei auf eine gewisse Strecke¹⁾ in seiner ganzen Dicke nekrotisch, das Knochenmark aber zerstört, wie dies bei einer totalen Nekrose der Röhrenknochen fast immer der Fall sein muss²⁾. Als dann wird das Periost durch eine Zellschicht vom Knochen getrennt, schwillt an, verdickt sich und erzeugt auf seiner inneren Seite einen neuen, den Sequester mit weiter Höhle umfassenden Knochen. Der todte Knochen wird gleichsam eingesargt und der neue, ihn umfassende erhält deshalb auch den Namen Todtenlade, *Capsula sequestralis*. In dieser Todtenlade befinden sich kleinere und grössere Löcher. Erstere dienen den ernährenden Gefässen zum Eintritt, letztere sind die Austrittsöffnungen für den im Innern der Kapsel gebildeten, das todte Knochenstück umspülenden Eiter und die abgelösten Stücke des Sequester. Sie stehen daher auch immer im Zusammenhang mit mehr oder weniger langen Fistelgängen oder Geschwüren der Weichtheile. Diese grösseren Oeffnungen der *Capsula sequestralis* werden *Foramina grandia*³⁾ oder Kloaken⁴⁾ genannt. Ihre Zahl ist sehr verschieden. Ihre Grösse steht gewöhnlich in umgekehrtem Verhältniss zu ihrer Anzahl. Häufig, jedoch keineswegs constant, finden sich Kloaken an den Stellen der *Foramina nutricia* des normalen Knochens, und gewöhnlich verlaufen sie, wie jene, in schräger Richtung. Ihre Gestalt ist höchst verschieden; gemeinhin ist ihr innerer Umfang grösser als ihr äusserer. Die sie auskleidende Membran ist eine Fortsetzung der Fistelmembran. Sie liegen fast immer an dem abhängigen Theile des Knochens, entstehen erst, wenn der Sequester gänzlich von Eiter umspült ist, und verdanken der lückenhaften Bildung oder Resorption der Knochensubstanz ihre Entstehung. Bildet sich die *Capsula sequestralis* von Anfang an nur in unvollständiger Weise aus, so dass in ihr grosse unregelmässige Knochenlücken, deren Ausdehnung oft derjenigen des Sequester gleich ist, vorhanden sind, so kommt es gar nicht zur Bildung der eigentlichen Kloaken. Diese Knochenlücken selbst können freilich als Kloaken bezeichnet werden, jedoch unterscheiden sie sich von ihnen dadurch,

¹⁾ Ein Röhrenknochen kann auch in seiner ganzen Länge absterben. Am Häufigsten beobachtet man diesen seltenen Vorgang noch an den Phalangen. Dies ist dann eine *Necrosis totius ossis*.

²⁾ Aeusserst selten liefert das Mark, während der Röhrenknochen abstirbt, eine stabförmige Verknöcherung, welche an beiden Enden mit den unversehrt gebliebenen Epiphysen in feste Verbindung treten und somit die abgestorbene Röhre festhalten kann, — *Necrosis tubulata*, nach Blasius.

³⁾ Nach Troja (Neue Beobachtungen und Versuche über die Knochen, übersetzt von Schönberg, Erlangen, 1828).

⁴⁾ Nach Weidmann (vgl. das Citat auf pag. 546).

dass sie bei Weitem nicht immer mit Fistelgängen in den Weichtheilen communiciren. Zuweilen sind sie durch feste Membranen verschlossen, indem es zwar zur Entwicklung von Bindegewebe, aber nicht zur Verknöcherung gekommen ist.

Wir unterscheiden, ausser dieser totalen und der, bereits im Allgemeinen besprochenen, oberflächlichen partiellen Nekrose an den Röhrenknochen noch eine dritte Art, die *Necrosis partialis centralis*. Setzen wir voraus, dass nur die der Markhöhle zunächst gelegenen Lamellen nekrotisch sind, wobei die Integrität des Knochenmarkes natürlich nicht wohl bestehen kann, so müssen sich nothwendig die weiter nach Aussen gelegenen Knochenlamellen entzünden, porös werden, an einzelnen Stellen in Verschwärung übergehen und auf solche Weise, während von dem entzündeten Periost her neue Knochenschichten aufgelagert werden, eine gleichfalls mit Kloaken versehene Kapsel um den abgestorbenen centralen Theil des Knochens darstellen.

Die seltenste und merkwürdigste Form der *Necrosis partialis centralis* ist die *Schichtnekrose*, bei welcher nur die mittleren Schichten der kompakten Knochen-substanz nekrotisch werden, während gegen die Peripherie sowohl als gegen die Markhöhle noch Schichten erhalten bleiben. Vgl. Stadelmann, Bemerk. z. Lehre v. d. operat. Behandl. d. Nekrose. Nürnberg, 1859. — Volkmann, l. c. pag. 291.

Manche Schriftsteller haben behauptet, dass eine totale Nekrose in der vorhin geschilderten Weise überhaupt nicht vorkomme und dass die vermeintliche neue Knochenkapsel immer nur aus einer Auflockerung und Anschwellung der peripherischen Schichten des alten Knochens hervorgehe. Man hat sich in dieser Beziehung besonders auf den Umstand berufen, dass der Sequester stets ein geringeres Volumen zeigt, als das Knochenstück, welchem er entspricht, im gesunden Zustande hatte, dass derselbe ferner stets zackig und uneben ist und an seiner Oberfläche keineswegs dieselben Vorsprünge und Vertiefungen darbietet, welche der normale Knochen besitzt. Von Anderen dagegen wird behauptet, dass gerade die *Necrosis partialis centralis* gar nicht vorkomme, indem das geringe Volumen und die Unebenheiten des Sequester theils als Folgen der vorausgegangenen Entzündung, theils als mechanische Wirkungen des von den Granulationen ausgeübten Drucks zu betrachten seien¹⁾. Letztere Erklärungen sind zwar vollkommen begründet; genaue Untersuchungen aber der Sequester sowohl, als der Knochenkapseln, und vor Allem die zahllosen Versuche an Thieren, welche über diesen Gegenstand angestellt worden sind, ergeben mit Bestimmtheit, dass beide Arten

¹⁾ Die frühere Annahme, dass der Sequester sich im Eiter zum Theil löse oder corrodirt werde, ist als irrig erwiesen.

der Nekrose, sowohl die partielle centrale, als auch die totale unter den oben erörterten Verhältnissen vorkommen können.

Bei der Nekrose der kurzen Knochen ist der Vorgang ähnlich wie an den Röhrenknochen. Das Periost und die umliegenden Gewebe schwellen an, lösen sich vom Knochen; das Periost aber liefert neue Knochenschichten, welche den abgestorbenen Knochen einkapseln. Dieser wird nachträglich, unter dem Einflusse des ihn umspülenden Eiters, macerirt und in der bereits beschriebenen Weise durch Kloaken in einzelnen Stücken ausgestossen. Zuweilen behält auch die corticale Schicht des Knochens ihre Leistungsfähigkeit und bildet unter Hinzutreten von Periostaufagerungen eine Kapsel um den Sequester.

Die Ausstossung der gelösten Sequester erfolgt um so leichter, je oberflächlicher sie liegen, je weniger vollständig sie eingekapselt sind, je günstiger für ihr Austreten im letzteren Falle die Oeffnungen (Kloaken) der Kapsel gelegen sind. Meist liegen letztere sehr ungünstig, indem sie keineswegs zu den Enden des Sequesters führen, sondern die dicken Wandungen der Todtenlade vorwiegend rechtwinklig gegen die Längsachse des Knochens, mithin auch des Sequesters, wenn auch in etwas schräger Richtung, durchbohren. Deshalb gehört denn auch die Ausstossung eines eingekapselten Sequesters zu den Seltenheiten und kommt meist erst nach vorgängiger Ausweitung der Kloaken durch die, in Folge des Drucks der Sequesterspitze eingeleitete Ulceration (Caries) zu Stande. Verweilt ein gelöster Sequester allzu lange in der Kapsel, so erfolgt schliesslich ulceröse Zerstörung derselben in grösserem Umfange, welche häufig die übeln Folgen grosser Eiterungen nach sich zieht, ohne zur Ausstossung zu führen.

Der neugebildete Knochen, welcher schliesslich aus der Entwicklung der Todtenlade hervorgeht, ist aussen (wenn es ein Röhrenknochen ist, auch innen) von einer gefässreichen Membran überzogen, welche entweder vollständig neugebildet oder blos aus dem alten, erhaltenen und durch die Entzündung verdickten Periost entstanden ist. Das Knochenmark wird niemals vollständig und niemals in regelmässiger Form wiederersetzt. Der nach einer vollständigen Nekrose neugebildete Röhrenknochen gleicht zu Anfang in Bezug auf seine inneren Verhältnisse am Meisten dem Schlüsselbein, welches bekanntlich keine Markhöhle enthält. Allmähig bildet sich letztere, bald an dieser, bald an jener Stelle, gewöhnlich nicht als eine einfache röhrenförmige Lücke, sondern in der Form mehrerer, durch knöcherne Scheidewände getrennter Zellen. Der neugebildete Knochen ist An-

fangs biegsam, oder doch brüchig, auch sehr leicht, weil er sehr porös ist. An seiner Oberfläche bemerkt man eine grosse Menge kleiner Oeffnungen, durch welche Gefässe eindringen. Später wird sein Gewebe dichter und fester, aber nur höchst selten verlieren sich die Rauigkeiten, Höcker und Zacken an seiner Oberfläche gänzlich. Jedenfalls ist noch lange, nachdem die Heilung beendet, gewöhnlich für die ganze Lebensdauer, der neugebildete Knochen umfänglicher und, sofern er noch im Wachsthum begriffen war, auch länger als derjenige, welchen er ersetzt hat. (Vgl. pag. 520).

Symptome. Obgleich die Knochen-Nekrose nicht immer auf Entzündung beruht, so fehlen doch in ihrem Verlaufe niemals Entzündungs-Erscheinungen: Schmerz, Geschwulst, Röthe, weiterhin Eiterung u. s. f. — Uebrigens sind die Erscheinungen verschieden, je nach der Art und dem Sitz der Nekrose.

a) **Oberflächliche Nekrose** in Folge von Periostitis. Schmerzhaftigkeit an der entsprechenden Stelle, welche durch Druck vermehrt wird; Bildung einer diffusen teigigen Geschwulst, über welcher die Haut sich röthet, bläulich wird und endlich verschwärt. Dann Nachlass der Schmerzen, üppige Granulationen, welche nur einen engen Fistelgang übrig lassen, in dessen Tiefe der weissgrau oder schwarz gefärbte Knochen liegt. Die Farbe des letzteren wird um so dunkler, je mehr er der Luft ausgesetzt ist. Bei der Berührung mit der Sonde vernimmt man einen hellen Ton und empfindet einen festen Widerstand. Sobald die Exfoliation erfolgt ist, wachsen, gleichsam hinter dem Sequester her, die Granulationen üppig empor und vernarben, wenn die Ausfüllung bis zur Oberfläche gediehen ist. — Dieselben Erscheinungen, mit Ausnahme des Abscesses, beobachtet man, wenn ein blossliegender Knochen von Nekrose befallen wird.

b) Besteht Nekrose ohne primäre Betheiligung des Periostes, so lässt sich voraussetzen, dass sie beträchtlich ausgedehnter ist. Ausser den bereits angegebenen Symptomen fehlen in diesen Fällen während des Verlaufs niemals Störungen des Allgemeinbefindens (Fieber). Vgl. „Osteomyelitis“.

c) Die eingekapselte Nekrose der Röhrenknochen ist zuweilen im Anfange schwer zu erkennen, besonders wenn der Knochen von dicken Weichtheilen umgeben ist. Gewöhnlich ist der Schmerz das zuerst auffallende Symptom. Er sitzt tief und ist sehr heftig, zuweilen nächtlich exacerbirend. Demnächst entwickelt sich an der schmerzhaften Stelle, gewöhnlich unter Fieberbewegungen, eine Geschwulst, mit deren Wachsthum die Schmerzen nachlassen. Mehrfache Abscesse entstehen in der Umgegend und entleeren demnächst

unverhältnissmässig grosse Mengen von Eiter, ohne dass dadurch ein beträchtliches Sinken der Geschwulst herbeigeführt würde. Zuweilen entwickeln sich die Abscesse mit grosser Schnelligkeit. Man glaubt eine Phlegmone vor sich zu sehen, schneidet ein, entleert Eiter; aber in der Nachbarschaft entstehen schnell neue Eiterherde, und wenn auch der eine oder der andere nach der Incision heilt, so lässt die Mehrzahl doch die oben beschriebenen fistulösen Gänge zurück. Durch den geöffneten Abscess oder Fistelgang gelangt man mit dem Finger oder der Sonde zu dem nekrotischen Knochen, den man, je nach der Dauer und dem Gange der Krankheit, mehr oder weniger vollständig von seiner Kapsel umschlossen findet. Oft kann man von mehreren Fistelgängen aus denselben Sequester erreichen. Man führt dann von verschiedenen Seiten gleichzeitig Sonden ein, um sich von der Zahl und Grösse der Sequester zu überzeugen. Sind sie klein, so erfolgt ihre Ausstossung, vielleicht sogar ihre Auflösung in dem sie umspülenden Eiter, ohne besondere Zufälle. Verweilt dagegen der Sequester wegen räumlichen Missverhältnisses längere Zeit nach seiner vollständigen Ablösung, welche man im Allgemeinen nach 8 bis 12 Wochen erwarten kann, fort und fort in der Todtenlade, so veranlasst er schliesslich Verschwärung dieser selbst, sowie der benachbarten Knochen und Weichtheile, unter den Erscheinungen des sogenannten Pseudo-Erysipels. Dann folgt oft Pyämie oder hektisches Fieber unter gänzlicher Aufreibung der Kräfte des Patienten durch die massenhaften Eiterverluste.

Diagnose. Nach unseren jetzigen anatomischen Kenntnissen wird die in älterer Zeit häufig begangene Verwechslung der Nekrose mit anderen Knochenkrankheiten, besonders mit Pseudoplasmen nicht zu befürchten sein (vgl. Cap. III.). Wo irgend der Verdacht einer Nekrose besteht, darf man nicht müde werden, zu sondiren, zu dilatiren und wieder zu sondiren. Diagnostische Operationen sind im weitesten Umfange zu empfehlen, namentlich auch das Oeffnen einer zweifelhaften Knochenkapsel, wenn die, vielleicht auf grossen Umwegen, andauernd entleerten Eitermassen den Verdacht erregen, dass gelöste Sequester in ihr sich befinden. Solche zweifelhaften Fälle sich selbst zu überlassen, ist gefährlicher, als zahlreiche und bedeutende Einschnitte zu machen, um eine klare Einsicht zu gewinnen.

Die grössten Schwierigkeiten machen solche Fälle von eingekapselter Nekrose, in denen, trotz Monate langer Dauer der Krankheit, noch kein Aufbruch nach Aussen oder ein Aufbruch mit weithin gewunden verlaufenden Fistelgängen erfolgt ist, so z. B. am Femur Aufbruch an der inneren Seite, während der Eingang in die Kapsel sich an der äusseren Seite befindet. Man darf aber auch nicht aus jedem zum Knochen

verlaufenden Fistelgang auf Nekrose schliessen. Abgesehen vom Knochenabscess, kann es sich auch um Senkungsabscesse handeln, welche ganz anderen Ursprungs sind.

Die Unterscheidung von Caries und Nekrose stützt sich, abgesehen von der Anamnese und der Berücksichtigung der bei Caries fast immer, bei Nekrose dagegen verhältnissmässig selten bestehenden Dyskrasien, wesentlich auf die in nachfolgender Tabelle zusammengestellten Merkmale, deren Einzelwerth jedoch, nach den vorausgehenden Erläuterungen, nicht zu hoch angeschlagen werden darf.

	Caries.	Nekrose.
1. Beschaffenheit des Geschwürs,		
a) Rand	weit unterminirt, schlaff oder callös.	eng, fest mit üppigen Granulationen besetzt.
b) Grund	speckige, schlaife, leicht blutende Granulationen auf dem Knochen.	üppige Granulationen, ohne Zusammenhang mit dem nekrotischen Knochen.
c) Secret	Jauche.	guter Eiter.
d) Umgebung	ödematös, missfarbig.	fast normal.
2. Beschaffenheit des Knochens	brüchig, leicht blutend, sehr schmerzhaft bei der Berührung.	hart, meist glatt, wenig empfindlich, grau oder schwarz.
3. Sitz	fast ausschliesslich in spongiösen Knochen.	vorzugsweise in compacten Knochen.
4. Ausdehnung	die Verschwärung ergreift den Knochen und die Weichtheile.	der Brand bleibt auf den Knochen beschränkt.

Prognose. Knochenbrand ist an sich keine lebensgefährliche Krankheit. Selbst für die Brauchbarkeit des erkrankten Theils ist er nicht immer bedenklich, da der absterbende Knochen in der Regel ersetzt wird. Mit vollständiger Sicherheit ist Heilung zu erwarten, wenn die Nekrose oberflächlich und wenig ausgebreitet ist. Dagegen ist sie als eine bedenkliche Krankheit zu bezeichnen, wenn sie ihren Sitz in der Tiefe hat, weit ausgedehnt ist, insbesondere durch die ganze Dicke eines tief gelegenen Knochens sich erstreckt. Die Heftigkeit und Ausdehnung der Entzündung, weiterhin der Eiterung, und die dadurch bedingte Gefahr des hektischen Fiebers oder der Pyämie begründen diese übele Prognose. Dies ist um so wichtiger, als bei solchen Fällen nur durch operative Eingriffe Hülfe geleistet werden kann. Besteht Nekrose an einem der Knochen, welche die Schädel-, Brust- und Bauchhöhle begrenzen, so bedingt die Nachbarschaft und

daher auch Mitleidenschaft der Eingeweide besondere Gefahren. Ebenso verhält es sich mit der Nekrose in der Nähe eines Gelenkes.

Die **Behandlung** ist theils eine prophylaktische, theils beabsichtigt sie die Abstossung des Sequesters zu befördern, ihn herauszuziehen, den Wiederersatz und die Vernarbung zu leiten.

Die prophylaktische Behandlung bezieht sich selten auf Bekämpfung einer zu Grunde liegenden Dyskrasie, meist ist sie eine rein örtliche. In letzterer Beziehung ist die Behandlung jeder Periostitis, die Entleerung von Eiter durch eine das Periost spaltende Incision, u. dgl. m. als eine gegen die Nekrose gerichtete Prophylaxis zu betrachten. Hierher gehört ferner die Sorge, dass zufällig entblösste Knochen möglichst bald wieder, — und zwar wo möglich mit lebenden Theilen, sonst aber mit feucht-warmen Umschlägen oder Salben-Verbänden bedeckt werden, die Fernhaltung aller reizenden Substanzen, die Vermeidung der Entblössung eines Knochens bei Operationen, sofern dieselbe nicht unbedingt nothwendig ist.

Ist die Nekrose bereits ausgebildet, so hat man zunächst die in der Umgegend des alten Knochens auftretende Entzündung in Schranken zu halten. Sofern sie aber nicht durch ihre Localität dem Leben Gefahr droht, vermeide man Blutentziehungen, da der Kranke für den Process der Ausstossung und des Wiederersatzes noch vieler Kräfte bedarf.

Bei oberflächlicher Nekrose hat man nur die sich bildenden Abscesse zu öffnen und den Sequester, wenn er vollständig gelöst ist, auszuziehen. Die in grosser Menge früher vorgeschlagenen und angewandten Mittel, um die Abstossung zu beschleunigen, das Brennen, Aetzen, Abkratzen des Periostes u. dgl. m., führen durchaus nicht zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes, sondern bedingen nur eine weitere Ausdehnung der Nekrose.

Bei der eingekapselten Nekrose (der centralen und der totalen) sind häufig mechanische Hindernisse, welche die Ausstossung des Sequesters unmöglich machen, oder doch verzögern, durch operative Eingriffe zu beseitigen, da das längere Verweilen desselben tödtliche Zufälle veranlassen kann (vgl. pag. 551 u. 553). Das Mittel zur Befreiung des Sequesters besteht in einer hinlänglichen Eröffnung der Capsula sequestralis mit Meissel und Hammer oder mittelst des Trepans, des Osteotoms, kleiner Sticksägen und schneidender Knochenzangen. Eine solche Operation heisst Nekrotomie (Necrotomia). Zur Anlegung der Oeffnung wählt man wo möglich eine Stelle, an welcher vor Allem die Capsula sequestralis ohne Verletzung bedeutender Gefässe und Nerven zugänglich ist, und wo ferner das eine Ende

des Sequesters durch eine Kloake deutlich gefüllt werden kann. Die Kapsel wird durch einen grossen, kräftigen, bis auf den Knochen eindringenden Längsschnitt blossgelegt, von welchem aus man mit stumpfen Instrumenten (Schabeisen) das meist schwierig verdickte Periost nach den Seiten zurückschiebt. Zuweilen reicht das Fortnehmen der zwischen zwei Kloaken bestehenden Knochenbrücke hin, zuweilen sogar die Erweiterung einer Kloake mittels des Meissels, der Säge, oder der schneidenden Knochenzange¹⁾. Wo grosse Sequester zu entfernen sind, und nur verhältnissmässig kleine Kloaken bestehen, legt man in der Nachbarschaft einer Kloake eine neue Oeffnung an und vergrössert diese, indem man die Knochenbrücke zwischen ihr und der Kloake wegnimmt. Immer mache man die Oeffnung so gross, dass bei der Ausziehung des Sequesters (welche übrigens oft recht feste Zangen und eine kräftige Hand erheischt) Quetschung oder Erschütterung der Kapsel, besonders ihrer gefässreichen inneren Auskleidung, vermieden werden kann.

Allerdings ist anderer Seits wünschenswerth, dass nicht ein allzu grosser Theil der Kapsel entfernt werde, ja sogar, dass eine ausgedehnte Entblössung derselben unterbleibe. Die Festigkeit der immer nur aus lockerem, spongiösem Gewebe bestehenden Kapsel könnte sonst auf die Dauer leiden, zumal die Operationslücke oft nur durch fibröses Gewebe ausgefüllt wird; auch könnte Entzündung und Verschwärung derselben in grösserer Ausdehnung folgen und somit die Heilung mindestens sehr langwierig werden. Daher ist es ein gutes Auskunftsmittel, sehr grosse Sequester (wie sie freilich nur selten vorkommen) in der Kapsel selbst zu zerbrechen und dann stückweise auszuziehen. Die Zerreissung und Erschütterung der gefässreichen Auskleidung der Todtenlade, deren Möglichkeit Michon als Gegengrund gegen dieses, besonders von Dupuytren ausgebildete Verfahren hervorhebt, kann bei einiger Sorgfalt vermieden werden. Zum Zerbrechen des Sequesters reicht eine schmale gerade Knochenzange aus. Wo sich im Voraus erkennen lässt, dass es nothwendig oder nützlich wäre, den Sequester zu zerbrechen, ist es zweckmässig, die Eröffnung der Todtenlade in ihrer Mitte vorzunehmen, da die Zerstückelung von dieser Stelle aus leichter gelingt, als von dem einen Ende her. — Die Sequestralkapsel zum Behuf der Entfernung eines grossen Sequesters sammt diesem selbst quer zu durchsägen und dann durch Umbiegen des Gliedes den erforderlichen Raum für die Extraction zu gewinnen, ist jedenfalls das gefährlichste Verfahren und erfordert dieselbe Nachbehandlung, wie ein complicirter Bruch.

¹⁾ Zu diesem Behuf ist bei dünnen Kapseln die, nach den Angaben Nélaton's, von Lürer verfertigte Hohlmeissel-Zange ganz bequem. Ihre Wirkung hat vor derjenigen des Meissels den Vorzug, dass keine Erschütterung stattfindet. Dagegen arbeitet man mit dem Meissel viel schneller und kann, wenn er nur scharf genug ist, nachtheilige Erschütterungen auch recht wohl vermeiden, so dass ich, nach Hunderten von Erfahrungen, doch Meissel (namentlich die grossen Hohlmeissel der Tischler) und Hammer für die wesentlichen Instrumente zur Nekrotomie erklären muss. Bei dicken Sequestralkapseln ist die schneidende Zange gar nicht zu brauchen.

Während der Eröffnung der Sequestralkapsel findet eine beträchtliche Blutung statt¹⁾. Dieselbe rührt aus den Gefäßen der Kapsel selbst her und ist nur deshalb so bedeutend, weil diese sich im Knochengewebe nicht zusammen- und zurückziehen vermögen. Man sucht sie während der Operation durch einen Strom kalten Wassers zu stillen. Sollte sie nach Beendigung derselben noch fort-dauern, so kann man durch die Tamponade mit Sicherheit ihrer Herr werden²⁾. Ueberdies müssen zur Verhütung einer allzu heftigen Entzündung nach jeder bedeutenden Nekrotomie Eisumschläge oder, in Ermangelung des Eises, andauernde Irrigationen mit kaltem Wasser mehrere Tage angewandt werden. Dadurch wird dann auch einer weiteren Blutung Einhalt gethan. Bei einer solchen Nachbehandlung habe ich sogar in scheinbar verzweifelten Fällen die schon bestehenden, weit verbreiteten Entzündungen schnell rückgängig werden, und den Kranken ohne weitere Zufälle genesen sehen. Von Anderen werden bedenkliche, sogar lebensgefährliche Blutungen, heftige Entzündungen, besonders aber Pyämie als mögliche Folgen der Nekrotomie geschildert; letztere habe ich unter Hunderten von Fällen erst einmal gesehen. Wahrscheinlich hängt der verschiedene Erfolg, abgesehen von der auf die Ausführung der Operation und die Nachbehandlung zu verwendenden Sorgfalt und dem sehr wichtigen Kräftezustande des Patienten, von dem Grade der Befestigung ab, welche der Sequester zur Zeit der Operation noch besass.

Man sollte die Nekrotomie niemals verschieben, wenn der Sequester gelöst ist³⁾ und bei beträchtlicher Eiterung dennoch nicht ausgestossen wird; man sollte sie aber niemals unternehmen, so lange der Sequester noch nicht vollkommen beweglich ist, besonders nicht

¹⁾ Bei Anwendung der prophylaktischen Compression kann dieselbe ganz vermieden werden.

²⁾ Eine vereinzelte Ausnahme hat W. Busch (chirurg. Mittheilungen aus der Bonner Universitäts-Klinik, Berlin 1863, Separat-Abdruck aus d. Archiv f. klin. Chirurg. Bd. IV.) beobachtet; die Blutung wurde tödtlich, obwohl Busch noch die Femoralis und die Profunda femoris unterband. — Ich bin gleichfalls einmal durch eine solche Blutung zur Unterbindung genöthigt worden; sie kam aus einer erweiterten Arterie des Periosts.

³⁾ Kann man sich mit dem Finger oder mittelst zweier, von verschiedenen Kloaken aus eingeführten Sonden direct von der Beweglichkeit des Sequesters überzeugen oder ihn mit einer Kornzange hin und her bewegen, so ist die Entscheidung leicht. Anderen Falls hat man auf die seit dem Beginne der Erkrankung verlassene Zeit Rücksicht zu nehmen. Nach 12 Wochen ist die Lösung mit grösster Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Stromeyer hebt hervor, dass nach Vollendung der Lösung die den Sequester umgebenden Granulationen besonders leicht bluten.

wenn er mit dem Gelenk-Ende eines Knochens noch in festem Zusammenhange steht. Droht im letzteren Falle dem Leben des Kranken Gefahr durch die Ausbreitung der Entzündung auf das Gelenk und die darauf folgende Eiterung im Gelenk, so ist nicht die Nekrotomie, sondern, je nach der Ausdehnung der Zerstörungen, die Amputation oder die Resection vorzunehmen.

Mit Rücksicht auf die bedeutende Eiterung, welche durch die Anwesenheit eines Sequesters bedingt wird und nach seiner Entfernung, während die Todtenlade sich mit Granulationen ausfüllt, oft lange Zeit fortbesteht, hat man die Kräfte des Patienten durch leicht verdauliche, plastische Nahrungsmittel zu unterstützen. So sehr auch jede heftige Steigerung der Entzündung örtlich bekämpft werden muss, so wenig darf dem Patienten jemals eine Entziehungskur auferlegt werden; vielmehr wird man selbst nach bedeutenden Nekrotomien, während das kranke Glied noch in Eis gehüllt liegt, alsbald Wein, Chinin und Eisen mit Vortheil geben.

VIII. Knochen-Brüchigkeit und Knochen-Erweichung. Osteopsathyrosis; Fragilitas, Mollities, Curvaturae ossium.

Veränderungen in der Festigkeit einzelner oder auch sämtlicher Knochen des Skelets können durch sehr verschiedene Krankheitsprocesse verursacht werden, so z. B. auf chemischem Wege durch Mangel der zur Ernährung der Knochen nothwendigen Kalksalze, ferner durch mangelhafte Entwicklung des Callus bei Knochenbrüchen (vgl. pag. 332 u. f.), durch die Mehrzahl der im Knochengewebe sich entwickelnden Neubildungen. Eine wirkliche Biegsamkeit der Knochen kann nur durch den Mangel der Kalksalze in ihnen veranlasst werden, da von deren Anwesenheit die Festigkeit und Sprödigkeit des Knochengewebes abhängt. Versuche an Thieren haben die, nach chemischen und physiologischen Gesetzen vorauszusehende Thatsache festgestellt, dass bei einer, übrigens reichlichen Fütterung mit Substanzen, welche arm oder ganz frei von Kalksalzen sind, sehr bald ein hoher Grad von Biegsamkeit der Knochen und zuletzt eine vollkommene Unbrauchbarkeit derselben zu irgend welchen Bewegungen eintritt¹⁾. Zugleich entwickelt sich aber bei solchen Versuchen auch immer ein sehr beträchtliches Allgemeinleiden, bedingt durch die Stör-

¹⁾ Vgl. Chossat, Recherches expérimentales sur l'inanition. Paris 1843. — Ueber das bei Thieren häufige Vorkommen der Osteomalacie und der Rachitis, über die Zusammengehörigkeit beider und ihre Abhängigkeit von Kalkmangel in der Nahrung hat Roloff eine interessante Arbeit geliefert, Virchow's Archiv, Bd. 37 (1866), pag. 433—503.

rung in dem Nutritionsprocess aller übrigen Organe, da bekanntlich auch in der Zusammensetzung der Weichtheile die Kalksalze eine bedeutende Rolle spielen. Diese, durch fehlerhafte chemische Zusammensetzung der Knochen bedingte Biegsamkeit (Halisteris, malacia halisteretica) ist jedoch ohne gleichzeitige Veränderungen der Structur (Osteoporose) beim Menschen noch nicht beobachtet worden. An den Epiphysen rachitischer Knochen kommen allerdings Stellen vor, welche als der Kalksalze beraubte Knochensubstanz gedeutet werden könnten. Diese sind aber, wie wir weiter unten sehen werden, vielmehr als Knorpel aufzufassen, welcher zwar in seiner Structur knochenähnlich geworden, aber noch nicht verknöchert ist. In der Regel lässt sich die vermeintliche Biegsamkeit der Knochen auf einen verschieden hohen Grad von Brüchigkeit reduciren. Diese aber entspringt aus Veränderungen der Structur, welche theils auf ganz mechanische Weise durch den Druck einer im Knochen oder in seiner Nachbarschaft entwickelten Geschwulst (vgl. das folg. Capitel) bedingt werden, oder auf Osteoporose beruhen, welcher ihrer Seits entweder durch den, bereits bei der Knochen-Entzündung besprochenen Resorptionsprocess oder als eine physiologische Abänderung der Knochenstructur im höheren Alter zu Stande kommt.

Sofern man von „Brüchigkeit der Knochen“ schlechtweg spricht, bezieht sich dies wesentlich auf die Rarefaction des Knochengewebes in Folge von Knochen-Entzündung.

Von dieser Auffassung der Osteoporose als eines Productes der Knochen-Entzündung weicht Rokitsansky (Lehrbuch d. pathologischen Anatomie. Wien, 1855 u. f., Bd. II. pag. 102) in sofern ab, als er neben der auf Entzündung beruhenden auch noch zwei Formen der durch Atrophie des Knochengewebes veranlassten Osteoporose als concentrische und excentrische Atrophie der Knochen unterscheidet. Fälle der Art lassen aber auch die Deutung zu, dass es sich entweder um physiologische, d. h. durch das höhere Alter bedingte Veränderungen des Knochengewebes, oder aber um die Folgen einer vorausgegangenen oder chronisch fortbestehenden Entzündung handle. Wir reihen deshalb die Knochenbrüchigkeit, sofern sie nicht von Neubildungen im Knochen abhängig ist, der Knochen-Entzündung und ihren Ausgängen an, indem wir die physiologische Altersatrophie um so mehr kurz übergehen zu können glauben, als der ihr zu Grunde liegende Resorptionsprocess wesentlich mit dem bei der Knochen-Entzündung auftretenden übereinstimmt.

Jedenfalls ist allgemein anerkannt, dass erhöhte Porosität der Knochen den Grund für die Brüchigkeit in den hier zu berücksichtigenden Fällen abgiebt. Dass man früher, ohne zureichenden Beweis, alle möglichen Dyskrasien und Diathesen als Ursachen der Knochenbrüchigkeit aufgeführt hat, wurde bereits erwähnt¹⁾. — In

¹⁾ Vgl. pag. 321. — Eine besondere Berühmtheit hat noch immer Saillant's Gichtkranker, der so leicht geworden war, dass zwei Männer ihn im Bade unter Wasser halten mussten.

manchen Fällen hat sich die Erblichkeit derselben nachweisen lassen; in anderen bestand sie ohne nachweisbare Ursache von frühester Jugend an bis zum spätesten Alter. Meist schliesst diese aus unbekannter Ursache entstandene Brüchigkeit der Knochen die Heilung der Fracturen durch Callus nicht aus.

Die Veränderungen der Structur, sowie der Consistenz und Form des Knochens sind verschieden, je nachdem entweder der bereits vollständig ausgebildete, erwachsene Knochen porös wird, — oder aber der noch in der Entwicklung begriffene, wachsende Knochen eine Störung seiner Ausbildung erleidet. Dieser Unterschied ist schon lange, bevor man eine richtige Einsicht in das Wesen dieser Prozesse gewonnen hatte, empirisch festgestellt worden. Die Verminderung der Consistenz des wachsenden, kindlichen Knochens wurde Rachitis, diejenige, welche bei Erwachsenen auftritt, Osteomalacie genannt. Die Pathogenese beider ist erst durch die Untersuchungen von Hermann Meyer¹⁾ und von Virchow²⁾ aufgehellt worden, auf welche wir uns in Nachstehendem fortgehend beziehen werden.

A. Osteomalacie. Osteomalacia, Malacosteon s. Rachitis adultorum.

Nach den Angaben von Lobstein³⁾ hat schon ein alter arabischer Arzt die Knochen-Erweichung der Erwachsenen beobachtet, da er von einem Manne erzählt, welcher sich in einer Palmematte tragen liess, „weil er nur noch im Kopf, im Genick und in den Händen Knochen besass, während alle anderen Theile seines Skelets vollkommen biegsam waren und willkürlich gar nicht bewegt werden konnten, mit Ausnahme der Zunge.“ Der erste Fall, welcher genauer untersucht ist, wurde von Morant⁴⁾ beschrieben. Derselbe betrifft die durch ihn berühmt gewordene Frau Supiot, welche nach mehreren Wochenbetten von einem höchst auffallenden Grade der Osteomalacie befallen wurde. Das Leiden begann mit scheinbar rhen-

¹⁾ Beiträge zu der Lehre von den Knochenkrankheiten. Zeitschrift für rationale Medicin, 1853, pag. 143 u. f.

²⁾ Das normale Knochenwachsthum und die rachitische Störung desselben. In Virchow's Archiv für pathol. Anatomie etc., 1853, pag. 409—507.

³⁾ Anatomie pathologique, Tom. II. pag. 188.

⁴⁾ Histoire de la maladie etc. d'une femme devenue tout-à-fait contrefaite par un ramollissement général des os. Paris 1752. Die Abbildung ist von Volkmann (l. c. pag. 343) in Holzschnitt wiedergegeben. — In Betreff der übrigen Literatur vgl. F. C. Naegelé, das schräg verengte Becken etc., Mainz 1839, die Inaugural-Dissertation von C. O. Weber, Ossium mutationes osteomalacia universalis effectae, Bonnae 1851, und Litzmann, die Formen des weiblichen Beckens etc., nebst einem Anbange über die Osteomalacie. Berlin, 1861.

matischen Schmerzen in verschiedenen Körpertheilen, besonders in den Extremitäten, welche allmählig immer heftiger wurden. In dem Urin bemerkte man ein weisses Sediment¹⁾; späterhin wurden die Beine der Kranken durch Muskelzug allmählig nach Aussen umgebogen, so dass sie endlich eine Krümmung nach Aussen und Oben erhielten, die so bedeutend war, dass die Kranke auf ihrem linken Fuss wie auf einem Kissen mit dem Kopf liegen konnte. Aehnliche Veränderungen erfuhren die übrigen Knochen des Skelets.

Die anatomischen Verhältnisse der osteomalacischen Knochen lassen sich im Wesentlichen auf „Osteoporose“ zurückführen. Alle Schriftsteller stimmen darin überein, dass ihre Textur im höchsten Grade schwammig, die ungemein vergrösserten Markräume und Gefässcanäle mit einem blutig-fettigen Exsudate gefüllt seien, und der ganze Knochen daher, wenn die compacte Substanz bis auf eine winzige Schale geschwunden und von der spongiösen nur dürftige Balkennetze geblieben sind, wie Käse leicht zu durchschneiden, mithin auf der höchsten Stufe des Krankheitsprocesses nicht nur im höchsten Grade brüchig, sondern wirklich biegsam, einer Sehne ähnlich erscheine. Diese in den meisten Fällen beobachtete „wächserne“ Biegsamkeit lässt sich aus der erhöhten Porosität (excentrischen Atrophie) allein nicht erklären. Kilian unterscheidet solche Fälle als *Osteomalacia cerea s. flexilis* von der auf eigentlicher Brüchigkeit beruhenden *Osteomalacia fracturosa*. Als eine dritte Art dürfte, nach Solly, die *Osteomalacia rubra* zu unterscheiden sein, die sich durch eine, von erheblicher Vascularisation abhängige, auffallende Röthung der brüchigen Knochen auszeichnet.

Aetiologie. Die meisten Kranken, welche von Osteomalacie befallen werden, haben vorher entweder schon längere Zeit an chronischen Uebeln, welche störend auf die Ernährung des ganzen Körpers einwirkten, gelitten, oder in kümmerlichen Verhältnissen und in feuchten Wohnungen gelebt; oft folgt die Osteomalacie auch unmittelbar auf eine acute Krankheit. Sie ist häufiger bei Frauen als bei Männern und entwickelt sich bei jenen besonders im Wochenbett oder in Folge von Krankheiten, welche sie im Wochenbett zu überstehen hatten.

Vielleicht beruht die Annahme der überwiegenden Häufigkeit der Osteomalacie bei Frauen darauf, dass ihre Folgen bei diesen wegen ihres Einflusses auf die Weite des Beckens (bei späteren Geburten) viel häufiger erkannt werden, als bei Männern. Jedenfalls kommt Osteomalacie auch bei Männern vor.

Die **Symptome** sind Anfangs diejenigen eines heftigen und aus-

¹⁾ Dass diese auch anderweitig bemerkten Sedimente vorwiegend kalkhaltig seien, wird zwar von Vielen behauptet, von Anderen aber entschieden bestritten.

gebreiteten Rheumatismus. Der Sitz der Schmerzen wird aber alsbald von den Kranken in die Knochen verlegt. Er verhält sich wie bei einer ausgebreiteten Periostitis. Nach Verlauf einer gewissen Zeit treten an den Knochen Anschwellungen auf, die vorzugsweise in der Gegend der Gelenkvorsprünge ihren Sitz zu haben pflegen. Der Gang der Kranken wird unsicher, wankend, jede Bewegung schmerzhaft. Endlich im höchsten Grade des Uebels werden die Extremitäten-Knochen durch den Muskelzug verbogen, die Wirbelsäule und die Beckenknochen durch das Gewicht des Rumpfes und Kopfes verkrümmt, das Becken insbesondere durch das Hervortreten des Kreuzbeins und das Zusammenrücken der Pfannengegenden bis zu den höchsten Graden verengt. Die Körperlänge der Kranken wird verringert, — was gewöhnlich erst bei dem Versuche, das Bett zu verlassen, bemerkt wird, und woraus zuweilen die wahre Natur des Leidens erst erkannt wurde. Ein Kranker wurde in 19 Monaten um 1 Fuss kleiner; eine ansehnlich grosse Frau von 50 Jahren schrumpfte in wenigen Jahren zu einer Zwerggestalt zusammen; ein Jüngling von $4\frac{1}{2}$ Fuss Höhe verlor ein Drittel derselben. Ist es bis zu diesem höchsten Grade der Krankheit gekommen, so erfolgt gewöhnlich der Tod durch allgemeine Entkräftung, oder durch mechanische Behinderung der Functionen wichtiger Eingeweide. Jedoch sah man sehr häufig die Ernährung des übrigen Körpers lange Zeit hindurch in ganz normaler Weise erfolgen. In der Mehrzahl der Fälle bleiben, wenn die Osteomalacie sich auch über das ganze übrige Skelet erstreckt, doch die Zähne und die Kiefer unversehrt, so dass also das Kauen nicht behindert wird. Ueberhaupt werden die Kopfknochen selten von der Krankheit ergriffen.

Ogleich die Osteomalacie unzweifelhaft mit einem Allgemeinleiden zusammenhängt, so ist sie doch häufig auf einzelne Theile des Skelets beschränkt. Besonders häufig sind osteomalacische Verkrümmungen am Becken beobachtet worden, was jedoch vielleicht nur darauf beruht, dass am weiblichen Becken auch unbeträchtliche Verkrümmungen den Geburtsact in hohem Grade stören und daher bestimmter zur Kenntniss kommen.

Die Unterscheidung zwischen Osteomalacie und Rachitis beruht wesentlich auf folgenden Punkten. Bei letzterer hört der Erweichungsprocess mit der Vollendung des Wachsthums auf, hat einen sehr langsamen Gang und ist von sehr geringen oder gar keinen Schmerzen begleitet. Die Osteomalacie dagegen tritt bei Erwachsenen plötzlich auf, steigert sich schnell bis zum höchsten Grade der Biegsamkeit der Knochen und ist im Anfang stets, häufig aber

auch während der ganzen Dauer der Krankheit von heftigen Schmerzen begleitet.

Von einer wirksamen **Behandlung** kann, nach den vorliegenden Erfahrungen, nur in sofern die Rede sein, als eine Periostitis oder Osteitis, deren Ausgang in Knochen-Erweichung gefürchtet wird, durch antiphlogistische und antidyskrasische Mittel bekämpft werden soll. Ist die Erweichung selbst eingetreten, so hat man von der Anwendung der Tonica, auch von der Darreichung von Kalksalzen zwar Nutzen erwartet, jedoch noch nicht mit Entschiedenheit beobachtet. Neben der Unterhaltung der Kräfte und der Bekämpfung etwa bestehender Dyskrasien wird es daher in solchen Fällen hauptsächlich darauf ankommen, allzu bedeutende Verkrümmungen der Knochen, sofern dies möglich, durch mechanische Hilfsmittel zu verhüten.

B. Rachitis, Englische Krankheit.

Nach Glisson¹⁾, welcher zuerst, oder doch einer der Ersten die „Englische Krankheit“ beschrieb, war sie im Jahre 1620 im westlichen Theile von England aufgetreten und wurde damals als ein Morbus plane novus betrachtet²⁾. Man gab ihr den Namen *the rickets*, woraus das französische *riquets* und wahrscheinlich auch Rachitis entstanden.

Nächst Glisson haben sich vorzüglich John Mayow, J. L. Petit, Portal, in neuester Zeit aber zahlreiche Forscher, besonders J. Guérin, Trousseau und Lasègue, H. Meyer, am Gründlichsten Virchow, mit ihr beschäftigt. Die oben citirte Abhandlung von Virchow enthält die genaueren literar-historischen Angaben, sowie auch den Nachweis, dass die Schreibart „Rhachitis“ ungerechtfertigt ist. — Eine sehr ausführliche Monographie über Rachitis hat neuerdings Ritter von Rittershain (in Prag) geliefert. Berlin, 1863.

Aetiologie. Rachitis wird vorzugsweise häufig in England, Holland und dem nördlichen Frankreich beobachtet, jedoch ist sie auch weit entfernt von den Seeküsten, z. B. im mittleren und südlichen Deutschland, eine keineswegs seltene Krankheit. Fast immer entwickelt sich dies Uebel um die Zeit der ersten oder der zweiten Dentition, am Häufigsten der ersten. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass der zu dieser Zeit stattfindende stärkere Verbrauch von phosphorsaurem Kalk für die Zahnbildung in ätiologischem Zu-

¹⁾ De rachitide sive morbo puerili tractatus, Lugduni Batavorum, 1620.

²⁾ Nach den geistreichen Untersuchungen von Stiebel, in seiner auch für den Praktiker werthvollen Schrift „Rickets“ (Erlangen 1863), stellt eine antike Büste des Aesop diesen rachitisch dar; die Krankheit dürfte also wohl im Alterthume schon bekannt oder doch vorhanden gewesen sein.

sammenhänge mit der Rachitis stände. Es ist aber bekannt, dass grade um diese Zeit des Lebens die Geneigtheit zu Erkrankungen überhaupt und namentlich zu Knochenkrankheiten in sehr hohem Grade gesteigert ist. Jedenfalls ist eine unzureichende oder schwerverdauliche Kost eine wichtige Ursache der Rachitis. Die Periode des Entwöhnens, den oft plötzlich herbeigeführten Uebergang von der Muttermilch zu groben, vegetabilischen Nahrungsmitteln, besonders zu solchen, welche in ihrer Zusammensetzung derjenigen des Blutes wenig analog sind (wie Kartoffeln, unreifes Obst u. dgl.), hat man als wesentliche ätiologische Momente zu betrachten. Der Aufenthalt in schlechter, feuchter Luft, Mangel an Bewegung sind gleichfalls in Anschlag zu bringen; jedoch kann durch frische Landluft allein der Einfluss schlechter Ernährung nicht aufgehoben werden. Man findet rachitische Kinder eben so gut auf dem Lande, als in den Städten. Von vielen Seiten wird die Erblichkeit der Rachitis, oder doch ihre Entstehung bei Kindern von scrophulösen, gichtischen oder überhaupt dyskrasischen Eltern hervorgehoben. Dass eine solche Entstehungsweise möglich sei, kann nicht in Abrede gestellt werden, da zuverlässige Beobachtungen von angeborener Rachitis vorliegen, der Foetus aber durch fehlerhafte Ernährung nur erkranken kann, sofern das ihn ernährende Blut der Mutter krankhaft zusammengesetzt, oder der Keim selbst in seinen ersten Anfängen fehlerhaft gebildet war.

Von vielen Aerzten wird eine besondere Beziehung der Rachitis zur Scrophulosis angenommen, oder wohl gar die Rachitis schlechtweg als Knochen-Scropheln bezeichnet. Aber das Vorkommen der Lymphdrüsen-Anschwellung und anderweitiger entschieden scrophulöser Symptome ist bei Rachitis geradezu selten, und es liegt daher kein Grund vor, beide Krankheitsprocesse zusammenzuwerfen. Viel eher dürfte an eine Abhängigkeit der Rachitis von hereditärer Syphilis zu denken sein, wie Wegner (Berl. klin. Wochenschr. 1870. No. 22 u. f.), auf Grund anatomischer Untersuchungen wahrscheinlich gemacht hat.

Symptome und Verlauf. Der Anfang der Rachitis lässt sich schwer bestimmen, weil gewöhnlich Erkrankungen der Eingeweide mit denen der Knochen zugleich auftreten, deren Symptome vor und neben der letzteren zur Geltung kommen. Meist lässt sich eine Reihe von Vorboten erkennen, welche man auch als die erste Periode der Krankheit zusammenfasst; Traurigkeit, Mattigkeit, Abneigung gegen alle Bewegungen, wirkliche Schwierigkeit letztere auszuführen. Vermögen die Kinder bereits über ihre Empfindungen Ausdruck zu geben, so klagen sie über Schmerzen in den Gelenken und nach dem Verlauf der Röhrenknochen. Sie sind schwach, schwitzen bei der geringsten Anstrengung, auch während des Schlafes auffallend stark; ihr Gesicht ist blass, ihre Haut fast immer feucht, und oft treten

Fieberbewegungen auf; der Puls ist dabei voll und weich, das Venensystem stark entwickelt. Zuweilen ist ihr Appetit schlecht, oft vorzugsweise auf Amylacea oder saure Speisen gerichtet, der Durst sehr beträchtlich, und in der Regel besteht Diarrhöe mit Meteorismus. Viele rachitische Kinder jedoch verlieren niemals den Appetit, haben keine Diarrhöe und keinen Meteorismus; aber fast alle magern ab, wenn sie auch Anfangs noch ein starkes Fettpolster besitzen, sie werden blass und entleeren viel Harn, in welchem sich nach dem Erkalten ein reichlicher Bodensatz (s. pag. 571) findet. Alle diese Erscheinungen können nur wenige, oder auch mehrere Monate lang fortbestehen. — Ist die Rachitis auf einzelne Knochen, besonders auf diejenigen der unteren Extremitäten beschränkt, so kann die Verkrümmung derselben sich entwickeln, ohne dass irgend welche Vorboten, oder Störungen des Allgemeinbefindens sich einstellen.

Mit dem Auftreten der Verkrümmung beginnt die zweite Periode. Anschwellungen der Gelenk-Enden, Verbiegungen und Verdrehungen der mannigfaltigsten Art, oft zahlreiche Fracturen oder Infracturen werden an dem Skelet in dieser Periode beobachtet. Als Beispiel betrachten wir Fig. 76, das Skelet eines älteren Individuums, welches besonders an den unteren Extremitäten und an der Wirbelsäule die höchsten Grade der Verkrümmung zeigt. An allen Gelenken sind hier die Epiphysen aufgetrieben, — daher die Ausdrücke „Zweiwuchs“, „doppelte Glieder“. Die Rippenknorpel, welche für die Rippen die Rolle der Epiphysen spielen, sind an der Verbindungsstelle mit der Rippe knotig aufgeschwollen. Tritt diese Anschwellung an allen oder doch an vielen Rippenknorpeln zugleich auf, so entsteht dadurch der „rachitische Rosenkranz“.

Gewöhnlich beginnt die Anschwellung der Epiphysen an den unteren Extremitäten, besonders am Kniegelenk, wodurch Tibia und Fibula, und etwas später das Oberschenkelbein verkrümmt werden. Demnächst folgen die unteren Epiphysen der Vorderarmknochen, das Becken, die Rippen, die Wirbelsäule, Schulterblatt und Schlüsselbein, zuletzt die Kopfknochen. Jedoch finden sich viele Ausnahmen von dieser Regel; die Reihenfolge kann eine ganz andere sein, namentlich werden Rippen und Schädel nicht selten lange vor den Extremitätenknochen befallen. Die Störungen des Allgemeinbefindens dauern inzwischen, wenn sie überhaupt vorhanden waren, in derselben Weise weiter fort, insbesondere die Schmerzhaftigkeit aller Bewegungen, die Diarrhöe und das Fieber. Nicht selten zeigen die Kranken in Uebereinstimmung mit ihrem absolut oder relativ grossen Kopfe eine auffallend entwickelte Intelligenz. Zuweilen aber werden sie wasser-

Fig. 76.



köpfig und häufig stupid¹⁾. Die Dauer dieser Periode schwankt zwischen 1 und 3 Jahren.

Die dritte Periode ist diejenige der Heilung, insbesondere der Wiederherstellung der Festigkeit der Knochen. Die Störungen der Verdauung und demnächst auch der Ernährung schwinden allmählig, die Kräfte kehren zurück, die ganze Ausbildung des Körpers schreitet vorwärts, die Muskeln erhalten ihre Kraft, die Knochen ihre

¹⁾ Eine ausgezeichnete Schilderung und Erläuterung des psychischen Verhaltens rachitischer Kinder findet sich in Stiebel's „Bickets“. Vgl. pag. 563.

Festigkeit; gewöhnlich werden letztere sogar durch Sklerose fester und härter als im normalen Zustande. Verkrümmungen und Auftreibungen der Gelenk-Enden können schwinden, ohne Zuthun der Kunst. Ob und wie hierbei die wiedererwachende Thätigkeit der Muskeln mitwirkt, ist noch nicht genauer nachgewiesen. Statt dieses glücklichen Ausgangs bietet das Ende der dritten Periode häufig ein trauriges Bild dar. Obgleich die Biegsamkeit der Knochen allmählig aufhört, magern die Kranken doch immer mehr ab und gehen, unter fortdauernden Verdauungsstörungen allmählig abzehrend, zuweilen auch wasserüchtig zu Grunde. In anderen Fällen schleppen sie ihre traurige Existenz noch lange Zeit fort, aber ohne dass die Verkrümmungen schwinden, zuweilen unter Vermehrung derselben, nicht selten auch unter Zurückbleiben eines hohen Grades von Brüchigkeit.

Ein besonders ausgeprägtes Beispiel von hartnäckig andauernder Rachitis mit letalem Ausgange hat C. O. Weber beschrieben (*Enarratio consumptionis rachiticae etc.*, Bonn, 1862). Es handelte sich um ein 22jähriges Mädchen, bei der die Krankheit im 7ten Jahre begonnen hatte.


Varietäten. Die Rachitis kann in eine acute und chronische Form, in eine allgemeine und partielle (locale), dann aber, je nach dem Körpertheile, welchen sie befällt, in Rachitis der Wirbelsäule, der Brust, der Extremitäten-Knochen u. s. f. eingetheilt werden. Man unterscheidet ferner die Rachitis des Fötus und diejenige des Kindes.

Die Rachitis des Fötus ist ausgezeichnet durch ihren eigenthümlichen Einfluss auf die Diaphysen der Röhrenknochen, während sie (im Gegensatz zu der Rachitis des Kindes) die Epiphysen gar nicht oder fast gar nicht ergreift. An allen Röhrenknochen sieht man Anschwellungen und Einschnürungen, die das Ansehen haben, als wären unregelmässige Ringe über einander gelegt, wobei die Knochen zuweilen ihre normale Richtung behalten, zuweilen an einzelnen Stellen eingeknickt und verbogen erscheinen.

Fig. 77 (auf pag. 568) zeigt einen rachitischen Fötus, welchen Chaussier (*Bullet. de l'école de médecine*, 1813. No. 3. Tom. I. pag. 301) beschrieben hat. Die Anschwellungen sind, nach Guersant (*Dictionn. en 30 vol., nouv. édit. Tom. II. pag. 168*), durch compactes Knochengewebe gebildet, in dessen Mitte der Markcanal unterbrochen zu sein scheint. Da, wo die Einschnürungen bestehen, findet sich im Gegentheil eine nur sehr dünne Schicht von brüchiger Substantia spongiosa. Solche durchaus verschieden beschaffene Knochen-Abschnitte grenzen unmittelbar an einander. Man sieht hier an demselben Knochen die beiden Ausgänge des höchsten Grades der Rachitis, bleibende Osteoporose und Sklerose neben einander. Wahrscheinlich sind die aufgetriebenen Knoten an der Stelle früherer Fracturen oder Infracturen durch üppige Callusbildung entstanden.

Die anatomische Untersuchung liefert verschiedene Resultate, je nach der Periode, aus welcher der rachitische Knochen herrührt.

Fig. 77.



In der ersten Periode der Krankheit findet man ein wässriges, blutiges, selten eiteriges (H. Meyer) Exsudat zwischen dem Periost und dem Knochen, ferner im Markcanal, in den Zellen der Substantia spongiosa, kurz überall in der Umgebung der Knochensubstanz und am Reichlichsten an denjenigen Stellen, an welchen der Knochen am Gefässreichsten ist. Man hat diese Exsudate auch unter dem Namen des „rachitischen Saftes“ zusammengefasst, wodurch jedoch leicht eine irrige Vorstellung veranlasst werden kann, da es sich keineswegs um eine besondere Absonderung, sondern um eine gesteigerte Transsudation von Plasma handelt. — In der zweiten Periode erfolgt zwischen Periost und Knochen, scheinbar aus diesem Exsudat, Neubildung von Bindegewebe, von Knorpel, auch von lockerer, spongöser Knochensubstanz, während die normale Bildung der Substantia compacta, welche vom Periost aus erfolgen soll, durch die Interposition des Exsudats zwischen Knochen und Periost gehindert, die bereits gebildete normale Rindensubstanz (wie bei gesunden wachsenden Knochen) sehr schnell porös wird und, da neue compacte Schichten vom Periost her nicht geliefert werden können, so vollständig in die spongöse Knochensubstanz übergeht, dass nur eine höchst dünne Schicht derselben an ihrer früheren Peripherie übrig bleibt. Ferner wird aber auch das Wachstum

und die Verknöcherung der fötalen Knorpelanlage beeinträchtigt. In derselben erfolgt zwar die Bildung von Markräumen durch Zusammenfließen der Knorpelhöhlen (Chondroporose), auch die Umwandlung von Knorpelzellen in Knochenkörperchen, aber keine Ablagerung von Kalksalzen, keine Verknöcherung. Der Knorpel wird „osteoid“, aber er wird nicht zu Knochen (Virchow). Das Ausbleiben der Verknöcherung in den Epiphysen bedingt eine wahre Biagsamkeit derselben; insbesondere können sie durch Druck, wie er z. B. auf die Epiphysen im Kniegelenk durch die Schwere des Rumpfes bei aufrechter Stellung ausgeübt wird, zusammen und gleichsam in die Breite gedrückt werden. Vielleicht erfolgt durch einen seitwärts wirkenden Druck, wie z. B. beim Caput femoris, eine Verschiebung der Epiphyse (H. Meyer). Die spongiöse Beschaffenheit des Mittelstücks der Röhrenknochen veranlasst eine wahre Brüchigkeit derselben. Dies kann theils durch einen directen Versuch erwiesen werden, theils ergibt es sich aus der Beobachtung zahlreicher, durch einen mehr oder weniger festen Callus geheilter Fracturen und Infracturen in den Diaphysen der Röhrenknochen. Giebt es daher auch Fälle, in denen die Annahme einer wirklichen Verbiegung im Mittelstück eines Röhrenknochens nicht ganz zurückgewiesen werden kann, wie Fig. 78, so beruht doch die Mehrzahl rachitischer Verkrümmungen der Diaphyse auf Infracturen, Brüchen innerhalb des unversehrten Periosts, zu denen durch den vorwaltend spongiösen Bau der Diaphyse Veranlassung gegeben wird.

Fig. 78.



Am Schädel spricht sich die Rachitis durch grosse Weite der Fontanellen und Nähte aus, indem an diesen, dem Epiphysenknorpel analogen Stellen die Verknöcherung ausbleibt und die Knochenränder durch eine beträchtliche Schicht blutreicher, höchst poröser Knochensubstanz verdickt und vergrössert werden, während der mittlere Theil eines jeden Knochens von einer solchen Auflagerung frei bleibt und im Gegentheil durch fortschreitende Resorption immer dünner und biegsamer wird. Dies sind die Veränderungen, welche Elsässer bereits unter dem Namen des weichen Hinterkopfes, da sie am Hinterhaupte vorzugsweise auftreten, richtig beschrieben hat. Durch die spongiöse Wucherung der Knochenränder und das Ausbleiben der Verknöcherung der Nähte wird die auffallende Grösse des rachitischen Schädels erklärlich (vgl. Fig. 77).

In der dritten Periode findet man die erwähnten Fracturen entweder unverändert, oder durch festen Callus geheilt, welchen man früher mit Exostosen verglichen, auch wohl als solche beschrieben hat. Auch das schwammige Knochengewebe kann nachträglich sklerosiren und somit der Knochen schliesslich eine grössere Festigkeit erlangen, als im normalen Zustande. Wenn Heilung erfolgt, so verknöchern die bis dahin biegsamen Epiphysenknorpel.

C. O. Weber (l. c.) fand bei der Section des pag. 567 erwähnten Mädchens 67 Fracturen und zahlreiche Infraktionen; an mehreren Stellen liessen die Knochen sich biegen. Die mikroskopische Untersuchung lehrte, dass nicht blos die von Virchow beschriebenen Wachstumsstörungen eingetreten, sondern dass auch bereits fertig gebildete Knochensubstanz wieder porös und biegsam geworden war. Das übermässig entwickelte, gallertige Knochenmark enthielt fast kein Fett, dagegen Milchsäure. Der Fall wäre hiernach vielleicht als ein Uebergang von Rachitis in Osteomalacie zu deuten.

Die bleibenden Difformitäten, welche durch Rachitis bedingt werden, lassen sich, nach R. Volkmann, in folgender Weise übersichtlich zusammenstellen.

1) Verschiebung (Abbiegung) von Epiphysen kommen in besonders hohem Grade an den Rippen vor, in geringerem sehr häufig an den Extremitäten, namentlich am Knie (*genu varum* und *valgum*).

2) Verbiegungen erweichter Diaphysen durch Belastung oder Muskelzug, sowohl an den Beckenknochen als an den Extremitäten, stellen immer nur sehr flache und gleichmässig gewölbte Bogenlinien dar.

3) Einknickungen (Infraktionen) bedingen die bedeutenderen Deformitäten an den Gliedmassen, namentlich solche von mehr winkliger Gestalt. Hierher gehören alle höheren Grade der „Säbelbeine“.

4) Vollständige Fracturen kommen selten und nur in der Heilungsperiode vor, ohne sich von den an gesunden Knochen beobachteten zu unterscheiden.

Form und Richtung der Deformität (Dislocation) sind übrigens äusserst wechselnd, namentlich an den Extremitäten keineswegs immer symmetrisch. Am Thorax tritt ziemlich constant eine seitliche Ablachung durch Streckung der Rippenbogen auf, so dass das Brustbein kielförmig hervorsteht (*pectus carinatum*, Hühnerbrust); viel seltener tritt das Gegentheil ein. Die mannigfaltigsten Verkrümmungen zeigt die Wirbelsäule (vgl. Bd. IV.). Die Veränderungen am Kopf wurden schon erwähnt. Die Deformitäten des Beckens entziehen sich im kindlichen Alter der Beobachtung und finden in der Geburtshilfe ihre besondere Würdigung.

Chemische Untersuchung. Den anatomischen Verhältnissen des rachitischen Knochens entsprechend, hat man auch beträchtliche Abänderungen der chemischen Zusammensetzung voraussetzen zu müssen geglaubt. Bostock fand, dass der Gehalt an phosphorsaurem Kalk, der (nach Bostock) im normalen Zustande $\frac{1}{3}$ des Gewichtes des Knochens ausmachen soll, bis auf $\frac{1}{5}$ vermindert war. Aber Bequerel fand grosse Verschiedenheiten in der chemischen Zusammensetzung rachitischer Knochen, nicht blos bei verschiedenen Individuen, sondern auch je nach der Gegend, aus welcher der

Knochen genommen war. Ein Kind von $2\frac{1}{2}$ Jahren, welches zu Anfang der dritten Periode der Rachitis an Pneumonie gestorben war, lieferte in 1000 Theilen Schädelknochen: 352 Wasser, 357 organische Substanz, 291 Kalksalze, so dass also letztere etwa $\frac{1}{3}$ ausmachten, während sich in dem Os femoris desselben Skelets auf 1000 Theile: 414 organische Substanz, 528 Wasser und 58, also fast nur $\frac{1}{18}$ an Kalksalzen vorfand. Bei einem 3jährigen Kinde, welches unter gleichen Verhältnissen gestorben war, zeigte sich eine noch grössere Differenz; die Schädelknochen enthielten ungefähr $\frac{1}{4}$, die Tibia $\frac{1}{30}$ und das Sternum blos $\frac{1}{50}$ an Kalksalzen.

Sollen die chemischen Analysen rachitischer Knochen wirklich Bedeutung gewinnen, so müsste vor Allem die Zusammensetzung der einzelnen Knochen in den verschiedenen Perioden der Krankheit immer nur mit derjenigen derselben Knochen aus demselben Lebensalter im normalen Zustande verglichen werden. Die Verschiedenheit der einzelnen Schichten eines rachitischen Knochens ist so gross, dass es sogar nothwendig wäre, bei der chemischen Analyse auch die compacte Substanz des ursprünglichen Knochens von der aussen aufgelagerten spongiösen Substanz, und diese wieder von dem, zwar von Markräumen durchzogenen, aber kalklos gebliebenen Epiphysenknorpel zu sondern.

Einen weiteren Anhaltspunkt hat man von chemischer Seite in der Untersuchung des Harns zu gewinnen gesucht. Im Allgemeinen ist phosphorsaurer Kalk in dem Harne rachitischer Kinder in viel grösserer (etwa der vierfachen) Menge vorhanden, als im normalen Kinderharn. Man hat ferner ausserordentlich viel Milchsäure und auch Oxalsäure in ihm nachgewiesen. Phosphorsaures Natron scheint gleichfalls in relativ grösserer Menge ausgeschieden zu werden. Jedoch sind alle diese Analysen noch unzureichend; sichere Schlüsse auf das Wesen der Krankheit werden erst möglich sein, wenn durch grössere Untersuchungsreihen die Menge der täglichen Ausscheidung von Kalk- und anderen Salzen, so wie des Säuregehalts bei rachitischen und gleichaltrigen, auch in gleicher Weise ernährten, gesunden Kindern festgestellt ist.

Wollen wir aus den vorstehenden Thatsachen über das Wesen der Rachitis eine Ansicht zu gewinnen suchen, so müssen wir zunächst die Idee von einer Erweichung des schon gebildeten Knochens ganz ausschliessen. Es handelt sich um eine Hemmung der normalen Knochenbildung und des normalen Knochenwachstums, wobei die in ihrer Structur zur Verknöcherung vorbereiteten Theile die zur Vollendung derselben erforderlichen Kalksalze nicht in sich aufnehmen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Störung der Knochenbildung auf der eigenthümlichen Beschaffenheit der die Verknöcherung gleichsam erwartenden Theile beruhe, da bei der Hei-

lung der Rachitis und zum Theil sogar während ihres Bestehens in jenen Theilen, welche auf der Höhe der Krankheit weich bleiben, Kalkablagerung ohne Weiteres erfolgt. Wahrscheinlich also liegt der Grund in der Beschaffenheit des Blutes, wie man sie schon seit Glisson chemisch nachzuweisen, sich vergeblich bemüht. Sehr nahe liegt es, zu vermuthen, dass entweder vermehrte Ausscheidung der Kalksalze durch den Harn, oder verminderte Zufuhr derselben durch die Nahrungsmittel die Schuld tragen. Wie wenig wir über erstere im Klaren sind, wurde bereits bemerkt. Was die zu geringe Zufuhr von Kalksalzen betrifft, so muss vor Allem festgehalten werden, dass es sich hierbei wahrscheinlich nicht bloß um ein gewisses Quantum von Knochenerde, welches in den Körper eingeführt werden müsste, sondern auch um bestimmte Verbindungen derselben mit organischen Substanzen (Albuminate) handelt, da voraussichtlich nur in dieser Form und Verbindung ihr Uebergang in das Blut oder doch ihre Verwendung zur Ernährung (insbesondere der Knochen) möglich ist. Hiermit stimmt denn auch die Erfahrung überein, dass Rachitis nur bei unzureichend ernährten Kindern auftritt, besonders bei solchen, die durch den zu frühen oder ausschliesslichen Genuss der Amylacea häufig oder gar fortdauernd an saurer Gährung in ihren Verdauungsorganen leiden, welche eine Reizung und Entzündung der Darmschleimhaut zur Folge hat. Enthalten nun jene Amylacea schon an und für sich — wie dies für sehr viele, besonders für Kartoffeln, gilt — ein unzureichendes Quantum von Kalkalbuminaten; so muss die Verarmung des Blutes an letzteren auf das Aeusserste gesteigert werden, wenn die erwähnte saure Gährung eine chronische Entzündung der Darmschleimhaut veranlasst, durch welche die Resorption des Speisebreies gehindert wird. In dieser Beziehung darf nochmals darauf hingewiesen werden, dass gerade zur Zeit der Dentition und des Zahnwechsels Rachitis sich vorzugsweise zu entwickeln pflegt; besonders zur Zeit der ersten Dentition treffen die beiden angedeuteten Momente zusammen: 1) stärkerer Verbrauch an kalkhaltigem Ernährungsmaterial Seitens der emporwachsenden Zähne, 2) entzündliche Reizung und somit verminderte Resorption auf der Darmschleimhaut.

Die **Behandlung** der Rachitis ist theils eine diätetisch-pharmaceutische, theils eine mechanische. Von inneren Mitteln sind am Meisten empfohlen: die roborirenden, tonischen, auch die Tonica excitantia und die Kalkpräparate. Man wird durch sie allein aber niemals etwas ausrichten, wenn die Diät und die übrigen Lebensverhältnisse des Patienten nicht gehörig geregelt werden können. Leicht verdauliche, nahrhafte Kost, gute Milch, Fleischbrühe, kleine Gaben

guten süßen Weins, Aufenthalt und Bewegung in freier Luft, an sonnigen, trockenen Orten, sind zur Bekämpfung der Rachitis von grösserem Nutzen, als alle Tonica der Pharmakopoe. Auch der, mit rationeller Begründung empfohlene phosphorsaure Kalk hat den von ihm gebegten Erwartungen nicht entsprochen. Zufuhr des Kalkes in den Darm ist erst eine Bedingung zu seiner Aufnahme in's Blut. Dem gereizten Zustande der Darmschleimhaut möchten Kalkwasser (mit Milch gemischt) und kohlensaurer Kalk (*Conchae praeparatae*) noch mehr entsprechen. Mit vielem Erfolge hat man Bäder, besonders Salzbäder, zur Behandlung der Rachitis in Gebrauch gezogen. — Alle im Verlauf der Rachitis auftretenden acuten Krankheiten sind für sich mit grösser Sorgfalt zu behandeln.

Die mechanische Behandlung der Rachitis wurde zu Anfang dieses Jahrhunderts von Boyer, Richerand, A. Cooper gänzlich verworfen. Delpsch hat am Meisten dazu beigetragen, diese Ansicht zu verdrängen, und jetzt werden rachitische Verkrümmungen ganz allgemein mechanisch behandelt. Bei leichter Verbiegung kann man sich auf das Anlegen von Schienen während der Nacht beschränken, so dass die Patienten bei Tage sich frei bewegen. In manchen dieser Fälle, welche bei guter Diät und Pflege schnell heilen, bedarf es einer mechanischen Behandlung gar nicht, namentlich bei den „flachen Säbelbeinen“. Bei bedeutender Verkrümmung sind permanent wirkende Maschinen oder Verbände nothwendig. Durch einen gut angelegten Gypsverband werden auch die vorzüglichsten Maschinen übertroffen. Da die Mehrzahl der Verbiegungen, besonders der langen Knochen, auf Infracturen beruht, müssen wir auch eine möglichst frühzeitige mechanische Behandlung, ganz nach den bei den Fracturen gegebenen Vorschriften, empfehlen. Ein frühzeitig angelegter Verband kann die Verbiegungen in der Mitte der Röhrenknochen ganz verhüten oder doch beschränken.

Wenn die eingeknickten oder verkrümmten Knochen bereits durch Callusbildung und Sklerose zu einem die Norm übersteigenden Grade von Festigkeit gelangt sind, so kann von blossen Verbänden und Maschinen kein Nutzen für die Wiederherstellung ihrer Form mehr erwartet werden. Die Behandlung muss dann dieselbe sein, wie bei einem schlecht geheilten Knochenbruche (vgl. pag. 361 u. f.). Wenn die Verhältnisse der Verkrümmung es gestatten, so ist das Zerbrechen des difformen Knochens allen anderen Methoden vorzuziehen, da es jedenfalls weniger gefährlich ist, als das Durchschneiden des Knochens (welches am Besten als subcutane Osteotomie in der von B. v. Langenbeck angegebenen Weise ausgeführt wird)

oder das Aussägen eines keilförmigen Knochenstückes, welches schon von Mayer (in Würzburg) bei diesen und ähnlichen Verkrümmungen mit glänzendem Erfolge vorgenommen wurde¹⁾.

Drittes Capitel.

Neubildungen an und in den Knochen.

Die nach dem Typus des normalen Knochengewebes sich entwickelnden knöchernen Geschwülste, welche an und in den Knochen vorkommen, die Exostosen, sind bereits Bd. I. pag. 408 u. f. beschrieben worden. Auch das Chondrom der Knochen, der Osteoid-Krebs und das osteoide Sarcom fanden dort pag. 399 u. f., pag. 513 u. f. und pag. 571 ihre Erläuterung. Aber es kommen am Skelet auch fast alle anderen (nicht-knöchernen) Arten der Geschwülste vor (mit Ausnahme der Lipome), bald peripherisch am Knochen, bald central in ihm entwickelt; im ersteren Falle zwischen Periost und Knochen, meist von einer verknöcherungsfähigen Periostkapsel umhüllt, im letzteren hauptsächlich vom Mark ausgehend, regelmässig von einer mehr oder weniger dicken, auf späteren Stadien immer sehr verdünnten, hie und da durchbrochenen Knochenkapsel umgeben, welche nicht auf einer „Expansion“ des Knochens beruht, sondern auch wesentlich vom Periost geliefert wird, während das vorher unter der reizenden Einwirkung der wachsenden Geschwulst vielleicht sklerosirte Gewebe des Knochens selbst allmähig ganz schwindet. Diese Bildung von Knochenkapseln um Geschwülste hat in alter Zeit zu der Benennung „Winddorn, Spina ventosa“ Veranlassung gegeben²⁾. Da man früher nur die macerirten und getrockneten Knochen zu untersuchen pflegte, fand man in den Kapseln nur Luft (Wind). Dupuytren hat diese irrthümliche Auffassung erneuert, indem er, die Knochenkapsel für das Wesentliche haltend, die verschiedenartigsten Geschwülste als Knochenysten zusammenfasste und daher denn auch Knochenysten mit flüssigem und solche mit festem Inhalt unterschied.

Fig. 79 zeigt eine solche Knochenyste, deren Inhalt unbekannt geblieben ist, aus dem Dupuytren'schen Museum in Paris.

Sind die Knochenkapseln nicht zu dick und anderer Seits noch widerstandsfähig genug, so entsteht beim Betasten derselben das sogen.

¹⁾ Vgl. *Illust. med. Zeitung* 1852, Bd. II. Heft 7 u. f. — Vgl. pag. 362 u. f.

²⁾ Derselbe Name ist auch für Fälle von chronischer Osteomyelitis an Phalangen- und Metacarpalknochen, welche zu deren Auftreibung führen, benutzt worden und zum Theil noch in Gebrauch. Vgl. pag. 542, sowie auch Bd. IV.

Pergamentknittern, indem durch den Fingerdruck die dünne Knochenlamelle, wie ein Stück Pergament oder Blech, eingedrückt wird und beim Nachlass des Drucks wieder hervorspringt. Unter zu starkem Druck knickt das Knochenblatt, wie eine Eischale, mit knisterndem Geräusch ein. Auch durch andere Gewalten können Brüche dieser Kapseln in mehr oder weniger grossem Umfange, an Röhrenknochen oft, bei geringfügiger Gewalt, bis zur völligen Unterbrechung der Continuität zu Stande kommen. Die Rarefaction (Atrophie) des Knochens kann aber auch, ohne dass es zur Bildung einer Knochenkapsel kommt (namentlich bei malignen Tumoren), soweit fortschreiten, dass „fast von selbst“ (spontan) eine Fractur entsteht. Vgl. pag. 320. Die Mehrzahl der vom Knochen ausgehenden Geschwülste zeigt, wenn es auch nicht zur Bildung von Knochenkapseln kommt, doch grosse Neigung zur Entwicklung von Knochengewebe, namentlich in Form von Schwämmen und Nadeln, die mit ihrer Basis an dem Mutterknochen haften.

Fig. 79.



Die Entscheidung darüber, ob eine Geschwulst vom Knochen ausgehe, ist oft schwierig. Tief sitzende Tumoren der Weichtheile, namentlich unter starken und straff gespannten Fascien, ergeben denselben Befund, wie die am Knochen selbst haftenden. Der Knochen bewegt sich bei dem Versuche, die Geschwulst zu bewegen, hier wie dort mit, und die Geschwulst lässt sich in beiden Fällen nicht isolirt verschieben. Genaue Erwägung des ursprünglichen Auftretens und des Entwicklungsganges der Geschwulst liefert in manchen Fällen, jedoch auch nicht immer, die Entscheidung. Jedenfalls muss man beim Beginne einer Operation, durch welche ein Tumor entfernt werden soll, der am Knochen zu haften scheint, darauf gefasst sein, dass derselbe vom Knochen ausgehe, und dass somit eine partielle oder totale Entfernung des Knochens nothwendig werden kann.

I. Fasergeschwulst, Fibroma.

Fibrome wurden besonders in und an schwammigen Knochen, den Gelenk-Enden der Röhrenknochen, den Wirbeln, den Phalangen der Finger, den Schädelknochen, den Kiefern und den Beckenknochen beobachtet. Bald haben sie ihren Ursprung inmitten der Knochen-substanz, bald sind sie nur umgrenzte Auswüchse, Wucherungen des Periost, wie z. B. die von der Schädelbasis ausgehenden Schlundpolypen, die fibröse Epulis, welche von dem Alveolarrande des Kiefers und von dessen Periost ausgeht und das Zahnfleisch nur vor sich her schiebt. Die Basis der Fibrome, welche dem Knochen aufsitzen, ist sehr häufig mit knöchernen Auswüchsen durchwebt, während die innerhalb des Knochens sich entwickelnden Fasergeschwülste von Resten des alten, erkrankten Knochens durchsetzt werden, so dass die Knochen-substanz wie auseinandergesprengt erscheint.

Die **Diagnose** der Knochenfibrome bietet, wenn sie nicht etwa, wie im Pharynx, frei zu Tage treten, Schwierigkeiten dar; denn ihrer Consistenz nach, sind sie vor der vollständigen Blosslegung weder von Chondromen noch von Exostosen zu unterscheiden, von ersteren oft erst bei genauerer anatomischer Untersuchung. Practische Bedeutung haben diese Unterscheidungen zum Glück meist nicht.

Die **Behandlung** muss, wo möglich, in der Exstirpation mit Erhaltung des Knochens, an dem oder in dem das Fibrom sitzt, bestehen. Ist dasselbe von einer Knochenkapsel umschlossen, so soll man diese eröffnen und die Geschwulst mit hebelartigen Instrumenten herausbefördern oder, wenn sie fester sitzt, mit starken Zangen herausreißen, wobei man aber der totalen Entfernung nicht ganz sicher ist und daher, um Recidive zu verhüten, nach der mechanischen Entfernung der Geschwulst noch das Glüheisen anzuwenden empfiehlt. Besser ist es in solchen Fällen, wenn die Localität es irgend gestattet, das ganze kranke Knochenstück durch Resection zu entfernen. Durch grosse Osteofibrome an den Extremitäten kann man genöthigt werden, zu amputiren.

II. Cysten.

Knochen-Cysten sind selten, können aber in allen Knochen vorkommen, besonders in den Knochen des Gesichts (öfter im Unterkiefer als im Oberkiefer), im Os parietale, in der oberen Wand der Augenhöhle, im Femur, in den Beckenknochen.

Schuh sah Knochen-Cysten einmal an der Stirn, zweimal in einem Zahofache (Hydrops alveoli), wo sie auch Bowman (vgl. Canstatt's Jahresber. für 1851, Bd. IV. pag. 201) beobachtete, einmal am Oberkiefer.

Wie bei anderen Cysten, so müssen auch hier die verschiedenen Entstehungsweisen berücksichtigt werden; manche sind zu den erweichten Chondromen, Myxomen u. s. f. zu rechnen, andere als Hydrops der im Knochen vorhandenen Höhlen zu betrachten, für noch andere sind besondere, durch die localen Verhältnisse bedingte Entstehungsweisen wahrscheinlich gemacht. So hebt Bowman z. B. hervor, dass die Cysten der Alveolen genau an der Vereinigungsstelle des Zwischenkiefers mit dem Oberkiefer vorkommen und einen Theil des Knochens wie eine Schale vor sich hertreiben, mithin vielleicht als *Vitia primae formationis* zu betrachten sind.

Nach der Beschaffenheit ihrer inneren räumlichen Verhältnisse theilt man die Knocheneysten ein in einkammerige und mehrkammerige; aber auch die einkammerigen Cysten sind, wenn sie zwischen Periost und Knochenoberfläche entstanden, an ihrer Basis bisweilen von Knochenadeln durchsetzt und von einem aufgeworfenen, zackig-unebenen Knochenrande umgeben, in Folge der, durch die Zerrung der Knochenhaut bedingten, schleichenden Entzündung. — Das Volumen ist höchst verschieden, bis zu der Grösse einer Faust und darüber. Die multiloculären Cysten, deren Höhle durch knöcherne Scheidewände in abgeschlossene oder communicirende runde Räume getheilt ist, haben ein ganz unbegrenztes Wachsthum.

Symptome und Verlauf. Im Anfange scheinen die Knocheneysten schmerzlos oder doch wenig schmerzhaft zu sein. Allmählig macht sich eine unbewegliche knöcherne Geschwulst bemerkbar, die mit weiterer Zunahme ihres Volumens, jedoch relativ früh, eine gewisse Compression zulässt und das oben erwähnte Pergamentknittern darbietet. Weiterhin kann die verdünnte Knochenschale an einzelnen Stellen ganz schwinden. Dann drängt die Flüssigkeit das Periost und die Weichtheile vor sich her; man entdeckt Fluctuation, vielleicht auch den die fluctuirende Stelle umfassenden Knochenrand. Die bedeckenden Weichtheile bleiben lange verschiebbar, bis endlich durch die Dehnung in der Umgebung der Cyste Entzündung entsteht. — Je nach der Oertlichkeit variiren die übrigen Symptome: durch Cysten an den Kiefern wird die Sprache, das Kauen und Schlucken behindert; die cystisch erkrankten Knochen der unteren Extremitäten können das Körpergewicht nicht mehr tragen, sie brechen zuweilen sogar bei einer Bewegung im Bette. — Das Wachsthum, im Allgemeinen langsam, wird bisweilen plötzlich auffallend schnell. Manche Knocheneysten erreichen in wenigen Monaten ein enormes Volumen, während wieder andere Jahre lang stationär bleiben. Nach einer Probepunction sah man den flüssigen Inhalt sich immer bald wieder

ergänzen. Jedoch können, nach Dupuytren, die Wandungen knöcherner Cysten nach der Entleerung des Inhalts auch allmählig zusammensinken und unter nachfolgender Eiterung vollständig verwachsen.

Die **Prognose** ist bei genuinen Cysten relativ günstig. Ist die Knocheneyste das Product eines anderweitigen Pseudoplasma, so ist die Prognose des letzteren auch maassgebend für die der Cyste. Im Uebrigen ist dieselbe abhängig von dem Sitze der Geschwulst und von den sonstigen Gesundheitsverhältnissen des Patienten. Multiloculäre Cysten sind wegen ihres bedeutenden Volumens und wegen der Schwierigkeit, die einzelnen Hohlräume zu entleeren, schwieriger zu heilen, müssen wohl auch sich ganz überlassen bleiben, oder können doch nur mit Verlust des Knochenstückes, in welchem sie sitzen, oder der ganzen Extremität beseitigt werden.

Für die **Behandlung** der genuinen Cysten empfiehlt Dupuytren folgendes Verfahren. Man macht eine Probepunction, um sich von der Beschaffenheit des Cysteninhalts zu überzeugen, dann einen Einschnitt über den grössten Durchmesser der Geschwulst, — an den Kieferknochen womöglich von der Schleimhaut aus, sonst aber da, wo die Wandungen am Meisten verdünnt und nachgiebig sind. Um vollständige Entleerung des Cysteninhalts zu bewirken, ist bisweilen die Excision eines Theiles der Cystenwand mit dem Messer, dem Meissel, einer Säge, oder einer Trepankrone erforderlich. Die weitere Behandlung hängt ab von der Beschaffenheit des Cysteninhalts und der denselben producirenden Cystenwand. Um Eiterung oder Zerstörung der inneren Cystenwand zu bewirken und dadurch die Wiederzeugung der Flüssigkeit zu verhüten, stopft man Charpiekugeln in die Höhle oder macht reizende Einspritzungen. Die Cyste muss beim Wechseln des Verbandes sorgfältig gereinigt werden, um längere Ansammlung und Zerfall des Eiters zu verhüten. Zu diesem Zweck räth Dupuytren, eine Gegenöffnung an dem abhängigsten Theile der Geschwulst zu machen und durch die Cystenöhle ein Haarseil zu ziehen. Gewöhnlich sinkt schon nach dieser Behandlung die Cystenwand zusammen und nach einigen Monaten ist nur wenig von der früheren Geschwulst übrig. Das Zusammensinken der Cystenwände lässt sich durch Compressiv-Verbände beschleunigen. Nie wurden in den zahlreichen, von Dupuytren operirten Fällen bedenkliche Zufälle beobachtet.

Blasenwürmer. Hydatiden. Echinococcen.

Echinococcen-Cysten wurden zwar fast in allen Knochen des menschlichen Skelets, am Häufigsten in der Tibia, nächstem im

Hüftknochen, im Oberarmbein, im Femur, in der Diploë der Schädelknochen¹⁾, im Allgemeinen jedoch sehr selten beobachtet.

Echinococccen-Bälge der Knochen bilden buchtige, von einer weichen, opalisirenden Haut ausgekleidete Höhlen, die mit heller wässriger Flüssigkeit gefüllt sind, in der rundliche Blasen schwimmen, die ganz der Mutterblase gleichen. Das Volumen der Cysten variiert von dem einer Erbse bis zu dem eines Hühnereies und darüber. In einem von Rokitanský beschriebenen Falle war das linke Darmbein in einen Sack von der Grösse einer Mannsfaust umgewandelt. Das Knochengewebe wird, nach Einigen, allseitig verdrängt, so dass eine vollständige Höhle entsteht, deren Wandungen um so dünner sind, je mehr die Höhle sich ausdehnt; Rokitansky fand dagegen „an der inneren Wand des Sackes haftende zahlreiche kleinere und grössere Knochenstücke“, so dass die Knochensubstanz weniger verdrängt als „zertrümmert“ erscheint. Resorption von Knochensubstanz findet aber auch hierbei Statt; der Fall von Rokitansky zeigte „den Boden der Pfanne vollständig aufgezehrt, so dass der Schenkelkopf in einen dessen Stelle vertretenden Acephalocystensack hineinragt.“ Auf dieselbe Weise wird, nach Nélaton, wenn sich die Echinococccen im Markrohre eines langen Knochens entwickeln, zuerst der ganze Markraum von der Neubildung ausgefüllt, sie drängt sich in die Epiphyse hinein, allmählig wird auch der Markraum erweitert und an seinen dünnsten Stellen endlich perforirt, so dass das verdickte Periost und die membranartig ausgespannten Muskeln die Wände der Höhle bilden.

Symptome. Aus den bisherigen Beobachtungen geht nur hervor, dass sich die Echinococccen in den Knochen bald unter fixen, tief-sitzenden Schmerzen, bald ohne diese entwickeln, dass ihr Wachsthum bald sehr langsam ist (sie können Jahre lang stationär bleiben), bald plötzlich so schnell fortschreitet, dass ein operatives Einschreiten dringend erforderlich wird. Auch diese Cysten haben eine mit der Zunahme ihrer Grösse immer dünner werdende Knochenhülle, die beim Druck das bereits erwähnte Pergamentknittern darbietet. In ihrer Umgebung fehlen in der Regel alle Entzündungs-Erscheinungen. Wird die knöcherne Cystenwand durchbrochen, so entsteht unter Hervordrängen der Weichtheile Fluctuation. Nie wurde, nach Nélaton, spontaner Durchbruch nach Aussen beobachtet. Wenn sich Echinococccen in dem Markraume eines Röhrenknochens entwickeln, so entsteht, wegen der Verdünnung der Knochenhülle, leicht plötzlich eine

¹⁾ Vgl. Nélaton, *Eléments de pathologie chirurgicale*, Tom. II. pag. 52.

„spontane“ Fractur. Durchbruch des Echinococcensackes nach einer benachbarten Gelenkhöhle veranlasst Gelenk-Entzündung.

Diagnose. Der Entwicklungsgang solcher Cysten hat nichts Eigenthümliches. Ueber die Beschaffenheit des Inhalts lässt sich nur mit Hilfe des Probetroicart oder durch anderweitige Eröffnung der Cyste Aufschluss erhalten. Namentlich wird man die entleerte Flüssigkeit auf Hakenkränze und Stücke der charakteristisch geschichteten Blasenwände mit dem Mikroskop zu untersuchen haben.

Die **Prognose** hängt von dem Sitz und Grösse der Cyste ab.

Behandlung. Man muss entweder dem weiteren Wachsthum durch Zerstörung der Mutterblase vorbeugen oder den ganzen Knochen hinwegnehmen. Zu ersterem Zwecke wird die Cyste geöffnet, und der Inhalt sorgfältig entfernt. Die Zerstörung der Mutterblase auf mechanischem Wege bietet jedoch, theils wegen ihrer festen Verwachsung mit dem Knochen, theils wegen der vielen Sinuositäten, Schwierigkeiten dar: es bedarf der Anwendung von Aetzmitteln, die mittelst Charpiebäuschen eingeführt werden, oder des Glüheisens. Letzteres wird man in der Nähe von grösseren Höhlen oder wichtigeren Organen nur mit der grössten Vorsicht anwenden dürfen. Die diesem Verfahren folgende Eiterung ist voraussichtlich stark und langdauernd, so dass nur bei guten Kräften ein günstiger Ausgang zu erwarten steht. Die partielle Resection ist deshalb, sofern nur ein Theil des Knochens von der Cyste verdrängt worden ist, vorzuziehen. Hat die Cystenbildung von der Markhöhle her den ganzen Knochen allseitig verdrängt, so bleibt nur die Exstirpation desselben oder die Amputation übrig.

III. Knochen-Aneurysma, pulsirende Knochengeschwulst, Knochen-Haematom. Aneurysma ossium, Osteo-aneurysma.

Das Knochen-Aneurysma ist überaus selten, am Häufigsten aber noch in den Epiphysen der Röhrenknochen, vor Allem in dem oberen Ende der Tibia beobachtet worden.

Richet, welcher jedoch in seinen *Recherches sur les tumeurs vasculaires des os, dites tumeurs fongueuses, sanguines des os* (Archives générales 1864 und 1865) die sogleich zu erwähnende Beobachtung von Carnochan unberücksichtigt lässt, fand in 7 von ihm zusammengestellten Fällen 6 Mal den Sitz des Uebels im oberen Ende der Tibia, 1 Mal im oberen Ende des Humerus. — Der Fall von Carnochan betraf das untere Ende des Femur. Mehr als diese 8 Fälle von Knochenaneurysma sind als sicher constatirt nicht anzusehen. Vgl. Volkmann, l. c. pag. 478.

Besteht die Krankheit schon einige Zeit, so findet man bei der anatomischen Untersuchung innerhalb des Knochens eine un-

regelmässige Höhle, die einer Seits von spongiösem Knochengewebe, anderer Seits von einer sehr dünnen, aus Substantia compacta bestehenden Knochenschale umschlossen wird. Letztere kann stellenweise oder auch gänzlich resorbirt werden, so dass die Continuität des erkrankten Knochens vollständig unterbrochen wird und nur das Periost und die übrigen Weichtheile den Sack des Aneurysma bilden. In Fällen der Art kann die Höhle so gross werden, dass sie mehrere Schoppen Flüssigkeit fasst. Auffallender Weise wird das benachbarte Gelenk von der angrenzenden Geschwulst nicht mit in ihren Bereich gezogen; die Gelenkknorpel und die Synovial-Membran bleiben unversehrt, selbst wenn das Knochengewebe bis unmittelbar an den Gelenkknorpel geschwunden ist. Die aneurysmatische Höhle enthält flüssiges Blut, Gerinnsel und Reste des zerstörten Knochens. Die innere Oberfläche der Höhle gleicht der Uterinfläche der Placenta; sie ist von zahlreichen erweiterten Gefässen durchzogen, aus welchen eingespritzte Flüssigkeiten sich in die Höhle ergiessen; die offenen Mündungen zahlreicher Arterien können sogar mit blossem Auge gesehen werden. Auf der äusseren Oberfläche des Sackes verbreiten sich gleichfalls erweiterte Arterien in grosser Anzahl, während benachbarte grosse Arterienstämme sich durchaus normal verhalten¹⁾.

Nach diesem, durch die Untersuchungen von Scarpa begründeten und in neuester Zeit besonders durch Carnochan²⁾ bestätigten Befunde kann die in Rede stehende Geschwulst auf die anderweitig vorkommenden Formen des Aneurysma nicht zurückgeführt werden. Auch der Versuch, sie als Teleangiectasie (Breschet) oder als Aneurysma anastomosium (Chelius) zu deuten, lässt sich nur in höchst gezwungener Weise durchführen. Dagegen sind mit gewichtigen Gründen mehrere Autoritäten für die Ansicht aufgetreten, dass diese Geschwülste als „gefässreiche Markschwämme“ zu betrachten seien, namentlich Boyer, Rokitansky, zum Theil Lebert³⁾. Die Angaben über anatomischen Befund in den ersten Stadien der Krankheit, welche wir Dupuytren⁴⁾ verdanken, sind dieser letzteren Ansicht günstig. Der Höhlenbildung geht nach seinen Beobachtungen, eine

¹⁾ Breschet und Dupuytren sahen jedoch bei einer „pulsirenden Geschwulst“ der Tibia die Art. tib. recurrens ant., sowie die in den erkrankten Knochen zunächst eindringenden Arterien sehr ausgedehnt, auf gleiche Weise die oberflächlichen und tiefer liegenden Venen auffallend erweitert.

²⁾ Ueber das Aneurysma der Knochen. *Illustr. med. Zeitung*, 1853, Bd. III. pag. 41.

³⁾ *Traité pratique des maladies cancéreuses*, pag. 730. „Was die *Tumeurs érectiles* der Knochen betrifft, so sind dieselben so selten, dass man bei einiger Ungewissheit in der Diagnose gut thun wird, sie für krebsige Geschwülste zu halten.“

⁴⁾ *Leçons orales*, Tom. III. pag. 232 u. f.

Erweichung des Knochengewebes voraus, begleitet von Hämorrhagien wie sie im Krebs- und Sarcom-Gewebe vorkommen. Das weiche, gefässreiche Gewebe von röthlich-gelber Farbe, welches im Beginne des Uebels von Scarpa unter dem verdickten gefässreichen Periost beobachtet worden ist, deutet Dupuytren geradezu als Krebsgewebe. Berücksichtigt man weiter, dass oft mehrere Geschwülste dieser Art an demselben Individuum, niemals aber gleichzeitig mit einer solchen ein Aneurysma der Weichtheile beobachtet worden ist, berücksichtigt man ferner den sogleich näher zu erörternden Verlauf, insbesondere die nach operativer Behandlung dieses Uebels ganz gewöhnlich eingetretenen Recidive; so drängt sich die Ueberzeugung auf, dass es sich in der grossen Mehrzahl der Fälle von sogenanntem Knochen-Aneurysma um gefässreiche, mit grossen hämorrhagischen Cysten durchsetzte Krebse oder Sarcome gehandelt habe. Das wirkliche, nicht krebsige Knochen-Aneurysma, welches als eine höchst seltene Krankheit betrachtet werden muss (vgl. pag. 584), ist weder Teleangiectasie, noch Aneurysma anastomosium. Die einzige Deutung desselben, welche einige Wahrscheinlichkeit hat, ist die von Carnochan gegebene, dass es nämlich durch atheromatöse Entartung der Häute aller Arterien, welche die schwammige Knochensubstanz einer Epiphyse versorgen, bedingt werde, also ein im Knochen eingebetteter, von mehreren Arterien zugleich versorgter, aneurysmatischer Sack sei. Richet legt auf die Ausweitung der Periost-Arterien besonderes Gewicht. Unerklärt bleibt in dem einen wie in dem anderen Falle, weshalb gerade diese Arterien und weshalb nicht auch andere bei demselben Individuum von dem atheromatösen Prozesse befallen werden.

Die schnelle Ausbuchtung einer Knochenhöhle unter dem Einflusse stark pulsirender Gefässe erscheint nicht wunderbar, da wir auch bei den gewöhnlichen Aneurysmen (z. B. beim Aneurysma arcus aortae, am Sternum) dieser Erscheinung begegnen.

Die **Aetiologie** ist dunkel, obgleich jeder Patient als Ursache diesen oder jenen Stoss oder Schlag angiebt.

Symptome. Die Kranken werden durch einen mehr oder weniger heftigen Schmerz auf den Sitz ihres Leidens aufmerksam. Derselbe steigert sich entweder ganz allmählig, oder tritt plötzlich auf (bei einer zufälligen Bewegung) unter einem Gefühl von Krachen an der leidenden Stelle oder in dem benachbarten Gelenke, und bleibt dann lange unverändert bestehen. An dem schmerzhaften Orte erscheint eine oft in wenigen Monaten, selten erst nach längerer Zeit, zu einem bedeutenden Umfange heranwachsende Geschwulst, über welcher die

Haut allmählig geröthet, verdünnt und mit erweiterten Venen durchzogen wird. Diese Geschwulst ist nicht scharf begrenzt, hängt mit dem Knochen zusammen, ist an einzelnen Stellen fluctuirend, an anderen mehr fest, an noch anderen lässt sich bei tieferem Drucke Pergamentknittern oder das Geräusch zerquetschter Eierschalen entdecken. Die Extremität verliert an Kraft, wird in dem der Geschwulst benachbarten Gelenke halb gebeugt und steif; verschiedenartige, bald durchfahrende, bald mehr drückende, immer aber heftige Schmerzen treten auf. Selbst bei noch geringem Umfange zeigt die Geschwulst mit dem Herzschlage isochronische Pulsationen. Comprimirt man den zuleitenden Arterienstamm, so hören die Pulsationen auf, die Geschwulst wird nachgiebiger, und bei der Untersuchung mit den Fingern kann man, sofern die knöcherne Schale schon durchbrochen oder biegsam ist, die Veränderungen am Knochen, besonders die in ihm befindliche Aushöhlung erkennen. Bei der Auscultation hört man, nach Carnochan, sehr deutlich ein mit dem Arterienpulse synchronisches Blase-Geräusch, welches jedoch von Anderen, namentlich von Nélaton¹⁾, nicht vernommen werden konnte, während es in dem Falle von Richet wieder vorhanden war.

Welchen Ausgang diese Geschwülste ohne Zuthun der Kunst nehmen, geht aus den vorliegenden Beschreibungen nicht hervor, da nur Fälle bekannt sind, in denen operative Hülfe stattfand. Wahrscheinlich würden sie das Schicksal anderer Aneurysmen theilen.

Die **Diagnose** des Knochen-Aneurysma ist auf allen Stadien seiner Entwicklung überaus schwierig. Die ersten Beobachter dieser Krankheit, Pearson²⁾, Scarpa, Lallemand, glaubten es mit Aneurysmen der Art. artic. genu oder tibial. antic. zu thun zu haben. Eine genauere Untersuchung ergiebt abweichend von einem gewöhnlichen Aneurysma an dieser oder jener Stelle der vom Knochen ausgehenden pulsirenden Geschwulst dünne bedeckende Knochenlamellen mit Pergamentknittern, und nach der durch allmählichen Druck und durch Compression der Hauptarterie bewirkten Entleerung der Geschwulst eine Vertiefung im Knochen. Aneurysmen der Weichtheile sind ferner, besonders im Anfang, mehr beweglich. Sichere Unterscheidungs-Merkmale von pulsirenden Knochen-Krebsen und Sarcomen suchen wir vergebens. Nach Nélaton wäre für das Knochen-Aneurysma das allmähliche Verschwinden der Geschwulst durch Druck auf dieselbe und durch Compression der Hauptarterie charakteristisch, während der pulsirende „Knochenfungus“ sich nur um Weniges auf

¹⁾ *Elémens de pathol. chirurg.*, Paris 1844, Tom. II. pag. 41.

²⁾ *Medical Communications*, Tom. IX. pag. 95. London 1790.

diese Weise zusammendrücken lasse und nachher doch noch eine unebene Masse darstelle. Auch mit einer Knochenzyste könnte vielleicht, wenn auch schwieriger, eine Verwechslung vorkommen. Leichter ist, nach Carnochan, die Verwechslung mit einem Gelenkleiden, dem sogenannten Tumor albus (vgl. Gelenkentzündung); jedoch nur im Anfange des Uebels.

Die **Behandlung** ist nur auf operativem Wege möglich. Bis jetzt hat man entweder durch die Unterbindung des zuleitenden Arterienstammes, oder durch die Entfernung des erkrankten Knochenstückes (Amputation) Heilung zu erzielen gesucht. Fälle von Unterbindung der zuleitenden Arterie bei wirklichem Knochen-Aneurysma sind nur drei bekannt¹⁾; in allen drei Fällen soll Heilung erfolgt sein²⁾. In den vorgerückten Stadien der Krankheit ist wohl nur von der Amputation Erfolg zu erwarten. In manchen Fällen wird sich vielleicht durch die Resection³⁾ das kranke Knochenstück entfernen und so die Extremität erhalten lassen. — Ob von der Electropunctur oder den Einspritzungen des Chlor-Eisens (vgl. pag. 145 u. f.) ein günstiger Erfolg zu erwarten wäre, lässt sich im Voraus nicht angeben⁴⁾.

IV. Krebs der Knochen. Osteocarcinoma⁵⁾.

Anatomische Verhältnisse. Das Knochengewebe kann auf mehrfache Weise krebsig erkranken: 1) in der Form des primären

- 1) Der von Carnochan (l. c. pag. 45 und 46) als „Knochen-Aneurysma“ aufgeführte Fall von Dupuytren betrifft einen Knochenkrebs. Die pulsirende Geschwulst an der vorderen Seite der Tibia, um welche es sich handelte, schrumpfte nach der Unterbindung der Arteria femoralis zusammen, so dass der Kranke entlassen werden konnte; aber nach 7 Jahren kehrte er zurück mit einer nicht pulsirenden, bis zum oberen Drittheil des Oberschenkels sich ausdehnenden Geschwulst, welche die Amputation erforderte. Dupuytren selbst erklärt diesen Fall für Fungus haematodes, d. h. Krebs. Vgl. Leçons orales, Tom. III. pag. 232.
- 2) Der Fall von Lagout, welchen Richet auführt, kann eigentlich nicht als geheilt angesehen werden, da die Geschwulst „Anfangs zwar kleiner wurde, dann aber stationär blieb und nach 6 Jahren noch mit flüssigem Blute gefüllt war.“
- 3) Nélaton erwähnt einen Fall, in welchem ein Genfer Chirurg einen Theil der aneurysmatischen Schädeldecke mit unglücklichem Erfolge resecirte. Es ist aber nicht erwiesen, dass ein Knochenaneurysma bestand.
- 4) Die beiden Fälle, in denen Sirus-Pirondi die Injection von Ferrum sesquichloratum anwandte, schienen Heilung zu versprechen, waren aber schon nach einem Monat in dem alten Zustande. Ob es wirklich Knochenaneurysmen waren, ist nicht sicher erwiesen. Vgl. Richet, l. c. pag. 170.
- 5) Die in den Weichtheilen vorkommenden Krebsgeschwülste sind viel früher genau studirt worden, als die Knochenkrebs. Wir hatten bei den bereits erörterten

Knochenkrebses; 2) indem die krebsige Entartung von den benachbarten Organen auf den Knochen übergreift; 3) indem unter dem Einfluss der Krebskachexie, nachdem schon längere Zeit in anderen Organen (z. B. in der Brustdrüse) Krebs bestanden hat, secundäre Ablagerungen in den Knochen Statt finden.

Der primäre Knochenkrebs hat ein begrenzteres Gebiet als der secundäre und der von den Weichtheilen übergreifende; er erscheint besonders häufig im Ober- und Unterkiefer, in den Darmbeinen, in den Wirbelkörpern, im Femur (in der Mitte und an den Gelenkenden), in der oberen Epiphyse der Tibia, im Gelenkkopf des Humerus, in den Schädelknochen. Der Ausgangspunkt ist bald das Periost, bald die gefässreiche spongiöse Substanz¹⁾.

Entwickelt sich der Krebs an der Oberfläche des Knochens, bedeckt vom Periost, so entstehen in der Umgegend desselben die verschiedensten Formen der Osteophyten, ganz wie bei chronischer Periostitis, und die Krebsgeschwulst selbst wird von langen, nadelförmigen oder blättrigen, feinen Osteophyten durchsetzt, die sich nach den verschiedenen Richtungen hin mit einander verbinden und durchkreuzen oder auch an ihrer Peripherie büschelförmig aus einander gehen (Fig. 80 u. 81²⁾). Die tieferen Corticalsichten des erkrankten Knochens werden sklerosirt, oft elfenbeinartig.

Ganz entgegengesetzte Prozesse begleiten den inmitten der Knochensubstanz auftretenden Krebs: der umliegende Knochen wird porös, die peripherischen Knochenlamellen werden verdünnt, oft bis auf's Aeusserste. Diese Form des Knochenkrebses, welche besonders bei alten Leuten vorkommt, giebt vorzüglich zu der Entstehung spontaner Fracturen (Fig. 82) Veranlassung³⁾.

Knochengeschwülsten öfter auf die Zweifel aufmerksam zu machen, welche in diesem Theile der Geschwulstlehre herrschen. Manche der von Dupuytren beschriebenen „Knochencysten mit festem Inhalt“, sowie besonders ein Theil der pulsirenden Knochengeschwülste sind gewiss krebsige Neubildungen. Auf die dubiose Bedeutung der „Osteo-Sarcome und -Steatome“ ist bereits Bd. I. pag. 571 hingewiesen worden. A. Cooper beschrieb Knochenkrebs als „schwammige Exostosen“, Boyer als „Exostoses laminées, cellulèuses oder Spina ventosa der Erwachsenen“.

¹⁾ Nach Rokitsansky „die, die Markcanälchen, die Zellen und Markhöhlen der Knochen auskleidenden Gewebe, das Marksystem“.

²⁾ Fig. 80 und 81 (auf pag. 586) zeigen macerirte Schenkelknochen, auf denen die Krebsmasse auffass, aus der Sammlung von Nélaton. Fig. 80 Ansicht von der hinteren Seite. Fig. 81 Längsdurchschnitt.

³⁾ So bricht z. B. „bei einem schnellen Aufstehen oder einem festeren Stützen auf den Foss der Oberschenkel, beim Aufstützen auf den Ellenbogen, beim Umwenden

Fig. 80.



Fig. 81.



Fig. 82.



Das ganze Knochensystem zeigt überdies bei allgemeiner Krebskachexie in einzelnen Fällen eine grössere Brüchigkeit durch fortschreitende Osteoporose mit Verdünnung der Corticalsichten. Ob diese in spezifischer Beziehung zum Krebs steht, oder nur Folge des Marasmus, vielleicht auch blos des höheren Alters der Kranken ist, lässt sich nicht bestimmt entscheiden (vgl. pag. 558 u. f.).

In den Corticalsichten schreitet die Resorption der Knochen- substanz mehr allseitig und vollständig fort, als in der von Krebs befallenen spongiösen Knochen- substanz. Beim Krebs der Epiphysen findet man, wenn er selbst bis an den Gelenkknorpel vorgedrungen ist, diesen gewöhnlich noch unversehrt und wie eine Decke abgehoben. — Hat der centrale Knochenkrebs die peripherischen Knochen- lamellen atrophirt und hier und da durchbohrt, so entwickelt er sich gewöhnlich ausserhalb des Knochens zu grossen Geschwülsten und verwächst mit den Weichtheilen.

von der einen Seite zur anderen der Oberarm, — was einem erfahrenen Wand- arzt Aufschluss über die Natur des zu Grunde liegenden Processes giebt.* (Schub.) Dass hieraus allein aber nicht immer auf Krebs zu schliessen sei, ergibt sich aus unseren früheren Erörterungen. Vgl. pag. 320, 558, 579.

Fast alle Arten des Krebses treten auch als primäre Knochenkrebsse auf.

Der Colloidkrebs wurde, obgleich im Ganzen sehr selten, doch fast in allen Knochen beobachtet. Er bildet kuglige Geschwülste, deren Oberfläche drusig, höckerig und prall anzufühlen ist; die einzelnen Drusen erreichen nach der Oberfläche und gegen nachgiebige Theile hin, ein bedeutendes Volumen. Die Resistenz wechselt je nach den verschiedenen Umwandlungen der colloiden Masse (s. Bd. I. pag. 525 u. f.). Das Gerüst enthält bisweilen „reichliche Knochenbildung in Form von Plättchen und Strängen, welche dem Fachwerke hie und da auf grosse Strecken folgen“¹⁾. Die aus dem Knochen hervorstwachsenden Colloidgeschwülste sind bald nur mit einer Bindegewebshülle, bald mit einer Knochenschale umgeben. Weniger als andere Krebsformen scheint der Colloidkrebs die Gelenknorpel zu schonen.

Rokitansky (l. c.): „An Stelle der linken Hüftpfanne fand sich ein faustgrosser, viel Blutgerinnsel und chocolatbraune Flüssigkeit enthaltender Sack, in welchem der Schenkelkopf sammt seinem Halse steckte.“

Vom Scirrhus werden die Knochen ebenfalls selten ergriffen; er wurde am Ober- und Unterkiefer, an Schädel und an Röhrenknochen gefunden, bald von der Markhöhle, bald vom Knochengewebe selbst, bald vom Periost ausgehend. Hat er seinen ursprünglichen Sitz an der Knochenoberfläche, so erscheint er als eine mit breiter Basis aufsitzende höckerige Geschwulst, mit den im Allgemeinen (Bd. I. pag. 526 u. f.) erörterten Eigenschaften, und drängt, nach Rokitansky, die oberflächlichen Schichten des Knochens „zu einem faserig-blättrigen Filze auseinander, der, von der Basis der Aftersmasse hervorstwachsend, durch Anbildung neuer Knochensubstanz längs der vorzüglichsten Faserzüge des Aftersparenchyms zu einem knöchernen Gerüste desselben wird“ (vgl. pag. 585).

Die häufigste Form des Knochenkrebses ist der Zellenkrebs (Markschwamm). Derselbe hat eine ganz entschiedene Neigung zu Hämorrhagien und ist nicht selten überaus gefäss- und blutreich (Fungus haematodes). Künstliche Injectionen lassen die Injectionsmasse immer frei an den hämorrhagischen Herden hervordringen. Die in solchen Herden abgesetzten Blutgerinnsel machen dieselben Metamorphosen durch, wie der Bluterguss nach einer Gehirnapoplexie: der Erguss erscheint zuerst als coagulirtes Blut, das Gerinnsel wird allmählig blasser (fibrinös) und zuletzt in eine weissgelbliche, hie und da ockerfarbene, krümelige Masse verwandelt; oder es entsteht eine

¹⁾ Rokitansky in d. Sitzungsber. der Wiener Akademie, Bd. IX. Heft II. 1852.

weniger gefärbte und weniger dichte, schmierige Masse aus dem Extravasat. — Gewöhnlich erscheint der weiche Knochenkrebs in einzelnen Massen, Geschwülsten, die sehr oft ein erstaunliches Volumen erreichen, besonders an den Gelenk-Enden der Röhrenknochen, an den platten Schädel- und Beckenknochen, am Brustbein und an den Rippen; seltener tritt er als ausgebreitete Infiltration auf. Der erkrankte Knochen selbst sowohl, wie das Krebsgerüst, bieten ein mannigfaches Verhalten dar. Bei sehr schnellem Wachstum des Krebses wird der Knochen zu einem zartblättrigen Filze auseinandergedrängt oder zu einer blättrig-löcherigen Masse zersprengt. In anderen Fällen ist die compacte Knochensubstanz durch die aus der Tiefe des Knochens wuchernde Krebsmasse zu einer einfachen, oder mit einer fasrig-blättrigen Neubildung besetzten Schale gleichsam aufgebläht. Seltener ist der Knochen inmitten des Krebses vollständig verschwunden. — Das fasrige Gerüst des Krebses findet sich häufig zu einem strahlig-blättrigen Skelet verknöchert, welches die verschiedenste Anordnung der einzelnen Strahlen und Dornen darbietet, bald nur an der Basis der Geschwulst auftritt, bald aber durch die ganze Geschwulst sich gleichmässig verbreitet.

Der infiltrierte Knochenfungus kann über das ganze Skelet ausgebreitet sein. So berichtet Rokitansky: „Die Knochen des Rumpfes, namentlich die Rippen, das Sternum und die Wirbelkörper waren in ihrem Gewebe aufgelockert, weich, jene leicht einzuknicken, und enthielten eine milchige, aus runden Elementarzellen bestehende Flüssigkeit, hier und da mit einem schmutzig braunen Marke vermischt. In dem letztgenannten Zustande war sie auch in den erweiterten Zellen der Beckenknochen und der Gelenk-Enden der Ober- und Unterschenkelknochen beider Seits enthalten. Daneben fand sich eine blässröthliche, speckig-markige Aftermasse über die innere Fläche des ganzen Schädelgewölbes in Form einer Schichte von ansehnlicher Dicke ausgebreitet, in welcher einer Seits sich eine theils netzartige, theils faserige Knochen-Neubildung auf der Glastafel einwebte, während sie anderer Seits auch an der harten Hirnhaut anhaftete. Sämmtliche Lymphdrüsen längs der Bauchwirbelsäule, sowie einzelne Gekrösdrüsen weisslich, speckig-markig infiltrirt.“

Der melanotische Krebs wurde von Rokitansky, von Lebert u. A., auch von mir im Knochen beobachtet. — Ueber den Osteoidkrebs haben wir bereits Bd. I. pag. 513 u. f., über sein Verhältniss zum Sarcom ebenda, pag. 571 gehandelt.

Epithelialkrebs kommt selten als primäres Knochenleiden vor; desto häufiger greift er von der Unterlippe, dem Zahnfleisch oder dem Boden der Mundhöhle auf den Unterkiefer über. Hat er, wenn auch nur an einer kleinen Stelle, die Corticalsubstanz des Knochens durchbrochen, so wuchert er, obgleich scheinbar nur mit einem Stiel befestigt, in der Marksubstanz doch meist ganz gewaltig und gewinnt im Innern des Knochens eine nicht leicht zu bestimmende Verbreitung, für deren

Ermittlung am Lebenden nachfolgende Verhältnisse zu beachten sind. Der Ausdehnung des Carcinoms entsprechend, lässt sich das Periost ungemein leicht von dem Knochen ablösen; dasselbe ist in derselben Ausdehnung gefässreicher und mit einem wässrigen Exsudat durchtränkt; die Oberfläche des Knochens ist im Umkreise der Eintrittsstelle des Carcinoms vielfach durchlöchert, atrophisch, weiterhin hyperämisch und mit weichen gefässreichen Osteophyten bedeckt.

Krebs einzelner Arten der Knochen. Der Krebs der platten Knochen hat wegen der gleichzeitigen Resorption der Knochensubstanz innerhalb des Krebsgewebes sowohl, wie in der Umgegend desselben, zu besonderen Krankheitsnamen, wie Knochennagung, Erosion (Otto), Osteolyosis, Resolutio ossis (Lobstein), Veranlassung gegeben. Derselbe entspringt nämlich in der Diploë und breitet sich unter Resorption der letzteren aus. Die bedeckenden und benachbarten Corticalschichten bieten nur die Merkmale der Knochen-Entzündung dar und werden erst später vollständig resorbirt; zuerst erscheinen nur punktförmige Defecte oder Löcher, durch welche sich, wie durch ein Sieb, der Krebs der Diploë hervordrücken lässt. Wird eine solche vom Krebs erfüllte Höhle durchsägt, so kann man zwischen beiden Corticalschichten sehr weit in die zwischen ihnen, an Stelle der spongösen Substanz vorhandenen Krebsmassen eindringen. Ist die Corticalschicht durchbrochen, dann verwächst der Krebs mit den Umgebungen. Wir haben jedoch, im Gegensatz zu der als constant angenommenen Resorption der Knochensubstanz, in der Umgebung des Schädelkrebses (Fungus diploë), an verschiedenen Stellen desselben Schädels nicht allein eine beträchtliche Hypertrophie der Corticalschicht, sondern auch Sklerose der ursprünglichen Diploë gesehen. Die hypertrophische und sklerosirte Knochensubstanz wurde offenbar erst secundär von Osteoporose und dann von Krebs befallen¹⁾.

An den Röhrenknochen wird, nach Nélaton, durch eine Krebsgeschwulst nicht blos die Dicke, sondern auch die Länge des Knochens oft ansehnlich (bis zu 6 Ctm.) vermehrt, wie bei chronischer Entzündung der Röhrenknochen. Vgl. pag. 518 u. 520.

Für die **Diagnose** des Knochenkrebses lassen sich, so lange er nicht als Geschwulst mit den allgemeinen Charakteren des Krebses hervortritt, wenig Anhaltspunkte geben. Bald intermittirend auftretende, eigenthümliche, durchfahrende, bald mehr dumpfe, constante Schmerzen werden, wie bei anderen Krebsen, so auch hier beschrieben. Unter den objectiven Symptomen wird eine mit dem Pulse isochronische

¹⁾ Das betreffende Präparat wurde von mir bei der Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Greifswald vorgezeigt. Vgl. Deutsche Klinik, 1850, No. 40.

Bewegung der Geschwulst angeführt, die Lebert, bei der Seltenheit der sogenannten Knochen-Aneurysmen, dem „Markschwamme“ der Knochen geradezu als charakteristisch zuschreibt¹⁾. Das Wachsthum ist bald langsam, bald rapid. Andere äussere Merkmale, das Gefühl der Härte, der Fluctuation, die eigenthümliche Crepitation beim Druck auf die mit einer knöchernen Schale umgebenen Geschwülste, die spontanen Fracturen etc. wurden bereits erörtert.

Verlauf. Die Dauer ist sehr verschieden; Jahre lang „kann das Uebel local bleiben“, oft aber auch sehr schnell zum Tode führen.

Lebert sah in Dieffenbach's Klinik eine Frau von 45 Jahren, die seit 6 Jahren an Krebs des Oberkiefers litt, schon 12 Operationen mit immer wieder folgenden localen Recidiven überstanden hatte und deren Allgemeinbefinden noch gut war.

Behandlung. Der Erfolg eines operativen Eingriffs (der allein möglichen Therapie) hängt von zu vielen individuellen Momenten ab (von der Verbreitung des Krebses, der Dauer, Entwicklungsweise, Form etc.), als dass man in dieser Beziehung ein allgemein gültiges Urtheil fällen könnte.

Für die Ausführung der Operation gelten dieselben Regeln, wie für die Exstirpation krebsiger Geschwülste überhaupt. Die Besorgniss, nicht alles Kranke zu entfernen, liess Einige die Exarticulation des erkrankten Gliedes der Amputation oder Resection²⁾ ganz allgemein vorziehen. Es lassen sich in dieser Beziehung keine anderen Anhaltspunkte geben, als die aus einer möglichst genauen Untersuchung des einzelnen Falles hervorgehenden.

Die Unterbindung der zuführenden Gefässe gewährt keine Aussicht auf Erfolg. A. Cooper erwähnt seine Versuche, durch Unterbindung des Arterienstammes den Knochenkrebs zu heilen, ausdrücklich, um vor ähnlichen Unternehmungen zu warnen.

Erscheint eine Operation unzulässig, so bleibt nur übrig, die Schmerzen zu lindern und Schlaf zu schaffen, — recht tiefen Schlaf.

V. Sarcom der Knochen. Osteosarcoma.

Seit man die Sarcome einer Seits von den Fibromen, anderer Seits von den Krebsen sondern gelernt hat, sind auch in und an den Knochen alle Arten derselben gefunden worden. Die äusseren Erscheinungen schliessen sich grösstentheils an die beim Knochenkrebs geschilderten an. In Betreff der Differenzen des Verlaufs und der

¹⁾ Nicht blos deutlich fühlbare und hörbare Pulsationen, sondern auch mit letzteren isochronische Blasegeräusche habe ich in 5 Fällen von Knochenkrebs (3 an der Tibia, 2 an den Condylen des Femur) in einem solchen Grade ausgeprägt beobachtet, dass die Annahme eines Aneurysma ungemein nahe lag.

²⁾ Glückliche Erfolge von Resection der Scapula und besonders von Resection des Ober- und Unterkiefers sind bekannt.

Prognose, sowie auch der verschiedenen Arten des Sarcoms kann nur auf die allgemeine Schilderung (Bd. I. pag. 557 u. f.) verwiesen werden.

VI. Knochen-Tuberkeln.

Anatomische Verhältnisse. Aechte Tuberkeln kommen in den Knochen sehr selten vor; sie entwickeln sich fast ausschliesslich in der Substantia spongiosa, viel seltener unter dem Periost. Man kann in Bezug auf die Fähigkeit zur Entwicklung der Tuberkeln eine rothe, gefässreiche und eine gelbe, fettreiche Substantia spongiosa unterscheiden. In ersterer treten, nach Nélaton¹⁾, die Tuberkeln fast ausschliesslich auf. Bei Erwachsenen findet sich gefässreiche Marksubstanz nur in den Knochen des Rumpfes, während bei Kindern die Marksubstanz überall, wo sie vorkommt, auch gefässreich ist. Dem entsprechend zeigen sich, nach Nélaton, Knochen-Tuberkeln bei Erwachsenen auch nur in den Rumpfknochen, z. B. in den Wirbeln, während sie bei Kindern auch in den Epiphysen der Röhrenknochen und in den kurzen Knochen der Extremitäten vorkommen. Die Tuberkeln scheinen an jedem Röhrenknochen eine besondere Prädisposition für das eine seiner Enden zu haben; am Femur für das untere, an der Tibia, dem Humerus und den beiden Vorderarmknochen für das obere. Jedoch werden ganz gewöhnlich die in einem Gelenk zusammenstossenden Epiphysen, als auch die symmetrischen Knochen beider Seiten, überhaupt aber gewöhnlich mehrere Knochen gleichzeitig befallen. Die Diaphysen der Röhrenknochen werden unstreitig am Seltensten von Tuberculose ergriffen.

Nélaton unterscheidet 2 verschiedene Formen des Knochen-Tuberkels: den eingekapselten und den infiltrirten. Letztere ist jedoch, wie neuere Untersuchungen ergeben haben, als „käsige Entzündung“ aufzufassen und hat mit der Tuberculose ebenso wenig gemein, wie die sogenannte Tuberculose der Lymphdrüsen²⁾.

Dem eingekapselten Knochen-Tuberkel liegt die Entwicklung der grauen Granulationen zu Grunde. Die Oberfläche des Knochens erscheint an der entsprechenden Stelle gefässreicher, gleichsam marmorirt. Nimmt man an einer solchen Stelle die compacte Knochen-schicht mit der Säge fort, so kann man mitten in der spongiösen Knochen-substanz mit einem starken Scalpell eine verschieden grosse

¹⁾ Recherches sur l'affection tuberculeuse des os, thèse de Paris, 1836, und *Elémens de pathol. chirurgicale*. Paris, 1847, T. II. pag. 58. — Die Angaben Nélaton's sind keineswegs überall maassgebend, da er die käsige Ostitis mit der Tuberculose zusammenwirft.


²⁾ Vgl. pag. 278 und Bd. I pag. 579.

Fig. 83.



Gruppe (Fig. 83, *a*) perlgänzender Kügelchen heraus-schälen, deren jedes etwa einen Millimeter Durchmesser hat. Diese Granulationen sind von Gefässen umspinnen, und von dem Knochengewebe so genau umfasst, dass dasselbe eine besondere Schale um jedes einzelne Körnchen zu bilden scheint. Bei ihrer weiteren Entwicklung durchbrechen die einzelnen Granulationen die Scheidewände und fließen zu einer Masse zusammen, welche, allmählig erweichend, sowohl in ihrer Consistenz, als in ihrem Aussehen, Aehnlichkeit mit Glaserkitt darbietet. Inzwischen aber hat sich um diese Tuberkelmasse eine feste Kapsel (Cyste) entwickelt, welche Anfangs gelatinös ist, später aber aus dicht durch einander verfilzten, glänzenden Fasern besteht und desto gefässreicher wird, je weitere Fortschritte die Erweichung des Tuberkels macht. Dieser eingekapselte Tuberkel Nélaton's (Fig. 84, *a*),

Fig. 84.



ist, nach der so eben gegebenen Darstellung seiner Entwicklung, als ein weiter vorgerücktes Stadium des in der Form von Granulationen auftretenden Knochen-Tuberkels zu betrachten (Rokitansky).

Nélaton glaubt, neben der so eben erörterten Entstehungsweise des eingekapselten Tuberkels auch noch eine zweite annehmen zu müssen: eine plötzliche Ablagerung der gelben Tuberkelmasse mit nachträglicher Einkapselung, ohne dass graue Granulationen vorhergehen. Dies „plötzliche“ Auftreten, welches natürlich schwer zu beweisen sein möchte, ist mindestens eben so schwer zu begreifen, und es scheint nach Nélaton's eigener Darstellung fast, als wenn er diesen *Tubercule d'emblée* nur Andral zu Liebe annähme. Nach den vorliegenden Beschreibungen liegt sowohl die Möglichkeit, dass es sich nur um ein weiter vorgerücktes Stadium der Tuberculose handele, als auch die Annahme einer Verwechslung von „Tuberkel“ und eingedicktem, käsigem Eiter sehr nahe. Vgl. Virchow's Untersuchungen über Tuberculose, Würzburger Verhandlungen, III. pag. 98, und Deutsche Klinik 1852, No. 25.

Ist der Tuberkel in der Tiefe eines Knochens entstanden, so ist er auch überall von gefässreichem Knochengewebe umgeben; entstand er an der Oberfläche, so wird seine Kapsel zum Theil vom Periost oder vom Gelenk-Knorpel begrenzt. Das Periost wird an einer solchen Stelle verdickt, auch wohl durch eine Knochenschicht (Auf-lagerung an seiner inneren Seite) verstärkt und leistet daher der andrängenden Tuberkelmasse zuweilen sehr bedeutenden Widerstand. Die Gelenk-Knorpel dagegen werden, wo sie an den Tuberkel

grenzen, leicht resorbirt. Alsdann tritt die tuberculöse Masse in die Gelenkhöhle ein und veranlasst durch ihre Anwesenheit eine heftige Gelenk-Entzündung.

Fig. 85, Tuberkel am unteren Ende des Femur, welcher bei *a* den Gelenk-Knorpel durchbohrt hat und bei *b* in das benachbarte Kapselband eingedrungen ist.

Fig. 85.



Die zweite Form der Knochen-Tuberculose ist, nach Nélaton, die tuberculöse Infiltration, welche zwei Entwicklungsstufen darbieten soll, mit der zuerst erwähnten Form aber gar keinen Zusammenhang hat und in der That nichts anderes ist, als eine Knochenentzündung mit Ausgang in Eiterung und käsige Eindickung des Eiters, — Ostitis caseosa. Ihr erstes Stadium ist die durchscheinende graue oder röthliche Infiltration des Knochengewebes. Dieselbe tritt in einzelnen, scharf begrenzten Flecken auf, in denen das Knochengewebe selbst sich weder porös, noch anderweitig verändert zeigt, mit einziger Ausnahme der Erfüllung und Durchdringung desselben mit Exsudat. Das zweite Stadium bildet die eitrige Infiltration. Die infiltrirte Masse wird gelblich, undurchsichtig, erweicht und zerfällt zu Eiter. Dies Stadium unterscheidet sich von der gewöhnlichen Caries durch den gänzlichen Gefässmangel und die sogenannte interstitielle Hypertrophie, während bei Caries das Knochengewebe gefässreich und porös ist. Als interstitielle Hypertrophie bezeichnet Nélaton die ohne Volumen-Vermehrung des ganzen Knochens auftretende Verdickung der Knochenlamellen (Sclerose) der spongiösen Substanz, durch welche die Markräume und Gefässcanälchen in der ganzen Ausdehnung der Infiltration auf's Aeusserste verengt werden. Die spongiöse Knochensubstanz erhält auf diese Weise Aehnlichkeit mit der compacten, wird aber demnächst, in Folge der durch die Erfüllung der Gefässcanälchen eintretenden Beschränkung der Blutzufuhr, nach und nach nekrotisch. Es bilden sich Demarcationslinien, und während an einzelnen Stellen die gelatinöse Infiltration noch deutlich erkannt werden kann, findet man an anderen schon Sequester. Diese aber zeigen die erwähnte interstitielle Hypertrophie auch nach ihrer Ablösung; sie sind daher, obgleich sie aus der spongiösen Substanz herrühren, von auffallend dichtem und festem Gewebe und unterscheiden sich sogar von den durch andere Processe erzeugten Sequestern durch geringe Brüchigkeit.

Die eitrige Infiltration kann, nach Nélaton, auch plötzlich (*d'emblée*) entstehen, analog dem eingekapselten gelben Tuberkel, d. h. ohne dass ihr die durchscheinende, gelatinöse Infiltration vorausgegangen ist.

Verlauf. Der Knochen-Tuberkel kann erweichen, oder verkreiden. Im letzteren Falle wird die Tuberkelmasse allmählig immer mehr mit Kalksalzen imprägnirt und stellt zuletzt eine von sklerosirtem Knochengewebe umschlossene, mörtelartig harte Substanz dar. Der häufigere Ausgang ist Erweichung. Durch diese entsteht das tuberculöse Knochengeschwür, welches sowohl peripherisch auftreten, als auch ursprünglich einen centralen Sitz haben kann. Im letzteren Falle ist der erweichte Tuberkel rings von Knochen-Substanz umschlossen; es entsteht eine tuberculöse Knochen-Caverne. Der Inhalt derselben ist mit dem Secret des peripherischen Geschwüres identisch; es ist der tuberculöse Eiter, welcher ausser den nekrotischen Knochenstückchen stets noch die Tuberkelmasse selbst enthält und daher als eine trübe, mit krümligen Massen und weissen Flocken gemischte Flüssigkeit erscheint. Sobald die Erweichung begonnen hat, erfolgen in der Umgegend neue Exsudationen in der Form der sog. gallertigen Infiltration, welche schnell ihren Ausgang gleichfalls in Erweichung nimmt und somit wesentlich zur Vergrösserung der Cavernen beiträgt. Ist die Erweichung bis zur Oberfläche des Knochens vorgeschritten, so verdrängt sie zunächst das inzwischen verdickte, oft an seiner inneren Seite mit Osteophyten besetzte Periost; weiterhin aber wird dasselbe durchbrochen, und dem Eiter steht nun der Weg in die Weichtheile frei. Die vor ihm herschreitende Entzündung bedingt seine Einkapselung, welche gewöhnlich bis zum Durchbruch der Haut fortbesteht. Der Abscess erhält, sofern er sich in einiger Entfernung von dem kranken Knochen entwickelt, auch hier den Namen Congestionsabscess (vgl. pag. 541). Nachdem die Haut durchbrochen und der tuberculöse Eiter entleert ist, bleibt ein fistulöses Geschwür übrig, dessen Grund die ehemalige tuberculöse Caverne bildet. Diese selbst kann nicht zusammensinken, da ihre Wandungen knöchern sind, es sei denn, dass letztere durch den Druck anderer Theile gegen einander gedrängt werden; sie liefert unverhältnissmässig grosse Mengen dünnen Eiters. Findet aber im Knochen eine weitere Tuberkel-Ablagerung nicht Statt und sind die Kräfte des Kranken zureichend, so kann die Knochen-Caverne, wie ein Abscess der Weichtheile, sich ausfüllen und mit fester Narbe heilen.

Die **Symptome** der Knochen-Tuberculose stimmen hiernach mit denen der Knochen-Entzündung, weiterhin der Caries überein, bis nach erfolgtem Ausbruch aus der Beschaffenheit des ausfliessenden

Eiters die Anwesenheit der Tuberkeln sich erschliessen lässt. Vorher kann die Diagnose nur mit einiger Wahrscheinlichkeit gestellt werden, indem man die Constitution des Kranken, den Sitz des Uebels und den bei der Tuberculose relativ langsamen Verlauf berücksichtigt. Die Unterscheidung der Knochen-Tuberculose von käsiger Ostitis ist ohne anatomische Untersuchung nicht möglich.

Aus dem wissenschaftlich allerdings unzulässigen Zusammenwerfen von Tuberculose und käsiger Ostitis erwächst daher für die Praxis zunächst noch kein Schade, zumal alle käsigen Entzündungen als ätiologische Momente für Tuberculose angesehen werden können. Vgl. Bd. I. pag. 584.

Die **Aetiologie** der Knochen-Tuberkeln fällt mit derjenigen der Tuberkeln überhaupt zusammen. Fast ausschliesslich werden dieselben bei scrophulösen Individuen beobachtet, meist in der Jugend.

Die **Prognose** ist diejenige der dyskrasischen Caries. Die Localität des Uebels hat wesentlich Einfluss auf den zu erwartenden Ausgang. Das gleichzeitige Bestehen oder die spätere Entwicklung von Lungen-Tuberkeln (bei mindestens 50 Procent solcher Patienten) verschlechtert die Prognose bedeutend. Führt die Tuberculose der Knochen nicht zum Tode, so veranlasst sie doch beträchtliche Deformitäten oder macht verstümmelnde Operationen nothwendig.

Die **Behandlung** muss vor Allem gegen die der Tuberculose zu Grunde liegende allgemeine Ernährungs-Störung gerichtet sein. Die örtliche Behandlung kann sich Anfangs nur auf Eis, Blutentziehungen, Ableitungsmittel (Fontanellen und Haarseile) beschränken, um dadurch die mit der Bildung, Erweichung und Ausstossung der Tuberkelmasse auftretende Entzündung in Schranken zu halten, insbesondere auch ihr Uebergreifen auf benachbarte wichtige Organe zu verhüten. Ist der Aufbruch erfolgt und droht dem Leben oder der Function des betreffenden Gliedes durch die nachfolgende Eiterung eine grössere Gefahr, als durch die operative Entfernung des betreffenden Knochenstückes, so ist letztere durch die Resection vorzunehmen. Wird aber das Leben des Patienten durch die Verjauchung des betreffenden Knochens bedroht und ist die Resection, wegen der localen Verhältnisse oder wegen beträchtlicher Zerstörung der Weichtheile, nicht ausführbar, oder wegen des schlechten Kräftezustandes nicht zulässig, so versucht man, wenn das Leiden an einer Extremität seinen Sitz hat, das Leben durch die Amputation zu retten, wobei die Prognose durch das gleichzeitige Bestehen von Tuberkeln in anderen Organen allerdings in hohem Grade getrübt werden kann.

Achter Abschnitt.

Von den Krankheiten der Gelenke.

Erstes Capitel.

Von der Gelenk-Entzündung und deren Folgen¹⁾.

I. Gelenk-Entzündung. Arthrophlogosis.

A. Anatomische Untersuchung.

Bei der **anatomischen Untersuchung** der Gelenk-Entzündung²⁾ müssen wir die verschiedenartigen Elemente unterscheiden, aus denen ein Gelenk zusammengesetzt ist: Synovialhaut, Knochen, Knorpel, Bänder, Bandscheiben und Faserknorpel.

I. Die Synovialhaut ist in den meisten Fällen der Sitz der wesentlichsten Veränderungen bei Gelenk-Entzündung, mag sie nun primär erkrankt, oder secundär ergriffen sein. Da man selten Gelegenheit hat, Gelenk-Entzündungen beim Menschen auf ihren ersten Stadien anatomisch zu untersuchen, so muss man die Resultate der Versuche an Thieren zu Hilfe nehmen, um eine vollständige Ueber-

¹⁾ Vgl. Rust, Arthrokakologie oder über Verrenkungen aus inneren Bedingungen. Wien 1817. A. Cooper, Treatise on diseases of the joints. London 1817. B. Brodie, Pathological and surgical observations on diseases of the joints. London 1818. Bonnet, Traité des maladies des articulations. Paris 1844. Bonnet, Traité de thérapeutique des maladies articulaires. Paris 1853. L. Strömeyer in s. Lehrbuch, Bd. I. pag. 462 u. f. R. Volkmann, in dem Handbuch von Pitha u. Billroth, Bd. II. Abth. II. pag. 491 ff. C. Hueter, Klinik der Gelenkkrankheiten, Leipzig 1870.

²⁾ Vgl. Richet, Annales de la chirurgie, 1844 Mai und Juni; Bouley, Recueil de médecine vétérinaire 1847; Lebert, Maladies scrofuleuses et tuberculeuses, Paris 1848; Gurlt, Beiträge zur vergleichenden pathologischen Anatomie der Gelenkkrankheiten. Berlin 1853; C. Hueter, l. c.

sieht über die hier stattfindenden Vorgänge zu gewinnen. Jedoch gelingt es auf diesem Wege nicht, die den einfachsten und leichtesten Formen der Synovialhaut-Entzündung (Synovitis serosa) entsprechenden Veränderungen kennen zu lernen. Oeffnet man bei einem Thiere ein Gelenk, zieht einen Faden hindurch, oder injicirt in dasselbe eine reizende Flüssigkeit, so sieht man nämlich schon nach wenigen Stunden die ganze Synovialhaut geröthet, das Epithelium abgestossen, die Oberfläche daher rauh; nicht mehr glänzend. Weiterhin erheben sich feine Granulationen auf der Synovialhaut, welche Anfangs den bei Blennorrhoe der Conjunctiva auftretenden ähnlich sind, bald aber beträchtlich wachsen und auch auf die Oberfläche des bis dahin noch glänzend weissen und unveränderten Gelenkknorpels vorschreiten. Dieser Zustand zeigt für das unbewaffnete Auge eine gewisse Aehnlichkeit mit demjenigen Stadium einer Augenblennorrhoe, wo die Hornhaut, deren Stelle hier vergleichsweise der Knorpel vertritt, von den Granulationen noch nicht überwachsen ist. Die Granulationen der Synovialhaut scheinen von den kleinen Zotten der letzteren auszugehen, und das granulöse Ansehen beruht Anfangs vielleicht bloß auf der Wucherung der Zotten¹⁾. Weiterhin aber ist das Wachsthum der Granulationen ein durchaus selbstständiges, da sie nicht bloß über die freie Fläche des Knorpels fortwachsen, sondern an Stellen, wo der Knorpel durch die Entzündung zerstört ist, auch vom Knochen emporwuchern. So wird endlich die ganze freie Oberfläche der Synovialhaut von einer gefäßreichen Neubildung überzogen, welche ein schwammiges Aussehen darbietet, bei der Berührung leicht blutet und oft sehr empfindlich ist. Inzwischen ist das an der äusseren Seite der Synovialhaut gelegene Bindegewebe durch entzündliche Wucherung verdickt, bald mehr schwammig aufgelockert, bald mehr fibrös entartet; jedenfalls verwächst es mit der Synovialhaut. Diese ist also sowohl von ihrer inneren Fläche her durch die Granulationen, als von Aussen her durch das mit ihr verschmelzende, mächtig gewucherte Bindegewebe verdickt. Die Synovia wird in ihrer Quantität vermehrt und in ihrer Zusammensetzung verändert; sie erscheint in den leichtesten Formen, bei reichlicher Vermehrung serös, bei schwerer Erkrankung der Synovialhaut dicklig und trübe, indem sich ihr die in grosser Masse abgestossenen Epithelialzellen, Blut und Eiter, häufig auch

¹⁾ C. Hueter lässt die Gelenkzotten nicht als normale Gebilde gelten, da er dieselben in den Gelenken Neugeborner niemals fand; nach seiner Anschauung sind dieselben Producte entzündlicher Processe, wie sie in den Gelenken Erwachsener, namentlich im Bereich der unteren Extremitäten, überaus häufig vorkommen.

Faserstoff-Flocken beimischen. Namentlich nimmt sie oft sehr schnell eine eitrige Beschaffenheit an (*Synovitis suppurativa*), welche nicht bloß aus der Beimischung abgestossener Epithelien erklärt werden kann¹⁾. Von diesem Stadium aus kann die Entzündung der Synovialhaut noch rückgängig werden. Alsdann vermindert sich die Quantität der Synovia allmählig, ihre Qualität nähert sich wieder der normalen, und die Granulationen sowohl, als auch die Bindegewebswucherungen schrumpfen ein. Jedoch geschieht das Eine wie das Andere selten ganz vollständig, so dass eine Vermehrung der Synovia und eine Verdickung der Synovialhaut auch im günstigsten Falle fast immer übrig bleiben.

Haben sich die Gelenk-Granulationen in Form kleiner Polypen entwickelt, namentlich an solchen Stellen, wo die Gelenkzotten ursprünglich eine bedeutendere Grösse besitzen, so können hieraus sogenannte „Gelenkmäuse“ hervorgehen. Der kleine, Anfangs weiche Gelenkpolyp wird nämlich, indem sich Narbengewebe in ihm entwickelt, vielleicht auch Verknöcherung eintritt, zu einem festen, gestielten Körper, dessen Stiel bei späteren Bewegungen abreißen kann. Die Möglichkeit eines solchen Vorganges muss zugestanden werden, ohne dass jedoch erwiesen wäre, dass alle sogenannten Gelenkmäuse auf diese Weise entstehen, worauf wir weiter unten zurückkommen werden. Vgl. Rokitsansky, Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien 1851, und Gurlt, l. c. pag. 43.

Schreitet die Entzündung weiter fort, so nimmt einer Seits die Synovia an Menge und an eitriger Beschaffenheit zu, anderer Seits zeigen sich auch die umgebenden Theile, die fibrösen Bänder, die benachbarten Muskeln, das Fettgewebe bis zu dem subcutanen Bindegewebe hin, geröthet und aufgewulstet, von Exsudat erfüllt, bald gallertig erweicht, bald speckig indurirt. Der entzündliche Process entwickelt sich bald in der einen, bald in der anderen Richtung vorwiegend. Bei recht acutem Verlauf wird in ersterem Falle der Uebergang in Eiterung nicht selten durch Fibrinausscheidungen in den synovialen Erguss vermittelt (*Synovitis seroso-fibrinosa*, nach Hueter); aber auch bei dieser Exsudationsform ist Rückbildung möglich. Diejenigen Fälle, in denen die Wucherung der Synovialmembran und weiterhin auch der fibrösen Bänder vorwiegt, kann man als *Synovitis hyperplastica* zusammenfassen, von welcher C. Hueter drei Formen zu unterscheiden empfiehlt: *Synovitis hyperplastica laevis s. pannosa*, mit gefässreicher Wucherung der Synovialhaut, namentlich in Gestalt eines, dem Pannus der Hornhaut ähnlichen Ueberzuges über die dem Druck der gegenüberliegenden Gelenkflächen nicht ausgesetzten Theile der Gelenkknorpel;

¹⁾ Vgl. R. Volkmann, Ueber die katarrhalischen Formen der Gelenkeiterung. Archiv f. klin. Chir. Bd. I. pag. 415 u. f.

Synovitis hyperpl. granulosa, ausgezeichnet durch üppige Entwicklung der oben geschilderten Granulationen; Synovitis hyperpl. tuberosa mit höckeriger, inselförmiger Entwicklung dieser letzteren. Bei längerer Dauer schreitet die Entzündung auch auf die Gelenk-Enden der Knochen fort, welche jedoch auch schon von Anfang an ergriffen sein können. In der Umgebung des Gelenkes findet man dann weiterhin (sogenannte periarticuläre) Abscesse, welche entweder unabhängig von dem Inhalte der Synovialkapsel in dem entzündeten Bindegewebe entstanden sind (phlegmonöse Abscesse, periarticuläre Phlegmone, Perisynovitis), oder durch den aus der durchbrochenen Gelenkkapsel hervorgedrungenen Eiter gebildet wurden (consecutive Abscesse, Senkungs- oder Congestions-Abscesse). Letztere können, wie die bei den Krankheiten der Knochen erwähnten Congestions-Abscesse, denen sie durchaus analog sind, sich in den Bindegewebsräumen zwischen den Muskeln weithin erstrecken oder „senken“.

II. Die Entzündung der Gelenk-Enden der Knochen bedingt wesentlich dieselben Veränderungen, welche wir bei der Knochen-Entzündung im Allgemeinen hervorgehoben haben. Sie führt, je nach ihrem Sitze, ihrer Ausdehnung, dem Grade der Heftigkeit und den ursächlichen Verhältnissen, bald zu Osteophytenbildung, bald zu Sklerose, bald zu Osteoporose, Difformität und Atrophie des Knochens, bald zu Eiterung oder zu Caries und Nekrose.

III. Auch der Gelenkknorpel, d. h. der knorpelige Ueberzug der Gelenk-Enden, erleidet Veränderungen. Dass derselbe bei intensiven Eiterungen theilweise oder sogar in seiner ganzen Ausdehnung der Nekrose verfallen kann, darüber besteht kein Zweifel. Die Frage dagegen, ob der Knorpel von Entzündung ergriffen werden könne, musste nach früheren Untersuchungen¹⁾ verneint werden. Weder bei Experimenten an Thieren, noch bei der Untersuchung von menschlichen Gelenken, die an Entzündung gelitten hatten, war es gelungen, an dem Gelenkknorpel Veränderungen aufzuweisen, die mit denjenigen, welche in anderen Geweben als Resultate der Entzündung bekannt waren, irgend eine Analogie darboten. Namentlich kommt in der That niemals Injectionsröthe oder Exsudat in dem gefässlosen Gewebe der Gelenkknorpel vor. Dagegen zeigen die Knorpel in entzündeten Gelenken Veränderungen, die eine eigenthümliche Ernährungsstörung annehmen lassen. Das Gewebe des Knorpels zerfällt

¹⁾ Ecker im Archiv für physiologische Heilkunde 1843; Redfern in Edinburgh Monthly Journal of the medical Sciences 1849 und 1850, beide mit schönen Abbildungen; Kölliker, mikroskopische Anatomie (Leipzig, 1850) Bd. II. 1ste Hälfte, pag. 321; Wedl, Grundzüge der pathologischen Histologie, pag. 161.

nämlich in Fasern, welche bald grob, durch deutliche Fissuren von einander getrennt und mit blossem Auge erkennbar sind, bald sehr feine Fäden darstellen, welche nur mit der Lupe unterschieden werden können. Der Process der Zerfaserung beginnt fast immer an der freien Oberfläche des Knorpels, welche in die Gelenkhöhle hineinsieht. Diese erscheint dann matt, rissig, selbst filzig. Die mikroskopische Untersuchung lehrt, dass die Zerspaltung in Fasern wesentlich die Hyalin- (Intercellular-) Substanz des Knorpels betrifft. Der Grund dieser Zerspaltung aber liegt in dem schnellen Wachstum, der darauf folgenden fettigen Degeneration und dem Zusammenfließen oder Platzen der Knorpelzellen. Die zwischen ihnen übrig bleibende hyaline Substanz erhält daher auch eine verschiedene Faser-Richtung, je nach der Anordnung der ursprünglich im Knorpel vorhandenen Zellen. An der freien Oberfläche liegen die Fasern horizontal, der Oberfläche entsprechend, in der Tiefe dagegen vertical gegen dieselbe. Je mehr die Knorpelzelle zu Grunde gegangen und je vollständiger die Zerfaserung eingetreten ist, desto geringer zeigt sich bei chemischer Untersuchung der Gehalt an Chondrin, desto reichlicher liefert der kranke Knorpel gewöhnlichen Leim. Diese Abänderung der chemischen Zusammensetzung deutet offenbar ebenso sehr als die Veränderung der Structur auf eine wesentliche Störung der Ernährung des Knorpels. Die bezeichneten Structurveränderungen stimmen aber im Wesentlichen mit den an der entzündeten Hornhaut und weiterhin an allen zelligen Gebilden im Zustande der Entzündung nachgewiesenen Veränderungen¹⁾ so vollständig überein, dass wir nicht anstehen dürfen, auch diesen sogenannten Zerfaserungsprocess der Knorpel als einen entzündlichen zu bezeichnen. Im weiteren Verlaufe der Entzündung sieht man (bei Synovitis hyperplastica granulosa) auch Granulationen aus dem Knorpelgewebe sich entwickeln, in welche vom Knochen und von der Synovialhaut aus Blutgefässe hineinwachsen. Ob die Knorpel-Entzündung primär entstehen, oder nur von den Nachbartheilen übertragen werden kann (was allerdings wahrscheinlicher ist), lässt sich nicht entscheiden. Der Einfluss der knöchernen Gelenkenden auf ihre knorpeligen Ueberzüge kann nicht hoch angeschlagen werden, da man selbst bei Verschwärung der ersteren die Knorpel zwar abgelöst, aber gerade in dem der Knochensubstanz zunächst liegenden Theile oft normal und nur an der freien Oberfläche in der beschriebenen Weise zerfasert findet. Dagegen scheint die Beschaffenheit der Synovia und, da diese von dem Zustande der Synovial-

¹⁾ Vgl. Virchow, in seinem Archiv, 1852. — His, Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie der Hornhaut. Basel 1856.

haut abhängig ist, indirect auch die Synovialhaut auf die Knorpel einen erheblichen Einfluss zu haben.

Eine zweite pathologische Veränderung der Gelenkknorpel, welche wir hier erwähnen müssen, ist die Verknöcherung. Dieselbe erfolgt entweder blos durch Ablagerung von Kalksalzen in das Gewebe des Knorpels, oder unter gleichzeitigem partiellen Wachstum desselben. Bei der ersteren Form beginnt die Verknöcherung gleichmässig in der ganzen Ausdehnung des Gelenkknorpels unmittelbar am Knochen und schreitet von da aus gegen die Oberfläche fort. Hierdurch entsteht zunächst eine feste, weisse Lamelle; denn in dem verknöcherten Knorpel tritt nirgend die Bildung von Markräumen (Gefässcanälchen) auf, die neue Knochensubstanz ist von vornherein sklerosirt (*Eburneatio*). Schreitet die Verknöcherung bis zur Gelenkfläche vor, so erhält die neue Knochensubstanz dort eine feine Politur. — Die zweite Form der Verknöcherung beginnt mit einer, in einzelnen Hügeln auftretenden Wucherung des Knorpels unter gleichzeitiger Hyperämie der entsprechenden Stellen des Knochens. Diese Hügel verknöchern demnächst, indem zugleich die benachbarten Gefässcanäle aus dem Knochen sich in dieselben fortsetzen. Die prominirenden Hügel erhalten nach und nach gleichfalls ein polirtes Ansehen. — So entstehen in dreifacher Weise an den Gelenk-Enden der Knochen statt des knorpeligen Ueberzuges polirte Schliff-Flächen: durch die beiden Arten der Verknöcherung des Knorpels und durch wirkliches Abschleifen des entblössten Knochens, nach vorgängiger Zerstörung des Knorpels durch den Process der Zersetzung.

IV. Die fibröse Gelenkkapsel und die übrigen, das Gelenk umgebenden Bänder werden primär wohl niemals¹⁾, secundär aber bei allen bedeutenden Gelenk-Entzündungen verändert gefunden. Sie erscheinen matt, aufgelockert durch ein gallertiges, zwischen ihre sehnigen Fasern infiltrirtes Exsudat. Diese Auflockerung kann sich in heftigen Fällen zu einer vollständigen Erweichung steigern; in anderen Fällen verschmelzen sie gänzlich mit dem verdickten sub-synovialen Bindegewebe zu einer speckigen Masse. Seltener findet man sie verdickt und gleichzeitig verhärtet.

V. Die Faserknorpel, welche theils als *Cartilagine interarticularia* (Bandscheiben, Menisci), theils als *Labra cartilaginea* an den Gelenken auftreten, können sowohl primär als secundär von Entzündung ergriffen werden, und unterscheiden sich in dieser Beziehung also ebenso sehr von den Gelenkknorpeln, wie in ihrer

¹⁾ Richet, l. c. Gurlt, l. c. pag. 55.

Structur. Man findet sie angeschwollen, gallertig erweicht, eiternd. Wo in ihnen die Elemente des Knorpels vorherrschen, da wird auch die am Knorpel vorkommende Zärfaserung beobachtet. —

Gewöhnlich ist es nicht schwer, bei der anatomischen Untersuchung eines entzündeten Gelenkes den Ausgangspunkt der Entzündung mit grosser Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Wie sich aus den vorstehenden Untersuchungen schon ergibt, hat man denselben wahrscheinlich immer entweder (und zwar bei Weitem am Häufigsten) in der Synovialmembran, oder in den knöchernen Gelenkenden zu suchen, die Veränderungen in allen anderen Gebilden aber als secundäre zu betrachten. Die Entzündung der knöchernen Gelenkenden geht gewöhnlich sehr schnell auch auf die Synovialmembran über, so dass besondere Krankheitsbilder sich wohl für diese und jene Form aufstellen, aber die Unterscheidung sich bei Weitem nicht immer in dem einzelnen Falle vollkommen durchführen lässt. Die Benennungen: Arthrophlogosis synovialis, fibrosa, ossium u. s. f. sind daher vorzugsweise für die ganz frischen Fälle von Bedeutung. Jede zu bedeutender Höhe gesteigerte Gelenk-Entzündung betrifft das ganze Gelenk, ist also eine Panarthritis.

B. Aetiologie.

Die Prädisposition eines Gelenkes zur Entzündung ist desto grösser, je mehr dasselbe bewegt wird; von Belang ist ferner die Grösse der articulirenden Flächen: am Häufigsten sind daher Entzündungen des Kniegelenks, dann folgt das Hüft-, das Fuss-, Hand-, Ellenbogen- und Schultergelenk (Nélaton). Namentlich haben diese Prädispositionen für die aus inneren oder allgemeinen Ursachen entspringenden Gelenk-Entzündungen Bedeutung. Durch Verletzungen, namentlich penetrirende Wunden, kann in jedem beliebigen Gelenke mit gleicher Leichtigkeit Entzündung hervorgerufen werden. Für traumatische Entzündungen sind eben diejenigen Gelenke am Meisten prädisponirt, welche am Häufigsten Verletzungen ausgesetzt sind.

A. Als allgemeine, innere, oder constitutionelle Veranlassungen der Gelenk-Entzündung bezeichnet man:

1) Acute Dyskrasien, wie Typhus, Scharlach (seltener andere acute Exantheme), Pyämie (mit Einschluss der puerperalen), Ruhr, Diphtheritis, Urämie. Gelenk-Entzündungen dieses Ursprungs treten regelmässig acut auf, können aber weiterhin in den chronischen Verlauf übergehen.

2) Chronische Dyskrasien, namentlich Gicht, Skropheln und Syphilis. Scrophulosis vermag, unabhängig von einer ört-

lichen Einwirkung, Entzündungen sowohl der knöchernen Gelenk-Enden, als auch der Synovialhaut hervorzurufen, meist mit chronischem Verlauf. Auch die syphilitische Gelenk-Entzündung ist keineswegs selten und verläuft zuweilen sehr acut.

3) Hiervon ist wohl zu unterscheiden die beim Tripper beobachtete Gelenk-Entzündung, welche (besonders häufig im Kniegelenk) auftritt, ohne dass eine äussere Schädlichkeit sich als Ursache derselben nachweisen lässt. Das Räthselhafte dieser Gelenk-Entzündung wird nicht vermindert durch die mehrfach gemachte Beobachtung, dass überhaupt Reizungen der Harnröhre, wie sie namentlich durch das Einführen des Katheters veranlasst werden, zuweilen ganz plötzlich eine acute Gelenk-Entzündung zur Folge haben.

Letale Fälle der Art, bei denen die Section eitrigen Erguss in mehreren Gelenken und zugleich in den Leibeshöhlen nachwies, mögen wohl aus purulenter Infection, oder (wie ich sah) aus Nierenerkrankungen, welche mit dem, den Katheterismus indicirenden Uebel eine gleiche Quelle hatten, oder doch neben ihm, unabhängig von der Anwendung des Katheters, sich entwickelt haben, zu erklären sein.

In welcher Weise durch ein Allgemeinleiden (einer acuten oder chronischen Dyskrasie) Gelenk-Entzündung veranlasst wird, lässt sich zur Zeit noch nicht genügend erläutern. Dass es sich um allgemeinere Wirkungen handelt, ist unzweifelhaft, da in der Regel mehrere Gelenke, wenn auch in verschiedenem Grade, zugleich oder bald nach einander befallen werden, — Polyarthrititis. Aber es ist noch keineswegs erwiesen, dass die weit verbreitete Wirkung immer das Resultat einer chemischen Veränderung der Blutmischung sei. Am Deutlichsten ist dies bei der echten Gicht (Panarthrititis urica, nach Hueter), bei welcher die Ablagerung harnsaurer Salze in und an den Gelenken das wesentliche Moment ist. Auch bei den acuten Dyskrasien handelt es sich vielleicht um chemische Abänderungen der Zusammensetzung des Blutes, die aber nichts Specificisches an sich haben, sondern von dem Fieber als solchem abhängig sind, welches überall die Bildung „entzündungserregender Stoffe“ im Blute veranlasst, — Polyarthrititis ex statu febrili, nach Hueter¹⁾.

Für die Mehrzahl der nicht-traumatischen Gelenk-Entzündungen fehlt es aber, auch bei Berücksichtigung aller vorstehend erläuterten Verhältnisse, an genügenden ätiologischen Momenten. Man nennt dieselben „rheumatische“ und hat zu ihrer Erklärung eine besondere Erkrankungsform „Rheuma“ angenommen, welche durch ihre Entstehung aus „Erkältungen“ ausgezeichnet sein soll. Sowohl chronische als auch acute Gelenk-Entzündungen, Rheumatismus articularum

¹⁾ Billroth u. Pitha, Handbuch, I. 2. pag. 86, und l. c. pag. 102 u. f.

chronicus und acutus, sollen auf diese Weise entstehen. Im Verlaufe des letzteren war seit Jahrzehnten die Endocarditis rheumatica als eine besonders gefährliche Complication bekannt (vgl. Bd. I. pag. 289). Nach Hueter wäre nicht das Gelenkleiden, sondern die Endocarditis als das Primäre aufzufassen und die begleitende Polyarthritus synovialis acuta aus den von dem sammtartigen Beschlage der Mitralklappe herrührenden Embolien in den Arterien der Synovialhaut abzuleiten. Auch die chronisch verlaufenden Fälle von sog. rheumatischer Gelenk-Entzündung glaubt Hueter, theils aus der vorausgegangenen acuten, theils aus chronischer Endocarditis ableiten zu können, so dass die Polyarthritus ex Endocarditide als eine besondere Art der Gelenk-Entzündung aufzustellen wäre. Jedenfalls bliebe aus der alten Gruppe „rheumatische Gelenk-Entzündung“ noch eine grosse Menge von Fällen übrig, die wir ehrlich als *ex causa ignota* entstanden bezeichnen müssen, wenn wir nicht vorziehen uns bei der Annahme der (oft gar nicht nachzuweisenden) „Erkältung“ zu beruhigen.

B. Als örtliche Veranlassungen, welche unabhängig von einer Prädisposition oder einem Allgemeinleiden Gelenk-Entzündung — und zwar in der Regel nur eines, des eben verletzten Gelenkes (Monarthritus) — hervorrufen, sind alle Verletzungen der Gelenke im weitesten Sinne, also nicht bloß penetrirende Wunden und Fracturen, sondern auch Quetschungen und Verstauchungen (vgl. Cap. III.) aufzuführen. In diesem Sinne müssen traumatische Gelenk-Entzündungen als die bei Weitem häufigsten bezeichnet werden. Bei Individuen, welche mit einem der oben angeführten Allgemeinleiden behaftet sind, können höchst unbedeutende Insultationen zur Erregung einer sehr heftigen Gelenk-Entzündung ausreichen.

Eröffnungen eines Gelenkes können nicht bloß durch Wunden, welche das Gelenk selbst treffen, sondern auch durch Verletzungen von Schleimbeuteln, welche mit der Gelenkhöhle communiciren, überdies aber durch Anätzungen oder brandige Zerstörung der Gelenkkapsel bewirkt werden (Verbrennung, Frostangrän u. s. f.); die durch letztere hervorgerufene Gelenk-Entzündung steht der traumatischen (im engeren Sinne des Wortes) an Heftigkeit nicht nach. Offenbar ist in allen diesen Fällen der Eintritt der von der Luft getragenen Fäulniskeime als wesentliche Entzündungsursache zu betrachten. Das Eindringen größerer fremder Körper steigert die Heftigkeit der Entzündung. Eiter, welcher in der Umgebung eines Gelenkes gebildet wurde, kann nach Verschwärung der Kapsel (oder auch von einem mit ihr communicirenden Schleimbeutel aus direct) in die Gelenkhöhle

eindringen und eine Arthrophlogosis acutissima veranlassen. Von dem Einfluss benachbarter Knochen-Entzündungen war schon pag. 528 und 533 die Rede. Analog verhält es sich mit dem Vordringen von Neubildungen (Geschwülsten) gegen und in eine Gelenkhöhle (vgl. Abschn. VII. Cap. III.). Auch Aneurysmen, welche einer Gelenk-Kapsel oder einem Gelenk-Ende nahe gerückt sind, bedingen durch mechanische Reizung Entzündung des Gelenks.

C. Verlauf und Ausgänge.

Der Verlauf einer Gelenk-Entzündung ist, wie bereits erwähnt, bald acut, bald chronisch, zeigt aber ausserdem, je nach den Veranlassungen und nach dem Bau des befallenen Gelenkes, beträchtliche Verschiedenheiten¹⁾.

Als Ausgänge können (ausser der Zertheilung und dem Brande) im Allgemeinen aufgeführt werden: 1) Gelenk-Eiterung, Gelenk-Abscess (Pyarthros, Arthropyosis); 2) Gelenk-Wassersucht (Hydarthros, Hydarthrosis); 3) Gelenk-Verschwärung, sogenannter Gliedschwamm, weisse Gelenk-Geschwulst (Tumor albus, Arthrocaec); 4) Gelenksteifigkeit (Ankylosis).

Eine scharfe Grenze zwischen diesen sogenannten Entzündungsausgängen und der Gelenk-Entzündung selbst lässt sich aber weder bei der Beschreibung, noch am Krankenbette ziehen.

I. Acute Gelenk-Entzündung.

Die acute Gelenk-Entzündung hat fast immer entweder die Synovialmembran allein oder diese und die knöchernen Gelenk-Enden zugleich zum Ausgangspunkt; selten ist sie ursprünglich eine reine Knochen-Entzündung. Das einfachste Bild einer acuten Gelenk-Entzündung sehen wir nach penetrirenden Wunden (vgl. Cap. III. d. Abschn.). Schmerz, Functionsstörung, pralle, fluctuirende Geschwulst, Fieber (oft mit gastrischen Störungen) finden sich bei allen Arten der acuten Gelenk-Entzündung. Zuweilen treten allgemeine (Fieber-) Symptome, Unbehagen, Appetitlosigkeit, Frostschauer, namentlich aber auch ein deutlicher Schüttelfrost früher auf, als die Localerscheinungen der Entzündung. Sehr bald wird die Bewegung des Gelenkes stark behindert, es tritt Schmerz hinzu, welcher sich über das ganze Gelenk, oft sogar darüber hinaus verbreitet, gewöhnlich aber auf

¹⁾ Den von Hueter nachgewiesenen Varietäten der anatomischen Veränderungen (vgl. pag. 598 u. f.) entsprechend, lassen sich auch ebenso viele verschiedene Krankheitsbilder entwerfen. Dazu scheinen mir aber die bisherigen Erfahrungen noch nicht genügend.

einer Stelle besonders heftig ist. Er wird durch Druck und vor Allem durch Bewegung des kranken Gelenkes vermehrt, hält oft ganze Wochen lang in solcher Heftigkeit an, dass die geringste Bewegung, sogar die geringste Erschütterung, z. B. durch einen vorüber fahrenden Wagen, den Kranken zum heftigen Schreien bringt und in die grösste Aufregung versetzt. Der schmerzhaften Erregung entsprechend, treten häufig Muskelkrämpfe an dem erkrankten Theile auf, durch welche, da sie Bewegungen des entzündeten Gelenkes bewirken, nicht blos der Schmerz, sondern auch die Krankheit selbst gesteigert wird. Die äussere Haut röthet sich nur, wenn das entzündete Gelenk ganz oberflächlich liegt; meist ist sie jedoch in Folge der Schwellung gespannt und glänzend, selbst über tief liegenden Gelenken. Die Geschwulst ist mehr oder minder erheblich und kann mannigfach wechseln; sie kann theilweise verschwinden und in derselben oder noch grösserer Ausdehnung wiederkehren¹⁾. Sie wird zum grössten Theil durch die übermässige Secretion und Ansammlung pathologischer Synovia (Exsudat, Eiter in der Synovialhöhle), zum Theil aber auch durch die Wucherungen der Synovialhaut selbst bedingt. Wenn Erguss in die Gelenkhöhle ohne erhebliche Verdickung der Synovialmembran und der umgebenden Theile besteht, so ist Fluctuation in der ganzen Ausdehnung der Kapsel (bei oberflächlich liegenden Gelenken) fühlbar; dieselbe wird aber undeutlicher, wenn gleichzeitig fibrinöse Exsudate in den Umhüllungen des Gelenkes vorhanden oder die letzteren durch parenchymatöse Wucherung erheblich verdickt sind. An tief liegenden Gelenken ist Fluctuation schwer oder gar nicht zu entdecken (z. B. am Hüftgelenk). Den knöchernen Gelenk-Enden entsprechend, ist die Geschwulst weniger vorspringend, aber härter; an den mit dickem fibrösen Gewebe überzogenen Stellen ist sie resistenter, als da, wo die Synovialhaut nur schwach bedeckt ist. Die Wärme-Erzeugung im Gelenke steht in geradem Verhältniss zu der Intensität der Entzündung. Sie besteht unabhängig von der bei heftigen Gelenk-Entzündungen sehr merklichen Steigerung der Eigenwärme des ganzen Körpers. Zuweilen findet man bei Bewegung des Gelenkes oder beim Druck auf dasselbe eine Art von Knarren, ein „Neuledergeräusch“, wie bei Entzündungen seröser Häute (der Pleura), wie bei diesen abhängig von fibrinösen Niederschlägen im Innern der Kapsel.

Entzündete Gelenke haben eine vorwiegende Tendenz, eine bestimmte Lage anzunehmen und zwar eine solche, welche die

¹⁾ Wie überall (vgl. Bd. I. pag. 11), so hat man auch für die Bestimmung der Geschwulst bei Gelenk-Entzündung genaue Messungen vorzunehmen und sich nicht auf das trügerische Augenmaass zu verlassen.

das Gelenk herum liegenden Bänder und Muskeln in Gleichgewicht bringt und die Spannung derselben vermindert. Die Kranken suchen eine solche Lage instinctmässig, weil die dadurch bewirkte Verminderung der Zerrung der Weichtheile und des Druckes der Gelenkflächen gegen einander den Schmerz erträglicher macht.

Zuweilen verläuft die acute Gelenk-Entzündung in ein bis fünf Tagen und nimmt dann ihren Ausgang in Zertheilung oder in Eiterung. Wenn die veranlassende Ursache gering und die Synovialhaut nicht in ihrer ganzen Ausdehnung entzündet ist, so kann bei starker Anschwellung Schmerz und Fieber sehr mässig, und die Röthe nur leicht durchscheinend sein („rosenartig“) oder ganz fehlen; allmählig werden dann die Erscheinungen geringer, das Gelenk gewinnt Anfangs eine schwache, später seine ganze Beweglichkeit wieder.

Bei stürmischem Verlaufe und grosser Intensität der Erscheinungen ist aber der Ausgang in Gelenk-Eiterung¹⁾ viel wahrscheinlicher. Zuweilen entsteht die Eiterung so schnell, dass man glauben könnte, es habe eine plötzliche Ablagerung von Eiter in dem Gelenke Statt gefunden. In manchen Fällen der Art findet man bei mikroskopischer Untersuchung des Gelenk-Inhaltes vorwiegend nicht Eiterzellen, sondern zerfallene fibrinöse Massen. Solche überaus acute eitrige oder eiterähnliche Ergüsse finden sich in den Gelenken namentlich bei Pyämie, zumal bei Wöchnerinnen, ferner bei acuten Exanthemen, endlich auch zuweilen nach Quetschungen und Verstauchungen der Gelenke. In den letztgedachten Fällen kann ein beträchtlicher Blut-Erguss in die Gelenkkapsel (Haematarthros), wie er durch solche Verletzungen sehr häufig bedingt wird, zu der Bildung jener eiterähnlichen Massen (durch Zerfall der Gerinnsel) wesentlich beitragen.

Die Gelenk-Eiterung ist nur an oberflächlich gelegenen Gelenken schon vor dem Aufbruch zu erkennen. Die Diagnose stützt sich dann auf die mit grosser Schmerzhaftigkeit verbundene Anschwellung des Gelenkes, so wie auf die Fluctuation in demselben, welche jedoch mitunter schwer zu entdecken ist, das Oedem in der Umgegend und die

¹⁾ Als Gelenk-Eiterung, Arthropoyosis, Pyarthros, weniger gut als Gelenk-Abscess (Abscessus articuli), bezeichnet man im engeren Sinne die Ansammlung von Eiter innerhalb einer Gelenkkapsel. Im weiteren Sinne wird diese Benennung auch für Abscesse gebraucht, welche ausserhalb der Kapsel und unabhängig von einer Gelenkerkrankung, in der Nähe eines Gelenkes auftreten. Abscesse der letzteren Art sind von Wichtigkeit, weil die nachfolgende Narbenbildung die Function des Gelenkes stören oder, was weit bedenklicher ist, der Eiter seinen Weg, statt nach Aussen, in die Gelenkkapsel hinein nehmen und dadurch eine Arthroplogosis acutissima erregen könnte. Häufiger als man gewöhnlich glaubt, communiciren diese periarticulären Abscesse mit dem Gelenk.

bald auftretende Röthung der das Gelenk bedeckenden Haut (sogen. Pseudo-Erysipel). Dies alles sind Symptome, die auch der Gelenk-Entzündung angehören können; aber eine Gelenk-Entzündung, bei der dieselben mit steigender Heftigkeit und mit beträchtlichem Fieber bestehen, ist voraussichtlich bereits in Eiterung übergegangen.

Der weitere Verlauf einer sich selbst überlassenen Arthropyosis ist verschieden, je nachdem die Eiterbildung nur von den oberflächlichsten Schichten der Synovialhaut ausgegangen ist (katarrhalische Gelenk-Eiterung, nach R. Volkmann) oder auf tiefer greifenden Veränderungen derselben beruht. Im ersteren Falle kann Resorption des eitrigen Ergusses mit vollständiger Wiederherstellung der Beweglichkeit des Gelenkes erfolgen. Wenn dagegen auch von den tieferen Schichten der Synovialhaut Eiter geliefert wird, wie dies bei grosser Intensität der Erscheinungen vorausgesetzt werden muss, so führt der Pyarthros in der Regel zur eitrigen Infiltration und Zerknorpelung der Gelenkknorpel, weiterhin zur Verschwärung der knöchernen Gelenkenden (nach vorgängiger Abstossung der Knorpel) und der Gelenkkapsel zugleich, oder doch der letzteren allein, und somit zum Aufbruch des Gelenkes. Mitunter tritt der Eiter in die Nachbargewebe, und wird, wenn er noch mehr von seröser Beschaffenheit und seine Menge nicht zu bedeutend ist, im Bindegewebe resorbirt (Velpeau und Parmentier). In der Regel aber folgt auf den Aufbruch des Gelenkes auch der Durchbruch des Eiters nach Aussen. Selten erfolgt der letztere auf geradem Wege; vielmehr entstehen meist in der bereits wiederholt beschriebenen Weise, je nach der Localität, erst Senkungs-Abscesse in der Umgebung des Gelenkes. Endlich wird aber durch fortschreitende Ulceration auch die Haut durchbrochen und der Eiter ergiesst sich, gewöhnlich in grosser Menge, nach Aussen. Die Diagnose kann nunmehr nicht leicht zweifelhaft sein. Bestehen noch Bedenken, so werden sie durch die Percussion gelöst, welche in der Gelenkkapsel auf diesem Stadium, wegen der eingetretenen Zersetzung des Eiters Luftgehalt erkennen lässt.

Die Knochen-Enden, welche durch Caries ihre Form eingebüsst haben und durch die zerstörten, oder doch beträchtlich gedehnten Bänder nicht mehr in ihrer normalen Lage erhalten werden, folgen dem Muskelzuge, der zuweilen sogar schon vor dem Aufbruch seine Wirkung geltend macht. Auf diese Weise entstehen dann die sogenannten Luxationen (vgl. Cap. III. dieses Abschnitts).

Der Eiter nimmt nach dem Aufbruch unter dem Einflusse der Luft meist sehr schnell eine schlechte Beschaffenheit an. Bessert er sich allmählig, wird seine Quantität geringer, nimmt die Geschwulst ab

und der Kranke an Kräften zu, so kann man auf einen günstigen Ausgang hoffen. Es entsteht dann gewöhnlich eine wahre knöcherne, vollkommene Ankylose. Nur sehr selten stellt sich die Beweglichkeit des Gelenkes wieder her¹⁾. Der bei Weitem häufigere Ausgang aber ist der in schnell um sich greifende Verjauchung. Der Kranke geht dann unter den Erscheinungen der Pyämie oder des hektischen Fiebers bald schnell, bald langsam zu Grunde, wenn Amputation oder Resection ihn nicht etwa noch retten.

Auch Brand der umgebenden Weichtheile, sowie auch des weiter gegen die Peripherie gelegenen Theiles der Extremität kann als Ausgang der acuten Gelenk-Entzündung vorkommen, — wahrscheinlich in Folge der durch die ausgedehnte Kapsel bedingten Gefäßcompression. Velpeau²⁾ erwähnt Fälle der Art ausdrücklich.

2. Chronische Gelenk-Entzündung.

a) Destructive (fungöse) Gelenk-Entzündung. Tumor albus. Arthrocace.

In vielen Fällen wird die ursprünglich acute Gelenk-Entzündung chronisch. Die bei jener beschriebenen Veränderungen, namentlich die Verdickung der Synovialhaut und die Ansammlung einer grösseren Menge auch qualitativ veränderter Synovia bleiben bestehen, und die Haltung des Gliedes sowie die Bewegungen des Gelenks kehren nicht zur Norm zurück. Nur das Fieber erlischt oder ermässigt sich doch erheblich, die spontanen Schmerzen lassen nach, hören auch wohl ganz auf, während Berührung oder Bewegung des Gelenkes sofort wieder Schmerzen, auch wohl Muskelkrämpfe hervorrufen. — Bei dyskrasischen, besonders scrophulösen Individuen erfolgen Nachschübe der Entzündung und weitere Gewebs-Metamorphosen bei einer solchen, aus dem acuten Verlauf hervorgegangenen, ebenso wie bei der ursprünglich chronischen Entzündung. Letztere nimmt ihren Ausgang aber gleich häufig von den Gelenk-Enden, wie von der Synovialhaut. Sie beginnt ohne Fieber und mit geringen Schmerzen, welche nur durch Bewegung oder Druck auf das Gelenk erregt werden. Gewöhnlich entwickelt sich in der Umgebung der verdickten Synovialmembran durch fortgesetzte Wucherung ein speckiges „sarcomatöses“ Gewebe, in welchem zuletzt Eiterung und in weiterer Folge Verschwärung auftreten kann. Diesen Ausgang bezeichnet man als Gliederschwamm, Fungus articuli, Tumor albus. Werden durch Verschwärung

¹⁾ Beispiele dieses glücklichsten Ausganges s. bei R. Volkmann (l. c.) und aus meiner Klinik bei Heineke, Krankheiten des Knies, Danzig 1866.

²⁾ Dictionnaire en 30 vol., nouv. édit.

Sardelen, Chirurgie. 7. Aufl. II.

die Gelenkbänder zerstört, so entsteht auch in chronischen Fällen, zümal bei den häufig auftretenden sympathischen Muskelverkürzungen, eine Verschiebung der Gelenk-Enden gegen einander, eine Verrenkung aus innerem Grunde, *Luxatio spontanea*, und es bilden sich *Congestionsabscesse*, aus denen schliesslich Gelenkfisteln hervorgehen.

Die gewöhnliche, chronische Entzündung der Gelenk-Enden hat ihren Sitz in der spongiösen Substanz, kommt fast ausschliesslich bei scrophulösen Individuen auf Grund der sogenannten oder wahren Tuberculose der Knochen vor (vgl. pag. 591 u. f.), und führt entschieden zu *Caries*. Der im Knochen gebildete Eiter und die abgelösten Knochenstückchen werden wegen der inzwischen eintretenden Verdickung des Periosts selten direct nach Aussen, sondern fast immer in die Gelenkhöhle entleert. Dann tritt plötzlich eine Steigerung zur acuten Form auf, während bis dahin alle Symptome geringfügig oder doch schwankend waren. Die ausgedehnten Zerstörungen, welche diese Art der *Arthrophlogosis* herbeiführt, geben ihr noch den meisten Anspruch auf den von Rust für die destructive Gelenk-Entzündung eingeführten Namen *Arthroace*. Das erste Symptom dieser gefährlichen Krankheit ist bald Schmerz, und zwar häufig Schmerz in einiger Entfernung von dem leidenden Gelenke, bald Functionsstörung, bald endlich Anschwellung des Gelenkes, welche jedoch nur an oberflächlich liegenden Gelenken deutlich wahrgenommen werden kann. Die Geschwulst hat die Gestalt der Gelenk-Enden, obgleich sie gewiss nicht in einer wirklichen Auftreibung, sondern vielmehr in einer Exsudation und Auflagerung unter dem Periost ihren Sitz hat (vgl. Knochen-Entzündung). Hierauf beruht wesentlich die Unterscheidung von dem aus Entzündung der Synovialhaut entstandenen *Tumor albus*. Nach und nach wird die Geschwulst, indem die Entzündung sich auf das ganze Gelenk ausbreitet, sehr bedeutend, die Brauchbarkeit ganz vernichtet, Schmerzen und Störungen des Allgemeinbefindens sehr erheblich, und es erfolgt endlich, oft nach jahrelangen Leiden, der Aufbruch auch bei dieser Art von Gelenk-Entzündung. Hierbei ist wohl zu unterscheiden, ob der Eiter seinen Weg aus dem Knochen direct nach Aussen nahm (in welchem Falle es sich eigentlich nur um *Caries aperta* eines spongiösen Knochenstücks handelt), oder ob das Gelenk selbst aufgebrochen ist, wo dann die bei Weitem grösseren Gefahren der Verjauchung des ganzen Gelenkes eintreten. Es leuchtet ein, dass auch hierbei Verschiebung der Gelenk-Enden erfolgen kann. — In dem einen wie in dem anderen Falle kommt es oft zur Bildung von *Congestionsabscessen* und Gelenkfisteln. Ist der Aufbruch des Gelenkes oder

auch nur die Zerfaserung des Gelenkknorpels bei Entzündung der Gelenk-Enden erfolgt, so ist Heilung nur durch Verwachsung derselben (*Ankylosis vera*), oder durch Bildung eines „neuen“ Gelenkes nach vorheriger *Luxatio spontanea* möglich.

b) Deformirende Gelenk-Entzündung. *Arthroplogosis deformans*.
Polyarthrititis deformans.

Als eine besondere Art der chronischen *Arthroplogosis* ist diejenige hervorzuheben, welche erst in neuerer Zeit von den irländischen Aerzten Colles, Adams und Smith am Hüftgelenk erkannt und zuerst als *Malum coxae senile*, späterhin als „chronisch-rheumatische Entzündung“ auch an den meisten übrigen Gelenken beschrieben ist¹⁾. Dieselbe ist ausgezeichnet durch die bedeutende Missstaltung, welche die Gelenk-Enden durch Abflachung und Verbiegung, die Umgebungen des Gelenkes durch Entwicklung von stalaktitenförmigen Osteophyten, sowie endlich die articulirenden Flächen durch Eburneation und Abschleifung erleiden. Vgl. pag. 599 u. f. Die Synovialhaut wird hierbei fast immer erheblich verdickt und zeigt constant zottige Wucherungen; niemals aber entsteht Eiter im Gelenk, niemals Caries oder Nekrose. Oft wachsen Osteophyten von Aussen her in die Gelenkkapsel hinein, indem sie einen Ueberzug derselben vor sich her drängen. Hieraus, sowie auch aus der Wucherung einzelner, grösserer Zotten, kann die Bildung von Gelenkmäusen ihren Ursprung nehmen.

Diese Entzündungsform wird ebensowohl bei jugendlichen als bei hochbejahrten Individuen beiderlei Geschlechts, jedoch nicht leicht vor den Jahren der Pubertät angetroffen. Veranlassungen sind oft gar nicht nachzuweisen. Zuweilen wird „Erkältung“ angeschuldigt; in manchen Fällen entstand das Leiden nach übermässigen Anstrengungen oder nach einer Quetschung des Gelenkes.

¹⁾ Rokitansky subsumirt sie unter „entzündliche Osteoporose“. — Stromeyer, welcher das Wesen dieser Krankheit in einer partiellen Obliteration der Gefässe des Gelenks sucht, was mit Hueter's Annahme eines embolischen Ursprunges (vgl. pag. 604) zu vereinbaren wäre, nennt sie „*Arthroxerosis*“, und die Franzosen in neuester Zeit *Arthrite chronique sèche*, obgleich eine Verminderung der Synovia bei diesem Leiden nicht constant ist. — E. Gurlt (l. c.) schlägt die Benennung „chronische Entzündung der Gelenke“ vor, gesteht aber selbst, dass nur durch einen besonderen Nachdruck, den man auf das „chronische“ zu legen habe, eine Verwechslung mit anderen chronischen Gelenk-Entzündungen zu vermeiden sei. — Vgl. auch R. Hein, Beitrag zur Kenntniss der chronischen Gelenk-Entzündung, *Virchow's Archiv*, 1858, Bd. XIII. pag. 16.

Unter den Symptomen ist, nachdem längere Zeit dumpfer Schmerz und Kraftlosigkeit des betreffenden Gliedes vorausgegangen sind, vor Allem charakteristisch das rauhe Knarren, welches man oft durch jede, zuweilen aber nur durch gewisse Bewegungen in dem Gelenke erzeugen kann. Demnächst magern die das Gelenk umgebenden Muskeln in auffallendem Grade ab. Dies findet seine Erklärung darin, dass der Patient, weil er der Schmerzen wegen die Bewegungen scheut, jene Muskeln nicht gebraucht; der ruhende Muskel aber magert immer ab und degenerirt endlich (vgl. Krankheiten der Muskeln). Ueberdiess kann sich die Entzündung auch von den knöchernen Gelenk-Enden auf die in der Nähe inserirten Muskeln fortsetzen, wodurch schmerzhaft Spannung und Rigidität bedingt werden. Die spontane sowohl, als die durch Bewegung erregte Schmerzhaftigkeit des Gelenkes ist sehr verschieden, niemals von unerträglicher Heftigkeit, wie bei der acuten Gelenk-Entzündung, oft aber von grosser Ausdehnung, weit über den Umfang des Gelenkes hinaus. Der Verlauf ist sehr schleichend, die Beschwerden oft wechselnd, während die Krankheit permanent und das Gelenk immer mehr steif wird.

D. Prognose.

Die Prognose einer Gelenk-Entzündung muss man sowohl in Betreff der Lebensgefahr, als in Betreff der Brauchbarkeit des erkrankten Theils, immer höchst vorsichtig stellen. Im Allgemeinen sind acute Gelenk-Entzündungen lebensgefährlich und chronische mindestens sehr schwer zu beseitigen.

Die Lebensgefahr einer Gelenk-Entzündung hängt wesentlich von der Eiterung ab. Es handelt sich hier, wie bei den Eiterungen überhaupt, um Pyämie, amyloide Degeneration und hektisches Fieber (vgl. Bd. I. pag. 245 u. f.). Amyloide Degeneration ist in Folge von Gelenk-Eiterungen, namentlich bei Kindern sehr häufig. Auch acute und chronische Tuberculose wird in Folge chronischer Gelenk-Entzündungen vorzugsweise bei jugendlichen Kranken beobachtet. In der grossen Mehrzahl der Fälle aber ist die Ursache des tödtlichen Ausganges einer Gelenk-Entzündung in dem Fieber zu suchen, welches von der Eiterung abhängig ist. Verläuft dasselbe, wie in der Mehrzahl der chronischen Fälle, schleichend, ohne sehr bedeutende Temperatur-Erhöhungen, aber mit stetigem Sinken der Kräfte, so bezeichnet man es hier, wie bei anderen Eiterungen, als „hektisches Fieber“. Thrombosen und die von der Verschleppung der Thromben abhängige Pyämie (*Pyæmia multiplex*, nach Hueter) findet man als Todesursache nur bei solchen Gelenk-Eiterungen, welche

bereits zum Durchbruch der Kapsel geführt haben. Es scheint, dass die Berührung des Eiters mit den periarticulären Venen erforderlich ist, um Thrombose einzuleiten (Hueter).

In Betreff der späteren Brauchbarkeit des entzündeten Gelenkes gewähren die chronischen Entzündungen im Allgemeinen eine schlechtere Prognose als die acuten. Dass bei letzteren, selbst wenn es zur Eiterung gekommen ist, noch eine vollständige Wiederherstellung der normalen Beweglichkeit erreicht werden kann, wurde bereits pag. 609 erwähnt. In der grossen Mehrzahl der Fälle erlangt das Gelenk nach Ablauf der Entzündung die normale Beweglichkeit nur in beschränktem Maasse wieder oder wird ganz steif. (Vgl. Ankylose). Sehr viel seltener bleibt eine pathologische Beweglichkeit zurück, ein sogenanntes Schlottergelenk. Ein solches hat seinen Grund äusserst selten in Veränderungen der knöchernen Gelenk-Enden, in der Regel vielmehr in einer Dehnung, welche die durch entzündliche Auflockerung erweichten Gelenkbänder seitens des in der Gelenkkapsel angehäuften Exsudats erlitten haben.

E. Behandlung der Gelenk-Entzündung.

a) Behandlung der acuten Gelenk-Entzündung.

Völlige Ruhe des Gelenkes ist die erste Bedingung der Heilung einer acuten Gelenk-Entzündung. Ein immobilisirender Verband, der das kranke Gelenk zur Ruhe zwingt, ist daher eins der wichtigsten Heilmittel bei Gelenk-Entzündungen. Nächst der Erfüllung der *Indicatio causalis* (der meist unausführbaren Entfernung oder Bekämpfung noch fortwirkender Entzündungsursachen) giebt es keine dringendere Indication, als diejenige, jede Bewegung des entzündeten Gelenkes zu verhüten. Wir haben schon der Haltung des Gliedes gedacht, welche die Kranken instinctmässig annehmen. Diese lindert die Schmerzen aber nicht auf die Dauer. Zuweilen wird es, der Schmerzen wegen, ganz unmöglich, diese Haltung später zu ändern; dies kann, wenn die Heilung durch Ankylose erfolgt, eine bleibende Difformität zur Folge haben. Man muss also möglichst früh dafür sorgen, dass das Glied in einer solchen Stellung fixirt werde, in welcher es auch auf die Dauer möglichst gute Dienste thun kann. Zwar wird der Kranke zuerst über grosse Schmerzen klagen, wenn man die Haltung des Gliedes ändern muss, um dasselbe in den Verband zu bringen; doch wird er sich bald an die nunmehr gesicherte Lage gewöhnen. Chloroform ist in diesen Fällen fast unentbehrlich. Hat aber der Kranke schon eine allzu unzweckmässige Haltung angenommen, und steht zu be-

Wichtig, dass man bei Anwendung derselben in der Chloroformnarkose die Extremität in bestimmter Weise lagern könnte, so legt man sie in eine zweifelhafte mit einem Gummiband versehene Rinne, an der man die erforderlichen Veränderungen der Stellung allmählig vornimmt. Nach der vorzüglich von Bennett und Mayor empfohlenen Drahtzirkeln und Drahtschlingen, bedient man sich jetzt mit Recht fast ausschließlich des Gyps-Verfahrens, dem man nöthigen Falls mit Feinstern vermischt, wie bei Fracturen. Im bereits Bd. I. pag. 158 u. f. erläuterten Verzuge des Gyps-Verfahrens zeigen sich auch bei dieser Gelegenheit¹⁾.

Wie für die Reduktion zerbrochener Knochen, hat man auch für die Fixation (Immobilisation) entzündeter Gelenke die permanente Extension angewandt. Ihre Wirkung nach bezeichnet man dieselbe zweckmäßiger als *Distraction der Gelenke* (Volkman); denn die Gelenk-Enden werden in der That von einander gezogen, und grade durch, dass der Druck, welchen die, durch den Zug der krampfhaft verhärteten Muskeln und der (von dem in der Gelenkkapsel angesammelten Exsudat gespannten) Bänder, gegen einander gepressten Gelenkflächen auf einander ausüben, verhütet oder vermindert wird, scheint die Wirksamkeit dieser Behandlungsweise begründet zu sein. Namentlich dürfte der durch den Druck bedingten ulcerösen Usur (Caries) der Knochen dadurch am Sichersten vorgebeugt werden (vgl. pag. 539). Zur Ausübung der Distraction bedient man sich am Besten der pag. 349 und 454 beschriebenen Methode mittelst aufgeklebter Heftpflasterstreifen und angehängter Gewichte. Anwendbar ist die Distraction vorzugsweise für das Hüft- und Kniegelenk; bei Hüftgelenks-Entzündungen verdient sie unbedingt den Vorzug vor der blossen Immobilisation.

Nächst diesen mechanischen Heilmitteln ist die energische und andauernde Anwendung der Kälte (Eisbeutel) für die Behandlung acuter Arthroplogosen von der grössten Bedeutung²⁾. Erreicht man durch die dauernde Anwendung des Eises keinen Nachlass der Erscheinungen in den ersten 24 Stunden, so soll man, wenn es die

¹⁾ Aufgeklebte Blechschienen, die man, dem Gelenk entsprechend, ausbiegt, gewähren oft genügende Festigkeit in sehr bequemer Weise. Vgl. pag. 342.

²⁾ Die früher sehr verbreitete Annahme, dass acute Gelenk-Entzündungen gewöhnlich „rheumatischen Ursprungs“ oder ohne Weiteres „Rheumatismus“ seien (vgl. pag. 603), hat in der Verbindung mit der Ansicht, dass man rheumatische Leiden nicht mit Kälte behandeln dürfe, grossen Schaden angerichtet. Esmarch hat gezeigt, dass sogar bei dem „acuten Gelenkrheumatismus“ — im strengsten Sinne des Wortes — die Behandlung mit Eis vorzügliche Dienste leistet.

Kräfte des Kranken gestatten, Blutentziehungen machen, namentlich Blutegel in der Gegend des kranken Gelenkes setzen; bei lebhafter Reaction und heftigem Schmerz, besonders bei jungen kräftigen Individuen, werden sogar Aderlässe empfohlen. Jedoch ist es sehr rathsam, wenn irgend möglich dem Kranken sein Blut zu sparen, da er durch das Fieber und die, trotz Blutentziehungen, oft eintretende Eiterung ohnehin entkräftet wird.

Die Blutegel müssen, wenn überhaupt, in reichlicher Anzahl (bei grossen Gelenken bis zu 60 und so abwärts bis auf 10) angewendet werden. Die Anwendung der Schröpfköpfe wird meist durch die grosse Empfindlichkeit der Gelenkgegend verboten. Ueberdies leisten sie weniger als Blutegel, weil man durch sie nicht auf einem so engen Raume eine gleich grosse Menge Blut entziehen kann (vgl. Bd. I. pag. 200).

Auch grosse Blasenpflaster (*vésicatoires monstres*, Velpeau) und andere Epispastica werden empfohlen; jedoch hat man, namentlich zu Anfang, dem Eise viel mehr zu vertrauen, als dem Vesicator oder gar der Jodtinctur, welche bei acuten Gelenk-Entzündungen völlig werthlos ist. Demnächst kommen noch die Ableitungen auf den Darmcanal durch entsprechend starke Drastica in Betracht. Was die von Vielen gerühmte Compression betrifft, so dürfte ihre Anwendung in der ersten Zeit, wegen der Schmerzen, kaum ausführbar sein und eher schaden, als nützen; dagegen ist dieselbe bei Abnahme der Krankheits-Erscheinungen, namentlich zur Förderung der Resorption des Exsudats, wohl zu empfehlen und kann namentlich durch elastische Binden zweckmässig ausgeführt werden¹⁾.

Narkotische Mittel, sowohl innerlich als hypodermatisch angewendet, sind von vortrefflicher Wirkung zur Besänftigung des Schmerzes und zur Verhütung oder Unterdrückung der Muskelkrämpfe.

Quecksilbersalbe in starken Dosen dick eingerieben (eigentlich wohl nur dick aufgestrichen), wird auf der Höhe der Entzündung von Vielen als ein wahres Beruhigungsmittel gepriesen, namentlich bei Kindern, die jedenfalls nicht so leicht dem sonst zu befürchtenden Speichelfluss ausgesetzt sind. Ich habe mich von der Wirksamkeit dieses Mittels niemals überzeugen können.

Gelingt es durch die vorstehend erwähnten Mittel nicht die Entzündungs-Erscheinungen rückgängig zu machen, steigern sich diese vielmehr stetig, so ist bei strotzender Füllung der Gelenkkapsel die Punction indicirt. Die Entleerung des Eiters muss aber so verrichtet werden, dass unmöglich Luft (oder doch kein Fäulnisserreger) in das Gelenk eindringen kann, und muss möglichst vollständig sein.

¹⁾ Das früher der Compression bei acuten Gelenk-Entzündungen gespendete Lob mag zum Theil darauf beruht haben, dass man die gute Wirkung, welche der zum Behuf der Compression angelegte Verband als immobilisirender hatte, der Compression zuschrieb.

An einzelnen Gelenken, z. B. am Hüftgelenk, wo schon die Diagnose grössere Schwierigkeiten darbietet, dürfte dieser Aufforderung wohl niemals entsprochen werden können. Die übrigen grösseren Gelenke dagegen können bei Anwendung der subcutanen Methode mit Sicherheit ohne Eintritt von Luft entleert werden. In der Regel bedient man sich dazu eines Troicarts, durch dessen Canüle der Eiter bequem abfliessen kann. Die ursprünglich auf die Entleerung von Eiter aus der Pleurahöhle berechneten Apparate von Schuh und von J. Guérin können hier mit Vortheil angewandt werden. Bei ersterem muss der Eiter durch Druck auf das Gelenk herausbefördert werden; bei letzterem wird er durch eine auf den Troicart genau passende Spritze ausgepumpt, weshalb diesem wohl für den vorliegenden Fall der Vorzug einzuräumen sein dürfte¹⁾. Weniger sicher ist die subcutane Eröffnung des Gelenkes mit einem Tenotom; besonders dürfte die Entleerung dickflüssigen Eiters durch die verhältnissmässig kleine Stichöffnung schwierig sein, und derselbe daher auf unerwünschte Weise in die umgebenden Gewebe eingepresst werden. Bei strenger Durchführung der antiseptischen Methode kann man unbedenklich auch grössere Einschnitte machen und, erforderlichen Falls, Röhren durch das Gelenk führen, welche den Abfluss des Eiters dauernd sicher stellen, — ganz wie bei einem gewöhnlichen Abscess (vgl. Bd. I. pag. 280). — Von der Entleerung des Eiters ist freilich keine schnelle Hülfe gegen etwa schon bestehende Caries oder Wucherung der Kapsel und der Gelenkbänder zu erwarten. Doch auch auf diese kann die Entfernung des Eiters und die Aufhebung der übermässigen Spannung günstig einwirken; und jedenfalls ist Eröffnung bei genauer Befolgung der antiseptischen Methode so unschädlich, dass, wenn Schmerzhaftigkeit und Spannung im Gelenke die Entleerung wünschenswerth erscheinen lassen, die Vermuthung, dass Caries der Gelenk-Enden bestehe, davon nicht abhalten sollte²⁾.

¹⁾ Auch die in neuester Zeit viel genannten und benutzten Saug-Troicarts (Aspirateurs) von Dieulafoy, Chwat, Jessop u. A. sind nur Modificationen der Guérin'schen Saugspritze oder der noch älteren Weiss'schen Magenpumpe. Einen Fall von Arthropyosis genu nach bedeutender Contusion, in welchem ich (schon 1851) mit dem glücklichsten Erfolge mittelst der Guérin'schen Spritze 180 Grammen Eiter (nicht Synovia) entleerte, hat Dr. Kuntze in seiner Inaugural-Dissertation: De arthropyosi genu, Gryphiae 1852 beschrieben.

²⁾ Die Punction bei Pyarthros wird von Vielen gescheut, von Manchen entschieden verworfen. Letztere Ansicht wird namentlich von Stromeyer, auf dessen Darstellung (Handbuch pag. 506—514) ich ausdrücklich verweise, lebhaft vertreten. Ich muss aber mit Bezug hierauf bemerken, dass ich auch vor Einführung der antiseptischen Methode niemals auf diese Verwundung eine Entzün-

Bisher haben wir bei unseren therapeutischen Betrachtungen die Gelenkkapsel als noch geschlossen vorausgesetzt. Bestand von Anfang an eine penetrirende Wunde, die gar nicht geschlossen werden, oder doch nicht geschlossen erhalten werden konnte, so ist vor Allem ein streng antiseptisches Verfahren einzuschlagen (vgl. Bd. I. pag. 280). Auch nach dem Eintritt der Eiterung, sowie nach dem Aufbruch eines Pyarthros beruht die Hauptaufgabe in der Sorge für freien Abfluss des Eiters und Verhütung seiner Zersetzung. Ist letztere bereits eingetreten oder auf Grund vorausgegangener Vernachlässigung anzunehmen, so muss eine gründliche Desinfection durch Ausspülen der Gelenkhöhle mit stärkeren (3—5 p. c.) Lösungen von Carbolsäure oder Chlorzink jeder anderen Behandlung vorhergehen. Demnächst ist für absolute Ruhe (Immobilität) des Gelenks, Abfluss des Eiters (Drainage) und antiseptische Verbände gleichmässig zu sorgen.

Während man früher fast allgemein die Amputation oberhalb des von Eiterung ergriffenen Gelenkes, wenigstens bei Arthropyosis grösserer Extremitäten-Gelenke, dringend empfahl, weiss man jetzt, dass selbst in Fällen, wo bereits der Aufbruch erfolgt ist und wegen schon bestehender Erkrankung der Gelenk-Enden oder aus anderen Gründen die oben empfohlenen Behandlungsweisen ihren Dienst versagen, doch noch durch die Resection oft nicht blos das Leben des Kranken sicherer erhalten, sondern meist auch eine mehr oder weniger brauchbare Extremität wieder hergestellt werden kann. Lässt die Localität des Uebels oder die Beschaffenheit der umgebenden Weichtheile die Resection unzulässig erscheinen, so versucht man durch grosse Einschnitte dem Eiter freien Abfluss zu verschaffen und die eiternde Gelenkhöhle wie eine grosse eiternde Wunde, namentlich mittelst antiseptischer Verbände und Irrigationen, bei absolut unbeweglicher Lage des Gelenks, zu behandeln. Droht aber die Erschöpfung der Kräfte eine lebensgefährliche Höhe zu erreichen, so muss man schliesslich doch die Amputation oberhalb des eiternden Gelenkes ausführen. Vgl. Bd. IV. Abth. XXXV. u. f.

b) Behandlung der chronischen Gelenk-Entzündung.

Bei der destructiven Form der chronischen Gelenk-Entzündung (dem Tumor albus und der Arthrocace) muss auf die in der

Entzündung habe folgen sehen, „deren Heftigkeit die Secretion unterdrückt“ hätte. — In neuester Zeit hat R. Volkmann (l. c. pag. 436 u. f.) die Punction entzündeter Gelenke besonders lebhaft empfohlen und vorgeschlagen, mit derselben die Injection von Höllensteinlösungen, nach Analogie der Behandlung von Katarhen und Blennorrhöen des Auges, zu combiniren. Die antiseptische Methode lässt die Gefahren der Gelenk-Punction gänzlich vermeiden.

Mehrzahl der Fälle zu Grunde liegende Dyskrasie Rücksicht genommen werden. Die Entzündung selbst wird von vielen Aerzten noch jetzt in hergebrachter Weise durch öfter wiederholte Blut-Entziehungen mittelst Schröpfköpfen oder Blutegeln bekämpft; nach einiger Zeit geht man dann zu den Ableitungsmitteln, besonders den Fontanellen, dem Haarseil, den Moxen, dem Glüheisen über, welches letztere namentlich von Rust als ein wahres Specificum gepriesen wurde. Nach Stromeyer leisten diese Mittel nichts, und können sogar den Uebergang in Eiterung befördern. Letzteres dürfte namentlich für die in unmittelbarer Nähe des leidenden Gelenkes angebrachten Fontanellen, Haarseile u. s. w. gültig sein. Ganz allgemein aber muss anerkannt werden, dass weder durch Blutegel, noch durch künstliche Eiterungen in der Umgebung des Gelenkes auf den Gang der chronischen Gelenk-Entzündung ein dauernder günstiger Einfluss ausgeübt wird. Die häufige Wiederholung der Blutentziehungen und die andauernde Unterhaltung von Eiterungen ist aber überdies aus dem Grunde zu verwerfen, weil die gesammte Ernährung der ohnehin meist schwächlichen Kranken dadurch leidet. Im Gegentheil ist bei lange dauernden Gelenk-Entzündungen die Hebung der Kräfte von grosser Bedeutung. Unzweifelhaft ist der Nutzen der Immobilisation und, wo es angeht, der Distraction des erkrankten Gelenkes in der oben (pag. 614) geschilderten Weise. Feste Einwickelungen mittelst Pflasterstreifen, Flanell- oder Gummi-Binden sind namentlich in Fällen, wo keine erhebliche Empfindlichkeit des Gelenkes für Druck besteht, von Bedeutung. Während bei acuten Exacerbationen die intercurrente Anwendung von Eis erforderlich wird, leisten in den, Monate und Jahre lang fast auf demselben Zustande verharrenden Fällen (dem eigentlichen Tumor albus der alten Chirurgen) feuchtwarme Einwickelungen und lauwarne Bäder die erspriesslichsten Dienste¹⁾. Sehr zweckmässig lässt sich die Einwirkung der feuchten Wärme zugleich mit der Compression erzielen, indem man das Gelenk mit einer feuchten Compresse umhüllt und diese mit einer aus dünnausgewalztem Gummi geschnittenen Binde so fest, als erträglich, umwickelt. Vgl. Hydarthros. Besteht überhaupt noch die Möglichkeit, bei einer destructiven Gelenk-Entzündung den Ausgang in Verschwärung abzuwenden, so gelingt es am Sichersten durch die Anwendung dieser, mit der Distraction leicht zu combinirenden Verbände, deren Wirksamkeit durch das (mehr beliebte als bewährte) Aufpinseln von Jodtinctur vielleicht verstärkt werden kann. — Droht

¹⁾ In dieser Weise wirken wohl auch die vielgerühmten Thermen von Gastein, Teplitz, Wiesbaden, die Soolbäder von Kreuznach, Rehme, Colberg u. s. f.

dem Leben des Patienten durch das Eiterungsfieber oder die stetig zunehmende Entkräftung Gefahr (wie dies namentlich nach dem Aufbruch des Gelenkes bald zu befürchten ist), so darf man mit der Resection nicht zögern. (Vgl. Bd. IV.)

Bei der deformirenden Gelenk-Entzündung werden, neben dem inneren Gebrauch von Jodkali, Bepinselungen mit Jodtinctur, spanische Fliegen, Einreibungen reizender Salben und Dampfbäder empfohlen. Die kalte Douche erwies sich mir im Anfange des Uebels nützlich, späterhin gewaltsame Bewegung des kranken Gelenks (in der Chloroformnarkose) und galvanische Reizung der unthätigen Muskeln; jedoch wurde immer nur Besserung, nie dauernde Heilung erreicht.

II. Gelenkwassersucht, Gliedwasser, Hydrops articuli, Hydarthros, Hydarthrosis.

Eine Ansammlung von wässriger, d. h. mit serösem Transsudate gemischter Synovia in der Gelenkhöhle begleitet fast alle Gelenkkrankheiten. Sie ist in der That, wie alle übrigen Wassersuchten, meist ein blosses Symptom, wenn gleich nicht geläugnet werden soll, dass sie auch „essentiell“, d. h. die einzige Erscheinung sein kann, welche das Kranksein begründet und die Therapie bestimmt.

Bichat bezeichnete den Hydarthros als Resultat eines Missverhältnisses zwischen Exhalation und Resorption; Boyer behauptete sogar zuversichtlich, dass durch übermässige Exhalation die acute und durch verminderte Resorption die chronische Gelenkwassersucht entstehe (Traité des maladies chirurgicales Tom. IV, pag. 459). Aehnlich Bonnet. Durch solche „Erklärungen“ wird unsere Einsicht nicht gefördert.

Wir schliessen die Gelenkwassersucht an die Gelenkentzündung an, indem wir sie als eine Synovitis serosa chronica betrachten, welche jedoch Eigenthümlichkeiten genug darbietet, um eine besondere Beschreibung zu verdienen.

Aetiologie. Prädisponirt sind lymphatische Personen, mit schlaffen Gelenken, zumal bei schlechter Nahrung und feuchter Wohnung. Als directe Ursachen sind übermässige Anstrengungen, Verstauchungen, Verrenkungen, Wunden, Entartungen der verschiedenen Bestandtheile der Gelenke und ihrer nächsten Umgebungen aufzuführen¹⁾; auf indirectem Wege entsteht sie nach andauernden Durchnässungen häufig im Zusammenhange mit „Rheumatismus“, ferner bei Chlorose und anderen hydrämischen Zuständen, nach der Angabe Anderer auch in Folge der Unterdrückung des Schweisses, eines Exanthems oder der Menstruation.

¹⁾ Auch ein subsynoviales, in die Gelenkhöhle hineingewachsenes Lipom (Lipoma arborescens, nach J. Müller) kann Hydarthros zur Folge haben.

Das Kniegelenk ist am Häufigsten hydropisch, und zwar aus denselben Ursachen, welche überhaupt die grössere Frequenz seiner Erkrankungen bedingen; ausserdem kommt Hydrops relativ häufiger im Fuss-, Hand-, Schulter- und Ellenbogen-Gelenk vor.

Pathologische Anatomie. Zunächst springt die Menge der in dem Gelenke angesammelten Flüssigkeit und die dadurch bedingte Ausdehnung der Gelenkkapsel in die Augen. Der Druck, welchen die gedehnten Muskeln in der Umgebung des kranken Gelenkes und auf die in letzteres ergossene Flüssigkeit ausüben, bedingt eine Ausdehnung der schwächsten Stellen der fibrösen Gelenkkapsel und folglich eine Verlängerung der schon im normalen Zustande bestehenden Ausbuchtungen der Synovialhaut. Auf diese Weise entsteht im Umfange der wassersüchtigen Gelenke eine Art synovialer Hernien, welche zuweilen eine beträchtliche Ausdehnung erreichen. So können an dem Schultergelenke die Ausbuchtungen, welche die Synovialhaut aus der Gelenkkapsel hervor zu den Sehnen des langen Kopfes des Biceps, des Infraspinatus und des Subscapularis schiebt, eine solche Ausdehnung erleiden, dass man am mittleren Theile des Oberarms, in der Achselhöhle und selbst in der Fossa infraspinata Fluctuation fühlt. In ähnlicher Weise dehnt am Hüftgelenke, dessen fibröse Kapsel überaus fest ist, die durch die Muskeln gedrückte Flüssigkeit die Ausbuchtung der Synovialhaut unter der Sehne des Iliopsoas in der Art auseinander, dass sich eine grosse birnförmige Tasche entwickelt und die Fluctuation namentlich am oberen inneren Theile des Oberschenkels, an einem von dem Gelenke ziemlich entfernten Punkte wahrnehmbar wird. — Es giebt Fälle, in denen die Wasseransammlung sich auf die Ausbuchtungen der Synovialhaut beschränkt, indem deren Verbindungsanal mit der Gelenkhöhle obliterirt. Auf solche Weise entstehen in der Umgebung der Gelenkhöhle Geschwülste von oft bedeutendem Umfange, die man bald als Ganglien, bald als Hygrome bezeichnet, — deren wahre Natur oft schwer erkannt werden kann, wie wir dies im nächsten Abschnitt näher erläutern werden. — Die Muskeln, welche durch den Hydarthros gespannt oder verschoben sind, vermögen auf die von ihnen zu bewegendem Knochen in dem Grade weniger sicher und weniger normal einzuwirken, als ihre Richtung durch die Ueberfüllung der Gelenkkapsel abgeändert ist. Die relative Lage der in dem wassersüchtigen Gelenk zusammengestossenen Knochen und die dadurch bedingte Stellung des betreffenden Gliedes hängt also nicht allein von der durch die Flüssigkeit bewirkten Auseinanderdrängung der Gelenk-Enden ab, sondern ebensowohl von der, allerdings aus derselben Quelle entspringenden,

fehlerhaften Richtung und Spannung der Muskeln. Jedoch findet sich dies Verhalten fast nur an den von breiten Muskeln umfassten Gelenken, wie an der Schulter. Am Knie, Hand- und Fuss-Gelenk erfährt die Geschwulst nur Seitens der Sehnen und Aponeurosen Widerstand; erstere verschieben sich leicht und entgehen dadurch der Dehnung, die Aponeurosen aber können durch ihre Spannung nicht in dem Maasse die Bewegung beeinträchtigen, wie gespannte Muskeln. Beim Hydarthros genu erstreckt die Geschwulst sich allerdings oft bis unter die *Musc. vasti extern. und intern.*; da sie aber diese Muskeln immer nur partiell ausdehnt, so ist eine Behinderung ihrer Wirkung wenig bemerkbar. — Mitunter zeigt die Synovialhaut ihre normale Beschaffenheit oder ist selbst blasser und glatter als gewöhnlich, — in Folge des durch die Flüssigkeit ausgeübten Druckes. Alsdann findet sich in dem Gelenk eine trübe, schlecht geklärten Molken ähnliche Flüssigkeit, in welcher albuminöse Flocken oder Krümel suspendirt sind. In anderen Fällen ist die Synovialhaut geröthet, und es finden sich überhaupt alle die bei der anatomischen Beschreibung der Gelenk-Entzündung angegebenen Veränderungen mehr oder weniger entwickelt; die Synovia hat ihre fadenziehende Beschaffenheit verloren und ist dem Blut-Serum ähnlich. — In eben der Weise, wie die Qualität, variiert auch die Quantität der Flüssigkeit, abgesehen von der verschiedenen Capacität der einzelnen Gelenkkapseln. Im Kniegelenk können z. B. bis zu 600 Grammen enthalten sein. — Bei veraltetem Hydarthros sind eigenthümliche Veränderungen der Gelenk-Enden der Knochen beobachtet worden, wohin die Abplattung und das Breiterwerden der Kniescheibe bei Gelenkwassersucht des Kniegelenks gehört (vgl. auch „Gelenkmäuse“).

Dupuytren beschreibt die anatomischen Veränderungen, welche er bei Gelegenheit der Section eines mit Hydarthros beider Kniegelenke behafteten Hingerichteten fand, wie folgt. „Trotz des erheblichen Umfangs beider Kniegeleaze war die Haut über ihnen unverändert; aber zu beiden Seiten der Kniescheibe erhob sich eine längliche, vertical verlaufende Geschwulst, in welcher, so wie in den seitlichen Theilen des Gelenks, Fluctuation deutlich wahrnehmbar war. Als die Gelenke geöffnet wurden, liefen aus dem einen 360, aus dem andern 390 Grammen einer zähen, fadenziehenden, zwar etwas röthlichen, aber durchscheinenden Flüssigkeit aus, von fadem, jedoch sehr schwachem Geruch, ein wenig salzigem Geschmack, 1,05 specifischem Gewicht. Die Gelenkhöhlen waren fast nur nach Oben erweitert, die Synovialkapsel stieg bis 10 Centimeter über die Gelenkflächen der *Condyl. femoris* unter der Sehne des *M. quadriceps* hinauf. Auch die Seitentheile waren vor und hinter den seitlichen Bändern ausgedehnt, wogegen nach der Kniekehle zu jede Ausdehnung fehlte. Die Synovialkapsel, dicker und röther als im normalen Zustande, war auf ihrer inneren Fläche von verschiedenen grossen Klümpchen bedeckt, welche auf mehr oder minder dicken Stielen saßen und aus denen man mit Leichtigkeit eine der in der Kapsel befindlichen

ähnliche Flüssigkeit herausdrücken konnte (die angeschwollenen ödematösen Gelenkzotten).“ (Dict. des sciences méd. Tom. XXI. pag. 148.)

Symptome. Dem Ergüsse in das Gelenk gehen oft vage Schmerzen vorher, welche bei schnellem Verlauf und in Gelenken, die von festen Bändern umgeben sind, einen so hohen Grad erreichen, dass sich daraus schon der entzündliche Ursprung des Uebels erschliessen lässt. Die Beweglichkeit ist behindert, in verschiedener Richtung, je nach dem Bau des Gelenkes. Die Geschwulst entsteht ohne Veränderung der Hautfarbe. Sie ist elastisch, fluctuirend, weicht dem drückenden Finger, ohne eine Grube zu behalten und ist beim Druck wenig oder gar nicht schmerzhaft. Ihre Gestalt hängt, da sie von der Gelenkkapsel umschlossen wird, von deren Gestalt ab; sie zeigt an denjenigen Stellen Vorsprünge, wo die Synovialhaut Ausbuchtungen bildet. So bildet z. B. Hydarthros des Kniegelenks zwei Geschwülste, eine an der äusseren, die andere an der inneren Seite der Kniescheibe, von denen letztere umfänglicher ist. Drückt man die Kniescheibe gegen die Condylen des Oberschenkelbeins, von denen sie durch die ergossene und sie gleichsam schwimmend erhaltene Flüssigkeit getrennt ist, so werden die beiden seitlichen Geschwülste deutlicher und gespannter; sobald der Druck nachlässt, tritt die Kniescheibe wieder hervor. Dasselbe Resultat erreicht man durch die Beugung des Unterschenkels; je mehr dabei die Kniescheibe gegen die Condylen des Femur angedrängt wird, desto deutlicher treten die seitlichen Geschwülste hervor und ihr seitlicher Inhalt kann dann nicht von einer Seite zur andern getrieben werden. Streckt man aber das Bein, so verkleinern sich beide Geschwülste und werden weicher; der flüssige Inhalt erfüllt dann gleichmässig die Gelenkhöhle, in welcher die Compression ihn nach allen Richtungen hin- und hertreibt. Die Geschwulst kann sich schliesslich in dem Maasse vergrössern, dass sie bis zur Hälfte des Schenkels hinaufsteigt. Bei Hydrops des Ellenbogen-Gelenks liegen zwei längliche Geschwülste seitlich am Olecranon. Im Fussgelenke ist die Geschwulst besonders vor den Knöcheln deutlich, am Handgelenk auf der Dorsalseite.

Der Verlauf der Gelenkwassersucht ist chronisch, oft wird sie stationär; jedoch erfolgt die Entwicklung der Krankheit zuweilen mit überraschender Schnelligkeit; eine Gelenkhöhle kann in wenigen Tagen mit Flüssigkeit überfüllt werden. Die Quantität des Ergusses kann sich plötzlich vermindern, sogar ohne bemerkbare Ursache, namentlich aber wenn anderweitige Secretionen gesteigert werden¹⁾.

¹⁾ Vidal sah während eines Cholera-Anfalls die Wassersucht des einen Kniegelenks sehr schnell verschwinden, die des andern sich erheblich vermindern.

Häufig wird die ergossene Flüssigkeit allmählig wieder resorbirt und die Gelenkwassersucht geht, wenn sie einfach ist, in Genesung über. Anderer Seits sollen aber auch Fälle vorkommen, wo die Flüssigkeit so bedeutend sich mehrt, dass Zerreiſung der Synovialhaut eintritt, Ausfluss des Exsudats in das umgebende Bindegewebe und dann erst schliesslich Resorption desselben erfolgt. Die den Hydarthros begleitenden Functionsstörungen ergeben sich aus den anatomischen Veränderungen von selbst.

Die **Diagnose** folgt meist leicht aus den angeführten Symptomen; jedoch können tiefe Lage der Gelenkhöhle, geringe Quantität des Exsudats, besondere Stellungen des Gliedes und anderweitige Erkrankungen, namentlich Entartungen an demselben, sie schwierig machen. So versteckt z. B. bei dem Hüft- und Schultergelenk die Dicke der umgebenden Weichtheile die angesammelte Flüssigkeit. Man muss in solchen Fällen namentlich auf die Divertikel der Synovialhaut achten. Was den Einfluss der Haltung des Gliedes betrifft, so können z. B. die Kniescheibe und die an ihr befestigten Sehnen, bei der Beugung des Knies scharf an die Condylen gedrückt, den Durchgang der Flüssigkeit von einer Seite zur andern verhindern, so dass zu beiden Seiten fluctuirende Geschwülste emporsteigen, welche das Ansehen gewinnen, als lägen sie ausserhalb der Gelenkhöhle. Pseudoplasmen, welche von den Gelenk-Enden ausgehen, können Fluctuation des Gelenkes gleichsam simuliren; jedoch lässt diese sich bei letzteren meist nur an einzelnen Stellen wahrnehmen, während sie bei Hydarthros in der ganzen Ausdehnung der Kapsel gefühlt wird und die Flüssigkeit von einem Orte zum andern, von Unten nach Oben, von einer Seite zur andern, von Hinten nach Vorn gedrängt werden kann.

Prognose. Wenn die Gelenkwassersucht als Localisation eines Allgemeinleidens (namentlich bei Chlorose) auftritt, so verschwindet sie oft schnell entweder von selbst, oder unter dem Einflusse milder Mittel, macht aber auch häufig Recidive. Ist sie dagegen eine selbstständige Erkrankung des Gelenkes, so verschwindet das Exsudat (wenn überhaupt) langsam oder nur nach kräftig eingreifenden Mitteln. Gewöhnlich widersteht der idiopathische Hydarthros, namentlich der chronische, sogar allen unseren Mitteln.

Behandlung. Man hat die Gelenkwassersucht mit tonischen, resolvirenden, diaphoretischen Mitteln, mit Purganzen, mit Bädern, Vesicatoren, Cauterien, Moxen, Brandstrichen und Druckverbänden, durch die Incision, das Haarseil, die Punction mit oder ohne Injection einer reizenden Flüssigkeit zu heilen versucht.

Erfolg haben diese Mittel sämmtlich mehr als einmal gehabt,

hauptsächlich weil viele Gelenkwassersuchten von selbst wieder verschwinden, — wenn auch nicht für immer. Oft ist für die Heilung von grösserer Bedeutung, als die angewandten Mittel, dass während ihrer Anwendung das Glied in Ruhe gehalten wird. Nicht selten gelingt es, Gelenkwassersuchten (selbst mehrere Monate alte) erfolgreich durch kräftige Gegenreize zu bekämpfen. In dieser Art wirken Bäder, Douchen, reizende Salben, Jodtinctur u. dgl. Die das ganze Gelenk einhüllenden Blasenpflaster (nach Velpeau) verdienen vor allen ähnlichen Mitteln den Vorzug.

Man wendet sie am Zweckmässigsten als fliegende Vesicatore an, kann ihre Wirksamkeit aber auch durch Auflegen von Jodsalbe (4–10 Jod auf 100 Fett) auf die entblösste Cutis erhöhen, was schmerzhaft ist, aber die Epidermis-Bildung wenig stört. Aufpinseln von Jodtinctur wirkt langsamer und, sofern man nicht die Tinct. jodi fortior anwendet (vgl. pag. 529), auch weniger energisch als Blasenpflaster.

Gelenkwassersuchten, welche schon über Jahr und Tag alt sind, widerstehen häufig allen diesen Mitteln.

Man sucht dann die Allgemeinleiden, welche mit der Gelenkwassersucht in Causalnexus stehen, zu beseitigen: namentlich Rheumatismus oder Hydrämie, jenen durch Colchicum und diuretische Salze, Sool- und Dampf-Bäder, diese durch Eisenpräparate. Ist ein Allgemeinleiden nicht aufzufinden, so giebt man versuchsweise starke Purganzen, bei kräftigen Individuen auch die von Gimelle¹⁾ empfohlenen grossen Dosen des Tartarus stibiatus.

Indess reicht häufig genug die pharmaceutische Behandlung nicht aus, und man sieht sich genöthigt, zu mechanischen Hülfsmitteln seine Zuflucht zu nehmen.

Vor Allem ist die Compression hier, wie bei der chronischen Gelenk-Entzündung, zu empfehlen²⁾. Oft genügt eine gewöhnliche Rollbinde, oder ein Pflasterverband; doch muss man stets für einen gleichmässigen Druck sorgen und daher Polster unterlegen, wo sich Vertiefungen an der Oberfläche des Gelenkes vorfinden. Am Vollständigsten wird die beabsichtigte gleichmässige Compression durch Gummibinden geleistet. Die nicht aus überspannenen Gummifäden gewebten, sondern aus dünnen ausgewalzten Gummipplatten geschneittenen Binden ersetzen überdies ein permanentes Dampfbad, da sie für Wasserdunst und somit auch für die Hautperspiration ganz undurchgängig sind.

Bei den eigentlichen Operationen handelt es sich im Wesentlichen immer um Eröffnung der Gelenkkapsel.

¹⁾ Bulletin de Théraputique, 1838, Bulletin de l'Académie de médecine. T. V. pag. 344 und Annales de la chirurgie française et étrangère. T. XIII, pag. 219.

²⁾ Vgl. Blandin im Bulletin de l'Académie. T. XI. pag. 310.

Mit der durch einen Troicart, unter Ausschluss des Luft-eintritts, bewirkten Punction sind Gefahren nicht verbunden, wie namentlich Malgaigne dargethan hat; indess erzeugt sich hiernach, wie in andern geschlossenen Höhlen, die Flüssigkeit meist von Neuem. Da jedoch die geringe Gefahr dieser Operation ihre mehrmalige Wiederholung gestattet, so sind durch sie radicale Heilungen erzielt worden, indem man theils durch innere Mittel, theils durch einen unmittelbar nachher angelegten Compressiv-Verband auf die kranke Synovialhaut einwirkte.

Was die sogen. subcutanen Incisionen betrifft, so hat schon Desault die schräge Incision empfohlen, durch welche die directe Verbindung zwischen der inneren und äusseren Oeffnung aufgehoben wird. Hieraus hat Goyrand seine „subcutane Methode“ gemacht. Statt das Exsudat geradezu herauszulassen, sucht er dessen Resorption zu erzielen, indem er es in das die Gelenkkapsel umgebende Bindegewebe fliessen lässt. Dies Verfahren ist, weil der Zutritt der Luft zu dem Gelenke ausgeschlossen wird, viel weniger gefährlich, als die einfache Incision, aber es gewährt in Betreff der Radicalheilung keine grössere Sicherheit. Das Exsudat in der Gelenkhöhle kann eben so gut wieder entstehen, gleichviel ob die Entleerung ganz nach Aussen, oder in die das Gelenk umgebenden Weichtheile Statt findet.

Reinigende Einspritzungen in die Gelenke sind früher schon gemacht worden; Jod-Lösungen¹⁾, wie sie zur Heilung der Hydrocele angewendet werden, gebraucht man erst seit 1841, nach dem Vorgange von Velpeau und Bonnet. Die Jodlösung wird durch eine Troicart-Canüle, nach vorgängiger Punction des Gelenkes, eingespritzt, die Canüle dann verschlossen und die Jodlösung 1—2 Minuten in der Gelenkhöhle zurückgehalten und durch Kneten des Gelenkes mit allen Punkten der Synovialhaut in Berührung gebracht. Da man ihren Abfluss durch die demnächst wieder geöffnete Canüle weder durch Druck noch anderweitig befördert, so bleibt gewöhnlich etwas davon in der Gelenkhöhle zurück und wird ohne weitere Gefahr nach und nach resorbirt. Nach der Injection ist absolute Ruhe des Gelenkes nothwendig und genaue Beachtung der etwa auftretenden Erscheinungen von Gelenk-Entzündung. Unter dem Gebrauche topisch erweichender und narkotischer Mittel, oder schlimmeren Falls örtlicher Blut-Entziehungen, soll sich die Entzündung eben so, wie nach der Injection in die Tunica vaginalis testis, zertheilen. Indess erwähnte schon Bérard,

¹⁾ Tinct. Jodi 1, Wasser 2, oder Jod 1, Jodkalium 2, Wasser 24. Die Vorsichtsmaassregeln bei dieser Injection sind dieselben, wie bei der gleichnamigen Operation der Hydrocele (vgl. Bd. IV.).

dass den von ihm gemachten Injektionen oder Gelenk-Eiterungen gefolgt seien, und es ist jetzt, obgleich mehr günstige Resultate in grösserer Anzahl vorliegen, doch nur allzu bekannt, dass lebensgefährliche Vereiterungen der betreffenden Gelenke folgen können.

Bei der directen Incision wird das Gelenk mit Lanzette oder Messer geöffnet und die Flüssigkeit herausgefassen. Man wählt eine Stelle, wo die Gelenkkapsel möglichst nur von Haut bedeckt ist. Früher führte man nach der Operation einen kleinen Charpiehansch in die Wunde, theils um die Flüssigkeit ganz herauszusaugen, theils um Entzündung zu erzeugen, deren Resultat theilweise oder gänzliche Verwachsung des Gelenks sein sollte. Obgleich diese Operation mit Erfolg gemacht ist, so kann man sich doch weder über ihre Unzuverlässigkeit, noch über ihre Gefahr täuschen; denn einmal kann der eingeführte Charpiehansch zwar den Abfluss des Exsudats befördern, aber nicht seine übermässige Entstehung hindern; anderer Seits aber ist die durch ihn hervorgerufene Entzündung von allen jenen Gefahren begleitet, welche wir pag. 565 u. f. erwähnt haben¹⁾.

Das Durchziehen eines Haarseils mit nachfolgender Compression soll auch Erfolg gehabt haben, obgleich Bonnet Zweifel darüber hegt. Dass das Haarseil wirksamer ist, als die blosse Incision mit Einführung eines Charpiepfropfs, ist gewiss; aber diese Wirksamkeit ist das Resultat einer Entzündung und Eiterung der Synovialhaut, welche immer gefährlich ist und leicht Gelenksteifigkeit zur Folge haben kann.

Bei Weitem weniger gefährlich und voraussichtlich erfolgreicher ist die Incision mit nachfolgender Drainage unter Anwendung der antiseptischen Methode. Wo man überhaupt zur freien Eröffnung des Gelenkes schreiten muss, sollte man dieselbe immer nur in dieser Weise ausführen.

Die primären sowohl, als auch die secundären Wirkungen der bisher besprochenen Methoden und Behandlungsweisen müssen natürlich verschieden sein, je nach dem Gelenke, nach der Beschaffenheit des Exsudats, nach den Ursachen desselben und den anatomisch-pathologischen Veränderungen, welche bestehen. Denn ein aus allgemeiner Diathese hervorgehendes Exsudat, wie man es in mehreren Gelenken zugleich oder bald nacheinander entstehen sieht, muss leicht Rückfälle machen; so wie anderer Seits ein Hydarthros, welcher mit

¹⁾ Gelenke, welche mit chronischem Hydarthros behaftet sind, besitzen allerdings weniger Empfindlichkeit für Entzündungs-Reize, als normale; aber gefährlich bleibt doch an ihnen jede Operation, welche Gelenk-Eiterung zur Folge haben kann.

derweitigen bedeutenden anatomischen Veränderungen des Gelenks erbunden ist, auf keine Weise heilbar sein wird, wenn er auch noch von localen Ursprungs ist. Bei einer einfachen Gelenkwassersucht kann aber fast jedes Verfahren zum Ziele führen; Grund genug, um mit dem mildesten zu beginnen. So z. B. würde man, nach vergeblicher Anwendung der ableitenden Mittel, die Compression zuerst ohne und dann mit Unbeweglichkeit des Gelenkes versuchen, später die Punction mit nachfolgender Compression, und erst als letzte Zuflucht die Jod-Ioduction oder die directe Incision. Die Einführung eines Charpie-Auswasches in das Gelenk und das Durchziehen eines Haarseils durch dasselbe müssen als gefährlich und unsicher verworfen werden.

III. Gelenksteifigkeit, Ankylosis¹⁾.

Als Gelenksteifigkeit, Ankylosis, wird im Allgemeinen die fest gewordene Verbindung zweier Gelenk-Enden unter einander und die daraus hervorgehende Beeinträchtigung der Beweglichkeit eines Gelenkes bezeichnet. Man unterscheidet vollkommene und unvollkommene Ankylosen, je nachdem die Beweglichkeit des Gelenkes gänzlich oder nur zum Theil vernichtet ist²⁾. C. Hueter will unter Ankylose nur die absolute Unbeweglichkeit der Gelenke verstanden wissen und bezeichnet die behinderte Beweglichkeit der Gelenke als Contractur, worunter Andere eine pathologische Verkrümmung der Muskeln verstehen.

Von anatomischer Seite ergibt sich, dass die Bewegungen eines Gelenkes aufgehoben sein können: entweder durch pathologische Veränderungen innerhalb, oder durch pathologische Veränderungen ausserhalb der Gelenkkapsel. Erstere bestehen in Verwachsung der beiden Gelenk-Enden bald durch Pseudomembranen und Stränge, bald durch knöcherne Verschmelzung der Knochen, nach Zerstörung der knorpeligen Ueberzüge, oder in bedeutenden Unebenheiten der Gelenkflächen. Die pathologischen Veränderungen ausserhalb der Kapsel beziehen sich auf die dasselbe umgebenden Gewebe, Bänder, Sehnen, Muskeln etc. Auf diese Thatsachen gestützt, unterscheidet man: 1) Ankylosis intracapsularis s. vera³⁾, 2) Ankylosis extracapsularis s. spuria. Beide können zugleich bestehen.

¹⁾ Vgl. Nussbaum, die Pathologie und Therapie der Ankylosen. München 1862.

²⁾ Vgl. Cloquet, im Diction. en 30 vol., nouv. édit. Tom. III.

³⁾ Boyer (Traité des maladies chirurgicales, Paris 1852, Tom. IV. pag. 553) nannte wahre Ankylosen diejenigen, welche die Beweglichkeit gänzlich aufheben.

1) Ankylosis intracapsularis. Sie zerfällt in zwei Unterarten. Bei der ersteren wird die Verbindung der Gelenk-Enden entweder durch directe Verwachsung, oder durch Pseudomembranen bedingt, welche sie mit einander verbinden. Letztere Unterart könnte man füglich „membranöse Ankylose“ nennen. Sie ist besonders die Folge von äusseren Einwirkungen, wie Contusionen, Distorsionen, Luxationen, Fracturen in der Nähe der Gelenke, Gelenkwunden. Die Pseudomembranen, meist in Form von Bändern oder Strängen entwickelt, verhalten sich ganz wie die bekannten pleuritischen Adhäsionen. Die Absonderung der Synovia hört auf; die Verwachsungen befestigen sich immer mehr, in mehr oder weniger grosser Zahl, und erstrecken sich nach verschiedenen Richtungen. Sie nehmen entweder das ganze Gelenk ein — vollkommene Zusammenlöthung; oder sie finden sich nur an einzelnen Stellen — partielle Zusammenlöthung. In letzterem Falle kann in einigen Gelenken noch eine gewisse Beweglichkeit zurückbleiben. Eine Enarthrose, ein Ginglymus können dadurch zu einer Amphiarthrose herabsinken, was dann immer noch einige Hoffnung auf Heilung übrig lässt.

Hierher gehört wohl der vielfach angeführte Fall von Job van Meekren. Die Ankylose befand sich am Ellenbogen-Gelenk. Der Kranke bemerkte, dass, nach einem Fall auf den Vorderarm die Bewegungen täglich leichter und ausgedehnter wurden, bis sie endlich sich ganz wieder herstellten. Wahrscheinlich waren die Verwachsungen durch den Fall zerrissen worden.

An diese Ankylosen schliesst sich die Verknöcherung der Faserknorpel der Symphysen, die man vorzugsweise im höheren Alter an den Symphysen der Wirbel- und Beckenknochen findet; auch sie kann als ein Herabsinken der schwach beweglichen Verbindung (Symphysis) zu einer unbeweglichen (Synostosis) betrachtet werden.

Die zweite Unterabtheilung der intracapsulären Ankylose kann man die „knöcherne“ nennen. Da hier die Gelenk-Enden ohne Zwischensubstanz, wie die Knochen-Enden bei einem Bruche, zusammenwachsen, hat man vorausgesetzt, dass die Gelenkknorpel geschwunden und die subcartilaginöse Knochensubstanz blossgelegt sein müssen. Die anatomische Untersuchung der so zusammengelötheten Knochen weist in der ersten Zeit oft eine fleischige, röthliche Masse von verschiedener Dicke nach, welche mitunter noch von fistulösen Gängen durchzogen ist, namentlich wenn Sequester zurückgeblieben sind. In anderen Fällen findet man aber die wohl erhaltenen Knorpelüberzüge mit einander verwachsen, so dass auf dem Durchschnitt ein deutlicher Knorpelstreifen zwischen den Knochen-Enden erscheint, und es ist

noch zweifelhaft, ob diese Ankylosis cartilaginea (Volkman) später zu einer knöchernen wird, oder dauernd knorplig bleibt. Bei vollkommen knöcherner Ankylose findet man, wenn man den Knochen der Länge nach durchsägt, gar keine Begrenzungslinie zwischen den früheren Gelenkflächen, die beiden Knochen bilden nur einen einzigen (Fig. 86).

Zuweilen findet man statt dessen Knochen-Auswüchse und Vertiefungen auf den Gelenkflächen, welche durch ihr genaues Ineinandergreifen die Gelenk-Enden unbeweglich mit einander verbinden. So kann z. B. wenn der Unterschenkel lange Zeit in gebeugter Stellung unbeweglich erhalten wird, die Tibia durch andauernden Druck solche Aushöhlungen in den Condylen des Oberschenkels bilden, dass jede Streckung des Unterschenkels unmöglich wird.

Die oben erwähnten Pseudomembranen können nach und nach fester werden; es können sich Kalksalze in ihnen ablagern, sie können wirklich verknöchern. Wenn aber die Knochen-Enden mit einander verschmelzen, so ist es wahrscheinlicher, dass die etwa vorhandenen Pseudomembranen und Knorpel zerstört wurden, und dadurch die Substanz der beiden Knochen in unmittelbare Berührung kam. Jedenfalls lehrt die Erfahrung, dass die Aussicht auf Wiederherstellung der Beweglichkeit desto geringer wird, je länger man mit der einzuleitenden Bewegung wartet.

2) Ankylosis extracapsularis. Die knöchernen Gelenk-Enden, die Knorpel und die Synovialhaut sind unversehrt; die Veränderungen in den umgebenden Geweben, in den äusseren Ligamenten, Aponeurosen, Muskeln (meist Contractur) beeinträchtigen allein die Beweglichkeit des Gelenks. Häufig folgt diese Form der Ankylose auf lange andauernde Ruhe des Gelenks. Gewöhnlich hängt diese nicht von dem Willen des Kranken, sondern von einer Lähmung, einem Bruch oder anderen Knochenkrankheiten ab. Die völlige Bewegungslosigkeit eines Gelenks bewirkt, dass die umgebenden Sehnen und Muskeln, denen die abwechselnde Spannung und Erschlaffung fehlt, ihre Dehnbarkeit verlieren und die beiden Gelenkflächen aneinanderpressen. Später erfolgt sogar, wie die Beobachtungen von

Fig. 86¹⁾.

¹⁾ Verschmelzung des Femur (a) mit dem Os ileum (b) nach Bourgery. Gefässcanäle und Markräume beider Knochen gehen vollständig in einander über.

Bonnet¹⁾ und Teissier²⁾ zeigen, nicht ganz selten ein Erguss von Blut und seröser Flüssigkeit, und zuweilen selbst eine Röthung der ganzen Synovialhaut mit Bildung von Pseudomembranen ohne andere Veranlassung, als die lange Ruhe der Gelenke. Meist sind aber die nachfolgenden Veränderungen der Kapsel nicht von grosser Bedeutung; in manchen Fällen fand man die Beweglichkeit vollkommen, obgleich das Gelenk viele Jahrzehnte lang gar nicht bewegt worden war.

Cruveilhier beschreibt einen Fall von völliger Ankylose des rechten Unterkiefergelenks, in welchem consecutiv auch das linke in eine 83jährige Ruhe versetzt wurde; nichts desto weniger war das letztere Gelenk nicht ankylotisch, d. h. die Knorpel, die Synovialhaut und die Knochen-Enden waren vollkommen gesund. Eines ähnlichen Falles erwähnt Walther. — Kühnholz hat bei einer 60jährigen Frau eine partielle Verwachsung des Körpers des Unterkiefers mit dem Oberkiefer beobachtet, welche angeboren war. Trotz der gänzlichen Unbeweglichkeit während des ganzen Lebens waren bei dieser Frau die Unterkiefergelenke vollkommen frei.

Die extracapsuläre Ankylose kann aber auch auf Entwicklung neuer krankhafter Producte beruhen. So können sich Ablagerungen von Kalksalzen um das Gelenk herum bilden und wie angelegte Schienen Unbeweglichkeit desselben erzeugen; oder das ganze Gelenk umgibt sich mit einem Knochenringe (ringförmig angeordneten Osteophyten) und stellt so das „Ringbein“ der Thierärzte dar. Letztere Form kommt zuweilen an den Wirbelkörpern des Menschen im höheren Alter vor, viel häufiger ist sie jedoch bei alten Pferden, namentlich am Fessel- und Kronbein des Fusses. Cruveilhier nennt sie „peripherische oder invaginirte Ankylose.“ Ein Knochenbruch in der Nähe des Gelenks kann die Bildung eines Callus zur Folge haben, welcher das Gelenk umfaßt³⁾. Bei Gichtkranken findet man mitunter die Hand- und Fussgelenke durch weisse, sandsteinartige, zerreibliche Incrustationen (Ablagerungen von harnsaurem Kalk und Natron) ankylotisch, welche wie Stalaktiten aus dem Knochen selbst hervorzukommen scheinen. Dabei kann aber das Innere des Gelenks fast gesund sein. Eine tiefe Brandwunde kann an Stelle der durch sie zerstörten Gewebe sehr feste Narben, ein abnormes bandartiges Gewebe erzeugen, welches das Gelenk nach einer Richtung zieht und es in dieser unbeweglich festhält. In dieser Weise können auch andere Narben wirken. Endlich können sich Geschwülste, Aneurysmen,

1) *Maladies des articulations*, Tom. I. pag. 67.

2) *Gazette médicale de Paris*, 1841.

3) Knochenbrüche können auf zweifache Weise Ankylose verursachen: 1) durch die lange Ruhe, zu welcher sie den Kranken zwingen, wobei die Stelle des Knochenbruchs gleichgültig ist; 2) durch fehlerhafte Callusbildung, namentlich bei Brüchen der Gelenk-Enden.

Exostosen u. s. w. im Umkreise eines Gelenks entwickeln und eine Unbeweglichkeit erzeugen, von hinreichender Dauer, um die umgebenden Organe sich verbilden und ihre Elasticität und Contractilität einbüßen zu lassen. — Die extracapsuläre Ankylose ist fast immer eine unvollkommene.

Selten beschränken sich die **anatomischen Veränderungen** bei Ankylose auf das Gelenk. Vor Allem finden sich fast immer Veränderungen in den das Gelenk bewegenden Muskeln. Meist haben die Flexoren das Uebergewicht gewonnen, so dass das Glied in halb oder ganz gebeugter Stellung verharret und die Beugemuskeln selbst der Contractur, die Streckmuskeln dagegen der Atrophie verfallen (vgl. Krankheiten der Muskeln). Die fehlerhafte Stellung und die Unbeweglichkeit des ankylotischen Gelenkes bedingen die abnorme Ausbildung anderer Muskelgruppen und compensirende Krümmungen der mannigfaltigsten Art.

Bei der **Diagnose** handelt es sich vor Allem um die Unterscheidung von Ankylose und Muskelcontractur. Abgesehen von der Belehrung, welche die Anamnese liefert, werden alle anderen Unterscheidungsmethoden durch die Anwendung des Chloroforms überflüssig gemacht. Eine Difformität, welche blos auf Muskelcontractur beruht, schwindet unter Anwendung eines geeigneten Zuges oder Druckes, sobald eine tiefe Betäubung durch Chloroform-Inhalationen herbeigeführt ist. Gelingt ihre (zunächst vorübergehende) Beseitigung auf diese Weise nicht, so lässt sich bestimmt annehmen, dass anderweitige Veränderungen im Gelenk oder seiner Umgebung das wesentliche Hinderniss sind. Bevor diese Untersuchungsweise in die Praxis eingeführt wurde, musste man die Diagnose auf eine genaue Erforschung der vorausgegangenen Krankheit und der Art des Widerstandes, welche in dem verkrümmten Gelenke Statt fand, zu stützen suchen. Lässt ein Gelenk z. B. bei supponirter Contractur der Flexoren sich nicht blos nicht strecken, sondern auch nicht beugen, so muss ausser der Muskelcontractur, sofern diese überhaupt besteht, jedenfalls noch ein anderes Hinderniss vorhanden sein, d. h. Ankylose. Ist dagegen nur diejenige Bewegung unmöglich, welcher die verkürzten Muskeln sich entgegensetzen, so besteht keine Ankylose. Zwischen diesen einfach und klar liegenden Extremen finden sich aber viele Abstufungen, in denen man nur durch das Chloroform volle Klarheit erhält. Auch der Grad der Beweglichkeit, sofern solche noch besteht, wird in der Chloroform-Narkose am Sichersten erkannt, wobei man aber passive und active Beweglichkeit nicht verwechseln darf, da zu letzterer auch gesunde Muskeln gehören. Für die meist sehr schwierige, oft gar

nicht durchzuführende Unterscheidung der verschiedenen Formen der Ankylose am Lebenden muss auf die anamnestischen und besonders auf die causalen Momente wesentlich Rücksicht genommen werden. Verdankt die Unbeweglichkeit eines Gelenkes nicht einer deutlich ausgesprochenen Entzündung desselben, sondern sehr langer ruhiger Lage (z. B. bei Fractur in der Diaphyse) ihre Entstehung, so berechtigt dies im Allgemeinen zur Annahme der extracapsulären Form. Fand aber ein Knochenbruch in der Nähe des Gelenkes, oder gar innerhalb desselben Statt, bestand eine penetrirende Gelenkwunde, oder Caries, oder Nekrose der Gelenk-Enden, dann muss intracapsuläre Ankylose angenommen werden. — Sehr wenig sicher ist auch der Zeitpunkt, von welchem ab man den vorliegenden Krankheitsfall als Ankylose und nicht mehr als Gelenk-Entzündung bezeichnen soll. A priori wird erstere Bezeichnung gerechtfertigt sein, wenn alle übrigen Krankheits-Erscheinungen neben der „Steifigkeit“ in den Hintergrund treten.

Die **Prognose** wird insofern günstig genannt, als oft genug die Ankylose ein erwünschter und selbst absichtlich herbeigeführter Ausgang ist, wie z. B. bei Caries der Gelenk-Enden. Deshalb aber ist die Prognose der Ankylose selbst nicht günstig. Dieselbe bedroht freilich nicht das Leben; aber die durch sie gestörte Function des Gelenkes wird ohne Zuthun der Kunst niemals und mit Kunsthülfe auch nur selten vollständig wiederhergestellt. Meist muss man sich mit Verbesserung der Form begnügen, welche freilich auch für die Function des Gliedes von hohem Werth sein kann.

Behandlung. Ist die Ankylose einmal nicht zu vermeiden, so muss man bestrebt sein, das Gelenk in derjenigen Richtung zu erhalten, welche späterhin für den Kranken die vortheilhafteste ist. Betrifft die Ankylose z. B. das Unterkiefergelenk, so muss man, um die Einbringung der Speisen in den Mund später zu ermöglichen, den Unterkiefer in leichter Senkung erhalten. Ober- und Unterschenkel müssen gestreckt, der Fuss im rechten Winkel zum Unterschenkel, der Arm gesenkt und ein wenig vom Thorax entfernt gehalten werden. Der Vorderarm muss gegen den Oberarm sich in mittlerer Beugung befinden, während zugleich die beiden Knochen des Vorderarms in der Mitte zwischen Pronation und Supination stehen. Die Hand muss in der Richtung des Vorderarms, d. h. zwischen Extension und Flexion, und der Finger in halber Flexion sich befinden. Der Kopf endlich muss gerade auf der Wirbelsäule erhalten werden. Jedoch können manche Umstände eine Aenderung der angegebenen Positionen bedingen oder es selbst rathlich machen, dem Kranken die Wahl der

anzunehmenden Stellung nach seinem Behagen zu überlassen (vgl. pag. 613 u. f.).

Wenn es einer Seits Fälle giebt, wo die Bildung einer Ankylose erstrebt werden muss, wie z. B. bei Caries der Gelenk-Enden, so muss man in anderen Fällen aus allen Kräften sie zu verhindern suchen. Deshalb ist es bei tief dringenden Wunden und Verbrennungen, bei Knochenbrüchen und anderweitigen Verletzungen in der Nähe der Gelenke, sehr gerathen, im Gelenke häufig kleine Bewegungen vorzunehmen, durch welche die Muskeln und Sehnen vor Contractur bewahrt und die Secretion der Synovia angeregt wird. Anfangs dürfen diese Bewegungen nur passive sein, später (bei Fracturen im Allgemeinen nach erfolgter Consolidation) auch active. Reicht dann die Muskelthätigkeit allein nicht aus, so müssen erweichende Mittel in allen Gestalten zu Hülfe kommen: Bäder, Fomentationen, Douchen, bei deren Gebrauch aber die Bewegungen nie versäumt werden dürfen. Die Ausführung der letzteren darf dem Kranken niemals allein überlassen werden. Anfangs werden sie von dem Arzt und einem tüchtigen Gehülfen gemacht und zuweilen, wenn es sein muss, selbst mit einiger Gewalt. Dann hört man oft in dem Gelenke ein eigenthümliches Krachen, wodurch man sich von den Manipulationen nicht abhalten lassen darf, da es nur von der Rauigkeit der Gelenkflächen und Sehnenscheiden herrührt. Eine in dem einzelnen Falle oft schwer zu entscheidende Frage ist die, wann man die Bewegungen beginnen soll. Nach einer heftigen Gelenk-Entzündung muss man sich auf Jahre lang ihrer enthalten, da sie leicht die Entzündung wieder anfachen könnten; bei mehr chronischem Verlaufe kann man frühzeitige Versuche machen, Anfangs sehr gemässigt, um sie sofort auszusetzen, wenn sie zu heftige Schmerzen verursachen und die übrigen Entzündungs-Erscheinungen steigern.

Sind Bäder, Douchen und sonstige örtliche Mittel wirkungslos, dann beginnt die Behandlung der Ankylose durch Maschinen und operative Eingriffe. Die Wirkung beider ist entweder eine langsame, schrittweise (dies ist die früher allgemein gebräuchliche Behandlung), oder sie wirken plötzlich, wie die Maschine von Louvrier, die Methode von Dieffenbach und von B. v. Langenbeck¹⁾. Bei diesen kann, wenn man die solchen heftigen Zerreißen folgenden Zufälle nicht sorgfältig behandelt, das Gelenk später ganz unbrauchbar werden, aus der nachfolgenden Erkrankung sogar Lebensgefahr erwachsen. Jedoch hat die Erfahrung hinlänglich gelehrt, dass in chi-

¹⁾ S. Jessen „Commentatio de contractura et ankylosi genu nova methodo violentae extensionis ope sanandis.“ Berolini MDCCCL.

rurgisch gebildeten Händen die plötzliche Ueberwindung der Ankylose keineswegs das ihr von Vidal ertheilte Epitheton „barbarisch“ verdient, sondern in der Mehrzahl der Fälle heilbringend wirkt.

Durch die Hand allein kann man, auch ohne besondere Vorbereitung, intracapsuläre, noch nicht übermässig starke membranöse Verbindungen zerreißen. Natürlich richtet sich die Wirksamkeit der Hand in diesen Fällen nach der körperlichen Kraft des Operators. Die Wirkung der Hand kann durch den Vorderarm unterstützt werden, welchen man z. B. unter die Wade des Kranken legt, um durch kräftige Beugung des Unterschenkels Stränge zu zerstören, welche sich zwischen Kniescheibe und Oberschenkel gebildet hatten.

Ein „Knochen-Einrichter“, dessen Pravaz erwähnt, heilte eine Ankylose des Hüftgelenks dadurch, dass er sitzend die Wade des kranken Beines auf seine Schulter legte, und dann, während er mit beiden Händen den vorderen Theil der Hüftknochen niederdrückte, mit Gewalt sich aufrichtete. Dadurch wurde eine, mit einem Krachen verbundene heftige Beugung des Hüftgelenks herbeigeführt, deren Schmerzhaftigkeit sehr gering war; am anderen Tage schon konnte man den Kranken aufstehen lassen. Bonnet (Gazette médicale No. 27, 6. Juillet 1850), welcher diesen Fall in einem Aufsätze anführt, durch welchen er diese und andere gewaltsame Handgriffe empfiehlt, behauptet drei Ankylosen des Hüftgelenks ohne subcutane Schnitte und ohne Maschinen durch solche Zerreißungen allein und ohne alle üblen Folgen geheilt zu haben.

Diese eben angeführten Handgriffe hat man durch subcutane Durchschneidung der Muskeln, Sehnen, Aponeurosen und Bänder zu erleichtern gesucht, und oft sind Dutzende solcher Durchschneidungen in der Umgegend eines Gelenkes ausgeführt worden (Dieffenbach, Guérin). Sie haben sich nicht bewährt und sind durch die von B. v. Langenbeck empfohlene, gewaltsame Dehnung in der Chloroform-Betäubung fast ganz überflüssig geworden. — Diese Methode gründet sich wesentlich darauf, dass durch tiefe Chloroform-Betäubung vollständige Erschlaffung der Muskeln herbeigeführt und diese daher durch die nachfolgenden gewaltsamen Bewegungen nicht zerrissen, sondern gedehnt werden. Die fibröse oder auch knöchernen Zwischensubstanz, welche die Gelenk-Enden in dieser oder jener Stellung unbeweglich fixirt, wird demnächst zerrissen und zerbrochen. Alsdann wird das Glied in der dem späteren Gebrauche desselben am Meisten günstig erscheinenden Lage in einem Gypsverbande befestigt. Die nachfolgende Entzündung ist nur selten sehr heftig, so dass die Anwendung der Kälte zu ihrer Bekämpfung fast immer ausreicht. War die Ankylose nicht die Folge einer cariösen Zerstörung, so kann man durch diese Methode in einzelnen (freilich sehr seltenen) Fällen nicht bloß eine günstigere Stellung, sondern auch einige Beweglichkeit des Gelenks durch Anfangs passive, demnächst active Be-

wegungen zu erreichen hoffen. Mit diesen Bewegungen ist jedoch immer erst dann der Anfang zu machen, wenn die nach der gewaltsamen Ueberwindung der Ankylose folgende Entzündung ganz erloschen ist.

Gegen die knöcherne Ankylose der Gelenke ist auch die einfache Durchsägung, oder (namentlich um Beweglichkeit zu erzielen) die Resection der zusammengewachsenen Knochen vorgeschlagen. Rhea-Barthou in Philadelphia, welcher Operationen der Art zuerst (und zwar mit Glück) ausgeführt haben soll, durchsägte den Hals des Femur, nachdem er ihn durch eine grosse Incision in der Gegend des Trochanter blossgelegt hatte. Anfangs schien es auch, als wollte ein neues Gelenk sich bilden; der Kranke bewegte den Oberschenkel und ging sogar einige Monate darauf. Bald aber hörte die Beweglichkeit auf, und nach dem Tode erwies es sich, dass beide Stücke des Halses durch Callus sich wieder vereinigt hatten. Rhea-Barthou machte auch die Resection und zwar bei Ankylose des Kniegelenks. Nachdem der Knochen an einer von den grossen Gefässen entfernten Stelle blossgelegt worden, nimmt man mit einer Säge ein keilförmiges Stück aus ihm heraus; ein etwa nicht getrennter Theil des Knochens kann nachträglich zerbrochen werden.

Diese Operation hat begreiflicher Weise alle Gefahren einer complicirten Fractur in ihrem Gefolge und verhält sich daher, abgesehen von der durch Chloroformnarkose auch hier zu umgehenden Zerreiſung der Muskeln, zu der Langenbeck'schen Ruptur der Ankylose gerade wie eine bedeutende Knochenwunde zu einer einfachen Fractur oder Bänderzerreiſung. Jedoch haben Ried u. A. (auch ich selbst) durch Aussägung eines sorgfältig in allen seinen Dimensionen vorher berechneten Keils günstige Resultate erzielt¹⁾, und die Erfolge der kühnen Unternehmungen A. Mayer's auf dem Gebiete der Osteotomie²⁾ sprechen gleichfalls zu Gunsten dieses Verfahrens. Freilich darf man auch hierbei, sofern es sich um die untere Extremität handelt, niemals an die Herstellung eines brauchbaren Gelenkes denken, sondern nur eine Formverbesserung des ankylotischen Gelenkes erwarten. An der oberen Extremität, namentlich am Ellenbogengelenk, ist auf solche Weise sogar die Herstellung eines brauchbaren Pseudogelenkes (eines eigentlichen künstlichen Gelenkes) gelungen. Ob der Keil genau in der Gelenkgegend oder in nächster Nähe ausgesägt wird, ist nicht von grossem Belang, namentlich wenn man nicht auf

¹⁾ Von Ried's 3 Operirten starb nur einer; vgl. Schillbach, Beiträge zu den Resectionen, 1858, Abthl. I. pag. 65.

²⁾ Illustrirte med. Zeitung, 1852, Bd. II. Heft I.

Herstellung der Beweglichkeit ausgeht. Mit geringerer Gefahr dürfte in den meisten Fällen, wo die subcutane Ruptur nicht gelingt, Langenbeck's subcutane Osteotomie¹⁾ ein ebenso günstiges Resultat liefern, als die sogen. keilförmige Resection, jedoch ohne Aussicht auf Beweglichkeit. Zum Behuf ihrer Ausführung wird von einer kleinen Hautwunde aus der Knochen mit einem Drillbohrer durchbohrt, in das Bohrloch eine Sticksäge eingesetzt, und mit dieser entweder nur die eine Hälfte oder nach und nach auch der ganze Knochen durchsägt, der im ersten Falle übrig bleibende Theil aber zerbrochen.

IV. Bewegliche Körper in den Gelenken, Gelenkkörper, Gelenkmäuse, Corpora heterogenea in articulis s. juxta articulos, Mures articulares.

Ambroise Paré²⁾ erzählt, dass er im Jahre 1558 von einem Schneider gerufen wurde, um ihm eine „Wassergeschwulst“ am Knie zu öffnen. In dieser fand er, wie er sich ausdrückt, einen Stein von der Grösse einer Mandel, sehr weiss, glatt und hart; der Kranke genas und lebte noch längere Zeit. Dies ist die erste Beobachtung über eine „Gelenkmaus“, welche in der Literatur vorliegt.

Die nächste Beobachtung rührt von Pechlin (*Observationes physico-medicae*. No. XXXVIII. pag. 306) her, 1691. Demnächst hatte Alexander Monroe 1726 Gelegenheit, das Kniegelenk einer Frau zu untersuchen, in welchem sich ein freibeweglicher Knorpel von der Grösse einer Bohne befand; er glaubte in diesem Gelenk zugleich an den Knorpelüberzügen des Femur einen Eindruck zu bemerken. Von da ab häufen sich die Beobachtungen von Gelenkmäusen.

Anatomische Verhältnisse. Gelenkmäuse sind in verschiedenen Gelenken, namentlich aber in Charniergelenken, bei Weitem am Häufigsten im Kniegelenk beobachtet worden. Ihre Zahl ist sehr wechselnd, bald findet man sie vereinzelt, bald in grosser Zahl beisammen. Morgagni fand deren 25 in dem Kniegelenk einer alten Frau, Robert 18 in einem Ellenbogengelenk, Malgaigne 60; in einigen Fällen wurden sie als unzählbar bezeichnet. Ihre Grösse ist gleichfalls sehr verschieden. Im Allgemeinen sind sie desto kleiner, in je grösserer Anzahl sie in einem Gelenke vorhanden sind. Jedoch überschreiten sie selten die Grösse einer Mandel; es gehört zu den höchst seltenen Ausnahmen, wenn Samuel Cooper in dem Kniegelenk eines Soldaten eine Gelenkmaus von der Grösse der Kniescheibe

¹⁾ Deutsche Klinik, 1854, No. 30.

²⁾ Malgaigne'sche Ausgabe der Werke Paré's. Liv. XIX. Chap. XV. T. III. pag. 23. Vgl. Nélaton, *Pathol. chirurg.* T. II. pag. 180.

fand, welche demselben noch dazu niemals Beschwerden erregt hatte. Ihre Gestalt ist bald rundlich, bald länglich, gewöhnlich platt gedrückt, seltener zackig, eckig oder facettirt. Ihre Oberfläche ist meist glatt und glänzend. Dies hat zu der Annahme geführt, dass sie stets von einer Ausbuchtung der Synovialhaut überzogen seien. Bei einigen ist dies unzweifelhaft der Fall, bei anderen aber, wie wir weiter unten sehen werden, bestimmt nicht. Ihre Farbe ist gemeinhin diejenige der Knorpel; nur wenn sie wirklich verknöchert sind, haben sie auch das Aussehen der Knochen. Gewöhnlich stimmt auch ihre Festigkeit und ihr Gefüge, so weit sich dies mit blossem Auge auf einem Durchschnitt erkennen lässt, mit denen des Knorpels überein. In mehreren hat man auch die feinere Structur des Knorpels mit dem Mikroskop nachgewiesen, dagegen liefern sie beim Kochen kein Chondrin, sondern Glutin. Ihr Gehalt an phosphorsaurem und kohlen-saurem Kalke ist oft sehr beträchtlich. In vielen Fällen zeigten sie eine deutliche Schichtung, zuweilen um einen kohlschwarzen und weichen, in anderen Fällen um einen knöchernen Kern. In mehreren Fällen besass der Gelenkkörper eine rauhe zackige Fläche von knöcherner Natur und eine andere glatte und knorpelige Fläche.

So verhielt sich insbesondere die Gelenkmaus, deren genauere Untersuchung wir Richet verdanken und welche von Velpeau durch eine Operation aus dem Kniegelenk eines Mannes entfernt worden war. Hier bestand fast der ganze Gelenkkörper aus Knochensubstanz, nur eine seiner Flächen und zwar eine convexe besass einen Knorpelüberzug. Er glich durchaus einem abgebrochenen Stück des Gelenk-Endes des Femur. Bei der Section erwies sich, dass am unteren Ende des Femur in der That ein Substanzverlust genau von der Grösse und Gestalt jener Gelenkmaus bestand, so dass über die Entstehung derselben durch Ablösung eines Stückes des Gelenk-Endes vom Femur kein Zweifel obwalten konnte. Diesem Falle ähnlich ist der Fig. 87 abgebildete (Cruveilhier und Richerand). Diese Gelenkmaus hatte gleichfalls eine convexe knorpelige Fläche *a* und eine concave knöcherne *b*.

Man findet die Gelenkkörper bald frei und ohne irgend eine Adhäsion, so dass sie sich in der ganzen Gelenkhöhle hin und her bewegen können, bald angeheftet an die Synovialhaut durch einen verschiedenen dicken Stiel. Fälle der letzteren Art sind neuerdings namentlich von Cruveilhier, Robert und G. Simon genauer beobachtet worden¹⁾. Zuweilen

¹⁾ Fig. 88 ist der von Robert untersuchte Fall von Gelenkmäusen im Ellenbogengelenk. Es

Fig. 87.



Fig. 88.



ist der Stiel ganz dünn und nahe daran zu zerreißen, in anderen Fällen besitzt er eine ansehnliche Breite und umbüllt zuweilen den Gelenkkörper in der Art, dass man deutlich erkennt, wie er von Aussen her gegen die Synovialhaut vorgedrungen ist und diese vor sich in die Gelenkhöhle hineingestülpt hat. Man hat auch Gelenkmäuse im subsynovialen Bindegewebe beobachtet, welche die Synovialmembran nur wenig gegen die Gelenkhöhle hin ausbuchteten.

Die Gelenke, in welchen man bewegliche Körper findet, zeigen stets die Erscheinungen einer mehr oder weniger intensiven chronischen Entzündung. Zuweilen besteht Gelenkwassersucht; gewöhnlich aber finden sich die unter dem Namen der defemormirenden Gelenk-Entzündung (pag. 611) zusammengefassten Veränderungen.

Auch Schriftsteller, welche die „deformirende Gelenk-Entzündung“ nicht besonders schildern, sich also in dieser Hinsicht durchaus unbefangen verhalten, führen dennoch die ihr zugehörigen Veränderungen bei der pathologischen Anatomie der Gelenkmäuse auf. So auch Vidal: „Die das Gelenk umgebenden Muskeln und fibrösen Gebilde bleiben nicht unbetheilt. Man findet in der Umgebung der Gelenke oft weit ausgebreitete Verknöcherungen in den Sehnen, Muskeln und Bändern. An den betreffenden Knochen sieht man auch in grösserer Entfernung vom Gelenk unregelmässige Osteophytenbildung. Das Gewebe der knöchernen Gelenk-Enden selbst erscheint verdichtet (geschrumpft), stärker geröthet und brüchig, die Gelenkflächen sind abgeflacht und an ihrem Rande von einem Kranze von Osteophyten umgeben. Die Gelenkknorpel erscheinen gestreift und gleichsam zerklüftet nach der Richtung der vorzugsweise in dem Gelenk stattfindenden Bewegungen. Zuweilen sind die Knorpel an einzelnen Stellen ganz zerstört oder doch tief eingedrückt. Man hat Fälle gesehen, in denen die Usur der Gelenkknorpel sich auf die ganze Oberfläche der Condylen des Femur und der Tibia erstreckte und auch die Zwischengelenkknorpel in der Richtung von Vorn nach Hinten stark abgeschliffen erschienen. Die Synovialhaut selbst ist stets mit stark entwickelten Zotten besetzt.“

Alle diese anatomischen Thatsachen sind von Wichtigkeit für die Beantwortung der Frage nach der Entstehungsweise der Gelenkmäuse.

Die Schriftsteller, welche diese sonderbare Krankheit zuerst beobachteten, konnten begrifflicher Weise nur unbegründete Hypothesen über ihren Ursprung aufstellen. So meinte Paré, dass die Gelenkkörper sich analog den Blasensteinen verhielten, also Niederschläge aus der Synovia seien; eine Ansicht, welcher Kölliker¹⁾ für gewisse Fälle auch jetzt noch seine Billigung geben zu müssen glaubt. Der

waren 20 Gelenkkörper, theils frei, theils in verschiedenem Grade gestielt, theils ganz von der Synovialhaut umschlossen in demselben enthalten. Alle waren ganz knöchern, höckerig und klein. Der Körper α ist bei A in natürlicher Grösse abgebildet.

¹⁾ Mikroskopische Anatomie Bd. II. Abth. I. pag. 325.

Fall von *Monro* gab Veranlassung zu der Annahme, dass ein Stück Gelenkknorpel, welches in irgend einer Weise abgelöst sei, die Gelenkmäuse darstelle. *Breschet*¹⁾ stützte diese Ansicht, abgesehen von der äusseren Aehnlichkeit, auf die Beobachtung, dass Gelenkmäuse besonders häufig im Knie- und Kiefer-Gelenk vorkommen, in denen sich Zwischengelenkknorpel (*menisci*) befinden, von welchen leichter ein Stück abgelöst werden könnte. Diese Ansicht ist häufig und heftig bekämpft worden. Jedenfalls ist eine solche Entstehungsweise der Gelenkmäuse selten; aber die Beobachtung von *Richet*, welche wir oben mitgeteilt haben, zeigt die Möglichkeit derselben.

Hunter bemerkte bei seinen Versuchen über die Umwandlung der Blutextravasate, dass das ergossene Blut, je nach der Beschaffenheit seiner Umgebungen, verschiedene Umwandlungen erfährt. Er sah, dass *Coagula* in der Nähe der Knochen mit Kalksalzen imprägnirt werden können, und schloss daraus, dass *Coagula* in den Gelenken sich in Knorpel- und Knochensubstanz umzuwandeln vermöchten. Mit Rücksicht auf die der Bildung von Gelenkkörpern gewöhnlich vorausgehenden Gewaltthätigkeiten glaubt er nun ferner annehmen zu dürfen, dass derselben stets ein Blut-Erguss in's Gelenk zu Grunde liege. Es fiel ihm nicht schwer, demnächst auch zu erklären, weshalb diese Körper bald gestielt, bald ungestielt sind, da er den Nachweis geliefert zu haben glaubte, dass die *Coagula* mit den benachbarten Theilen in beliebiger Weise verwachsen könnten. Die *Hunter'sche* Hypothese war bereits gänzlich verlassen, als *Velpeau* sie auf's Neue aufstellte und mit vielem Glück vertheidigte. Hält man sich aber streng an die vorliegenden Thatsachen, so kann man die Möglichkeit einer solchen Bildungsweise höchstens für diejenigen Fälle zugestehen, wo grosse Mengen kleiner bröcklicher Gelenkkörper von unbestimmter Structur sich vorfinden (*Virchow*). Die Umwandlung eines frei in einer Gelenkhöhle liegenden *Coagulum* in Knorpel- und Knochensubstanz ist geradezu von der Hand zu weisen.

Laennec ist der Urheber derjenigen Erklärungsweise, welche die meisten Anhänger zählt und gewiss für viele Fälle die richtige ist. Nach seiner Ansicht entstehen die Gelenkkörper auf Grund einer Entzündung in dem subsynovialen Bindegewebe, vielleicht in manchen Fällen auch noch weiter nach Aussen, in der Umgegend der knöchernen Gelenk-Enden, wo bekanntlich die Bildung von *Osteophyten*, mit denen viele Gelenkmäuse in ihrer Structur übereinstimmen, besonders leicht zu Stande kommt. Bei ihrem weiteren Wachstume drängen sie die

¹⁾ *Coquebert*, Thèse. Paris, 1830, No. 236. pag. 24.

Synovialhaut vor sich her, so dass sie einen Ueberzug von ihr erhalten, welcher endlich zu einem Stiel verlängert und durch eine plötzliche Bewegung zerrissen werden kann. Dieser Theorie Laennec's liegen die oben erwähnten anatomischen Thatsachen zu Grunde. Unter den neuesten Schriftstellern glaubt besonders Gurlt¹⁾, auf Grund eigener Untersuchungen, diese Erklärungsweise für die Mehrzahl der Fälle annehmen zu müssen.

Gleichberechtigt mit ihr ist jedoch die gleichfalls auf anatomischen Beobachtungen beruhende Ansicht von Rokitansky, welche wir bereits früher (pag. 598) berührt haben²⁾. Nach seiner Ansicht beruht die Bildung der beweglichen Gelenkkörper auf einer eigenthümlichen Wucherung der Gelenkzotten, in deren kolbig angeschwollenen Enden sich Knorpel- und Knochensubstanz entwickelt³⁾. Es ist thatsächlich, dass die Entstehung der Gelenkkörper mit entzündlichen Vorgängen zusammenfällt. Bei der Gelenk-Entzündung aber sahen wir diese gefässreichen Fortsätze stets beträchtlich wuchern und bei chronischem Verlauf sich andauernd verdicken.

Der Umstand, dass, nach den Untersuchungen von Kölliker (Mikroskopische Anatomie, Bd. II. erste Hälfte, pag. 324 und 325), in den kolbigen Enden der Gelenkzotten auch im normalen Zustande Knorpelzellen vorkommen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Entwicklungsgang Statt finden könne, um Vieles.

Wir würden sonach als mögliche Entstehungsweisen anzunehmen haben: 1) die Umwandlung eines Blutgerinnsels; 2) die Ablösung eines Knorpel- oder auch Knochenstücks von der Gelenkfläche eines Knochens; 3) incrustirte Niederschläge aus der Synovia; 4) das Hineinwachsen von Osteophyten in die Gelenkhöhle; 5) Entwicklung von Knorpelgewebe und Verknöcherung in den kolbigen Enden der angeschwollenen Gelenkzotten. Die zuletzt aufgeführten beiden Entstehungsweisen lassen die Abhängigkeit von der deformirenden Gelenk-Entzündung deutlich erkennen.

Symptome. Gewöhnlich veranlassen die Gelenkmäuse Symptome, welche auffallend genug sind. Wahrscheinlich bleiben sie jedoch oft lange Zeit unbemerkt. Plötzlich empfindet der Kranke ohne bekannte

¹⁾ l. c. pag. 84.

²⁾ In neuester Zeit hat sich auch Fock (Bemerkungen über Entstehung und Operation der Gelenkkörper, Archiv f. klin. Chir., Bd. II. pag. 162) auf Grund eigener Untersuchungen für diese Ansicht ausgesprochen.

³⁾ Auch hier kommt wieder die Frage in Anregung, ob die Gelenkzotten nicht überhaupt pathologische Gebilde seien. Vgl. pag. 597. — Die dendritische Wucherung fettreicher Synovialfalten, das *Lipoma arborescens* Mülleri, kann auch als Gelenkmaus auftreten, sogar nach Ablösung des Stiels frei werden. Jedoch geschieht dies sehr selten und ohne merkliche Störungen.

Veranlassung einen äusserst heftigen Schmerz in dem Gelenke und kann sich, wenn es ein Gelenk an der unteren Extremität ist, nicht aufrecht halten. Zuweilen ist dieser Schmerz so heftig, dass der Kranke ohnmächtig wird. Dies ist in der Regel das erste Symptom der Krankheit und zugleich ein pathognomonisches. Zuweilen haben die Kranken die Empfindung von einem in dem Gelenke sich bewegenden Körper oder fühlen denselben auch mit ihren Fingern an irgend einer Stelle der Oberfläche des Gelenkes, am Knie z. B. gewöhnlich an der inneren Seite. Fast immer besteht Entzündung der Synovialhaut mit wässrigem Erguss in die Gelenkhöhle (Hydarthros). In anderen Fällen aber fehlt jede Anschwellung, und die Patienten finden bei genauer Vergleichung des leidenden Gelenkes mit dem gesunden keinen Unterschied. Die Beschwerden, welche durch Gelenkkörper erregt werden, sind, je nach der Häufigkeit der Schmerzanfälle und je nach der Reizung der Synovialhaut, sehr verschieden. Dies lässt sich zum grossen Theil auch schon aus der verschiedenen Grösse, Natur und Entstehungsweise der Gelenkkörper ableiten.

Wie hat man jene plötzlichen und heftigen Schmerzanfälle zu erklären? Gewöhnlich nimmt man an, dass sie von der Interposition der Gelenkmaus zwischen die Gelenkflächen der Knochen abhängig seien, in der Art, dass der Kranke Ruhe habe, so lange die Gelenkmaus in einer Ausbuchtung der Synovialhaut verweile, dagegen von jenem plötzlichen Schmerze befallen werde, wenn durch irgend eine unvorhergesehene Bewegung eine Einschiebung derselben zwischen die Gelenkflächen erfolge. Richet macht gegen diese Ansicht geltend, dass die Gelenkflächen viel zu genau aufeinander passten und mit viel zu grosser Kraft durch die Muskeln, Bänder und den Druck der Luft in innigster Berührung erhalten würden, als dass die Einschiebung eines Körpers von der Grösse einer Mandel oder gar darüber wahrscheinlich wäre. Ferner ist zu bedenken, dass die Gelenkknorpel unempfindlich sind, so dass jener Schmerz jedenfalls nicht von ihrer Berührung, sondern nur von der durch das Auseinanderdrängen der Gelenk-Enden bewirkten Zerrung der Synovialhaut abgeleitet werden könnte. Ueberdies hat man ähnliche Schmerzen auch ohne Anwesenheit von Gelenkmäusen beobachtet, blos auf Grund plötzlicher oder heftiger Bewegungen. Diese leitet man dann von einer Zerrung oder Quetschung eines Theiles der Synovialmembran ab. Wahrscheinlich muss diese Erklärung auch für die durch Gelenkmäuse veranlassten Schmerzen als die richtige angesehen werden.

Die **Diagnose** stützt sich wesentlich auf jene mehr oder weniger häufig wiederkehrenden, plötzlich auftretenden Schmerzen und Func-

tionsstörungen. Zur vollen Sicherheit der Diagnose gehört, dass man den Gelenkkörper selbst fühlt, was oft bei der grossen Beweglichkeit derselben schwierig ist und dem Kranken leichter gelingt als dem Arzte.

Die **Prognose** ist insofern keine ungünstige, als lebensgefährliche Erkrankungen aus der Anwesenheit von Gelenkmäusen nicht hervorgehen. Dagegen kann die Brauchbarkeit der Extremität, besonders beim Sitz im Kniegelenk, durch die häufige Wiederkehr der Schmerz-Anfälle in solchem Grade beeinträchtigt werden, dass der Kranke sich jeder, wenn auch lebensgefährlichen Operation zu unterwerfen bereit ist.

Behandlung. Es liegt sehr nahe, zur Beseitigung der erwähnten Beschwerden die operative Entfernung des fremden Körpers vorzunehmen. Dies thaten auch die ersten Beobachter dieses Leidens, namentlich Paré, Simpson u. A., bis die Erfahrung lehrte, dass diese Operation den Tod zur Folge haben kann. Man kannte damals noch nicht genugsam die Gefahren penetrierender Gelenkwunden, und der Zufall wollte, dass gerade die ersten Operationen der Art, bei welchen die Gelenkhöhle ohne besondere Vorsicht geöffnet wurde, glücklich abliefen. Die Zahl der unglücklichen Erfolge mehrte sich aber bald in so erschreckender Weise, dass Benj. Bell die Amputation des Oberschenkels der Ausziehung eines Gelenkkörpers aus dem Kniegelenk vorziehen zu müssen glaubte¹⁾. Die neueste Zeit hat jedoch Methoden kennen gelehrt, durch welche lebensgefährliche Zufälle viel weniger wahrscheinlich gemacht werden.

Die Vorsichtsmaassregeln, welche bei der Extraction der Gelenkkörper zu beachten sind, beziehen sich theils auf die Vorbereitungen, theils auf die Ausführung der Operation selbst. Bevor man zur Operation schreitet, muss nämlich durch vollkommen ruhige Lage, Einwickelung, nöthigen Falls auch durch Eis und locale Blut-Entziehungen jede entzündliche Reizung aus dem der Operation zu unterwerfenden Gelenke verschucht werden²⁾.

Bei der Operation soll der Zutritt der Luft in die Gelenkhöhle vermieden werden. Zu diesem Behuf empfahl bereits Desault die Verschiebung der Haut. Man drängt dann den fremden Körper an eine Stelle, wo die Gelenkkapsel möglichst oberflächlich liegt, und macht, während er von dem Gehülfen oder mit der linken Hand sicher fixirt wird, einen hinreichend grossen Einschnitt, um ihn ohne Zerrung der Kapsel heraustreten zu lassen. Sollte er an einem Stiele festsitzen, so wird dieser mit einer Scheere möglichst tief abgeschnitten.

¹⁾ Man hat fast nur bei Gelenkmäusen im Kniegelenk Veranlassung zur Operation gefunden; jedoch operirten Einzelne auch am Schulter- und am Ellenbogen-Gelenk.

²⁾ Lisfranc, Gaz. des Hôpit., 1838, No. 309.

Tritt er nicht sogleich aus der Wunde hervor, so fasst man ihn mit einer Hakenpincette und zieht ihn schnell heraus. Jedenfalls lässt man unmittelbar, nachdem der Gelenkkörper die Hautwunde passiert hat, die verschobene Haut los, damit jene nicht mehr der Wunde in der Gelenkkapsel entspricht und somit das Eindringen von Luft in letztere unmöglich gemacht wird, und verschliesst dann die Wunde aufs Sorgfältigste. Desault, Bromfield u. A., neuerdings auch Fock¹⁾, haben auf diese Weise sehr glückliche Resultate erzielt; jedoch mag mancher unglücklich abgelaufene Fall unbeschrieben geblieben sein, da bei gestielten Gelenkkörpern auf die angegebene Weise der Eintritt von Luft in die Gelenkkapsel sicher nicht zu vermeiden ist²⁾. Jedenfalls wird man auch im glücklichsten Falle für mindestens 14 Tage die absolute Ruhe des operirten Gliedes durch einen geeigneten Verband sicherstellen müssen und andauernd Eisumschläge anwenden, da bekanntlich oft erst mehrere Tage nach der Verletzung die verderbliche Entzündung ausbricht.

Bei Weitem weniger gefährlich erscheint das Verfahren von Goyrand, welcher die Gelenkmaus in zwei Stationen herausbefördert (*méthode sous-cutanée en plusieurs temps*). Der Gelenkkörper wird gegen eine vorspringende Stelle der Kapsel angedrängt, die Haut über ihm von einem Gehülfen in eine grosse Falte erhoben. An der Basis derselben sticht Goyrand ein langes schmales Bistouri gerade auf den Gelenkkörper ein und spaltet durch eine Hebelbewegung desselben, ohne die Stichwunde in der Haut zu vergrössern, die Kapsel in hinreichender Ausdehnung, um dem durch die Finger der linken Hand hervorgepressten Gelenkkörper den Austritt in das subcutane Bindegewebe zu gestatten. Dieser Austritt erfolgt mit einem plötzlichen,

¹⁾ l. c. pag. 167 u. f. — Fock legt besonderes Gewicht darauf, dass man den Gelenkkörper vorher durch den Patienten selbst, nach mehrtägiger Ruhe der Extremität, sicher fixiren lasse (im Kniegelenk am Condylus externus), dass man ferner kein Chloroform anwende (welches auch wegen der geringen Schmerzhaftigkeit der Operation überflüssig ist), um vor jeder unvorhergesehenen Bewegung sicher zu sein, und dass man endlich um jeden Preis bei der Extraction selbst den Eintritt von Luft in das Gelenk vermeide, über dessen grosse Gefahren alle einig sind.

²⁾ Ich kenne aus der Praxis eines berühmten Operateurs einen solchen Fall, wo bei einem kräftigen jungen Manne eine gefährliche Entzündung folgte und schliesslich Ankylose zurückblieb. Dagegen hat G. Simon (Langenbeck's Archiv 1864) einen grossen, gestielten Gelenkkörper aus dem Kniegelenk mit glücklichem Erfolge extirpirt. — Die „Operation unter Wasser“ — in einer Badewanne — dürfte auch nicht sicher stellen. Dagegen darf man sich von der „antiseptischen Methode“ wohl volle Sicherung gegen Gelenk-Eiterung versprechen.

deutlich fühlbaren Ruck¹⁾. Während die linke Hand die Haut gegen die Kapselwunde anpresst, um den Rücktritt der Gelenkmaus in die Kapsel zu verhüten, lässt der Gehülfe die Hautfalte los, und der Operateur zieht das Messer aus der nun weit von der Kapselwunde entfernt liegenden Hautwunde hervor. Letztere wird mit ein wenig Charpie und einem Pflasterstreifen bedeckt, das Gelenk aber mit einer weichen Binde eingewickelt. Den Gelenkkörper findet man in einiger Entfernung von dem Gelenke unter der Haut oder zwischen den Muskeln. Hier kann er dann, am Besten wohl erst wenn die Kapselwunde vollständig geheilt ist, also in der Regel nach mindestens 8 Tagen, ohne alle Gefahr durch eine einfache Incision extirpirt werden. Die Vortheile dieses Verfahrens sind so einleuchtend und die durch dasselbe erzielten Resultate so glücklich, dass über seine Vorzüglichkeit vor der älteren Operationsweise kein Zweifel sein kann. Goyrand selbst entfernte auf diese Weise aus demselben Kniegelenk kurz nach einander zwei Gelenkmäuse, deren eine er unter der Haut zurückliess, was nach seiner Ansicht stets ohne Gefahr geschehen kann²⁾. Jedoch muss man zugestehen, dass gestielte Gelenkkörper auf diese Weise nur durch einen besonders glücklichen Zufall herausbefördert werden können, und dass bei ungestielten die Herausbeförderung aus der Gelenkkapsel Schwierigkeiten haben, sogar unmöglich sein kann. Bonnet war z. B. in einem Falle ausser Stande, den Austritt des Gelenkkörpers zu bewirken, obgleich er die Kapsel weit geöffnet hatte; bei einem sehr grossen Gelenkkörper habe ich dasselbe erlebt³⁾. Ein weniger unangenehmer Zufall ist mir einmal begegnet: der im Augenblick des Einschnitts noch deutlich unter dem Finger gefühlte und von diesem hervorgepresste Körper (von der Grösse einer Mandel) verschwand gänzlich, wahrscheinlich zwischen die Oberschenkelmuskeln, erregte aber keine Beschwerden. — Ruhige Lage mit sicher fixirtem Gelenk und bei den leisesten Schmerzen sogleich Anwendung des Eises dienen zur Verhütung einer Gelenk-Entzündung. Goyrand liess seinen Kranken schon am zweiten Tage nach der Operation — wohl allzu übermüthig — umhergehen.

Um die Gefahren einer Eröffnung der Gelenkkapsel zu vermeiden, hat man die Fixirung der Gelenkmaus an einer Stelle des

¹⁾ Besteht zugleich Gelenkwassersucht, so spritzt das Wasser aus der comprimierten Kapsel durch die kleine Hautwunde in kräftigem Strahle hervor.

²⁾ Annales de la chirurgie française et étrangère, 1841, Tom. I. pag. 63.

³⁾ Die sehr zackige, scheibenförmige Gelenkmaus, welche 4 Ctm. im grössten Durchmesser und beinahe 2 Ctm. Dicke hatte, wurde demnächst durch die gewöhnliche Operation mit dem glücklichsten Erfolge entfernt.

Gelenks, wo ihre Anwesenheit voraussichtlich keine Beschwerden erregt, versucht. Middleton und Gooch schlugen vor, den Gelenkkörper durch einen geeigneten Verband an der passenden Stelle so lange festzubalten, bis er durch Adhäsion mit seiner Umgebung hinreichend fest verwachsen sei. Nach den Angaben von Sam. Cooper hatte ihr Verfahren mehrmals Erfolg. Auch Boyer rühmt sich, in zwei Fällen durch ein entsprechend gearbeitetes Knieband die Festheftung des Gelenkkörpers an einer unschädlichen Stelle erzielt zu haben. Jedoch hat er seine beiden Kranken später nicht wieder gesehen, und die Dauer der Heilung ist somit nicht erwiesen. Mit mehr Aussicht auf Erfolg, aber auch weniger gefahrlos verfolgte Dieffenbach denselben Weg, indem er die Gelenkmaus an einer passenden Stelle festnagelte¹⁾.

Das Goyrand'sche Verfahren, welches bei geringerer Gefährlichkeit grössere Sicherheit gewährt, verdient, sofern nur der Gelenkkörper vollkommen frei beweglich ist, vor den Fixationsversuchen den Vorzug. Ergiebt sich nach der subcutanen Eröffnung der Gelenkkapsel die Unmöglichkeit, die Gelenkmaus aus derselben hervor zu drängen, so muss man sich entweder auf die Festheftung durch eins der erwähnten Verfahren, am Besten wohl durch eine Bandage, beschränken, oder sofort, unter strenger Befolgung der antiseptischen Methode, zur freien Eröffnung der Kapsel in der von Desault und von Fock (vgl. pag. 643) angegebenen Weise schreiten.

Zweites Capitel.

Neurosen der Gelenke.

Gelenkneurosen werden so häufig mit Entzündungen der Gelenke und deren Folgen verwechselt, dass eine besondere Beschreibung derselben im Anschluss an die entzündlichen Leiden zweckmässig erscheint.

Wir verstehen mit Stromeyer²⁾ und Esmarch³⁾ unter Gelenk-

¹⁾ Dieffenbach schlug einen Stahl Nagel durch den Gelenkkörper bis in den Knochen und zog den Nagel erst nach 4 bis 6 Tagen aus, um hinreichend feste Adhäsionen entstehen zu lassen. Dies gelang zwei Mal ohne übele Zufälle, in einem dritten Falle trat bedenkliche Eiterung ein. — Jobert suchte den Gelenkkörper durch Einstechen von Nadeln zu fixiren; das Verfahren schien der Patientin zu langweilig und wurde aufgegeben. (Bull. de therap. 1845, Juillet).

²⁾ Handbuch der Chirurgie, Bd. I. pag. 503 ff.

³⁾ Ueber Gelenkneurosen, Kiel und Hadersleben 1872. — Wir folgen hier vorzugsweise der Darstellung von Esmarch.

neurosen nicht bloß Neuralgien, welche im Gelenk oder in der Gelenkgegend ihren Sitz haben, sondern auch Contracturen und Muskelkrämpfe, welche im Bereich eines Gelenkes auftreten. In diesem Sinne ist auch die Benennung „hysterisches Gelenkleiden“ zu verstehen, unter welcher Benj. Brodie¹⁾ das Uebel zuerst beschrieben hat.

Wie bei den meisten Nervenleiden prävaliren auch bei diesem die subjectiven Symptome. Vor Allem klagen die Patienten über Schmerz, welcher in einem bestimmten Gelenk, seltener in mehreren zugleich empfunden wird, von dem Gelenke aus aber auf einen mehr oder weniger grossen Abschnitt der Extremität (oder des Körpers) ausstrahlt. Der Schmerz ist von sehr verschiedener Heftigkeit, meist wechselnd, so dass er z. B. Abends sich steigert. Durch Anstrengungen des Gelenks wird er bisweilen vermehrt, bisweilen vermindert. Bald ist er ziehend, reissend (rheumatisch), bald klopfend, rhythmisch mit dem Pulse exacerbirend, wie in entzündeten Fingern. Jede psychische Erregung pflegt den Schmerz zu steigern, während er durch Ablenkung der Aufmerksamkeit vermindert wird und bei eintretender Ermüdung Abends aufhört oder doch erheblich nachlässt und den Schlaf nicht stört, — was im Gegensatz zu den, durch Gelenk-Entzündungen bedingten Schmerzen sehr wichtig ist. Gegen Berührung ist das von Neurose befallene Gelenk sehr empfindlich, aber bei stärkerem Druck nicht mehr, als bei leichter Betastung, so dass z. B. das Erheben einer Hautfalte an dem Gelenk oft mehr Schmerz macht, als eine kräftige Compression der ganzen Kapsel oder der Gelenkvorsprünge oder das Anpressen der knöchernen Gelenk-Enden gegen einander durch Druck oder Stoss. Mit Schmerzäußerungen sind die Kranken sehr freigebig; sie schreien, schlagen um sich und stampfen mit den Füßen; zuweilen stellen sich sogar weitstanzähnliche Bewegungen ein, so dass man gegen Fall oder Stoss Vorsichtsmaassregeln ergreifen muss.

In Betreff der objectiven Symptome ist vor Allem hervorzuheben, dass sie weder zu der Dauer des Leidens, noch zu der Heftigkeit der Schmerzen in gradem Verhältniss stehen. Oft lässt die aufmerksamste Untersuchung keine objective Veränderung erkennen, während die Patienten auf's Heftigste klagen. Bisweilen ist eine geringe Anschwellung in der Gegend des Gelenkes zu entdecken. Dieselbe kann im Gelenke selbst ihren Sitz haben und ein Ueberrest früherer Entzündungen sein (namentlich Synovitis serosa). In anderen Fällen sitzt sie in den äusseren Bedeckungen und ist durch die angewandte

¹⁾ On diseases of the joints, 2. Auflage, London, 1822.

Therapie veranlasst (Vesicantien, Jodtinctur, Eisbeutel). Bisweilen tritt auch eine eigenthümliche Anschwellung, ähnlich einer Urticaria-quaddel, in der Gelenkgegend auf, welche in der Regel ebenso schnell wieder verschwindet, wie sie entstanden ist, sich bald mehr teigig, bald mehr fluctuirend anfühlt, aber niemals Eiter enthält. — In manchen Fällen zeigt die Gelenkgegend oder auch das ganze Glied auffällige Temperaturschwankungen, die sogar einen intermittirenden Typus haben können: meist erfolgt die Steigerung (oft sogar von Röthung und Anschwellung begleitet) des Abends, der Nachlass Nachts. Anstrengungen des Gliedes, auch passive Bewegungen bei der ärztlichen Untersuchung können vorübergehend Hitze, Röthung und Schwellung zur Folge haben. — Sehr auffällig erscheinen die Functionsstörungen, welche freilich nicht immer objectiv nachweisbar sind. Ein „grosses Schwächegefühl“ hindert die Patienten, sich des erkrankten Gelenkes zu bedienen; sie fürchten zu fallen, fallen auch wohl wirklich oder knicken um, wenn sie zu gehen versuchen, obwohl die betreffenden Muskeln nicht mehr, als die dauernde Ruhe es mit sich bringt, abmagern und ihre elektrische Reizbarkeit nicht verlieren. Diese „Schwäche“ bleibt oft nach dem Aufhören der Schmerzen zurück. Häufig sind aber auch alle zu dem kranken Gelenk gehörigen Muskeln oder doch gewisse Gruppen derselben von einer spastischen Contractur befallen, welche bei dem Versuche, Bewegungen zu machen, besonders heftig hervortritt, in der Chloroform-Betäubung aber sofort verschwindet, so dass die Gelenke dann durchweg normal, nur zuweilen unter knarrendem (aber auch sehr wechselnden) Geräusch bewegt werden können.

Wie die Symptome, so zeigt auch der Verlauf ein mannigfaltig wechselndes Bild. Bald allmälige Entwicklung und Steigerung mit nachfolgendem allmäligen Nachlass; bald plötzliches Auftreten, ohne alle Veranlassung oder nach einer unbedeutenden Verletzung der Gelenkgegend, einem Blutverlust, einer Gemüthsbewegung, und dann ebenso plötzliches Verschwinden nach einer anderen Gemüthsbewegung oder auch ohne allen Grund; bald dauerndes Leiden desselben Gelenks, bald Ueberspringen auf ein anderes oder Uebergang zu anderen nervösen Leiden. In vielen Fällen, zumal bei unzweckmässiger Behandlung, erstreckt sich die Dauer des Uebels auf viele Jahre; Contracturen anderer Muskelgruppen, Krämpfe und sonstige nervöse Leiden gesellen sich hinzu, und die Kranken können schliesslich durch Marasmus zu Grunde gehen.

Aetiologie. Eine entschiedene Prädisposition zu Gelenkneurosen haben solche Individuen, die auch sonst Erscheinungen erhöhter

Nervosität, namentlich mehr oder weniger ausgeprägter Hysterie darbieten, vor Allem also jüngere Damen der höheren Stände, welche geistig und körperlich verzogen und verzärtelt sind. Bei solchen stellt sich das Uebel oft ohne jede Veranlassung ganz plötzlich ein. Häufiger aber sind Quetschungen oder Verstauchungen des Gelenkes, zumal wenn sie unzweckmässig behandelt wurden, als Veranlassungen anzuschuldigen. An den Gelenken der unteren Extremitäten, an denen das Uebel entschieden häufiger auftritt, scheinen durch Reizungszustände in den Harn- und Geschlechtsorganen Neurosen hervorgerufen werden zu können, welche Esmarch mit Wahrscheinlichkeit daraus erklärt, dass diejenigen Nervenstämme, welche sensible Zweige zu dem Hüft- und Knie-Gelenk senden, innerhalb des Beckens zahlreiche Anastomosen mit denjenigen Nervengeflechten bilden, welche die Unterleibs- und namentlich die Geschlechtsorgane versorgen.

Bei der **Diagnose** handelt es sich wesentlich um die Unterscheidung von Gelenk-Entzündung. Wo andere nervöse Symptome und das ganze Wesen der Kranken den Wegweiser liefern, gelingt diese Unterscheidung meist leicht. Ist dies nicht der Fall, weisen vielmehr vorausgegangene Verletzungen oder sonstiger anamnestischer Befund auf Entzündung hin, so sind Irrthümer leicht möglich, und in dubis ist man in der That berechtigt und verpflichtet dann den Gedanken an eine noch fortbestehende Entzündung in den Vordergrund zu stellen. Das Missverhältniss zwischen der Hartnäckigkeit und Heftigkeit des Leidens einer Seits und der Geringfügigkeit der objectiven Krankheits-Erscheinungen (namentlich der örtlichen Veränderungen) anderer Seits führen in der Regel auf die richtige Fährte. Von Belang ist eine genaue Vergleichung des gesunden Gelenks der anderen Seite, welches bei genauer Messung nicht einen geringeren, sondern eher einen grösseren Umfang darbietet, als das kranke, woraus mindestens erhellt, dass letzteres nicht angeschwollen ist. Endlich ergibt sich auch, dass alle sonst gegen Gelenk-Entzündung wirksamen Mittel in diesen Fällen nicht blos den Dienst versagt haben, sondern sogar nachtheilig gewesen sind.

Die **Behandlung** der Gelenkneurosen muss nämlich Alles vermeiden, was die Kräfte herabsetzen oder die Nervosität steigern könnte. Daher sind alle Blutentziehungen und Ableitungsmittel¹⁾, auch die absolute Ruhe und andauernde Anwendung von Eis zu vermeiden. Dagegen sind passive Bewegungen, auch das Kneten (Massiren) der

¹⁾ Die oberflächliche Application des *Ferrum candens* (ohne Chloroform-Betäubung) hat sich jedoch in mehreren Fällen, zumal bei spastischen Contracturen, nützlich erwiesen.

Gelenke (welches grade diesen Fällen wohl seinen Ruf verdankt) von Vortheil. Für erstere darf man im Beginn die Chloroform-Betäubung benutzen, vor deren häufigerer Anwendung aber ebenso sehr zu warnen ist, wie vor den hypodermatischen Injectionen von Morphinum, nach denen die Patienten gewöhnlich lechzen. Kalte Begiessungen und Douchen sind in der Regel nützlich. Das Hauptgewicht ist aber auf die Behandlung des ganzen Nervensystems, besonders auf die psychische Einwirkung zu legen. Gelingt es dem Arzte, den Willen der Patienten dem seinigen unterzuordnen und namentlich bei Neurosen der Gelenke an den unteren Extremitäten die ersten Gehversuche glücklich zu erzwingen, so ist damit mehr erreicht, als alle Nervina zu leisten vermögen. Neurotomien, Neurektomien, auch Amputationen haben sich stets erfolglos erwiesen.

Drittes Capitel.

Verletzungen der Gelenke. Laesiones articularum.

I. Gelenkwunden.

I. Schnitt-, Hieb- und Stich-Wunden der Gelenke.

Die mit scharfen Instrumenten in der Gegend eines Gelenkes beigebrachten Wunden dringen entweder in die Gelenkhöhle ein oder nicht. Nur im ersteren Falle sind sie eigentlich Gelenkwunden. Die Verletzung der Haut kann dabei eine mehr oder weniger ausgedehnte sein, sie kann der Kapselwunde entsprechen oder nicht; im letzteren Falle nennt man besonders Stichwunden der Art „subcutane.“

A. Nicht penetrirende Wunden in der Gegend der Gelenke unterscheiden sich wenig von den Wunden anderer Theile. Jedoch vergesse man nicht, dass alle Gelenke von starken Gefässnetzen und von straffen Geweben, insbesondere von Sehnen, die häufig auch von Sehnenscheiden, welche mit der Gelenkhöhle selbst communiciren können, eingeschlossen sind, umgeben werden. Nicht selten, besonders bei Wunden mit Substanzverlust, wird die Vereinigung durch die Gestalt und die Bewegung des Gelenkes gehindert, oder es entwickelt sich eine, für die Function des Gliedes nachtheilige Narbe (vgl. Ankylose); jedoch lässt sich in der Mehrzahl der Fälle durch gehörige Sorgfalt diesen Uebelständen vorbeugen.

B. Penetrirende Gelenkwunden (Gelenkwunden im engeren Sinne), von denen im Nachstehenden ausschliesslich die Rede ist, haben eine viel grössere Bedeutung. Am Häufigsten werden, wegen ihrer

oberflächlichen Lage, die Charniergelenke geöffnet, besonders das Fuss- und Kniegelenk, welche bei manchen ländlichen Arbeiten (z. B. beim Mähen), beim Schiffsbau u. dgl. m. leicht durch schneidende Instrumente getroffen werden¹⁾.

Die **Erscheinungen** einer penetrirenden Gelenkwunde weichen zu Anfang oft sehr wenig, vielleicht gar nicht, von denen einer oberflächlichen Wunde ab. Allerdings wird ein kundiges Auge sogleich nach der Verletzung den Ausfluss der Synovia beobachten können; aber dem Kranken selbst entgeht derselbe um so leichter, als er häufig nur unbedeutend ist und durch die erhebliche Blutung aus den das Gelenk umspinnenden Gefässnetzen verdeckt wird. Gewöhnlich fährt daher der Verletzte, wenn die Wunde ihm ihrer Grösse wegen nicht bedenklich erscheint, noch mehrere Tage fort, das verwundete Gelenk zu gebrauchen. Nach 3, 4, höchstens 6 Tagen, zuweilen aber auch früher treten die ersten Erscheinungen der traumatischen Gelenk-Entzündung auf (vgl. pag. 609). Der Verletzte empfindet eine schmerzhaft Behinderung der Bewegungen und die Umgegend des Gelenkes schwillt an. Alsbald erscheinen die Wundränder aufgedunsen, missfarbig; zwischen ihnen läuft eine grosse Menge röthlicher Flüssigkeit aus; schwammige, weiche Granulationen drängen sich aus der Wunde hervor. Nur bei ganz kleinen Stichwunden fehlen solche Veränderungen an der Wunde selbst. Jedenfalls entsteht nun auch Fieber mit sehr frequentem Puls, heisser Haut, Röthung des Gesichts, gewöhnlich auch Störungen der Verdauung, Appetitlosigkeit mit weisslich belegter Zunge, Durst, Schlaflosigkeit. Der Kranke sucht von selbst das Bett, bringt gern das verletzte Gelenk in halb gebeugte Stellung und schützt es sorgfältig vor jeder Bewegung oder Berührung. Die Geschwulst in der ganzen Ausdehnung der Synovialkapsel nimmt immer mehr zu; die Haut darüber wird stark gespannt, deshalb glänzend, selten intensiv geröthet. Die Schmerzen sind heftig und stehen in directem Verhältniss zu der Intensität der Entzündung. Ober- und unterhalb des Gelenkes entwickeln sich, theils wegen der durch die Geschwulst bedingten Behinderung des Blutlaufs, theils in Folge der weiteren Ausbreitung der Entzündung, Anschwellungen und Abscesse, welche zuweilen, ohne dass eine deutlich erkennbare Phlegmone vorausgeht, plötzlich und in grösserer Entfernung von dem entzündeten Gelenk auftreten. Mit der Gelenkkapsel selbst communiciren diese Eiterherde nur dann, wenn jene stark von Eiter ausgedehnt und endlich geborsten war. Gewöhnlich liegen die gedachten Abscesse im

¹⁾ Bisswunden dringen selten bis in ein Gelenk ein. Am Knie sah ich eine penetrirende Wunde in Folge des Bisses eines Schweines.

Unterhautgewebe, zuweilen aber auch zwischen den Muskeln, und bilden dort weitverbreitete „Eiter-Senkungen“, welche man oft selbst durch zahlreiche und tiefe Einschnitte nicht verhüten kann. Sehr gewöhnlich ist die Folge dieser beträchtlichen und ausgebreiteten Eiterungen Pyämie, welche dann in der zweiten Woche nach der Verletzung sich zu entwickeln pflegt. (Vgl. pag. 612). Zuweilen tritt zu einer Gelenkwunde in weiter Ausdehnung Gangrän, wenn auch die grossen Gefäss- und Nervenstämme unversehrt geblieben sind, wie Larrey, Velpeau, Fleury u. A. beobachtet haben. Wahrscheinlich entsteht der Brand in solchen Fällen in Folge des andauernden Druckes, den die angeschwollene Gelenkkapsel auf die zwischen ihr und den sie umgebenden fibrösen Gebilden eingeklemmten Gefässe (namentlich Venen) ausübt. Gangrän ist aber um so mehr zu befürchten, wenn die Gefäss- und Nervenstämme gleichfalls verletzt sind. — Auch Tetanus hat man bei Gelenkwunden auftreten sehen. — Besteht mit der Gelenkwunde zugleich eine Fractur oder Ablösung der Epiphyse, oder sind fremde Körper in das Gelenk eingedrungen, so ist der Ausgang in Verjauchung in hohem Grade wahrscheinlich.

Reine Gelenkwunden sind jedoch bei Weitem nicht immer tödtlich. Werden sie genau vereinigt und alle Bewegung des verletzten Gelenkes verhütet, so entwickelt sich, falls nicht eine der zuletzt erwähnten Complicationen hinzutritt, entweder gar keine Entzündung, oder sie lässt sich doch durch eine entsprechende Behandlung beseitigen. Zuweilen kann der Ausgang in Eiterung, besonders bei engen Stichwunden, gänzlich vermieden werden. Gewöhnlich eitern Gelenkwunden auch bei zweckmässiger Behandlung, weil diese meist nicht früh genug geleistet werden kann; aber der Eiter ist doch von guter Beschaffenheit und die Vernarbung erfolgt durch den gewöhnlichen Granulationsprocess. Bei diesem Verlaufe bleibt das Leben zwar ungefährdet, aber die Function des Gelenkes wird oft dauernd gestört. Entweder die Gelenk-Enden verwachsen mit einander, oder es bleibt doch eine so beträchtliche Verdickung der Gelenkbänder zurück, dass dadurch die Beweglichkeit des Gelenkes gleichfalls mehr oder weniger beschränkt wird. Vgl. Ankylose.

Die **Diagnose** der Gelenkwunden ist nicht schwierig, wenn dieselben gross sind. Man kann alsdann die Wundränder von einander entfernen, in die Gelenkhöhle hineinsehen, daselbst die Gelenknorpel erblicken, oder doch den Finger in die Gelenkhöhle einführen; bei jeder Bewegung sieht man Synovia ausfliessen. Wenn dagegen die Wunde eng ist, schräg oder winklig verläuft, so kann die Diagnose sehr schwierig werden. In einem solchen zweifelhaften Falle

muss man ohne Weiteres die Wunde genau vereinigen und ganz so handeln, als wäre es eine Gelenkwunde. Jede weitere Untersuchung mit dem eingeführten Finger oder der Sonde, sowie die absichtliche Bewegung des Gelenkes zum Behufe einer genauen Diagnose würden grosse Gefahren in ihrem Gefolge haben. — Das Ausfliessen von Synovia ist allerdings ein für die Diagnose wichtiges Symptom, aber kein pathognomonisches; denn einer Seits kann Synovia auch aus verwundeten Sehnenscheiden fliessen, ohne dass eine Gelenkwunde besteht, und anderer Seits verändert sich die Beschaffenheit der Synovia im Gelenk beim Zutritt der Luft so schnell, dass sie schon 24 Stunden nach der Verwundung oft gar nicht mehr erkannt werden kann. — Je tiefer das Gelenk liegt, desto schwieriger ist die Diagnose.

Die **Prognose** ist, wie aus der Beschreibung des Verlaufs erhellt, im Allgemeinen bedenklich. Muss es auch als eine Uebertreibung bezeichnet werden, wenn Ledran und Bell behaupten, dass eine eiternde Gelenkwunde immer tödlich sei, so ist es doch sicher, dass der Verletzte, sobald Eiterung nicht verhütet werden kann, immer in Lebensgefahr ist und Steifigkeit des Gelenkes, auch im glücklichsten Falle, oft genug davon trägt. Ist mit der Gelenkkapsel zugleich eins der Gelenk-Enden verletzt, oder ist ein fremder Körper im Gelenk zurückgeblieben, so ist die Prognose noch viel schlechter. (Vgl. Schusswunden der Gelenke.) Je grösser das verletzte Gelenk, desto gefährlicher seine Wunden. An den oberen Extremitäten ist die Prognose im Allgemeinen etwas günstiger, als an den unteren. Je leichter der vollständige Abfluss des Eiters erfolgen kann, desto günstiger ist im Allgemeinen der Verlauf. Von Einfluss ist ferner das Alter; je jünger der Verletzte ist, desto besser die Prognose. Grosse Reizbarkeit und Schwäche lassen einen ungünstigen Ausgang befürchten.

Worauf beruht die Gefahr der Gelenkwunden? Paré¹⁾ erklärte sie aus der Verletzung der Aponeurosen und Sehnen, Brasdor²⁾ aus der Zersetzung der organischen Flüssigkeiten. Bonnet hat letztere Ansicht wieder aufgefrischt, indem er eine Zersetzung nicht blos des Eiters, sondern auch des Blutes durch die Einwirkung der in die Gelenkhöhle gelangten Luft annimmt. Die sinuöse Gestalt der Gelenkhöhlen soll in dieser Beziehung einen besonderen Einfluss haben, indem durch dieselbe bei gewissen Bewegungen des Gelenkes eine Art von Aspiration ausgeübt werde. Die meisten neueren Wundärzte neigen sich der Ansicht zu, dass der Eintritt der, immer Fäulnis-

¹⁾ Oeuvres complètes. Paris 1840, Tom. II. pag. 117.

²⁾ Traité des maladies des articulations. Lyon 1845, Tom. I.

keine enthaltenden, atmosphärischen Luft als die Ursache der üblen Zufälle zu betrachten ist. (Vgl. Bd. I. pag. 623). Durch diese wird Eiterung erregt und die schon bestehende Eiterung verschlimmert. Von Wichtigkeit ist die Thatsache, dass eine penetrirende Gelenkwunde viel gefährlicher ist, als eine Exarticulation (Abschneiden des Gliedes in einem Gelenke), woraus wohl geschlossen werden darf, dass einer Seits die grössere Oberfläche der entzündeten Synovialmembran, anderer Seits aber auch die Einklemmung der Entzündungsgeschwulst zwischen den das Gelenk umfassenden fibrösen Gebilden, noch mehr vielleicht die Behinderung des Eiterabflusses, von Bedeutung für den Verlauf sind. Es handelt sich bei der traumatischen Gelenk-Entzündung in der That um eine eingeklemmte Entzündung, welche mit Eintritt von Luft in die Gelenkhöhle complicirt ist.

Die **Behandlung** der Gelenkwunden bezweckt vor Allem die Verhütung der Entzündung. Gewährt die Wunde Aussicht für das Gelingen der ersten Vereinigung, so muss man sie sofort genau schliessen, den Zutritt der Luft verhüten, das Gelenk immobilisiren und von vorn herein in Eis einhüllen. — Befinden sich fremde Körper in dem verwundeten Gelenke, — zufällig eingedrungen oder auch absichtlich eingestopft zur Stillung der gefährlich erscheinenden Blutung, z. B. Bäusche von Leinwand oder Heu (wie ich selbst gesehen habe), so muss man diese, nöthigen Falls nach vorgängiger Erweiterung der Wunde, entfernen und das Gelenk durch reichliches Ergiessen von wässriger Karbolsäure-Lösung (1 auf 40) vollständig ausspülen und säubern. Erscheint die Wunde im Uebrigen noch für die erste Vereinigung geeignet (was freilich selten sein dürfte), so näht man die Hautwunde, sichert den Abfluss des Wundsecrets und der Synovia durch Einführen eines Rohrs (Drainage), legt darüber einen antiseptischen Verband und hüllt das ganze Gelenk in Eis ein. — Bei allen Gelenkwunden, welche keine Aussicht auf unmittelbare Vereinigung darbieten, steht, wie bei complicirten Fracturen, die sorgfältige Durchführung der antiseptischen Methode, neben absoluter Ruhe und Eishüllung des Gelenkes, obenan. — Entsteht trotz dieser Vorsichtsmaassregeln, oder (was häufiger ist) wegen Vernachlässigung derselben, Gelenk-Entzündung, so ist diese nach den pag. 613 u. f. erläuterten Grundsätzen zu behandeln.

2. Schusswunden der Gelenke¹⁾.

Die Verletzungen der Gelenke durch Schusswaffen beschränken sich entweder auf eine mehr oder weniger heftige Quetschung, oder

¹⁾ Vgl. die Bd. I. pag. 654 und Bd. II. pag. 370 citirten Werke.

die Kugel dringt in das Gelenk ein. Der letztere Fall ist der häufigere; spricht man schlechtweg von „Schusswunden der Gelenke“, so hat man nur diese Art der Verletzung im Sinne.

Die durch Geschosse bedingten Quetschungen der Gelenke sind nicht selten so heftig, dass Gangrän entsteht und bei Lösung des Brandschorfs das Gelenk geöffnet wird.

Höchst selten, und zwar nur, sofern es sich um das Kniegelenk handelt, kann die Kugel in das Gelenk eindringen, ohne die knöchernen Gelenk-Enden zu verletzen. Sie muss dann zufällig an einer solchen Stelle und in solcher Richtung eingedrungen sein, dass die schlaffen von den Gelenk-Enden hervorragenden Theile der Kapsel sie aufnehmen konnten. Dass die Kugel in solcher Weise durch das Gelenk hindurchgeht, ist, namentlich am Kniegelenk (vgl. Bd. IV) wohl möglich, aber im Allgemeinen nicht wahrscheinlich. Die Kugel bleibt also in der Regel im Gelenk liegen oder stecken und erregt eine sehr heftige Entzündung. In seltenen Fällen wird das Gelenk durch die vorüberstreichende Kugel ohne Knochenverletzung aufgerissen.

Die Kugel kann ferner in eine Epiphyse eindringen, oder dieselbe mit einer röhrenförmigen Wunde durchbohren, ohne die Synovialkapsel zu verletzen, worauf jedoch stets Gelenk-Entzündung folgt. Fast immer ist hierbei die Epiphyse von Fissuren durchzogen, welche bis zur Gelenkfläche des Knochens dringen.

Gewöhnlich verletzt die Kugel den Knochen und die Synovial-Kapsel zugleich. Das Schicksal der Kugel kann hierbei ein dreifaches sein: bald bildet sie eine, das Gelenk von einer Seite zur anderen durchbohrende Wunde und geht also der Eintrittsöffnung gegenüber wieder hinaus; bald liegt sie im Gelenk zwischen Knochensplittern; bald endlich, jedoch nur bei oberflächlich liegenden Gelenken, fällt sie aus der Eingangsöffnung wieder heraus.

Die Splitterung der Gelenk-Enden, die Erschütterung des getroffenen Knochens, die Ablösung der Knorpel, das bedeutende Blut-Extravasat, welches nicht blos die Gelenkhöhle, sondern auch die den Schusseanal umgebende, mehr oder weniger gequetschte Substantia spongiosa erfüllt, vermehren bei den Schusswunden die Gefahren, welche den Gelenkwunden ohnehin eigenthümlich sind, sehr bedeutend. Es handelt sich hier um die Combination einer penetrirenden Gelenkwunde mit einer complicirten Fractur.

Der Verlauf dieser Verletzungen ist gewöhnlich ein sehr stürmischer. Unter heftigen Schmerzen und Fieber schwillt nicht blos das verletzte Gelenk, sondern auch die weitere Umgebung desselben sehr bald an; der unterhalb gelegene Theil der Extremität wird

ödematös, indem die Anschwellung der Gelenkkapsel den venösen Blutlauf behindert. Die Geschwulst der Gelenkkapsel ist durch vermehrte Absonderung der Synovia, Bluterguss, bald auch entzündliches Exsudat bedingt. Sie erfolgt auch, wenn Synovia und Blut durch den Wundcanal ausfliessen. Letzterer wird jedoch durch die Anschwellung seiner Wandungen und durch Anhaften der Gerinnsel bald verstopft. Ist er späterhin noch durchgängig, so fliesst trübe, bald eitrige Flüssigkeit aus. Die Schmerzen sind gewöhnlich andauernd und heftig, werden aber jedenfalls durch Berührung des Gelenkes und Bewegung des Gliedes aufs Aeusserste gesteigert. Schon nach wenigen Tagen tritt, unter Fieber-Erscheinungen (nicht selten unter Vorausgehen eines starken Schüttelfrostes), Eiterung — und, wo das extravasirte Blut sich schnell zersetzt, auch Verjauchung ein. In dem Gelenke entwickelt sich dann stinkendes Gas, welches beim Druck auf die Kapsel durch die Wunde entweicht, dessen Anwesenheit in der Kapsel aber schon viel früher durch Percussion nachgewiesen werden kann. Der Kranke stirbt gewöhnlich pyämisch.

Am Stärksten ausgeprägt sieht man diesen Verlauf bei Schusswunden des Kniegelenkes. Handelt es sich um ein kleineres Gelenk oder um eine minder bedeutende Verletzung (insbesondere ohne Zersplitterung der Gelenk-Enden), so ist der Verlauf weniger stürmisch; es folgt aber doch Eiterung. — Hat der Eiter keinen Abfluss, so durchbricht er die Gelenkkapsel und veranlasst ausgebreitete Phlegmonen, demnächst Abscesse, Eitergänge, und bedingt dadurch nachträglich Lebensgefahr (Pyämie, hektisches Fieber).

Dringen eiternde Fissuren bis unter den Knorpel-Überzug eines Gelenkes, so erweicht an dieser Stelle der Knorpel, wird abgestossen, und die Jauche dringt nun in die bis dahin unversehrte Gelenkhöhle ein, wodurch plötzlich die heftigste Gelenk-Entzündung hervorgerufen wird. Dies kann aber auch in Fällen geschehen, wo nicht blos die Gelenkkapsel unversehrt ist, sondern auch die gedachten Fissuren fehlen, indem die spongiöse Knochensubstanz in derselben Ausdehnung nekrotisch wird, in welcher sie in der Umgebung des Schusscanals von Extravasat durchdrungen, mithin gequetscht oder doch stark erschüttert war. Dringt bei der Lösung des Sequesters alsdann die Entzündung bis an den Gelenkknorpel vor, so wird dieser erweicht und abgestossen, womit dann dem Eiter der Eintritt in die Synovialkapsel geöffnet ist.

Die **Diagnose** ergibt sich häufig schon aus der schmerzhaften Geschwulst, dem Ausfluss blutiger Synovia beim Druck auf die aufgetriebene Kapsel, endlich am Entschiedensten aus der Untersuchung

mit dem in die Wunde eingeführten Finger. Häufig aber fehlt das eine oder das andere Symptom; es ist daher die genaueste Untersuchung aller Schusswunden in der Gegend der Gelenke zu empfehlen (vgl. Bd. I. pag. 670). — Höchst selten läuft eine Kugel um ein grösseres Gelenk herum, so dass man auf beiden Seiten desselben eine Schussöffnung vorfindet, und daher glauben könnte, das Gelenk sei gänzlich durchbohrt. Man hüte sich vor der leichtfertigen Annahme eines solchen „Contourschusses“, wenn es (wegen zufällig veränderter Stellung des Gliedes) nicht gelingen will, den Finger in die Gelenkkapsel einzuführen oder Synovia auszupressen. — Auftreibung der Gelenkkapsel ist an sich kein sicheres Zeichen ihrer Verletzung, da sie auch bei Wunden in ihrer Nähe sich entzünden und durch serösen oder Blut-Erguss ausgedehnt werden kann; aber, wo ohnehin der Verdacht einer penetrirenden Gelenkwunde besteht, wird er durch die Schwellung des Gelenks erheblich gesteigert.

Die **Behandlung** ist in solchen Fällen, wo es sich um die kleinen Finger- und Zehen-Gelenke, oder um ein einfaches Aufreissen der Gelenkkapsel, oder endlich um eine röhrenförmige Wunde der Epiphyse (welche streng genommen keine Gelenkwunde ist) handelt, dieselbe, wie bei anderen Gelenkwunden (vgl. pag. 653). Namentlich ist auf sorgfältige Feststellung des Gelenkes und streng antiseptische Verbände das grösste Gewicht zu legen. Letztere werden freilich unter den Verhältnissen des Krieges oft schwer durchzuführen sein. — Liegt die Kugel im Gelenke, so ist sie nach Dilatation der Wunde zu entfernen. Besteht aber mit der Gelenkwunde gleichzeitig eine Knochenverletzung, so muss man alle Knochensplitter und alle Rauigkeiten, welche die Synovialmembran reizen könnten, vollständig beseitigen. Diese Aufgabe wird sich, mit höchst seltenen Ausnahmen, immer nur dadurch erfüllen lassen, dass man die zersplitterten Gelenk-Enden, nachdem vorher die Gelenkkapsel weit geöffnet ist, von den Weichtheilen entblösst und absägt; d. h. die Resection der Gelenk-Enden ausführt. Wo die Weichtheile in solcher Ausdehnung verletzt sind, dass die Erhaltung der Extremität auch nach Beseitigung der zersplitterten Gelenk-Enden unmöglich erscheint, ist sogleich die Amputation vorzunehmen.

Diese für die Behandlung der in Rede stehenden Wunden im Allgemeinen maassgebenden Vorschriften müssen, je nach der Localität des verletzten Gelenkes, wesentlich modificirt werden ¹⁾).

¹⁾ Genaueres über die Verhältnisse der einzelnen Gelenke, sowie über die Ausführung der erwähnten Operationen, findet sich im vierten Bande.

II. Gelenkbrüche. Fracturen der Gelenk-Enden¹⁾.

Continuitäts-Trennungen der Knochen im Bereich eines Gelenkes mussten von uns schon bei der Beschreibung der einzelnen Fracturen (pag. 373 bis 512), ferner bei der „gewaltsamen Ablösung der Epiphysen“ (pag. 371) und bei den „Schusswunden der Gelenke“ (pag. 653) erwähnt werden. Hier wollen wir die Fracturen der Gelenk-Enden noch einmal im Allgemeinen, namentlich in ihrer Qualität als Gelenkverletzungen, erläutern.

Brüche der Gelenk-Enden sind bei Weitem seltener als solche im Mittelstück der Röhrenknochen. Es gehört eine sehr grosse und meist eine directe Gewalt dazu, um Gelenkbrüche zu Stande zu bringen, weil Hebelwirkungen wegen der Kürze des dem Gelenke zugewandten Bruchstücks fast gar nicht zur Geltung kommen können. Jedoch machen die Brüche am Schenkelhalse alter Leute eine bereits wiederholt erwähnte Ausnahme. Auch Brüche des Olecranon und der Patella entstehen nicht immer durch directe Gewalt.

In anatomischer Beziehung lassen sich drei Arten der Gelenkbrüche unterscheiden.

1) Der Bruch befindet sich zwar in nächster Nähe des Gelenkes, aber doch noch ausserhalb der Insertionen des Kapselbandes. Solche Fracturen sind streng genommen keine Gelenkbrüche, schliessen sich diesen aber in Betreff der diagnostischen und therapeutischen Schwierigkeiten vollständig an. Die Beweglichkeit an der Bruchstelle kann für diejenige des Gelenkes und die ganze Verletzung dann für eine Verstauchung gehalten werden; die Dislocation der Bruchstücke lässt anderer Seits unter Umständen den Irrthum aufkommen, es handle sich um Luxation. Auf diese Verhältnisse haben wir bei der *Fractura colli humeri chirurgici*, bei der *Fractura radii* u. s. f. aufmerksam gemacht.

2) Die Bruchlinie läuft durch die Insertionsstellen des Kapselbandes und löst diese zum Theil ab. Wir werden auf solche Fracturen als häufige Complicationen der Verrenkungen zurückkommen. Sie sind zwar nicht immer von Verrenkung begleitet, bestehen aber fast niemals ganz ohne Verschiebung der Gelenk-Enden.

3) Der Bruch verläuft innerhalb des Kapselbandes, — Gelenkbrüche im engeren Sinne, mit bedeutendem Bluterguss in's Gelenk und nachfolgender Gelenk-Entzündung.

¹⁾ Vgl. Senftleben, Beiträge zur Kenntniss der Fracturen an den Gelenken. Annalen der Charité, Bd. VIII. pag. 98.

Kardelen, Chirurgie. 7. Aufl. II.

Dass diese Unterscheidungen sich auf den einzelnen Fall nicht immer anwenden lassen, indem die Bruchlinie häufig zum Theil intra-, zum Theil extracapsulär verläuft, wurde bei den Schenkelhalsbrüchen bereits erläutert. (Vgl. pag. 464 u. f.)

Wenn die Bruchlinie aber auch nicht in das Gelenk eindringt, so ergeben sich, indem die Entzündung von dem Periost nach anatomischer Continuität auf die Gelenkbänder übergreift, doch stets erhebliche Störungen in dem benachbarten Gelenk. Gelingt es nicht, die Entzündung in Schranken zu halten, so wird die Beweglichkeit des Gelenkes dauernd gestört (vgl. Ankylose, pag. 627). Dringt die Bruchlinie in das Gelenk ein, so stört die zwischen die Bruchflächen sich eindringende Synovia deren Verwachsung, und der Mangel des Periost macht die Entwicklung eines sogen. provisorischen Callus unmöglich.

Gerade deshalb ist von therapeutischer Seite eine möglichst frühzeitige und möglichst genaue Reposition und eine recht sichere Retention dringend zu empfehlen. Die erstere wird durch Anwendung des Chloroform, die letztere durch den Gypsverband möglich gemacht, mit dem man die, wegen der nachfolgenden Gelenk-Entzündung meist nicht zu entbehrende Eisblase sehr wohl combiniren kann. Steigert sich die Schwellung durch fortgesetzten Erguss im Gelenke, worauf man zu schliessen hat, wenn der Verletzte über den Druck des Verbandes oder über Schmerzen in dem an der peripherischen Seite des verletzten Gelenkes gelegenen Theile der Extremität klagt, ferner wenn irgend erhebliche Schwellung in diesem Theile, namentlich also an den Fingern oder Zehen eintritt, oder wenn diese letztgenannten Theile von dem Verletzten nicht willkürlich bewegt werden können, so muss der Verband gespalten, wenn dies nicht ausreicht, ganz entfernt werden. Die Gefahren des Druckbrandes sind wegen der Schnelligkeit, mit welcher Gelenke anschwellen können, viel grösser und die sorgfältige Ueberwachung solcher Verbände daher viel dringlicher, als bei anderen Fracturen. Gelingt es, namentlich wegen starken Blutergusses im Gelenk, bei dem ersten Verbande nicht, die Reposition vollständig zu bewirken, so muss der Verband nach einigen Tagen (wenn die Schwellung nachlässt) abgenommen und vor seiner Erneuerung die Reposition vervollständigt werden. Dass unter besonderen Verhältnissen die Reposition überhaupt auf eine spätere Zeit verschoben werden muss, wurde bei den Brüchen des Olecranon und der Patella erläutert (vgl. pag. 440 und 485.) Die weitere Behandlung fällt dann mit der Prophylaxis der Ankylose (vgl. pag. 633) zusammen. Namentlich darf man bei Gelenkbrüchen die Verbände nicht so lange liegen lassen, wie bei Brüchen der

Diaphysen. Nach 2—3 Wochen (bei Kindern noch früher) ist der Verband zu wechseln und dabei jedes Mal dem Gelenke eine etwas andere Stellung (bald mehr gebeugt, bald mehr gestreckt) zu geben. Später als bei anderen Brüchen darf man den Verband ganz fortlassen, weil die Consolidation aus den schon angeführten Gründen langsamer erfolgt.

In Betreff der mit Eröffnung des Gelenkes (penetrierender Gelenkwunde) complicirten Gelenkbrüche gilt Alles, was über die analogen Schussverletzungen soeben gesagt wurde.

Isolirte Brüche der Gelenkknorpel (der knorpeligen Ueberzüge der Gelenk-Enden) scheinen nur äusserst selten vorzukommen. Die Knorpel leisten sogar bei Brüchen, welche durch die Epiphyse rechtwinklig gegen die Gelenkfläche eindringen, sehr oft Widerstand, werden aber meist dennoch bei der nachfolgenden Entzündung abgelöst und oft in grösserer Ausdehnung zerfasert (vgl. pag. 599 u. flgd.). Niemals erfolgt Heilung durch Neubildung von Knorpel, sondern durch Callus oder durch eine Bindegewebs-Narbe.

III. Quetschung und Verstauchung.

Unter dem Namen „Verstauchung“ werden verschiedene Verletzungen der Gelenke zusammengefasst, welche darin übereinstimmen, dass offene Wunden nicht bestehen, und dass eine dauernde Verschiebung der knöchernen Gelenk-Enden gegen einander gleichfalls fehlt.

Wir zerlegen die Verstauchung, wie sie im weiteren Sinne aufgefasst wird, in: 1) Quetschung der Gelenke und 2) Verstauchung im engeren Sinne.

I. Quetschung. *Contusio articuli.*

Die Quetschung des Gelenkes ist entweder eine directe oder eine indirecte. Im ersteren Falle hat die Gewalt unmittelbar auf das Gelenk eingewirkt, wie dies am Knie, am Ellenbogen, am Fuss- und Handgelenk besonders häufig geschieht. In Folge einer solchen directen Quetschung entsteht ungemein schnell in der Gegend des Gelenkes eine beträchtliche Geschwulst, welche durch den, theils in der Umgegend, theils in der Gelenkkapsel selbst erfolgten Bluterguss bedingt ist. Drückt man diese Geschwulst mit der Hand, so nimmt man eine Crepitation wahr, wie sie beim Zusammenpressen eines Schneeballes entsteht. Zuweilen hört man auch ein ähnliches Crepitiren, wie bei einem Knochenbruch. In solchen Fällen sei man stets vorsichtig; es handelt sich dann wahrscheinlich wirklich um eine Fractur, wenn auch vielleicht bloß um die Ablösung eines Theiles des

knöchernen Gelenkendes, oder um ganz oberflächliche Zermalmung eines Gelenk-Endes. War die einwirkende Gewalt nicht sehr bedeutend, so verschwindet die Geschwulst bald wieder bei ruhiger Lage des Gliedes und Anwendung kalter Umschläge. Vermindert sich hierbei die Geschwulst in den nächsten Tagen nicht stetig, so muss man nochmals sorgfältig nach einer Fractur im Gelenk forschen; findet sich eine solche nicht, so hat man jedenfalls Grund, anzunehmen, dass die einwirkende Gewalt sehr bedeutend war und dass die Quetschung nicht bloß einen Bluterguss in's Gelenk (*Haematarthros*), sondern Entzündung des Gelenkes bewirkt hat. Dann bleiben auch heftige Schmerzen nicht lange aus, und nur durch eine sehr sorgfältige Behandlung der Gelenk-Entzündung lässt sich ein übler Ausgang verhüten. — Von den höchsten Graden der directen Quetschung, auf welche Eröffnung des Gelenkes durch Gangrän folgt, war bei den Schusswunden der Gelenke die Rede.

Indirecte Quetschung nennen wir eine solche, bei der die Gewalt in mehr oder weniger grosser Entfernung von dem Gelenk eingewirkt hat, — eine Quetschung durch Gegenschlag. Solche Quetschungen beobachtet man häufiger im Oberarm- und besonders im Oberschenkel-Gelenk, wo sie durch einen Fall auf die Füße, auf die Kniee, auf den grossen Trochanter veranlasst werden. Die tiefe Lage dieser Gelenke erschwert die Diagnose. Auch hier ist stets an die Möglichkeit einer Fractur zu denken.

2. Verstauchung. *Contorsio, Distorsio.*

Verstauchung nennen wir im engeren Sinne eine unvollkommene und vorübergehende Verschiebung der Gelenk-Enden gegen einander, eine unvollständige Verrenkung, welche sogleich ohne Zuthun der Kunst reducirt wird. Die Gelenkbänder sind dabei entweder zerrissen, oder doch in hohem Grade gezerrt. Man kann sich leicht eine richtige Vorstellung von den bei einer Verstauchung stattfindenden anatomischen Veränderungen machen, wenn man an einer Leiche das Ellenbogengelenk über die gerade Linie hinaus streckt, so dass der Vorderarm gegen den Oberarm einen nach Hinten offenen stumpfen Winkel, der *Processus cubitalis humeri* aber in der Ellenbeuge einen Vorsprung bildet (*Hyperextension, Dorsal-Flexion*). Lässt man dann die Theile in ihre normalen Verhältnisse zurückkehren, so findet man das Kapselband an seiner vorderen Seite zerrissen, an der hinteren Seite aber zusammengequetscht, ähnlich wie bei einer Verrenkung, nur in geringerem Maasse.

Aetiologie. Die Hebelwirkung, durch welche in dem eben gebrauchten Beispiele, die Zerreiſſung des Kapselbandes erfolgt, indem das Olecranon sich gegen die hintere Fläche des Humerus anstemmt und der ganze Vorderarm somit einen einarmigen Hebel darstellt, ist der häufigste Mechanismus für Verstauchungen wie für Verrenkungen. Jedoch kommen zuweilen auch Drehbewegungen in Betracht; im Munde des Volks werden Verstauchungen sogar oft schlechtweg als „Verdrehungen“ bezeichnet. — Die Bänder eines Gelenkes zerreiſſen, wenn durch äussere Gewalt dem Gelenk eine Bewegung abgezwungen wird, für welche es gar nicht eingerichtet ist. Wird das vollständige Abweichen der Gelenk-Enden von einander, durch die relative Grösse der Gelenkflächen oder durch Vorsprünge und Vertiefungen an denselben, welche in einander greifen, verhindert, oder wird durch die Gestalt der Gelenkflächen die unmittelbare Rückkehr zur normalen Stellung begünstigt, so sind damit die anatomischen Prädispositionen für eine Distorsion gegeben. Verstauchungen sind daher viel häufiger in Charniergelenken, als in freien Gelenken, am Häufigsten im Fussgelenk. Sie entstehen um so leichter, je weniger widerstandsfähig die Bänder eines Gelenkes sind.

Symptome. Im Augenblick der Verletzung empfindet der Kranke einen heftigen Schmerz, gleich darauf aber sind die Bewegungen des Gelenkes nicht behindert. Zuweilen besteht sogar unmittelbar nach der Verletzung eine zu grosse Beweglichkeit. Bald aber werden die Bewegungen schwierig, sogar unmöglich, jedenfalls sehr schmerzhaft; es entsteht beträchtliche Geschwulst, welche zum Theil durch Bluterguss, zum Theil durch Exsudation bedingt ist. Bluterguss erfolgt nicht bloß in der Tiefe, sondern auch unmittelbar unter der Haut; daher beträchtliche Sugillationen, und zwar bei Verstauchung von Charniergelenken nicht bloß auf der Seite, wo die Bänder zerrissen sind, sondern auch auf der entgegengesetzten, wo gewöhnlich bloß Quetschung oder Erschütterung stattgefunden hat. Bei Verstauchung des Fussgelenkes durch Drehung des Fussrückens nach Innen werden z. B. die inneren Seitenbänder des Fussgelenkes gezerrt oder zerrissen, Sugillationen erscheinen aber auch am äusseren Knöchel.

Bei der **Diagnose** einer Verstauchung handelt es sich um die Unterscheidung derselben von Quetschung, von Verrenkung und von Fractur. Mit der Quetschung hat sie den Bluterguss in die Gelenkhöhle gemein, weshalb sich auch, wie bei jener, „Schneeballenknirschen“ bei Druck auf das Gelenk und bei Bewegungen findet; sie unterscheidet sich durch die schnell eintretende grosse Schmerzhaftigkeit, Steifigkeit und bedeutende Anschwellung des Gelenkes.

Bevor letztere sich entwickelt hat, ist die Unterscheidung von einer Verrenkung sehr leicht, weil man sich mit den Fingern von der normalen Stellung der Gelenkvorsprünge überzeugen kann. Später, wenn die Geschwulst beträchtlich ist und durch dieselbe ein hoher Grad von Steifigkeit bedingt wird, kann die Unterscheidung von einer Verrenkung schwierig werden. Vgl. pag. 675 u. f. Alsdann können auch Verwechselungen von Fractur der Gelenk-Enden und Verstauchung leichter vorkommen. Vgl. pag. 657.

Ausgänge und Prognose. In leichteren Fällen lassen Schmerz und Geschwulst bald nach, die Sugillationen verschwinden in der gewöhnlichen Weise, und allmählig stellen sich die normalen Bewegungen wieder ein. Hat aber die Zerreißung der Bänder mit sehr grosser Gewalt an einem sehr festen Gelenke Statt gefunden, so steigert sich der Schmerz zu einer unerträglichen Höhe; das ganze Gelenk und seine Umgegend wird heftig entzündet, und es kann eine dauernde Steifigkeit oder auch eine grosse Neigung zu Recidiven zurückbleiben. Strengt der Verletzte späterhin das Gelenk beträchtlich an, so entwickelt sich oft sehr schnell auf's Neue Entzündung, die in Eiterung oder doch in sogenannten Tumor albus (vgl. pag. 609) übergehen und daher lebensgefährlich werden kann. In dieser Gefahr schweben besonders Individuen, welche an einer Dyskrasie leiden, oder bei denen das verletzte Gelenk schon früher krank war. Bei alten Leuten ist die Prognose einer Verstauchung übler, weil bei der Festigkeit ihrer Bänder eine so grosse Gewalt zur Zerreißung derselben gehört, dass immer ein gleichzeitiges Abbrechen einzelner Stücke des Gelenkran des befürchtet werden muss.

Die **Behandlung** hat die Wiedervereinigung der zerrissenen Bänder herbeizuführen, die Resorption des Blutergusses zu begünstigen, die Entzündung zu mässigen. Dazu ist vor Allem absolute Ruhe des Gelenkes erforderlich. Genaue Einwickelung desselben mit einer weichen Binde genügt in leichteren Fällen. Sicherer erfüllt ein Gypsverband diese Indication. Alle solche Verbände begünstigen überdies die Resorption der Blutergüsse durch gleichmässigen Druck; jedoch darf dieser niemals in solchem Grade stattfinden, dass dadurch der Schmerz gesteigert oder gar die Blutbewegung gestört würde. In bedeutenderen Fällen fügt man Eis-Umschläge oder kalte Irrigationen hinzu. Die kalten Umschläge werden so lange fortgesetzt, wie sie dem Kranken angenehm sind; fühlt er bei ihrem Fortlassen die unangenehme Hitze oder Schmerzhaftigkeit in dem Gelenke zurückkehren, so ist dies ein Zeichen, dass sie noch länger nothwendig sind. Hat man kein Eis zur Hand und lassen sich Irrigationen nicht gut anbringen,

oder reicht die Anwendung der Kälte nicht aus zur Beseitigung der Schmerzen, so lässt man Blutegel (wie bei Gelenk-Entzündung) in der Umgebung des Gelenkes setzen. Nachdem Schmerzhaftigkeit und Geschwulst beseitigt sind, muss man noch für längere Zeit Bewegungen des Gelenkes durch entsprechende Verbände, nöthigen Falls auch durch fortgesetzte ruhige Lage verhüten, um das vollständige Zusammenheilen der zerrissenen Gelenkbänder zu erzielen.

Nicht ganz unbedenklich erscheint mir die von französischen Aerzten vielfach empfohlene „*Massage*“, d. h. das Streichen, Drücken und Kneten an dem verstauchten Gelenke (vgl. Elleaume, *Du massage dans l'entorse*, *Gaz. des hôp.* 1860, p. 151). Allerdings könnte die Resorption der Blutergüsse dadurch wohl ebensogut befördert werden, wie durch das Zerdrücken von Contusionsbeulen (vgl. Bd. I. pag. 647); sobald aber Gelenkbänder, wenn auch nur zum Theil, zerrissen sind, und somit wohl bei allen überhaupt der ärztlichen Behandlung bedürftigen Verstauchungen, muss ein solches Verfahren gefährlich erscheinen.

IV. Verrenkungen. *Luxationes* ¹⁾.

A. Von den Verrenkungen im Allgemeinen.

Verrenkung, *Luxatio*, heisst eine dauernde Verschiebung der zur Bildung eines Gelenkes zusammentretenden Knochen-Enden gegen einander. Man nennt auch die Trennung zweier unbeweglich mit einander verbundenen Knochen, sobald sie gegen einander verhoben sind, Verrenkung (was, nach den neueren Untersuchungen über die Structur der Symphysen ²⁾, wenigstens für diese ganz gerechtfertigt erscheint); gewöhnlich aber bezeichnet man eine solche Verletzung, je nachdem es sich um eine Naht oder um eine Symphyse handelt, als *Diastasis* ³⁾, oder als Symphysen-Trennung.

¹⁾ Das ausführlichste Werk über Verrenkungen verdanken wir Malgaigne: „*Traité des fractures et des luxations*, Tom. II. Paris 1855“ (1100 Seiten). Mindestens ebenso wichtig sind dessen frühere experimentelle Arbeiten, welche sich theils in seinem *Traité d'anatomie chirurgicale*, theils in der *Revue médico-chirurgicale* finden. Für die ganze Lehre von den *Luxationen* sind ferner von Bedeutung: Roser's Untersuchungen über Verrenkungen, in den verschiedenen Jahrgängen des *Archivs für physiologische Heilkunde*; Fischer (in Köln), „Die Ursachen des so häufigen Verkennens von Verrenkungen, Köln 1850;“ Streubel, in *Schmidt's Jahrb.* 1851 u. f.; C. O. Weber, *Chirurgische Erfahrungen etc.* Berlin 1859, pag. 187 u. f.; Gellé, *Étude du rôle de la déchirure capsulaire dans la réduction des luxations récentes de la hanche.* *Archives génér.* Avril 1861; W. Busch, *Beiträge zur Lehre von den Luxationen*, *Archiv für klinische Chirurgie* (1863) Bd. IV. Heft I; Hueter, l. c.

²⁾ Vgl. Luschka, *Die Halbgelenke des menschlichen Körpers.* Berlin 1838.

³⁾ Vgl. Bd. III. „Trennung der Schädelnähte.“

Zerstörung der Knochen und Bänder durch vorausgegangene Entzündung und Eiterung kann (wie wir bei der Gelenk-Entzündung sahen) zu einer Verrenkung führen. Auf solche Weise entsteht die consecutive, pathologische (nach Malgaigne) oder freiwillige Verrenkung, *Luxatio spontanea*.

Hier ist zunächst von der Verrenkung durch äussere Gewalt (*Luxatio violenta seu traumatica*) zu handeln, welcher wir die angeborene Verrenkung (*Luxatio congenita*) anschliessen, obgleich äussere Gewalt wohl nur höchst selten, wahrscheinlich sogar niemals zur Entstehung derselben beiträgt.

I. Traumatische Verrenkung. *Luxatio violenta s. traumatica*.

Aetiologie. Gewaltsame Verrenkungen können an allen Gelenken vorkommen. Die Ausdehnung und Gestalt der Gelenkflächen, die Zahl und Stärke der die Knochen-Enden vereinigenden Bänder können zwar ein beträchtliches Hinderniss für die Entstehung einer Verrenkung abgeben; aber durch die höchsten Grade der Gewalt werden sie endlich doch alle überwunden. Zuweilen entstehen dabei dann zugleich Knochenbrüche und Zerreissungen der Weichtheile von solcher Ausdehnung und Bedeutung, dass die Verrenkung fast als Nebenverletzung erscheint.

Die Mehrzahl der Luxationen und besonders die wegen ihrer Häufigkeit als typisch betrachteten, finden sich an solchen Gelenken, in denen sich durch einfache Bogenlinien umschriebene Knochenflächen berühren und in denen ausgiebige und verschiedenartige Bewegungen stattfinden. Je fester die Gelenkverbindung und je weniger ausgiebig die Bewegungen eines Gelenkes, desto seltener ist Luxation desselben. Die Fuss- und Handwurzelknochen stehen z. B. durch fast geradlinig begrenzte breite Flächen mit einander in Berührung und sind durch zahlreiche starke, zum Theil innerhalb des Gelenkes gelegene Bänder mit einander straff verbunden und daher nur höchst unbedeutender Bewegungen fähig; dem entsprechend sind die Verrenkungen in ihnen sehr selten und nur durch sehr grosse Gewalt möglich. Ausgedehntere Bewegungen gestatten die Charniergelenke; aber ihre Berührungsflächen sind beträchtlich, besonders in querer Richtung, in welcher sie auch fast gar keine Beweglichkeit besitzen. In dieser Richtung erfolgen denn auch nur selten Verrenkungen; in der Richtung dagegen, in welcher die Gelenk-Enden sich an einander bewegen und die Gelenkflächen sich in geringerer Ausdehnung berühren, entstehen Verrenkungen leichter. Die Arthrodie endlich, das freieste Gelenk,

bietet auch die grösste Möglichkeit für Luxationen dar; das Schultergelenk erleidet häufiger Verrenkungen, als alle übrigen Gelenke zusammengenommen¹⁾.

Es giebt sonach eine physiologische Prädisposition der Gelenke zu Verrenkungen.

Als prädisponirend sind ferner gewisse krankhafte Zustände der Bänder und Muskeln zu betrachten. Durch Erschlaffung der Bänder und durch Continuitätstrennung derselben (durch frühere Luxation desselben Gelenkes, anderweitige Zerreissung oder entzündliche Auflockerung der Bänder, Gelenkwassersucht) werden Verrenkungen begünstigt. Erschlaffung der Muskeln prädisponirt zur Verrenkung von solchen Gelenken, an denen Muskeln zur Befestigung der Gelenkenden wesentlich beitragen (wie z. B. am Schultergelenk). Anderer Seits soll eine besonders kräftige Muskulatur Verrenkungen begünstigen, namentlich bei gleichzeitiger Schwäche der Gelenkverbindungen; jedoch sind Menschen mit stark entwickelten Muskeln hauptsächlich wohl deshalb häufiger Verrenkungen ausgesetzt, weil sie sich mehr als andere solchen Beschäftigungen unterziehen, bei denen die Gelegenheit zur Entstehung von Verrenkungen sich darbietet. Hierauf beruht es auch zum grössten Theil, dass Verrenkungen häufiger bei Männern als bei Frauen, häufiger im mittleren als im Greisen-Alter, häufiger bei Erwachsenen als bei Kindern beobachtet werden.

In der frühesten Kindheit kommen traumatische Luxationen gar nicht vor; bis zum 10. Lebensjahre sind sie noch sehr selten. Dies erklärt sich aus der grossen Stärke und Elasticität der Bänder und Knorpel. Es entsteht leichter eine Epiphysentrennung, als eine Verrenkung. Vgl. Hueter, l. c. pag. 299.

Gelegenheits-Ursachen. Die Kraft der Muskeln (der Muskelzug) allein vermag eine Verrenkung (z. B. des Unterkiefers) hervorzubringen. In manchen Fällen wird die Verrenkung durch Muskelzug vorbereitet oder, nachdem sie durch äussere Gewalt eingeleitet ist,

¹⁾ Statistische Uebersicht der Verrenkungen, nach Malgaigne, Norris, O. Weber und Gurlt. Unter 1105 Fällen fanden sich: Verrenkungen des Schultergelenks 556, des Hüftgelenks 97, des Ellenbogengelenks 88, des Schlüsselbeins 68, des Fusses 46, des Daumen 45, des Handgelenks 40, der Finger (mit Ausschluss des Daumen) 21, des Kniegelenks 19, des Unterkiefers 15, der Kniescheibe 7, der Wirbelsäule 7. Verrenkungen anderer Gelenke sind nur ganz vereinzelt aufgeführt. Nach einer Zusammenstellung von E. Blasius (Deutsche Klinik, 1870, No. 43) kommen auf 100 Schulter-Verrenkungen, etwa 35 des Ellenbogengelenks, 21 des Oberschenkels, 12 des Schlüsselbeins, 10 des Radius, 7 des Daumen, 6 des Fusses. — Die Statistik der Luxationen lässt noch viel zu wünschen übrig. Vgl. Gurlt, Deutsche Klinik, 1857, Monatsbl. 1; Hueter, l. c. pag. 298 u. f. — Verrenkungen scheinen im Allgemeinen 10 mal seltener zu sein, als Knochenbrüche.

vollendet. Zuweilen bedingt eine gewisse Stellung des Gelenkes, in welche es willkürlich oder unwillkürlich versetzt worden ist, eine specielle Prädisposition, eine mechanische Gewalt aber ist die eigentliche Veranlassung, ein anderweitiger Muskelzug gleichsam das vollbringende Moment für die Luxation. So wird z. B. der Oberarm durch die Zusammenziehung des Deltamuskels in eine für seine Verrenkung besonders günstige Stellung gebracht. Findet in dieser Stellung ein Fall auf den Ellenbogen statt, so dass dieser vorübergehend das *Punctum fixum* für den durch das Oberarmbein gebildeten Hebelarm wird, so weicht der Oberarmkopf, welcher jetzt das bewegliche Ende des Hebels ausmacht, unter dem Zuge des *Pectoralis major* und *Latissimus dorsi* nach Unten und Vorn aus, so dass diese Muskeln die Verrenkung vollenden, welche der Deltamuskel vorbereitet hatte. Viele haben jedoch den Muskeln bei der Entstehung der Verrenkungen eine zu grosse Rolle zugetheilt, besonders Boyer. Nach seiner Lehre handelt es sich bei jeder Verrenkung um eine primitive und eine consecutive Verschiebung (vgl. pag. 667); erstere kann sowohl durch Muskelzug, als auch durch äussere Gewalt veranlasst werden, letztere wird immer durch Muskelzug herbeigeführt. In neuester Zeit hat Roser¹⁾ der Lehre Boyer sich insofern angeschlossen, als er annimmt, der Gelenkkopf werde gewöhnlich (namentlich bei Verrenkungen im Hüftgelenk) durch nachfolgende Bewegungen in eine secundäre Stellung gebracht.

Die mächtigsten und wichtigsten Veranlassungen der Verrenkungen sind äussere Gewalten, welche den Widerstand der Gelenkbänder zu überwinden, Muskeln zu zerreißen, auch Knochen zu zerbrechen vermögen. Diese mechanischen Einflüsse sind hauptsächlich von zweierlei Art: 1) Stoss, Zug, Drehung, durch welche die Gelenkbänder zerrissen, die Gelenkflächen gewaltsam von einander entfernt werden; 2) Fall auf eine Extremität, wobei ein Theil derselben durch den Fussboden aufgehoben wird, während der oberhalb des nächsten oder nächstfolgenden Gelenkes liegende Knochen mit der ganzen Gewalt des in seiner Wucht durch die Schnelligkeit des Falles gesteigerten Körpergewichts vorwärts getrieben wird. — Bei der ersten Reihe wirkt die Gewalt direct auf eins der Gelenk-Enden oder auch wohl auf beide in der Nähe des Gelenkes ein²⁾. Weil es sich hierbei um

¹⁾ Zur Revision der Verrenkungslehre, Wunderlich's Archiv 1857, Heft 1.

²⁾ Verrenkungen der Art kann man an der Leiche ohne Schwierigkeit nachahmen. Lässt man z. B. während der Oberschenkel auf einem Tische ruht, den Unterschenkel herabhängen, erhebt dann die Ferse und führt einen kräftigen Schlag auf das obere Ende der Tibia, so kann man hierdurch eine Verrenkung im Kniegelenk erzeugen.

directe Einwirkung der Gewalt mindestens auf das eine Gelenk-Ende handelt, nennt man die durch solchen Mechanismus entstandenen Verrenkungen schlechtweg *directe*. Dabei sind die Gelenkbänder immer in hohem Grade zerrissen; das direct getroffene Gelenk-Ende zeigt deutlich die Spuren der Quetschung. Von allen Verrenkungen sind diese am Häufigsten mit *Fractur complicirt*; sie sind die gefährlichsten, aber auch die seltensten. — Bei der zweiten Reihe wirkt die Gewalt auf das dem verrenkten entgegengesetzte Ende des Knochens. Der Winkel, in dem die Gelenk-Enden zusammenstossen, wird auf's Aeusserste vergrössert oder verkleinert, die Spannung der Gelenkbänder daher auf's Aeusserste gesteigert, — bis zur Zerreiſung, wo dann, unter dem Einflusse einer selbst geringfügigen Gewalt am entgegengesetzten Ende des Knochens, durch Hebelbewegung die Verschiebung erfolgt. Die auf solche Weise entstehenden Verrenkungen nennt man *indirecte*; sie sind bei Weitem häufiger als die *directen*.

Auf die Wichtigkeit und Häufigkeit der Hebelwirkungen beim Entstehen einer Verrenkung hat neuerdings *Bueter* (l. c. pag. 274 u. f.) besonders aufmerksam gemacht. — Vgl. auch „*Distorsion*“, pag. 660, und die bei den einzelnen *Luxationen* weiterhin zu gebenden Erläuterungen.

Varietäten der Verrenkungen unterscheidet man, je nach dem Grade (der Ausdehnung) der Verschiebung und je nach den neuen Verhältnissen, in welche der Knochen getreten ist.

Haben die zusammengehörigen Gelenkflächen einander nicht vollständig verlassen, sondern berühren sich noch zum Theil, so nennt man die Verrenkung eine unvollständige, *Luxatio incompleta*, s. *Subluxatio*, im Gegensatz zur *Luxatio completa*, bei welcher gar keine Berührung zwischen den beiderseitigen Gelenkflächen mehr stattfindet. Unvollständige Verrenkungen kommen besonders an solchen Gelenken vor, in denen grosse breite Knochenflächen mit einander in Berührung stehen. Umgekehrt verhält es sich bei den *Arthrodien*, an welchen *Hippokrates* und in neuerer Zeit *Desault* unvollständige Verrenkungen sogar gänzlich leugneten¹⁾.

Bei vollständigen Verrenkungen bleibt die Verschiebung der Gelenk-Enden, was den Grad und die Richtung betrifft, später nicht immer dieselbe, wie unmittelbar nach der Verletzung. Man unterscheidet deshalb *primäre* und *consecutive* Verschiebung. Es ist allerdings möglich, dass ein verrenkter Gelenkkopf durch die äussere Gewalt an eine Stelle geschoben wird, an welcher ihn der Muskelzug oder anderweitige Verhältnisse nicht verbleiben lassen; aus einer Verrenkung nach Unten kann auf diese Weise zuletzt eine

¹⁾ Vgl. *Boyer*, *Maladies chirurgicales*, Tom. IV. pag. 22.

Verrenkung nach Oben werden (Boyer). Bedenkt man aber, wie wenig der niemals ruhende Tonus der Muskeln und die Anordnung der die einzelnen Gelenkböhlen umgebenden Gebilde eine solche Vertheilung der Verschiebung auf zwei Momente wahrscheinlich machen, so kommt man zu der Ueberzeugung, dass in der Mehrzahl der Fälle der verrenkte Gelenktheil an der Stelle, an welche er im Moment der Verrenkung selbst verschoben wurde, auch verbleibt.

Man unterscheidet frische und veraltete (*Luxatio recens* und *inveterata*), einfache und complicirte, auch einfache und doppelte Verrenkungen. Veraltet nennen wir eine Verrenkung, sobald die durch die Verletzung erregte acute Entzündung abgelaufen ist. Frisch ist sie also nicht blos in den ersten Stunden ihres Bestehens, sondern auch noch während der, meist mehrere Tage andauernden Reactions-Periode. Jedoch wird es mit diesen Unterscheidungen nicht immer so streng genommen.

Benennung der Verrenkungen. Man spricht von Verrenkungen nach Oben, nach Unten, nach Innen, nach Aussen, nach Vorn, nach Hinten, je nach der Richtung, in welcher der verrenkte Knochen verschoben ist. Welcher ist aber der verrenkte Knochen? Man antwortet: „Als verrenkt ist derjenige Knochen zu betrachten, an welchem man zum Behufe der Reduction die Extension ausüben muss.“ Abgesehen von der sonstigen Mangelhaftigkeit dieser Bestimmung, wonach sollen wir uns in den keineswegs seltenen Fällen richten, wo gar keine Extension anzuwenden ist? — „Verrenkt,“ sagt man ferner, „ist derjenige Knochen, dessen Verschiebung eine Difformität bedingt.“ Zur Bildung der Difformität tragen aber gewöhnlich beide Gelenk-Enden bei. Ebenso schwierig durchzuführen ist die Benennung der Verrenkung nach demjenigen Knochen, welcher vorzugsweise vorschoben ist, obgleich diese Bezeichnungsweise in manchen Fällen als die natürlichste erscheint. Um Verwirrungen zu vermeiden, muss man die Benennung nach einem bestimmten Princip durchführen, und es ist sehr zu bedauern, dass in dieser Beziehung zwischen den Wundärzten der verschiedenen Länder keine vollständige Uebereinstimmung herrscht. In Deutschland und Frankreich bezeichnet man jetzt ganz allgemein denjenigen Knochen als den verrenkten, welcher vom Schädel oder aber von der Mittellinie des Körpers am Weitesten entfernt ist, und benennt die Richtung der Verrenkung nach derjenigen Fläche des dem Schädel oder der Mittellinie näher gelegenen Knochens, gegen welche hin der verrenkte Knochen verschoben ist.

Fig. 89.



Fig. 90.



Fig. 91.



So ist also z. B. Fig. 89 eine Verrenkung des Vorderarms — denn der Vorderarm ist weiter entfernt vom Schädel, als der Oberarm — und zwar nach Hinten, d. h. gegen die hintere Fläche des Oberarms. — Fig. 90 ist eine Verrenkung des Oberschenkels nach Hinten und Oben. — Fig. 91 stellt eine (sogenannte) Verrenkung des Körpers des Brustbeins nach Vorn und Oben, d. h. auf die vordere Fläche des Manubrium sterni dar.

Anatomische Veränderungen des verrenkten Gelenks.

1) Die knöchernen Gelenk-Enden erleiden sehr häufig mit der Verrenkung zugleich eine Continuitätstrennung. Solche complicirte Fracturen erfolgen durch Zerschmetterung oder durch Abreißen eines Knochenstücks und zwar vorzugsweise bei älteren Leuten, deren Knochen brüchig und deren Bänder fest sind. So bricht z. B. der Malleolus externus bei einer Verrenkung des Fusses nach Aussen durch Abreißen, bei einer Verrenkung nach Innen durch Zermalmung. In ähnlicher Weise entstehen Brüche der Tubercula des Humerus und des Gelenkranbes der Scapula bei Schulter-Verrenkungen.

Der durch die Verrenkung in neue Umgebungen versetzte Knochen geht mit diesen alsbald auch neue Verbindungen ein. Meist wurde er in seiner Bewegung erst durch einen anderen Knochen aufgehalten. Es treten somit zwei Knochen in Berührung, welche keineswegs hierzu bestimmt sind. Darauf beruhen die Veränderungen, welche bei verallieten Verrenkungen, sowohl der verrenkte Knochen selbst, als auch derjenige, mit welchem er abnormer Weise in Berührung getreten

vollendet. Zuweilen bedingt eine gewisse Stellung des Gelenkes, in welche es willkürlich oder unwillkürlich versetzt worden ist, eine specielle Prädisposition, eine mechanische Gewalt aber ist die eigentliche Veranlassung, ein anderweitiger Muskelzug gleichsam das vollbringende Moment für die Luxation. So wird z. B. der Oberarm durch die Zusammenziehung des Deltamuskels in eine für seine Verrenkung besonders günstige Stellung gebracht. Findet in dieser Stellung ein Fall auf den Ellenbogen statt, so dass dieser vorübergehend das *Punctum fixum* für den durch das Oberarmbein gebildeten Hebelarm wird, so weicht der Oberarmkopf, welcher jetzt das bewegliche Ende des Hebels ausmacht, unter dem Zuge des *Pectoralis major* und *Latissimus dorsi* nach Unten und Vorn aus, so dass diese Muskeln die Verrenkung vollenden, welche der Deltamuskel vorbereitet hatte. Viele haben jedoch den Muskeln bei der Entstehung der Verrenkungen eine zu grosse Rolle zugetheilt, besonders Boyer. Nach seiner Lehre handelt es sich bei jeder Verrenkung um eine primitive und eine consecutive Verschiebung (vgl. pag. 667); erstere kann sowohl durch Muskelzug, als auch durch äussere Gewalt veranlasst werden, letztere wird immer durch Muskelzug herbeigeführt. In neuester Zeit hat Roser¹⁾ der Lehre Boyer sich insofern angeschlossen, als er annimmt, der Gelenkkopf werde gewöhnlich (namentlich bei Verrenkungen im Hüftgelenk) durch nachfolgende Bewegungen in eine secundäre Stellung gebracht.

Die mächtigsten und wichtigsten Veranlassungen der Verrenkungen sind äussere Gewalten, welche den Widerstand der Gelenkbänder zu überwinden, Muskeln zu zerreißen, auch Knochen zu zerbrechen vermögen. Diese mechanischen Einflüsse sind hauptsächlich von zweierlei Art: 1) Stoss, Zug, Drehung, durch welche die Gelenkbänder zerrissen, die Gelenkflächen gewaltsam von einander entfernt werden; 2) Fall auf eine Extremität, wobei ein Theil derselben durch den Fussboden aufgehallen wird, während der oberhalb des nächsten oder nächstfolgenden Gelenkes liegende Knochen mit der ganzen Gewalt des in seiner Wucht durch die Schnelligkeit des Falles gesteigerten Körpergewichts vorwärts getrieben wird. — Bei der ersten Reihe wirkt die Gewalt direct auf eins der Gelenk-Enden oder auch wohl auf beide in der Nähe des Gelenkes ein²⁾. Weil es sich hierbei um

¹⁾ Zur Revision der Verrenkungslehre, Wunderlich's Archiv 1857, Heft 1.

²⁾ Verrenkungen der Art kann man an der Leiche ohne Schwierigkeit nachahmen. Lässt man z. B. während der Oberschenkel auf einem Tische ruht, den Unterschenkel herabhängen, erhebt dann die Ferse und führt einen kräftigen Schlag auf das obere Ende der Tibia, so kann man hierdurch eine Verrenkung im Kniegelenk erzeugen.

directe Einwirkung der Gewalt mindestens auf das eine Gelenk-Ende handelt, nennt man die durch solchen Mechanismus entstandenen Verrenkungen schlechtweg *directe*. Dabei sind die Gelenkbänder immer in hohem Grade zerrissen; das direct getroffene Gelenk-Ende zeigt deutlich die Spuren der Quetschung. Von allen Verrenkungen sind diese am Häufigsten mit *Fractur complicirt*; sie sind die gefährlichsten, aber auch die seltensten. — Bei der zweiten Reihe wirkt die Gewalt auf das dem verrenkten entgegengesetzte Ende des Knochens. Der Winkel, in dem die Gelenk-Enden zusammenstossen, wird auf's Aeusserste vergrössert oder verkleinert, die Spannung der Gelenkbänder daher auf's Aeusserste gesteigert, — bis zur Zerreißung, wo dann, unter dem Einflusse einer selbst geringfügigen Gewalt am entgegengesetzten Ende des Knochens, durch Hebelbewegung die Verschiebung erfolgt. Die auf solche Weise entstehenden Verrenkungen nennt man *indirecte*; sie sind bei Weitem häufiger als die *directen*.

Auf die Wichtigkeit und Häufigkeit der Hebelwirkungen beim Entstehen einer Verrenkung hat neuerdings Hueter (l. c. pag. 274 u. f.) besonders aufmerksam gemacht. — Vgl. auch „Distorsion“, pag. 660, und die bei den einzelnen Luxationen weiterhin zu gebenden Erläuterungen.

Varietäten der Verrenkungen unterscheidet man, je nach dem Grade (der Ausdehnung) der Verschiebung und je nach den neuen Verhältnissen, in welche der Knochen getreten ist.

Haben die zusammengehörigen Gelenkflächen einander nicht vollständig verlassen, sondern berühren sich noch zum Theil, so nennt man die Verrenkung eine unvollständige, *Luxatio incompleta*, s. *Subluxatio*, im Gegensatz zur *Luxatio completa*, bei welcher gar keine Berührung zwischen den beiderseitigen Gelenkflächen mehr stattfindet. Unvollständige Verrenkungen kommen besonders an solchen Gelenken vor, in denen grosse breite Knochenflächen mit einander in Berührung stehen. Umgekehrt verhält es sich bei den *Arthrodiën*, an welchen Hippokrates und in neuerer Zeit Desault unvollständige Verrenkungen sogar gänzlich leugneten¹⁾.

Bei vollständigen Verrenkungen bleibt die Verschiebung der Gelenk-Enden, was den Grad und die Richtung betrifft, später nicht immer dieselbe, wie unmittelbar nach der Verletzung. Man unterscheidet deshalb primäre und consecutive Verschiebung. Es ist allerdings möglich, dass ein verrenkter Gelenkkopf durch die äussere Gewalt an eine Stelle geschoben wird, an welcher ihn der Muskelzug oder anderweitige Verhältnisse nicht verbleiben lassen; aus einer Verrenkung nach Unten kann auf diese Weise zuletzt eine

¹⁾ Vgl. Boyer, *Maladies chirurgicales*, Tom. IV. pag. 22.

Verrenkung nach Oben werden (Boyer). Bedenkt man aber, wie wenig der niemals ruhende Tonus der Muskeln und die Anordnung der die einzelnen Gelenkhöhlen umgebenden Gebilde eine solche Vertheilung der Verschiebung auf zwei Momente wahrscheinlich machen, so kommt man zu der Ueberzeugung, dass in der Mehrzahl der Fälle der verrenkte Gelenktheil an der Stelle, an welche er im Moment der Verrenkung selbst verschoben wurde, auch verbleibt.

Man unterscheidet frische und veraltete (*Luxatio recens* und *inveterata*), einfache und complicirte, auch einfache und doppelte Verrenkungen. Veraltet nennen wir eine Verrenkung, sobald die durch die Verletzung erregte acute Entzündung abgelaufen ist. Frisch ist sie also nicht blos in den ersten Stunden ihres Bestehens, sondern auch noch während der, meist mehrere Tage andauernden Reactions-Periode. Jedoch wird es mit diesen Unterscheidungen nicht immer so streng genommen.

Benennung der Verrenkungen. Man spricht von Verrenkungen nach Oben, nach Unten, nach Innen, nach Aussen, nach Vorn, nach Hinten, je nach der Richtung, in welcher der verrenkte Knochen verschoben ist. Welcher ist aber der verrenkte Knochen? Man antwortet: „Als verrenkt ist derjenige Knochen zu betrachten, an welchem man zum Behufe der Reduction die Extension ausüben muss.“ Abgesehen von der sonstigen Mangelhaftigkeit dieser Bestimmung, wonach sollen wir uns in den keineswegs seltenen Fällen richten, wo gar keine Extension anzuwenden ist? — „Verrenkt,“ sagt man ferner, „ist derjenige Knochen, dessen Verschiebung eine Difformität bedingt.“ Zur Bildung der Difformität tragen aber gewöhnlich beide Gelenk-Enden bei. Ebenso schwierig durchzuführen ist die Benennung der Verrenkung nach demjenigen Knochen, welcher vorzugsweise vorschoben ist, obgleich diese Bezeichnungsweise in manchen Fällen als die natürlichste erscheint. Um Verwirrungen zu vermeiden, muss man die Benennung nach einem bestimmten Princip durchführen, und es ist sehr zu bedauern, dass in dieser Beziehung zwischen den Wundärzten der verschiedenen Länder keine vollständige Uebereinstimmung herrscht. In Deutschland und Frankreich bezeichnet man jetzt ganz allgemein denjenigen Knochen als den verrenkten, welcher vom Schädel oder aber von der Mittellinie des Körpers am Weitesten entfernt ist, und benennt die Richtung der Verrenkung nach derjenigen Fläche des dem Schädel oder der Mittellinie näher gelegenen Knochens, gegen welche hin der verrenkte Knochen verschoben ist.

Fig. 89.



Fig. 90.



Fig. 91.



So ist also z. B. Fig. 89 eine Verrenkung des Vorderarms — denn der Vorderarm ist weiter entfernt vom Schädel, als der Oberarm — und zwar nach Hinten, d. h. gegen die hintere Fläche des Oberarms. — Fig. 90 ist eine Verrenkung des Oberschenkels nach Hinten und Oben. — Fig. 91 stellt eine (sogenannte) Verrenkung des Körpers des Brustbeins nach Vorn und Oben, d. h. auf die vordere Fläche des Manubrium sterni dar.

Anatomische Veränderungen des verrenkten Gelenks.

1) Die knöchernen Gelenk-Enden erleiden sehr häufig mit der Verrenkung zugleich eine Continuitätstrennung. Solche complicierende Fracturen erfolgen durch Zerschmetterung oder durch Abreißen eines Knochenstücks und zwar vorzugsweise bei älteren Leuten, deren Knochen brüchig und deren Bänder fest sind. So bricht z. B. der Malleolus externus bei einer Verrenkung des Fusses nach Aussen durch Abreißen, bei einer Verrenkung nach Innen durch Zermalmung. In ähnlicher Weise entstehen Brüche der Tubercula des Humerus und des Gelenkranbes der Scapula bei Schulter-Verrenkungen.

Der durch die Verrenkung in neue Umgebungen versetzte Knochen geht mit diesen alsbald auch neue Verbindungen ein. Meist wurde er in seiner Bewegung erst durch einen anderen Knochen aufgehalten. Es treten somit zwei Knochen in Berührung, welche keineswegs hierzu bestimmt sind. Darauf beruhen die Veränderungen, welche bei veralteten Verrenkungen, sowohl der verrenkte Knochen selbst, als auch derjenige, mit welchem er abnormer Weise in Berührung getreten

ist, darbieten. Der Druck, welchen diese Knochen gegen einander ausüben, bedingt eine Entzündung beider, welche zur Resorption an der Stelle des Druckes und zur Knochen-Neubildung in der nächsten Umgebung führt. So kann unter der fortdauernden Wirkung des Muskelzuges der verrenkte Gelenkkopf in dem Knochen, gegen welchen er sich anstemmt, eine Vertiefung, gleichsam eine neue Gelenkhöhle erzeugen, während er selbst abgeflacht und in seinem ganzen Umfange verringert wird. Diese neue Gelenkhöhle entsteht aber nicht bloß auf Kosten des Knochens, welchem sie angehört; vielmehr liegt nur ein Theil ihrer Tiefe in der Dicke desselben, ein grosser Theil ihres Umfanges wird von Osteophyten gebildet, welche den Gelenkkopf mehr oder weniger vollständig umfassen. Die von dem verrenkten Gelenk-Ende verlassene ursprüngliche Gelenkhöhle oder Gelenkfläche wird nach und nach immer kleiner, weicht immer mehr von ihrer Form ab und verliert dadurch nach längerer Zeit gänzlich die Fähigkeit, den verrenkten Knochen wieder aufzunehmen.

Fig. 92.




Fig. 92. Hüftbein, an welchem eine Verrenkung des Oberschenkelkopfs nach Oben bestand. Die unterste Vertiefung ist die ehemalige Pfanne, welche bereits bedeutend abgeflacht ist; die mittlere Vertiefung nahm den grossen Trochanter, die oberste den verrenkten Schenkelkopf auf.

Es leuchtet ein, in wie hohem Grade sowohl die Befestigung des verschobenen Gelenk-Endes in einer neu gebildeten Gelenkhöhle, als auch die Verkleinerung und Ausfüllung der alten Gelenkhöhle die Einrenkung einer veralteten Luxation erschweren müssen.

2) Die Gelenknorpel werden bei der Entstehung von Verrenkungen durch die gewaltsame Reibung und Quetschung oft abgerissen. Zuweilen werden sie auch durch die nachfolgende Entzündung abgelöst oder zerstört. Sie werden selten vollständig, meist nur durch eine Art von Faserknorpel ersetzt. Wo sie ganz und dauernd verloren gegangen sind, verdichtet sich das blossgelegte und demnächst entzündete Knochengewebe (vgl. pag. 599).

3) Die Bänder. Das Kapselband zerreißt immer, sofern es nicht durch vorausgegangene Krankheiten eine Verlängerung oder Erschlaffung erlitten hat, — mit Ausnahme gewisser unvollständiger oder unter ganz eigenthümlichen Verhältnissen bestehender Verrenkungen. Der Kapselriss findet sich nicht immer auf derjenigen Seite des Ge-

lenkes, nach welcher die Verschiebung erfolgt ist. Gewöhnlich bleiben einzelne Bänder und erhebliche Theile des Kapselbandes unversehrt; diese üben dann einen beträchtlichen Einfluss auf die Richtung der Verschiebung, die Stellung des verrenkten Gliedes und die Befestigung des Gelenk-Endes an seinem neuen Aufenthaltsorte aus. Im Allgemeinen ist der Riss im Kapselbande hinreichend gross, um den verrenkten Knochen heraustreten zu lassen. Nichtsdestoweniger kann der Rücktritt des Gelenk-Endes durch denselben Riss schwierig und sogar unmöglich werden, wenn die Ränder desselben durch Blutergüsse und Exsudat verdickt, oder wenn sie in einer nicht entsprechenden Richtung gespannt sind. Auf dies letztere Verhältniss ist von therapeutischer Seite besonderes Gewicht zu legen. Die Hilfsbänder der Gelenke zerreißen viel seltener, als das Kapselband. Statt einfach zu zerreißen, nehmen sie bei ihrer Ablösung häufig ein Stück der oberflächlichen Knochenschicht mit sich fort.

4) Muskeln und Sehnen. Die das Gelenk umgebenden Muskeln werden zum Theil erschlafft, zum Theil gespannt, zum Theil zerrißen oder gequetscht. Die Zerreißung hat gewöhnlich ihren Sitz an der Uebergangsstelle zwischen Sehne und Muskel, zuweilen aber auch an der Insertion der Sehne. Manchmal erfolgt Muskel-Zerreißung in grosser Entfernung von der Verrenkung. Bonnet sah Zerreißung der Bauchmuskeln bei einer Verrenkung der Wirbelsäule nach Hinten. Zuweilen wird auch der verschobene Gelenkkopf zwischen zwei Sehnen oder Muskeln wie in einem Knopfloch eingeklemmt; je mehr diese Muskeln gespannt werden, desto beträchtlicher wird die Einklemmung des Gelenkkopfes. Bei längerer Dauer der Verrenkung werden sowohl die gespannten, als auch die erschlafften Muskeln in ihrem Gewebe krankhaft verändert. Das eigentliche Muskelgewebe schwindet unter vorwiegender Entwicklung von Fett- oder Bindegewebe. Auf diese Weise gehen die Muskeln ihrer Contractilität verlustig und verstärken fernerhin bloss die neuen bandartigen Verbindungen, welche den verrenkten Knochen umgeben. Bei ausgebreiteter Entzündung und besonders, wenn Continuitätstrennungen des Knochens bestehen, kann sich die Knochen-Neubildung bis auf die Muskeln und bis in sie hinein fortsetzen. Bei veralteten Luxationen können die pathologisch veränderten Muskeln und Sehnen der Reduction ein beträchtliches Hinderniss entgegensetzen und auch, wenn diese gelingt, als starre, nicht mehr contractile Stränge, die Brauchbarkeit des Gliedes beeinträchtigen.

5) Gefässe und Nerven. Ohne Zerreißung von Gefässen ist eine Verrenkung nicht möglich; daher Sugillationen an dem und

Blutergüsse in dem Gelenk. Selten werden grosse Gefässe verletzt, wenn solche auch in der nächsten Nachbarschaft des Gelenkes liegen. Die Beweglichkeit und Elasticität derselben gestattet beträchtliches Ausweichen und bedeutende Dehnung. Auch grössere Nervenstämme werden selten bei Verrenkungen zerrissen oder gezerzt. — Häufiger kommt es zu solchen Nebenverletzungen durch unvorsichtiges, allzu gewaltsames Ziehen bei der Einrenkung.

6) Die äussere Haut kann entweder im Augenblick der Verrenkung selbst (durch directe Einwirkung der äusseren Gewalt oder durch ein hervortretendes Gelenk-Ende) zerrissen oder später durch Ulceration durchbrochen werden. In dem einen, wie in dem anderen Falle tritt die Luxation durch Blosslegung des Gelenk-Endes in die Reihe der gefährlichsten Verletzungen. Eine Verrenkung mit Durchbohrung der Haut ist, wenn sie auch sonst noch so einfache Verhältnisse darböte, immer eine „complicirte“ im schlimmsten Sinne; denn ausser den, vielleicht an sich bedenklichen Zerreibungen der Weichtheile, kommt als ein besonderer Nachtheil noch der Eintritt der Luft in die Gelenkhöhle hinzu, durch welchen der Heilungsvorgang im höchsten Grade gestört wird. Vgl. „Complication der Verrenkungen“, pag. 682.

Heilungsvorgang. Sehr selten kehren die verrenkten Gelenk-Enden in Folge eines zufälligen oder doch nicht in dieser Absicht angebrachten Druckes oder Stosses in ihre normale Stellung zurück.

Nélaton sah eine Verrenkung des Unterkiefers zurückgehen, während er mit der Untersuchung derselben beschäftigt war. Malgaigne berichtet sogar von der spontanen Reposition einer 8 Tage alten Unterkiefer-Verrenkung, die vorher einem Repositions-Versuch widerstanden hatte. Nach Lafosse ging eine seit 6 Tagen bestehende Schenkel-Verrenkung zurück, als man den chloroformirten Kranken in die zur Reduction erforderliche Lage bringen wollte.

Selten gelingt auch die Reposition dem Kranken selbst. Meist handelt es sich dabei um recidivirende Verrenkungen, die eine schlaffe Kapsel oder einen weit klaffenden Kapselriss voraussetzen lassen. Schön Hippokrates erwähnt, dass „Manche leicht das Schultergelenk verrenken und den Oberarmkopf mit der anderen Hand wieder an seine Stelle schieben können.“

Wenn die Gelenk-Enden (in der grossen Mehrzahl der Fälle durch Kunsthülle) wieder in ihre normale Stellung gebracht sind, so erfolgt die Heilung in ähnlicher Weise wie nach Verstauchungen. Jedoch ist zur Wiederherstellung der Brauchbarkeit des Gelenkes bei Weitem mehr Zeit erforderlich, weil das Kapselband weit geöffnet ist, oft auch noch Sehnen und Muskeln gezerzt, gequetscht oder gleichfalls zerrissen, zuweilen selbst Knochenstückchen abgerissen oder

zermalmt sind. Diese Verletzungen heilen, wenn sie auch subcutan bestehen, doch immer erst in mehreren Wochen.

Bleiben die Gelenk-Enden in der fehlerhaften Stellung, welche sie durch die Verrenkung erhalten haben, so entwickelt sich um das beweglichere Gelenk-Ende ein sogenanntes neues Gelenk, eine Nearthrosis. Für diesen Vorgang sind zunächst die, pag. 669 beschriebenen Veränderungen der Knochen von grösster Bedeutung. Das „neue Gelenk“ wird aber in vielen Fällen auch durch Neubildung sowohl knorpeliger Ueberzüge (wenn auch nur mit der Structur der Faserknorpel) als auch einer Synovialkapsel vervollständigt, zu welcher letzteren in manchen Fällen Stücke der alten Synovialkapsel, welche mit dem Gelenk-Ende zugleich dislocirt wurden, die Grundlage abgeben mögen, während sie in anderen Fällen in Folge des von dem verschobenen Knochen auf das umgebende Bindegewebe, ausgeübten Druckes in derselben Weise entsteht, wie „accidentelle Schleimbeutel“ (vgl. Abschnitt IX.) unter gedrückten Hautstellen.

Symptome. Im Augenblick der Ausrenkung behaupten manche Kranke das Gefühl einer Zerreiſung an der Stelle des verrenkten Gelenkes gehabt, auch wohl ein Knacken gehört zu haben; alle beschreiben einen mehr oder weniger heftigen Schmerz, der besonders bei der Verrenkung von Charniergelenken sehr stark und bei directen Verrenkungen immer beträchtlicher ist, als bei indirecten.

Die objectiven Symptome beziehen sich, — abgesehen von der Möglichkeit, die dislocirten Gelenk-Enden direct zu fühlen¹⁾ oder gar zu sehen, — auf die Veränderungen der Form, der Länge, der Richtung und der Beweglichkeit des Gliedes.

1) Die veränderte Form der Gelenkgegend fällt sogleich in die Augen, wenn man sie mit dem entsprechenden gesunden Gelenke vergleicht. Das früher vernachlässigte Studium der normalen Verhältnisse am lebenden Menschen giebt in dieser Beziehung sehr bald eine Sicherheit, die auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Die Erforschung der Formverhältnisse eines Gelenkes bezieht sich aber keineswegs blos auf die Besichtigung desselben, sondern schliesst zugleich eine genaue manuelle Untersuchung ein. Man sieht Vorsprünge und Vertiefungen an Stellen fehlen, wo sie vorhanden sein sollten, und bemerkt sie an Stellen, wo sie nicht sein sollten. Genauer entdecken die Finger die einzelnen Knochenvorsprünge, welche das Gelenk umgeben, oder die dislocirten Gelenk-Enden selbst

¹⁾ Um sich direct zu überzeugen, ob der Gelenkkopf nicht in der Gelenkhöhle sich befindet und ob eine zweifelhafte Geschwulst wirklich der Gelenkkopf ist, kann in besonders schwierigen Fällen auch die Acupunctur benutzt werden.

in ihrer abnormen Stellung, die dann durch Messung ihrer relativen Entfernungen vollständig constatirt werden kann. Ist z. B. das Schultergelenk verrenkt, so erscheint die Schulter abgeflacht; man fühlt das hervorspringende Acromion und entdeckt unter demselben an der Stelle, an welcher das obere Ende des Humerus stehen sollte, eine Vertiefung, in deren Grunde die Gelenkfläche der Scapula gefühlt werden kann, der Gelenkkopf aber wird als eine harte Geschwulst in der Nähe (in der Achselhöhle) wahrgenommen. Diese Formveränderungen sind besonders bei ganz frischen und bei ganz veralteten Luxationen leicht zu erkennen. Einige Zeit nach der Ausrenkung entsteht durch den in und um die Gelenkhöhle erfolgenden Bluterguss, durch die schnell gesteigerte Absonderung von Synovia in der verletzten Gelenkkapsel, späterhin durch entzündliche Exsudation eine so beträchtliche Geschwulst, dass es für eine gewisse Zeit schwer, sogar unmöglich werden kann, die charakteristischen Veränderungen in der Tiefe durch die Geschwulst der Weichtheile hindurch zu fühlen.

Gewöhnlich betrifft die Difformität nicht blos das Gelenk selbst, sondern den ganzen Körpertheil, namentlich das ganze Glied. Dies beruht theils auf der veränderten Richtung des verrenkten Knochens, theils auf der unwillkürlichen Veränderung, welche der Kranke in seiner Haltung zur Erschlaffung der abnorm gespannten Theile vornimmt. Bei einer Verrenkung im Schultergelenk z. B. sinkt das ganze Schultergerüst herab, bei einer Luxation des Oberschenkels die entsprechende Beckenhälfte; zugleich wird aber im letzteren Falle die Wirbelsäule nach der Seite der Verrenkung gebeugt und somit die ganze Körperhaltung verändert.

2) Die Länge des Gliedes ist bald vermehrt, bald vermindert. Die verschiedene Neigung des zunächst am Stamme befindlichen Knochens und die veränderte Richtung des entfernteren erschweren zuweilen die Schätzung der Länge des verrenkten Gliedes.

Diese Umstände, sowie fehlerhafte Art der Messung veranlassen oft Irrthümer; nicht selten sieht ein Arzt da eine Verkürzung, wo der andere eine Verlängerung findet. Wir werden das bei der Messung einzuschlagende Verfahren bei den einzelnen Luxationen, sofern es sich nicht von selbst ergibt, genauer beschreiben.

3) Die Richtung des verrenkten Knochens muss nothwendig verändert sein; er steht immer mehr oder weniger schief; auch die Richtung und Lage der Muskeln erleidet Veränderungen.

So sieht man Fig. 89 (pag. 669) bei einer Verrenkung im Ellenbogengelenk den Triceps, welcher im normalen Zustande dem Oberarmbein parallel läuft, mit ihm einen Winkel bilden. — Fig. 90 zeigt bei einer Verrenkung des Os femoris die auffallend schiefe Stellung dieses Knochens.

4) Die Beweglichkeit des verrenkten Gelenkes kann, nament-

lich auf frischer That, vermehrt sein bei Verrenkungen, welche mit sehr ausgiebiger Zerreiſſung der Bänder oder Fractur der Gelenkränder complicirt ſind. In den meiſten Fällen aber iſt von Anfang an jede Bewegung in dem verletzten Gelenke dem Kranken nicht bloß erſchwert und ſchmerzhaft, ſondern durchaus unmöglich, indem die betreffenden Knochen durch die in abnormer Richtung wirkenden Muskeln und die unverſehrt gebliebenen, durch die Dislocation auf's Aeufferſte geſpannten Theile des Kapselbandes feſt gegen einander gepreſſt werden. — Passive Bewegungen ſind faſt immer in einiger Ausdehnung möglich, jedoch ſtets ſchmerzhaft.

Differentielle Diagnose. Verrenkungen können mit Quetſchung und Verſtauchung des Gelenkes, mit Knochenbrüchen in der Nähe des Gelenkes und mit Ablöſung der Epiphysen verwechſelt werden. In ganz friſchen Fällen ſind ſolche Verwechſelungen bei einiger Aufmerkſamkeit ſtets zu vermeiden. Wenn beträchtliche Geſchwulſt entſtanden iſt, wird die Unterſcheidung zuweilen ſchwierig. Jedoch führt eine genaue Unterſuchung auch hier zum Ziele. Bei Quetſchungen und Verſtauchungen ſind Länge und Richtung des Gliedes, ſowie auch die Stellung der Gelenkvorsprünge unverändert; die Geſchwulſt entwickelt ſich nicht ſo ſchnell, wie bei einer Verrenkung, und es iſt daher längere Zeit hindurch noch möglich, die Gelenkvorsprünge an ihrer normalen Stelle zu entdecken. Bei Knochenbrüchen in der Nähe von Gelenken findet ſich gleichfalls die normale Stellung der Gelenkvorsprünge gegen einander; die Länge der Extremität bleibt dieſelbe, man mag ihr dieſe oder jene Stellung geben, während man bei einer Verrenkung verſchiedene Maasſe erhält, je nachdem man die Extremität in dieſe oder jene Stellung bringt. Beſteht Verkürzung, ſo kann dieſelbe bei einer Fractur durch Extension vorübergehend ausgeglichen werden; ſie kehrt aber ſogleich zurück, wenn die Extension nachläßt. Bei einer Luxation kann die vorhandene Verkürzung nur durch einen ſolchen Eingriff beſeitigt werden, welcher zugleich die Einrenkung bewirkt, mit deren Gelingen dann die normale Länge und Richtung definitiv hergeſtellt iſt. Bei einem Bruche des Gelenk-Endes findet ſich die grösſte Difformität in der Nähe des Gelenkes, bei einer Luxation in der Gegend des Gelenkes ſelbſt. Kann man deutliche Crepitation wahrnehmen, ſo ſind damit in der Regel alle Zweifel beſeitigt. Jedoch iſt nicht zu vergeſſen, daß Fractur und Luxation neben einander beſtehen können und daß auch bei Verrenkungen durch Reibung des verrenkten Gelenkkopfes an der Oberfläche eines anderen Knochens, oder auch durch Verſchiebung einer dislocirten Sehne Crepitation entſtehen kann.

Dieselbe ist freilich von der den Fracturen eigenthümlichen Crepitation bei gehöriger Aufmerksamkeit zu unterscheiden; es ist nicht das raue, harte Reibegeräusch, sondern einem Knirschen ähnlich, wie es durch Reiben von Porcellanscherben oder durch Kneten von trockenem Stärkemehl entsteht. Diese Art der Crepitation findet sich bei der Ablösung einer Epiphyse allerdings auch; aber von einer solchen kann nur bei jugendlichen Individuen die Rede sein (vgl. pag. 371).

In manchen Fällen trägt der Bericht des Verletzten oder zufälliger Zeugen über den Vorgang der Verletzung zur Aufklärung bei.

Grosse Erleichterung für die Diagnose der Verrenkungen gewährt die Betäubung mittelst Chloroform, da durch dieselbe nicht bloß die Schmerzhaftigkeit der Untersuchung, sondern auch ein grosser Theil der Schwierigkeiten für den Arzt ganz wegfällt. Man wird zu diesem Hilfsmittel um so mehr greifen, als es zugleich die, stets möglichst bald einzuleitende Behandlung in jedem Fall erleichtert¹⁾.

Prognose. Verrenkungen sind im Allgemeinen nicht lebensgefährlich, können es aber durch ihre Complicationen werden. Wird die nöthige Kunsthülfe nicht geleistet, so ist späterhin die Brauchbarkeit des verrenkten Gelenkes in mehr oder weniger hohem Grade beeinträchtigt, je nachdem dasselbe zu ausgedehnten oder nur zu unbedeutenden Bewegungen bestimmt war. Ganz anders gestaltet sich die Prognose bei zweckmässiger Behandlung. Erfolgt diese frühzeitig, so kann bei einer nicht complicirten Verrenkung immer vollständige oder doch nahezu vollständige Wiederherstellung der Brauchbarkeit des Gelenkes, und somit der Extremität, erwartet werden. Bei veralteten Verrenkungen ist die Aussicht auf Wiederherstellung der Function durch Kunsthülfe um so geringer, je länger die Verrenkung bereits besteht. Vgl. „Behandlung“.

Die **Behandlung** der Verrenkungen besteht, abgesehen von Complicationen, in 1) der Einrenkung (Reductio), 2) der Erhal-

¹⁾ Wenn man auch mit Roser (l. c.) als das wesentliche Hinderniss der Einrenkung Enge und Lage des Kapselrisses und nicht Muskelspannung betrachtet, und die Schwierigkeit der Einrichtung allein darin sucht, dass es nicht gelingt, dem Gelenkkopf eine dem Kapselriss entsprechende Stellung zu geben; so muss man doch den practisch bewährten Nutzen der Chloroform-Betäubung auch von theoretischer Seite anerkennen. Denn daran, dass es nicht gelingt, dem Gelenkkopf in eine entsprechende Stellung zum Kapselriss zu bringen, ist eben die Spannung der Muskeln oft wesentlich schuld. — Die früher zum Behuf der Muskel-Erschlaffung angewandten, barbarischen „Ekelkuren“ (Brechweinstein in refracta dosi bis zur entsetzlichsten Wirkung nach Oben und Unten) und Aderlässe (an beiden Armen zugleich) sind mit Recht der Vergessenheit verfallen.

tung des Gelenkes in der ihm durch die Einrenkung wiedergegebenen normalen Stellung (Retentio) und 3) der Wiederherstellung seiner Beweglichkeit (durch passive, später auch active Bewegungen desselben).

Die Einrenkung muss, mit Ausnahme der Fälle, in denen bereits eine heftige Entzündung eingetreten (und noch nicht abgelaufen) ist, möglichst bald, nachdem man die Verrenkung erkannt hat, vorgenommen werden. Zu ihrem Gelingen ist erforderlich, dass der Gelenkkopf (d. h. das wesentlich verschobene Gelenk-Ende) in eine solche Stellung zu der Oeffnung in der Gelenkkapsel gebracht werde, dass er möglichst leicht durch dieselbe an seine normale Stelle, sei es durch den Zug der Muskeln, sei es durch den äusseren Druck zurückkehren kann. Dies wird im Allgemeinen am Leichtesten gelingen, wenn man den Gelenkkopf genau auf demselben Wege, auf welchem er die Gelenkkapsel verlassen hat, in dieselbe zurückführt. Oft aber ist dieser Weg (d. h. der Luxations-Mechanismus) im einzelnen Falle schwer zu erkennen, oft stellen sich auf demselben dem Gelenkkopf mehrfache Hindernisse entgegen (Reductions-Hindernisse). Zunächst ist die normale, oder durch Reizung, endlich durch Entzündung gesteigerte Zusammenziehung der Muskeln zu überwinden, demnächst bald dieser, bald jener Knochenvorsprung, über den der Gelenktheil durch die äussere Gewalt hinweggetrieben wurde und den er auf dem Rückwege desto schwieriger passirt, weil er jetzt nicht bloß durch den Luftdruck, wie früher gegen die ihm entsprechende Gelenkfläche, so nun gegen den abnormen Nachbar, sondern auch durch die gespannten Theile des Kapselbandes und die umgebenden Muskeln gegen ihn angepresst wird; überdies können auch noch eigenthümliche Einklemmungen und Hemmungen des Gelenkkopfes durch Interposition von Muskelbäuchen, Sehnen und Stücken des Kapselbandes stattfinden, und der Kapselriss, welcher für den Austritt des Gelenkkopfes hinreichend gross war, kann schwer wieder aufzufinden oder in Folge der Spannung zu eng sein, um den Rücktritt zu gestatten.

Je nach der Art des Reductions-Hindernisses bedarf es bald bloß milderer, bald gewaltsamerer Eingriffe, um die Reduction zu bewirken.

In die Reihe der ersteren (*méthodes de douceur*, Malgaigne) gehören: der directe Druck auf den verrenkten Knochenheil, mit welchem man in frischen Fällen oft ohne alle Gewalt zum Ziele gelangt, und die Rotations- und die Hebelbewegungen, welche freilich, unter dem Schein der Milde, oft die Entfaltung grosser Kraft gestatten.

Malgaigne unterscheidet von dem Druck und von den Hebelbewegungen noch besonders die Methode des Stosses (*impulsion*), und die Methode der Auslösung (*dégagement*), welche sich jedoch theils auf Druck, theils auf Hebelbewegungen reduciren lassen. — Eine genauere Beschreibung aller dieser Einrichtungs-Methoden kann zweckmässig erst bei den einzelnen Gelenken gegeben werden, da deren specielle Beschaffenheit wesentliche Abänderungen nothwendig macht.

Oft muss man diese milderer Eingriffe mit der Extension combiniren. Bevor man genauere Kenntnisse über die Entstehungsweise der einzelnen Verrenkungen hatte, war die Extensionsmethode die allgemein herrschende. Sie setzte, wie bei der Einrichtung der Knochenbrüche, die Contra-Extension voraus und wurde meist, wenn es gelungen war, den Gelenkkopf durch Ziehen an dem peripherischen Theile der Extremität in die Gegend des Kapselrisses zu bringen, durch directen Druck auf den Gelenkkopf vervollständigt. Somit bestand die Einrenkung, wie die Einrichtung der Knochenbrüche, aus 3 Acten: Extension, Contra-Extension und Coaptation. Freilich wurde dabei von allen einsichtigen Wundärzten bemerkt, dass sie manchmal durch „blosse Coaptation“ gelinge, d. h. durch directen Druck.

Die Extension wird mit den Händen, oder mit Hilfe von Maschinen ausgeübt. Oft reichen die Hände zum Behufe der Extension vollkommen aus, in manchen Fällen sind sie sogar das zweckmässigste Extensionsmittel. Sobald man eine grössere Gewalt anwenden, insbesondere mehrere Gehülfen zugleich ziehen lassen oder der Maschinen sich bedienen will, ist die Anwendung von Schlingen nothwendig, welche aus zusammengelegten Handtüchern, Tischtüchern u. dgl. hergestellt werden.

Man faltet die anzuwendenden Tücher in der Weise, dass sie dicke Binden (*Louguettes*) von 4 bis 6 Finger Breite und 1 bis 2 Meter Länge darstellen. Die Mitte einer solchen Binde wird um den Theil gelegt, an welchem die Extension ausgeübt werden soll; die Enden werden auf der entgegengesetzten Seite gekreuzt, der Achse des Gliedes parallel abwärts geführt und an der Stelle, an welcher die Mitte des Tuches das Glied umfasst, so wie ein Stück weiter abwärts durch eine in Cirkeltouren anzulegende Rollbinde genau befestigt. An den beiden Enden der Schlinge wird demnächst die Extension ausgeübt. — Man kann auch umgekehrt die Enden (Köpfe der *Louguettes*) befestigen und am Mittelstück ziehen. Dann legt man beide Köpfe der Achse des Gliedes parallel auf verschiedene Seiten desselben, umwickelt sie mit Cirkeltouren, schlägt die äussersten Enden um und umwickelt diese nochmals. — Bei Empfindlichen legt man auf die Haut zuerst mehrfache Touren einer Flanellbinde. Abgehärtete Haut erträgt auch einfache Umschnürung mit einem Tuche.

Die Frage, ob man möglichst nahe oder möglichst entfernt von dem verrenkten Gelenke die Extension ausüben müsse, hängt innig mit derjenigen zusammen, ob man die dem verrenkten zunächst gelegenen Gelenke beugen oder strecken solle. In der grossen Mehr-

zahl der Fälle ist die gebeugte Haltung vorzuziehen. Die hierauf bezüglichen Erörterungen sind aber nur unter Berücksichtigung der localen Verhältnisse verständlich, kommen auch nur bei Schulter- und Hüftgelenks-Verrenkungen in Betracht.

Die Contra-Extension wird möglichst nahe an dem verrenkten Gelenke und in solcher Weise ausgeübt, dass eine vollständige Fixation des betreffenden Gelenktheiles beabsichtigt wird. Schlingen, welche in der oben angegebenen Weise um das Glied oder um den Ruumpf geführt sind und entweder durch Gehülfen festgehalten oder an einem Pfosten, einem in der Mauer befestigten Ring u. dgl. ihren Halt finden, werden zu diesem Behufe angewandt.

Die Extension geschieht entweder in der Richtung der Achse des verrenkten Knochens, oder auch in entgegengesetzter Richtung. Sobald der Knochen durch den Zug beweglich geworden ist, sucht man ihn durch Druck und Zug in die Nähe des Kapselrisses zu bringen und seinen Eintritt in denselben zu bewirken. Dieser letzte Act erfolgt meist ohne besonderes Zuthun des Arztes, indem das am Kapselriss angelangte Gelenk-Ende durch die Zusammenziehung der umgebenden Muskeln plötzlich und mit einem „schnappenden Geräusch“ in seine normale Stellung zurückgeführt wird. Dies Geräusch, welches als charakteristisch für das Gelingen der Einrenkung betrachtet wird, fehlt aber nicht selten selbst bei frischen Verrenkungen, bei veralteten fast immer.

Nachdem die Einrenkung gelungen ist, besteht gewöhnlich zunächst keine Neigung zur Wiederverrenkung. Dennoch ist es nöthig, die Extremität für längere Zeit durch einen Verband zu befestigen, damit die zerrissenen Bänder und Muskeln, oft auch abgelöste Stücke des knöchernen Gelenkran des, in entsprechender Stellung wieder zusammenheilen. Vor der dritten Woche dürfen keine activen Bewegungen in dem verrenkten Gelenke gemacht werden, wenn man nicht etwa die vollkommene Ueberzeugung hat, dass das Kapselband unversehr geblieben war.

Auf die von Alters her immer wieder gestellte und in neuester Zeit besonders lebhaft discutierte Frage, bis zu welcher Zeit die Reduction einer Verrenkung noch möglich ist, lässt sich im Allgemeinen gar nicht antworten, da die in Rechnung zu ziehenden Verhältnisse nicht blos, je nach den verschiedenen Gelenken, sondern auch an jedem einzelnen Gelenke höchst mannigfaltig sind. — Oft gelingt es bei einer veralteten Luxation, den Gelenkkopf wieder flott zu machen; aber es stellt sich eine zweite Schwierigkeit entgegen: die Gelenkhöhle, in welche der Gelenkkopf zurückgebracht werden

soll, hat sich inzwischen ausgefüllt, oder doch in solchem Grade verengt, dass ein räumliches Missverhältniss zwischen beiden Theilen besteht. Allerdings geschieht dies nicht so schnell, wie man früher annahm; aber dies Hinderniss ist doch oft genug von grosser Bedeutung. Eine weitere Schwierigkeit bedingt die Verkürzung der Muskeln, welche im Zustande der Contractur selbst beträchtlicher Gewalt Widerstand leisten. Man hat sie subcutan durchschnitten, was aber die Brauchbarkeit des Gliedes gefährdet, da die durchschnittenen Muskeln nicht immer wieder brauchbar werden. Mehr ist, sofern die Muskeln nur noch nicht fibrös entartet sind, von der Chloroform-Narkose zu erwarten (vgl. Krankheiten der Muskeln). — Gefässe und Nerven sind oft in abnormer Weise festgeheftet; die Zerreißung dieser Befestigung kann gefährliche Folgen haben. — Das ganze verrenkte Glied wird gewöhnlich nach und nach atrophisch, insbesondere auch sein Skelet, welches einen hohen Grad von Brüchigkeit erreichen kann; deshalb sind denn auch, selbst unter den Händen geschickter Wundärzte, Knochenbrüche in Folge von Reductionsversuchen bei veralteten Luxationen beobachtet worden. — Mit Rücksicht auf diese Gefahren lehrte Asthley Cooper: „Bei einer Schulterverrenkung sind 3 Monate, bei einer Hüftverrenkung 2 Monate als der äusserste Termin zu betrachten, über welchen hinaus man niemals Einrenkungsversuche machen sollte, wenn es sich nicht etwa um sehr schlaife Subjecte handelt. Versucht man bei muskelkräftigen Individuen die Einrenkung noch nach längerer Zeit, so hat man zu befürchten, dass auch im Falle des Gelingens die Nachtheile, welche aus der gewaltsamen Reduction erwachsen, den durch das Gelingen der Einrenkung erzielten Vortheil bei Weitem überwiegen.“ — Die Hilfsmittel, welche uns heut zu Tage zu Gebote stehen, vermindern freilich viele der früher gefürchteten Gefahren und lassen sonst als unübersteiglich geschilderte Schwierigkeiten glücklich überwinden. Schmerzhaftigkeit und Muskelspannung werden durch Chloroform beseitigt, Adhäsionen, welche das verrenkte Gelenk-Ende mit seinen neuen Narbentheilen verbinden, werden durch oft wiederholte passive Bewegungen und Extensionen in der Chloroform-Narkose theils gelöst, theils in der Weise gedehnt, dass sie isolirte Stränge darstellen, die endlich ohne Gefahr subcutan durchschnitten werden können. Trotz aller dieser Fortschritte ist aber doch dem Anfänger zu rathen, dass er auf diesem Felde lieber zu wenig, als zu viel wagen und versprechen möge.

Das Verfahren bei der Reduction einer veralteten Verrenkung ist im Allgemeinen dasselbe, wie bei einer frischen, nur

mit entsprechender Steigerung der anzuwendenden Kraft. Zu diesem Behufe kann man entweder die Zahl der Gehülfen, welche zum Ziehen benutzt werden, vermehren, oder Maschinen anwenden. Unter letzteren hat namentlich das *Scammum Hippocratis*¹⁾ bis auf Paré und Heister Anwendung und Vervollkommnung gefunden; seit Desault wurden dann alle Einrenkungs-Maschinen verworfen und in Frankreich erst durch Sédillot²⁾ wieder eingeführt. Die Maschine, deren man sich jetzt in schwierigen Fällen, in welchen die Hände der Gehülfen nicht ausreichen — und solche Fälle sind seit Einführung des Chloroforms sehr selten geworden — gewöhnlich bedient, ist der Flaschenzug, an welchem man nach Sédillot

Fig. 93.



einen Dynamometer anbringen kann, um sicher zu sein, dass man nicht mit zu grosser Kraft wirke³⁾. Manche geben einer gewöhnlichen Winde mit Zahnrad und einspringender Stellfeder den Vorzug vor dem Flaschenzuge, weil die Wirkung gleichmässiger sei⁴⁾. Die Extension kann mittelst dieser Apparate viel leichter, als mittelst der Hände zu einem gefährlichen Grade gesteigert werden; es ist daher grosse Vorsicht bei ihrer Anwendung nothwendig. Ihr Vorzug besteht darin, dass die Extension in einem bestimmten Grade längere Zeit hindurch stetig fortgesetzt werden kann, was gerade bei veralteten Verrenkungen von Bedeutung ist.

¹⁾ Fig. 93 zeigt diese von Hippokrates (Ausg. v. Littré, T. IV. pag. 17) angegebene Maschine, durch welche Extension und Contraextension „gradweise und je nach Belieben“ gesteigert werden sollten. Das verrenkte Glied *D* ist auf einem Brette *A* befestigt; seine Richtung wird durch das Querholz *B*, welches zwischen den Strebepfeilern *CC* eingeklemmt ist, gesichert; bei *EE* wird durch Drehen an einer Kurbel die Extension ausgeführt.

²⁾ Annales de la Chirurgie. Tom. II. pag. 2 und 129.

³⁾ Vgl. Sédillot, Traité de méd. opératoire, Paris 1853.

⁴⁾ Mennel-Schneider'scher Apparat. Vgl. pag. 339.

In der Regel hat man die Reduction sowohl der frischen, als auch der veralteten Verrenkungen in einer Sitzung, oder doch in wenigen, kurz auf einander folgenden zu erreichen gesucht. Wenn dies unter Aufwendung einer möglichst grossen Gewalt nicht gelingen wollte, so wurde die Einrenkung für unmöglich erachtet. Gustav Simon¹⁾ hat zuerst die allmälige Reduction durch Monate hindurch wiederholte Extensionen, Bewegungen, subcutane Durchschneidung der deutlich fühlbaren und durch die wiederholten Tractionen immer aufs Neue wieder fühlbar gemachten Stränge, welche den Gelenkkopf festhielten, mit glücklichem Erfolge ausgeführt²⁾. Dies langsamere, ungefährliche, und voraussichtlich erfolgreichere Verfahren ist zu empfehlen, wenn eine veraltete Verrenkung den gewöhnlichen Reductionsversuchen nicht weichen will.

Wenn die Einrenkung einer veralteten Luxation durchaus nicht gelingt, so kann man oft, namentlich im Ellenbogengelenk, durch Resection eine bessere Beweglichkeit oder doch eine bessere Stellung und somit eine grössere Brauchbarkeit der Extremität erzielen. Vgl. Bd. IV. Abth. XXXV. Cap. II.

Complicationen der Verrenkungen.

1) Heftige Quetschung und Entzündung. Jede Verrenkung ist mit einem gewissen Grade von Quetschung, mit Bluterguss in die Kapsel und in die Umgegend des verrenkten Gelenk-Endes verbunden; auf jede folgt ein gewisser Grad von Entzündung. Bestehen aber die höheren Grade der Quetschung, so folgt eine sich schnell ausbreitende Eiterung, welche leicht zum Tode führen kann. Solche Verletzungen beobachtet man fast ausschliesslich in Folge directer Gewalt. Der ganze Umfang des Gelenkes stellt dann eine harte, heisse, sehr schmerzhaftes Geschwulst dar, die umliegenden Muskeln sind krampfhaft verkürzt, jede Bewegung wird äusserst schmerzhaft oder gar unmöglich. Ist in einem solchen Falle die Reduction auf frischer That versäumt worden, oder nicht gelungen, so muss man zunächst durch energische Anwendung der Kälte die Entzündung mässigen. Erfolgt aber die Einrenkung bald nach der Verletzung, bevor noch Entzündungs-Erscheinungen aufgetreten sind, so ist der Verlauf immer ein viel günstigerer, mag auch eine sehr heftige Quetschung stattgefunden haben.

¹⁾ Prager Vierteljahrsschrift, 1852, Bd. III.

²⁾ Bei angeborenen Luxationen hat man dies Verfahren schon längst als das einzig mögliche erkannt.

2) Brand. Die das Gelenk zunächst umgebenden Weichtheile werden durch die dislocirten Knochen zuweilen nicht bloß zerrissen, sondern zernahmt, direct mortificirt. In anderen Fällen werden die Weichtheile indirect oder secundär mortificirt in Folge der traumatischen Entzündung; dann tritt der Brand erst mehrere Tage nach der Verletzung auf. War bald nach der Verletzung die Einrenkung erfolgt, und beschränkt sich der Brand auf die oberflächlichen Theile, bleibt namentlich die Gelenkkapsel unversehrt, so kann bei sorgfältiger Behandlung das Glied noch erhalten werden. Erstreckt sich aber der Brand bis in die Gelenkhöhle, so ist die Resection nur in solchen Fällen ausführbar, wo die Zerstörung der das Gelenk umgebenden Weichtheile auf einen geringen Umfang beschränkt ist, im Uebrigen ist man auf die Amputation angewiesen, welche aber alsdann meist unter so ungünstigen Umständen ausgeführt werden muss, dass auch auf sie keine grosse Hoffnung gebaut werden darf.

3) Knochenbrüche. Die häufig bei Verrenkungen vorkommenden Ablösungen einzelner Theile des Gelenkrandes verhalten sich ganz ähnlich, wie Zerreibungen der Bänder; das Band hat Widerstand geleistet und der Knochenvorsprung, an welchem es befestigt war, ist abgebrochen, eigentlich abgerissen. Solche Fracturen sind, obgleich sie die Entzündung stets steigern und den Heilungsprocess stören, keine bedenklichen Complicationen. Man könnte sogar denken, die Verletzung werde dadurch eine weniger bedenkliche, indem die einfache Fractur eine schnellere und zuverlässigere Heilung erwarten lasse, als die Zerreibung der Bänder. Aber die localen Verhältnisse sind einer vollständigen Heilung solcher Fracturen nicht günstig, namentlich lässt sich für genaue Aneinanderfügung derselben nichts thun. Das Nichtanheilen solcher abgebrochenen Stücke des Gelenkrandes begünstigt in hohem Grade das Recidiv der Verrenkung¹⁾.

Ganz anders verhält es sich, wenn ein in der Nähe des Gelenkes bestehender oder gar in dasselbe eindringender Bruch durch die ganze Dicke des Knochens geht. Ein solcher Fall lässt immer eine ausserordentliche Gewalt voraussetzen, welche zuerst die Luxation und dann auch noch die Fractur erzeugt haben muss. Ausgedehnte und bedeutende Quetschungen werden dann nie fehlen. — Durch unzweckmässige Reductionsversuche kann eine Verrenkung nachträglich mit Fractur complicirt werden. — Manche Fracturen erleichtern die Reduction, z. B. Bruch des Pfannenrandes bei Verrenkungen des Oberschenkels. Dagegen wird die Retention in solchen Fällen höchst schwierig.

¹⁾ Vgl. Streubel, Deutsche Klinik, 1852, No. 11.

Die Behandlung besteht, wenn blos ein Theil des Gelenkran- des oder ein benachbarter Fortsatz abgebrochen ist, nur in seiner sorg- fältigeren Retention. Geht aber der Bruch durch die ganze Dicke eines Gelenk-Endes, so wird er zu einem mächtigen Hinderniss für die Reduction. Je nachdem die Fractur oberhalb oder unterhalb des verrenkten Gelenkes liegt, ist entweder die Contra-Extension oder die Extension in Bezug auf die Verrenkung ausführbar. Lässt sich das verrenkte Bruchstück fassen, so muss man durch directen Druck dasselbe in die Gelenkhöhle zurück zu schieben suchen, wie dies z. B. Richet¹⁾ und Watson²⁾ bei Verrenkungen im Schultergelenk mit Fractur des chirurgischen Halses des Oberarmbeins gelungen ist. Andern Falls hat man bisher zuerst die Fractur unter geeigneter Behandlung heilen lassen und dann die Reduction der inzwischen allerdings veralteten Verrenkung versucht. Kann man mittelst des Gypsverbandes, wenn auch nur provisorisch, das abgebrochene Gelenk- Ende mit dem Schaft des Knochens in Verbindung setzen, so gelingt es vielleicht auf diese Weise einen Hebelarm zu gewinnen, durch dessen Benutzung die Einrenkung sofort bewerkstelligt werden könnte. Jeden- falls bedarf es eines Gypsverbandes zur Retention, wenn die Reduction gelungen ist.

4) Zerreibungen der grossen Gefässe und Nerven sind eine sehr üble, wenn auch sehr seltene Complication. Sie können bei der Verrenkung selbst oder durch rohe Reductionsversuche bewirkt werden³⁾. — Besteht mit einer Gefässverletzung zugleich eine äussere Wunde, so hat man sofort in der Wunde selbst die Unter- bindung und demnächst die Einrenkung auszuführen. Kann man das blutende Gefäss in der offenen Wunde, wegen der bereits bestehenden Geschwulst nicht finden, oder ist die Haut unversehrt geblieben, so muss man zu der indirecten Unterbindung seine Zuflucht nehmen. In Betreff consecutiver Aneurysmen vgl. pag. 75 u. f. — Zer- reibungen grosser Nervenstämmen sind noch viel seltener, als Zerreibungen von Blutgefässen; jedoch hat man nach sehr gewalt- samen Extensionsversuchen sogar Zerreibung der Nervenwurzeln nahe am Rückenmark beobachtet.

5) Penetrierende Gelenkwunden. Die Verletzung wird aus einer subcutanen durch diese Complication zu einer der Luft expo-

¹⁾ Vgl. Union méd. 1852. No. 124; Canstatt's Jahresber. für 1852, Bd. IV. p. 67.

²⁾ The American Journal of the medical sciences, 1855, Oct.

³⁾ A. Guérin hat noch in neuester Zeit an einem Arme, welcher freilich „ganz degenerirt“ gewesen sein soll, ein abschreckendes Beispiel von totaler Abreissung im Ellenbogengelenk geliefert. Vgl. Berl. klin. Wochenschr., 1864, No. 20.

nirten. A. Cooper und nach ihm die meisten Englischen, jetzt auch viele deutsche Aerzte verstehen unter „complicirten Verrenkungen“ schlechtweg solche, bei denen das verrenkte Gelenk-Ende blossliegt. Wie bei complicirten Knochenbrüchen, so kann auch hier die Verletzung der Weichtheile durch eine direct einwirkende äussere Gewalt oder durch den mit bedeutender Kraft dislocirten Gelenktheil herbeigeführt werden. Jedenfalls verschlechtert eine solche Complication die Prognose in sehr hohem Grade.

Die Behandlung muss auf frischer That in der möglichst schnellen Reduction, dem Verschluss der Wunde, Fixation und streng antiseptischem Verbandsbestehen; weiterhin kommt die Prophylaxis gegen Gelenk-Entzündung wie bei Gelenkwunden zur Geltung. Um die Reduction möglich zu machen, kann die Erweiterung der Wunde mit dem Messer erforderlich werden; wenn diese aber wegen localer Verhältnisse bedenklich erscheint, ferner wenn das herausstehende Knochenstück zu gross ist, oder wenn dasselbe schon längere Zeit der Luft ausgesetzt war, so ist die Resection des blossliegenden Gelenk-Endes indicirt.

Schinzinger (Die complicirten Luxationen. Jahr 1858) empfiehlt die Reposition nur in ganz frischen Fällen zu versuchen, wenn nur einige Linien des Gelenk-Endes hervorstehen, dieses sich ohne Quetschung und Zerrung der Weichtheile leicht zurückführen lässt, und wenn von Seiten des Verletzten keine zu grosse Reaction zu befürchten ist. Auch auf die Qualität des betroffenen Gelenkes selbst soll man Rücksicht nehmen: denn gerade bei kleineren Gelenken (wie die der Finger und Zehen) haben die complicirten Luxationen am Häufigsten Tetanus zur Folge.

Noch viel übler ist die Prognose, wenn zugleich mit der Blosslegung oder dem Heraustreten des Gelenkkopfes noch anderweitige Complicationen bestehen: Knochenbrüche, Zermalmung der Weichtheile, Zerreiassung der Gefässe u. s. w. Da treten ausser dem Einflusse der Luft auch noch die Bruchstücke und die zermalmten Gewebe als Ursachen einer verderblichen Entzündung auf, neben welcher die Gefässzerreiassungen noch weit ausgebreiteten Brand herbeiführen. In solchen Fällen steht zu erwarten, dass der Kranke durch Verjauchung und Pyämie zu Grunde gehen, oder im günstigeren und viel selteneren Falle doch nur ein unbrauchbares Glied davon tragen werde. Daher ist die Amputation sogleich vorzunehmen.

2. Angeborene Verrenkung. *Luxatio congenita.*

Fast an allen Gelenken sind angeborene Verrenkungen beobachtet worden, am Häufigsten im Hüftgelenk. Schon Hippokrates kannte sie und wusste sie von den „spontanen“ zu unterscheiden. Paré erwähnt ihrer, und Verduc spricht sich über die zu ihrer Heilung

unternommenen Reductionsversuche dahin aus, dass durch solche nur die Unwissenheit des Wundarztes, der sie unternähme, bewiesen werde. In unserem Jahrhundert ist die Literatur der „angeborenen Verrenkungen“ eine überaus reichhaltige¹⁾.

Die **Aetiologie** dieser Luxationen führt uns in vielen Beziehungen auf die Aetiologie der Missbildungen überhaupt zurück. Vielleicht können in manchen Fällen Gewaltthätigkeiten, welche den Fötus während der Geburt oder im Uterus selbst betroffen haben, oder auch die Lage desselben im Uterus als Ursache angesehen werden. Jedoch lassen sich aus der Annahme solcher absolut oder relativ äusseren Schädlichkeiten immer nur einzelne Verrenkungen an den Extremitäten erklären. Für die Mehrzahl der Fälle sind äussere Einwirkungen nur im Stande, die bereits bestehende, unvollständige Verrenkung zu vervollständigen. Die meisten angeborenen Luxationen sind nämlich, wie J. Guérin nachgewiesen hat, bei der Geburt noch unvollständig und werden erst nach und nach bis gegen das vierte Jahr hin vollständig. Die schon zur Zeit der Geburt bestehenden Verschiebungen sollen, nach Guérin, auf Muskelverkürzungen beruhen, welche ihrer Seits von Erkrankung oder mangelhafter Ausbildung der Nervencentra abhängig sind. Fehlt das untere Stück des Rückenmarkes, so findet man Verrenkungen an den unteren Extremitäten; bei Abwesenheit des oberen an den oberen; fehlt die eine seitliche Hälfte des Gehirns, so findet man ihr entsprechend auf der einen Seite des Körpers die Verrenkung. Aber oft kann man bei der anatomischen Untersuchung eines mit Verrenkungen behafteten Fötus keine Spur von Muskelverkürzung entdecken. Zuweilen wurde grosse Erschlaffung der Bänder, übermässige Anfüllung der Kapsel mit Synovia, mangelhafte Entwicklung des Gelenkkopfes oder der Gelenkhöhle als prädisponirendes Moment nachgewiesen. — Gegen die Annahme mechanischer Veranlassungen spricht, abgesehen von der Seltenheit traumatischer Verrenkungen bei Kindern (vgl. pag. 665), der Umstand, dass in der grossen Mehrzahl der Fälle mehrere Verrenkungen (z. B. in beiden Hüftgelenken) zugleich bestehen, und dass dieselben sehr viel häufiger bei Kindern vorkommen, welche auch anderweitige, oft die Lebensfähigkeit beeinträchtigende

¹⁾ Vgl. Palotta, *Exercitationes pathologicae* (Mediolani, 1820), Cruveilhier, *Traité d'anatomie pathologique générale* (Paris 1849, Tom. I.), J. Guérin, *Recherches sur les luxations congénitales* (Paris 1841) und *Gazette médicale* 1841, No. 7 u. 10, Heine d. Ä., *Ueber congenitale und spontane Luxationen* (Stuttgart 1842), Stromeyer, *Ueber Atonie der fibrösen Gebilde* (Würzburg 1840), v. Ammon, *Die angeborenen chirurgischen Krankheiten des Menschen* (Berlin 1842), Smith, *On fractures and dislocations in the vicinity of joints* (Dublin 1842).

Missbildungen an sich tragen, als bei übrigens wohlgebildeten, endlich auch in vielen Fällen ihre Erbllichkeit nachgewiesen ist. Wahrscheinlich handelt es sich bei den congenitalen Verrenkungen nicht um eine Verschiebung, wie sie bei den traumatischen Verrenkungen vorkommt, sondern um eine ursprüngliche Missbildung. Gelenkhöhle, Kapsel und Gelenkkopf sind mehr oder weniger deform entwickelt, oder rücken wenigstens nicht zu einander. Oft hat der Gelenkkopf die Gelenkhöhle nicht verlassen, sondern er hat sich überhaupt niemals in ihr befunden. In anderen Fällen ist er durch ein zu schlaffes oder ein zu weites Kapselband so unvollständig befestigt, dass der erste kräftige Muskelzug oder (an den unteren Extremitäten) der Druck des Körperwichts die schon vorbereitete Verrenkung zu Stande bringt.

Diese Auffassung steht mit den Thatsachen, namentlich auch mit den von J. Guérin zur Stütze seiner Ansicht angeführten, in vollständigem Einklänge. Die Begründung dieser Lehren verdanken wir hauptsächlich v. Ammon.

Die **anatomische Untersuchung** des kranken Gelenkes liefert ein sehr verschiedenes Resultat, je nachdem man dasselbe gleich nach der Geburt, oder nach einigen Jahren, oder endlich gar nach vollendetem Wachsthum untersucht. Je länger nach der Geburt, desto mehr stimmen alle Verhältnisse mit den bei einer veralteten traumatischen Luxation beobachteten überein, so dass es, besonders wenn nur eine Verrenkung besteht, schwierig sein kann, zu entscheiden, ob man eine „angeborene“ oder eine „veraltete traumatische“ Luxation vor sich hat. — Anfangs ist der Zustand des verrenkten Gelenkes sehr wenig von dem normalen verschieden. Das Kapselband und die Bänder überhaupt sind schlaffer. Das Gelenk ist daher beweglicher, und die Gelenkflächen der Knochen berühren sich nicht so genau, wie im normalen Zustande; man kann sie weiter von einander entfernen, oder auch leicht in die normale Stellung zurückführen. Die das Gelenk umgebenden Muskeln befinden sich oft (nach J. Guérin, constant) im Zustande der Contractur. Mit weiter fortschreitendem Alter entfernen sich die Gelenk-Enden immer mehr von einander, die Gelenkenden werden, der veränderten Lage der Knochen entsprechend, verlängert; niemals aber findet Zerreißung des Kapselbandes Statt. Am genauesten kennt man die weiteren Veränderungen am Hüftgelenk. Hier wird das Kapselband zu einem weiten Schlauche ausgedehnt, welcher Anfangs dem Gelenkkopfe das Zurücktreten in die Pfanne gestattet, später aber sich in der Mitte (einer Sanduhr ähnlich) verengt und endlich an dieser Stelle obliterirt. So ist denn der Gelenkkopf von der Pfanne gänzlich abgesperrt und in seiner normalen Stellung fixirt. Zwischen ihm und dem benachbarten

Knochen (Hüftbein) wird die Gelenkkapsel fortdauernd comprimirt, bis sie endlich unter diesem Drucke ganz schwindet und die, ihren Substanzverlust umgrenzenden Ränder mit dem inzwischen durch den Druck entzündeten Knochen verwachsen. Die solcher Gestalt mit einander in Berührung gesetzten Knochen erleiden nun dieselben Veränderungen, wie bei veralteten Verrenkungen (pag. 669 u. f.). Zunächst verliert der Gelenkkopf seine regelmässige Gestalt, wird abgeflacht, bekommt Eindrücke u. dgl. m. Viel später, und immer erst, wenn unter dem Einflusse des Druckes die dem Hüftbein zugekehrte Wand der Kapsel geschwunden ist, bildet sich an dem, jetzt mit dem Gelenkkopf in Contiguität tretenden Knochen eine gewöhnlich unregelmässige, von stalaktitenförmigen Osteophyten umgebene Gelenkhöhle (vgl. Bd. I. pag. 768). Die alte, jetzt leere Gelenkhöhle wird, nachdem ihr Knorpelüberzug resorbirt ist, verhältnissmässig schnell durch Narbensubstanz ausgefüllt; selten entspricht ihre Form irgendwie derjenigen des Gelenkkopfes, den sie aufnehmen sollte, woraus eins der wesentlichsten Reductionshindernisse entspringt. — Die Knochen und Muskeln des verrenkten Gliedes werden atrophisch, wie bei jeder sehr veralteten Verrenkung.

Die Richtung der Verschiebung wird, nach J. Guérin, ausschliesslich durch die Wirkung derjenigen Muskelgruppe bestimmt, welche von Contractur befallen ist. Dies „Gesetz“ erleidet aber viele Ausnahmen, da nach Guérin's eigener Angabe, die angeborenen Verrenkungen bei der Geburt immer incomplet sein und erst nach und nach zu completen werden sollen. Es können mithin auch äussere Einflüsse und willkürliche Bewegungen auf die Richtung der Verschiebung noch nach der Geburt einwirken.

Die **Prognose** einer angeborenen Luxation ist im Allgemeinen diejenige der sehr veralteten. Die Aussicht auf Heilung aber ist noch viel geringer, weil Knochen und Muskeln atrophisch sind, weil Gelenkkopf und Pfanne nicht mehr zu einander passen und weil endlich der kindliche Organismus die zur Reduction erforderlichen Eingriffe weniger leicht erträgt. Ist die alte Gelenkhöhle obliterirt und die Kapsel an einem anderen Knochen befestigt, so hört die Möglichkeit der Reduction ganz auf. Der Termin dieser Veränderungen soll, nach J. Guérin, für das Hüftgelenk, zwischen dem 10ten und 14ten Lebensjahre liegen; in der Mehrzahl der Fälle vollziehen sich dieselben aber wohl viel früher.

Behandlung. Die allmälige Reduction, welche man in neuester Zeit auch auf die veralteten Verrenkungen mit Vortheil angewandt hat, kann bei angeborenen allein etwas leisten. Nachdem etwa noch

erweichende Bäder und Einreibungen vorausgeschickt sind, beginnt man die Extension, welche in Bezug auf ihre Kraft und ihre Dauer bei jeder Wiederholung zu steigern ist. Um sie andauernd und stetig auszuführen, bedient man sich des Flaschenzuges. Widerstand leistende Muskeln oder Bänder werden subcutan durchschnitten. Ist der Gelenkkopf endlich an seine normale Stelle gebracht, so sind noch längere Zeit permanente Extension und passive Bewegungen erforderlich, um denselben sicher und möglichst tief in die entsprechende Gelenkhöhle hineinzudrängen. — Lässt sich die Reduction gar nicht mehr vollständig ausführen (was, nach meiner Ueberzeugung, als die Regel betrachtet werden muss), so sucht man den Gelenkkopf wenigstens an einer möglichst günstigen Stelle zu fixiren und an dieser die Bildung einer neuen Gelenkhöhle zu bewirken. Zu diesem Behuf sind, je nach der Localität, verschiedene Bandagen und Apparate erforderlich. J. Guérin empfiehlt ausserdem tiefe subcutane Scarificationen bis in's Periost des Knochens, um dadurch die Bildung von Osteophyten zu veranlassen, die den Gelenkkopf umfassen sollen. — In der Mehrzahl der Fälle lässt sich auch durch die sorgfältigste und ausdauerndste Behandlung nur wenig erreichen.

Wir werden auf die einzelnen angeborenen Verrenkungen, unserer Ansicht von dem Wesen dieses Uebels entsprechend, bei den Difformitäten der einzelnen Gelenke im IV. Bande näher eingehen.

B. Von den Verrenkungen der einzelnen Gelenke im Besonderen.

a) Verrenkungen am Kopfe¹⁾.

1. Verrenkungen des Unterkiefers. *Luxationes mandibulae.*

Aetiologie und Mechanismus. Verrenkungen der beiden *Processus condyloidei* des Unterkiefers entstehen fast ausschliesslich durch Muskelzug (durch übermässiges Abwärtsziehen des Kinns), und zwar stets in der Richtung nach Vorn. Eine Verrenkung nach Hinten wäre nur möglich, wenn das Kinn sehr stark gehoben würde, was unausführbar ist, weil die untere Zahnreihe gegen die obere anstösst. Sollte eine seitliche Verrenkung zu Stande kommen, so müsste der eine Gelenkkopf (*Processus condyloideus*) in demselben Grade nach Innen verschoben werden, als der andere nach Aussen;

¹⁾ Ueber Trennungen (Diastasen) der Nähte vgl. Schädel-Verletzungen Bd. III. Bardeleben, Chirurgie. 7. Aufl. II.

schrägen Richtung der vorderen Fläche des Tuberculum articulare durch die Spannung der Kaumuskeln unmöglich gemacht.

Die Befestigung des Unterkiefers in seiner abnormen Stellung kann, nach Malgaigne und Nélaton, auch noch in der Weise erfolgen, dass die Spitze des Processus coronoideus, sobald das Kinn abwärts gezogen und der Gelenkkopf vor das Tuberculum getreten ist, sich gegen den unteren Rand des Os zygomaticum nahe der dasselbe mit dem Processus zygomaticus maxillae verbindenden Naht anstemmt, zumal an dieser Stelle sich gewöhnlich eine kleine Grube findet, in welche die Spitze des Processus coronoideus eingreifen kann. — Maisonneuve widerspricht diesen Angaben auf Grund von Versuchen an Leichen, bei denen er die Proc. coronoideus und die Arcus zygomaticus absägte. (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 1862, Tom. 55, pag. 654.) Damit stimmt auch ein Sectionsbefund von Demarquay (Bull. de therap. 1863, Mai). In dem von ihm untersuchten Falle hatte sich der Meniscus zwischen Condylus und Tuberculum articulare eingeklemmt. — Jedenfalls ist die Feststellung des Proc. coronoideus nicht die Regel. — Vgl. Mathieu, Recherches expérimentales et critiques sur les luxations de la mâchoire inférieure. Arch. gén. de méd. 1869, Août.

Die Muskeln, welche bei der Erzeugung der Verrenkung wirken, sind vorzugsweise die Herabzieher des Kinns, also der Mylohyoideus, Geniohyoideus, Digastricus, welche sämtlich nur wirken können, sofern das Zungenbein nach Unten fixiert ist. Sobald die relative Lage des Masseter und des Pterygoideus internus zum Ramus mandibulae durch die Wendung der Processus condyloidei nach Vorn geändert ist, können die hinteren Fasern dieser Muskeln die Vollendung der Verrenkung begünstigen, indem sie das obere Ende des Astes hebelnd weiter nach Vorn drängen. Der Pterygoideus externus kann überdies den Processus condyloideus etwas nach Vorn ziehen.

Seltener erfolgt die Verrenkung in der Art, dass bei einem Falle oder durch einen Schlag das Kinn stark abwärts getrieben und in dieser Stellung fixiert wird, während die Kaumuskeln durch eine krampfartige Zusammenziehung den Winkel des Knochens erheben und somit den Processus condyloideus nach Vorn drängen.

Die Verrenkung beider Processus condyloidei durch blossen Muskelzug ist immer eine einfache, — meist eine incomplete; sie scheint in der Regel ohne Zerreißen irgend eines Bandes, insbesondere ohne Zerreißen der Kapsel, welche sehr schlaff und dehnbar ist, zu erfolgen. Das einzige feste Band ist das Ligamentum laterale externum. Dasselbe verläuft aber schräg von Oben und Vorn nach Hinten und Unten, so dass es bei der Verschiebung des Processus condyloideus nach Vorn demselben ohne bedeutende Zerrung folgen kann. Die Verrenkung erfolgt in der Art, dass die Condylen sich unter den Bandscheiben (Menisci), ohne diese mitzunehmen, verschieben und am vorderen Rande der letzteren feststellen, so dass grade durch deren Interposition das Zurückgehen gehindert wird. —

(gewöhnlich) entsteht diese Verrenkung während des Gähnens oder Artrezeptions (bei Cholera-Anfällen, Vokal), seltener beim Einbeissen in einen grossen Apfel oder ein ähnliches Stück Brod. Sie recidivirt sehr leicht. Die Erschlaffung der Muskeln ist oft so gross, dass der Unterkiefer bei jedem Gähnen wieder verrenkt wird.

Die Verrenkung eines der *Processus condyloidei* allein ist seltener, weniger einfach und schwieriger zu reduciren. Ihre Entstehung setzt gleichfalls ein beträchtliches Abwärtsziehen des Kinnes voraus. Nach Boyer entsteht sie in folgender Weise. Der eine *Processus condyloideus* erfährt in der *Cavitas glenoides* und unter dem *Tuberculum articulare* eine Drehung, durch welche sein innerer Rand nach Vorn gewendet wird, während der *Processus condyloideus* der anderen Seite vor das *Tuberculum articulare* tritt und sich zugleich etwas nach hinten wendet. Auf diese Weise entfernt sich der verrenkte *Processus condyloideus* beträchtlicher, als bei der Doppelverrenkung, von der Ursprungsstelle des *Ligamentum laterale externum*, welches daher stark gezerrt (oder zerrissen) wird.

Symptome: a) der beiderseitigen Verrenkung. Der Kranke ist genöthigt, den Mund offen zu halten, wodurch seine Gesichtszüge sehr eigenthümlich entstellt werden. Der Speichel läuft ihm aus dem Munde, da er, wegen der Spannung der *Fascia buccopharyngea* und des *M. mylopharyngeus*, nur unvollkommene Schlingbewegungen machen kann; er ist ausser Stande zu kauen, oder deutlich zu sprechen, insbesondere vermag er Lippenbuchstaben nicht auszusprechen. Die Entferrung zwischen den beiden Zahnreihen ist mehr oder weniger vergrössert, oft sehr bedeutend, oft so wenig, dass man kaum den Daunen zwischen sie bringen kann (A. Paré). Die Zähne können einander aber weder genähert, noch auch weiter von einander entfernt werden. Die untere Zahnreihe ist weiter nach Vorn gerückt, so dass die Schneidezähne des Unterkiefers, wenn der Mund geschlossen werden könnte, vor diejenigen des Oberkiefers stehen würden. Vor dem Gehörgange, da, wo man im normalen Zustande die äussere Seite des *Processus condyloideus* fühlen kann, findet man eine Vertiefung. Die Wangen und Schläfen sind, wegen der Zerrung des *Masseter* und *Temporalis*, abgeflacht. Der *Processus coronoideus* bildet beiderseits unter dem Jochbogen einen Vorsprung, den man — durch die Wange hindurch, oder noch besser, mittelst des in den Mund eingeführten Fingers, — weiter nach Vorn als gewöhnlich fühlen kann.

b) Besteht die Verrenkung nur auf einer Seite, so ist das Kinn nach der entgegengesetzten Seite, jedoch nicht immer auf-

fallend verschoben. Die Zähne stehen in derselben Richtung falsch; die Kranken sind beim Sprechen gehindert, vermögen aber doch noch zu articuliren. Der Processus coronoideus der verrenkten Seite wölbt die Wange auffallend hervor. Das wichtigste Symptom ist die Grube vor dem Ohr, an der Stelle, wo der Condylus des Unterkiefers stehen sollte. — Bei ungenauer Untersuchung kann die einseitige Verrenkung mit Lähmung des Facialis (daher auch mit Apoplexie) oder mit krampfhafter Muskelverkürzung der entgegengesetzten Seite verwechselt werden.

Prognose. Der Zustand des Kranken wird bei der beiderseitigen Verrenkung, wenn auch keine Einrenkung erfolgt, doch nach und nach erträglicher, indem die Gelenkköpfe auch in der abnormen Stellung einige Beweglichkeit erlangen, freilich niemals in solchem Grade, dass die Zahnreihen sich wieder berühren und der Kranke mithin wieder kauen könnte; aber der Mund kann doch durch die Berührung der Lippen geschlossen werden, der Ausfluss des Speichels hört auf und die Schlingbewegungen gehen wieder von Statten. Letztere sind jedoch durch die Zerrung des am Unterkiefer befestigten Theiles des Schlundkopfes meist dauernd behindert; in der Mehrzahl der Fälle vermag der Patient nur Flüssigkeiten zu schlucken und muss auch zu diesem Behufe den Kopf hintenüber beugen.

Wird die Einrenkung bei einseitiger Luxation des Unterkiefers unterlassen, so pflegt eine Verbesserung des Zustandes nur höchst selten einzutreten.

Ravaton erzählt von einem Soldaten, welcher zwei Jahre nach der Verrenkung eines Processus condyloideus, welche nicht eingerenkt werden konnte, dennoch, obgleich mit einiger Schwierigkeit, kauen und sprechen konnte.

Behandlung. Zum Behufe der Einrenkung hat man 1) die Condylen so weit abwärts zu bewegen, dass sie unter den vorspringenden Rand des Meniscus oder (bei der completen Luxation) unterhalb des Tuberculum articulare zu stehen kommen, 2) dieselben nach Hinten zu schieben. Ein Gehülfe fixirt den Kopf des sitzenden Kranken, indem er, hinter ihm stehend, die Hände vor der Stirn kreuzt und das Hinterhaupt gegen seine Brust andrückt. Der Wundarzt führt seine (mit Leinwand umwickelten) Daumen in den Mund ein und legt sie mit ihrer Volarfläche auf die unteren grossen Backzähne, während die übrigen Finger die Seitentheile des Unterkiefers bis zum Kinn umfassen. Mit dem Daumen wird nun ein kräftiger Druck gerade abwärts auf den hinteren Theil des Knochens ausgeübt, während das Kinn durch die übrigen Finger an einer weiteren Verschiebung nach Unten gehindert wird. Sobald man einige Beweglichkeit der Condylen durch diesen Druck erreicht hat, folgt der zweite Act, indem die

Daumen gegen die Backzähne und den vorderen Rand des Kronenfortsatzes angestemmt werden und die übrigen Finger das Kinn erheben. Die Zusammenziehung der Kaumuskeln vollendet die Einrenkung; zuweilen erfolgt sie mit solcher Schnelligkeit und Gewalt, dass die Daumen des Wundarztes zerbissen werden. Deshalb rathen Manche, die Daumen, sobald die Condylen „flott“ geworden sind, an die äussere Seite der Zähne anzulegen. Hierdurch kann aber die Reduction leicht misslingen. Lässt man die Daumen zu lange auf den Zähnen liegen, so erschwert dies gleichfalls die Reduction, da ihre Anwesenheit die Annäherung der Zahnreihen an einander, mithin die Wirkung der Kaumuskeln behindert. — Findet sich die, pag. 691 erwähnte Einkellung der Spitze des Processus coronoideus in der Grube des Jochbogens, so muss man mit den Daumen gegen den vorderen Rand des Processus coronoideus drücken, um diesen nach Hinten zu schieben, während der Kranke sich bemüht, den Mund möglichst weit zu öffnen. Auf diese Weise hat Nélaton eine Unterkiefer-Verrenkung reducirt, an welcher alle anderweitigen Versuche erfolglos waren.

Ist nur eine Seite verrenkt, so wird auch nur auf dieser der Druck mit dem Daumen ausgeführt und die Zurückschiebung vorgenommen. Letztere muss aber nicht gerade nach Hinten, sondern zugleich in der Richtung nach Aussen erfolgen, entsprechend der oben erläuterten Verschiebung.

Leo (Deutsche Klinik 1855, No. 13) empfiehlt, nach eigenen Erfahrungen, auch bei Verrenkung beider Condylen des Unterkiefers zuerst den einen und dann den anderen Condylus zu reponiren; dadurch werde die Reposition leichter, indem man jedesmal blos die Kaumuskeln der einen Seite zu überwinden habe.

Statt hauptsächlich auf die hinteren Backzähne einen Druck auszuüben, hat man früher durch Aufwärtsdrängen des Kinns die Reduction auszuführen gesucht. Hierher gehört der Faustschlag gegen das Kinn und das Verfahren mit dem Knebel, dessen Ravaton gedenkt. Letzteres bestand darin, dass ein Riemen oder Gurt in der Richtung vom Kinn zum Scheitel um den Kopf geführt, dort über eine Holzplatte zusammengeknotet und mit einem Knebel so lange aufgedreht wurde, bis unter einem gleichzeitig angewandten Druck auf die Processus condyloidei die Einrenkung gelang. Weniger roh ist das Verfahren, welches Johann de Vigo beschreibt. Zwischen die Backzähne werden ein Paar Keile von Holz gelegt, mittelst welcher der Wundarzt zugleich einen Druck auf die untere Zahnreihe ausübt, das Kinn wird mittelst eines Riemen, der um den Kopf geführt wird von Gehülfen stark aufwärts gezogen.

Für frische Fälle sind diese Verfahrensweisen durchaus zu ver-

werfen. Dagegen könnte man bei veralteten Unterkiefer-Luxationen von einer Combination der Holzkeile (mit denen man jedenfalls länger drücken kann als mit den Daumen) und des Knebels wohl Erfolg erwarten. Leichter und sicherer aber gelingt die Reduction veralteter Unterkiefer-Luxationen mittelst des von Stromeyer angegebenen Instrumentes. Dies ist eine starke Zange, deren hufeisenförmige Endstücke man zwischen die Backzähne des Ober- und Unterkiefers legt, so dass diese durch Umdrehung einer die Griffe verbindenden Schraube mit beträchtlicher Hebelkraft von einander entfernt werden.

Bouisson (*Gaz. méd.* 1852, pag. 736) hat das Stromeyer'sche Instrument als „levier à plaques paraboliques“ beschrieben. Aehnliche Instrumente sind schon früher vorgeschlagen worden; jedoch gebührt dem Stromeyer'schen der Vorzug. Dasselbe hat sich bei einer bereits seit 35 Tagen (Stromeyer's Handbuch der Chirurgie, Bd. I. pag. 608) und unter Bouisson's Händen bei einer seit 2 Monaten bestehenden Unterkiefer-Verrenkung bewährt.

Lecat liess in einem schwierigen Falle den Kranken auf die Erde setzen, während er selbst aufrecht stand, und wirkte durch seine Daumen mit dem ganzen Gewicht seines Körpers auf die hinteren Backzähne des Unterkiefers ein, wodurch die Reduction gelang. — A. Cooper setzte statt der Holzkeile ein Paar Gabelstiele ein.

Bei der grossen Neigung zu Recidiven, welche Verrenkungen des Unterkiefers meist hinterlassen, ist es nothwendig, nicht blos einen Monat lang jede weitere Entfernung der Zähne von einander sorgfältig (in der ersten Zeit durch ein Kinnthuch oder eine Schleuder) zu verhüten, sondern dem Kranken auch fernerhin in dieser Beziehung die grösste Vorsicht zu empfehlen.

Die Reposition der Recidive ist übrigens immer sehr leicht; sie gelingt zuweilen durch einen leichten Schlag gegen das Kinn.

Selten erheischen Complicationen eine besondere Rücksicht.

b) Verrenkungen am Rumpfe.

1. Verrenkungen der Wirbel¹⁾.

Die Wirbel sind bekanntlich nicht blos durch die Gelenkverbindungen ihrer schrägen Fortsätze, sondern auch durch die breiten und starken Symphysen, welche sich zwischen den einander zuge-

¹⁾ Vgl. G. Fischer, Mittheilungen aus der chirurgischen Universitäts-Klinik zu Göttingen, pag. 163 u. f., Richet, *Gaz. des hôpit.* 1864, No. 144, Maisonneuve, *Compt. rend. d. l'Acad.* 1864, T. 58, Martini, *Centralblatt d. med. Wissensch.* 1864, pag. 503, 1865, 169, Schuh, *Wiener med. Wochenschrift* 1865, No. 1, Luigi Porta, *Giornale veneto*, 1865, Marzo, C. Hueter, zur Lehre von den Luxationen, *Archiv f. kl. Chirurg.* Bd. IX., E. Blasius, die traumatischen Wirbelverrenkungen, *Prager Vierteljahr-Schrift*, 1869, II, H. Kerris, *Inauguraldissert.* Greifswald, 1869.

wandten Flächen ihrer Körper befinden, und durch mehrere starke Hilfsbänder mit einander sehr fest vereinigt. Die Bewegungen der einzelnen Wirbel gegen einander sind selbst bei bedeutenden Biegungen der Wirbelsäule sehr gering. Dennoch hat man lange von Verrenkungen aller einzelnen Wirbel gesprochen. Hippokrates hatte bereits die Annahme der grossen Mehrzahl dieser Verrenkungen widerlegt, und genaue anatomische Untersuchung der in neuerer Zeit beobachteten, sowie kritische Beleuchtung der früher beschriebenen Fälle haben übereinstimmend ergeben, dass es sich in der Regel um Brüche der Wirbelbogen handelte. Schon die allgemeine Angabe, dass es leicht gewesen sei, die Difformität zu beseitigen, oder den Knochen eine solche Richtung zu geben, dass die Compression des Rückenmarks aufhörte, lässt einen solchen Irrthum vermuthen. Für Wirbel-Verrenkungen ist gerade die auffällige und starre Difformität charakteristisch, welche sich nur durch Anwendung erheblicher Kraft und besonders berechneter Bewegungen beseitigen lässt.

In der Rücken- und Lendengegend ist Verrenkung ohne Fractur äusserst selten und unwahrscheinlich. Wo Fractur und Luxation zusammen bestehen, prävaliren meist die Erscheinungen der letzteren.

Robert (Luxation en arrière, sans fracture, de la 5. vertèbre dorsale sur la 6. Gaz. des Hôp. 1853. No. 113) erklärt die Verschiebung eines Rückenwirbels nach Vorn, sobald die Bandverbindungen mit dem nächst oberen Wirbel gelöst seien, für sehr wohl möglich. Eine forcirte Beugung des Rumpfes nach Vorn könne sie veranlassen, wie dies aus einem von ihm beobachteten Falle hervorgehe. Ein Mann wurde, während er in einer Grube stand, durch einen auf seinen Rücken fallenden schweren Mastbaum vornüber gebeugt. Die untere Hälfte des Rumpfes und die Beine waren sofort gelähmt; in der Mitte des Rückens fand sich ein schmerzhafter Vorsprung. Nach 11 Tagen erfolgte der Tod. Es fand sich kein Knochenbruch; das Rückenmark war durch „Luxation des 6. Rückenwirbels nach Vorn“ vollständig zerrissen. Der Wirbelkörper ragte in das mit Blut gefüllte Mediastinum. Auch die Pleura war beiderseits zerrissen, in ihrer Höhle gleichfalls Blut. Alle Bänder und der zwischen dem 5. und 6. Rückenwirbel liegende Faserknorpel waren vollständig zerrissen; das Ligam. flavum allein war unversehrt. Das 6. Rippenpaar war am 6. Rückenwirbel angeheftet geblieben, die Dura mater nicht zerrissen, obgleich das Rückenmark in einer Ausdehnung von 5 Ctm. in Brei verwandelt war. — Willig e (Zeitschr. d. deutsch. Chir. Vereins. Bd. VIII. Hft. 3. pag. 224 u. f.) beobachtete eine Verrenkung des 11. Brustwirbels. Ein Mann war trunken vom Heuboden gefallen, hatte sogleich aus Mund und Nase geblutet, war dann aber in Sopor verfallen. Am Rücken zeigte sich eine beträchtliche Difformität zwischen dem 10. und 12. Brustwirbel im Umfang eines Hühner-ees, welche durch kräftigen Zug und Gegenzug am Becken und an den Schultern beseitigt wurde, ohne dass dabei ein Geräusch sich wahrnehmen liess. Der Kranke, dessen Beine bis dahin gelähmt waren, vermochte dieselben demnächst wieder zu bewegen, jedoch nicht vollständig.

Halswirbel können auch ohne gleichzeitige Fractur verrenkt werden. Diese Verrenkungen bieten wesentliche Verschiedenheiten

dar, je nachdem sie an den beiden oberen oder an den fünf unteren Halswirbeln bestehen.

a) Verrenkungen der beiden ersten Halswirbel.

Der Atlas ist mit dem Hinterhauptbein so innig verbunden, dass nur sehr beschränkte Bewegungen zwischen ihnen Statt finden und nur durch beträchtliche Zerstörungen der Gelenkbänder und der Gelenkflächen selbst, besonders bei Caries der letzteren, Verschiebungen zwischen ihnen zu Stande kommen. Selten und nur durch eine sehr grosse Gewalt und mit sehr beträchtlichen Nebenverletzungen vermögen äussere Einwirkungen diese Verrenkung hervorzubringen. Als angeborene unvollkommene Verrenkung ist sie in der Richtung nach hinten bei anencephalen Missgeburten, nach Vorn bei einem Kinde von 3 Monaten beobachtet worden.

Bouisson (Gazette médic. de Paris 1855) glaubt, dass man mit Unrecht in neuerer Zeit das Vorkommen traumatischer Verrenkungen in dem Gelenk zwischen Atlas und Hinterhaupt gelegnet habe (Riche), und führt zum Belege eine Beobachtung an, welche einen 16jährigen Menschen betrifft, der durch eine schwere Last, die auf ihn niederfiel, fast zermalmte wurde. Nach Eröffnung des Schädels fand man einen Bluterguss auf der Oberfläche des Gehirns und nach Entfernung des letzteren eine auffallende Verengerung im Foramen magnum mit Compression der Medulla oblongata. Nach Blosslegung des Gelenks zwischen Hinterhaupt und Atlas zeigte sich, dass der rechte Gelenktheil des letzteren vor dem entsprechenden Condylus occipitis stand, während auf der linken Seite die beiden entsprechenden Gelenkflächen einander noch gegenüber, aber etwas von einander entfernt standen. Eine Fractur war nicht vorhanden, der Symphysenknorpel zwischen dem 2. und 3. Wirbel ein wenig abgelöst.

Häufiger kommt die Verrenkung des Epistropheus vor, trotz der grossen Festigkeit der Bänder, durch welche die relative Stellung der beiden ersten Halswirbel gesichert ist. Jedoch bricht bei Weitem leichter der Zahnfortsatz des Epistropheus, als die Bänder zerreißen. Bruch des Zahnfortsatzes hat Verrenkung zur Folge, weil derselbe Anheftungs- oder Stützpunkt für die wesentlichen Bänder dieses Gelenkes ist. Bei Kindern kann der Zahnfortsatz, da er eine Epiphyse des Epistropheus ist, wie jede andere Epiphyse, an der Verbindungsstelle abgelöst werden. Bei Kindern ist aber auch die Verrenkung eher möglich, weil der Zahnfortsatz kürzer ist und die Ligamenta lateralia weniger fest sind, so dass er leichter (nach Petit u. A. beim Aufheben des Kindes am Kopf) unter dem Ligamentum transversum hindurchschlüpfen könnte. Jedoch sind diese Angaben nicht durch die Section erwiesen.

Stromeyer beschreibt (Handbuch pag. 609) eine atonische Subluxation zwischen Atlas und Epistropheus, die durch einen Fall auf den Kopf entstehe. „Der Kopf sinkt dicht unter dem Hinterhaupte auf eine Seite und dreht sich etwas um seine Achse nach der entgegengesetzten Seite. Man kann ihn sehr leicht in seine

normale Richtung bringen, er sinkt aber sofort wieder in die fehlerhafte Stellung zurück. Der Patient kann ihn nicht gerade richten, obgleich man deutlich sieht, dass sein Halsmuskeln sich anspannen, also nicht gelähmt sind.“

Die Entstehungsweise der Verrenkung des Epistropheus ist, nach Bichat, eine doppelte:

1) Der Zahnfortsatz wird gerade nach Hinten geschoben, indem das Ligamentum transversum, die Ligamenta lateralia und der ganze übrige Band-Apparat zerrissen werden. Hierzu ist eine ganz ausserordentliche Gewalt nothwendig; ein Fall auf das Hinterhaupt von sehr bedeutender Höhe, ein Schlag auf das Genick bei vornüber gebeugtem Kopfe. Nach *Caussé* soll eine Verrenkung des Zahnfortsatzes wegen Zerreiſung des Ligamentum transversum auch durch eine gewaltsame Bewegung in entgegengesetzter Richtung, indem nämlich der Kopf stark hintenüber, das Genick aber nach Vorn gedrängt wird, zu Stande kommen können. Man hat, nach den Analekten von *Caussé*, diese Verletzung bei den Opfern eines berühmten Mörders gehandelt, welcher selbst gestand, den Tod herbeigeführt zu haben, indem er mit der einen Hand das Kinn stark aufwärts, mit der anderen aber das Genick nach Vorn stiess. *Bew. médico-chirurgicale*, 1852, Sept.

2) Der Kopf wird gewaltsam nach der einen Seite gebogen und übermässig in derselben Richtung rotirt. Hierdurch werden die auf's Aeusserste gespannten Seitenbänder der entgegengesetzten Seite zerrissen. Erfolgt die Biegung in noch stärkerem Grade, oder wird die Rotation nach Vorn noch weiter fortgesetzt, so zerreiſt auch das zweite Seitenband und der Zahnfortsatz schlüpft unter dem Ligamentum transversum, welches unversehrt bleibt, nach Hinten.

Diese Entstehungsweisen werden von *Boyer* als unzweifelhaft angenommen. Jedoch ist ein hinreichender anatomischer Beweis dafür noch nicht geliefert und die Untersuchungen über das Entstehen dieser Verrenkung bei Hinrichtungen durch den Strang haben, je nach der verschiedenen Technik der Henker zwar verschiedene, aber noch keine genügenden Resultate geliefert. Zuverlässig ist nur, dass bei dem Erhängen viel häufiger Fracturen der Wirbel entstehen, als die in Rede stehende Verrenkung. Die vorwiegende Häufigkeit der Fracturen am Atlas und Epistropheus nach der Hinrichtung durch den Strang hat bereits *Realdus Columbus* in Pisa, *Bom* und *Padua* durch anatomische Untersuchungen nachgewiesen.

Die Symptome dieser Luxation können fast immer nur an der Leiche beobachtet werden; der Tod erfolgt in der Mehrzahl der Fälle sogleich durch Compression oder Zerreiſung des Rückenmarks. Der Kopf ist in hohem Grade beweglich, hängt vornüber, der Mund ist geöffnet, die Augen ragen stark hervor, das Gesicht ist geröthet und aufgedunsen, der Puls, wenn überhaupt noch zu fühlen, selten und klein; Empfindung und Bewegung sind erloschen.

Von Behandlung ist in der Regel keine Rede. Fände man den Patienten noch lebend, mit grosser Athemnoth kämpfend, so wäre ein Reductionsversuch in der bei den Wirbelbrüchen angegebenen Weise vorsichtig zu unternehmen. Deutet aber kein Symptom auf ein Bedrohtsein des Lebens, so unterlasse man jeden Reductionsversuch; dann besteht nämlich die besprochene Verrenkung gewiss

nicht, und anderweitige, in ihren Symptomen ihr ähnliche Verletzungen könnten durch Extensionsversuche verschlimmert werden.

b) Verrenkungen der fünf unteren Halswirbel.

Zwischen den unteren fünf Halswirbeln kommen unvollkommene¹⁾ und vollkommene, einseitige und doppelseitige Verrenkungen vor.

Einseitige Verrenkungen können ebensogut vollkommen sein, wie doppelseitige. Beide entstehen aber durch einen verschiedenen Mechanismus: die einseitigen durch Rotation (Abduction), die doppelseitigen durch Beugung, weshalb man sie denn auch ganz zweckmässig als Rotations- und als Beugungs-Luxationen unterscheiden kann (Hueter), zumal bei den sogen. einseitigen Verrenkungen das Gelenk der anderen Seite doch keineswegs immer von aller Verschiebung frei bleibt. — Die Veranlassung ist nicht immer bloß eine äussere Gewalt, sondern zuweilen auch ein Muskelzug, oft Beides zugleich, indem z. B. ein Kind auf dem Kopfe zu stehen versucht, wo dann nicht bloß die Spannung der Halsmuskeln, sondern auch die Last des ganzen Körpers einwirkt.

Begünstigt wird die Verrenkung auch hier durch vorausgegangene Entzündung oder Caries in den betreffenden Gelenken. Vgl. Maisonneuve, *Compt. rend. de l'Acad. des sciences*. T. LVIII.

Directe Gewalt scheint für die Entstehung solcher Luxationen durchaus nicht erforderlich zu sein. Butcher (On dislocation of the cervical vertebrae, without fracture. *Dublin quarterly journ.* Mai 1853) erzählt einen hierher gehörigen Fall von Verrenkung der Halswirbel ohne alle Fractur, aber mit Zerreißung aller Bänder und namentlich auch des Zwischenknorpels. Nur das Ligam. longitudinale ant. war unversehrt. Der Körper des fünften Halswirbels ragte stark nach Vorn hervor, die unteren Gelenkfortsätze desselben standen $\frac{1}{4}$ Zoll vor den unteren Gelenkfortsätzen des 6ten. Der Intervertebralknorpel adhärirte zu $\frac{2}{3}$ seiner Dicke dem 6., zu $\frac{1}{3}$ dem 5. Wirbel. Der Mann war auf das Hinterhaupt gefallen, während Rumpf und untere Extremitäten hintenüber schlugen. Der Tod erfolgte nach 57 Stunden. Der Verletzte hatte von Anfang an mit schwacher Stimme über grosse Schmerzen im Genick geklagt. Die Extremitäten waren für Bewegungen gänzlich, für Empfindungen nicht gelähmt. Zwischen dem 5. und 6. Halswirbel war im Nacken eine bedeutende Vertiefung. Alle Respirationsmuskeln mit Ausnahme des Zwerchfelles waren gelähmt. Incontinentia alvi und Retentio urinae. Auffallend war an den folgenden Tagen die Erhöhung der Temperatur an den unteren Extremitäten. Repositionsversuche wurden nicht gemacht, sondern Blutegel gesetzt und Calomel gegeben.

¹⁾ Nach Stromeyer (*Handb. I. pag. 611*) können bei einem Fall auf den Kopf die Bänder der Halswirbel auch zerreißen, ohne dass Luxation eintritt, worauf „durch Quetschung“ oder Zerreißung des Rückenmarks der Tod schnell oder später erfolgen, aber (bei antiphlogistischer Behandlung) auch Heilung erzielt werden kann. Nach den über die „Verstauchung“ von uns gegebenen Erläuterungen (*pag. 660*) dürfte eine solche Verletzung als „Verstauchung der Halswirbel“ bezeichnet werden, da eine Quetschung des Rückenmarks doch ohne eine, wenn auch vorübergehende, Dislocation der Wirbel nicht erfolgen könnte.

Symptome. Der Kranke empfindet im Augenblicke der Verrenkung einen sehr heftigen Schmerz und hört zuweilen ein Geräusch, oder hat doch die Empfindung, dass etwas in seinem Halse reisse. Bei der gewöhnlicheren Form, der einseitigen (Rotations-) Verrenkung, steht der Kopf schief, mit dem Gesicht nach der entgegengesetzten Seite hingewandt, und es ist dem Kranken vollkommen unmöglich, ihn gerade zu richten. Der Halstheil der Wirbelsäule bildet auf der verletzten Seite einen concaven, auf der entgegengesetzten einen convexen Bogen. — Im Nacken beschreiben die Dornfortsätze einen nach Hinten convexen Bogen, oder es findet sich auch ein durch den Dornfortsatz des verrenkten Wirbels bedingter Vorsprung. In derselben Höhe fühlt der in den Pharynx eingeführte Finger gewöhnlich eine Einbiegung oder Vertiefung, während sich unmittelbar darüber ein durch den nächst oberen Wirbel gebildeter Vorsprung findet. Bei weit geöffnetem Munde sieht man, dass die hintere Pharynxwand und das Gaumensegel einander näher gerückt sind. Je nachdem die Verrenkung mehr oder weniger vollständig ist, treten die Erscheinungen der Compression oder Zerreiſung des Rückenmarkes oder auch bloss einer Zerrung der durch die entsprechenden Foramina intervertebralia austretenden Nerven hervor. Dieselben sind, *ceteris paribus*, um so gefährlicher, je weiter oben die Verletzung besteht¹⁾. Die Symptome sind ziemlich constant: mehr oder weniger vollständige Lähmung für Empfindung und Bewegung unterhalb der Schlüsselbeingegend; Geistesthätigkeit ungestört, Körperoberfläche am Rumpf und an den Extremitäten kühl, mit Ausnahme weniger Fälle, in denen die Temperatur erhöht war; Kopf und Hals oft von profusem Schweiß bedeckt (durch Lähmung der Gefässnerven); Respiration erschwert und ausschließlich mit dem Zwerchfell und den Bauchmuskeln vollführt; Magen sehr reizbar; grosse Neigung zum Erbrechen; Harnverhaltung, unwillkürliche Entleerung der Faeces. In der Mehrzahl der Fälle erfolgt, wenn die Einrennung nicht gelingt, der Tod, zuweilen jedoch erst nach mehreren Tagen. Der Grund des Todes scheint die Ausbreitung der Erkrankung des Rückenmarks zu den Ursprungsstellen des Vagus zu sein²⁾. Dies Alles gilt natürlich nur für die Fälle, in denen die Rückenmark mitverletzt oder nachträglich erkrankt ist. Sind nur die austretenden Nervenstämme oder deren Wurzeln gequetscht, so beschränken sich, abgesehen von den localen Erscheinungen, alle Störungen auf die Lähmung des entsprechenden Arms. — In sehr sel-

¹⁾ Vgl. „Wirbelbrüche“, pag. 383 u. L.

²⁾ Williams, Dislocations in the cervical region of the vertebral column, Brit. Times and Gaz. 1857, Aug. 15.

nen Fällen treten erhebliche Funktionsstörungen gar nicht auf, obgleich die Difformität deutlich ist und bleibt.

Die Behandlung muss, sobald die Diagnose feststeht — trotz des Widerspruchs von Desault¹⁾ u. A.²⁾, — in der nach allgemeinen Regeln (in Chloroform-Narkose) auszuführenden Einrenkung bestehen. Der Versuch der Einrenkung ist nicht bloss nicht gefährlich, sondern hat in der Mehrzahl der Fälle zum Ziele geführt. Er ist das einzig mögliche Hilfsmittel (Malgaigne). Auch hier folge man der allgemeinen Regel, nicht durch grosse Gewalt, sondern durch wohl-rechnete Bewegungen die Einrenkung zu bewerkstelligen. Bei der einseitigen (Rotations-) Luxation neigt man, nach Richet, den Kopf noch etwas stärker gegen die Schulter, gegen welche derselbe in deformirter Weise geneigt steht (und von welcher das Kinn abge- wandt ist) und dreht dann den kräftig mit beiden Händen gefassten Kopf so, dass das der genannten Schulter entsprechende Ohr nach vorn und das Kinn wieder in die Medianebene rückt. Auch für die viel schwierigeren Fälle von doppelseitiger (Beugungs-) Luxation ist es rathsamer, durch Rotation die successive Einrenkung des einen Gelenkes nach dem anderen zu erzielen (Hueter), als der früher empfohlenen Extension allein zu vertrauen, welche man in besonders schlimmen Fällen allerdings auch zu Hülfe nehmen kann.

Die Contra-Extension geschieht dann an den Schultern, die Extension am Kopfe, den der Wundarzt mit der einen Hand am Kinn, mit der anderen am Hinterhaupte fasst. Der Zug geschieht zunächst in der Richtung, welche der Hals durch die Verrenkung erhalten hat, demnächst gerade aus, unter gleichzeitiger Rotation in der eben beschriebenen Weise. Fehlt ein Gehülfe, so kann man die Contra-Extension durch das gegen die Schulter des Patienten angestemmte Knie auszuführen suchen.

Zu den grössten Seltenheiten gehört wohl die zufällige Einrenkung, wie sie in der medicinischen Zeitung Russlands, 1858, No. 39, berichtet wird. Die Luxation war durch einen Schlag mit einem Holzseil in den Nacken veranlasst. Der Kranke lag comatös da, den Kopf nach Hinten und Rechts geneigt, mit bedeutenden Vorspringen des Pomum adami und Faltenbildung der Haut im Nacken. Der Halswirbel sprang nach Hinten, der 3. nach Vorn vor. Unmöglichkeit der Reduction, die 8 Tage lang täglich versucht wurde, bis der Kranke unversehens aus dem Bette aufstand und sich dabei selbst seine Luxation reponirte.

Watson (Journ des connoiss. méd., Avril 1851), gelang in 2 Fällen von einseitiger Verrenkung der Halswirbel mit Rotation die Einrenkung. In beiden Fällen

¹⁾ Leveillé (l. c. Tom. II. pag. 62) theilt, nach eigenen Notizen aus dem Jahre 1793, einen Fall mit, in welchem Desault selbst, aber mit dem Bemerken, dass es auf Tod und Leben gehe, bei einem Kinde die Reduction einer Verrenkung der Halswirbel vornahm. Wahrscheinlich handelte es sich um eine unvollständige Verrenkung eines unteren Halswirbels, obgleich die Beobachtung unter „Verrenkungen des zweiten Halswirbels“ aufgeführt ist.

²⁾ Vgl. den pag. 699 citirten Aufsatz von Butcher.

schiene die Verletzten den sie umgebenden Laien todt zu sehn. Die Verrenkung bestand unter dem Ursprunge des N. phrenicus. Watson führte die Reduction in der Art aus, dass er seine Füße auf die Schultern des ausgestreckt am Boden liegenden Verletzten stemmte, den Kopf kräftig fasste und demnächst zur Seite drehte. Die normale Lage wurde sogleich wieder hergestellt. Der Puls hob sich, die Respiration wurde freier, und nach etwa 1 Stunde kehrte in beiden Fällen das Bewusstsein wieder. In dem einen Falle traten nach 2 Stunden Convulsionen ein, gegen welche ein reichlicher Aderlass angewandt wurde. 14 Tage reichten zur vollständigen Heilung hin.

Malgaigne berichtet (Revue médico-chir. 1853. Decbr.) mehrere Fälle von gelungener Einrenkung. So z. B. folgenden. Ein 13jähriges Mädchen trägt eine schwere Matratze auf dem Kopf; diese gleitet nach Rechts ab und sogleich erfolgt unter krachendem Geräusch eine Schiefstellung des Kopfes nach Links mit vollständiger Unbeweglichkeit. Die Verschiebung der Dornfortsätze dicht über der Vertebra prominens nach Rechts konnte deutlich gefühlt und die an der, von ihnen verlassene Stelle bestehende Vertiefung deutlich gesehen werden. Die Reduction gelang 23 Stunden nach der Verletzung. Malgaigne stemmte seine Kniee gegen die Schultern der Kranken, kreuzte die Hände gegen das Kinn und zog den Kopf anfangs aufwärts und nach Links, dann mit einer Rotation nach Rechts und Hinten. Als bald fühlte er ein Geräusch, welches die Kranke jedoch nicht vernahm. Die Reduction war vollendet und die Pat. konnte mit dem normal stehenden Kopfe und Halse alle Bewegungen ausführen. — Vgl. auch die pag. 695 in der Note angeführte Literatur.

Jul. Roux will die eine Seite des verrenkten Wirbels durch einen Längsschnitt blosslegen, den Gelenkfortsatz reseciren und die Reduction dann in der Weise durch Drehung des Kopfes ausführen, dass der verrenkte Wirbel eine Stellung erhält, als wäre nur auf der einen Seite der Gelenkfortsatz verrenkt, wobei dann ein nicht-lebensgefährlicher Druck auf das Rückenmark ausgeübt werden würde. Die Gefahren einer solchen Operation bedürfen keiner Erläuterung.

Walker in Boston (Canstatt's Jahresber. f. 1851, Bd. IV. pag. 40) suchte in einem schwierigen Falle, der tödtlich verlief, die Einrenkung durch Abschneiden der Muskel-Insertionen zu begünstigen, was gleichfalls nicht zu empfehlen sein dürfte.

2. Verrenkungen des Brustbeins¹⁾.

Als Verrenkung des Brustbeins bezeichnet man eine Verschiebung seiner einzelnen, durch Knorpel verbundenen Stücke gegen einander. Dieselbe ist fast ausnahmslos in der Weise beobachtet worden, dass der Körper des Brustbeins nach Vorn und aufwärts rückt und sich demnächst mit seiner hinteren Fläche gegen die vordere des Manubrium sterni anstemmt (vgl. Fig. 94 und 95).

¹⁾ Diese nicht ganz seltene Verletzung ist, trotz der oberflächlichen Lage des Brustbeins, lange unbeachtet geblieben. Erst 1771 beschrieb sie Aurran, Wundarzt am Hôtel-Dieu zu Rouen, in dem damaligen Journal de médecine, Tom. XXXVI. pag. 521. Genauere Untersuchungen darüber haben Maisonneuve (Annales de l'anatomie et de la physiologie pathologiques, Paris 1813), Siry (Union méd. 1864. No. 51) und Brinton (Americ. journal of med., 1867, Jul.) angestellt. Letzterer hat 14 Fälle gesammelt, darunter eine Verrenkung nach Hinten. — Vgl. übrigens „Fracturen des Brustbeins“, pag. 390.

Die Verletzten waren meist
 äftige Männer; die Veranlassung
 bald eine directe, d. h. eine
 walt, welche auf das Manubrium
 erni in der Richtung von Vorn
 ch Hinten einwirkt, bald eine
 directe, indem das Sternum
 in der Länge nach auseinander
 rissen wird. Bei einem Fall
 f den Rücken oder auf das Ge-
 ck wird die Erschütterung dem
 rustbein durch die Schlüssel-
 eine und Rippen mitgetheilt. Die
 n oberen und unteren Ende

esselben befestigten Muskeln können durch ihre Spannung die Zer-
 rissung desselben befördern (vgl. pag. 390). Bei den durch Fall auf
 en Rücken entstandenen Verrenkungen finden sich stets beträchtliche
 ertletzungen an der Wirbelsäule, dem Schlüsselbeine, den Rippen.

Die **anatomischen Veränderungen** an der Stelle der Verletzung
 nd: 1) der Symphysenknorpel zwischen Handgriff und Körper des
 rustbeins ist zerrissen; 2) die Knorpel der beiden ersten Rippen-
 aare bleiben mit dem Handgriffe in Verbindung und werden mit
 m verschoben; 3) die Membrana sterni ist an der vorderen Seite
 errissen, an der hinteren vom Körper des Brustbeins in einiger Aus-
 ehnung abgelöst.

Symptome. Gewöhnlich sieht man sogleich, dass die vordere
 rustwand eine Verkürzung erfahren hat und dass das Manubrium
 terni eingedrückt ist. Mit dem Finger kann die abnorme Stellung
 er beiden Theile des Brustbeins noch deutlicher erkannt werden.
 as hervorragende obere Ende des Körpers des Brustbeins ist voll-
 ömmen glatt. Die Hervorragung steht 2 Centimeter oberhalb der
 elenke zwischen dem dritten Rippenpaare und dem Brustbeine. Die
 iletzt erwähnten beiden Symptome begründen die Unterscheidung
 on dem Bruche des Sternum (vgl. pag. 390). Bei bedeutender
 eschwulst wird die Diagnose schwierig. Eine erworbene oder an-
 eborene Vertiefung an dieser Stelle des Brustbeins kann dazu ver-
 iten, bei einer blossen Quetschung die in Rede stehende Verrenkung
 zuzunehmen. In Betreff der secundären Verletzungen und Erkrank-
 ungen der Brust-Organen und in Betreff der Prognose gilt das vom
 rustbein-Bruch Gesagte.

Behandlung. Ist die Verletzung durch einen Sturz auf den

Fig. 94.



Fig. 95.



Rücken entstanden, so muss man sich gewöhnlich jedes Reducionsversuches enthalten, weil die an der Wirbelsäule voraussichtlich bestehenden Verletzungen durch einen solchen verschlimmert werden könnten. Sind letztere nicht vorhanden oder ist die Verletzung durch directe Gewalt entstanden, so legt man unter den Rücken eine hinreichend starke, festgepolsterte Rolle und lässt auf die Symphysis ossium pubis einen Druck, am Kinn aber einen kräftigen Zug ausüben. Zur Retention genügt, bei ruhiger Lage mit erhöhtem Kopf, eine den Brustbein-Körper nach Hinten drückende, breite Binde.

3. Verrenkungen der Rippen und Rippenknorpel.

Verrenkungen der Rippen (in der *Articulatio costo-vertebralis* und *costo-transversaria*) sind nicht zuverlässig beobachtet.

Die Unsicherheit der Beobachtung von Buttet, auf welche man sich in dieser Beziehung stützte, ist durch Boyer (*Maladies chirurgicales*, Tom. IV. pag. 124) bereits nachgewiesen. Die Brüchigkeit der Rippen einer, die Biegsamkeit ihrer Knorpel und die Festigkeit ihrer Gelenk-Verbindungen anderer Seits verhindern diese Verrenkungen. In Betreff des Gelenkes zwischen den Wirbeln und der Rippe kommt ausserdem die Dicke der sie bedeckenden Muskeln in Betracht. Wie schwer aber auch nach deren Entfernung eine Verrenkung in jenem Gelenke entsteht, wenn man nicht alle einzelnen Bänder vorher durchschneidet, davon kann man sich am Cadaver leicht überzeugen. Hiermit soll jedoch nicht in Abrede gestellt werden, dass bei überaus gewaltsamen Verletzungen, welche aber zugleich eine Zerschmetterung der Wirbel mit sich führen müssten, auch Verrenkung des hinteren Rippen-Endes vorkommen könnte.

Verrenkung der Rippenknorpel ist wirklich beobachtet worden, jedoch sehr selten und nur an der 6., 7., 8. und 9. Rippe, deren Gelenkverbindungen (besonders an den letzteren, welche das Brustbein gar nicht direct erreichen) sehr viel weniger fest sind, als diejenigen der oberen Rippenknorpel. Diese Verrenkung setzt immer einen Fall auf einen vorspringenden Körper voraus. Der Knorpel, dessen Gelenkverbindung gelöst wird, gleitet unter und hinter den nächst oberen, und drängt diesen nach Vorn, so dass derselbe einen Vorsprung bildet, welcher zu der Annahme verleiten kann, es sei der obere Knorpel verrenkt. Schmerz, Athembeschwerden, auch Krampf der Thoraxmuskeln, gesellen sich alsbald hinzu. — Zum Behufe der Reduction drückt man auf den hervorragenden Knorpel von Unten und Vorn her, worauf der verrenkte alsbald hervorspringt und durch seine Elasticität den richtigen Platz wieder einnimmt. Wahrscheinlich würde die Reposition während einer starken Inspiration von selbst erfolgen, das Fortbestehen der Verschiebung aber auch keine üblen Folgen haben, da Schmerz und Krampf nach und nach von selbst verschwinden.

4. Trennungen der Becken-Symphysen, Verrenkungen der Beckenknochen.

Die grosse Festigkeit der Becken-Symphysen gestattet nur selten und bei Einwirkung bedeutender Gewalt eine Verschiebung derselben. Gewöhnlich bestehen ausser einer solchen noch so bedeutende Verletzungen der äusseren Weichtheile und der Eingeweide, dass diese mehr als die Verschiebung der Knochen ins Auge fallen.

Die Veranlassungen sind ein Fall von bedeutender Höhe auf das Becken oder auf einen Fuss, oder das Aufschlagen einer grossen Last auf das Becken.

Die beiden Hüftbeine sollen nach Zerreiſung der Symphysis sacro-iliaca, ohne Trennung der Symphysis ossium pubis, nach Hinten verschoben werden können, und zwar durch eine direct auf die hintere Fläche des Kreuzbeins einwirkende Gewalt, so dass eigentlich das Kreuzbein verschoben wird.

Delpech erwähnt eines Falles der Art. Ein Getreidesack fiel einem Menschen auf's Kreuz, während er auf allen Vieren ruhte. „Das Kreuzbein wurde in die Beckenhöhle hinein verschoben, durch Zerrung und Zerreiſung der Sacralnerven erfolgte Lähmung der unteren Extremitäten und der Kranke starb.“ Die erwähnten Symptome lassen sich aber ebenso gut aus einer Erschütterung der Cauda equina erklären und eine Verschiebung des Kreuzbeins nach Vorn durch das Auffallen eines Getreidesackes ist schwer zu begreifen, da derselbe das Kreuzbein nicht geöffnen kann, ohne zugleich mit derselben Gewalt auf die hinteren Hüftbeinstachel aufzuschlagen. Wahrscheinlich handelt es sich in diesem Falle um die Zerreiſung der einen Symphysis sacro-iliaca, wie dies in einem unter gleichen Umständen beobachteten und in den *Memoires de l'Academie de chirurgie* beschriebenen Falle (Binai) durch die Section nachgewiesen ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Delpech diesen selben Fall im Sinne hatte. Stromeyer (*Handbuch*, I. pag. 613) glaubt sogar, dass in manchen Fällen bloß eine Schiefstellung des Beckens in Folge von Contusion der Hüfte Statt gehabt habe, und macht darauf aufmerksam, dass eine solche Schiefstellung mit Luxation eines Beckenknochens verwechselt werden könne.

Verschiebungen der beiden Hüftbeine aufwärts können durch einen heftigen Sturz auf die Füſse oder auf das Gesäss hervorgebracht werden. Die Symphysis-sacro-iliaca muss dabei auf beiden Seiten zerrissen sein.

Verschiebung eines Hüftbeines setzt die Zerreiſung der Symphysis ossium pubis und der Symphysis sacro-iliaca der entsprechenden Seite voraus und ist ebenso, wie die vorerwähnten Formen, in der Regel als eine lebensgefährliche Verletzung zu betrachten. Sobald die Verschiebung irgend bedeutend ist, werden voraussichtlich auch die im Becken gelegenen Organe (Blase, Mastdarm, Nerven- und Venengeflechte, Arterien, Fascien, Bindegewebe) gequetscht oder zerrissen sein, woraus dann gefährliche Entzündungen und Eiterungen innerhalb des Beckens hervorgehen.

Als charakteristische Symptome der Verrenkungen des Hüftbeins hebt Malgaigne hervor: 1) Beweglichkeit mit krachendem Geräusch in der Gegend der zerrissenen Symphyse, 2) veränderte Stellung der Spina ilei posterior.

Behandlung. In Betreff der Nothwendigkeit, vor Allem die etwa bestehenden Complicationen zu berücksichtigen, sind Alle einverstanden. Boyer und seine Schüler empfehlen, den Kranken frühzeitig auf Krücken gehen zu lassen, um durch das Gewicht des Beins die Reduction allmählig zu bewirken, und erklären jeden Reductionsversuch auch für gefährlich. Andere stützen ihre Ansicht von der Nothwendigkeit frühzeitiger und gewaltsamer Reduction darauf, dass die aus ihren normalen Verbindungen gelösten Knochen nothwendig die mit ihnen in Berührung tretenden Weichtheile heftig reizen.

Sanson (Dictionn. de méd. et de chirurg. prat., Tom. XI. pag. 224) glaubt beide Ansichten vereinigen zu können: „man solle die Reduction vornehmen, wenn sie keine besonderen Schwierigkeiten darbietet, dagegen unterlassen, wenn durch die ersten Versuche Schmerzen entstehen, welche den Reizungsstand mehr, als die Fortdauer der Verschiebung selbst es thut, erhöhen könnten.“ Dieser Vermittelungsvorschlag führt aber nicht zum Ziele. Von wo ab sollen wir die Reduction schwierig nennen? Schmerzhaft ist sie, sofern wir von der Chloroform-Narkose absehen, immer. Wozu erkennen, ob diese Schmerzen fähig sind, den Reizungsstand stärker zu erhöhen, als die Verschiebung selbst?

Kann, mit Rücksicht auf die bestehenden Complicationen, von einer mechanischen Behandlung überhaupt die Rede sein, so empfiehlt es sich gewiss mehr, den Verletzten in ruhiger Lage mittelst permanenter Extension (wie bei Fractura femoris, vgl. pag. 453) zu behandeln, als das Boyer'sche Verfahren nachzuahmen, welches nur in solchen Fällen, wo andauerndes Stillliegen gefährlich erscheint, den Vorzug verdienen dürfte.

Verrenkungen des Steissbeins können durch äussere Gewalt nach Vorn, bei einer schweren Geburt nach Hinten erfolgen. Im ersteren Falle entsteht Entzündung des den Mastdarm umgebenden Bindegewebes und der Fascia perinei oder des Mastdarms selbst; auch im letzteren hat man Phlegmone folgen sehen. Die Reposition mittelst der in den Mastdarm eingeführten und von Aussen aufgelegten Finger ist nicht schwierig. Die Bekämpfung der Entzündung und, falls Eiterung folgt, die frühzeitige Oeffnung des Abscesses ist von grosser Wichtigkeit.

Bonnafont (Union méd. 1859. No. 9) giebt folgende Beschreibung einer Luxatio coccygis. Eine Nonne war mit dem Steiss auf den Rand eines Nachtgeschlirs gefallen, welches dabei zerbrach. Sofort entstand in der Nähe des Afteres ein heftiger Schmerz, der im Verlauf eines Monats nicht schwinden wollte. Da erst suchte die

Leidende ärztliche Hilfe. Ihre Klagen waren: Beschwerden beim Stuhlgange, selbst bei der Application von Klystieren, Schmerzen in beiden Oberschenkeln, bis zu den Knieen hinab, Unvermögen zu sitzen, heftiger Schmerz in der Aftergegend beim Husten und Niesen, seltenes Uriniren. Bonnafont fand, die hintere Fläche des Os sacrum mit dem Finger verfolgend, dass dasselbe plötzlich und in ungewöhnlicher Höhe aufhörte, und dass dort oberhalb des Anus eine nussgrosse Vertiefung bestand, in deren Grund er das Os coccygis nach Vorn luxirt fand. Bei der Untersuchung durch das Rectum fand man das Steissbein, mit dem Os sacrum fast in rechtem Winkel, quer in den Mastdarm hineinragend. B. reducirte mit dem hoch in den Mastdarm eingeführten und gebogenen Zeigefinger die Luxation, und übte dann noch $\frac{1}{4}$ Stunde lang einen Druck von Vorn nach Hinten auf das Steissbein aus, um einer neuen Deviation vorzubeugen. Tags darauf hatte sich die Luxation unvollkommen wieder hergestellt. Deswegen wurde nach der Reduction die Wärterin beauftragt, dreimal täglich möglichst lange mit ihrem Zeigefinger auf das Steissbein einen Druck von Vorn und Oben nach Hinten und Unten auszuüben. So wurde das Uebel beseitigt.

c) Verrenkungen an der oberen Extremität.

1. Verrenkungen des Schlüsselbeins, Verrenkungen des Sternal-Endes des Schlüsselbeins ¹⁾.

Die Incisura clavicularis des Brustbeins wird nach Unten durch den Knorpel der ersten Rippe gleichsam vervollständigt, so dass eine Verrenkung des Sternal-Endes der Clavicula nach unten ohne vorherigen Bruch jenes Knorpels unmöglich ist. Dagegen kann dasselbe nach Vorn, nach Oben und nach Hinten ausweichen. In diesen drei Richtungen sind auch Verrenkungen des Schlüsselbeins beobachtet worden. Bei allen dreien kommt, sobald die Verrenkung vollständig ist, noch eine Verschiebung nach Innen hinzu, welche abgesehen von der äusseren Gewalt, durch den grossen Brustmuskel, welchem das Schlüsselbein keinen Widerstand mehr leisten kann, herbeigeführt wird.

1) Verrenkung nach Vorn, Luxatio praesternalis.

Aetiologie. Durch directe Einwirkung kann die an ihrer hinteren Seite durchaus geschützte Clavicula nicht nach Vorn gestossen werden; dies ist nur indirect durch eine die Schulter nach Hinten drängende Gewalt möglich. Boyer erläuterte den Mechanismus dieser Verrenkung in der Art, dass er für die Mehrzahl der Fälle ein Anstemmen des Mittelstücks des Schlüsselbeins gegen die erste Rippe beim Zurückdrängen der Schulter annahm, wodurch das Schlüsselbein in einen zweiarmigen Hebel umgewandelt werde. Nach Morel-Lavallée dagegen wirkt das Schlüsselbein als einarmiger Hebel, dessen Stützpunkt an dem hinteren Theile der Incisura clavicularis sterni sich

¹⁾ Vgl. Morel-Lavallée, Essai sur les luxations de la clavicule, Annales de la chirurgie, Paris 1843, Tom. IX. pag. 145, 258 etc.

befindet. Den Widerstand leisten die vorderen Gelenkbänder, und die Kraft wirkt auf das andere Ende des Knochens, mithin durch Vermittelung eines Hebelarmes von der Länge des ganzen Schlüsselbeins. Das Sternal-Ende der Clavicula durchbricht, indem es nach Vorn gedrängt wird, das Kapselband, tritt noch mehr nach Vorn und wird unter dem weiteren Einflusse der äusseren Gewalt und gleichzeitiger Mitwirkung der vom Rumpf zur Schulter laufenden Muskeln aus allen Verbindungen gelöst und weiter verschoben.

Die erste Rippe könnte somit der Entstehung der Verrenkung eher hinderlich als förderlich sein, indem der zwischen ihr und dem Acromial-Ende des Schlüsselbeins gelegene Hebelarm sehr viel kürzer, und daher weniger wirksam ist, als der durch den ganzen Knochen bis zum Rande der Incisura clavicularis gebildete. Ueberdies würde die erste Rippe kein sehr haltbares Hypomochlum sein, sondern unter der Einwirkung einer bedeutenden Gewalt alsbald zerbrechen, oder, im Falle sie sehr elastisch wäre, die Kraft beträchtlich schwächen.

Die Veranlassung war bald ein Fall auf den vorderen Theil der Schulter, oder auf den vom Rumpf entfernt gehaltenen Ellenbogen, bald ein plötzlicher und unerwarteter Druck, wie z. B. durch den Tragriemen einer Kiepe, die schwer belastet auf dem Rücken getragen wird, und, während der Träger ausruht, plötzlich von ihrem Stützpunkt abgelenkt, bald ein unsanfter Versuch, einen krumm stehenden Rekruten durch Zurückziehen der Schultern gerade zu richten, zumal wenn dabei das Knie gegen den Rücken gestemmt wird.

Die Verrenkung nach Vorn kann vollständig oder unvollständig sein. Im letzteren Falle ist der vordere Theil der Kapsel allein zerrissen (Cooper), oder auch bloß ausgedehnt (Bichat). Bei der vollständigen Luxation dagegen sind alle Bänder zerrissen und das Schlüsselbein ist mit dem Meniscus nach Vorn und zugleich abwärts getreten (Cooper). Die Sternal-Portion des Köpfnickers ist nach Vorn und Unten gedrängt, vielleicht sogar zerrissen.

Symptome. Der Schmerz hört bald auf, wird aber durch Bewegung der Schulter oder Berührung der leidenden Stelle wieder erregt. Die Haltung des Arms ist wie beim Bruch der Clavicula. Derselbe kann in jeder Richtung, wengleich mit Schmerz, bewegt werden; die Erhebung des Arms ist besonders schwierig und schmerzhaft.

Bei der unvollkommenen Verrenkung findet man in der Höhe der Incisura clavicularis eine kleine, harte, wenig schmerzhaftes Geschwulst, welche den Bewegungen der Clavicula folgt, insbesondere durch Zurückdrängen der Schulter vergrößert, durch Vorwärtsschieben derselben verkleinert wird oder verschwindet, aber sogleich zurückkehrt, wenn man die Theile sich selbst überlässt.

Bei der vollständigen Verrenkung erscheint die Schulter

schmäler, die Fossa supra- und infraclavicularis weiter nach Innen gerückt und die erstere auf Kosten der letzteren vergrössert. Die Clavicula ist schräg nach Innen und Unten getreten, die innere Portion des Sternocleidomastoideus umfasst ihr Sternal-Ende, während die äussere nach Vorn und Innen verschoben ist und deutlich hervorspringt. Das innere Ende der Clavicula erscheint vor der Incisura clavicularis sterni als eine feste Geschwulst, welche den Bewegungen der Scapula in derselben Art, nur in noch grösserem Maassstabe folgt, wie bei der unvollkommenen Verrenkung. Sie kann bis zu 8 Centimeter hinabsteigen. Die Stelle des Gelenkes wird als eine Vertiefung oder doch als eine nachgiebige Stelle deutlich erkannt.

Die Diagnose ist so leicht, dass man kaum begreift, wie eine Exostose oder ein Schlüsselbeinbruch Irrthümer veranlassen können. In letzterer Beziehung ist entscheidend, dass die Länge des Schlüsselbeins durch die Verrenkung nicht verändert wird. Ein hoher Grad von Erschlaffung des Gelenkes könnte mit einer unvollkommenen Verrenkung verwechselt werden, unterscheidet sich aber durch die allmähliche Entstehung und dadurch, dass der Kranke die Difformität, wenigstens vorübergehend, willkürlich beseitigen kann.

Die Prognose ist günstig: selbst ohne Kunsthilfe kehrt die Brauchbarkeit der Extremität zurück, freilich mit bleibender Difformität; durch zweckmässige Behandlung kann man letztere verhüten.

Zur Reduction drängt man die Schulter nach Hinten und den Ellenbogen nach Vorn, übt dann einen Druck auf das Sternal-Ende des Schlüsselbeins aus und schiebt gleich darauf die Schulter nach Vorn und die Ellenbogen nach Hinten. Zur Retention dienen schräg über das verrenkte Glied verlaufende Bidentouren, die mit Gyps befestigt werden, oder, wo diese nicht zureichen, ein Bruchband, dessen Pelotte auf das Sternal-Ende der Clavicula gelegt wird, — auch der auf demselben Princip beruhende Apparat von Méliér.

2) Verrenkung nach Oben, *Luxatio suprasternalis*, wäre, nach Boyer, unmöglich, weil sie nur zu Stande kommen könnte, wenn eine ungeheure Gewalt auf das äussere Ende des Schlüsselbeins, wie auf den langen Arm eines zweiarmigen Hebels einwirkte, dessen Stützpunkt die erste Rippe wäre. An dieser Ansicht ist, wie Morel-Lavallée gezeigt hat, richtig, dass eine grosse Gewalt die Schulter abwärts drängen muss, was in der That selten geschieht; dagegen dient die erste Rippe niemals als Hypomochlion, wie dies bei der Verrenkung nach Vorn bereits erörtert ist.

Der anatomische Nachweis dieser seltenen Luxation ist geliefert. R. W. Smith (Dublin Journ. of med. sc. 1872, Decbr.) fand bei einem Menschen, welcher von einem

Wagen gequetscht worden war, die Gelenkfläche der Extr. stern. claviculae oberhalb des Sternum in Berührung mit dem inneren Rand des Sternocleidom. der anderen Seite, einen Finger breit oberhalb der ersten Rippe. Pat., welcher namentlich beim Aufrichten an grosser Dyspnoe litt, starb 11 Tage darauf an einer anderen gleichzeitig erlittenen Verletzung. Bei der Section fand sich der obige Befund bestätigt. Der Sternalkopf des Kopfnickers derselben Seite kreuzte das Sternalende des Schlüsselbeins. Hinter letzterem lag der M. sternohyoideus und die vordere Trachealwand. Alle Bänder, auch das Lig. costoclaviculare, waren zerrissen, der Meniscus vom Sternum losgerissen und mit der Clavicula nach Oben verschoben. — Frühere Beobachtungen am Lebenden machten Sédillot (Dictionnaire des études médicales pratiques) und Baraduc. Ersterer beschreibt eine unvollständige Verrenkung des rechten Schlüsselbeins. Die Veranlassung war ein Fall in einen tiefen Graben mit der rechten Schulter voran. Die Schulter stand etwas tiefer, das Acromion etwas weiter nach Vorn und etwa 50 Millim. weiter nach Innen. Der untere Winkel des Schulterblatts war näher an die Wirbelsäule gerückt und ragte stärker hervor. Bei jeder Bewegung des Armes hörte man ein deutliches Krachen; zugleich empfand der Verletzte Schmerzen im Sterno-Clavicular-Gelenk. Hier fand sich zwischen den beiden Köpfen des Kopfnickers ein durch das Sternal-Ende des Schlüsselbeins gebildeter Vorsprung; die innere Portion des Kopfnickers war gespannt, die äussere erschlaffte, der Kopf nach der kranken Seite geneigt. Unter Anwendung eines Contentiv-Verbandes verschwanden die Schmerzen, und der Kranke konnte den Arm wieder frei bewegen, aber die Clavicula stand höher und zugleich etwas weiter nach Vorn als die andere. — Baraduc sah eine vollständige Verrenkung des linken Schlüsselbeins, gleichfalls in Folge eines Sturzes auf die Schulter. „Das Sternal-Ende des Schlüsselbeins steht auf der Incisura jugularis sterni. Lässt man den Kopf nach der kranken Seite neigen und drückt die Haut tief zwischen den beiden Portionen des Kopfnickers ein, so fühlt man eine glatte, dreieckige, nach Rechts stehende Fläche, rechtwinklig zum oberen Rande des Sternum. Die Portio sternalis des Kopfnickers ist nach Vorn gedrängt und umfasst etwa das vordere Drittel des Sternal-Endes der Clavicula, während der hintere Umfang desselben vom Sternohyoideus umfasst ist, so dass die Extremitas sternalis claviculae zwischen beiden Muskeln, wie in einer Schlinge ruht. Unter dem inneren Drittheil des Schlüsselbeins fühlt man, besonders wenn man die Haut etwas eindrückt, eine beträchtliche Vertiefung, welche nach Unten von der ersten Rippe, nach Innen von der Incisura clavicularis sterni begrenzt wird.“ Durch einen Verband, welcher den Ellenbogen und somit das Acromial-Ende des Schlüsselbeins erhob, das Sternal-Ende desselben aber abwärts drückte, wurde vollständige Heilung erzielt. — Ein Gypsverband oder ein passendes Bruchband dürften die Befestigung des verrenkten Gelenk-Endes sicherer erreichen lassen.

3) Verrenkung nach Hinten, *Luxatio retrosternalis*. Die Veranlassung ist ein gewaltsames Vorwärtsstossen der Schulter oder ein plötzlicher heftiger Zug am Arm nach Vorn bei fixirtem Rumpf. Ausnahmsweise kann eine das Sternal-Ende des Schlüsselbeins nach Hinten drängende Gewalt diese Verrenkung veranlassen.

Im Moment der Verletzung entsteht heftiger Schmerz, auch wohl Ohnmacht. Bei bedeutender Verschiebung treten Athem- und Schlingbeschwerden auf; erstere können sich bis zur Erstickung steigern, letztere, sowie auch Störungen der Circulation, sind selten. Haltung

des Arms wie beim Bruch des Schlüsselbeins; active Bewegungen veranlassen Schmerz und sind kraftlos, besonders wenn der Ellenbogen nach Vorn gebracht wird. Die Schulter steht etwas niedriger und der Mittellinie näher. Bewegungen des Halses sind behindert.

J. B. Petit beschreibt diese Verrenkung, jedoch, wie es scheint, ohne sie beobachtet zu haben. Desault u. A. hielten sie für beinahe unmöglich. Es giebt aber genau beobachtete Fälle. Der erste wurde von Duverney bei der Section entdeckt. Den zweiten hat Pellioux (*Revue médicale*. Paris 1834) beschrieben; zwei wurden von Englischen Wundärzten, vier von Morel-Lavallée, mehrere vereinzelt von Anderen beobachtet.

Man unterscheidet zwei Varietäten der Verrenkung nach Hinten.

a) Verrenkung nach Hinten und Unten. Das Acromial-Ende des Schlüsselbeins steht höher, als an der gesunden Seite, auch höher, als das mit ihm verbundene Acromion. Verfolgt man das Schlüsselbein mit dem Finger von Aussen nach Innen, so fühlt man, sofern keine bedeutende Geschwulst besteht, die leere *Incisura clavicularis sterni*. Mit dem Schlüsselbein zugleich ist die *Portio clavicularis* des Kopfnickers nach Hinten und Innen gerückt. Die Schulter lässt sich nur durch sehr bedeutende Gewalt bewegen. Durch kräftigen Zug nach Hinten und Aussen gelingt vorübergehend die Reduction; aber mit dem Nachlass des Zuges kehrt unter deutlichem Geräusch die frühere Difformität wieder. — In der Hälfte der Fälle verwandelte sich die Verrenkung nach Hinten und Unten alsbald in die:

b) Verrenkung nach Hinten und Oben. Hier findet sich statt der Fixation der Schulter grosse Beweglichkeit. Man sieht und fühlt die *Clavicula* in ihrer ganzen Länge. Ihr Sternal-Ende bildet oberhalb des Brustbeins eine harte Geschwulst, welche den Bewegungen der Schulter nach Innen und Aussen direct folgt, bei anderen Bewegungen der Schulter aber in entgegengesetzter Richtung sich mitbewegt. Mit Leichtigkeit lässt sich die Reduction ausführen, aber die Verrenkung kehrt ebenso schnell zurück. Ob diese Verschiebung auch primär vorkomme, ist nicht entschieden.

Die Diagnose der Verrenkung nach Hinten und Oben ist leicht. Durch starkes Fettpolster oder bedeutende Geschwulst kann das Erkennen der Verrenkung nach Hinten und Unten schwierig werden. In solchen Fällen ist das Hervorstehen des Acromial-Endes des Schlüsselbeins über dem Acromion ein wichtiges Zeichen.

Prognose. Die Brauchbarkeit der Extremität wird, auch wenn die Verrenkung nach Hinten nicht reducirt wird, nur wenig beeinträchtigt, jedoch mehr als bei anderen Luxationen der *Clavicula*. Bei richtiger Behandlung erfolgt die Heilung in der Art, dass sich oft gar nicht erkennen lässt, auf welcher Seite die Verrenkung bestand.

Behandlung. Die Reduction gelingt bei der Verrenkung nach Hinten und Oben leicht, wenn man den Ellenbogen nach Vorn, Innen und Oben führt. Bei der Verrenkung nach Hinten und Unten ist sie etwas schwieriger. Man muss an dem Arme nach Hinten und Aussen extendiren, während man mit einem unter der Achsel um Schulterblatt und Thorax angelegten Tucho die Contra-Extension macht. —

Die Retention macht grössere Schwierigkeiten. Die für den Bruch des Schlüsselbeins empfohlenen Verbände, welche durch Zurückziehen der Schulter wirken, wurden mit Vortheil angewandt. Morel-Lavallée empfiehlt den Velpeau'schen Verband (pag. 409).

2. Verrenkungen des Schulterblatts, Verrenkungen des Acromion, Verrenkungen des äusseren oder Acromial-Endes des Schlüsselbeins¹⁾.

Die durch feste Bänder gesicherte Verbindung zwischen dem Acromial-Ende des Schlüsselbeins und dem Acromion liegt zwischen dem zu Fracturen höchst geneigten Schlüsselbein einer und dem zu Verrenkungen im höchsten Grade prädisponirten Schultergelenk anderer Seits. Daher die Seltenheit dieser Luxationen.

Verrenkungen nach Vorn und nach Hinten sind, wenn sie überhaupt vorkommen, jedenfalls nicht von Dauer, sondern verwandeln sich durch das Gewicht der Extremität und den Muskelzug in Verrenkungen nach Unten oder nach Oben. Bei letzterer steht das Acromial-Ende des Schlüsselbeins entweder oberhalb oder unterhalb des Processus coracoïdes, so dass sich drei Arten ergeben.

a) Verrenkung des Schulterblatts nach Unten, *Luxatio scapulae infraclavicularis*, nach Anderen: Verrenkung des äusseren Endes des Schlüsselbeins nach Oben²⁾.

Die gewöhnliche Veranlassung ist ein Fall auf die Schulter, bei welchem der Rumpf einen Stoss nach Vorn erhält. Der Eine fiel eine Treppe hinab, der Andere stürzte von einem Wagen, indem er eine Klobe Holz hinabschleudern wollte, ein Dritter fällt beim Laufen, beim Ringen u. dgl. m. Trifft eine Gewalt gerade von Aussen auf die Schulter, so setzt sich der Stoss auf das Schlüsselbein fort und es folgt wahrscheinlich Bruch desselben; wirkt aber der Stoss zugleich

¹⁾ Verrenkung des Schulterblattes und Schlüsselbeins zugleich (Verrenkung beider Enden des Schlüsselbeins) ist äusserst selten: 1) Fall von Porral (*Journal hebdomadaire de médecine*, 1831). Das Sternal-Ende des Schlüsselbeins war nach Vorn und Oben, das Schulterblatt nach Vorn und Unten (nach Anderen: das äussere Ende des Schlüsselbeins nach Oben und Hinten) verrenkt. Letztere Verrenkung wurde *reducit* und vollkommen geheilt; bei der ersteren fand keine Einrenkung Statt, wodurch jedoch die Brauchbarkeit der Extremität nicht wesentlich beeinträchtigt wurde. 2) Fall von Col (*Gaz. des hôp.* No. 112, 1872). Bei einem jungen Mädchen war das Sternal-Ende des Schlüsselbeins nach Vorn, das Acromial-Ende nach Oben luxirt.

²⁾ Diese relativ häufigste unter den Verrenkungen des Acromio-clavicular-Gelenkes ist keineswegs so selten, wie Petit glaubte. Morel-Lavallée hat in zwei Jahren 5 im Hôpital de la Pitié gesammelt. Ich selbst habe deren bereits 7 gesehen.

von Hinten auf den Rumpf ein, so wird die Schulter nach Unten und Innen geschoben, die Gelenkflächen kommen in eine schiefe Stellung gegen einander und die Bänder sind allein noch zu überwinden. Man hat diese Verrenkung auch bei einem Fall auf den Ellenbogen entstehen sehen. Der vom Rumpf entfernte Humerus drängt die Scapula nach Innen und Oben; da er aber zunächst auf den Gelenktheil der Scapula einwirkt, so kann, während dieser erhoben wird, das Acromion abwärts geschoben werden. Endlich kann diese Verrenkung auch durch directe Gewalt entstehen, indem ein schwerer Körper, ein Balken u. dgl. auf die Schulter auffällt oder von ihr abgelenkt, sofern dadurch (was freilich selten ist) das Acromion allein abwärts oder das äussere Ende des Schlüsselbeins aufwärts getrieben wird.

Symptome. Die Haltung der Extremität ist wie bei *Fractura clavicularae*. Der Kranke hat zuweilen die Empfindung des Zerreisens in seiner Schulter gehabt, empfindet aber nur ausnahmsweise heftige Schmerzen. Der Hals ist oft steif; der Kopf, etwas nach der Seite der Verletzung geneigt, wird nur mit dem Rumpfe zugleich bewegt. Bewegungen des Arms sind beschwerlich, jedoch alle ausführbar, auch Rotationen des Humerus.

Ist die Luxation unvollständig, so fühlt man auf der Schulter eine kleine runde Geschwulst, die mit der Clavicula zusammenhängt. Erhebt man den Arm bis zur verticalen Stellung, so verschwindet die Geschwulst, kehrt aber sogleich zurück, sobald man ihn sich selbst überlässt. Zuweilen ist die Hervorragung so unbedeutend, dass nur eine genaue Vergleichung mit der gesunden Seite sie erkennen lässt.

Bei der vollständigen Verrenkung ist die Difformität viel bedeutender. Das Schlüsselbein liegt auf dem Acromion, kann dasselbe sogar nach Aussen überragen und bis zu 4 Centm. oberhalb desselben stehen, wodurch dann die Schulter abgeflacht erscheint. Diese Lage-Veränderung des Schlüsselbeins kann mit dem Auge und den Fingern erkannt werden. Fasst man das Schlüsselbein in der Mitte und bewegt es hin und her, so folgt die Geschwulst über dem Acromion seinen Bewegungen. Drängt man den Arm schräg aufwärts und auswärts, so verschwindet die Geschwulst, und die Schulter erhält ihr normales Ansehen, jedoch nur für so lange als der Arm in dieser Stellung erhalten wird. Drückt man das Schlüsselbein zugleich abwärts, so gelingt die Einrenkung noch leichter. Bei diesen Bewegungen der verrenkten Knochen gegen einander hört und fühlt man nicht selten ein Reibe-Geräusch, welches durch die Berührung der zerrissenen Bänder, oder der Gelenkknorpel bedingt wird. Zuweilen besteht schmerzhaftige Spannung der Clavicular-Portion des Trapezius.

Nur bei grosser Unachtsamkeit könnte eine Verwechslung mit *Luxatio humeri*, eber noch mit *Fractura acromii* Statt finden. Da findet sich auch Abflachung der Schulter und auf ihrer Höhe ein beweglicher Knochenvorsprung, die Bewegungen des Arms sind gleichfalls machtlos; aber das Bruchstück des *Acromion*, welches mit dem Schlüsselbein in Zusammenhang bleibt, bewegt sich unter *Crepitation* an der Bruchfläche der *Spina scapulae*; auch geht die Entfernung des hervorragendsten Theiles der Geschwulst vom dem *Sterno-clavicular-Gelenk* über die Länge der *Clavicula* hinaus.

Als Beispiel diene nachstehender Fall, welcher (zuletzt einem zweiten, ganz analogen) in meiner Klinik 1859 beobachtet wurde. Ein Säulen-Arbeiter gerieth in der Weise zwischen den Pumpenhebel und die Windmühlwelle des Getrieberwerkes, dass sein Thorax in der Richtung von der linken Schulter nach der rechten Achselhöhle hin zusammengedrückt wurde. Am Tage nach der Verletzung ergab sich folgender Befund. Heftiger Hostenreiz, Schmerzhaftigkeit im Thorax, namentlich in der Gegend der zweiten Rippe, woselbst sich eine, besonders beim Druck erheblich schmerzhaft Stelle findet, während keine *Crepitation* entdeckt werden kann. Der Kranke athmet fast allein mit dem Zwerchfell; nur an den untersten Rippen ist bei der Inspiration eine geringfügige Bewegung zu bemerken. An der linken Schulter gewahrt man sofort einen scharf begrenzten Vorsprung, über welchen sich die äusseren Bedeckungen hinwegspannen; die Wölbung der Schulter ist links bedeutend geringer als auf der anderen Seite; der Arm hängt schlaff herab und kann nur mit Mühe bis zu einem halben rechten Winkel erhoben werden. Passive Bewegungen im *Humerus-Gelenk* sind vollkommen frei. Die Entfernung vom *Sterno-clavicular-Gelenk* der kranken Seite bis zum oben erwähnten scharf begrenzten Vorsprung beträgt genau soviel, wie die Länge des Schlüsselbeins auf der gesunden Seite. Mit dem Finger kann man leicht die unversehrte Continuität der linken *Clavicula* zwischen den eben angeführten Punkten fühlen. Verfolgt man in gleicher Weise die linke *Spina scapulae*, so findet man das *Acromion* unterhalb jenes als *Acromial-Ende* des Schlüsselbeins erkannten Vorsprungs. Die Entfernung zwischen den letzterwähnten beiden Punkten beträgt 1 Ctm.; der *Processus coracoideus* der linken Seite ist ganz in der Tiefe und undeutlich, der der rechten sehr leicht und oberflächlich zu fühlen; die *Articulatio sterno-clavicularis* der linken Seite bildet eine gleichmässige Wölbung, in welcher das innere Ende des Schlüsselbeins weniger deutlich hervortritt. Der äussere Saum des *M. cucullaris* tritt sehr deutlich hervor und ist gespannt. Drückt man auf das dislocirte *Acromial-Ende* der *Clavicula* von Oben und Hinten nach Vorn und Unten, und drängt vom *Cubital-Gelenk* aus den Oberarm nach Oben und Hinten, so ist die bestehende *Difformität* sofort ausgeglichen. Nachdem der Verletzte acht Tage lang eine *Mitella* getragen hatte, war er von der Arbeit nicht mehr zurück zu halten. Die Brauchbarkeit des Arms stellte sich vollkommen wieder her; eine unbedeutende *Difformität* blieb zurück. Vgl. Pistor, de *luxatione acapulae infraclaviculari*. Diss. Gryphiae 1859.

Prognose. Die unvollständige Verrenkung hat durchaus keine Bedeutung. Auch die vollständige hinterlässt selbst im unglücklichsten Falle nur eine *Difformität*. Bei zweckmässiger Behandlung kann auch diese vermieden werden.

Behandlung. Die Reduction erfolgt, indem man die Clavicula abwärts drückt und den Arm nach Aussen und Oben schiebt. Die Retention ist schwierig. Alle für die Fractura claviculae empfohlenen Verbände sind auch bei dieser Verrenkung angewandt worden, besonders der Boyer'sche, welchen Baraduc zu diesem Behufe modificirt hat, indem er die vom Ellenbogen zur kranken Schulter aufsteigenden Touren durchschneidet und auf letzterer zusammenknüpft, um sie je nach Bedürfniss fester zusammenknotten zu können. Man kann das Acromial-Ende der Clavicula auch durch ein Tourniquet abwärts drücken, welches man um die Schulter und den gebeugten Ellenbogen anlegt und entsprechend stark spannt (Laugier). Eine gut angelegte Mitella oder der Velpeau'sche Verband genügen.

Männer lässt man zur Nachbehandlung einen festen Hosenträger, nur über die kranke Schulter gelegt, tragen.

b) Verrenkung des Schulterblatts nach Oben, Luxatio scapulae supraclavicularis, nach Anderen: Verrenkung des Schlüsselbeins nach Unten. Lange Zeit hat man diese Verrenkung nur a priori demonstrirt und daher vielfach über dieselbe gestritten. Duverney und Boyer erkannten sie gar nicht an. J. L. Petit hatte sie zwar niemals beobachtet, behauptete aber dennoch, dass sie häufiger sein müsse, als die Verrenkung des Schulterblatts nach Unten, die er selbst mehrmals gesehen hatte. Wir besitzen jetzt vier genau beschriebene Fälle¹⁾. Durch diese wird die frühere, von Morel-Lavallée schon durch Experimente an Leichen bekämpfte Ansicht, dass nur bei gleichzeitiger Fractur des Processus coracoïdes eine Verrenkung des Schulterblatts nach Oben möglich sei, widerlegt. Diese Fractur würde allerdings erfolgen müssen, wenn das Schulterblatt während seiner Verschiebung nach Oben gar keine andere Bewegung machen, sich nicht drehen und nicht nach Hinten ausweichen könnte.

Die anatomischen Veränderungen, welche man bei Sectionen gefunden hat und auch durch Versuche an der Leiche nachweisen kann, sind folgende. Die Ligamenta acromio-clav. und coraco-clavic. sind gänzlich zerrissen; nur wenn man dieselben durchschneidet, ist es möglich, die Verrenkung an der Leiche zu Stande zu bringen. Die Gelenkflächen haben einander vollständig verlassen, eine unvollständige Verrenkung kommt gar nicht vor. Das äussere Ende des Schlüsselbeins steht unter dem Acromion und kann letzteres sogar nach Aussen überragen. Die Basis scapulae steht nicht einfach den Rippen näher,

¹⁾ Mell (Nova acta medico-physica), Reduction, genaue Section, Tournel (Archives de médecine 1837, T. XV. pag. 463), Baraduc (ungenau), Uhde (Deutsche Klinik 1852, No. 28).

wie bei der *Luxatio infraclavicularis*, sondern hat mit ihrem unteren Winkel eine Wendung nach Hinten gemacht. Ohne diese Drehung des Schulterblatts wäre das Eindringen des Schlüsselbeins zwischen Acromion und *Processus coracoides* unmöglich.

Der Mechanismus, durch welchen diese Verrenkung entsteht, ist, nach Morel-Lavallée, folgender. Eine grosse Gewalt drängt das Acromion aufwärts, oder das äussere Ende des Schlüsselbeins abwärts. Letzteres schiebt den *Processus coracoides* nach Hinten und durchbricht die Kapsel in ihrem unteren Umfange. Unter dem Zuge des Trapezii, der Rhomboidei, des *Levator anguli scapulae*, und besonders des *Serratus anticus major*, wird der obere Theil des Schulterblattes nach Innen geschoben. Da der Widerstand der inzwischen zerrissenen *Ligamenta acromio- und coraco-clavicular.* fehlt, so tritt das äussere Ende des Schlüsselbeins, theils durch die Einwirkung der äusseren Gewalt, theils durch den Zug der genannten Muskeln, denen sich die zum Oberarm laufenden Brust- und Rückenmuskeln, sowie der *Pectoralis minor* hinzugesellen, zwischen das Acromion und den *Processus coracoides*. — Uhde hält überdies die abducirte Stellung des Oberarms für erforderlich, weil das *Caput humeri* sonst der nach Unten ausweichenden *Clavicula* ein Hinderniss entgegenstellen würde.

Die Veranlassung war ein Fall oder ein Schlag auf die Schulter, namentlich den unteren Rand des Acromion, oder ein Schlag auf das äussere Ende des Schlüsselbeins, während das Schulterblatt durch Aufstemmen des Arms fixirt wurde.

Symptome. Die Schmerzen sind nicht bedeutend, werden aber durch jeden Versuch zur Bewegung sehr gesteigert; im Arm kann das Gefühl von Ameisenkriechen in Folge eines Druckes auf den *Plexus brachialis* bestehen. Der Kranke vermag den Arm nur wenig zu bewegen, besonders gar nicht zu erheben. Passive Bewegungen sind in einiger Ausdehnung möglich. Der Arm hängt am Rumpf gerade herab oder liegt ihm dicht an; diese Haltung wird durch die Verschiebung des Gelenktheils der *Scapula* nach Innen bedingt. Der Arm (vom Acromion aus gemessen) ist verlängert, indem die *Clavicula* mit ihrem äusseren Ende das Acromion emporhebt; jedoch ist diese Verlängerung inconstant und zuweilen nur scheinbar. Je weiter nämlich das Acromial-Ende des Schlüsselbeins nach Hinten rückt, desto geringer wird die Erhebung der Schulter, desto unbedeutender also auch die Verlängerung. Eine Neigung des Rumpfes nach der verletzten Seite kann den Arm beträchtlich länger erscheinen lassen. Die leidende Schulter steht alsdann niedriger, als die gesunde; rückt man aber den Oberkörper gerade, so steht sie höher, als die andere (Uhde).

Die Schulter erscheint abgeflacht, das Acromion ragt stark hervor, an seiner inneren Seite ist eine Vertiefung; das daselbst fehlende äussere Ende des Schlüsselbeins ragt zuweilen unter dem Acromion nach Aussen hervor. Besteht keine Geschwulst, so kann man das zur Gelenkverbindung mit dem Schlüsselbein bestimmte Grübchen an der inneren Seite des Acromion fühlen. Der untere Winkel des Schulterblatts ragt stark nach Hinten oder nach Hinten und Aussen hervor; das Acromion ist dem Sternum näher gerückt.

Die Prognose ist, selbst ohne Kunsthilfe, meist günstig. So lange das Schlüsselbein in seiner neuen Stellung noch nicht befestigt ist, sind Erhebung und Abduction des Armes nicht möglich, weil die für die Wirkung der vom Schulterblatt zum Arme hinabsteigenden Muskeln nothwendige Stütze fehlt, und der mit dem Gelenk-Ende des Schulterblatts nach Innen gerückte Oberarmkopf auf die in der Achselhöhle gelegenen Theile drückt, wenn der Arm abducirt wird. Sobald aber das äussere Clavicular-Ende unter dem Acromion durch ein „neues Gelenk“ befestigt ist, kehrt auch die Brauchbarkeit des Arms grössten Theils zurück.

Behandlung. Die Einrenkung gelingt durch blosses Zurückziehen der Schultern. Uhlé schob ausserdem das Schlüsselbein aufwärts. Zur Retention genügt eine Mitella.

c) Besonders zu erläutern ist diejenige Varietät der Verrenkung des Schulterblatts nach Oben, bei welcher nicht blos das Acromion, sondern auch der Processus coracoïdes über das äussere Ende des Schlüsselbeins hinaufrückt (Verrenkung des Acromial-Endes des Schlüsselbeins unter den Processus coracoïdes), welche die meisten Schriftsteller ihrer grossen Seltenheit wegen gar nicht erwähnen. Godemer (Recueil des travaux de la Société médicale d'Indre et Loire. 1843.) hat 5 Fälle der Art gesammelt, Pinjon (Journal de médecine de Lyon. Juillet 1842.) einen beobachtet.

Von den anatomischen Veränderungen können wir uns nur aus Versuchen an Leichen ein Bild entwerfen, da Sectionen nicht vorliegen. Die vom Processus coracoïdes und vom Acromion zum Schlüsselbein verlaufenden Bänder müssen gänzlich zerrissen werden. Das äussere Ende des Schlüsselbeins stemmt sich gegen das Schultergelenk, der Pectoralis minor ist aufs Aeusserste gespannt, der vordere Winkel des Schulterblatts sieht nach Innen, der untere nach Hinten u. s. f.

Symptome. Die Schulter ist abgeflacht und nach Vorn geschoben, der Arm hängt am Rumpfe herab, kann leicht bewegt werden, nur nicht nach Innen und Oben. In dem verrenkten Geleuke bestehen heftige Schmerzen; die Umgegend des Acromion, besonders nach Vorn, ist stark mit Blut unterlaufen, wahrscheinlich in Folge der directen Einwirkung einer bedeutenden Gewalt. Die Clavicula kann, zumal an ihrem äusseren Ende, nur unendlich gesehen und gefühlt werden; man will letzteres dagegen von der Achselhöhle aus mit dem Finger erreicht haben. Die Entfernung vom Acromion zur Articulatio sterno-clavicularis muss beträchtlich vergrössert sein. Man darf bei ihrer Messung nicht vergessen, dass die Clavicula abwärts gedrängt und das

Acromion nach Innen geneigt ist, und muss daher, wenn man die wirkliche Entfernung zwischen dem Acromion und dem Sternum messen will, den hinteren Rand und den unteren Winkel des Schulterblatts erst wieder bis zu ihrer normalen Stellung an den Rumpf andrücken. Die alsdann nachweisbare Vergrößerung des Zwischenraums zwischen Sternum und Acromion würde allein zur Diagnose hinreichen, da sie bei anderen Verletzungen nicht vorkommt. Ueberdies wird dieselbe durch die oberflächliche und bewegliche Stellung des Processus coracoïdes gesichert.

Trotz der sehr bedeutenden Verschiebung sind besonders gefährliche Zufälle nicht beobachtet worden.

Die Veranlassung war immer ein Fall auf die vordere Seite der Schulter. Nach Morel-Lavallée ist ein zweifacher Mechanismus möglich: I. Indem eine äussere Gewalt das Schulterblatt von Vorn her trifft und nach Hinten und Aussen stösst, wird das Schlüsselbein durch die ersten Rippen, durch seine Gelenkverbindung mit dem Sternum und durch die *Mm. subclavius* und *pectoralis major* in seiner Stellung festgehalten; es erfolgt daher bei hinreichender Grösse der Gewalt die Zerreiassung der *Ligamenta coraco-claviculare* und *claviculo-acromiale*; sofort tritt unter dem Zuge des *Pectoralis major* das Schlüsselbein mit seinem äusseren Ende vor den Processus coracoïdes und den *Pectoralis minor* hinab und drängt letzteren unter jenen Fortsatz. II. Das Schulterblatt wird durch die äussere Gewalt, welche fast ausschliesslich auf das Acromion einwirken muss, nach Aussen gedrängt, die von ihm zum Schlüsselbein gehenden Bänder werden zerrissen, beide Knochen sind für einen Augenblick gar nicht mit einander in Berührung, im nächsten Moment aber zieht die vereinte Kraft der vom Thorax zum Acromion und zum Processus coracoïdes verlaufenden Muskeln den äusseren Winkel des Schulterblatts nach Vorn, Innen und Unten; das äussere Ende des Schlüsselbeins, inzwischen durch den *Pectoralis major* abwärts gezogen, gleitet hinter den *Pectoralis minor* und somit unter den Processus coracoïdes.

Behandlung. Einrenkung und Retention sind leicht. Ein Gehülfe ergreift den Humerus an seinem oberen Theile mit der rechten und nahe dem Ellenbogengelenk mit der linken Hand und übt mit ersterer in horizontaler Richtung einen kräftigen Zug aus, während er mit letzterer den Ellenbogen gegen den Rumpf andrückt. Inzwischen sucht der Wundarzt den äusseren Winkel des Schulterblatts zu erheben. Lässt man die Extension, statt in der eben angegebenen Weise, an dem abducirten Arme ausführen, so kann die Spannung des *Pectoralis major* und des *Coracobrachialis* hinderlich werden. Wäre für die Extension grosse Kraft nöthig, so müsste man in der zuerst erwähnten Stellung die rechte Hand des Gehülften durch eine Schlinge ersetzen, an welcher mehrere Hände ziehen können. Da mechanische Hindernisse gar nicht zu überwinden sind, sondern ausschliesslich Muskeln, welche durch ihre Spannung die verrenkten Knochen in ihrer abnormen Stellung erhalten, so muss die Anwendung des Chloroforms von besonders grossem Vortheil sein. — Nach gelungener Einrenkung hat man den Desault'schen Verband mit gutem Erfolg angelegt; der Velpéau'sche dürfte die Retention in noch einfacherer Weise sichern. — Ob nach der Reduction besondere Neigung zu abermaliger Verschiebung besteht, ist nicht bekannt; wahrscheinlich würde, wenn eine neue Verschiebung einträte, vielmehr eine *Luxatio infraclavicularis* entstehen.

3. Verrenkungen im Schultergelenk, Verrenkungen des Oberarms. Luxationes humeri.

Die Verrenkungen des Oberarmkopfes (Schulter-Verrenkungen im engeren Sinne) sind häufiger, als alle übrigen Verrenkungen zusammengenommen (vgl. pag. 665). Dies erklärt sich aus der freien Beweglichkeit und exponirten Lage des Gelenkes, der geringen Berührungsfläche zwischen dem Oberarmkopf und dem Schulterblatt, der Länge des Hebelarms, welchen die obere Extremität darstellt, der Weite der Gelenkkapsel, sowie endlich aus den mannigfaltigen Insulten, denen gerade der Arm ausgesetzt ist.

Die feste Decke, welche das Acromion und der Processus coracoïdes nebst dem sie verbindenden starken Bande oberhalb des Gelenkes bilden, macht, sofern die genannten Knochenvorsprünge nicht etwa abgebrochen sind, eine Verrenkung nach Oben unmöglich.

Als partielle Luxation nach Oben wurde von Soden ein Fall beschrieben, in welchem die lange Portion des Biceps auf das Tuberculum majus verschoben war. Es ist jedoch, nach den Untersuchungen von Stromeyer (Handbuch I, pag. 625), zweifelhaft, ob es sich in diesem Falle nicht vielmehr um die Resultate einer chronischen Gelenk-Entzündung handelte. — Malgaigne beschreibt einen Fall von Verrenkung nach Oben (*Luxation sus-coracoïdienne*), dessen Entstehungsgeschichte dadurch völlig verdunkelt wird, dass rohe Einrenkungsversuche stattfanden, bevor ihn Malgaigne sah. — Bourget (Monit. des hôpit., 1858. No. 79 u. f.) will nicht bloß incomplete, sondern auch complete Verrenkungen des Humerus nach Oben beobachtet haben. Da er jedoch selbst angiebt, der Oberarmkopf habe, deutlich sichtbar, unter und vor dem Acromialende der Clavicula, nach Innen vom Acromion und vor dem Proc. coracoïdes gestanden, so müssen diese sogenannten „completen Verrenkungen nach Oben“ vielmehr unter die *Luxatio subclavicularis* (l. a. 2. unserer Tabelle auf pag. 721) subsumirt werden. Die von Bourget aufgeführten Beobachtungen von „incompleter Verrenkung nach Oben“ haben nicht mehr Beweiskraft als der Fall von Soden. Vgl. Morel-Lavallée, Gaz. des hôp. 1858, Juin.

Der Gelenkkopf kann also nur an der unteren Hälfte des Gelenkrandes und zwar entweder nach Vorn oder nach Hinten, d. h. entweder unter dem Processus coracoïdes oder unter dem hinteren Rande des Acromion, die Gelenkfläche der Scapula verlassen. Die Verrenkung gerade nach Unten ist unwahrscheinlich, weil in der Mitte des unteren Randes der Gelenkfläche die Kapsel durch den Ursprung des langen Kopfes des Triceps bedeutend verstärkt wird.

Wir können daher die Verrenkungen im Schultergelenk zunächst in zwei Gruppen unterscheiden:

1) Der Oberarmkopf gleitet nach Unten und Vorn und verlässt die Gelenkfläche der Scapula zwischen dem Processus coracoïdes und dem Ursprunge des Triceps, zwischen welchen

sich ein dem Durchmesser des Gelenkkopfes ungefähr entsprechender Raum vorfindet;

2) Der Oberarmkopf verlässt die Gelenkfläche des Schulterblattes an ihrem hinteren Rande zwischen dem Acromion und dem Ursprunge des Triceps, zwischen welchen Punkten nur etwa halb so viel Raum ist.

Von diesen beiden Gruppen ist die erstere bei Weitem die häufigere; letztere ist sogar absolut selten. Bei ersterer wendet sich der Oberarmkopf gegen die Achselhöhle, bei letzterer gegen die Fossa infraspinata. Bei ersterer tritt er unter dem Processus coracoides hervor, bei letzterer unter dem Acromion; daher die Eintheilung von Malgaigne: *Luxations sous-coracoidiennes* und *sous-acromiales*.

Je nachdem der Gelenkkopf an dieser oder jener Stelle und der Arm in dieser oder jener Richtung stehen geblieben ist, wird die Luxation mit verschiedenen Namen belegt, welche wir zur leichteren Uebersicht in der nebenstehenden Tabelle (in beschränkter Auswahl) zusammenstellen.

Die Oberarm-Verrenkungen können, wie andere, vollkommen und unvollkommen sein. Mit letzterem Namen darf man jedoch nur diejenigen Fälle bezeichnen, in denen der Oberarmkopf noch mit einem Theil seiner Gelenkfläche die Gelenkfläche der Scapula berührt. Solche unvollständige Verrenkungen des Oberarms sind selten und kommen wohl ausschliesslich als Varietäten der Luxation nach Vorn (in dem oben angegebenen Sinne) vor.

Einige Mal ist beobachtet worden, dass beide Oberarmköpfe zugleich verrenkt waren, *Luxatio humeri duplex*.

Sanson erzählt folgenden Fall. Ein Lasträger schickte sich an, mit vornüber gebeugtem Oberkörper, während er die Arme ausgestreckt hielt und die Hände aufstützte, einen Getreidesack auf seinen Rücken aufladen zu lassen. Der Sack stürzte ihm auf den oberen Theil des Rückens, wodurch dem Rumpf ein so gewaltsamer Stoss gegeben wurde, dass beide Oberarme nach Vorn verrenkt wurden. Aebulich Stromeyer (Handbuch I. pag. 627). — G. Fischer (l. c.) beschreibt eine Verrenkung beider Oberarmknochen durch Fall von einem Kutschersitz. — Grosvenor (Philadelphia med. and surg. Reporter 1869, Jan.) sah eine beiderseitige *Luxatio axillaris* nach einem Sturz auf beide Hände.

Fig. 96.



A. Verrenkungen nach Vorn
Der Oberarmkopf ist über den vorderen Rand der Gelenkfläche ausgetreten (Fig 96 bei A)

B. Verrenkungen nach Hinten.
Der Oberarmkopf ist über den hinteren Rand der Gelenkfläche (bei C) hinausgetreten.

Tabellarische Uebersicht der Verrenkungen des Oberarmkopfes.

I. *Luxatio axillaris*, Verrenkung nach Unten oder nach Unten und Innen.

1) *Luxatio subglenoides* s. *axillaris directa*. Der Gelenkkopf steht zwischen dem unteren Rande des Schulterblatthalses (B) und dem Thorax¹⁾.

2) *Luxatio subcoracoides*. Der Gelenkkopf steht unter der Wurzel des Proc. coracoides, an der inneren Seite des Collum scapulae.

II. *Luxatio intracoracoides* s. *subclavicularis*. Verrenkungen nach Vorn oder nach Vorn und Oben. Der Gelenkkopf steht an der inneren Seite des Proc. coracoides, ohne einen anderen Theil des Schulterblatts zu berühren, nahe unter der Mitte des Schlüsselbeins.

1) *Luxatio subacromialis*. Der Gelenkkopf steht unter der Wurzel des Acromion an der hinteren Seite des Collum scapulae.

2) *Luxatio infraspinata*. Der Gelenkkopf steht weiter nach Hinten, in der Fossa infraspinata.

¹⁾ Eine seltene Varietät dieser Luxation ist die von Middeldorpf beschriebene *Luxatio humeri erecta*, bei welcher der Arm, statt (wie gewöhnlich) abwärts, aufwärts gerichtet ist. — Als *Luxatio intercostalis* führt Sédillot eine Unterart der Verrenkung nach Vorn auf, welche einmal von Prochasca in Wien beobachtet wurde. Der Gelenkkopf war in diesem Falle zwischen den Rippen durch die Intercostalmuskeln in die Brusthöhle gedrungen.

I. Verrenkungen des Oberarmkopfes nach Vorn.

a) Die gewöhnlichen Formen, mit abwärts gerichtetem Arm.

Aetiologie. Fast alle Schriftsteller stimmen darin überein, dass die Veranlassung dieser Verrenkungen gewöhnlich eine indirecte, d. h. also ein Fall auf die vorgestreckte Hand oder auf den Ellenbogen sei. Von grosser Wichtigkeit für die Entstehung ist jedenfalls das Anstemmen des Tuberculum majus an das Acromion. Geschieht dies bei einem Falle plötzlich, so wird der Gelenkkopf mit der vollen Kraft des durch die Schnelligkeit des Falls vermehrten Impulses des Körpergewichts gegen den vorderen und unteren Umfang der Kapsel getrieben. Der vorgestreckte Arm (Ober- und Vorderarm) wirkt hierbei als zweiarmiger Hebel, dessen länger Arm von der Hand bis zum Tuberculum majus reicht, während der Oberarmkopf den kurzen Hebelarm bildet und das Hypomochlion vom Acromion dargestellt wird. In ähnlicher Weise ist das Anstemmen des Tuberculum majus gegen das Acromion wirksam, wenn Jemand beim Fallen mit dem Arme hängen bleibt oder sich während des Fallens halten will. Bei allen diesen Verrenkungen durch indirecte Gewalt ist also eine Mitwirkung des Muskelzuges gar nicht erforderlich, jedoch tritt dieselbe gewiss zuweilen in der früher ausschliesslich angenommenen Weise ein¹⁾, und wir werden an ihrer Bedeutung um so weniger zweifeln, als Beobachtungen vorliegen, durch welche die Entstehung von Oberarm-Verrenkungen durch blossen Muskelzug erwiesen wird²⁾. — Eine direct die Schulter treffende äussere Gewalt vermag gleichfalls Verrenkung herbeizuführen, ohne dass dazu eine besondere Stellung des Gliedes oder ein bestimmter Muskelzug erforderlich wäre. Schon A. Cooper hielt solche Veranlassungen für die häufigsten. Die Gewalt muss vorzugsweise auf das Tuberculum majus von Oben her einwirken und somit den Gelenkkopf nach Vorn und Unten treiben. Dies geschieht z. B. durch einen die Schulter schräg treffenden Schlag, einen Fall vom Wagen, von einer Treppe u. dgl.

¹⁾ Man hielt früher zum Entstehen einer Luxatio humeri für erforderlich, dass der Arm sich (namentlich durch Wirkung des M. deltoïdes) in rechtwinklig abducirter (erhobener) Stellung befinde. Treffe dann ein Stoss oder Schlag das obere Ende des Humerus, während der Ellenbogen oder, bei straff gestrecktem Vorderarm, die Hand unterstützt sei, so müsse der Gelenkkopf nach Unten ausweichen, könne aber aus dieser seiner primären Stellung durch Muskelzug nach verschiedenen Seiten dislocirt werden.

²⁾ Beobachtungen der Art liegen auch aus der neuesten Zeit und nach den Erfahrungen zuverlässiger Gewährsmänner vor. Vgl. Streubel, Deutsche Klinik 1852, No. 11; Dupuy, Journal de médecine de Bordeaux 1851, Dec.; meine Referate in Canstatt's Jahresbericht für 1851, IV. pag. 41, und für 1852, IV. pag. 69 u. f.

Symptome. Eine grosse Reihe von Störungen ist allen, in der Richtung nach Vorn erfolgenden Schulter-Verrenkungen gemeinsam. Die Schulter hat ihre Rundung verloren, ist abgeflacht, da das obere Ende des Humerus nicht mehr den Deltamuskel emporwölbt. Letzteren kann man, sofern noch keine bedeutende Geschwulst besteht, eindrücken, so dass man unter das Acromion eingreifen und die Gelenkfläche der Scapula fühlen kann. Das Acromion tritt mit ungewöhnlicher Schärfe hervor. Der Gelenkkopf wird von der Achselhöhle aus (mehr oder weniger leicht) als eine rundliche, harte Geschwulst gefühlt. Der Ellenbogen ist vom Rumpf mehr oder weniger entfernt. Zieht man von ihm aus in der Richtung des Humerus eine Linie nachwärts, so führt diese nicht zur Gelenkhöhle, sondern an deren inneren Seite. An der Stelle der Insertion des Deltamuskels erscheint der Humerus daher wie eingeknickt, woraus für den Unkundigen der Verdacht einer Fractur entstehen kann. Der Vorderarm ist gebeugt; der Kranke neigt den Kopf nach der verletzten Seite und unterstützt gewöhnlich, um die Schmerzen zu vermindern, den verrenkten Arm mit der anderen Hand. Ausser den die Gelenksgegend umgebenden Intergüssen, welche oft eine grosse, die eigentliche Deformität verdeckende Geschwulst darstellen, findet sich meist auch eine deutliche Infiltration längs des langen Bicepskopfes, welche dessen Ursprungslinie vom Gelenk aus folgt. Willkürliche Bewegungen des verrenkten Gelenkes sind unmöglich. Passive Bewegungen können nur in geringer Ausdehnung und mit heftigen Schmerzen vorgenommen werden; insbesondere ist es unmöglich, den Ellenbogen dem Rumpfe zu nähern. Bei dem Versuch, eine solche Bewegung auszuführen, findet man einen entschiedenen, gleichsam federnden Widerstand. Leichter und mit weniger Schmerzen (wenngleich auch nur in sehr geringer Ausdehnung) kann man den Arm abduciren und den Ellenbogen nach hinten bewegen.

Die einzelnen Formen der Luxation nach Vorn unterscheiden sich dadurch, dass der Gelenkkopf bald mehr, bald weniger weit von dem vorderen Rande der Gelenkfläche des Schulterblattes entfernt, bald mehr in der Tiefe, zwischen Schulterblatt und Thorax, bald weiter nach Vorn, unter dem grossen Brustmuskel Stellung genommen hat, woraus sich dann für die äussere Erscheinung verschiedene Richtungen und Längen des verrenkten Arms ergeben.

Tritt der Gelenkkopf dicht vor dem Gelenkrande der Scapula nachwärts in die Achselhöhle und bleibt dort stehen, so nennt man die Verrenkung im Allgemeinen *Luxatio axillaris*. Dieselbe ist dadurch ausgezeichnet, dass man den Gelenkkopf in der Achselhöhle

besonders leicht fühlen kann, dass der Ellenbogen nicht auffällig weit vom Rumpf absteht und dass der Arm jedenfalls nicht verkürzt, eher etwas verlängert ist. Die *Luxatio axillaris* zerfällt in 2 Unterarten: *Luxatio subglenoidea* und *Luxatio subcoracoidea* (im engeren Sinne).

Bei der *Luxatio subglenoidea* steht der Gelenkkopf zwischen dem unteren Rande des Schulterblattbalses (von welchem er die Ursprungssehne des langen *Triceps* nach Hinten verdrängt) und dem Thorax. Bei keiner Verrenkungsform ist der Oberarmkopf so leicht und deutlich in der Achselhöhle zu fühlen als bei dieser, bei keiner ist die Verlängerung (das Abwärtsrücken) des Arms so deutlich und die Abduction (die Entfernung des Ellenbogens vom Rumpf) so gering. Die Entstehung dieser Form der Verrenkung lässt einen Fall vornüber auf den in der Richtung grade nach Vorn vorgestreckten Arm voraussetzen. Wirkt die Gewalt nach erfolgter Ausrenkung in derselben Richtung weiter, so wird der Gelenkkopf tiefer in die Achselhöhle hineingetrieben, so dass er zwischen Thorax und vordere Fläche der *Scapula* zu stehen kommt, wobei dann eine gänzliche Zerreißung des *Musculus subscapularis*, in welchen der Gelenkkopf sich gleichsam einbohrt, unausbleiblich ist. Wegen des Feststehens des Gelenkkopfes in der *Fossa subscapularis* hat man solche Fälle *Luxatio subscapularis* genannt. Der Ellenbogen steht dabei weniger nach Hinten, als bei anderen Schulterverrenkungen; die Unbeweglichkeit des Arms und die Schmerzen sind besonders gross.

Sehr selten dürfte es sich ereignen, dass der Gelenkkopf dicht vor dem sehnigen Ursprunge des langen Kopfes des *Triceps* zwischen diesem und dem (alsdann unversehrt bleibenden) *Musc. subscapularis*, nahe dem unteren Theile des Gelenkranes der *Scapula*, angestemmt gegen die beiden Lefzen des unteren Randes der *Scapula* (vgl. Fig. 96 B. pag. 721) stehen bleibt, — eine Stellung, welche man früher (nach Desault) als die „primäre Verrenkung nach Unten“ bezeichnete und aus welcher alle anderen Arten der Verrenkung nach Vorn hervorgehen sollten, wozu die Möglichkeit allerdings vorliegt, da der Gelenkkopf von diesem höchst unsicheren Standpunkte ebenso gut tiefer in die Achselhöhle, als auch weiter nach Vorn verschoben werden kann. Pitha hat Gelegenheit gehabt, diese „richtige *Luxatio subglenoidea*“ in ihrer vollen Reinheit bei Verletzten, welche er unmittelbar nach dem Fallen auf den „gerade nach Aussen geworfenen“ (abducirten) Arm „ohne störende Zwischenbewegungen oder gar Hilfeversuche“ untersuchen konnte, genau zu constatiren¹⁾. Vielleicht kommt eine

¹⁾ Handbuch, Bd. IV. Abth. 1. pag. 33. Mir ist dies noch nie gelungen.

Die Verrenkung häufiger nur unvollkommen oder vorübergehend bestehend, indem der Gelenkkopf, in Folge eines Falles auf den vom Ellenbogen entfernten Ellenbogen, zwar die Kapsel in ihrem unteren Umfange zersprengt und aus ihr nach Unten hervortritt, aber sogleich wieder in sie zurückkehrt, sobald der Arm seinem Gewicht überlassen, hinabsinkt und den Gelenkkopf daher durch Hebelbewegung wieder in die Kapsel schiebt.

Goyrand konnte bei Versuchen an Leichen unter zehn Verrenkungen der Art reduciren, wenn er den Arm bloß gerade abwärts fallen ließ. Der obere, untere Theil der Kapsel bildet das Hypomochlion für den zweiarmigen Hebel, welchen der humerus in diesem Falle darstellt; der vom Caput humeri allein gebildete kurze Hebelarm wird aufwärts gedrängt, sobald der durch die übrige Extremität dargestellte Hebelarm, seinem eigenen Gewicht folgend, abwärts fällt. Bei dieser Betrachtung ist jedoch die Thätigkeit der Muskeln ganz übersehen. Der Deltoides, sowie der Pectoralis major und minor, auch der Biceps und Triceps könnten sehr wohl die spontane Reducirung begünstigen.

Bei der Luxatio subcoracoidea (Fig. 97) steht der Gelenkkopf unter der Wurzel des Proc. coracoideus, zwischen dem

äußeren Rande der Gelenkfläche der Scapula (oder auch der innereren Fläche des Collum scapulae) und dem Thorax; er steht höher, als bei der L. subglenoidea, hat weniger Neigung in die Achselhöhle einzudringen, ist aber die vordere Wand der letzteren etwas hervor und ist nicht beim Einlegen der Finger in die Achselhöhle, sondern auch von oben deutlich zu fühlen. Die Richtung des Ellenbogens nach Hinten ist bei der Entfernung vom Rumpfe auffällig, die Länge des Arms ist nicht erheblich vermindert. Bei Entstehung dieser Verrenkung durch Fall war der vorgestreckte Arm voraussichtlich zugleich etwas seitlich (nach Aussen) gerichtet. Zuweilen erfolgt die Verschiebung des Gelenkkopfes in der Art, dass er zwar die Gelenkfläche der Scapula gänzlich verlässt und sich nach der vorderen Seite des Schulterblatthalses unter den Proc. coracoideus stellt, aber nicht so weit nach Innen rückt, dass auch das Coracoclaviculare Ligament an die vordere (innere) Seite der Scapula gelangte. Der vordere Rand der Gelenkfläche des Schulterblatts legt sich dann in die Furche zwischen Gelenkkopf und Tuberc. majus (den sogen.

Fig. 97.



entstandenen Verrenkung) vermindert. Bei Entstehung dieser Verrenkung durch Fall war der vorgestreckte Arm voraussichtlich zugleich etwas seitlich (nach Aussen) gerichtet. Zuweilen erfolgt die Verschiebung des Gelenkkopfes in der Art, dass er zwar die Gelenkfläche der Scapula gänzlich verlässt und sich nach der vorderen Seite des Schulterblatthalses unter den Proc. coracoideus stellt, aber nicht so weit nach Innen rückt, dass auch das Coracoclaviculare Ligament an die vordere (innere) Seite der Scapula gelangte. Der vordere Rand der Gelenkfläche des Schulterblatts legt sich dann in die Furche zwischen Gelenkkopf und Tuberc. majus (den sogen.

anatomischen Hals des Humerus), das Tuberculum majus ab bleibt mit der Gelenkfläche der Scapula in Berührung. Bei einer solchen Luxatio capitis anatomici humeri braucht die Kapsel nicht zu zerreißen; die Schulter ist weniger difform, nur in ihrem hinteren Umfange abgeflacht, der Oberarm nach Innen rotirt, der Gelenkkopf wird von Vorn dicht unter dem Proc. coracoideus gefühlt, von der Achselhöhle dagegen schwierig erreicht¹⁾.

Diese Stellung bildet den Uebergang zu der unvollständigen Verrenkung nach Vorn, bei welcher noch ein Theil des Gelenkkopfes selbst mit der Gelenkfläche der Scapula in Berührung und die Kapsel meist unversehrt bleibt. Dass Letzteres der Fall war, darf man namentlich voraussetzen, wenn die Einrenkung auffallend leicht gelingt und die Brauchbarkeit der Extremität schon nach einigen Tagen wieder hergestellt ist. — Die Symptome sind die vorausgeführten, nur in viel geringerem Grade entwickelt; namentlich fehlt die Abflachung der Schulter fast ganz und von der Gelenkfläche der Scapula ist nur der hintere Rand in etwas grösserem Umfange, als im normalen Zustande, zu fühlen.

Stromeyer (l. c. pag. 623) glaubt, dass unvollkommene Luxationen des Humerus niemals traumatischen Ursprungs seien, sondern auf Atonie des Kapselbandes beruhen, und charakterisirt dieselben in folgender Weise. „Die Ellenbogen sind etwas nach Hinten gerichtet, der Oberarmkopf steht nahe dem Proc. coracoideus, zuweilen tiefer als derselbe. Zieht man vom Acromion eine Linie gerade abwärts, so läuft sie hinter dem Gelenkkopf oder doch nur über ein kleines Segment desselben. Bei mageren Leuten kann man die Haut unter dem Acromion bis zur Gelenkfläche des Schulterblatts eindrücken. Bringt man den Ellenbogen nach Vorn, so erfolgt vorübergehend die Einrenkung. Die atonische Verrenkung besteht fast immer auf beiden Seiten, jedoch überwiegend stark an der rechten, besonders bei Individuen, welche frühzeitig ein schweres Handwerk erlernt haben.“

Die Luxatio intracoracoidea²⁾ s. subclavicularis (Fig. 98) wurde von Desault u. A. als eine consecutive Verrenkung betrachtet, welche aus der soeben erörterten, oder aber aus der „primären Verrenkung nach Unten“ durch nachträgliche Verschiebung mittelst des Muskelzuges hervorgehe. Sie entsteht aber wohl ebenso oft unmittelbar

¹⁾ Vgl. Streubel l. c. — Ich habe einen veralteten Fall der Art secirt, einen anderen an einem jungen Arzte beobachtet und letzteren, durch Rotation, unter deutlichen Knacken, eingerichtet; einen dritten (veralteten) habe ich wiederholt genau untersucht.

²⁾ Den Namen „L. praeglenoidea“, welchen man dieser Verrenkungsform auch ertheilt, möchte ich ganz vermeiden, da er ebenso gut auf die eben beschriebene L. subcoracoidea passt, bei welcher der Gelenkkopf doch auch vor der Gelenkfläche der Scapula steht.

durch die einwirkende Gewalt, namentlich durch Fall auf den stark abducirten und nach Hinten gerichteten Ellenbogen. Der Oberarmkopf steht in dem, nach Oben durch das Schlüsselbein, nach Innen durch den Thorax, nach Aussen durch den Processus coracoïdes begrenzten Raume, er befindet sich also unter dem Schlüsselbein und nach Innen vom Processus coracoïdes. Durch diese Stellung des Kopfes ist eine Verkürzung des Arms (d. h. der Entfernung vom Acromion zum Condylus externus) bedingt. Der Gelenkkopf bildet in der Gegend, wo Pectoralis major und Deltoides zusammenstossen, eine Hervorragung, ist dagegen von der Achselhöhle aus schwer zu fühlen. Die Abflachung der Schulter besteht, wie bei Luxatio subcoracoidea.

Fig. 98.



Als unvollständige Luxatio intracoracoidea bezeichnet Pitha die von Anderen und auch von uns oben als Luxatio capitis anatomici beschriebene Form der Schulterverrenkung. Vgl. pag. 726.

b) Mit aufwärts gerichtetem Arm.

Die Luxatio humeri erecta, die seltenste aller Schulterverrenkungen, wird von Middeldorpf, der sie zuerst (1857) beobachtet hat, in folgender Weise beschrieben¹⁾. Der Humerus ist aufwärts gerichtet, so dass der Ellenbogen in der Nähe des Kopfes steht und die Hand des verrenkten Armes gegen den Schädel angedrückt oder mit der anderen Hand gehalten wird, um die bei jeder Bewegung eintretenden Schmerzen zu verhüten. Je nach dem der Gelenkkopf durch den im unteren vorderem Umfange des Gelenkes befindlichen Kapselriss mehr nach Vorn gegen den oberen Rand des Pectoralis major oder mehr nach Innen gegen den oberen Rand des Schulterblatts gedrängt ist, erhält der Humerus die Richtung aufwärts und nach Aussen oder aber aufwärts und nach Vorn. An der Stelle des Gelenkes finden sich die oben erwähnten Symptome der gewöhnlichen Schulter-Verrenkungen. Bei der Entstehung dieser Verrenkung spielt die gewaltsame Erhebung des Arms die Hauptrolle. Bei der weiteren Dislocation des Gelenkkopfes können äussere Gewalten sowohl als Muskelzug thätig sein. Die Veranlassung war in den bisher

¹⁾ Clinique européenne, 1859. No. 2 u. f.

beobachteten Fällen ein Sturz mit emporgehobenen Armen durch eine relativ enge Oeffnung, z. B. zwischen den Sprossen einer Leiter hindurch.

II. Verrenkung des Oberarmkopfes nach Hinten. *Luxatio retroglenoidea.*

Bei der seltenen Verrenkung nach Hinten durchbricht der Gelenkkopf die Kapsel zwischen dem Acromion und dem Triceps (also in ihrem dicksten, durch die Insertion der Mm. supra- und infraspinatus und teres minor verstärkten Theile) und stellt sich entweder unter die Wurzel des Acromion an den hinteren Umfang des Halses der Scapula, oder weiter nach Hinten in die Fossa infraspinata. Hier-nach unterscheidet man als Unterarten die *Luxatio subacromialis* (Fig. 99) und die *Luxatio infraspinata*¹⁾.

Die gewöhnliche Veranlassung ist ein Fall auf den Ellenbogen, während dieser nach Vorn gerichtet und vom Rumpf entfernt ist.

Symptome. Die Schulter erscheint, von Vorn gesehen, abgeflacht, eingesunken; man sieht und fühlt genau die Ränder des Acromion und der Pars acromialis claviculae, und fühlt, wenn man tief hineindrückt, auch die Gelenkfläche des Schulterblatts. Die vordere Wand der Achselhöhle ist nach Hinten verzogen. Unter der Wurzel des Acromion fühlt man eine, leicht als Gelenkkopf zu erkennende, stark hervorspringende harte Hervorragung. Diese ist besonders stark, wenn die *Luxatio subacromialis incomplet* ist (was, nach Pitha, die Regel wäre), wobei der Humeruskopf auf dem hinteren Gelenkrande

Fig. 99.



reitet und nur mit der halben Peripherie aus der Gelenkhöhle hervorragt. Haltung und Länge des Arms scheinen, je nach der speciellen Stellung des Gelenkkopfs, zu variiren.

Der Arm hängt, nach Cooper, vertical herab (Fig. 99); nach Sédillot ist seine Richtung schräg von Oben und Hinten nach Unten und Vorn, so dass also der Ellenbogen weiter nach Vorn steht, als die Schulter. Collis (The Dublin quarterly journ. of med. science. 1855. Aug.) fand ihn nach Vorn und etwas nach Aussen gerichtet. Die Länge des Arms vom äusseren Rande des Acromion bis zur Spitze des Olecranon gemessen, fand Sédillot um 27 Millim.

¹⁾ Eine genaue Beschreibung der äusserst seltenen, von Malgaigne noch angezweifelten *Luxatio infraspinata* verdanken wir Englisch (Wiener med. Presse, 1868, No. 51).

länger, als auf der anderen Seite; die Entfernung zwischen dem äusseren Bande des Acromion und der Wirbelsäule war verringert; die Achse des Arms schien bei der Betrachtung der hinteren Seite des Körpers schräg gegen den Rücken, hinauf gerückt zu sein. Suchte man den Ellenbogen nach Hinten zu bringen, so vermehrte man dadurch die Abflachung an der vorderen Seite der Schulter, indem der Pectoralis major und die vorderen Bündel des Deltoides noch stärker gespannt wurden. Versuchte man den Oberarm zu rotiren, so bewegte sich die durch den Gelenkkopf gebildete Geschwulst zuweilen mit einem leichten Geräusch; der ganze Arm aber war bedeutend nach Innen rotirt, so dass die Hand noch immer in Pronation zu stehen schien, wenn man im Radio-Ulnar-Gelenk auch die vollständigste Supination ausgeführt hatte. — In dem Falle von Englisch stand die Achse des Oberarms schief von Hinten, Oben und Innen nach Vorn, Unten und Aussen gerichtet, der Ellenbogen mehrere Zoll vom Rumpf entfernt.

Anatomische Untersuchung

A) frischer Oberarm-Verrenkungen.

1) Das Kapselband ist, der Richtung der Luxation entsprechend, gewöhnlich also zwischen der Sehne des Subscapularis und dem langen Kopfe der Triceps, in weiter Ausdehnung zerrissen, so dass der Gelenkkopf durch diese Oeffnung leicht hin und her bewegt werden kann. Nur bei überaus grosser Schloffheit des Kapselbandes und der dasselbe spannenden Muskeln, kann eine complete Luxation ohne Kapselriss erfolgen. Viel eher kann bei unvollkommener Verrenkung das Kapselband unversehrt bleiben. Zuweilen ist dasselbe nach allen Seiten hin zerrissen (besonders bei Luxatio subclavicularis), zuweilen nur am Collum humeri abgelöst. Ausdehnung und Richtung des Kapselrisses sind nicht blos für die Reduction von Bedeutung, sondern auch für die Stellung und Haltung des verrenkten Armes, sofern diese wesentlich von den unversehrt gebliebenen Theilen der Kapsel abhängt.

2) Die Sehnen des Subscapularis, Teres minor, Supra- und Infraspinatus sind sehr häufig zerrissen. Bei allen Verrenkungen nach Vorn wird erstere durch den hervortretenden Gelenkkopf fast ohne Ausnahme eingerissen oder ganz zerrissen, während die Sehnen der Rotatoren durch übermässige Dehnung zerreißen oder vom Tuberculum majus abreißen (vgl. Knochen). Seltener reisst die Sehne des langen Bicepskopfes; dagegen wird sie gewöhnlich aus der Rinne, in welcher sie zwischen den beiden Tuberkeln durch das Kapselband befestigt ist, herausgerissen. Alsdann kann sie das Tuberculum majus umfassen oder auch den Oberarmkopf selbst umschlingen, so dass sie zwischen ihm und der Gelenkfläche der Scapula sich einschleibt, woraus ein Repositionshinderniss entsteht. Bleibt die Sehne des langen Kopfes des Biceps in ihren normalen

Verbindungen im Sulcus intertubercularis, so kann sie dem verrenkten Gelenkkopfe nur in einem bedeutenden Bogen, mithin nur mit beträchtlicher Spannung des Biceps, folgen, woraus sich dann Beugung und Supination des Vorderarms erklärt.

3) Muskeln. Bei der Verrenkung nach Vorn ist der Subscapularis gewöhnlich erschlafft und gequetscht, da der Gelenkkopf alsdann in der Richtung seiner Wirkung verschoben wird und sich bei der Luxatio subcoracoidea sogar zwischen ihn und den Hals des Schulterblatts eindrängt. Hierbei werden dann seine Fasern nicht selten völlig zerrissen; der Gelenkkopf kann geradezu durch den Subscapularis hindurchdringen und in unmittelbare Berührung mit dem Serratus anticus major treten. Die Muskeln an der hinteren Seite des Schulterblattes sind bei der Verrenkung nach Vorn in der Regel zerrissen (vgl. „Sehnen“), seltener auf's Aeusserste gespannt; der lange Kopf des Triceps bildet mit demjenigen des Biceps zusammen eine den Hals des nach Vorn verrenkten Gelenkkopfes umfassende Schlinge. Der Deltoides ist bei allen Schulter-Verrenkungen (mit alleiniger Ausnahme der Luxatio erecta) gespannt, und zwar um so mehr, je mehr man den Ellenbogen dem Rumpfe zu nähern sucht. Sehr selten wird er vom Gelenkkopfe durchbohrt, so dass dieser dann dicht unter der Haut, von den Bündeln des Muskels umfasst, liegt¹⁾. — Bei der Verrenkung nach Hinten sind alle von Vorn her zum Arm tretenden Muskeln entweder stark gespannt oder zerrissen, der Infraspinatus dagegen ist erschlafft und zum Theil von der Fossa infraspinata abgelöst.

4) Knochen²⁾. Nicht selten finden sich Fracturen des Tuberculum majus, entweder durch das Anstemmen desselben gegen das Acromion oder durch Vermittlung der an ihm befestigten Muskeln (Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor). Im letzteren Falle betrifft diese Continuitätstrennung gewöhnlich nur seine oberflächliche, compacte Schicht, an welcher jene Muskeln inseriren, namentlich die für den Supra- und Infraspinatus bestimmten oberen Facetten³⁾. Seltener (nur nach Einwirkung directer Gewalt) findet sich eine er-

¹⁾ Vgl. Fergusson, The Lancet, 1858, Novbr. 7. Die Reduction gelang nicht.

²⁾ Nicht selten finden sich Fracturen in einiger Entfernung von dem verrenkten Gelenke, welche demselben Falle, der die Luxation veranlasste, ihre Entstehung verdanken, insbesondere Rippenbrüche, Bruch des Schlüsselbeins u. dgl. m., worauf bei der Kranken-Untersuchung wohl zu achten ist.

³⁾ Vgl. v. Thaden, über den Bruch des Tuberculum majus bei Luxat. des Humerus, Archiv f. klin. Chirurg. VI. pag. 67. — Nach Pitha (l. c. pag. 36) wäre das Abbrechen des Tuberculum minus bei der Luxation nach Hinten ebenso constant, wie Riss-Fracturen am Tuberculum majus bei Luxationen nach Vorn.

hebliche Fractur des vorderen, und noch viel seltener eine solche des hinteren Gelenkran des der Scapula. Dagegen sind Abreissungen des Limbus cartilagineus mit Absprengung kleiner Stücke des angrenzenden Knochenrandes sehr häufig. Diese Fracturen stellen keine bedeutende Complication dar und werden selten am Lebenden erkannt. Ganz anders verhält sich dies, wenn mit der Verrenkung zugleich Fractura colli humeri besteht, was, nach den Untersuchungen von C. Thambhayn¹⁾ nicht so selten vorkommt, als man früher glaubte (vgl. pag. 415).

5) Gefäss- und Nerven-Stämme der Achselhöhle werden durch den nach Vorn verrenkten Gelenkkopf zuweilen beträchtlich gequetscht, besonders wenn der Gelenkkopf den Musc. subscapularis durchbohrt hat und somit in unmittelbare Berührung mit ihnen getreten ist. Hierdurch kann der Rückfluss des Blutes und der Lymphe behindert werden, woraus dann eine auffallend bläuliche, weiterhin ödematöse Anschwellung des Arms hervorgeht. Die Schmerzen im ganzen Arm, das Gefühl von Ameisenkriechen, die Muskelkrämpfe und vorübergehende und bleibende Lähmungen erklären sich aus der Compression oder Zerrung der in der Achselhöhle gelegenen Nerven. Besonders ist und bleibt der Deltamuskel wegen Quetschung oder Zerreißung des Nervus circumflexus (s. axillaris) nicht ganz selten gelähmt. In einzelnen Fällen hat man Zerreißung der Vena axillaris oder der inneren Häute der Arteria axillaris mit nachfolgender Bildung von Aneurysmen beobachtet (Bérard, Nélaton). Jedoch sind solche Nebenverletzungen sehr selten, was sich aus den anatomischen Verhältnissen (aus denen man bei irriger Auffassung früher das Gegentheil deducirte), sehr gut erklären lässt. Nerven und Gefässe können sehr leicht dem gegen sie vordringenden Gelenkkopf, welcher ohnehin durch seine runde Gestalt und die Glätte seiner Oberfläche zum Fortgleiten über diese Stränge geeignet ist, ausweichen.

6) Das Bindegewebe in der Umgegend des Gelenkes wird sofort mit Blut infiltrirt, welches, sich nach dem Laufe des langen Kopfes des Biceps weit abwärts senkend, nicht blos in der Umgebung des Gelenkes, sondern auch an der inneren Seite des Oberarmes ausgebreitete Sugillationen bilden kann. Späterhin ist das umgebende

¹⁾ Ueber die mit Fractur des Collum humeri complicirten Schulterluxationen. Inaug. Dissert., Halle 1868. Unter den aus der Literatur zusammengestellten 68 Fällen (mit Einschluss eines in der Volk mann'schen Klinik beobachteten) fanden sich 22, in denen die Reduction der Verrenkung gelang, — eine neue Aufforderung, dieselbe in solchen Fällen immer sofort zu unternehmen!

Bindegewebe von Exsudat durchdrungen und bei allen nicht mehr ganz frischen Verrenkungen fester und dichter als gewöhnlich. Durch dies verdichtete, narbenähnliche Bindegewebe werden Gefässe und Nerven oft sehr schnell innig mit dem dislocirten Gelenkkopfe verklebt, weshalb dann die Gefahr ihrer Zerreißung durch Reductionsversuche viel grösser ist.

Von einigen Chirurgen, namentlich von Desault, ist die Entstehung von Emphysem in Folge sehr energischer Extensionen beschrieben worden. Er sah in 3 Minuten eine Geschwulst von der Grösse eines Kopfes sich entwickeln und dachte zuerst an ein durch Zerreißung der Arteria axillaris entstandenes Aneurysma. Es ist ungreiflich, auf welche Art hier eine Gas-Entwicklung Statt finden soll. Vgl. pag. 61 u. f.

B) längere Zeit nach der Reduction.

In Folge der nach jeder Schulterverrenkung eintretenden Entzündung erleidet sowohl die Gelenkfläche der Scapula, als auch das obere Ende des Humerus einige Formveränderungen. An den Stellen, wo die Knorpel von den Gelenk-Enden gelöst oder stark gequetscht waren, findet man eine durch Eburneation des Knochens gebildete Knochen-Narbe. Am Rande der Kapsel und an den Höckern des Oberarmbeins zeigen sich Osteophyten. Der Kapselriss ist gewöhnlich durch eine feste, dicke Narbe geschlossen, die übrige Kapsel aber schlaffer, als im gesunden Zustande. Zuweilen verheilt der Riss in der Kapsel nicht; alsdann communicirt sie oft mit dem unter dem M. subscapularis liegenden Schleimbeutel. Die Sehne des langen Bicepskopfes liegt oft ausserhalb des Sulcus intertubercularis. War sie zer-

Fig. 100¹⁾.



rissen, so kann ihr oberes Ende mit dem Gelenkkopfe verwachsen und dann gleichsam ein Ligamentum interarticulare darstellen.

C) der veralteten Luxationen.

Bei veralteten Schulter-Verrenkungen findet man in seltenen Fällen die Gelenkfläche des Schulterblatts nicht blos geschrumpft, sondern in einen convexen Vorsprung verwandelt, mit welchem der Gelenkkopf, indem er an der entsprechenden Stelle ausgehöhlt wird, nach und nach eine der Articulatio metacarpo-phalangea ähnliche Verbindung eingehen kann. Gewöhnlich aber wird der Oberarm-

¹⁾ Fig. 100 zeigt, nach einer Abbildung von A. Cooper, die neue Gelenkhöhle am Halse der Scapula unter der Wurzel des Processus coracoides.

kopf unter dem stetigen Druck allmählig abgeflacht und in der Nähe des Gelenktheiles der Scapula von einer neuen Gelenkkapsel umschlossen. In Betreff der Anheftung von Gefässen und Nerven vgl. pag. 680 u. 731.

Diagnose. Bei Beachtung der oben angegebenen Symptome werden Schulterverrenkungen nicht leicht verkannt werden; jedoch sind Verwechselungen vorgekommen mit Contusion des Schultergelenkes (bei bedeutender Geschwulst) und mit Fracturen am oberen Ende des Humerus sowie am Halse des Schulterblatts. Ueber letztere vgl. pag. 417 u. f. und 403 u. f. — Bei der Contusion fehlt nicht blos die charakteristische Haltung des Arms, sondern auch die abnorme Stellung der Gelenkvorsprünge. Die Chloroform-Narkose gestattet auch bei der stärksten Geschwulst diese Stelle genau zu erforschen und somit die Diagnose zu sichern. Wenn keine bestimmten Gründe gegen Anwendung des Chloroforms vorliegen; darf man dieselben in solchen zweifelhaften Fällen nie verabsäumen.

Prognose. Im Allgemeinen sind Oberarm-Verrenkungen nicht lebensgefährlich; jedoch sind ihre Folgen, wie sich dies aus der vorhergehenden Darstellung ergibt, in Betreff der Brauchbarkeit des Arms niemals ganz unbedeutend, selbst wenn sie frühzeitig und richtig eingereckt werden. Je weiter der Gelenkkopf sich von der zugehörigen Gelenkfläche entfernt hat, desto übler ist die Prognose, weil desto bedeutendere Zerreibungen Statt gehabt haben müssen; die unvollständigen Schulterverrenkungen bieten die beste Aussicht dar. Je frischer die Verrenkung, desto leichter die Reduction, desto günstiger also auch die Prognose. In Betreff der Möglichkeit veralteter Schulterluxationen zu reduciren, gilt das von den veralteten Verrenkungen im Allgemeinen (pag. 679 u. f.) Gesagte. Gerade am Schultergelenk sind oft noch sehr spät (selbst nach 2 Jahren) Einkerungsversuche gelungen. Desto entschiedener muss darauf hingewiesen werden, dass diese, sofern sie mit bedeutender Gewalt unternommen werden, wegen der Verwachsungen zwischen dem Gelenkkopf und dem Gefäss- und Nerven-Bündel, gefährlich werden können. — Unter den möglichen Complicationen gefährdet die Zerreibung der grossen Gefässstämme das Leben, — Quetschung und Zerrung des Plexus brachialis die Brauchbarkeit des Armes. Des üblen Einflusses der complicirenden Fracturen ist bereits hinreichend gedacht. Die Gefahren anderweitiger, zugleich mit der Verrenkung entstandener Verletzungen sind hier nicht zu erläutern.

Behandlung. Die zur Reduction der Schulterverrenkungen er-

sonnenen Methoden sind überaus zahlreich; alle, selbst die scheinbar unzweckmässigsten, sind mit gutem Erfolge angewandt worden, woraus nebenbei hervorgeht, dass es oft sehr leicht ist, den Oberarm einzurenken. Als hauptsächliche Methoden sind zu unterscheiden: 1) die Extension, und zwar a) in der Richtung des verrenkten Humerus (nach den allgemeinen, pag. 678 u. f. erörterten Principien), b) an dem vertical erhobenen Arme, welche gewöhnlich schlechtweg als die „Mothe'sche Methode“ bezeichnet wird; 2) die Hebelbewegung, 3) die Rotation, 4) der directe Druck auf den luxirten Gelenkkopf. Es giebt Fälle, in denen die eine oder die andere leichter zum Ziele führt; manchmal muss eine nach der anderen versucht werden; man würde sich absichtlich Schwierigkeiten schaffen, wenn man stets nur eine und dieselbe anwenden wollte.

1) Für die Ausübung der Extension ist in der Regel auch eine kräftige Contra-Extension erforderlich, d. h. es muss für Fixirung des Schulterblatts gesorgt werden. Zu diesem Behuf legt man eine Comresse in die Achselhöhle und über diese eine grosse dicke Schlinge (vgl. pag. 678), welche den Rumpf umfasst und Verschiebungen des Schulterblatts nach Aussen und Unten verhindert; eine zweite Schlinge liegt quer über dem Acromion und Schlüsselbein der leidenden Seite, so dass ihre Enden schräg über die Brust und den Rücken zur gesunden Seite hinabsteigen. Diese Contra-Extensions-Schlingen werden durch Gehülfen gehalten, oder an eingeschraubten (eingemauerten) Ringen befestigt. Zur Extension dient eine um das Handgelenk oder oberhalb der Condylen des Humerus angelegte Schlinge. Wenn die übrigen Umstände es erlauben, so ist es zweckmässiger, die Extensions-Schlingen am Oberarm selbst anzubringen. Ausser der directeren Wirkung auf den verrenkten Knochen spricht dafür der Umstand, dass es dadurch möglich wird, für Rotationsbewegungen des Humerus am Vorderarm einen mächtigen Hebel zu gewinnen. — Sobald grössere Gewalt angewandt werden soll, ist es zweckmässig, den Kranken auf einem Tisch, Sopha oder dgl. ausgestreckt liegen zu lassen. Extension und Contra-Extension lassen sich alsdann viel leichter ausführen, gleichgültig, welche Methode der Einrenkung angewandt wird. Soll der Kranke durch Chloroform betäubt werden, so ist schon deshalb die liegende Stellung zu empfehlen.

a) Will man sich der älteren Methode bedienen, so lässt man mehrere Gehülfen an der Extensions-Schlinge in der Richtung des verrenkten Humerus ziehen, gewöhnlich also schräg nach Unten und Aussen. Sobald der Gelenkkopf durch die Extension frei zu

werden beginnt, lässt der Arzt, sofern die Einrenkung jetzt nicht ohne Weiteres durch Muskelzug erfolgt, den Arm weiter nach Vorn führen, während er selbst durch eine Hebelbewegung die Coaptation zu vollenden sucht. Zu diesem Behuf setzt er die eine Hand als Stützpunkt in die Achselhöhle, während die andere den, durch den Humerus selbst dargestellten langen Hebelarm an seinem unteren Ende einwärts und den Gelenkkopf somit auswärts drängt.

Smith (Americ. Journ. of the med. sc., July, 1861), fand, dass Schulterverrenkungen sich leicht reduciren lassen, wenn man an beiden bis zu einem rechten Winkel erhobenen Armen durch zwei Gehülfen gleichmässig stark ziehen lässt.

b) Die Elevations-Methode, d. h. Extension an dem vertical erhobenen Arme wird gewöhnlich die Mothe'sche Methode genannt, da ihre Vorzüge erst durch Mothe (in Lyon) erläutert und das ganze Verfahren erst durch ihn wissenschaftlich und praktisch begründet worden ist.

In Deutschland ist diese Methode durch Rust und Kluge eingeführt worden. Bei den Landsleuten Mothe's hat sie erst Malgaigne zu Ehren gebracht, obgleich schon Boyer die Extension in horizontaler Richtung, also rechtwinklig gegen den Rumpf, für gewisse Fälle empfahl, und Delpech den Arm selbst noch mehr erhob. Nach Sanson, hat Desault sogar geradezu aufwärts extendirt. In England hat White (1748) schon vor Mothe (1776) die verticale Extension geübt, indem er die Kranken an dem verrenkten Arme aufhing, und A. Cooper hat die Einrenkung häufig in der Fig. 101 dargestellten Weise, also gleichfalls durch verticale Extension bewirkt.

Fig. 101.



Schon bei Hippokrates ist die Lehre zu finden, dass man die Einrenkung vornehmen könne, indem man den Vorderarm nach Hinten bringe und demnächst den Ellenbogen stark erhebe. — Neuerdings ist von mehreren Seiten besonders Gewicht darauf gelegt worden, dass man einen kräftigen Druck auf das Schulterblatt ausüben und die Einrenkung mehr durch Bewegung des letzteren, als des Humerus bewirken müsse.

Vgl. namentlich M. Langenbeck, Allg. Wiener med. Ztg. 1867, Juni. Dass mit diesen „Druck“ auf das Schulterblatt auch früher schon angewandt hat, zeigt Fig. 101 u. 102 hinlänglich.

Auch bei der Elevations-Methode ist es zweckmässig, den Patienten liegen zu lassen¹⁾. Alsdann braucht weder der Wundarzt, noch ein Gehülfe auf Tische und Stühle zu klettern, um die verticale Extension vorzunehmen, was nothwendig ist, wenn man den Kranken auf einem Stuhl sitzen lässt. Wollte man ihn auf die Erde setzen, was auch vorgeschlagen ist, so dürfte das weder für ihn selbst, noch für die Ausführung der Operation, zumal wenn man Chloroform anwendet, bequem sein. Dagegen kann man allerdings die Contra-Extension durch das Körpergewicht ersetzen, wenn man den Patienten auf dem Fussboden liegen lässt und an dem emporgehobenen Arme zieht²⁾. — Besitzt der Wundarzt hinreichende Kräfte, so kann er mit der einen Hand die Extension, mit der anderen die Contra-Extension ausüben (Fig. 101). — In Ermangelung von Gehülften kann man auch den Körper des Kranken anderweitig fixiren und alsdann den Arm zur Extension mit beiden Händen fassen. Die Einrenkung erfolgt gewöhnlich, sobald man durch die Extension den Gelenkkopf zur Höhe der Gelenkfläche des Schulterblatts erhoben hat, ganz von selbst, d. h. durch Muskelzug in dem Augenblicke, wo man ihn loslässt. In schwierigeren Fällen besorgen Gehülften das Ziehen am Arm und das Fixiren des Schulterblatts, der Operateur aber drängt mit seinen Daumen den Gelenkkopf in die Kapsel hinein und giebt das Signal zum plötzlichen Loslassen des Armes, sobald er glaubt, dass der Gelenkkopf sich dem Kapselriss gegenüber befinde.

¹⁾ Auch v. Pitha (l. c. pag. 40) empfiehlt neuerdings die liegende Stellung.

²⁾ „Pendelmethode“, nach Gustav Simon (Arch. f. klin. Chir. 1866, Bd. VIII, pag. 54). Der Patient liegt auf der gesunden Seite am Boden, der unverletzte Arm am Thorax befestigt, damit er nicht als Stütze diene. Ein Gehülfe tritt neben dem Patienten auf einen Stuhl oder Schemel, umfasst das Handgelenk des verrenkten Armes und zieht diesen zu sich empor; der Arzt umgreift das Schultergelenk und unterstützt die Einrenkung durch directen Druck, wobei er auch die Extension steigern kann. Ist stärkere Extension nöthig, so legt man eine Schlinge um das Handgelenk, befestigt an dieser ein Seil und führt dies über eine Rolle, einen Haken oder dgl. an der Decke oder an einem Gestell und zieht darselbst nöthigenfalls mit Hülfe des Flaschenzuges. Damit der Patient sich nicht mit den Füssen stützen könne, werden diese zusammengebunden oder von einem Gehülften emporgehalten. In dieser Stellung kann man den Körper des Verletzten Pendelbewegungen machen lassen, durch welche das Eingleiten des Gelenkkopfs begünstigt, namentlich auch der Kapselriss erweitert wird. — Vgl. Podrazky, Wochenbl. der k. k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien, 1869, No. 21.

Die Erhebung des Armes hat den Vortheil, dass nicht blos die Spannung der hinderlichen Muskeln (Deltoides, Supra- und Infraspinatus, Teres minor), sondern auch diejenige des noch unversehrten Theils der Kapsel beseitigt wird. Ausserdem lässt sich dadurch der Gelenkkopf von der Berührung mit einem Knochentheile, an den er sich anstemmen könnte, leicht befreien.

2) Die Einrenkung durch Hebelbewegung wird, nach A. Cooper, in der Art ausgeführt, dass man die eine Hand zur Extension,

Fig. 102.



benutzt, hauptsächlich aber auf den Oberarmkopf selbst vermittelt des Knies (Fig. 102) oder des Fusses einzuwirken sucht. Hierbei wird in der That viel weniger durch Extension als durch Hebelbewegung geleistet, und es schliesst sich dies Verfahren daher an die alten Einrenkungsmethoden mittelst der „Ambe“, mittelst des Ueberhängens über eine Thür oder eine Leiter und dgl. m. an. — Will man sich des Fusses ¹⁾ bedienen, so lässt man den Patienten auf dem Sopha oder dem Rande eines Bettes liegen. Der Wundarzt setzt sich ihm gegenüber, stemmt den einen Fuss in die Achselhöhle und extendirt am Vorderarm, oder, wie Cooper ursprünglich und gewiss mit Recht empfahl, an einer über den Condylen des Oberarms angelegten Schlinge. Dem Humerus wird hierdurch eine Hebelbewegung ertheilt, für welche die Ferse das Hypomochlion abgiebt. Der zu überwindende Widerstand liegt am Gelenkkopf, die Kraft wirkt am anderen Ende des Hebels, d. h. am unteren Ende des Humerus ein.

Vormaid (Medic. Times and Gaz. No. 345, 1857) band, um einen längeren Hebelarm zu gewinnen, den Arm auf einer langen Schiene fest. Als Hypomochlion benutzte er sein Knie, welches er in der Gegend des Ellenbogengelenkes anstemmte.

W. Busch (vgl. v. Mosengeil im Archiv f. kl. Chir. XII. 1048) lässt den

¹⁾ Die vornehmen Chirurgen in England practicirten zu A. Cooper's Zeiten in Schuhen und seidnen Strümpfen. Der Fuss darf natürlich nur mit dem Strumpf bekleidet sein, wenn er die in Rede stehende Rolle spielen soll.

Pat. auf einem Stuhl sitzen und einen Gehülfen seine Hand, — welche durch den auf das Knie des auf dem Stuhle fest aufgesetzten Beins sich stützenden Ellenbogen und durch Umfassen Seitens der anderen Hand in ihrer Haltung gesichert wird, ausgespreizt (Daumen nach Vorn, die übrigen Finger nach Hinten), — wie eine Gabel gegen den verrenkten Gelenkkopf in die Achselhöhle aufwärts einpressen. Der Arm des Pat. wird vom Arzte horizontal um die Hand des Assistenten herum nach Hinten bewegt, dann etwas gestreckt und, während der Assistent seine Hand zurückzieht, wieder nach Vorn geführt.

3) Von grosser Wichtigkeit ist in vielen Fällen die Rotation¹⁾. Die Fixation des Schulterblattes erfolgt in der gewöhnlichen Weise. Bei einer Verrenkung des rechten Armes ergreift der Wundarzt zum Behuf der Extension das untere Ende des Humerus mit der linken Hand, den rechtwinklig gegen den Oberarm gebeugten Vorderarm mit der rechten Hand in der Nähe des Handgelenkes. Die Extension geschieht nach Aussen rechtwinklig gegen den Rumpf. Dann aber ertheilt man dem Arme durch Vermittelung des Vorderarms plötzlich eine rotirende Bewegung nach Innen und drängt oder wirft ihn gleichsam gegen die Brust.

Auch die Rotation nach Aussen kann benutzt werden. Schinzinger hat mit Hülfe derselben Luxationen eingerenkt, welche anderweitigen Repositionsversuchen widerstanden hatten. Der Verletzte sitzt auf einem Stuhle; ein hinter ihm stehender Gehülfe fixirt das Schulterblatt mit den über die Schulterhöhe aufgelegten Händen. Der gegenüber sitzende Wundarzt fasst, bei Verrenkung des linken Oberarms, mit der rechten Hand das Handgelenk, mit der linken den Ellenbogen des rechtwinklig gebeugten Arms, drückt den Oberarm dicht an die Brust des Verletzten und führt die Hand des verrenkten Armes so weit als möglich nach Aussen und Hinten, so dass die Innenseite des Oberarms nach Vorn sieht, macht also eine möglichst starke Rotation nach Aussen. Dadurch wird der Gelenkkopf, wie man deutlich fühlen kann, nach Aussen und Oben in die Nähe der Gelenkgrube gebracht. Gegen Ende dieser Rotation drückt man den Oberarm etwas aufwärts; dann stemmt der Gehülfe zwei Finger der rechten Hand gegen den Gelenkkopf, um das Abgleiten vom Rande der Gelenkgrube zu verhindern, während der Wundarzt den Arm langsam nach Innen rotirt und unter einem eigenthümlichen, mehr knarrenden Geräusche die Einrenkung vollendet sieht.

Schinzinger (Prager Vierteljahrsschrift, 1862, Bd. II. pag. 139 u. ff.) überzeugte sich durch Experimente an der Leiche, dass bei der Rotation nach Aussen an dem verrenkten Gelenke alle Muskeln entweder erschlafft werden oder unbetheiligt bleiben, mit einziger Ausnahme des Subscapularis, der aber in der Regel schon vorher

¹⁾ Vgl. Lacour, in d. Mémoires de la société de chirorg. T. I.

trissen ist (vgl. pag. 730). Dass der Gelenkkopf sich bei der Rotation nach Aussen mäßig immer mehr der Gelenkgrube nähert, bewirken hauptsächlich die unversehrt gebliebenen Kapseltheile, namentlich die hintere und obere Kapselwand. Durch möglichst starke Rotation nach Aussen scheint auch ein weiteres Einreissen der Gelenkkapsel (also eine Dilatation des Kapselrisses) bewirkt zu werden; wenigstens bezieht Schinzinger darauf ein in diesem Moment zuweilen vernommenes Krachen. Jedenfalls wird wohl der Kapselriss auf diese Weise durch gleichmässige Spannung seiner Ränder durch den Rücktritt des Gelenkkopfes geöffnet. Ausserdem führt Schinzinger als Vorzug seiner Methode an, dass man weder Chloroform noch andere Vorbereitungen braucht und nur eines Gehülfen bedarf, dass Gefässe und Nerven vor Zerrung ganz sicher sind und dass überhaupt nur geringe Gewalt zur Anwendung kommt. Der zutreffendsten Angabe kann ich nicht beipflichten; man entwickelt an dem als Hebelarm benutzten Antibrachium vielmehr eine recht bedeutende Gewalt, und mir selbst ist es bei dem Versuche, eine veraltete Luxation auf diese Weise einzurichten, passiert, dass der Humerus (durch blosser Rotation) zerbrach, wie ich dies bei der Giessener Naturhistorischen Versammlung 1864 (Amtl. Ber. pag. 228) mitgetheilt habe. Ich muss Pitha beistimmen, dass man das Schinzinger'sche Verfahren auf frische Fälle beschränken sollte. — Bruns (Einiges über die Einrenkungslehre, Prager Vierteljahrsschrift, Bd. 78) erklärt die Einrenkung nach Schinzinger in folgender Weise: „Die m. supraspin., infraspin. und Teres minor sind bei der Luxation nach Vorn äusserst gespannt. Diese Spannung geschieht auf Kosten ihrer Elasticität, nicht durch ihre Contraction; denn sie fehlt nicht beim Experiment an der Leiche, und es lässt sich durch Messungen nachweisen, dass die betreffenden Muskeln eine Länge erreicht haben, die ihre natürliche Länge, selbst wenn der Humerus bei unversehrter Gelenkkapsel in der gleichen Stellung angenommen hat, in der sie normal am Meisten gespannt werden (bei starker Rotation des Humerus nach Innen), um ein Gewisses übersteigt. Bei der Einrenkung nun werden diese Muskeln aus ihrem extrem gespannten Zustande durch die Rotation des Humerus nach Aussen, wodurch das Tuberc. maj. ihrem Insertionspunkte, dem hinteren Pfannenrande, genähert wird, befreit. Ist dadurch zugleich der Gelenkkopf aus seiner Haft gebracht, so können sie sich weiter selbstständig contractiren und ziehen so den Gelenkkopf mit sich.“

4) Der directe Druck auf den luxirten Gelenkkopf ist, wie Pitha hervorhebt, schon von Avicenna empfohlen und seitdem geübt worden. Bald bewusst, bald unbewusst (namentlich wohl auch beim Versuche, das Fig. 102 abgebildete Cooper'sche Verfahren auszuführen), angewandt worden. Desault hat sich desselben bedient; aber zu allgemeiner Geltung ist diese Methode erst gekommen, seit es Richet gelang, mittelst derselben die Einrenkung bei Complication der Luxation mit Fractura colli humeri zu bewirken (vgl. pag. 418). Ganz besonders beliebt Pitha¹⁾ die „directe Reposition“ und empfiehlt zu ihrer Ausführung folgendes Verfahren. Der Arzt steht vor dem sitzenden Kranken und hält (sofern er dies nicht einem Gehülfen überlässt) den verrenkten Arm ein wenig emporgehoben mit der demselben gleichnamigen Hand, während er die gleichnamige in die Achsel-

¹⁾ Handbuch der allgem. u. speciell. Chirurgie, Bd. IV. 1. pag. 39.

höhle legt und mit den halbgebeugten Fingern den Gelenkkopf umfasst und sanft gegen die Gelenkhöhle drückt. Man braucht (bei den gewöhnlichen Axillarverrenkungen) nur den Gelenkkopf über den vorderen Gelenkrand herüber zu heben (zu „lüften“), höchstens noch eine leichte Rotation hinzuzufügen; das Zurücktreten des Gelenkkopfes erfolgt „von selbst“ mit schnalzendem Geräusch. Der Arm muss aber ganz locker gehalten werden; denn Muskelruhe ist die unerlässliche Bedingung des Gelingens dieser Methode.

Die Wahl der anzuwendenden Einrenkungsmethode richtet sich nach der Zeit des Bestehens der Verrenkung, der Richtung, in welcher sie erfolgt ist, und den Hilfsmitteln, über welche der Wundarzt disponiren kann. In frischen Fällen von *Luxatio axillaris* und bei allen unvollkommenen Verrenkungen sollte man den directen Druck auf den Gelenkkopf und die Rotation immer zuerst versuchen, weil diese Methoden am Wenigsten verletzend sind. Die Rotation dürfte überdies gegen eine etwa bestehende Interposition des *Biceps* besonders wirksam sein¹⁾. In schwierigen Fällen bedarf man vorzüglich der, eine stärkere Hebelwirkung entfaltenden Methoden von Mothe und Cooper; bei veralteten *Luxationen* sind zur kräftigeren Ausführung dieser letzteren Gehülfen oder sogar ein Flaschenzug erforderlich. Auch ist es manchmal nützlich, durch Anwendung verschiedener Methoden, den Gelenkkopf zuerst frei zu machen und ihn dann seinen Weg in einzelnen Stationen zurücklegen zu lassen.

In einem sehr schwierigen Falle von *Luxatio subclavicularis*, bei welcher schon am Tage vorher zwei Aerzte mit mehreren Gehülfen sich vergeblich bemüht hatten, gelang mir die Einrenkung, indem ich zuerst in der Richtung des verrenkten Humerus kräftig extendiren liess, bis der Gelenkkopf unter dem *Processus coracoideus* angelangt war. Hier stemmte er sich aber an und war durch keine Gewalt weiter zu bewegen. Nun wurde der Oberarm vertical erhoben, der Vorderarm gebeugt, was in der ursprünglichen Stellung des Gelenkkopfes, trotz vollständiger Betäubung durch Chloroform, unmöglich gewesen war. Nach einem kräftigen Zuge an einer oberhalb der *Condylen* angelegten Schlinge fühlte ich den Gelenkkopf beweglich werden. Sogleich wurde an dem von mir ergriffenen Vorderarm, während ich den Humerus schnell abwärts bewegte, eine Rotation desselben nach Innen ausgeführt, so dass die Hand des Patienten auf seine Brust, der Ellenbogen dicht an den Leib zu liegen kam. Mit lautem Geräusch trat in diesem Augenblick der Gelenkkopf in die Kapsel zurück. In dieser Weise habe ich später mehrmals Schulter-Verrenkungen älteren Datums reponirt.

C. Heine (Wiener med. Wochenschr. 1870 No. 25 u. f.) empfiehlt für veraltete Schulterverrenkungen folgendes Verfahren. Der Verletzte liegt auf einem von allen Seiten zugängigen Tisch, der Oberkörper (auf dem Rücken) nahezu horizontal, der obere Schulterrand den oberen Rand des Tisches etwas überragend, der Kopf ganz

¹⁾ Diese Empfehlung der Rotation steht bereits in Vidal's erster Ausgabe seines *Traité de pathologie externe* etc. (1838).

frei, von einem Gehülfen schwebend gehalten. Contraextension mit zwei Tüchern, wie pag. 734 beschrieben. Die Luxation auf der rechten Seite vorausgesetzt, fasst der Arzt, zur Rechten des Patienten stehend, den im Ellenbogengelenk rechtwinklig gebeugten Arm mit seiner rechten Hand am Handgelenk, mit der linken am unteren Ende des Humerus, erhebt ihn langsam nach Vorn und aufwärts bis der Vorderarm quer über dem Scheitel sich befindet und der Oberarm parallel der Längsachse des Rumpfes steht. Demnächst wird der Ellenbogen bis hinter das Niveau des Hinterhauptes gebracht, so dass der Humerus mit der Rückenfläche des Kranken einen nach Hinten offenen stumpfen Winkel bildet. Der Kopf des Patienten wird nun mit dem Gesicht nach der gesunden Seite gedreht und etwas rückwärts gesenkt, während der Arzt mit dem luxirten Arme einen weiten Bogen vor dem Gesicht des Patienten vorüber nach der gesunden Schulter beschreibt und denselben dann über die vordere Brustfläche zurückbewegt bis derselbe wieder an der Stelle des Thorax parallel der Körperachse steht. Inzwischen muss ein Gehülfe seinen Daumen von der Achselhöhle aus gegen den Gelenkkopf anstemmen um das Hineingleiten desselben in die Gelenkhöhle zu befördern.

Zum Behuf der Reduction einer *Luxatio humeri erecta* empfiehlt Middeldorpf zunächst in der Richtung des verrenkten Gliedes (bei gebeugtem Vorderarm) zu extendiren, dann den Ellenbogen in einer Bogenlinie abwärts zu führen und endlich, während man die andere Faust in die Achselhöhle stemmt, den Arm weiter abwärts und gegen den Rumpf hin zu bewegen.

Bei Complication einer Schulter-Verrenkung mit *Fractura colli humeri* kann überhaupt nur von der Anwendung des directen Drucks die Rede sein. Man muss auf ihre Ausführung um so mehr Sorgfalt verwenden, als voraussichtlich die Brauchbarkeit des Arms auf dem Spiele steht.

Dass die Einrenkung gelungen sei, ergibt sich bei frischen Verrenkungen schon aus dem charakteristischen Geräusch, mit welchem der Gelenkkopf zurücktritt, demnächst aber aus der Wiederherstellung der Form und Beweglichkeit der Schulter; jedoch sind active Bewegungen, wie sich dies schon aus unseren anatomischen Erläuterungen (p. 729 u. f.) ergibt, bei Weitem nicht immer sogleich möglich, und auch die Form kann bei veralteten Luxationen wegen der theilweisen Ausfüllung der Kapsel und der Atrophie der Muskeln zu Anfang mangelhaft sein. Jedenfalls zeigt der Gelenkkopf unmittelbar nach der Einrenkung keine Neigung, seine Stelle wieder zu verlassen.

Zur **Retention** dient eine Mitella, ein Tuch oder eine Binde, mittelst deren man den Arm am Thorax befestigt. Diese Verbandstücke müssen sogleich und auf den blossen Leib angelegt und, sofern die Kapsel nicht etwa als unversehrt anzusehen ist (pag. 726), 3—4 Wochen lang sorgfältig überwacht werden. Diese Zeit ist für die Heilung des Kapselrisses erforderlich. Erst nach Ablauf derselben

dürfen active Bewegungen gestattet werden; passive, namentlich rotirende Bewegungen sind schon nach Ablauf der zweiten Woche mit Vorsicht vorzunehmen, um Gelenksteifigkeit zu verhüten. Im Uebrigen hat man die Entzündung zu bekämpfen und späterhin die Muskelthätigkeit zu beleben, wozu namentlich faradische Reizung des Deltoïdes und der Rotatoren des Humerus erforderlich sein kann (vgl. Traumatische Lähmungen).

Wer eine Schulter-Verrenkung erlitten hat, muss noch lange nachher auf ein Recidiv gefasst sein, wenn er den Arm stark erhebt oder anderen Gelegenheitsursachen zur Verrenkung aussetzt. Daher sind für Solche, die bereits ein Recidiv durch geringfügige Veranlassung erfahren haben, mechanische Vorrichtungen zu empfehlen, welche die Erhebung des Arms erschweren, oder während der Erhebung einen Druck auf die untere Wand der Gelenkkapsel ausüben¹⁾.

4. Ellenbogen-Verrenkungen, Verrenkungen des Vorderarms. Luxationes antibrachii.

Im Ellenbogengelenk stossen der Proc. cubitalis humeri einer, und die oberen Enden der Ulna und des Radius anderer Seite zusammen. Das untere Ende des Humerus besitzt zwei nebeneinander liegende und in einander übergehende Gelenkflächen, nach Innen die Trochlea, welche mit der Ulna articulirt, nach Aussen die Eminentia capitata (Rotula), auf welche die tellerförmige Grube, die sich auf dem oberen Ende des Radius befindet, passt. An der inneren Seite der Trochlea, von ihr durch eine Furche getrennt, befindet sich der stark vorspringende Condylus internus (Epicondylus internus, *Épitrochlée* der Franzosen), an der äusseren und hinteren Seite der Eminentia capitata dagegen der viel weniger hervorspringende Condylus externus (Epicondylus externus, *Épicondyle* der Franzosen). Letzterer steht um etwa 1 Centimeter höher als die Gelenkfläche der Eminentia capitata; der innere Condylus erhebt sich 3 Centimeter oberhalb des unteren Randes der Trochlea. Zieht man eine Linie quer durch das Gelenk genau an den Gelenkflächen der Trochlea und Eminentia capitata, und eine andere von der Spitze des Condylus internus zu derjenigen des Condylus externus, so zeigt sich, dass diese beiden Linien an der inneren Seite viel weiter von einander entfernt sind, als an der äusseren.

An der vorderen und an der hinteren Seite des Gelenkes finden sich oberhalb des Proc. cubitalis Gruben, von denen die vordere, flachere, den Proc. coronoïdes ulnae bei starker Beugung, die hintere das Olecranon bei vollständiger Streckung des Arms aufnimmt. Am gestreckten Arm liegt die Spitze des Olecranon ein wenig, bei der Beugung erheblich unter einer durch die Spitzen der Condylen gezogenen Linie; so dass man, wenn es sich bei flectirter Stellung des Vorderarms oberhalb der gedachten Linie findet, mit Sicherheit auf eine Luxatio ulnae schliessen kann, sofern nicht eine Fractura olecrani besteht. Der Proc. coronoïdes tritt desto tiefer in die Fossa humeri anterior ein, je vollständiger der Arm gebeugt wird; um so grösser ist dann auch der Widerstand, welchen er der Entstehung einer Verrenkung leistet. Da

¹⁾ Vgl. Stromeyer, l. c. pag. 630.

Köpfchen des Radius berührt bei starker Beugung die seichte Fossa humeri anterior minor und hat in dieser Stellung die Eminentia capitata hinter sich, bei gestrecktem Arm über sich. Dasselbe greift nirgend in Vertiefungen des Humerus oder der Ulna merklich ein, wird von keinerlei Vorsprüngen der genannten Knochen umfasst und nur durch die Gelenkbänder in seiner Stellung befestigt.

Das Ligamentum laterale internum ist einer Seits am Condylus internus, anderer Seits an der Ulna befestigt, wird bei der Streckung des Vorderarms stark gespannt und bei der Verrenkung nach Hinten stets zerrissen. Das Lig. laterale externum, welches am Condylus externus und weiter nach Hinten entspringt, als das vorübergehende, und nach Unten in das Lig. annulare radii übergeht, wird bei der Streckung des Arms weniger gespannt und kann bei der Verrenkung nach Hinten unversehrt bleiben.

Die Muskeln, welche zur Befestigung und zum Schutze des Gelenkes dienen, liegen vorzüglich an der vorderen (Brachialis internus und Biceps) und an der hinteren Seite (Triceps). Von geringerer Bedeutung sind die von den Condylen und Winkeln des Oberarmbeins abwärts verlaufenden Extensoren und Supinatoren (vom Condylus externus), Pronator teres und Flexoren (vom Condylus internus).

Die Ellenbeuge liegt unterhalb einer zwischen Humerus einer-, und Vorderarmknochen anderer Seits quer durch das Gelenk gezogenen Linie; bei Luxationen steigt sie bis über eine quer durch den Proc. cubitalis gezogenen Linie hinauf.

Arten der Ellenbogen-Verrenkungen. Das Charniergelenk des Ellenbogens besitzt sowohl durch das gegenseitige Eingreifen der Vorsprünge und Vertiefungen an der Trochlea und am oberen Ende der Ulna, als auch durch die Stärke seiner Bänder einen so hohen Grad von Festigkeit, dass grosse Gewalt erforderlich ist, um Verrenkungen hervorzubringen. Bei einem Sturze auf die Hand und bei allen anderen Zufällen, bei denen die obere Extremität die Rolle eines Hebelarms spielt, kommen viel häufiger Verletzungen am oberen oder unteren Ende derselben zu Stande (viel häufiger also Fracturen des Schlüsselbeins und Oberarms, oder Verrenkungen der gedachten Knochen, oder Knochenbrüche in der Nähe des Handgelenks), als Verrenkungen im Ellenbogen-Gelenk. Dennoch sind dieselben, nächst den Verrenkungen des Oberarms, die häufigsten unter allen Luxationen (etwa 18 p. C.).

Nach der Richtung der Verschiebung unterscheiden wir: Verrenkungen nach Hinten, nach Vorn, nach Aussen, nach Innen. Die Luxation nach Hinten kann mit Bruch des Proc. coronoides, diejenige nach Vorn mit Fractura olecrani complicirt sein. Die Verrenkung kann beide, oder nur einen der beiden Vorderarmknochen betreffen; beide Vorderarmknochen können zugleich, aber nach verschiedenen Richtungen, verrenkt sein. Hiernach ergibt sich folgendes Schema:

A. Verrenkung beider Vorderarmknochen:

- a) nach Hinten $\left\{ \begin{array}{l} \alpha) \text{ ohne} \\ \beta) \text{ mit} \end{array} \right\}$ Bruch des Proc. coronoides,
 b) nach Vorn $\left\{ \begin{array}{l} \alpha) \text{ ohne} \\ \beta) \text{ mit} \end{array} \right\}$ Bruch des Olecranon,
 c) zur Seite $\left\{ \begin{array}{l} \alpha) \text{ nach Aussen,} \\ \beta) \text{ nach Innen,} \end{array} \right\}$
 d) nach verschiedenen Richtungen.

B. Verrenkung eines Vorderarmknochens:

- a) Verrenkung der Ulna nach Hinten,
 b) Verrenkung des Radius $\left\{ \begin{array}{l} \alpha) \text{ nach Vorn,} \\ \beta) \text{ nach Hinten,} \\ \gamma) \text{ nach Aussen.} \end{array} \right\}$

A. Verrenkungen beider Vorderarmknochen.

a) Verrenkung beider Vorderarmknochen nach Hinten.

Unter allen Luxationen im Ellenbogengelenk ist diese unzweifelhaft die häufigste. Sie entsteht durch einen Fall auf die Hand in folgender Weise. Der Arm ist gestreckt, die ganze Gewalt des Falles wirkt durch Vermittelung des Humerus auf die vordere Wand des Gelenkes ein. Der Humerus stellt einen zweiarmigen Hebel dar; der lange Hebelarm, auf welchen die Körperlast einwirkt, erstreckt sich von der Stelle, an welcher die Spitze des Olecranon den Humerus berührt, bis zum Schultergelenk, der kurze von ersterer bis zum Ende des Proc. cubitalis; vor letzterem liegt der zu überwindende Widerstand, wesentlich gebildet vom Kapselbande, welches die Sehnen des Brachialis internus und Biceps unterstützen. Das Hypomochlion wird durch das Olecranon dargestellt, also durch die Ulna. Die Verrenkung erfolgt mithin durch eine Gewalt, welche den Vorderarm gegen den Oberarm in eine übermässige Streckung (Hyperextension), eine Beugung gegen die Rückenseite (Dorsalflexion), zu versetzen strebt und zugleich den Oberarm abwärts treibt.

Neben diesem, von Bichat aufgestellten Mechanismus nimmt Boyer eines zweiten an, durch welchen die Verrenkung auch in halber Beugung in Folge eines Falles soll zu Stande kommen können. Er giebt an, dass bei dieser Stellung der Proc. coronoides eine geneigte Ebene darstelle, über welche der Proc. cubitalis, sobald nur die vordere Wand der Gelenkkapsel zerrissen sei, mit Leichtigkeit hinweggleiten könne. Dies ist irrig; der Proc. coronoides bildet auch bei halbgebeugter Stellung des Arms einen Vorsprung von 16 Mm. Höhe. Vgl. Malgaigne, Anatomie chirurgicale, Paris 1838, Tom. II. pag. 455.

Ein dritter Mechanismus, welcher von Roser durch Versuche an Leichen nachgewiesen ist, besteht in der schnellen Aufeinanderfolge von Hyperextension (durch welche in der von Bichat angegebenen Weise die vordere Wand der Kapsel gesprengt wird) und plötzlicher Beugung.

Die Verrenkung kann vollständig und unvollständig sein. Bei der vollständigen Verrenkung (Fig. 103) stehen beide Vorderarmknochen hinter dem Proc. cubitalis, das Olecranon steht beträchtlich höher, als die beiden Condylen, ragt stark nach Hinten hervor und zieht in derselben Richtung die Sehne des Triceps mit sich, welche oft saitenartig gespannt hervorspringt. Der Proc. coronoideus befindet sich in der Fossa humeri posterior. An seiner äusseren Seite, tiefer als das Olecranon, aber höher, als der Condylus externus, steht das Capitulum radii, welches man, wenn die Geschwulst nicht bedeutend ist, sowohl an seiner Circumferentia articularis, als auch an seiner nach Hinten und Oben sehenden tellerförmigen Grube mit den Fingern erkennen kann. Der Proc. cubitalis wird an der Beugeseite als eine harte, cylindrische Geschwulst gefühlt. Die Hautfalte der Ellenbeuge ist durch ihn aufwärts gedrängt. Die Extremität ist bedeutend (d. h. um die Entfernung der Spitze des Olecranon von der Spitze des Proc. coronoideus) verkürzt; ihr Umfang in der Ellenbeuge ist durch beträchtliche Vergrößerung des Diameter anteroposterior (Entfernung der Spitze des Olecranon von der Mitte der Ellenbeuge) auffallend vermehrt. Die veränderte Stellung der Gelenk-Enden, die Spannung des Brachialis internus und des Biceps bedingen das Feststehen des Vorderarms in halber Beugung.

Fig. 103.



Nicht selten kommen Uebergangsformen vor, welche zwischen Verrenkung nach Hinten und seitlicher Verrenkung die Mitte halten: die Vorderarmknochen sind nach Hinten verschoben, aber zugleich etwas schief gestellt. Vgl. „Seitliche Verrenkungen“, pag. 753.

Eine unvollkommene Verrenkung des Vorderarms nach Hinten wurde bereits von J. L. Petit angenommen, von Boyer u. A. aber gelehnet, weil der Proc. coronoideus unmöglich auf der walzenförmig gestalteten Trochlea einen festen Standpunkt einnehmen könne, sondern entweder nach Vorn in die normale Stellung zurückkehren, oder nach Hinten in die Fossa humeri posterior gleiten müsse, womit dann die

Zuweilen ist diese Verrenkung mit Luxation des Radiusköpfchens in der *Articulatio cubito-radialis* complicirt. Dies erklärt sich daraus, dass das *Lig. laterale externum*, welches bei der Verrenkung nach Hinten häufig zerreisst, nach Unten in das *Lig. annulare radii*, durch welches das Köpfchen des Radius in seiner Stellung zur Ulna erhalten wird, übergeht; die Haltbarkeit des letzteren wird durch Zerreißung des ersteren erheblich vermindert.

Nach Boyer¹⁾ ist es selten später als nach 6 Wochen möglich, die Luxation nach Hinten zu reponiren. Jedoch hat schon Desault dieselbe nach 2 Monaten reducirt²⁾, und Malgaigne erzählt, dass er mit Lisfranc eine beinahe vier Monat alte, incomplete Luxation des Vorderarms nach Hinten (vgl. pag. 746) eingerenkt habe. — Das Chloroform gestattet noch längere Fristen.

Behandlung. Das älteste Reductionsverfahren ist die gewaltsame Beugung um eine Säule oder einen Bettpfosten. Der Kranke sass auf dem Rande des Bettes, die Armbeuge der verrenkten Extremität wurde gegen einen der Pfosten, welcher zu diesem Behufe mit Leinwand umwickelt war, angelegt, und der Operateur drückte nun auf Schulter und Handgelenk, um diese durch spitzwinklige Beugung des Vorderarms einander möglichst stark zu nähern, während ein Gehülfe den Ellenbogen kräftig gegen den Pfosten anpresste.

Eine zweckmässige Abänderung dieses Verfahrens ist folgende. Ein Gehülfe hält den Oberarm in abducirter Stellung; der Operateur stemmt sein Knie oder seine eine Hand kräftig gegen die Beugeseite des verrenkten Gelenkes und sucht mit der anderen den supinirten Vorderarm möglichst stark zu beugen. Sobald die Beugung bis zu einem spitzen Winkel gediehen ist, schnappt das Gelenk ein. — Man kann auch, während ein Gehülfe den Oberarm fixirt und ein zweiter den gebeugten Vorderarm in der Gegend des Handgelenkes kräftig unterstützt, mittelst einer nahe an der Ellenbeuge um den Vorderarm geführten Schlinge die verrenkten Enden der Vorderarmknochen abwärts ziehen lassen, bis die Spitze des *Proc. coronoideus* aus der Grube des Humerus hervorgetreten ist, den *Proc. cubitalis humeri* aber durch eine um das untere Ende des Oberarms geführte Schlinge nach Hinten ziehen, so dass er in dem Augenblick, wo die Spitze des *Processus coronoideus* aus der Grube hervortritt, seinen Platz in der *Incisura sigmoidea major ulnae* wieder einnimmt.

Immerhin ist eine erhebliche Quetschung der Weichtheile in der

¹⁾ l. c. pag. 381.

²⁾ Vgl. Bérard, im *Dictionn. de médec. en 30 vol.*, Artikel „*Coude*“.

Ellenbeuge bei der gewaltsamen Beugung kaum zu vermeiden, und mit Recht bedient man sich daher jetzt fast allgemein, statt ihrer, der Hyperextensions-Methode. Ein Gehülfe extendirt am Handgelenk, ein anderer contraextendirt in der Nähe der Schulter. Der Wundarzt steht an der äusseren Seite der Extremität und umfasst das verrenkte Glied so, dass seine Daumen auf das Olecranon, die übrigen Finger aber in die Ellenbeuge zu liegen kommen; mit beiden Händen übt er nun einen kräftigen Druck auf das Olecranon aus, als wollte er dasselbe nach Vorn schieben und den Arm in Dorsalflexion versetzen. Reicht die Kraft der Hände allein dazu nicht aus, so setzt er das Knie fest gegen das Olecranon an oder drückt das letztere gegen ein festliegendes Polster, und fasst den Oberarm mit der einen, den Vorderarm mit der anderen Hand. Auf diese Weise kann man auch ohne Gehülfen die Dorsalflexion und, unter schnell folgender Beugung des Vorderarms, die Reduction bewirken. Das durch das Knie (oder das Polster) unterstützte Olecranon stellt das Hypomochlion dar, an welchem der Oberarm als zweiarmer, der Vorderarm als einarmer Hebel bewegt wird. Je stärker der auf Ober- und Vorderarm ausgeübte Druck das obere Ende des ersteren und das untere des letzteren nach Hinten bewegt, desto mehr entfernt sich der Proc. coronoides vom Proc. cubitalis humeri, und das Reductionshinderniss fällt fort, sobald diese Entfernung so gross geworden ist, dass die Spitze des Processus coronoides nicht mehr in der Fossa humeri posterior steckt. Dies Verfahren hat Liston angedeutet; gehörig erläutert hat es aber erst Roser.

Alle diese Methoden suchen, sei es durch starke Beugung, sei es durch übermässige Streckung, oder durch directen Zug am oberen Ende des Vorderarms, den Proc. coronoides aus der Fossa humeri posterior hervorzuheben. Häufig genug hat man aber mit gutem Erfolge, auch die (höchst indirect wirkende) Extension in der Richtung des verrenkten Vorderarmes angewandt. So namentlich Petit und Desault.

Auch durch Rotation des flectirten Vorderarms um die Längsaxe der Ulna zuerst nach Aussen (Supination) dann nach Innen ist die Einrenkung gelungen. Vgl. v. Mosengeil, Arch. f. klin. Chirurg. XIV. pag. 632.

Sobald der Proc. coronoides, gleichgültig durch welches Verfahren, zur vorderen Fläche der Trochlea gebracht ist, muss man den Vorderarm jeden Falls stark beugen, um dadurch ein abermaliges Abweichen der Gelenk-Enden von einander zu verhüten.

Sollte wegen Zerreiſſung des Lig. annulare der Radius bei der Einrenkung der Ulna nicht gefolgt ſein, ſo muſs man den gebeugten Vorderarm nachträglich ſtark ſupiniren und das Capitulum radii durch Druck von Hinten nach Vorn an ſeine Stelle ſchieben. Direkter Druck auf das Capitulum radii kann auch in Fällen nützlich ſein, in denen das Ligam. annulare unversehrt iſt.

Bei veralteten Verrenkungen iſt ausnahmsweiſe der Flaſchenzug nothwendig geworden; auch die Tenotomie hat man, jedoch ohne beſonderen Vortheil, angewandt.

Wenn der Proc. cubitalis humeri aus einer Hautwunde hervorgetreten iſt, ſo ſoll, nach Boyer, die Amputation indicirt ſein, weil wegen der Zerreiſſung der Art. brachialis und des Nerv. medianus ſtets Brand folge. Letzteres iſt jedoch, wie von theoretischer Seite vorauſzusehen und erfahrungsmäſſig feſtgeſtellt iſt, nicht immer der Fall. Man muſs daher die Arterie, ſofern ſie überhaupt zerriffen iſt, unterbinden, die Luxation (wenn ſie noch ganz friſch iſt) reponiren, oder, wenn dies Schwierigkeiten macht, lieber ſogleich und ohne vorher bedeutende Gewalt anzuwenden, das untere Ende des Humerus reſeciren und das Glied auf dieſe Weiſe zu erhalten ſuchen. Stellt ſich der collaterale Kreislauf nicht her, ſo muſs man allerdings nachträglich noch amputiren. Läſst die Ausdehnung der Verletzung vorausſehen, daſs ein collateraler Kreislauf gar nicht zu Stande kommen könne, ſo iſt die Amputation ſofort auszuführen.

Von glücklicher Heilung einer Verrenkung mit Austritt des Proc. cubitalis durch die Haut giebt es mehrere Beiſpiele. Eins der berühmteſten iſt daſs von J. L. Petit (*Maladies des os*, Tom. I. pag. 230) beſchriebene. Der Proc. cubitalis humeri hatte die Sehne des Biceps und den Brachialis internus zerriffen und die Haut durchbrochen, ſo daſs er den Fußboden berührte und die zerriffenen Muskel-Enden aus der Hautwunde herausgingen. Die Reduction gelang, die Muskel-Enden, welche ſich nicht zurückbringen lieſſen, wurden abgeſchnitten, und der Kranke war nach 6 Wochen (mit beſchränkter Streckbewegung) geheilt.

Von der Complication der Verrenkung des Vorderarms nach Hinten mit Bruch des Processus coronoideus ulnae war bereits bei der Beſchreibung des letzteren (pag. 443 u. f.) die Rede.

b) Verrenkung beider Vorderarmknochen nach Vorn.

α) Verrenkung beider Vorderarmknochen nach Vorn ohne Bruch des Olecranon wurde bis auf die neuſte Zeit in Zweifel gezogen, kommt aber wirklich vor. Dieſelbe kann nach Colson's Leichen-Experimenten auf dreierlei Weiſe zu Stande kommen: 1) durch übermäſſige Beugung des Vorderarms, 2) durch gewaltsame Rotation des Vorderarms um die Achſe des Humerus, 3) durch Hyperextension des Vorderarms. — Nach den wenigen vorliegenden

Beobachtungen an Lebenden befand sich der Vorderarm im Moment der Verrenkung in einer ziemlich stark gebeugten Stellung, und diese muss wohl, wegen des bei ihr Statt findenden Anstemmens des Processus coronoides ulnae gegen die Fossa humeri anterior, als prädisponirend angesehen werden. Die Veranlassung der Verrenkung war ein Fall auf den Ellenbogen, durch welchen das Olecranon vorwärts getrieben wurde. Wahrscheinlich hängt es nur von dem Grade der einwirkenden Gewalt ab, wie weit das Olecranon verschoben wird, ob es nämlich mit seinem rauhen oberen Ende gegen die Trochlea angestemmt stehen bleibt, oder an der vorderen Fläche der letzteren weiter hinaufgleitet. Letzteres ist, nach den vorliegenden Beobachtungen, höchst selten und lässt nicht bloß eine sehr ausgedehnte Zerreißen der Bänder, sondern auch eine beträchtliche Ablösung der Triceps-Sehne und des Musc. brachialis internus voraussetzen. Jedoch sind hierüber bestimmte Angaben nicht zu machen, da die anatomische Untersuchung noch in keinem der beobachteten Fälle Statt fand.

αα) Bleibt das Olecranon mit seiner Tuberositas gegen die Trochlea angestemmt, so ist der Arm um die Länge der Fossa sigmoidea major (etwa 2—3 Centim.) verlängert, steif, beinahe vollständig gestreckt und lässt sich ohne grosse Gewalt in Hyperextension, äusserst schwierig aber in Beugung versetzen. An der Stelle des Olecranon fühlt man zwischen den Condylen des Humerus eine Grube, welche, wenn die Geschwulst noch nicht bedeutend ist, auch mit dem Auge erkannt wird. In der Armbeuge entdeckt man den Proc. cubitalis und weiter abwärts, in entsprechender Entfernung von einander, die Spitzen des Olecranon und des Processus coronoides. Eine quer um das Gelenk laufende Furche deutet den zwischen der Eminentia capitata und dem Capitulum radii einer, und zwischen dem Condylus internus und dem Proc. coronoides anderer Seits befindlichen Raum an. Der Durchmesser des Gelenks von Vorn nach Hinten ist verringert, der Querdurchmesser unverändert.

ββ) Tritt das Olecranon auf die vordere Seite des Humerus, so ist der Durchmesser von Vorn nach Hinten bedeutend vergrößert, der Arm nicht verlängert, eher verkürzt, der Gelenktheil des Humerus an der Streckseite zu fühlen, die Spitzen des Olecranon und des Proc. coronoides treten vorn deutlich hervor.

Trotz der bedeutenden Zerreißen von Bändern, Sehnen und Muskeln, welche man vorauszusetzen hat, ist die Heilung bei gehöriger Kunsthilfe in allen bisher beobachteten Fällen glücklich gelungen.

Die Einrenkung geschieht, indem man am Vorderarm extendirt und die oberen Enden der Vorderarmknochen rückwärts drängt. Zur Retention legt man den halbgebeugten Arm in eine Mitella.

Fall von Colson (*Annales de la chirurgie*, Tom. IX. pag. 18). Ein 15jähriger Knabe stürzte beim Schlittschuhlaufen auf den rechten Ellenbogen, während der Vorderarm sich in halber Beugung befand, so dass das ganze Gewicht des Körpers auf das Olecranon einwirkte, dasselbe nach Vorn stiess und ganz aus der Trochlea herausbob. Der Arzt, welcher sofort gerufen wurde, fand eine Verlängerung des Arms um beinahe einen Zoll und konnte den Arm ohne heftigen Schmerz in Hyperextension versetzen, wobei das Olecranon zwischen den Pronator teres und den Biceps trat. Der Radius war der Ulna gefolgt; die Stellung beider Knochen zu einander war die normale. Die Reduction gelang leicht.

Fall von Léva in Antwerpen (*Annales et Bull. de la soc. méd. de Gand*, Mai 1842). Nach einem Sturz auf den Ellenbogen fand man die Länge des Arms vermehrt, das Olecranon aus dem hinteren Theile des Gelenkes verschwunden, das Ellenbogen-Gelenk leicht gebeugt, die Haut gespannt und die Sehne des Biceps stark hervorspringend; an ihrer inneren Seite fühlte man einen Knochenvorsprung. Die seitlichen Theile des Gelenkes waren abgeflacht und zeigten auf jeder Seite eine längliche Grube und mehr nach Hinten zwischen zwei Vorsprüngen eine Rinne, welche sich bis zum unteren Ende des Humerus erstreckte, gerade in der Gegend, wo man hätte eine Hervorragung finden müssen. Die Bewegungen des Gelenkes waren beschränkt und sehr schmerzhaft. Die Reduction gelang ziemlich leicht. Ein Gehülfe vollführte die Contra-Extension an der Schulter, ein zweiter die Extension am Vorderarm. Sobald diese hinreichend gewirkt zu haben schien, wurden die Gelenk-Enden des Ober- und Vorderarms von dem Wundarzt in entgegengesetzter Richtung fortgeschoben und nahmen unter Geräusch ihre normale Stellung wieder ein, während der Gehülfe den Vorderarm allmählig beugte.

γγ) Verrenkung der Vorderarmknochen nach Vorn, ohne Fractur des Olecranon, aber mit vollständiger Umdrehung beider Vorderarmknochen, ist eine äusserst seltene Varietät, welche sich an die seitlichen Rotations-Verrenkungen (pag. 756) anschliesst.

Beobachtung von Maisonneuve (*Gaz. des hôp. 1867*, pag. 37). Eine sehr abgemagerte Frau stürzte aus dem Bett auf den Ellenbogen. Der Proc. cubit. humer. ragte stark nach Hinten hervor, nur von der Haut bedeckt, da der M. triceps über den Condylus externus nach Vorn geglitten war. Die hintere Fläche des Olecranon war Vorn in der Ellenbeuge zu fühlen, die Fossa sigmoid. maj. schien den vorderen Umfang der Trochlea zu umfassen; das Capit. radii war nicht deutlich zu fühlen. Der Vorderarm stand in mässiger Beugung und starker Pronation, liess sich übrigens (passiv) beugen und strecken. Reduction in Chloroformnarkose. Zuerst wurde die Ulna auf den Condylus extern., also seitlich nach Aussen, verschoben, wodurch zunächst das Capit. radii an der radialen (jetzt inneren) Seite des Olecranon fühlbar wurde. Dann wurde die Ulna über die Spitze des Condyl. ext. hinausgedrängt, worauf der Vorderarm sich von selbst in Supination stellte und die Verschiebung sich in eine vollständige Luxation nach Hinten umwandelte, deren Reduction leicht gelang. — An Leichen gelang Maisonneuve die Herstellung dieser Verrenkung, indem er die

Ulna nebst dem Triceps gewaltsam über den Condylus extern. nach Aussen schob und dann die Pronation des Vorderarms so lange steigerte bis die vollständige Umdrehung der Ulna erfolgte. Brachialis int. und Supinator brevis zerrissen dabei.

β) Von der Verrenkung der Vorderarmknochen nach Vorn mit Bruch des Olecranon giebt es nur zwei Beispiele, und nur von dem einen (Riche) sind die Erscheinungen während des Lebens bekannt. Es verhielt sich Alles, wie bei der Verrenkung ohne Bruch des Olecranon, mit dem einzigen Unterschiede, dass letzteres an seiner Stelle geblieben war und daselbst gefühlt wurde.

In beiden Fällen bestanden so bedeutende Nebenverletzungen, dass es fraglich erscheint, ob nicht vielmehr die Luxation als Nebenverletzung zu betrachten war.

Die Einrenkung würde keine Schwierigkeiten machen und nach den so eben gegebenen Vorschriften zu vollziehen sein. Desto schwieriger ist voraussichtlich die Retention, welche wie bei Fractura olecrani (pag. 440 u. f.) zu bewerkstelligen wäre.

Beobachtung von Riche (Archives générales de médecine, 3. série, Tom. VI. pag. 471). Ein 18jähriger Maurer fiel von einem 45 Fuss hohen Gerüst. Am linken Ellenbogen fand sich der Durchmesser von Vorn nach Hinten vergrössert, der Querdurchmesser wenig verändert, vielleicht etwas kleiner; der Vorderarm wenig gebeugt und supinirt; jede willkürliche Beugung im Ellenbogengelenk, trotz der sehr grossen passiven Beweglichkeit, unmöglich. Der stark hervorspringende Condylus internus ist dem Processus styloideus ulnae fast um einen Zoll näher gerückt; die Verminderung der Entfernung von dem weniger hervorspringenden Condylus externus bis zu dem Processus styloideus radii ist weniger beträchtlich. Am hinteren Theile des Gelenkes findet man das Olecranon, das zur Seite verschoben werden kann, sonst seine normale Lage behalten hat, aber zum Theil aus einer ansehnlichen Wunde hervortritt. Unterhalb derselben gelangt der Finger in eine Vertiefung, in der man den Knochen nicht weiter verfolgen kann. An jeder Seite des Olecranon besteht eine Vertiefung, deren äussere Grenzen die Condylen ausmachen. Letztere springen hervor und drängen die Haut nach Oben; ihre Lage in Bezug auf das hintere Ende der Ulna ist normal. Vorn fühlt man in der Tiefe, einen Finger breit oberhalb der Condylen, eine länglich-runde, harte Geschwulst, welche den Brachialis internus und den Biceps emporhebt. — Zum Behufe der Reduction wurde der Vorderarm stark gebeugt, während an ihm zugleich extendirt wurde, und das obere Ende der Vorderarmknochen nach Hinten und Oben geschoben. Dies gelang ohne Mühe, aber die Verrenkung wiederholte sich mehrere Male mit grosser Leichtigkeit. Der Kranke starb an demselben Tage in Folge eines beträchtlichen Ergusses in die Unterleibshöhle. — Bei der Section fand man den Muskelcomplex, welcher von dem Condylus internus entspringt, in der Tiefe gänzlich zerrissen, ebenso das Ligamentum laterale internum, welches am Humerus und am Proc. coronoides nur noch mit einigen Fasern hing, das Ligamentum laterale externum unversehrt, aber durch den Radius nach Oben und Vorn gezogen, horizontal gestellt. Die Verbindung der Triceps-Sehne mit dem oberen Bruchstück der Ulna ist unversehrt; dasselbe ist ausserdem nach Innen an dem Anconaeus quartus und nach Aussen an dem äusseren Kopf des Triceps befestigt, so dass es nach allen Seiten hin mit Muskeln im Zusammenhang steht und dadurch in seiner normalen Stellung erhalten wird. Die Länge des Bruchstücks betrug 2 Zoll. Die Bruchlinie verlief schräg durch die Mitte

der *Incisura sigmoidea major*, demnächst aber an der äusseren Seite der Ulna nach Hinten und zuletzt zur inneren Seite herüber, so dass ihr Ende einen Finger breit unterhalb des *Olecranon* sich befand. Der *Proc. cubitalis humeri* befand sich hinter den Knochen des Vorderarms, welche nach Vorn verschoben und $\frac{1}{2}$ Zoll über die *Condylen* aufwärts gerückt waren. Das *Ligamentum annulare radii* war unversehrt, die Gelenkkapsel fast ganz zerrissen.

e) Seitliche Verrenkungen der Vorderarmknochen.

Vollkommene Verrenkungen der Vorderarmknochen blos nach der einen oder anderen Seite, wie sie namentlich *Boyer* noch beschrieb, sind niemals beobachtet worden. Vielmehr sind die seitlich verschobenen Vorderarmknochen entweder zugleich nach Hinten verrenkt, oder in solcher Weise rotirt, dass die *Fossa sigmoidea major* der Ulna den Winkel des Humerus umfasst. Der Name „Seiten-Verrenkung“ ist aber a potiori vollkommen berechtigt.

Die seitliche Verrenkung mit gleichzeitiger Rotation ist bisher nur sehr selten, und zwar nur in der Richtung nach Aussen beobachtet worden (s. pag. 759). Dieselbe lässt sich aus einer anderweitigen Ellenbogenverrenkung nicht ableiten und nöthigt unbedingt zur Annahme der von *Blanchen* in Zweifel gezogenen primären Seitenverrenkungen, deren Entstehung bei der grossen Festigkeit, welche das Gelenk einer in seitlicher Richtung einwirkenden Gewalt durch das Eingreifen seiner Knochen-Enden in einander entgegengesetzt, allerdings schwer zu erklären ist. — Verrenkungen zur Seite und nach Hinten (nach dem Vorgange von *A. Cooper*, auch „seitliche Verrenkungen“ schlechtweg genannt) sind, obgleich seltener als einfache Verrenkungen nach Hinten (vgl. pag. 744), doch bei Weitem häufiger, als die Seitenverrenkungen mit Rotation. Vielleicht entstehen sie immer als secundäre Verschiebungen aus Luxationen nach Hinten, vielleicht aber erfolgt die Verschiebung nach Hinten secundär durch den Zug des *Triceps*.

Die Entstehung der primären Lateral-Luxation erklärt *Malgaigne* in folgender Weise. Ein heftiger Schlag trifft die äussere Seite des Gelenkes; Oberarm und Vorderarm werden an dieser Seite hart an einander gedrängt, während ihre Gelenkflächen auf der inneren Seite sich etwas von einander entfernen. Wirkt die Gewalt weiter, so machen die an der äusseren Seite fest gegen einander gestemmten Knochen eine Art von Hebelbewegung, durch welche das *Ligamentum laterale internum* zerrissen wird. Der Verschiebung leistet nun blos das *Ligamentum laterale externum* Widerstand; wird auch dies zer-

rissen, so entsteht eine vollständige Verrenkung, und zwar nach Innen, wenn die Gewalt mehr auf den Vorderarm, — nach Aussen, wenn sie mehr auf den Oberarm einwirkte. Ein Stoss oder Schlag auf die innere Seite des Gelenks kann ähnliche Wirkungen haben. Jedoch hält Malgaigne wegen des starken Hervorspringens des inneren Randes der Trochlea die Verschiebung nach Innen für fast unmöglich. Jedenfalls sind Verrenkungen nach Hinten und Innen und selbst unvollständige Verrenkungen nach Innen höchst selten.

Die Entstehung einer seitlichen Verschiebung aus der primären Verrenkung nach Hinten bedarf keiner besonderen Erklärung. Vgl. pag. 745.

α) Verrenkung der Vorderarmknochen nach Aussen.

1) Unvollkommene Verrenkung des Vorderarms nach Aussen (Fig. 104) ist nach älteren und neueren Beobachtungen¹⁾

Fig. 104.



nicht ganz selten, obgleich es schwer gelingt, sie an der Leiche zu Stande zu bringen. Das Capitulum radii, welches durch das Ligamentum annulare mit der Ulna in normaler Verbindung steht, hat die Eminentia capitata verlassen und steht an der äusseren Seite des Condylus externus und unter demselben. Die Fossa sigmoidea major ulnae hat die Trochlea verlassen und umfasst die Eminentia capitata²⁾. Der Kranke hält den Vorderarm ein wenig gebeugt und pronirt. Jede Veränderung dieser Stellung ruft lebhafteste Schmerzen hervor; jedoch lassen sich Beugung und Streckung oft in erheblichem Maasse und in scheinbar normaler Weise (passiv) ausführen, indem die Fossa sigmoid. maj. sich auf der Rotula bewegt. Die Sehne des Biceps und der Brachialis internus sind beträchtlich gespannt. An der hinteren Seite des Gelenkes ist vor Allem der bedeutende Abstand

zwischen dem Olecranon und dem Condylus internus auffallend. Unter dem letzteren findet man die frei liegende Trochlea. Die tellerförmige Grube des Radius wird entdeckt, wenn man den Finger an dem

¹⁾ Pitha (l. c. pag. 72) erzählt 3 sehr instructive Fälle.

²⁾ Betrachtet man das Ellenbogengelenk als ein Ganzes, so ist diese Verrenkung offenbar eine unvollkommene; berücksichtigt man aber die einzelnen Vorderarmknochen, so kann sie als vollkommene bezeichnet werden, da keiner derselber mit dem ihm zugehörigen Theile des Proc. cubitalis in Berührung steht.

äusseren Winkel des Humerus abwärts führt, ist jedoch oft durch den Condylus externus verdeckt und deshalb schwer zu fühlen. — Von besonderem Interesse ist die durch C. Hueter¹⁾ nachgewiesene, wie es scheint, nicht ganz seltene Complication mit Bruch der Spitze des Condylus internus und Interposition des Bruchstücks zwischen der Trochlea und dem Rande der Fossa sigmoid. maj. ulnae. Es handelt sich dabei um einen Bruch durch Abreissen, indem das Ligament. lateral. intern., statt selbst zu zerreißen, den Theil des Condylus int., an welchem es inserirt, abreisst und mitnimmt.

2) Vollkommene Verrenkungen nach Aussen sind sehr viel seltener. Dieselben erfolgen entweder nach Aussen und Hinten oder nach Aussen mit Rotation beider Vorderarmknochen um ihre Längsachse nach Innen.

aa) Bei der Verrenkung nach Aussen und Hinten ist sowohl der Querdurchmesser des Ellenbogengelenks als auch derjenige von Vorn nach Hinten vergrössert. Das Olecranon springt in der Nähe des Condylus externus stark nach Hinten hervor. Das Capitulum radii wird deutlich neben dem äusseren Condylus, dessen Spitze deshalb gar nicht gefühlt werden kann, angetroffen. Der Arm ist verkürzt und wird übrigens wie bei der unvollständigen Verrenkung gehalten. — Eine sehr üble Complication dieser Verrenkung kann dadurch entstehen, dass der Biceps und Brachialis internus nebst der Arteria brachialis hinter den Condylus externus gleiten, indem sie der Verschiebung der Vorderarmknochen, besonders des Radius folgen²⁾. Wahrscheinlich drängt sich in einem solchen Falle, während die Ulna durch den Triceps aufwärts gezogen wird, der Condylus externus zwischen sie und die gedachten Weichtheile. Diese Interposition von Weichtheilen kann nicht blos die Einrenkung hindern, sondern auch wegen der Compression der Arteria brachialis Brand bedingen, da die Arteriae collaterales durch die Luxation selbst zerissen oder doch comprimirt werden. Die Zerreißen des Nervus ulnaris, welche man bei anatomischer Betrachtung beinahe für unausbleiblich halten sollte, ist nur einmal (von Bulley) bestimmt beobachtet worden. Stromeyer erwähnt die zuweilen erst nachträglich eintretende Durchbohrung der Haut durch den inneren Condylus. Complication mit Bruch des Condylus externus wurde wiederholt beobachtet.

¹⁾ Zur Lehre von den Luxationen, Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. IX. pag. 933.

²⁾ Vgl. Debruy, Annales de la chirurgie 1843.

4b) Die Verrenkung der Vorderarmknochen nach Aussen mit gleichzeitiger Rotation derselben nach Innen¹⁾.

ist zuerst von Nélaton²⁾, später von Rollet³⁾ beobachtet worden. Sie dürfte aus einer primären Seilenverrenkung in ähnlicher Weise durch den Zug des Biceps entstehen, wie die Verrenkung nach Hinten und Aussen durch den Triceps. — Die Symptome ergeben sich aus der nachstehenden Beschreibung Nélaton's, welche einen veralteten Fall betrifft.

„Der verletzte Ellenbogen hat seine normale Gestalt ganz verloren; er scheint gar nicht mehr vorhanden zu sein. Der am normalen Gelenk durch das Olecranon gebildete Vorsprung fehlt.

Das untere Ende des Humerus (Fig. 345, P) ragt als eine unflüchtige Geschwulst an der inneren Seite und etwa 2 Centim. unterhalb der oberen Enden der Vorderarmknochen hervor. Verfolgt man die Knochenvorsprünge und Vertiefungen in der Richtung von Innen nach Aussen, so bemerkt man:




Fig. 345.

1) den *Condylus internus*, über welchen die Haut stark gespannt ist, 2) die Rinne zwischen ihm und dem inneren Bande der Trochlea, in welcher der Nerven *ulnaris* liegt, 3) die Trochlea, insbesondere ihren inneren Rand, welcher den am Tiefsten stehenden Theil der Geschwulst ausmacht, 4) den hinteren Theil ihres äusseren Bandes, welcher hinter der die Trochlea von der *Eminentia capitata* (Bottula) trennenden Rinne gelegen ist, 5) den *Condylus externus*, 6) die hintere Fläche des äusseren Winkels des Humerus. Alle diese Theile können so deutlich gefühlt werden, als hätte man über einen skeletirten Arm nur ein Stück Haut gelegt.

Die oberen Enden der Vorderarmknochen liegen nach Aussen, zum Theil auch nach Vorn und erheblich höher, als der *Processus coracoideus*. Sie bilden eine verhältnissmässig geringe Geschwulst, zu welcher man in der Richtung von Hinten, Aussen und Unten, nach Vorn, Innen und Oben fortschreitend bemerkt: 1) einen 26—25 Millimeter nach Oben und Aussen vom *Condylus externus* gelegenen Knochenvorsprung, die *Olecranon* (O), dessen Zusammenhang mit der Ulna einer- und mit der hervorspringenden *Triceps*-Sehne anderer Seite deutlich erkannt werden kann (die ganze Ulna (U) ist so gedreht, dass die hintere Fläche des *Olecranon* nach Aussen gewandt ist und die *Fossa sigmoidea major* den äusseren Rand des Humerus umfasst), 2) den normalen Zwischenraum zwischen Radius und Ulna, in welchem sich der (atrophische) *Anconaeus quartus*

¹⁾ In Betreff der vollständigen Umdrehung der Vorderarmknochen s. pag. 751.

²⁾ Vgl. Huguier, *Thèse de concours sur le diagnostic des maladies du coude*, und Nélaton, *Pathologie chirurgicale*. Paris 1847, Tom II, pag. 381 u. f. — Fig. 105 ist eine schematische Zeichnung.

³⁾ *Gazette des hôpitaux* 1849, 17. April.

befindet, 3) den Radius (*R*), welcher mit der Ulna in normaler Weise verbunden ist, dessen tellerförmige Grube aber vor der vorderen äusseren Fläche des Humerus steht. In der Umgebung dieses neuen Gelenkes fanden sich (bei *C*) stalaktitenförmige Osteophyten.

Der Radialrand des Vorderarms ist nach Oben, sein Ulnar-
rand nach Unten gewendet, die hintere Fläche der Ulna sieht nach Aussen, die Fossa sigmoidea minor nach Oben, der Biceps und der Brachialis internus sind gespannt und springen nach Vorn hervor. Der Vorderarm steht gegen den Oberarm beinahe rechtwinklig gebeugt. Beugung und Streckung im Ellenbogengelenk sind unmöglich.*

β) Die Verrenkung der Vorderarmknochen nach Innen

kann gleichfalls als vollkommene und unvollkommene vorkommen. Letztere (Fig. 106) ist noch etwas häufiger, als erstere; überhaupt aber sind diese Verrenkungen äusserst selten¹⁾. Eine genaue Beschreibung derselben würde zu Wiederholungen führen, da von ihnen Alles, was von der Verrenkung nach Aussen gesagt wurde, in gleicher Weise, nur immer in umgekehrter Ordnung gilt. Die Ulna wird dicht unter dem Condylus internus gefühlt, steht der Spitze desselben näher, als im normalen Zustande, zuweilen sogar darüber hinaus, so dass der Condylus internus jedenfalls keine Hervorragung bildet; der Condylus externus dagegen ragt an der äusseren Seite des Gelenkes auffällig hervor. Biceps und Triceps sind nach Innen verschoben.

Die **Prognose** ist bei den Seitenverrenkungen im Allgemeinen schlechter, als bei den Verrenkungen nach Hinten, mit denen die vollständigen Seitenverrenkungen sonst in mehrfacher Beziehung übereinstimmen. Erfolgt bei letzteren keine Einrenkung, so wird das Gelenk und somit der Vorderarm ganz unbrauchbar. Besonders gross ist die Gefahr, wenn die oben erwähnte Interposition von Weichtheilen Statt findet. Die unvollständigen Seitenverrenkungen haben eine bessere Prognose; sogar sich selbst überlassen, gestatten sie späterhin ziemlich ausgedehnte Bewegungen im Ellenbogengelenk. Die Interposition der abgebrochenen Spitze des Condylus internus bedingt ein wichtiges Repositions-Hinderniss.

Die **Einrenkung** geschieht bei completen Seiten-Luxationen meist leicht durch Extension und seitlichen Druck oder Rotation, je nach der Richtung und der Art der Verrenkung. Statt der Extension können auch die bei der Luxation nach Hinten angegebenen Verfahren An-

Fig. 106.



¹⁾ Auch Pitha (l. c. pag. 74) vermag aus seiner reichen Erfahrung nur 2 Fälle von incompleter Luxation nach Innen zu erzählen.

wendung finden. — Bei Weitem schwieriger ist die Einrichtung der incompleten Seiten-Luxationen, bei denen man oft nur dadurch zum Ziele kommt, dass man durch Dorsalflexion den Kapselriss vergrössert und die Verrenkung absichtlich in eine vollständige umwandelt, die dann leicht zu reduciren ist. Namentlich gilt dies, nach Pitha, für die incomplete Verrenkung nach Innen. Findet man bei einer unvollständigen Luxation nach Aussen Schwierigkeiten, so hat man Grund, die Interposition eines Kapselstücks oder des mit dem Ligam. lateral. intern. abgerissenen Condylus internus anzunehmen. Dann führt Dorsalflexion mit nachfolgender Abduction (Umbeugung nach der äusseren Seite) und schliesslicher Beugung des Vorderarms (vgl. pag. 747) am Sichersten zum Ziele, da durch die Abduction voraussichtlich das noch an der Ulna festsitzende Ligam. lateral. internum gespannt und somit das an ihm haftende Bruchstück aus seiner interponirten Stellung entfernt wird. — Für den Fall der Interposition von Weichtheilen (pag. 755) empfiehlt Streubel, den Arm Anfangs in Dorsalflexion zu bringen, dann nach Aussen umzubiegen, um die Spitze des Olecranon in die Fossa humeri posterior zu drängen, und ihn endlich stark zu beugen, wobei die interponirten Weichtheile um den Condylus internus herum nach Vorn gleiten sollen.

Michaux dagegen glaubt die interponirten Weichtheile bei gebeugtem Vorderarm direct nach Vorn drängen, oder aber die hindernden Sehnen durch subcutane Durchschneidung beseitigen zu können — und die Arterie? Bis jetzt haben wir keine Erfahrungen über diese Vorschläge.

Zur **Retention** dient die gebeugte Lage des Arms in einer Mittella; nur in besonders schwierigen Fällen bedarf man für die ersten Wochen des Gypsverbandes. Bei der ausgedehnten Quetschung und Zerreissung der Weichtheile hat man stets die Entzündung energisch zu bekämpfen. Drückende Verbände sind zu vermeiden. Sollte, wie Stromeyer sah, grosse Neigung zur abermaligen Verschiebung bestehen, so müssen die alsdann anzuwendenden rechtwinklig gebogenen Seitenschiene den Condylen (besonders dem C. internus) entsprechende Löcher oder Ausbiegungen besitzen, um Druckbrand an diesen Stellen zu verhüten.

d) Verrenkungen beider Vorderarmknochen nach verschiedenen Richtungen: Divergirende Ellenbogen-Verrenkungen.

Bei dieser höchst seltenen Varietät wird gewöhnlich die Ulna nach Hinten und der Radius nach Vorn verschoben; aber auch Verrenkung der Ulna nach Aussen und des Radius nach Vorn oder nach

Vorn und Innen wurde beobachtet. Dieser letztere Fall bildet den Uebergang zu den Seitenluxationen mit Rotation (pag. 756).

Piogey und Dubreuil, welche diese letztere Art frisch beobachteten, machen darüber (*Gazette des hôpitaux* 1851, No. 8; *Canstatt's Jahresbericht für 1852*, IV. pag. 42) folgende Angaben. An der hinteren Seite des Gelenkes fehlt das Olecranon in der Fossa humeri posterior; den Condylus internus und die Trochlea fühlt man deutlich; das Olecranon umfasst mit seiner Cavitas sigmoidea major die Eminentia capitata humeri von Vorn und Aussen her, so dass seine hintere Fläche nach Aussen und Vorn, sein innerer Rand nach Hinten, der äussere nach Vorn gerichtet ist. (Bis dahin also Alles fast genau so, wie in dem Falle von Nélaton, pag. 756 u. f.). Nach Vorn und Innen vom Olecranon steht das Capitulum radii, ausser aller Verbindung mit der Eminentia capitata, beträchtlich entfernt von der Cavitas sigmoidea minor; seine Circumferentia articularis befindet sich in der Fossa supratrochlearis, also da, wo eigentlich der Processus coronoides ulnae stehen sollte. An der vorderen Seite des Gelenkes findet sich eine tiefe Grube, aussen vom Tendo tricipitis, innen vom Capitulum radii, unten vom äusseren Rande des Olecranon begrenzt. Der Arm ist wenig verkürzt, sein Umfang in der Ellenbogengegend vermehrt. — Die Veranlassung war ein Fall in der Trunkenheit. — Die Reduction gelang, nachdem in gebeugter Stellung durch Druck auf das obere Ende des Vorderarms, bei gleichzeitiger Unterstützung seines unteren Endes, kräftig extendirt war, mittelst gewaltsamer Supination und Flexion des Vorderarms.

Ich habe veraltete Fälle der Art wiederholt gesehen. Eine divergirende Luxation, bei der die Ulna nach Hinten und Oben, der Radius nach Vorn verschoben war, versuchte ich zu reduciren, nachdem sie schon über ein halbes Jahr bestanden hatte. Nur der Radius ging vollständig zurück; aber der bis dahin steif extendirt stehende Arm konnte nun bis zum rechten Winkel gebeugt werden und wurde wieder brauchbar.

Guersant (*Union méd.* 1854) beobachtete „Verrenkung der Ulna nach Innen und des Radius nach Aussen,“ — Chevallier (*Archiv. méd. Belges*, 1870, Oct.): „Verrenkung der Ulna nach Hinten, des Radius nach Aussen.“

Bei allen divergirenden Verrenkungen muss das Ligamentum annulare zerrissen sein; welche weiteren Verletzungen an dem Gelenke und am Ligam. interosseum Statt finden, ist anatomisch nicht nachgewiesen. Die Veranlassung ist auch hier ein Sturz auf die Hand oder auf den Ellenbogen; der Mechanismus der Verrenkung ist jedoch nicht hinreichend aufgeklärt. Vielleicht geht immer eine incomplete Luxation nach Hinten vorher, aus welcher Stellung, wenn das Lig. annulare zerrissen ist, Biceps und Pronator teres den Radius nach Vorn ziehen, während der Triceps die Ulna weiter nach Hinten zieht.

Die **Symptome** der relativ häufigsten Form der divergirenden Ellenbogen-Verrenkung — Radius nach Vorn, Ulna nach Hinten — sind aus denen der Verrenkung des Radius und derjenigen der Ulna (pag. 761 u. f.) zusammengesetzt. Der Vorderarm gebeugt, verkürzt, in der Mitte zwischen Pro- und Supination, der Durchmesser des Gelenkes von Vorn nach Hinten vergrössert, die Entfernung zwischen den beiden Condylen unverändert; das Olecranon ragt nach Hinten

(resp. zur Seite) hervor, die Triceps-Sehne ist gespannt. Die Richtung der beiden Vorderarmknochen gegen einander ist gänzlich verändert, ihre Beweglichkeit auf's Aeusserste beschränkt.

Die Stellung des Capitulum radii ist am Schwierigsten zu entdecken, daher auch Verwechslung mit einer isolirten Luxation der Ulna möglich. Der Irrthum wird nach Reduction der Ulna erkannt. Auch mit einer Verrenkung der Ulna, bei welcher zugleich Bruch des oberen Endes des Radius besteht, könnte die divergirende Verrenkung verwechselt werden. Bei letzterer steht aber der Vorsprung, den man in der Ellenbeuge fühlt, vor dem unteren Ende des Humerus, ist abgerundet, glatt, von regelmässiger Form, kurz besitzt alle Eigenschaften des Radiusköpfchens; Pro- und Supination lassen sich diesem Vorsprunge mittheilen. Bei Fractura capit. radii dagegen liegt der Vorsprung in der Armbeuge tiefer, hat eine unregelmässige Form und ist mehr oder weniger zackig; an der Hand ausgeführte Drehbewegungen theilen sich dem Radiusköpfchen, welches an seiner normalen Stelle steht, nicht mit, können aber eine trockene, raue Crepitation veranlassen.

Die **Prognose** ist nicht so schlecht, wie man nach den vorauszusetzenden, ausgedehnten Zerreibungen erwarten sollte. Selbst in Fällen, wo verspätete Einrichtungsversuche nicht mehr zum Ziele führen, wird der Arm nicht ganz unbrauchbar. In frischen Fällen gelingt die Wiederherstellung der Brauchbarkeit des Arms.

Die **Reduction** ist in der Regel so ausgeführt worden, dass man zuerst die Ulna und dann den Radius in der bei den Verrenkungen dieser Knochen zu beschreibenden Weise reponirte. Vidal schlägt vor, während kräftig extendirt wird, das Gelenk mit beiden Händen zu umfassen, die Daumen auf das Olecranon aufzusetzen und mit Unterstützung des Knies letzteres abwärts und nach Vorn zu drängen, während die übrigen Finger in der Armbeuge das Radiusköpfchen nach Hinten drängen. Streubel¹⁾ glaubt, dass es ausreiche, wenn man, während der Arm in vollständiger Supination (so weit diese möglich) extendirt wird, kräftig auf das Capitulum radii drücke.

In dem oben erwähnten, allerdings veralteten Falle habe ich, nachdem diese beiden Verfahren mich im Stich gelassen, die Hyperextension mit directem Druck auf das Capitulum radii verbunden.

¹⁾ Prager Vierteljahrsschrift, 1850. — Vgl. auch Piögey und Dubreuil, pag. 759.

B. Verrenkungen eines der beiden Vorderarmknochen im Ellenbogengelenk.

a) Verrenkungen der Ulna (nach Hinten).

Isolirte Verrenkungen des oberen Endes der Ulna sind selten und nur in der Richtung nach Hinten, jedoch nicht bloss unvollständige (vgl. pag. 745), sondern auch als vollständige Luxationen beobachtet worden. Eine geringe Verschiebung des Radius gegen die Trochlea hin (Fig. 107) oder nach Hinten kommt dabei häufig vor; auch kann der Processus coronoides abgebrochen sein (vgl. pag. 444). In einzelnen Fällen war die Ulna nach Hinten und Innen verschoben.

Symptome. Der Vorderarm ist auffallend pronirt (nach Innen verdreht) leicht gebeugt der nahezu gestreckt. Weder vollständige Streckung, noch Beugung über einen rechten Winkel hinaus sind möglich, wohl aber Rotation und Supination. Der Ulnarrand des Vorderarms ist auffallend verkürzt, seine Achse bildet mit derjenigen des Oberarms einen nach Innen offenen Winkel. Der Querdurchmesser der Ellenbeuge erscheint geringer; dagegen ist der Durchmesser von Vorn nach Hinten, sowie der Umfang des Gelenkes vergrößert. Die Trochlea springt an der vorderen Seite, das Olecranon nach Hinten hervor. Die Spitze des letzteren ist mehr nach Aussen gewandt und steht dem Condylus externus näher, während der innere Rand der Incisura sigmoidea major nach Innen und Hinten sieht. — Wurde der Nervus ulnaris gequetscht, so treten die, von Taubheit der betreffenden Hautstellen begleiteten Schmerzen nach dem Verlaufe desselben auf und werden durch jede Bewegung des verletzten Gelenkes gesteigert. Bei completer Luxation nach Hinten und Innen deckt der Processus coronoides ulnae gerade gegen die Rinne des Condylus internus, in welcher der Nervus ulnaris liegt und könnte daher sehr leicht quetschen oder verschieben (vgl. Fig. 107); jedoch werden die auf Quetschung oder Zerrung des Nervus ulnaris hindeutenden Symptome verhältnissmässig selten erwähnt¹⁾. Bei den häufigeren incompleten Verrenkungen wird der Nervus ulnaris nicht gequetscht, oft nicht einmal gezerrt oder verschoben.

Fig. 107.



¹⁾ Vgl. namentlich Streubel, l. c., und Deutsche Klinik, 1852, No. 16.

Das Ligamentum laterale internum ist immer zerrissen. Die übrigen Bänder, namentlich das Lig. annulare, reissen in der Regel auch. Bleibt das Lig. annulare unversehrt, so muss, wie sich bei anatomischer Betrachtung ergibt, der Radius etwas nach Hinten oder nach Innen ausweichen. Bei beträchtlicher Verschiebung der Ulna müsste wohl auch das Lig. interosseum und der Zwischengelenk-Knorpel des unteren Cubito-Radialgelenkes zerreissen.

Die gewöhnliche **Veranlassung** ist ein Fall auf die Hohlhand, bei welchem der Stoss jedoch hauptsächlich den Ulnar-Rand der Hand trifft. Wahrscheinlich knickt dabei der Arm im Ellenbogen-Gelenk nach Aussen um, so dass, während das Capitulum radii sich gegen den Humerus anstemmt, das innere Seitenband zerreist, wovon dann durch die weiter fortwirkende Gewalt des Stosses die Luxation zu Stande kommt. Für die Annahme eines solchen Mechanismus sprechen namentlich die Experimente von Streubel.

In einem von Pitha (l. c. pag. 87) beobachteten Falle entstand die Luxation bei einem kleinen Mädchen, welches zwischen Thür und Wand eingeklemmt wurde, während es mit beiden Händen die Thür zurückzudrängen suchte, an demjenigen Arme, welcher der Thürangel zugewandt war, mithin gerade am Ulnarrande der Hand den stärksten Druck erlitt. Der Mechanismus der seitlichen Umknickung ist auch hier leicht zu verstehen.

Die **Einknückung** ist leichter, als bei Luxation beider Knochen. A. Cooper empfiehlt die gewaltsame Beugung über dem Knie mit gleichzeitiger Extension am Vorderarm. Hierbei ist es von entscheidender Wirkung, dass das Capitulum radii sich, je stärker die Beugung wird, desto mehr gegen die Eminentia capitata humeri anstemmt und folglich den Humerus nach Hinten drängt. Die Reduction gelingt aber mindestens eben so leicht durch Hyperextension mit schnell darauf folgender Beugung (vgl. pag. 748), oder durch Seitenflexion (indem man das Knie gegen den Condylus externus stemmt) mit schnell folgender Beugung bei nach Aussen rotirtem Oberarm (Streubel). Letzteres Verfahren entspricht am Besten dem oben erläuterten Mechanismus der Entstehung.

b) Verrenkungen des Radius im Ellenbogen-Gelenk.

Wir kennen vollständige und unvollständige Verrenkungen des Radiusköpfchens, und zwar in allen drei möglichen Richtungen: nach Vorn, nach Hinten und nach Aussen.

α) Verrenkung des Radiusköpfchens nach Vorn kommt als vollständige und als unvollständige vor; jedoch ist es zweifelhaft, ob die als „unvollständige Verrenkung nach Vorn“ bezeichnete Verletzung wirklich immer eine solche ist.

1. Bei der vollständigen Verrenkung (Fig. 108) verlässt das Capitulum radii die Cavitas sigmoidea minor der Ulna und stellt sich mit seiner Circumferentia articularis auf die Volarseite der Eminentia capitata humeri, oder auch in die Fovea anterior minor, zwischen Biceps und Supinator longus. Der Vorderarm, abducirt und halb gebeugt, kann (auch passiv) nicht bis über einen rechten Winkel gebeugt und gar nicht gestreckt werden. Beim Versuche, die Beugung weiter zu treiben, fühlt und hört man das Anstossen des Radiusköpfchens an den Humerusschaft. Der Radius steht nach Vorn und bildet mit seinem Köpfchen in der Ellenbeuge eine, besonders bei einem Versuch zur Streckung deutliche Hervorragung. Die Hand steht in halber Pronation und kann nur wenig gedreht werden. Der Condylus externus humeri springt nach Aussen und Hinten stärker hervor, unter ihm, wo das Capitulum radii stehen sollte, ist eine (von der bald eintretenden Geschwulst meist verdeckte) Vertiefung; die Entfernung von ihm zum Processus styloideus radii ist verringert.

Fig. 108.



Die **Veranlassung** war meist eine direct auf das Capitulum radii in der Richtung von Hinten nach Vorn einwirkende Gewalt, z. B. bei einem Sturz hintenüber. In anderen Fällen soll ein Fall auf die vorgestreckte Hand, was wohl nur bei gleichzeitigem Bruch der Ulna möglich (Roser), in noch anderen gewaltsame und übermässige Supination die Veranlassung gewesen sein. Viel wahrscheinlicher ist die Entstehung durch übermässige Pronation, bei welcher das Radiusköpfchen durch die Hebelbewegung, die der Radius an der Stelle, wo er sich alsdann mit der Ulna kreuzt, erleidet, nothwendig stark nach Vorn gedrängt werden muss (Streubel).

Erfolgt keine Einrenkung, so bleiben Beugung und Streckung, Pronation und Supination immer unvollständig.

Die **Reduction** und noch mehr die Retention haben oft Schwierigkeiten, theils weil sich Stücke des Kapselbandes zwischen die Gelenkfläche der Ulna und das Capitulum radii einschieben können, theils wegen des mächtigen Zuges, den Biceps und Pronator teres an dem oberen Rande des Radius ausüben. Die Extension muss an der Hand ausgeführt werden. Die Einen empfehlen dabei die gebeugte, die Andern (Streubel) die gestreckte Stellung des Vorder-

arms. Jedenfalls muss man das *Capitulum radii direct* nach Hinten drücken und an der Hand kräftig supiniren. A. Cooper empfiehlt, den Arm über die Lehne eines Sophas zu beugen und in dieser Stellung an der Hand zu extendiren. — Zur Retention soll an der vorderen Seite des gestreckten Arms eine graduirte Compresse nebst Schiene genau befestigt werden und mehrere Wochen liegen bleiben (A. Cooper). Ein Gypsverband wird denselben Zweck besser erfüllen. Die Befestigung des Arms in starker Beugung scheint das Wieder-Ausweichen des Radius nicht so sicher verhüten zu können, freilich aber auch nicht so leicht Gelenksteifigkeit zu hinterlassen, als der Verband in gestreckter und supinirter Stellung. Debruy'n will deshalb den Verband schon nach einigen Tagen entfernen, in welcher Zeit aber der Kapselriss unmöglich geheilt sein kann.

2) Unvollständige Verrenkung nach Vorn, oder auch schlechtweg unvollständige Verrenkung des Radius nennen wir eine Verletzung, welche von Anderen gar nicht als Verrenkung anerkannt wird. Dieselbe ist, obwohl früher schon bekannt, genauer zuerst von Goyrand¹⁾, später von Gardner, Rendu, Perrin, Malgaigne und Streubel erörtert worden. Sie kommt ausschliesslich bei kleinen Kindern vor, wenn dieselben an einer Hand über einen Rinnstein oder eine Treppe hinauf geführt oder vielmehr gezogen werden, oder wenn man ein Kind in dem Augenblick, wo es fallen will, an einer Hand festhält, auch wohl bei dem Versuch, den Arm eines kleinen Kindes durch einen engen Aermel zu ziehen (Bottentuit, Perrin). Die Mehrzahl der Wundärzte, die sich mit diesem Gegenstande beschäftigt haben, glauben, dass durch einen Zug an der Hand nur, wenn diese in Pronation stünde, diese Verletzung entstehen könne. Jedoch ist bei der Beschreibung der einzelnen Fälle nicht erwähnt, dass die Hand in Pronation gestanden habe, als die Verrenkung eintrat. Sobald aber die sogen. Verrenkung erfolgt ist, steht die Hand immer pronirt, der Vorderarm halb gebeugt, oder in Viertelsbeugung und gegen den Bauch angelegt, oder endlich auch gestreckt und zur Seite herabhängend. Das ganze Glied wird unbeweglich gehalten, und das Kind schreit vor Schmerzen, wenn es den Arm auch ganz ruhig hält. Gegenstände, die man ihm hinhält, ergreift es stets mit der anderen Hand. Bei dem Versuche, die Hand (passiv) zu supiniren, erregt man nicht blos heftige Schmerzen, sondern findet auch einen entschiedenen Widerstand. Sobald man die Hand loslässt, stellt sie sich wieder in Pro-

¹⁾ Gazette médicale 1837, pag. 115. Annales de la chirurgie française et étrangère. Paris 1842, Tom. V. pag. 120.

nation. Dies ist das charakteristische Symptom der „Subluxation des Radiusköpfchens“¹⁾. Es besteht weder Geschwulst, noch Difformität in irgend auffallender Weise. Jedoch haben die Einen eine Vertiefung an der hinteren, die Anderen einen Vorsprung an der vorderen Seite des Gelenkes gefühlt und beschrieben. Erstere hebt namentlich Malgaigne hervor. Gewiss kann Beides vorkommen, bald das Eine, bald das Andere deutlicher. Malgaigne beschreibt ein knackendes Geräusch beim Versuch, das kranke Gelenk zu bewegen. Das finde auch ich sehr charakteristisch und habe es namentlich im Moment der Einrenkung höchst selten vermisst. Ich möchte es aus der von Streubel (s. unten) beschriebenen Interposition der Kapsel erklären.

Seit langer Zeit glaubten fast alle Wundärzte in dieser Symptomen-Gruppe eine Verrenkung des Radius zu erkennen; über die Art der Verrenkung aber herrschten Zweifel. Nach Duverney wäre es eine Verrenkung nach Unten, d. h. das Capitulum radii soll sich 5—7 Millimeter von der Eminentia capitata humeri, genau in der Richtung des Radius selbst, entfernen, ohne nach Vorn, Hinten oder zur Seite auszuweichen, — eine Hypothese, die keiner Widerlegung bedarf. Bontentuit glaubte, dass die Verschiebung in verschieden grosser Ausdehnung, bald nach Vorn, bald nach Aussen erfolge. Martin (Journal général de médecine, 1809) dagegen erklärte sich für eine complete Verrenkung des Radius nach Hinten und behauptete deshalb auch, man fühle das Köpfchen des Radius nach Hinten hervorragen. Wäre dies der Fall, so müssten die von Martin aufgeführten Fälle hier gänzlich ausgeschlossen und als complete Verrenkungen nach Hinten aufgeführt werden. Nach Monteggia handelte es sich um eine Verschiebung nach Vorn. Auch Collier (London medical gazette, 1836) erklärt seinen Fall für eine unvollständige Verrenkung nach Vorn. Perrin beschreibt einen, übrigens den andern ganz ähnlichen Fall als unvollständige Verrenkung nach Hinten und führt als Grund gegen die Annahme einer Verrenkung nach Vorn an, dass es möglich gewesen sei, den Arm vollständig zu biegen, was bei einer Verrenkung nach Vorn nicht vorkommen könne (Journal de chirurgie, 1843, pag. 135). Hiergegen ist einzuwenden, dass bei der unvollständigen Verrenkung das Radiusköpfchen nur so wenig hervorrage, dass die Beugung des Arms dadurch nicht wesentlich gehindert wird. Gardner (1837) und Rendu (1841) glauben, dass es sich um etwas ganz Anderes, als um eine Verrenkung handle, nämlich um eine Verschiebung der Tuberositas radii, an welche der Biceps sich anheftet, hinter den entsprechenden Rand der Ulna, wodurch die Rotation des Radius nach Aussen (Supination) unmöglich werde. Der Zwischenraum zwischen beiden Vorderarmknochen ist aber bei Kindern, nach den genauen Untersuchungen von Goyrand, viel zu weit, als dass die Tuber-

¹⁾ Dugès hat (Journal hebdomadaire, 1831) drei Beobachtungen veröffentlicht, welche von allen sonst bekannten darin abweichen, dass die Hand fast vollständig supinirt war und die Pronation durch einen „knöchernen Widerstand“ verhindert wurde. Der Radius sprang von der Eminentia capitata ein wenig hervor, und man konnte, so weit die Dicke des Fettpolsters es gestattete, an der hinteren Seite des Humero-Radialgelenkes eine Vertiefung fühlen. Es bleibt zweifelhaft, ob hier wirklich die in Rede stehende Verletzung bestand.

ositas radii, selbst bei der stärksten Pronation, den Rand der Ulna berühren könnte. Ueberdies vermochte Goyrand bei zwei Kindern die Hand mit Gewalt vollständig zu supinieren, ohne damit die Verrenkung zu beseitigen, denn die Hand kehrte, sobald er sie losliess, sogleich in die Pronation zurück. Die Hypothese von Gardner und Rendu ist also ganz unhaltbar. — Nach Bourguet (*Mémoire s. l. luxat. dites incomplètes de l'extrémité sup. du radius. Revue médico-chir., Mai, Juin, 1854*), würde die Tuberositas radii an der hinteren und äusseren Seite der Ulna durch eine Art von „Aufrollung“ der tieferen Fasern des Supinator brevis festgehalten, und eine Verschiebung des Capitulum radii bestünde dabei gar nicht.

Die wichtigste Autorität für die Deutung dieser Verletzung als Subluxation nach Vorn war Goyrand. Er erläuterte sie, wie folgt. „Die Bänder des Ellenbogen-Gelenkes sind in früher Kindheit sehr schwach. Das Radiusköpfchen aber ist nur durch ein Band, und auch durch dieses nur indirect mit dem Humerus verbunden, da das Ligamentum laterale externum nicht an ihm selbst, sondern an dem Ligamentum annulare befestigt ist. Die Muskeln sind zu schwach, um irgend Widerstand zu leisten, wenn eine Gewalt plötzlich das Capitulum radii vom Humerus entfernt. Kommt aber eine solche Entfernung auch nur für einen Augenblick zu Stande, so wird sogleich der Muskelzug förderlich für die Verrenkung. Der Biceps, von allen Muskeln, welche hier in's Spiel kommen, der kräftigste, zieht das obere Ende des Radius nach Vorn; alle anderen vom Oberarm zum Vorderarm hinabsteigenden Muskeln begünstigen die Verschiebung aufwärts oder hindern doch das Zurücktreten des Capitulum radii in seine normalen Verhältnisse, indem sie dasselbe gegen die vordere Seite der Eminentia capitata anpressen.“

Goyrand selbst hat sich jedoch in neuester Zeit einer anderen Auffassung zugewandt¹⁾. Er hält diese Verletzung jetzt für eine Luxation des Zwischengelenkknorpels des Handgelenks (Fibro-cartilago triangularis). Die Meinungsänderung wurde zunächst dadurch veranlasst, dass Goyrand, als er bei der Reposition dieser Verrenkung zufällig das Handgelenk des Kindes mit einer Hand umfasste, ein knuckendes Geräusch in dem Handgelenk wahrnahm. Es kamen ihm seitdem noch 10 derartige Verrenkungen zur Beobachtung, und in allen will er bei der Reposition das knuckende Geräusch im Handgelenk bemerkt haben. Unter den Symptomen hebt er besonders hervor: 1) eine ödematöse Anschwellung auf der Dorsalseite des Handgelenks, die sich zu erkennen gab, wenn die Verletzung mehrere Stunden oder Tage bestanden hatte; 2) Stellung der Hand

¹⁾ Sur la luxation du fibro-cartilage inter-articulaire du poignet en avant de l'extrémité inférieure du cubitus, lésion très-commune chez les enfants en bas âge. Bull. de thérap. Mars 30, 1860 und Gazette des hôpitaux, 1861. No. 126.

n Abduction (Ulnarflexion) in manchen Fällen, und in diesen namentlich auch ein krachendes Geräusch, das durch rotirende Bewegungen in der Hand hervorgebracht werden konnte; 3) Schmerzensäusserungen bei Druck auf den Rücken des Handgelenks, nicht bei Betastung des Ellenbogengelenks (— nur zu constatiren, wenn während des Bestehens die Aufmerksamkeit des Kindes abgelenkt wird). — Den Beweis, dass es sich um eine Verschiebung des Zwischengelenkknorpels handele, führt Goyrand aus anatomischen und physiologischen Thatsachen. Er beobachtete am Cadaver (an Durchschnitten des Handgelenks), dass bei den Bewegungen der Pro- und Supination der Faserknorpel sich verschiebt, bei der Pronation nach der Volar-, bei der Supination nach der Dorsalseite, dass ferner, wenn der Faserknorpel bei vollständiger Pronation stark nach der Volarseite verschoben ist, eine Abduction der Hand oder ein Druck, der die Handwurzel gegen die Vorderarmknochen treibt, genügt, um denselben vollständig zu verdrängen, und dass er dann nur mit Schwierigkeiten in seine normale Lage wieder zurückkehrt. Die Verschiebung des Knorpels war an Kindesleichen noch leichter zu bewerkstelligen, als an denen Erwachsener. — Bei dem Zustandekommen der in Rede stehenden Verletzung wird immer der Arm stark pronirt, dabei zunächst der Knorpel nach der Volarseite geschoben und dann durch Zug der Muskeln, welche die Hand dem Vorderarm nähern, vollständig verdrängt. Da der Knorpel bei der Supination nach der Dorsalseite gleiten muss, so wird bei der abnormen Stellung des Knorpels die Supination verhindert sein, durch eine gewaltsame Supination (unter knuckendem Geräusch) wird aber der Knorpel an seine normale Stelle gebracht werden können. Die zuweilen wahrgenommenen erepitiirenden Geräusche bei leicht rotirenden Bewegungen der Hand erklärt Goyrand aus der Reibung des Os triquetrum an dem unteren Ende der Ulna.

Streubel ging bei seinen Untersuchungen gleichfalls von anatomischen Thatsachen aus und hob vor Allem hervor, dass die Grösse des Capitulum radii bei Kindern eine ganz unverhältnissmässige ist, namentlich im Verhältnisse zu der relativ kleineren und flacheren *Inisura sigmoidea minor* der Ulna. Ziehe man an der Hand einer Kindesleiche, während das Ellenbogengelenk halb gebeugt und der Oberarm fixirt sei, und bringe den Vorderarm dann in übermässige Pronation, so fühle man, dass der Radiuskopf nach Vorn tritt. Am blossgelegten Gelenk sehe man dabei im hinteren Umfange der *Articulatio humero-radialis* eine Vertiefung entstehen, indem durch den Druck der Atmosphäre ein Theil der Kapsel eingepresst und demächst, wenn man mit der Pronation nachlässt, eingeklemmt werde.

Diese Interposition eines Stückes des Kapselbandes erklärte Streubel für das Wesentliche bei der sog. incompleten Verrenkung. — Jedoch glaubt Streubel sich überzeugt zu haben, dass neben wirklichen Verrenkungen und Kapsel-Interpositionen auch die verschiedensten Contusionen und Distorsionen der Gelenke unter der Rubrik „incomplete Radiusverrenkung“ zusammengeworfen sind¹⁾, woran sich wohl auch, nach den oben mitgetheilten, höchst verschiedenartigen Angaben, kaum zweifeln lässt.

Die Folgen dieser Verletzung, mag sie nun wirklich Verrenkung des Radius sein, oder eine solche nur simuliren, — sind niemals bedenklich, selbst wenn sie, wie sehr häufig geschieht, sich selbst überlassen bleibt. Die Verschiebung ist jedenfalls so unbedeutend, dass der Radius in seine normale Stellung von selbst zurückkehren kann, sobald nur der krampfhaft Muskelzug aufgehört hat. Diese spontane Reposition, auf deren Möglichkeit schon Goyrand hingewiesen hatte, ist von Gardner und Perrin beobachtet worden.

Sicherer jedoch dürfte es sein, die Einrenkung lege artis vorzunehmen. Reductionsverfahren sind in grosser Anzahl beschrieben worden, verschieden je nach der Ansicht des Autors über die Art der Verschiebung. Goyrand empfahl das kranke Gelenk mit der linken Hand zu umfassen, so dass der Daumen vorn auf das Capitulum radii drückt, mit der rechten Hand aber an der Hand des Kindes kräftig zu extendiren, dieselbe demnächst in Supination zu stellen und in dieser, während man den Radius gleichsam nach Hinten zurückstösst, den Vorderarm plötzlich und vollständig zu beugen. Bei dieser letzteren Bewegung sollte man ein deutliches Geräusch als den Beweis des Gelingens der Einrenkung vernehmen. — Seiner neueren Theorie gemäss, empfiehlt Goyrand jetzt, zuerst eine Abduction (Radialflexion) der Hand und dann eine forcirte Supination.

Sobald die Einrenkung erfolgt ist, werden alle Bewegungen wieder frei und schmerzlos. Nur sehr selten hat man die Verschiebung bald darauf wiederkehren sehen, so z. B. Monteggia vier Mal in wenigen Tagen, Dugès bei zwei Kranken unmittelbar nach der Einrenkung. Goyrand hat ein solches Recidiv niemals beobachtet, hält jeden Verband für überflüssig und lässt das Kind den Arm sogleich wieder frei gebrauchen. — Auch mir hat sich das erste Goyrand'sche, vornehmlich in kräftiger Supination bestehende Verfahren in sehr zahlreichen Fällen vollkommen bewährt. Sein guter,

¹⁾ Ueber die falsche Beurtheilung gewisser geringfügiger Verletzungen am Vorderarm kleiner Kinder. Prager Vierteljahrsschrift, 1861. Bd. II. In dieser Abhandlung findet sich auch eine eingehende Kritik der bis jetzt aufgestellten Theorien.

auch ohne Verband dauernder Erfolg erklärt sich ungezwungen aus der von Streubel angenommenen Interposition eines Kapselstücks, welche doch wohl häufiger vorkommen mag, als die wirkliche Luxation.

An die „Verrenkungen des Radius nach Vorn“ knüpft Pitha (l. c. pag. 91 u. f.) die Mittheilung einer ganz isolirt stehenden Beobachtung an, welche in diagnostischer Beziehung allerdings hierher, übrigens aber zu den Fracturen des unteren Humerus-Endes gehört und von Pitha auch als *disjunctive Fractur des Capitulum humeri* (d. h. der *Eminentia capitata*) bezeichnet wird. Ein 6jähriges Kind fiel aus dem Bett auf den Ellenbogen, dessen Verletzung als „Contusion“ behandelt wurde, bis Pitha 6 Monat danach folgenden Befund feststellte. Das verletzte Ellenbogengelenk lässt sich übermässig strecken (bis zu einer Dorsalflexion von 100 Grad); in dieser Stellung ragt in der Ellenbeuge ein wallaussgrosser Knochenvorsprung dicht unter der Haut hervor, genau an der Stelle eines nach Vorn luxirten Radiusköpfchens, von diesem aber durch bedeutende Grösse und Gestalt (kugelige Masse) verschieden; derselbe folgt den Bewegungen des Radius, jedoch weniger genau als an dem gesunden Arm. Bei spitzwinkliger Beugung des Arms, welche das Kind ohne Schwierigkeit ausführte, verschwand jener Vorsprung, und das Gelenk erschien normal. Pitha erklärt diesen Befund aus einer Fractur der *Eminentia capitata humeri*, welche nicht heilte, während die Gelenkfläche derselben mit dem *Capitulum radii* eine ankylotische Verbindung einging. Die Möglichkeit der Dorsalflexion glaubt Pitha aus der Erweiterung der *Fossa humeri posterior* (durch Wegfallen der *Eminentia capitata*) ableiten zu können, hebt aber mit Recht hervor, dass manche Ellenbogengelenke ursprünglich eine solche Befähigung zur Dorsalflexion besitzen.

β) Verrenkung des Radiusköpfchens nach Hinten.

Diese seltene Verrenkung kommt am Häufigsten bei Kindern jenseits des sechsten Lebensjahres vor und entsteht durch übermässiges Supiniren und Ziehen am Arm, oder durch einen Fall auf die vorgestreckte Hand, selten (nach Streubel wahrscheinlich niemals) durch directe Gewalt. Das *Capitulum radii* rückt hinter den *Condylus externus* (Fig. 109) und nimmt hier bald höher, bald tiefer seine bleibende Stelle. Der Arm steht in der Mitte zwischen Pronation und Supination, in mittlerer Beugung, und kann nur mit sehr grossen Schmerzen bewegt werden. Pronation und Flexion gelingen relativ leichter, als Supination und Extension. Das *Capitulum radii* wird an der hinteren Seite des Armes gefühlt; die durch dasselbe verschobenen Muskelbäuche verdecken den *Condylus externus*, während der *internus* besonders an der vorderen Seite deutlich hervorragt. Die Entfernung vom

Fig. 109.



Condylus externus (sofern er deutlich fühlbar) zum Processus styloideus radii ist verkürzt. Die Achse des Vorderarms bildet mit derjenigen des Oberarms deutlicher als im normalen Zustande einen nach Aussen offenen Winkel.

Wenn die Einrenkung nicht erfolgt, so bleiben alle Bewegungen im Ellenbogen-Gelenk beschränkt, der Arm jedoch nicht unbrauchbar.

Die Reduction gelingt leicht durch Extension an der Hand in möglichst stark supinirter Stellung und Druck auf das Capitulum radii. Zur Retention dient eine durch Achtertouren zu befestigende gepolsterte Schiene. Meist reicht die gebeugte Haltung des Gelenkes (in einer Mitella) hin, um Recidive zu verhüten.

γ) Verrenkung des Radiusköpfchens nach Aussen.

Mit der seltenen Verrenkung des Radiusköpfchens auf die äussere Fläche des Condylus externus fand sich in der Mehrzahl der Fälle (jedoch nicht immer) zugleich ein Bruch der Ulna, nach welchem man daher bei jeder Luxation des Radius sorgfältig forschen sollte, wie andererseits jede Fractura ulnae den Verdacht einer gleichzeitigen Luxatio radii erregen muss¹⁾. — Der Vorderarm steht in ähnlicher Weise steif, wie bei der Verrenkung nach Hinten; aber Supination und Pronation lässt sich leichter ausführen. Die am Condylus externus liegende Geschwulst, welche den Bewegungen des Radius folgt, wird leicht als dessen Capitulum erkannt. Ein zugleich bestehender Bruch der Ulna und schnell eintretende Anschwellung der Weichtheile können die Diagnose erschweren. Der Arm wird, sofern der Bruch der Ulna fehlt, auch ohne Einrenkung wieder brauchbar, jedoch bleibt Beugung und Streckung beschränkt. — Behandlung wie bei der Verrenkung nach Hinten. In Betreff der Fractura ulnae vgl. pag. 439.

Der Verrenkung des Radiusköpfchens nach Aussen schliesse ich eine eigenthümliche Art der Verrenkung an, welche bei einer alten Frau schon seit langer Zeit bestand, aber erst bei Gelegenheit einer Fractura ulnae, welche sie sich durch einen Fall auf der Treppe zuzog, von mir entdeckt wurde. Bei vollkommen gestrecktem Arme stand der Radius scheinbar normal; fühlte man genauer zu, so ergab sich, dass sein Köpfchen auffallend weit nach Vorn stand. Bei der Beugung des Vorderarms rückte das Köpfchen nicht etwa weiter nach Hinten an seine normale Stelle, sondern bewegte sich in einer beinahe elliptischen Rinne

¹⁾ Vgl. Malgaigne, Mémoire sur les luxations de la partie supérieure du radius compliquées de fractures. Revue médico-chirurgicale. Avril 1854. — Fälle von Luxation des Radiusköpfchens nach Aussen ohne Fractur der Ulna sind namentlich von Gerdy und von Nélaton beobachtet worden. v. Pitha (l. c. pag. 92) sah einen Fall ohne, drei mit Fractur der Ulna; ersterer war durch directe Gewalt entstanden.

zuerst aufwärts, dann nach Aussen und Hinten, also um den äusseren Winkel des Humerus, dicht oberhalb des Condylus externus herum und kehrte genau auf demselben Wege bei der Streckung an die frühere Stelle zurück. Die Frau versicherte, mit diesem ihrem rechten Arm ebenso viel (d. h. freilich ebenso wenig), wie mit dem linken arbeiten zu können, und wusste über den Vorgang, durch welchen, und die Zeit, zu welcher diese Verletzung zu Stande kam, Nichts anzugeben.

5. Verrenkungen im unteren Cubito-Radialgelenk, Verrenkungen des Köpfchens der Ulna¹⁾.

Verrenkungen des Capitulum ulnae sind sehr selten. Sie erfolgen nach der Volar- und nach der Dorsal-Seite der Hand.

Man nennt erstere auch Verrenkungen der Ulna nach Vorn (oder Verrenkungen des Radius nach Hinten), letztere Verrenkungen der Ulna nach Hinten (oder des Radius nach Vorn).

Ueber die relative Häufigkeit beider sind die Angaben verschieden. Nélaton und Vidal halten die Verschiebung nach der Dorsalseite (Hinten) für die häufigere, Wernher die Verrenkung auf die Volarfläche des Os triquetrum („nach Vornen“). Beide Parteien stützen ihre Angaben auf die anatomischen Verhältnisse und die Aetiologie. Die französischen Autoren behaupten, dass die Verrenkung nach Hinten durch übermässige Pronation und Flexion, diejenige nach Vorn durch Supination und Extension der Hand zu Stande komme. Das Aufschlagen eines schweren Körpers auf das untere Ende des Radius könne blos die Entstehung der Verrenkung begünstigen. (Desault hat sie beim Ausringen der Wäsche entstehen sehen; Boyer bei einer trunkenen Frau, die man etwas unsanft an der Hand aus dem Zimmer führte.) Bei übermässiger Pronation drücke das Köpfchen der Ulna auf den hinteren Umfang des Kapselbandes, welcher schlaffer sei und nur durch die Haut unterstützt werde; an der Volarseite sei die Kapsel fester und werde durch dicke und feste Weichtheile unterstützt. Wernher dagegen bezeichnet, nach den vorliegenden Beobachtungen, obgleich er die angegebene Entstehungsweise nicht ausschliesst, als die gewöhnliche Ursache einen Sturz auf den Ballen der Hand, durch welchen leichter eine Verschiebung der Ulna nach der Volarseite bedingt werden muss. In der Mehrzahl der Fälle besteht, nach Wernher, mit der Verrenkung des Capitulum ulnae zugleich Fractura radii, deren die französischen Autoren nicht Erwähnung thun.

¹⁾ Desault hat diese Verrenkung zuerst beschrieben als „Luxation de l'extrémité inférieure du radius,“ Boyer und Dupuytren nannten sie „Luxation du cubitus.“ Das von uns im Allgemeinen (pag. 668) anerkannte Princip für die Benennung der Luxationen zeigt sich an dieser Stelle als unzureichend, weil im Zustande der Ruhe die beiden Vorderarmknochen in halber Pronation so herabhängend, dass keiner derselben weiter vom Kopf oder von der Mittellinie des Körpers entfernt ist, als der andere. Wollte man als entscheidend ansehen, welcher von beiden Knochen im normalen Zustande der sich bewegende ist, so wären es „Verrenkungen des Radius“, da dieser bei der Pro- und Supination bewegt wird. Mit dem Radius zugleich bewegt sich aber auch die Hand. Man müsste also sagen: „Verrenkungen des Radius und der Hand“. Es ist daher wohl einfacher, die Ulna als verrenkt zu bezeichnen, da sie augenfällig ihre Lage im Verhältniss zu den in ihrer normalen Verbindung bleibenden Nachbar-Knochen (Hand und Radius) ändert.

Wahrscheinlich ist ohne gleichzeitigen Bruch des Radius und in Folge übermässiger Pronation, die Verrenkung nach der Dorsalseite, dagegen mit Bruch des Radius und in Folge eines Sturzes oder directer Gewalt diejenige nach der Volarseite die häufigere¹⁾. Ob letztere durch übermässige Supination und Streckung der Hand überhaupt zu Stande kommen könne, erscheint zweifelhaft.

Bei der Verrenkung nach der Volarseite springt das Capitulum ulnae oberhalb des Os pisiforme hervor, während sein normaler Vorsprung an der Dorsalseite fehlt. Die Hand ist supinirt, die Finger sind gebeugt, die Sehnen der Beugemuskeln theils nach der Volarseite hervorgewölbt, theils gegen die Radialseite verdrängt.

Bei der Verrenkung nach der Dorsalseite steht die Hand in übermässiger Pronation, die Finger und die Hand gebeugt; das Capitulum ulnae ragt an der Dorsalseite hervor.

Der Querdurchmesser des Vorderarms ist an dieser Stelle bei beiden Formen der Verrenkung verringert; jedoch kommt es auch vor, dass das Capitulum ulnae zugleich nach der Ulnarseite ausweicht, sich also vom Radius entfernt, wobei der Querdurchmesser des Vorderarms an seinem unteren Ende vergrössert werden muss.

Die **Einrenkung** geschieht bei der einfachen Verrenkung durch directen Druck mittelst der Daumen, indem die übrigen Finger den Vorderarm umfassen, während durch Gehülfen an der Hand kräftig extendirt und bei der Verrenkung nach der Volarseite eine gewaltsame Pronation, bei derjenigen nach der Dorsalseite dagegen Supination ausgeführt wird. Zur Retention dient ein Gypsverband.

Bei Complication mit Fractura radii muss ein zu deren Behandlung geeigneter Verband (vgl. pag. 436 u. f.) angelegt werden. Besteht zugleich eine in das Handgelenk oder doch bis zur Bruchstelle penetrirende Wunde, so wird die Resection der Vorderarmknochen am meisten Aussicht auf günstige Heilung gewähren; bei ausgedehnter Zermalmung der Knochen und der Weichtheile kann die Amputation erforderlich werden. Vgl. Bd. IV.

In Betreff der von Goyrand beschriebenen Verrenkung der Bandscheibe im Handgelenk (Fibrocartilago triangularis intermedia) vgl. pag. 776.

6. Verrenkungen der Hand (des Carpus, oder n. A. der Carpal-Enden der Vorderarmknochen). Luxatio manus.

Anatomische Verhältnisse. Das Handgelenk wird durch die erste Reihe der Handwurzelknochen (Os naviculare, lunatum, triquetrum) einer-, und durch die unteren Enden der Vorderarmknochen anderer Seits gebildet. Die genannten Hand-

¹⁾ Eine Verrenkung des Capitulum ulnae nach der Volarseite in Folge eines Falles habe ich einmal gesehen, — ohne Bruch des Radius.

Wurzelknochen stellen zusammen einen länglichen, von der Volar- nach der Dorsal-seite plattgedrückten, nach Oben convexen Gelenkkopf dar, welcher von einer entsprechenden, flachen Gelenkhöhle, die von den beiden Facetten des unteren Endes des Radius und von dem, an dem inneren Rande des letzteren befestigten, zum *Processus styloideus ulnae* brückenartig hinübergespannten Zwischengelenk-Knorpel (*Bandscheibe*, *Meniscus*, *Fibrocartilago triangularis intermedia*) gebildet wird. Diese kleine Gelenkhöhle hat, von der Dorsal- zur Volarseite gemessen, etwa 3 Millimeter Tiefe, von der Radial- zur Ulnarseite ist sie beträchtlich tiefer, weil die stärker hervorspringenden *Processus styloidei* hier zu ihrer Bildung mit beitragen. Nur der Radius steht in unmittelbarer Berührung mit dem *Carpus*, und zwar vorzugsweise mit dem *Os naviculare* und *lunatum*; von dem *Os triquetrum* berührt er nur einen kleinen Theil. Die Ulna dagegen steht mit keinem der Handwurzelknochen in directer Verbindung. Zwischen dem *Capitulum* und das demselben zunächst liegende *Os triquetrum* ist der erwähnte Knorpel eingeschoben. Hieraus ergibt sich, dass ein Stoss, welcher die Hand trifft, immer vorzugsweise auf den Radius seine Wirkung ausüben muss (vgl. Brüche des Radius). Die geringe Vertiefung der den *Carpus* aufnehmenden Gelenkhöhle könnte leicht zu der Annahme verleiten, dass Verrenkungen im Handgelenk sehr häufig seien. Die Verbindung zwischen beiden Theilen ist aber durch sehr feste Bänder gesichert und an der Dorsal- und Volar-Seite ausserdem durch die Streck- und Beuge-Sehnen geschützt. Das an sich schlaffe und weite Kapselband erhält eine sehr grosse Festigkeit durch die an der Dorsal- und Volar-Seite mit demselben verbundenen Verstärkungsbänder (*Ligament. rhomboides, rectum und obliquum*). Die beiden Seitenbänder des Gelenkes, welche vom *Processus styloideus radii* zum *Os naviculare* und *multangulum majus*, vom *Processus styloideus ulnae* zum *Os triquetrum* und dem inneren Theile der Gelenkkapsel hinabsteigen, machen durch ihre Festigkeit eine Verschiebung nach der Radial- oder Ulnar-Seite noch schwieriger, als sie schon wegen des Hervorspringens der Griffelortsätze und der grossen Ausdehnung der Gelenkflächen in dieser Richtung ist.

Hippokrates zählte Verrenkungen der Hand nach Vorn, nach Hinten und nach beiden Seiten auf. Seine Nachfolger haben dieselben in ätiologischer, prognostischer und therapeutischer Beziehung erläutert und bei jeder Art der Verrenkung auch noch vollständige und unvollständige unterschieden. J. L. Petit und Boyer haben diese theoretische Betrachtung der Hand-Verrenkungen noch weiter ausgesponnen. Aber schon Bouteau und Desault bezweifelten sie, und Dupuytren, zum anderen Extrem übergehend, leugnete sie gänzlich.

Das Vorkommen von Verrenkungen der Hand ist mit Sicherheit erwiesen¹⁾; aber sie sind sehr selten²⁾. Dies erklärt sich aus der

¹⁾ Ich habe selbst die Verrenkung der Hand nach der Dorsal-Seite bereits zwei Mal beobachtet, und zwar ein Mal bei einer alten Dame (vgl. Canstatt's Jahresbericht f. 1851, IV. pag. 43), das zweite Mal bei einem Knaben von zwölf Jahren. Letzterer gebrauchte seine Hand schon wenige Tage nach der Einrenkung, welche auf frischer That ausgeführt wurde, ganz wie eine gesunde. — Conner beschreibt neuerdings gleichfalls eine Dorsal-Verrenkung der Hand. Vgl. Virchow und Hirsch Jahresber. p. 1872. Bd. II. pag. 450.

²⁾ Aus den Erzählungen zuverlässiger Aerzte kenne ich mehrere Beispiele von Verrenkungen der Hand bei jugendlichen Individuen. Man wird gegen diese einwenden, es seien Verstauchungen oder Fracturen des Radius gewesen, welche verkannt wurden. Erstere sind aber durch die bestimmt beschriebene Difformität ausge-

geringen Länge des Hebelarms, den die Hand darstellt, aus der beträchtlichen Stärke der Gelenkbänder und aus dem Schutz, welchen die an der Volar- und Dorsal-Seite gelegenen Sehnen dem Gelenke gewähren. Uebrigens wirkt bei einem Fall auf die Hand, welcher als die gewöhnliche Veranlassung dieser Luxation angegeben wird, das Körpergewicht entweder auf das untere Ende der Metacarpalknochen, oder auf die Handwurzelknochen. Im ersteren Falle wird der Stoss erst durch Vermittelung mehrerer Gelenke auf das Handgelenk übertragen, concentrirt seine Wirkung besonders auf die Gelenkverbindungen des Os capitatum und bewirkt leichter eine Verschiebung (oder einen Bruch) dieses letzteren, als eine Verrenkung der Hand; im zweiten setzt sich der Stoss gewöhnlich sogleich direct auf den Radius fort und bewirkt eher eine Fractur desselben in der Nähe des Gelenkes, als Verrenkung des letzteren. Häufig besteht mit der Luxation zugleich eine Fractur des Gelenkranfes des Radius. Solche Absplitterungen des Gelenkranfes kommen, wie wir wiederholt hervorgehoben haben, auch bei anderen Verrenkungen vor und sind hier wie dort als Nebenverletzungen zu betrachten. Auch fehlt es nicht an Beispielen von Luxationen der Hand, bei denen durchaus keine Fractur gefunden wurde.

Marjolin berichtet über die anatomische Untersuchung der, Fig. 110 abgebildeten „Luxation der Hand nach der Dorsal-Seite“ Folgendes. „Keine Zerreiſſung der Sehnen, nur das Ligamentum anterius und das laterale externum sind zerrissen; beide Vorderarmknochen sind ganz unversehrt; auch an den Handwurzelknochen besteht keine Fractur.“ — In dem von Voillemier beobachteten Falle war allerdings die Spitze des Processus styloideus ulnae abgebrochen; aber Niemand wird anstehen, die Verrenkung der Hand für die Hauptsache und die Fractur jener Knochenspitze für eine Nebenverletzung zu erklären.

Die Gewalt, durch welche Verrenkung der Hand veranlasst werden soll, muss immer sehr bedeutend sein, gewöhnlich ein Sturz von nicht unerheblicher Höhe herab, oder eine directe Gewalt, seltener ein gewöhnlicher Fall auf die Hand.

Die Verrenkung kann sowohl nach der Dorsal-, als nach der Volar-Seite Statt finden. Ersteres ist häufiger. Seitliche Verrenkungen sind nicht beobachtet.

schlossen, letztere durch die Angabe, dass unmittelbar nach der Reduction die Difformität verschwand, dass sie, wenn die Hand dem Muskelzuge überlassen wurde, nicht wiederkehrte und dass die Hand nach wenigen Tagen wieder brauchbar, das Handgelenk nach allen Richtungen hin beweglich wurde. — Sind vielleicht genau beschriebene Luxationen der Hand deshalb so unerhört selten, weil sie auf frischer That so ungemein leicht zu reduciren sind und selbst des Laien wegen der auffallenden Difformität sogleich zur Reduction auffordern?

a) Verrenkung der Hand auf die Rückseite des Vorderarms (nach Hinten), Dorsalverrenkung der Hand, n. A. Luxation der beiden Vorderarmknochen nach Vorn (Fig. 110). Die Handwurzel bildet eine convexe Geschwulst an der Dorsalseite, während die Vorderarmknochen an der Volarseite hervortragen. Das Capitulum ulnae entspricht ungefähr dem Os lunatum, der Radius dem Os naviculare und Multangulum majus. Die Finger stehen halbgebeugt und können nur sehr schwierig bewegt werden; das Handgelenk ist unbeweglich. Die Entfernung von der Grenze des hervorspringenden Carpus zum Knöchel des Mittelfingers ist ebenso gross, als an der anderen Hand; die Entfernung vom Olecranon ist deutlich verringert. Die Länge der Vorderarmknochen von den Griffel-Fortsätzen zum Capitulum radii und zum Olecranon ist unverändert. Auch die Entfernung der beiden Processus styloidei von einander ist die normale, der Durchmesser des Handgelenkes von Vorn nach Hinten dagegen um das Doppelte vergrössert.

Fig. 110.



Eine Verrenkung der Hand auf die Dorsal-Seite des Radius, ohne wesentliche Veränderung ihrer Stellung zur Ulna ist von A. Cooper als Verrenkung des unteren Endes des Radius nach Vorn* beschrieben worden. „Die Gelenkfläche des Radius stand auf dem Os multangulum majus und naviculare, der äussere Rand der Hand war nach Hinten, der innere nach Vorn gedreht; der Processus styloideus radii bildete vor dem Os multangulum majus einen deutlichen Vorsprung.“ (Unter „Vorn“ ist hier offenbar die Volarseite zu verstehen.) Diese Einzelbeobachtung war durch keine anatomische Untersuchung gestützt, und es blieb daher der Verdacht nicht ausgeschlossen, dass es sich vielmehr um einen der Cooper's Zeiten noch nicht so genau bekannten Brüche des unteren Endes des Radius gehandelt habe (Wernher). — Ich habe dieselbe Verrenkung im veralteten Zustande mit Bestimmtheit beobachtet. Vor Allem springt die Hervorragung des Capitulum ulnae am Ulnarrande des Handgelenks in die Augen. Zwischen dem Capitulum ulnae und dem Ballen des kleinen Fingers ist eine tiefe Querfurche. Geht man in dieser an der Volarseite weiter, so fühlt man deutlich den vorspringenden Rand des unteren Endes des Radius. An der Dorsalseite dagegen ist letzteres völlig verdeckt durch den nach oben gerichteten Convexität stark prominirenden ganz unverkennbaren Carpus. Die Hand befindet sich in einer schwachen Volar- und Radial-Flexion, ist aber in ihrer Beweglichkeit wenig beeinträchtigt.

b) Verrenkung der Hand auf die Volarseite des Vorderarms (nach Vorn), Volar-Verrenkung der Hand, n. A. Luxation der beiden Vorderarmknochen nach Hinten (Fig. 111). Die Vorderarmknochen ragen an der Dorsalseite dicht unter der Haut hervor.

Fig. 111.



Durch eine quere Vertiefung, durch welche die stark hervorspringenden Strecksehnen der Finger verlaufen, setzen sie sich gegen die Hand ab. An der Aussenseite des Extensor pollicis longus bildet der Processus styloideus radii einen Vorsprung. Die durch den Carpus an der Volarseite gebildete Geschwulst ist wegen der darüber hin laufenden starken und zahlreichen Beugesehnen nicht so deutlich zu erkennen. Messungen geben ein analoges Resultat, wie bei der Dorsal-Verrenkung. Die Länge der Vorderarmknochen ist hier leichter, diejenige der Hand schwieriger zu constatiren, als bei der Dorsal-Luxation.

Die **Prognose** wird nur durch Complicationen ungünstig, besonders wenn das Gelenk durch eine Wunde geöffnet ist (Fall von Marjolin). Die Brauchbarkeit der Hand bleibt, wenn keine Reduction erfolgt, bei completen

Verrenkungen in hohem Grade beeinträchtigt.

Bei der **Diagnose** handelt es sich nur um eine Schwierigkeit: die Unterscheidung von Brüchen des unteren Radius-Endes (vgl. pag. 428 ff.). Besonders hervorzuheben ist, dass die (freilich unbedeutende) Einschnürung (*col du poignet*), welche an der Grenze zwischen Vorderarm und Hand im normalen Zustande und auch bei Fracturen des unteren Radius-Endes sich findet, bei der Verrenkung fehlt, bei welcher an dieser Stelle, in Folge der Uebereinanderschichtung der Handwurzel und der Vorderarmknochen, sogar eine Vermehrung des Umfanges stattfindet.

Behandlung. Die Reduction ist nicht schwierig; ich habe eine Verrenkung der Hand noch am fünfzehnten Tage mit einem einzigen Gehülfen reducirt. Ein kräftiger Zug an der Hand, während ein Gehülfe den Vorderarm fixirt, reicht hin. Boyer empfiehlt, nach gehöriger Extension einen kräftigen Druck auf den convexen Gelenktheil des Carpus auszuüben und die Hand in die entgegengesetzte Richtung zu bringen, als in welcher die Verrenkung erfolgte. — Zur Retention ist eine gepolsterte Schiene auf derjenigen Seite zu befestigen, nach welcher die Verrenkung erfolgt war. Die Neigung zu Recidiven scheint jedoch nicht gross zu sein; dagegen kann die nachfolgende Entzündung eine besondere Behandlung erfordern.

7. Verrenkungen einzelner Handwurzelknochen.

Zwischen den beiden Reihen der Handwurzelknochen können durch directe Gewalt oder durch Sturz auf den Handrücken unvollständige Verrenkungen in der Art vorkommen, dass der Kopf des *Os capitatum* allein oder zugleich mit dem oberen Ende des *Os hamatum* nach der Dorsalseite der Hand (nach Hinten) verschoben wird. Wenn noch keine bedeutende Geschwulst besteht oder der Fall veraltet ist, so kann man sehr deutlich auf dem Handrücken das vorspringende Köpfchen des *Os capitatum* fühlen. Ob das *Os hamatum* zugleich verrenkt ist, kann nur aus der Stellung des vierten und fünften Mittelhandknochen und der Schmerzhaftigkeit bei den Bewegungen derselben erschlossen werden. Jedoch sind isolirte Verrenkungen des *Os capitatum* bei der Festigkeit der Verbindung zwischen ihm und dem *Os hamatum* unwahrscheinlich.

Den Mechanismus dieser Verrenkung hat schon Boyer richtig erläutert. Eine grosse Gewalt biegt die Metakarpalknochen gegen die Volarseite: ihre Verbindungen mit der ersten Reihe der Handwurzelknochen geben nicht nach; die Beweglichkeit des Gelenkes zwischen der ersten und zweiten Reihe der letzteren dagegen ist sehr gross¹⁾. Das obere Ende des Hebelarms, an dem diese Beugung Statt findet, ist der Kopf des *Os capitatum*; dieser tritt daher nach der Dorsalseite aus der vom *Os naviculare* und *lunatum* gebildeten Gelenkhöhle hinaus, während die beiden *Ossa multangula* auf der convexen Gelenkfläche des *Os naviculare* etwas nach Vorn rücken. — Die Functionsstörungen sind nur dann bedeutend, wenn das *Os capitatum* an seiner falschen Seite beweglich bleibt. Die Hand wird dann kraftlos und für feinere Bewegungen ungeschickt.

Die Reduction erfolgt durch kräftigen Zug und nachfolgende Streckung der Hand. Zur Retention dient der von Malgaigne für die Brüche der Mittelhandknochen angegebene oder ein ähnlicher Verband (vgl. pag. 447).

Aeusserst selten sind Verrenkungen einzelner Handwurzelknochen beobachtet worden, so von Chisolm (Lancet, 1871, Octbr. 28) Luxation des *Os naviculare* nach der Volarseite mit Wiederherstellung der Function der Hand nach Excision des verrenkten Knochens.

In einzelnen Fällen hat man durch directe Gewalt oder Muskelzug eine Zerreissung des Kapselbandes, durch welches das *Os pisiforme* an das *Os triquetrum* befestigt ist, entstehen sehen. Ersteres wird alsdann verschoben; es kann also von einer Verrenkung des *Os pisiforme* gesprochen werden. An die Stelle der Gelenkverbindung tritt durch die nachfolgende Entzündung eine ankylotische Befestigung des *Os pisiforme*, durch welche die Function der Hand nicht gestört wird.

¹⁾ Die Beugung der Hand erfolgt vorzugsweise in diesem Gelenke (Malgaigne).

8. Verrenkungen des Mittelhandknochens des Daumen (n. A. der ersten Phalanx des Daumen).

Unter den Mittelhandknochen ist nur derjenige des Daumen zu einer Verrenkung in dem Gelenke zwischen Handwurzel und Mittelhand geneigt; die vier letzten Mittelhandknochen sind mit den Handwurzelknochen der zweiten Reihe so wie auch unter einander allzu fest verbunden.

Verrenkungen des Os metacarpi pollicis sind nach der Dorsal- und nach der Volar-Seite hin beobachtet worden.

Die **Veranlassung** ist eine äussere Gewalt, die das untere Ende des Mittelhandknochens nach Vorn treibt. Wirkt diese nicht allein auf den Mittelhandknochen, sondern, wie gewöhnlich, auf den ganzen Daumen ein, so entsteht viel leichter Verrenkung seiner ersten Phalanx, als des Mittelhandknochens.

Symptome. Bei der Luxation nach der Dorsalseite, welche Vidal als die häufigere und Chelius als die allein vorkommende beschreibt, ragt auf dem Handrücken die Basis des Os metacarpi hervor¹⁾. Letzteres ist gegen die Hohlhand gebeugt, so dass es fast rechtwinklig gegen die Achse der Hand steht, ist unbeweglich und der ganze Daumen erscheint verkürzt. Die Diagnose kann durch die bald eintretende bedeutende Geschwulst sehr erschwert werden. — Bei der Verrenkung nach der Volarseite, welche A. Cooper genau beschrieben hat und die von Wernher als die einzig vorkommende Luxation des Os metacarpi pollicis aufgeführt wird, bildet die Basis des Knochens in der Vola manus eine Hervorragung; der Daumen ist nach der Dorsalseite gerichtet und kann nicht opponirt, wohl aber in seinen übrigen Gelenken bewegt werden. Vidal hat einen Fall beobachtet, in welchem diese Verrenkung, weil der Kranke keinen Verband tragen wollte, recidivirte und endlich veraltete.

Die **Reduction** ist leicht nach den gewöhnlichen Regeln. Wenn keine Reduction erfolgt, geht die Brauchbarkeit der Hand auch nicht ganz verloren. Operative Eingriffe bei veralteten Fällen werden daher von A. Cooper widerrathen.

Demarquay (Bulletin de Thérap. 1851, Dec.) beschreibt eine Verrenkung des Mittelhandknochens des Daumen nach Hinten und Innen. Die Basis des Os metacarpi pollicis hatte sich gegen die Dorsalseite des Os multangulum majus, zugleich aber gegen den zweiten Mittelhandknochen gewandt, so dass sie auf dem Gelenk zwi-

¹⁾ Michon beobachtete eine incomplete Verrenkung in diesem Gelenke: das Os metacarpi stand nicht horizontal, sondern beinahe in normaler Richtung; aber seine Basis war auf dem Handrücken deutlich zu fühlen, während das Os multangulum majus einen kleinen Vorsprung an der Volarseite bildete.

schen den eben genannten Knochen ruhte; ein kleiner Theil von ihr war jedoch noch mit der entsprechenden Gelenkfläche des Os multangulum majus in Berührung, die Verrenkung mithin nicht ganz vollständig. Man fühlte die Gelenkfläche der Basis des Os metacarpi auf der Dorsalseite, den durch das Os multangulum majus gebildeten Vorsprung aber in der Tiefe des abgeplatteten Daumenballens. Die Reduction gelang, obgleich die Verrenkung schon 50 Tage alt war, leicht durch Extension mittelst der Lürer'schen Zange (vgl. Fig. 112, pag. 783) und gleichzeitiges Verschieben des Os metacarpi nach Aussen.

9. Verrenkungen der ersten Phalanx der Finger (in der Articulatio metacarpo-phalangea).

Luxationen der ersten Phalanx kommen am Häufigsten am Daumen vor, ungemein viel seltener an den übrigen Fingern, was sich leicht aus der freieren Beweglichkeit und der weniger geschützten Lage des ersteren erklärt. Gewöhnlich erfolgt die Verrenkung nach der Dorsalseite durch Hyperextension bei einem Fall auf die ausgestreckten Finger. Viel seltener sind Verrenkungen der Finger nach der Vola (nach Vorn) und Seiten-Verrenkungen (nach der Radial- oder Ulnar-Seite). Die Volar-Verrenkung lässt sich auch durch die höchsten Grade der Beugung nicht künstlich erzeugen, da die Gelenkflächen einander bei einer solchen Bewegung nicht verlassen. Es muss eine directe Gewalt den Finger gegen die Voralseite drängen, wenn eine Verrenkung in dieser Richtung entstehen soll.

Das auffallendste Beispiel von Volar-Verrenkung der Finger habe ich im veralteten Zustande bei einem Manne gesehen, welcher bald das Einklemmen der Hand in eine Maschine, bald einen Fall in den Keller als Veranlassung angab. Alle Finger, mit Ausnahme des Daumen, waren nach der Volarseite verrenkt; die Capitula ossium metacarpi ragten an der Dorsalseite hervor; bei gestreckter Stellung der Finger konnte man die Basis der Phalangen in der Hohlhand fühlen, woselbst sie frei beweglich waren. Fixirte man sie durch eine quer gelegte Schiene, so konnte Beugung und Streckung in den Phalangen-Gelenken mit Kraft ausgeführt werden; sonst waren die Bewegungen der verkürzten Finger machtlos.

Seiten-Verrenkungen werden durch die gegenseitige Stütze, welche die Finger sich gewähren, verhindert, nur der Zeigefinger und der kleine Finger könnten, der erstere nach der Radial-, der letztere nach der Ulnar-Seite, abweichen, weil sie daselbst keinen Nachbar haben. Jedoch erscheinen die bisher beobachteten Fälle vielmehr als Verrenkung auf den Handrücken und zur Seite.

Symptome. Bei allen Verrenkungen der Finger stehen die betroffenen Gelenke steif, unbeweglich¹⁾, je nach der Art der Verschiebung bald gestreckt, bald gebeugt. — Bei der Dorsal-Verrenkung

¹⁾ Bei veralteten Luxationen kann jedoch, wie in dem oben erwähnten Falle, die Beweglichkeit sich wieder einstellen.

wird von Einigen die gebeugte Stellung (bis zum rechten Winkel, nach Vidal), von Anderen dagegen eine Stellung in der Richtung des Os metacarpi, nur in einer anderen Ebene hinter demselben angegeben. Die zweite Phalanx ist gebeugt. Das Capitulum ossis metacarpi ragt in der Hohlhand stark hervor und kann die Haut daselbst durchbrechen.

Die **Einrenkung** ist in frischen Fällen leicht¹⁾. Ein Gehülfe fixirt die Hand, der Wundarzt beugt den verrenkten Finger bei der Dorsal- und streckt ihn bei der Volar-Einrenkung möglichst stark und zieht zugleich an ihm. Mit dem Daumen seiner anderen Hand aber drängt er die Basis der Phalanx prima vorwärts (Impulsion).

Jedoch kommen auch Fälle von Verrenkung der vier letzten Finger, namentlich in der Articulatio metacarpophalangea, vor, welche sehr schwer oder gar nicht einzu- renken sind, was wohl immer auf einer durch den Sitz des Kapselrisses bedingten Interposition eines Kapselstücks beruhen dürfte.

Grössere Schwierigkeiten bei der Einrenkung machen nicht selten

Die Verrenkungen des Daumen,

welche wir deshalb, besonders in Bezug auf die Verhältnisse, welche die Reduction erschweren können, genauer betrachten müssen.

Nach den sorgfältigen Untersuchungen von Wernher (Handbuch, IV. pag. 139) war bis vor Kurzem eine Verrenkung der ersten Phalanx des Daumen nur nach der Dorsalseite beobachtet worden. Die Angaben älterer Schriftsteller über das Vorkommen von Verrenkungen des Daumens nach der Volarseite (nach Vorn) erhalten jedoch durch die in neuester Zeit beschriebenen Fälle von Nélaton (Elements de pathologie chirurgicale, Tom. II. pag. 423), Lenoir (Luxation en avant de la première phalange du pouce réduite au bout de cinq semaines. Gaz. des hôpit. 1852. No. 26), Lombard (Luxation en avant de la première phalange du pouce. Revue méd.-chirurg. Mai 1852), Lorinser (Wiener med. Wochenschr. 1857. No. 17) und Meschede (Virchow's Archiv, Bd. 37. pag. 510 u. f.) grösseres Gewicht.

1. Verrenkungen des Daumen nach der Dorsalseite²⁾ sind häufiger, als solche nach der Volarseite. Für unvollkommene Verrenkungen der Art ist die Unbeweglichkeit in fast gestreckter Stellung und das Hervortreten der Basis der ersten Phalanx an der Dorsalseite charakteristisch. Bei vollständiger Verrenkung steht die erste Phalanx in Dorsalflexion, die zweite etwas gebeugt, beide unbeweglich, während das Os metararpi gegen den Carpus bewegt

¹⁾ Goyrand hat sogar eine Verrenkung der vier Finger mit Durchbruch der entsprechenden Mittelhandköpfchen durch die Haut mit glücklichem Erfolge redncirt.

²⁾ Synonyma: Verrenkung der ersten Phalanx des Daumen nach Hinten, Verrenkung des Daumen von seinem Mittelhandknochen nach Oben (Chelius), Verrenkung der zweiten Phalanx des Daumen auf den Rücken der ersten, Verrenkung des Metacarpal-Knochens des Daumen auf die Volarfläche der ersten Phalanx.

werden kann. Die Basis der ersten Phalanx ragt auf der Dorsalseite des Mittelhandknochens, das Capitulum des letzteren an der Volarseite deutlich hervor. Da beide gegen einander nicht bewegt werden können, kann man leicht die durch das Capitulum ossis metacarpi gebildete Hervorragung für die Basis der Phalanx halten.

Der Grund für die grosse Schwierigkeit oder sogar Unmöglichkeit, welche sich bei der Dorsalverrenkung des Daumens oft der Einrenkung entgegenstellt, ist in verschiedenen Verhältnissen gesucht worden und mag wohl auch nicht immer derselbe sein. Die Entscheidung hierüber ist nicht leicht, da anatomische Untersuchungen frischer Fälle nur ganz vereinzelt vorliegen; man muss sich auf Versuche an Leichen und genaue Erwägung der relativen Lage der Theile stützen.

Nach der von A. Vidal¹⁾ gegebenen Erklärung, drängt sich das Capitulum ossis metacarpi, während die Basis der ersten Phalanx mit den Sesambeinchen und den an ihr selbst und den letzteren befestigten Muskeln nach Hinten ausweicht, durch die Spalte, welche die kleinen Daumenmuskeln (an der äusseren Seite die äussere Portion des Flexor brevis und der Abductor brevis, an der inneren Seite der innere Kopf des Flexor brevis, der Adductor und die Sehne des Flexor longus) zwischen sich lassen. Diese krampfhaft gespannten, späterhin durch die Entzündung verkürzten Muskeln bilden einen, das Os metacarpi dicht oberhalb seines Capitulum (gleichsam an seinem Halse), einem Knopfloch ähnlich, fest umschnürenden Ring, welcher an der Dorsalseite vorzugsweise durch das direct die Sesambeine, indirect aber auch die genannten Muskeln verbindende Ligamentum intersesamoideum vervollständigt wird. Bei Extensionsversuchen wird dieser Spalt wegen der Spannung der Muskeln immer enger und das Zurückweichen des Capitulum ossis metacarpi daher immer weniger möglich²⁾.

Andere sahen die Einschiebung des vorderen Theiles des Kapselbandes zwischen das Köpfchen des Mittelhandknochens und die Basis der Phalanx als das wesentlichste Repositionshinderniss an. So Pailloux³⁾, später Blandin und vorzüglich Roser⁴⁾. Das mit

¹⁾ Lancette française, 1828, pag. 750.

²⁾ Diese Erklärungsweise ist von B. Günther (Die Verrenkung des ersten Daumengliedes. Leipzig 1844) in Betreff des Ligamentum intersesamoideum vervollständigt worden. Das Fortbestehen des Repositionshindernisses in der Chloroformbetäubung und das Vorkommen von Repositionsschwierigkeiten an Leichen sprechen gegen ihre Allgemeingültigkeit.

³⁾ Bulletin de la société anatomique 1826, pag. 147.

⁴⁾ Archiv für physiologische Heilkunde, 1843, pag. 210.

der vorderen Kapselwand innig zusammenhängende Ligamentum intersesamoideum, vielleicht auch eins der Sesambeinchen, folgen dem zerrissenen Theil der Kapsel und vermehren wegen ihrer Dicke den Widerstand¹⁾. Hierbei muss immer vorausgesetzt werden, dass die Kapsel am Köpfchen des Mittelhandknochens abgerissen ist, und also der verschobenen Phalanx folgen konnte. Reisst sie an der Basis der Phalanx ab, so ist kein Grund zur Verschiebung und Einklemmung (Interposition) derselben vorhanden. Michel²⁾, welcher auf letzteres Verhältniss zuerst aufmerksam gemacht hat, fand bei Versuchen an Leichen immer nur diejenigen Daumen-Verrenkungen schwer reducirbar, bei denen das Kapselband nahe am Capitulum ossis metacarpi abgerissen war. — Malgaigne, Günther, Wernher u. A. hegen die irrige Meinung, dass Reductionsschwierigkeiten an der Leiche überhaupt niemals vorkommen und sehen hierin einen wichtigen Grund für die Annahme der Vidal'schen Theorie.

Auch Interposition der Sehne des Flexor longus kann als Reductionshinderniss auftreten. Frank hat dies in einem Falle beobachtet, in welchem die Verrenkung nach der Dorsal- und Ulnarseite erfolgt war. Nachdem Lorinser und Meschede die Bedeutung der Sehnenverschiebungen bei der Volar-Luxation des Daumen (vgl. pag. 785) hervorgehoben hatten, ist der Mechanismus der Interposition der Sehne des Flexor longus besonders von Spitzer³⁾ erläutert worden. Dieselbe gleitet bei der Dorsal-Luxation stets ulnarwärts vom Köpfchen des Metacarpalknochens ab, weil sie schon normal näher am Ulnarrande desselben liegt, der Phalanx aber, an welcher sie unbeweglich festgeheftet ist, nothwendig folgen muss. Sie kann leicht, das Capitulum von der Ulnarseite her umschlingend, zwischen diesem und der Basis der Phalanx sich interponiren oder auch blos

¹⁾ Lücke (Berliner klin. Wochenschrift. 1871. No. 18) konnte sich in einem Fall von complicirter Dorsalluxation des Daumen, indem er die bestehende Wunde erweiterte, überzeugen, dass der innere Theil des Kapselbandes sammt dem entsprechenden (ulnaren) Sesambein interponirt, letzteres also auf der Dorsal-seite des Metacarpalknochens festgeklemmt war, und vermochte den Nachweis, dass hierin das Repositionshinderniss, welches allen bekannten Methoden widerstand, beruhe, dadurch zu liefern, dass er es mittelst Exstirpation des hervorgehobenen Sesambeins beseitigte. — Dass auch dies Hinderniss nicht allein und in allen Fällen wirksam ist, ergiebt sich schon daraus, dass auch an anderen Fingern, welche keine Sesambeine haben, Dorsal-Luxationen vorkommen, die sich nach keiner Methode reduciren lassen, wie ich z. B. am kleinen Finger sah.

²⁾ Gazette méd. de Paris, 1850, No. 49, Journ. d. connaiss. méd. 1851, Février.

³⁾ Wiener medic. Wochenschrift, 1866, No. 94.

der Ulnarseite des Capitulum anliegen, in welchem letzteren Falle sie weniger hinderlich wird.

Die älteste Theorie ist die noch von Dupuytren angenommene, dass die Spannung der Ligamenta lateralia, welche bei der Verrenkung in eine verticale Stellung zur Achse der beiden Knochen kommen, diese gewaltsam gegeneinander presse. Die Seitenbänder gerathen aber bei der Verrenkung in keine besondere Spannung, da sie gerade an den am Stärksten hervorspringenden Theilen der beiden Knochen befestigt sind; ausserdem ist das eine von ihnen gewöhnlich ganz zerrissen. Wo dies nicht der Fall ist, können sie wegen ihres Zusammenhanges mit dem Ligamentum intersesamoideum allerdings zur Vervollständigung der Einklemmung des Capitulum ossis metacarpi beitragen (Günther).

Zur Einrenkung von Dorsal-Luxationen des Daumen hat man sich folgender Methoden bedient.

1. Einfache Extension, entweder mittelst der Hand, oder mit einer Schlinge, oder endlich, sofern der verrenkte Finger sich nicht gut fassen lässt, mit der von Lüer angegebenen Zange¹⁾. (Fig. 112).

Fig. 112.



Die blosse Extension führt selten zum Ziele. Demarquay räth, mit derselben eine Rotation des Daumen zu verbinden, durch welche der eine Kopf des Flexor brevis vor das Capitulum ossis metacarpi geschoben und die Einklemmung des letzteren zwischen den beiden Köpfen beseitigt werden soll²⁾, welche aber auch bei Interposition der Sehne des Flexor longus günstig wirkt (vgl. pag. 785).

¹⁾ Die Lüer'sche Zange läuft an jeder Branche in ein gabelförmiges Ende aus; zwischen den Zinken jeder Gabel ist ein Stück Gurtband befestigt, welches eine Korkplatte einschliesst. Beim Schliessen der Zange wird der Finger zwischen den beiden Korkplatten fest und doch nicht hart eingeklemmt, so dass man ihn nach jeder Richtung mit grosser Kraft bewegen und namentlich auch drehen kann. Letzteres lässt sich auch erreichen, wenn man den Finger auf einer längeren Schiene (mit Gysbinden) befestigt. — Charrière, Mathieu u. A. haben die Lüer'sche Zange modificirt, ohne sie zu verbessern.

²⁾ Die Reduction gelang in einem von Roux in dieser Weise (mit Hülfe der Lüer'schen Zange) behandelten Falle sehr leicht. Bull. de Thérapeut. 1851, pag. 495.

2. Druck auf die Basis der ersten Phalanx und das Capitulum ossis metacarpi, um erstere abwärts, letzteres aufwärts zu drängen (*Impulsion directe, glissement*). Diese bereits von Hey versuchte, in neuester Zeit besonders von Malgaigne und Gerdy¹⁾ ausgebildete Methode wird nach den Angaben des Letzteren in folgender Weise verrichtet: der Wundarzt umfasst die Hand des Verletzten in der Art, dass die Finger gegen die Volarseite zu liegen kommen und die Zeigefinger insbesondere vor dem Capitulum ossis metacarpi sich kreuzen; mit den gegen die Basis der verrenkten Phalanx angestemmt Daumen schiebt er die letztere abwärts.

Man kann auch die Impulsion mit der Extension verbinden. Um erstere mit voller Sicherheit auszuführen, scheute sich Malgaigne nicht, einen Pfriem von der Volarseite her in das Capitulum ossis metacarpi einzubohren.

Die Mitte zwischen beiden Verfahren hält das von Rognetta empfohlene²⁾. Derselbe umgibt die Finger dicht hinter der Basis der verrenkten Phalanx mit einem offenen Schnürknoten und extendirt an den Enden des Strickes oder Bandes, aus welchem der Knoten gebildet ist. Je stärker gezogen wird, desto mächtiger drängt der Knoten gegen die Basis der Phalanx, und schiebt sie abwärts.

3. Die gewaltsame Beugung, zuerst von Charles Bell empfohlen und besonders von englischen Aerzten, bald allein, bald in Verbindung mit der Impulsion angewandt, hat augenscheinlich den Vortheil, dass der gespannte Flexor brevis erschlafft und die Berührungsfläche der beiden Knochen vermindert wird.

4. Hyperextension, Dorsalflexion, zuerst von Pailloux, auf Grund seiner Theorie von der Interposition des Kapselbandes empfohlen (und mit Erfolg angewandt), um den eingeklemmten vorderen Theil desselben frei zu machen, zugleich aber durch hebelartige Bewegung des Fingers die Basis der Phalanx abwärts zu schieben. Vidal empfahl, zur Ausführung der Dorsalflexion den verrenkten Daumen durch den Ring eines Schlüssels in der Art zu stecken, dass die Stange auf der Vorseite desselben zu liegen kommt, dann Schlüssel und Finger zugleich mit der Hand zu umfassen und auf solche Weise die Hebelbewegung auszuführen. Durch dies Verfahren gelang ihm die Reduction einer veralteten Verrenkung. Man kann zu diesem Behuf den Daumen auch auf einer Schiene befestigen oder die Lürer'sche Zange anwenden³⁾.

¹⁾ L'expérience, 1843.

²⁾ Nach Cooper verfuhr Penneck ebenso mit einer Aderlassbinde.

³⁾ Chelius empfiehlt, den Daumen mit einer befeuchteten Bandschlinge in gerader

Besteht der Verdacht einer Interposition der Sehne des Flexor longus, so muss man vor der Hyperextension die Dorsalluxation durch Rotation in eine Ulnarluxation verwandeln. Am Sichersten macht man auch diese Bewegungen mit der Lürer'schen Zange.

Bis zu welcher Zeit Daumen-Verrenkungen noch eingerenkt werden können, ist nicht sicher bekannt; wahrscheinlich nicht jenseit des zweiten Monats.

In manchen Fällen gelang die Einrenkung schon nach wenigen Tagen nicht, durch keine der angeführten Methoden. Günther rät alsdann zur subcutanen Trennung des Ligamentum intersesamoideum, während Malgaigne die Durchschneidung des Abductor brevis und des mit ihm verwachsenen Theiles des Flexor brevis empfiehlt. Jedoch kam Malgaigne auch damit in einem Falle nicht zum Ziele und sah sich genöthigt, zu der von Vidal für solche Fälle in Vorschlag gebrachten Resection des Capitulum ossis metacarpi zu schreiten. Bevor man sich dazu entschliesse, würde, nach Lücke's wohl berechtigter Empfehlung¹⁾, in frischen Fällen bloß die Eröffnung des Gelenkes durch einen gerade auf das Capitulum ossis metacarpi an der Volarseite eindringenden Schnitt zu versuchen sein, von welchem aus vielleicht die Reposition des Sesambeins und des ihm adhären den Kapselstücks (mit einem Hebel oder Haken) und somit die Beseitigung des Reductionshindernisses gelingt, von welchem aber auch, wenn nöthig, sofort zur Resection übergegangen werden kann.

II. Volar-Luxationen des Daumen, selten beobachtet und noch seltener anatomisch untersucht²⁾, entstehen durch übermäßige Beugung oder directen Stoss auf die Dorsalseite der ersten Phalanx. Das Capitulum ossis metacarpi ragt auf dem Handrücken hervor; die Basis der ersten Phalanx dagegen kann an der Volarseite des Mittelhandknochens weit emporgleiten, wobei sie sich, rotirend, bald mehr der Ulnar-, bald mehr der Radialseite zuwendet. Steht die Phalanx mit ihrer Volarseite der Ulna zugewandt, so kann man daraus erschliessen, dass sie auch auf der Ulnarseite emporgeschlitten ist und die Extensorensehnen nach derselben Seite dislocirt hat, — und umgekehrt. Dies ist von praktischer Bedeutung, da die Reduction leichter gelingt, wenn man die Volarluxation vollständig in die ihr verwandte Ulnar- oder Radial-Luxation umwandelt und dann erst

Richtung nach Oben zu ziehen, mit der anderen Hand den Metacarpus nach Unten zu drücken, demnächst den Daumen in gerade Lage zu bringen. Unter „Oben“ kann nach der übrigen Darstellung nur die Dorsalseite verstanden werden.

¹⁾ l. c. pag. 206 und 207.

²⁾ Vgl. Meschede in Virchow's Archiv, 1866, Bd. 37. pag. 510.

Dorsalflexion mit Neigung der Phalanx nach der entsprechenden Seite folgen lässt, als wenn man sofort bloß extendiren oder hyperextendiren wollte. Directer Druck auf das Capitulum erwies sich nützlich.

10. Verrenkungen der zweiten und dritten Phalanx.

Wenn die zweite (oder dritte) Phalanx verrenkt werden soll, so muss die erste (resp. zweite) fixirt sein und eine sehr bedeutende Gewalt auf jene Phalanx einwirken. Dies ist begreiflicher Weise höchst selten der Fall. Jedoch sind Verrenkungen in jeder Richtung beobachtet worden, häufiger nach der Dorsalseite, als nach allen anderen zusammengenommen. — Die Symptome sind denen der so eben erörterten Verrenkungen der ersten Phalanx analog. — Die Reduction durch Zug ist ohne die Lürer'sche Zange wegen der geringen Oberfläche des verrenkten Theils schwierig. Die Impulsion führt voraussichtlich leichter zum Ziele. Vidal empfahl auch bei diesen Verrenkungen die Anwendung des Schlüssels (vgl. pag. 784).

d) Verrenkungen an der unteren Extremität.

1. Verrenkungen des Oberschenkels, Verrenkungen im Hüftgelenk. *Luxationes femoris s. coxae*¹⁾.

Als Arten der Schenkelverrenkung unterscheidet man, je nach der Stellung, welche der verrenkte Gelenkkopf eingenommen hat:

A. Verrenkung nach Hinten:

- 1) auf die äussere Fläche des Darmbeins, nach Hinten und Oben, nach Aussen und Oben, *Luxatio iliaca*;
- 2) in den kleinen Hüftbein-Ausschnitt (oder in dessen Nähe), nach Hinten und Unten, gerade nach Hinten, *Luxatio ischiadica*;

B. Verrenkung nach Vorn:

- 1) auf das Foramen ovale, nach Vorn und Unten, *Luxatio infrapubica, obturatoria*;
- 2) auf den horizontalen Ast des Schoosbeins, nach Vorn und Oben, nach Oben und Innen, *Luxatio suprapubica, ileopubica*;

C. Verrenkung in verticaler Richtung:

- 1) nach Oben, *Luxatio supracotyloidea s. ileospinalis*,
- 2) nach Unten, *Luxatio infracotyloidea s. ischiotuberosa*²⁾.

¹⁾ In Betreff der anatomischen Verhältnisse vgl. Bd. IV.

²⁾ Das von Anderen gebrauchte Epitheton „ischiotubericum“ entbehrt jeder Analogie; man sagt „Ligam. sacrotuberosum“, nicht — tubericum.

A. Die Luxation nach Hinten (*L. retrocotyloidea*) kommt bei Weitem am Häufigsten vor, nach A. Cooper unter 20 Fällen 17 Mal. Sie hat zwei Unter-Arten: die *L. iliaca* (nach Hinten und Oben) und die *L. ischiadica* (nach Hinten und Unten); dieselben gehen jedoch vielfach in einander über, so dass man mit Recht auch von einer *L. ileoischiadica* spricht.

1) Bei der *Luxatio iliaca* stellt sich der Gelenkkopf auf der äusseren Hüftbeingrube fest (Fig. 113). Diese Art der Schenkelverrenkung kommt am Häufigsten vor (nach A. Cooper 12 auf 20) und bildet den Typus der Luxation nach Hinten¹⁾. Ihre Kennzeichen sind folgende: Verkürzung der Extremität um 40—55 Millimeter; die Hinterbacke difform, durch den meist deutlich fühlbaren Schenkelkopf mehr nach Hinten hervorgewölbt, ihre Falte höher gelegen oder verstrichen, die Schenkelbeuge dagegen als tiefere Einziehung erkennbar,

Fig. 113.



Fig. 114.



wegen der Leere der Pfanne durch den Finger leicht noch tiefer einzudrücken; der Oberschenkel gebeugt und adducirt, Fuss und Knie nach Innen gerollt, wobei das Knie ein wenig vor dem der anderen Seite steht; die grosse Zehe entspricht dem Tarsus des anderen

¹⁾ Die abweichende Ansicht Roser's findet später Erwähnung. — In unserer Figur 113 erscheint der grosse Trochanter etwas zu stark nach Vorn rotirt.

Fusses (Fig. 114): der grosse Trochanter steht näher am Hüftbeinkamm und hinter einer von der Spina anter. sup. zum Tuber ischii gezogenen Linie: der Schenkel ist dem entsprechend verkürzt. Einige Beweglichkeit bleibt: der Schenkel kann stärker adducirt und nach Innen rotirt werden, wogegen alle Versuche zur Abduction oder Rotation nach Aussen auf einen gleichsam federnden Widerstand stossen und lebhaft Schmerzen verursachen.

Anatomische Untersuchungen dieser Luxation sind selten, bald nach der Verletzung gemacht. A. Cooper hat bei zwei frischen Fällen völlige Zerreissung des Ligamentum teres und der Kapsel beobachtet. Häufiger fand man einen relativ engen Schütz im unteren Umlange der Kapsel. Sehr selten fehlte die Zerreissung des Ligamentum teres (Monteggia, Dupuytren, vgl. Sedillot, Dict. des dictionn. de médecine par Fabre. Art. Femur). — Ueber das Verhalten der Muskeln und Knochen berichtet A. Cooper: „Nach Aufhebung des Glutæus maximus fand man zwischen diesem und dem hinteren Theile des Glut. med. eine mit geronnenem Blute gefüllte Höhle: hier hatte der luxirte Schenkelkopf gelegen. Glutæus med. und minim. waren unverändert, dagegen waren Pyramidal., Gemell., Obturat. vollkommen, Pectineus theilweise zerrissen. Die Musc. iliacus und psoas waren völlig gesund. Das Labrum cartilagineum war, mit Ausnahme seines oberen und vorderen Theiles, überall unregelmässig eingerissen und das Ligament. teres vom Schenkelkopfe getrennt. Patient war am Tage nach der Luxation gestorben.

2) Luxatio ischiadica (Verrenkung nach Hinten und Unten). Nächst der vorigen kommt diese Form am Häufigsten vor (5 auf 20). Ihre Kennzeichen sind folgende: Verkürzung des Gliedes bis zu 15 Millimeter, mässige Beugung des Oberschenkels gegen das Becken, Rotation des Fusses und des ganzen Schenkels nach Innen, so dass seine äussere Fläche die vordere wird. Der grosse Trochanter, welcher eigentlich nach Hinten von der Pfanne liegt, tritt ein wenig nach Vorn; der Schenkelkopf ist namentlich bei wohlbeleibten Personen nicht fühlbar. Im Uebrigen Alles, wie bei Lux. iliaca.

Boyer glaubte, dass die Luxation nach Hinten und Unten als primäre schwerlich vorkomme, dass sie vielmehr für eine secundäre Verschiebung der Luxation nach Oben und Aussen (Hinten) zu halten sei, in der Weise, dass, während der Schenkelkopf Anfangs auf der Fossa iliaca externa stand, der Schenkel durch irgend eine Ursache stärker abducirt wird, wodurch der Kopf hinabgleitet und an den oberen Rand der Incisura ischiadica gelangt (Maladies chirurgicales, Tom. IV, pag. 287). Indess hat Asthley Cooper gezeigt, dass die Luxationen nach Hinten und Unten auch primär und unmittelbar entstehen können.

Billard untersuchte eine Luxatio ischiadica bei einem Manne, welcher aus einer Höhe von 40 Meter heruntergestürzt und 2 Stunden später gestorben war. Er fand eine grosse Menge Blut sowohl unter der Haut, als auch zwischen den Fasern des Glutæus maximus und medius bis auf die Umgebung des Gelenkes infiltrirt; die Fasern des Glutæus maximus waren in zwei Dritttheilen der Breite des Muskels in der Höhe der oberen Spitze des Trochanter major quer durchrisen, der Glutæus medius von seinem Ansatzpunkte an den Trochanter getrennt. Glutæus minimus war

unverletzt, erschlafft durch die Annäherung seiner beiden Ansatzpunkte. Dagegen war der Ileopectineus gespannt, durch seine Befestigung am kleinen Trochanter verdreht und gegen die Pfanne gedrückt; in derselben Spannung befanden sich Pectineus, Obturator externus, Adductor brevis. Der Schenkelkopf lag nach Hinten und Aussen von der Pfanne, der vordere Rand der Incis. ischiadica major wurde von den Mm. pyriform. und obturat. intern. bedeckt, welche zugleich schräg über den Hals des Oberschenkels hinwegliefen und somit stark gespannt und zwischen dem Schenkelkopf und der hinteren Seite der Pfanne eingeklemmt wurden. Die Gemelli waren zerrissen und der Quadratus an die eigentlich hintere, jetzt vordere Seite des Schenkelbalses gedrückt. (Archives de médecine, 1823, Tom. III. pag. 539).

Fig. 115.



Fig. 116.



B. Die Luxation nach Vorn kommt viel seltener, unter 20 Fällen von Schenkelverrenkung durchschnittlich nur 3 Mal vor. Wir unterscheiden zwei Unterarten: unterhalb und oberhalb des Os pubis.

1) Luxatio infrapubica s. obturatoria (Fig. 115 und 116). Die Kennzeichen dieser Luxation sind folgende. Der Schenkel ist nach Aussen rotirt und abducirt, er ruht in der Rückenlage des Kranken auf seiner äusseren Fläche. Der Unterschenkel ist ein wenig gebeugt, und da der Schenkelkopf auf dem Foramen obturatum, folglich niedriger steht, als die verlassene Pfanne, so ist das Glied etwas

verlängert. Der innere Knöchel tritt nach Vorn, und die Ferse, oder eigentlich die Achillessehne, stellt sich dem inneren Rande des anderen Fusses gegenüber. Den Schenkelkopf findet man als eine harte Geschwulst an der inneren oberen Seite des Schenkels in ziemlicher Tiefe, während unterhalb der Mitte des Poupert'schen Bandes sich eine Vertiefung zeigt; auch an der äusseren Seite (an der „Hüfte“) findet sich eine Vertiefung oder Einbiegung da, wo der grosse Trochanter stehen sollte, welcher durch die Rotation nach Aussen weiter nach Hinten gerückt ist; die Gesässfalte bildet statt eines Kreisbogen-Abschnittes einen stumpfen Winkel. Die Adductoren werden durch den Gelenkkopf nach Vorn gedrängt und stark gespannt. Abduction und Rotation nach Innen ist unmöglich.

A. Cooper hält die Biegung des Rumpfes gegen den Schenkel (in Folge der Zerrung des Ileopectas) für vorzugsweise charakteristisch. Wutzer (Ueber seltenere Formen der Schenkelverrenkung, Archiv f. klin. Chir., Bd. VI. pag. 656 u. f.) hebt die Einbiegung in der Gegend des Trochanter major, das Einsinken der Hüfte besonders hervor. Je weiter einwärts der Gelenkkopf rückt, desto deutlicher ist dies Einsinken. Geht er über den Rand des Foramen ovale hinaus und nimmt seine Stellung auf dem Ramus ascendens ischii oder descendens pubis, so erscheint die dem Trochanter entsprechende Hautstelle sogar concav (eingezogen). Man unterscheidet diese seltenere Luxat. obturatoria als Luxatio perinealis, weil der Gelenkkopf vom Damme aus gefühlt werden kann. Die Abduction und Auswärtsrollung des Schenkels erreicht in diesen Fällen den höchsten Grad.

2) Verrenkung des Schenkelkopfes auf das Schoosbein, Luxation nach Vorn und Oben, Luxatio suprapubica s. ileopubica (1:20). Der Schenkelkopf steht nicht immer auf dem Schambeine, sondern oft auf dem vorderen vorspringenden Rande des

Fig. 117.



Os ileum. Man kann danach auch zwei Varietäten unter den beiden eben angegebenen Namen unterscheiden (Malgaigne).

Der Gelenkkopf bildet in der Schenkelbeuge eine runde, harte Geschwulst, an deren innerer Seite die Pulsationen der Arteria femoralis wahrgenommen werden. Lebhaftige Schmerzen ziehen vorn den Schenkel entlang, dem Laufe des Nervus cruralis folgend. Die Verkürzung des, etwas nach Aussen rotirten Gliedes beträgt etwa einen Zoll; der grosse Trochanter, oft undeutlich zu fühlen, liegt in einer

vom oberen vorderen Darmbeinstachel senkrecht herabsteigenden Linie oder hinter derselben; Rotation nach Innen ist unmöglich; die Hinterbacke ist abgeflacht.

Fig. 117 zeigt eine veraltete Luxation nach Vorn und Oben, bei welcher der Schenkelkopf nach und nach mehr nach Aussen gerückt ist, so dass man den Fall auch als einen Uebergang zur Luxatio supracotyloidea hätte deuten können. — Fig. 118 ist das Os ileum ohne den Schenkelkopf dargestellt, am höchsten gelegen die Höhlung, welche der Schenkelkopf inne hatte, tiefer unten diejenige, welche sich der Trochanter bildete und am tiefsten die eigentliche verflachte Pfanne.




Fig. 118.

Dies Präparat rührt von einem 60jährigen Irren her, welcher wenige Tage nach der Verrenkung schon aufgestanden und gegangen war. Sechs Jahre später machte er mit Hülfe seines, ihm unentbehrlich gewordenen Stockes 42 Englische Meilen in einem Tage. Vgl. A. Cooper, On dislocations and fractures on vicinity of the joints, pag. 105. — In einem von Schub (Wiener med. Wochenschrift, 1852, No. 35) beobachteten und anatomisch untersuchten Falle fand sich das Labrum cartilagineum unversehrt. Die, einen vollen Zoll betragende Verlängerung des Schenkels erklärt Schub aus dem Anstemmen des oberen Umfanges des Gelenkkopfes gegen das Tuberculum ileopectineum. Der Schenkelkopf wurde in der Inguinalgegend und zwar in der Mitte zwischen der Symphysis ossium pubis und der Spina anterior superior deutlich gefühlt. Die Arteria femoralis verlief gerade über ihm. — Wutzer (l. c. pag. 678) fand die Extremität „um einen Theil kürzer“.

C. Luxationen in verticaler Richtung sind überaus selten.

1) Bei der Verrenkung nach Oben, Luxatio supracotyloidea s. ileospinalis, tritt der Schenkelkopf senkrecht empor und stellt sich zwischen den oberen und den unteren vorderen Hüftbeinstachel, so dass der durch ersteren gebildete Vorsprung von Unten verdeckt wird; der grosse Trochanter steht über der Pfanne, ganz nach Hinten gekehrt, der Schenkel auswärts rotirt und adducirt.

2) Bei der Verrenkung nach Unten, Luxatio infracotyloidea s. ischiotuberosa, stellt sich der Gelenkkopf am unteren Rande des Tuberculi ischii fest; man vermag ihn daher von keiner Seite zu fühlen. Alle das obere Ende des Femur umfassenden Muskeln (auch Adductoren und Ileopsoas) sind auf's Aeusserste gespannt, das auffällig verlängerte Bein wird daher in grade abwärts gerichteter (gestreckter) Stellung starr und unbeweglich gehalten.

Wenn wir bei der Symptomatologie der Schenkelverrenkungen von Verlängerung oder Verkürzung des luxirten Gliedes sprechen, so stützen wir uns dabei namentlich auf A. Cooper. Indess sind diese Verhältnisse noch streitig. So viel ist jedoch gewiss, dass, wenn nur alle Chirurgen in gleicher Weise und mit gleicher Berücksichtigung der Becken-Neigung und der Richtung des Gliedes messen wollten, sie zuletzt sich verständigen würden. Sédillot glaubt z. B., dass man zu dem Resultat, das luxirte Bein sei verlängert, nur dann gelangen könne, wenn die Länge des verrenkten Gliedes nicht mit derjenigen verglichen wird, welche das gesunde Bein in derselben Stellung ergibt. So würde z. B. bei der Verrenkung auf das Foramen ovale die Messung des nicht dislocirten, aber in Abduction befindlichen Fusses eine noch grössere Länge ergeben, als die des auf das Foramen ovale luxirten. — Busch (Archiv f. klin. Chirg. Bd. IV. Heft 1) hat auf diese Verhältnisse, sowie auf die Abhängigkeit der Stellung des Beines und des Beckens von der Spannung der unversehrt gebliebenen Kapseltheile besonders hingewiesen. Vgl. Bd. IV. Abth. XLI.

In neuerer Zeit hat man von einer Seite das Vorkommen der vollkommenen, von anderer Seite das der unvollkommenen Schenkelverrenkungen bestritten. Zur Erklärung dieser Widersprüche muss man wissen, dass einige Autoren jede Luxation unvollkommen nennen, bei welcher noch ein Theil des Schenkelhalses in Berührung mit dem Pfannenrande ist.

Entstehungsweise. — Sitz des Kapselrisses. — In der vorstehenden Beschreibung sind die verschiedenen Arten der Schenkelverrenkungen symptomatisch nach der Stellung des verrenkten Gelenkkopfes unterschieden. Die neuere Zeit hat aber gerade bei den Schenkelverrenkungen die grosse Bedeutung der Stelle des Kapselrisses für die Art der Reduction kennen gelehrt, da letztere doch rationeller Weise auf demselben Wege erfolgen muss, auf welchem der Gelenkkopf die Kapsel verlassen hat. Während man früher von der Voraussetzung ausging, dass der Kapselriss bei den Verrenkungen nach Vorn im vorderen und bei den Verrenkungen nach Hinten im hinteren Umfange der Kapsel erfolge, so dass der Gelenkkopf bei jenen über den vorderen, bei diesen über den hinteren Pfannenrand in der Gegend der daselbst befindlichen Ausschnitte hinübergleite, hat man jetzt durch Versuche an Leichen die Ueberzeugung gewonnen, dass der Kapselriss zwar an verschiedenen Stellen sitzen und eine verschiedene Anordnung darbieten kann, dass aber die Feststellung des Gelenkkopfes, trotz verschiedener Austrittsstellen, doch an denselben, anderer Seits aber auch aus derselben Austrittsstelle an verschiedenen Orten erfolgt, und dass somit aus der Stellung des Schenkelkopfes (der „Art“ der Verrenkung) auf den Sitz und die Beschaffenheit des Kapselrisses nicht ohne Weiteres geschlossen werden darf.

Roser¹⁾ hat zuerst, nach experimentellen Untersuchungen, die Verrenkung nach Unten als die gewöhnlichste primäre Ver-

¹⁾ Zur Revision der Verrenkungslehre, Archiv für physiologische Heilkunde, 1857.

renkung des Schenkels, d. h. die Zerreiſſung des unteren Umfanges der Kapsel als die gewöhnlichſte Art des Kapselrisses bezeichnet. Der Gelenkkopf tritt dabei, nach Roser, unter der Sehne des *M. obturator internus* hervor, wozu eine leichte Rotation nach Innen bei starker und gewaltsamer Beugung des Schenkels die Veranlassung giebt. Diese primäre Luxation nach Unten verwandelt sich aber in der Regel durch eine Streckbewegung und eine Rotation nach Innen, in die „Verrenkung nach Hinten“ (*Luxatio ischiadica*). Durch Abduction kann sie sich in die *Luxatio obturatoria* verwandeln. Bei der Verrenkung nach Vorn, zwischen die *Fossa ileopectinea* und den *Psoas* (*Luxatio ileopectinea*), ist, nach Roser, als Ursache eine übermässige Streckung nebst Rotation nach Aussen anzunehmen. Eine secundäre Verschiebung erfolgt dabei durch eine leichte Beugebewegung. Die Verrenkung hinter den *Pectineus* ist als eine blosse Modification dieser *Luxatio ileopectinea* anzusehen. Die *Luxatio iliaca* wäre, nach Roser, die seltenste aller Schenkelverrenkungen, während sie gewöhnlich für die häufigste gilt. Die Mehrzahl der Fälle, die man *Luxatio iliaca* genannt hat, gehören, nach Roser, zur *Luxatio ischiadica*.

Mit besonderer Ausführlichkeit hat Gellé¹⁾ die Bedeutung des Sitzes und der Beschaffenheit des Kapselrisses hervorgehoben. Nach seinen Untersuchungen wären in dieser Beziehung folgende Arten von Schenkelverrenkungen zu unterscheiden:

I. Die Kapsel zerreiſt in der Richtung des Schenkelhalses, und zwar regelmässig im hinteren unteren Dritttheil.

II. Die Kapsel zerreiſt rechtwinklig gegen die Achse des Schenkelhalses, und zwar:

1) dicht am Pfannenrande,

a) im vorderen, b) im hinteren, c) im oberen, d) im unteren Umfange;

2) dicht am Schenkelhalse.

III. Die Kapsel ist in ihrem ganzen Umfange abgerissen.

1) Die Kapsel zerreiſt in der Richtung des Schenkelhalses im hinteren unteren Dritttheil ihres Umfanges. Meist hat der Riss hierbei eine dreieckige Gestalt, die Basis dem Pfannenrande, die Spitze dem Femur zugewandt. Diese Art des Kapselrisses kommt zu Stande, wenn eine äussere Gewalt durch Vermittelung der Beugung des Schenkels, meist zugleich mit Abduction die Verrenkung zu Stande bringt. Auf solche Weise gelingen Hüftverrenkungen bei Versuchen am Cadaver am Leichtesten, wegen der relativen Schwäche der unteren Kapselhälfte. Sobald der

¹⁾ Étude du rôle de la déchirure capsulaire dans la réduction des luxations récentes de la hanche. Archives générales de médecine. Paris, 1861, Avril.

Gelenkkopf in dieser Richtung die Kapsel verlassen hat, und die Einwirkung der verletzenden Gewalt aufhört, fällt der Schenkel durch sein Gewicht aus der gebeugten in die gestreckte Stellung und der Gelenkkopf wird dadurch genöthigt, hinter dem Pfannenrande aufwärts zu steigen und sich somit auf die äussere Fläche des Hüftbeins zu begeben. Besteht eine *Luxatio iliaca*, und wird aus der Anamnese nicht bestimmt festgestellt, dass sie in gestreckter Stellung des Gliedes zu Stande gekommen sei (was äusserst selten ist), so kann man mit Bestimmtheit darauf schliessen, dass die oben angegebene Art des Kapselrisses sich finde. Folgt auf die Beugung eine Abduction während der Entstehung der Verrenkung und dann erst das Hinabfallen des Gliedes, so kann ausnahmsweise eine *Luxatio obturatoria* oder *perinealis* oder *ischiadica* zu Stande kommen. Eine genaue Erhebung der Anamnese in Betreff der Entstehungsweise der Verrenkung, namentlich in Betreff der stattgehabten Beugung, ist daher äusserst wichtig.

2) Die Kapsel ist rechtwinklig gegen die Achse des Schenkelhalses dicht am Pfannenrande abgerissen:

a) Im vorderen Umfange, d. h. vor einer Linie, die man sich von der *Spin. ant. sup. ilei* zum *Tuber ischii* gezogen denkt. Die Veranlassung ist eine Gewalt, welche den grossen Trochanter stark nach Hinten schiebt, z. B. übermässige Abduction in halber Beugung, Fall auf die vordere Seite des Trochanter, gewaltsame Rotation einer Rumpfhälfte nach Vorn, während das andere Bein fixirt ist. Durch einen solchen Kapselriss entsteht stets die *Luxatio obturatoria*. Man kann aus dieser auf die angegebene Art des Kapselrisses zurückschliessen, wenn nicht aus der Anamnese feststeht, dass die Verrenkung durch Beugung in der unter 1) beschriebenen Weise entstanden ist.

b) Im hinteren Umfange. Diese Verletzung entsteht durch Gewalten, welche den grossen Trochanter nach Vorn treiben, namentlich Rotation nach Innen; jedoch ist sie wegen der schrägen Stellung des Schenkelhalses überhaupt seltener, zumal der vordere Rand der Pfanne wenig hervorspringt und somit keinen genügenden Stützpunkt für die erforderliche Hebelbewegung abgiebt. Nur die *Luxatio iliaca* geht aus diesem Kapselriss hervor; aber unter allen Entstehungsweisen derselben ist diese die seltenste.

c) Im oberen Umfange. Der Kapselriss erfolgt durch übermässige Adduction, mag nun der Schenkel oder der Rumpf die entsprechende Bewegung ausführen. Der Gelenkkopf rückt über den

oberen Pfannenrand hinaus in den Anfang der Fossa iliaca oder auf den äusseren Theil des Ramus horizontalis pubis. *Luxatio ileopubica*.

d) Im unteren Umfange. Abductionsbewegungen sind die Veranlassung. Der Gelenkkopf tritt zunächst auf das Sitzbein; von da kann er sich aber entweder auf die Fossa iliaca oder aber nach vorn in das Foramen ovale oder nach dem Damm begeben. Sobald eine Schenkelverrenkung durch übermässige Abduction entstanden ist, hat man an diesen Mechanismus zu denken.

3) Die Kapsel ist rechtwinklig gegen die Achse des Schenkelhalses dicht am Femur abgerissen. Diese Verletzung ist von besonderer Bedeutung; denn die auf solche Weise entstandenen Verrenkungen lassen sich nicht reduciren.

Glücklicher Weise scheinen sie selten zu sein. Gellé brachte sie unter 150 Versuchen nur 4 Mal zu Stande. Ein einziges Präparat (noch dazu von einem veralteten Fall ohne Anamnese), auf welches Gellé sich beruft, kann als Beweis für das wirkliche Vorkommen dieses Mechanismus angesehen werden. Der Austritt des Gelenkkopfes durch einen solchen Riss ist schwer zu begreifen, lässt sich aber durch Experimente an der Leiche als möglich erweisen. Man darf nicht vergessen, dass die Insertion der Kapsel im unteren und hinteren Umfange an der Grenze zwischen dem äusseren und mittleren Drittel des Schenkelhalses sitzt, und dass gerade in dieser Gegend das Lig. orbiculare sehr schlaff und dünn ist. Von Belang ist auch, dass die Kapsel sich kurz vor ihrer Insertion am Schenkelhalse im unteren Umfange wie ein Halstuch umschlägt und dort durch kurze Faserzüge (*Retinacula*), welche die Synovialmembran abheben, befestigt wird. Hierdurch wird einerseits ihre Beweglichkeit, andererseits aber die Möglichkeit der Zerreißung bei starker Adduction mit gleichzeitiger Rotation nach Aussen vergrößert. Diese Bewegungen, durch welche allein Gellé im Stande war, die Verrenkung in der angegebenen Weise hervorzubringen, sind also dieselben, wie diejenigen, welche bei dem gewöhnlichen Kapselriss (vgl. 1) wirksam sind. Weshalb in dem einen Falle dieser, in dem anderen jener erfolgt, lässt sich nur aus der individuellen Anordnung des Kapselbandes erklären.

Die Form der Verrenkung, welche aus diesem selteneren Kapselriss hervorgeht, ist immer die *Luxatio iliaca* oder *ischiadica*. Die constante Unmöglichkeit der Reduction (auch an der Leiche nach Entfernung aller Muskeln) beruht darauf, dass der Gelenkkopf immer um die ganze Länge des Schenkelhalses von dem Kapselriss entfernt bleibt und somit die Kapselwand vor sich her in die Pfanne hineintreibt, ohne selbst in die Gelenkhöhle eindringen zu können (Interposition der Kapsel). Gellé hält es für unzulässig, in einem solchen Falle Reductionsversuche zu machen. Man soll abwarten, dass sich eine neue Gelenkhöhle bilde, d. h. die Luxation in ruhiger Lage und unter mässigen passiven Bewegungen veralten lassen. Es muss also auf die Diagnose einer solchen Art des Kapselrisses die grösste Sorgfalt verwendet werden. Die Merkmale, welche Gellé, nach seinen

Versuchen an der Leiche, aufstellen zu können glaubt, sind folgende. Die Verrenkung entstand durch Beugung, aber der halbgebogene Schenkel wurde zugleich nach Hinten getrieben und gerieth dabei in eine Rotation nach Aussen. Die Reduction gelingt nicht durch Anwendung der Beugung. Der Gelenkkopf ist in hohem Grade beweglich; man kann ihn in jeder Richtung weithin verschieben. Man kann die Rotation nach Innen so weit ausführen, dass der Hallux geradezu nach Hinten sieht; die Rotation nach Aussen ist beschränkter. Man glaubt reducirt zu haben, aber die Verrenkung stellt sich bei der leisesten Rotation nach Aussen wieder her. Der scheinbare Rücktritt des Gelenkkopfes in die Gelenkhöhle erfolgt ohne Geräusch. — Gellé bekennt selbst, dass keines dieser Zeichen pathognomonisch sei, sondern verlangt, sie alle zusammen in's Auge zu fassen.

4) Die Kapsel ist in ihrem ganzen Umfange abgerissen, sei es am Femur oder am Pfannenrande. Käme ein solcher Fall zur Beobachtung (was bisher nicht bekannt), so würde sich beim Reductionsversuche die Kapsel vor dem Gelenkkopf in die Pfanne einstülpen und die Reduction unmöglich machen. Um zu entscheiden, ob noch ein Theil der Kapsel adhärirt, wird es am Besten sein, den Oberschenkel zu beugen und zu abduciren. Hierbei wird, wenn die Trennung im ganzen Umfange besteht, jede Mitbewegung des Beckens aufhören und die Beweglichkeit des Schenkels in jeder Richtung ebenso gross sein, als bei einer Fractur unter dem Trochanter.

Somit können, nach Gellé, entstehen:

1. **Luxatio Ileo-ischladica**

- a) aus einem Längsriss im unteren Umfange,
- b) aus einem Querriss dicht am Femur (nicht reducirbar),
- c) aus einem Querriss dicht am Pfannenrande, im hinteren Umfange der Kapsel (am Seltensten).

2. **Luxatio obturatoria**

- a) aus einem Längsriss im unteren Umfange,
- b) aus einem Querriss dicht am Pfannenrande im vorderen Umfange,
- oder
- c) aus einem solchen im unteren Umfange.

3. **Luxatio supra-pubica**

- aus einem Querriss dicht am Pfannenrande im oberen Umfange.

In Betreff der in verticaler Richtung erfolgenden Verrenkungen macht Gellé keine Angaben. — Nach Pitha entsteht die *Luxatio supracotyloidea* durch einen Riss im oberen, die *infracotyloidea* durch einen solchen im unteren Umfange der Kapsel.

Ätiologie. Während die specielle Entstehungsgeschichte der Oberschenkel-Verrenkungen aus den vorstehenden Erläuterungen ent-

nommen werden kann, ist über ihre Veranlassungen im Allgemeinen zu bemerken, dass es der Stärke der Kapsel entsprechend, bedeutender Gewalten bedarf, um die Bewegungen des Gelenks bis über das gegebene Maass hinaus zu treiben. Die Bewegungen des Oberschenkels können aber vorzugsweise unter folgenden Verhältnissen über ihre normalen Grenzen gesteigert werden.

1. Durch einen Fall, gewöhnlich von beträchtlicher Höhe, wobei neben dem Gewicht des Körpers auch die Geschwindigkeit des Falles und häufig noch eine Last, welche der Fallende trug, in Betracht kommen.

2. Durch den Fall (das Aufschlagen) eines schweren Körpers auf den Verletzten (Einsturz von Stein- und Erdmassen auf denselben, Sturz eines Pferdes auf seinen Reiter, ein über den Oberschenkel hinweggehendes Wagenrad u. dgl. m.).

3. Durch einen hohen Grad von Spreizung der Schenkel, gleichgültig ob willkürlich oder durch äussere Veranlassung bewirkt.

Die Wirkung der genannten Gewalten auf den Oberschenkel verwandelt denselben in einen zweiarmigen Hebel, dessen Hypomochlion durch den Rand der Pfanne gebildet wird; den Widerstand gegen jene Gewalt leisten der Bänder-Apparat und die dem Gelenk zunächst gelegenen Muskeln. Die Gewalt wird um so grösser, je näher dem unteren Ende des Schenkels sie einwirkt, da jede auf einen ungleicharmigen Hebel wirkende Kraft an dem längeren Arme in geradem Verhältniss zu ihrer Entfernung vom Stützpunkt wächst.

Wir setzen hierbei voraus, das Becken sei fixirt und der Oberschenkel in Bewegung, weil auf diese Weise die meisten Oberschenkel-Luxationen entstehen; indess kann auch umgekehrt das Glied feststehen und die Bewegung am Becken stattfinden. Diese Entstehungsweise ist, nach A. Cooper und v. Dumreicher¹⁾, die gewöhnliche für die Luxatio supra-pubica. Dieselbe kann aber auch entstehen, wenn der gestreckte und adducirte Oberschenkel bei fixirtem Becken mit grosser Gewalt auswärts gerollt wird, oder wenn der Oberschenkel in Extension und Adduction fixirt ist, das Becken aber auf ihm übermässig rückwärts geneigt und gleichzeitig im Verhältniss zu dem Oberschenkel einwärts (nach Vorn) gedreht wird.

Complicationen. Oft bewirkt dieselbe Gewalt, welche die Verrenkung hervorrief, mannigfaltige (auch mehr oder weniger schnell tödtliche) Verletzungen an verschiedenen anderen Stellen des Körpers, namentlich auch Gefässerreissungen mit nachfolgender innerer und

¹⁾ Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1851, pag. 785.

äusserer Blutung. — Auch gleichzeitige Verrenkung beider Oberschenkel findet sich nicht so selten, wie man früher glaubte¹⁾.

Häufig entstehen Brüche des Randes des Pfanne (vergl. pag. 399), indem das Kapselband der einwirkenden Gewalt widersteht, jener knöchernen Rand dagegen abgesprengt wird. Gewöhnlich findet sich daher eine solche Fractur im oberen Umfange des Pfannenrandes, wo die Kapsel am Stärksten ist. Das abgebrochene Stückchen der Pfanne bleibt in inniger Verbindung mit dem Kapselbande und erhält daher auch hinreichende Blutzufuhr, um wieder anheilen zu können. Man schliesst auf das Bestehen dieser Complication, wenn die Reduction sehr leicht gelingt, der Gelenkkopf aber wieder ausweicht, sobald man ihn dem Muskelzuge überlässt. Dies erklärt sich daraus, dass einer Seits der für die Reduction hinderliche, für die Retention aber nützliche Widerstand des knöchernen Randes der Pfanne fehlt, anderer Seits aber mit der Ablösung des oberen Umfanges des Pfannenrandes auch der bei allen Luxationen sonst unversehrt und gespannt bleibende Theil des Kapselbandes seine Befestigung verloren hat und somit erschlafft ist.

Selten besteht mit einer Verrenkung des Schenkels zugleich ein Bruch des Femur²⁾. Hat letzterer am Schenkelhalse seinen Sitz, so wird die Diagnose und die Behandlung sehr schwierig. Die Einrenkung kann in einem solchen Falle erst vorgenommen werden, wenn die Fractur geheilt ist, also nach mindestens vier Wochen. Dass sie alsdann noch möglich ist, beweisen mehrere Beobachtungen. Bei einer Fractur im unteren Drittheil des Schenkels wäre nach Anlegung eines provisorischen Verbandes die Einrenkung immer sogleich zu versuchen.

Eine häufige Complication bildet, besonders bei Kindern, die Retentio urinae. Dieselbe hängt gewiss nur höchst selten von einem gleichzeitigen Beckenbruch ab, vielmehr gewöhnlich von der in den meisten Fällen vorauszusetzenden Erschütterung des unteren Rumpf-Endes (namentlich des Rückenmarkes oder der Blase selbst).

Sehr selten findet sich eine Zerreissung oder Quetschung grosser Gefäss- und Nervenstämme, am Leichtesten noch Umschlingung des

¹⁾ Ausser den früher publicirten Fällen kenne ich aus mündlicher Mittheilung des Dr. Kunschert noch einen Fall der Art, in welchem vollständige Heilung erzielt wurde. Auch in den Fällen von Steiner (Württemberg. med. Correspondenz-Blatt, 1870, No. 16) und von Pollard (Bartholom. report. VIII.) erfolgte nach leichter Reduction schnell Heilung.

²⁾ Vgl. Raillard, sur quelq. luxat. d. l. cuisse compliquées de fract. d. femur. Thèse. Paris, 1866.

Nerv. ischiadicus um den Trochanter major oder um den Schenkelhals bei Luxatio ischiadica.

Prognose. Die Gefahr der Schenkel-Verrenkungen beruht theils auf den so eben erwähnten Complicationen, theils auf der Schwierigkeit der Reduction. Gelang letztere, so konnten die Kranken oft schon nach 8—10 Tagen ganz gut gehen, — obgleich ein solcher Versuch niemals zu empfehlen ist. Die Schwierigkeit der Reduction hat ihren Grund zunächst theils in der Anstimmung des Schenkelkopfs an den Pfannenrand, theils in der Lage und der relativen Enge des Kapselrisses. Abgesehen von dem absolut ungünstigen Sitze des Kapselrisses (vgl. pag. 795), sind beide Momente ihrer Seits wieder bedingt theils durch die Spannung des unversehrt gebliebenen und mit dem Femur dislocirten Theiles der Kapsel, theils durch den Zug der das Gelenk umgebenden, mächtigen Muskeln. Die Schwierigkeiten steigern sich mit dem Alter der Verrenkung.

Wenn man die Luxationen des Oberschenkels sich selbst überlässt, so bleibt das Glied mehr oder weniger seiner Bewegungen beraubt und behält die fehlerhafte Richtung. Nicht selten aber gehen die Kranken sehr bald mit oder auch ohne Stock, — wengleich hinkend. Besonders bei Luxationen nach Hinten stellt die Möglichkeit zur Locomotion sich oft so vollständig wieder her, dass man dies wohl erwägen muss, wenn es sich fragt, ob veraltete Luxationen um jeden Preis reducirt werden sollen.

Sédillot (Luxations traumatiques sous-pubiennes ou ovalaires du fémur, avec conservation immédiate des usages du membre, Gazette des hôpitaux, 1861) beobachtete 5 Fälle von Luxatio femoris infra-pubica (die er mit Boyer unbegreiflicher Weise für die häufigste Art der Oberschenkel-Verrenkungen hält), in denen die Patienten gleich nach erlittener Verletzung wieder gehen und ohne starken Schmerz oder bedeutendes Hinken ihre gewohnten Beschäftigungen aufnehmen konnten.

In sehr seltenen Fällen beobachtete man spontane Einrenkung (durch Muskelzug), welche sich nur bei incompleter Luxation begreifen lässt.

Behandlung. Die Indicationen sind, wie bei allen anderen Luxationen: 1) das luxirte Gelenk-Ende aus seiner fehlerhaften Stellung flott zu machen und in die Pfanne zurück zu bringen (reduciren) oder wenigstens ihm eine solche Richtung im Verhältniss zu dem bestehenden Kapselriss zu geben, dass die Muskeln seine Reduction bewirken können; 2) das Wiederausweichen zu verhüten (Retention). Ersteres ist oft schwierig, Letzteres meist leicht.

Im Alterthum wurden für die Reduction von Schenkelverrenkungen wunderbare Kräfte und Mittel verwendet, namentlich das Aufhängen an den Füßen

Fig. 119.



(Fig. 119) und das Reiten auf einer Leiter (Fig. 120). Indess tadelte schon Hippokrates diese Verfahren und wandte gewaltsame Mittel nur da an, wo gelinde nicht zum Ziele führten. „Bei Einigen“, sagt er ausdrücklich, „reducirt man den Oberschenkel ohne Apparat, vermöge einer leichten, mit der Hand bewirkten und durch einige Bewegungen unterstützten Extension; in anderen Fällen beugt man den Schenkel im Gelenke, der Knochen erfährt eine Rotation und die Reduction ist vollbracht. In der Mehrzahl der Fälle ist es nicht gleichgültig, welches Verfahren man wählt; es ist eine genaue Kenntniß der gesammten durch die Kranken gebotenen Mittel nöthig, um für jeden Fall das geeignete wählen zu können.“

Die jetzt gebräuchlichen Reductions-Methoden sind wesentlich verschieden, je nachdem die Einrenkung mit gestreckter oder gebeugter Extremität vorgenommen wird.

A. Einrenkung mit gestreckter Haltung. Um zunächst den Oberschenkelkopf beweglich zu machen, verfährt man verschieden je nach der Richtung der Luxation. Steht der Schenkelkopf auf der hinteren Fläche des Hüftbeins, so muss man, um ihn von der Pfanne herabzuführen, den Schenkel in seiner fehlerhaften Rich-

tung, d. h. von Oben und Aussen nach Unten und Innen ziehen, so dass er die gesunde Extremität kreuzt und sein Knie über das Knie der andern Seite hinweggeht. Ist dieser Zug in der Richtung der Längsachse des Schenkels so weit gediehen, dass der Kopf in die Höhe der Pfanne gelangt zu sein scheint, so folgt als zweite Bewegung eine Drehung nach Aussen. Dasselbe Verfahren, nur in umgekehrter Richtung ausgeführt, gilt für die Reduction der Luxation nach Vorn. Man zieht nämlich Anfangs an dem Gliede in abducirter Stellung (in welche es durch die Luxation versetzt ist); sobald dann der Schenkelkopf von seiner abnormen Stelle flott gemacht und in die Nähe der Pfanne gebracht ist, führt man die Extremität gegen die gesunde, d. h. in die Adduction, unter gleichzeitiger Rotation nach Innen.

Nach Boyer's Vorschritt verfährt man bei der Extension mit gestreckter Haltung des Beins in folgender Weise. Der Kranke wird auf einen, mit einer Matratze bedeckten Tisch gelegt; am Kopf-Ende befindet sich ein, in einem Pfosten oder in der Wand eingeschraubter oder eingemauert eiserner Ring zur Befestigung der beiden Enden des als Longuetten zusammengelegten Betttuchs, dessen Mittelstück auf den obern innern Theil des Schenkels der gesunden Seite gelegt wird, während seine Enden vor und hinter dem Thorax nach Oben laufen. Zur Vermeidung eines zu starken Druckes wird die Weiche da, wo die Longuette anliegt, mit Watte ausgestopft. Damit aber die Contraextension wirksam sein könne, muss man verhindern, dass das Becken sich verschiebe, zu welchem Zwecke eine zweite Longuette mit ihrer Mitte zwischen dem Darmbeinstachel und dem Trochanter der luxirten Seite und mit ihren Enden um den Körper herum nach der anderen (gesunden) Seite etwas oberhalb des Darmbeinstachels geführt wird. Die Enden derselben werden Gehülfen übergeben, um sie unverrückt fest zu halten. Die Extensions-Schlingen werden über dem Knie oder über dem Fussgelenk befestigt, an ihren nach Vorn geführten Enden ziehen die Gehülfen. Die Zahl der letzteren muss mit der zu überwindenden Gewalt in Verhältniss stehen; man hat zur Extension bis zu sechs Gehülfen angewendet und würde noch mehr für die Contraextension bedürfen, wenn man dieselbe nicht durch Fixirung bewirkte. Der Chirurg steht auf der luxirten Seite, um den ausgewichenen Kopf gegen die Pfanne, je nach der Richtung der Luxation dirigiren zu können. Den Gehülfen müssen vorher die beiden von ihnen zu bewirkenden Bewegungen erklärt werden, nämlich: dass sie 1) das kranke Glied in der abnormen Richtung, in welcher es sich befindet, anziehen, und 2) durch eine Rotations-Bewegung dasselbe in seine natürliche

Fig. 120.



Lage zurückbringen sollen. Die Thätigkeit des Chirurgen beschränkt sich auf den zweiten Act, welchen er zu leiten und selbst durch energisches Eingreifen zu vollenden hat.

In neuerer Zeit ist vielfach darüber gestritten, ob es zweckmässiger sei, die Extensions-Schlingen über dem Fuss oder über dem Kniegelenk anzubringen; Letzteres ist vortheilhaft, wenn man den Unterschenkel als Hebelarm für die Rotation benutzen will. Hippokrates hat diesen Streit bereits zu schlichten versucht, indem er vorschlug, die Schlingen über dem Fusse und über dem Knie anzulegen, wie Fig. 121

Fig. 121.



zeigt. Auch hinsichtlich der Contra-Extension ist Hippokrates schon Desault und Roux zuvorgekommen, durch seinen Vorschlag, zum Behuf der Contra-Extension einen langen, doppelt zusammengelegten, starken aber weichen Riemen um das Perineum, hinten am Rückgrat hinauf und Vorn über das Schlüsselbein zu führen, einen zweiten Gurt aber um die Brust, unterhalb der Achselhöhle anzulegen (Fig. 121). Er vertheilte also die Befestigungspunkte am Körper, um nicht eine Stelle allzu sehr durch Druck zu belasten.

Bei der Luxation nach Hinten (Oben und Aussen) müssen die Gehülfen nach Innen, in einer den anderen Schenkel kreuzenden Richtungslinie, wie sie z. B. das luxirte Femur Fig. 113. u. 114 (p. 787) angiebt, ziehen, und zwar in langsamen, allmählig verstärkten, aber anhaltenden Zügen. Merkt der Chirurg, dass der Schenkelkopf in der Nähe der Pfanne sich befindet, so umfasst er das Knie, als wollte er es in seine Achselhöhle drücken und wendet den Schenkel stark nach Aussen. Dieser Bewegung gehen die Gehülfen nach, gleichzeitig aber bringen sie den unteren Theil des Fusses tiefer als die horizontale Ebene ist, auf welcher der Kranke liegt, und der Chirurg drängt mit seiner freien Hand den Schenkelkopf vorwärts. Die Gehülfen muss man anweisen, die Abductions-Bewegung nicht zu stark zu machen und namentlich den Unterschenkel nicht zu heben, weil sie dadurch den Schenkelkopf leicht bis zur Incisura ischiadica hinabtreiben könnten. Eine solche Form-Verwandlung der Luxation (vgl. pag. 807) ist, nach A. Cooper, nicht selten unreponirbar. Eben so wenig darf die schräge Richtung nach Innen übertrieben werden. Cooper be-

stimmt als Norm für dieselbe eine schräge Kreuzung des andern Knies. Befürchtet man das Herabgleiten des Schenkelkopfes zur *Incisura ischiadica*, so kann man den Coaptations-Riemen, nach Cooper, (die Wattmann'sche Schlinge) in Anwendung ziehen. Zu diesem Zwecke steigt ein Gehülfe auf das Bett des Kranken und bückt sich bis zur Höhe des luxirten Schenkels herab; dann wird die Mitte eines als Binde zusammengelegten Tuches auf die obere hintere Fläche des luxirten Schenkels gelegt und die beiden Enden um den Nacken des Gehülften geschlungen. Letzterer muss nun in dem Maasse, wie die Extension vorschreitet, allmählig seinen Nacken erheben und so das obere Ende des Oberschenkels in die Höhe ziehen. Tritt der gefürchtete Uebelstand aber ein, so ist dies kein Grund, von den Repositionsversuchen abzustehen; man müsste nur suchen, den Schenkelkopf erst zur *Fossa iliaca externa* wieder hinauf zu bringen, um ihn von da unter den bereits angegebenen Vorsichtsmaassregeln in die Pfanne zu führen. Das Hinaufbringen des Kopfes, oder vielmehr die Reduction der Luxation nach Hinten und Unten erfordert im Wesentlichen dieselbe Repositionsmethode, wie die vorhin beschriebene, nur muss man, da der Schenkelkopf gegen den hinter der Pfanne liegenden Vorsprung aufsteigen soll, das untere Ende des Schenkels während der Abduction und Rotation stark nach Unten drängen. „Auch hierbei,“ lehrt Cooper, „kann der Coaptations-Riemen von Nutzen sein, indem er, den Schenkelkopf nach Oben drängend, ihn in die Pfanne hineingleiten oder sich wälzen lässt.“

Zur Reposition der *Luxatio infrapubica* bedarf es einer geringeren Extension, wogegen, sobald der Kopf gelöst ist, der Coaptations-Riemen eine grössere Wirksamkeit entfalten muss. Denn während die Gehülften, nachdem sie von Innen nach Aussen gezogen haben, die Rotation ausführen, muss der Chirurg mit dem Coaptations-Riemen oder mit seiner Hand den Schenkelkopf zur Pfanne führen.

Um die *Luxatio suprapubica* in gestreckter Stellung zu reponiren, empfiehlt man, den Schenkel nach Hinten zu ziehen, um so den Gelenkkopf direct in die Pfanne hinab zu führen. Roser rät den Zug nach Hinten bis zur Hyperextension zu steigern und dann nach Innen zu rotiren.

W. Busch¹⁾ empfiehlt mit Recht bei allen Verrenkungen nach Vorn die Hyperextension dadurch zu unterstützen, dass man den Fuss des gestreckten Beins von einem Gehülften gegen den gesunden Fuss hin anziehen lässt. Dabei rückt der Schenkelkopf noth-

¹⁾ Beiträge z. Lehre v. d. Luxationen, Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. IV.

wendig nach Aussen, und diese Wirkung wird mächtig verstärkt, wenn man den Coaptations-Riemen anwendet, welcher dann als Hypomochlion für die am Fuss ausgeführte Hebelbewegung dient.

Den sogenannten „Paletta'schen Handgriff“ zur Einrenkung der Luxatio suprapubica beschreibt Paletta selbst (*Exercitat. pathologicae, Mediolani, 1820, pag. 72*) in folgender Weise: „Firmata pelvi pedem a ministro intendi jussi, dum ego extremo femore circa condylus apprehenso aurtisque extensionibus in anteriorem partem genu compuli, et mox auditus est sonus, qui a restituto osse excitabatur.“ Also: Rotation nach Innen während kräftiger Extension des gestreckten Gliedes. Vgl. Zeis, in *J. Deutsch. Klinik, 1857, No. 18.*

B. Die Einrenkung mit gebeugter Haltung ist bereits von Hippokrates angedeutet (vgl. pag. 800). In neuerer Zeit lehrte Pouteau: „Man achte darauf, dass der luxirte Schenkel während des Actes der Extension und Contra-Extension rechtwinklig gegen den Körper gebeugt sei, und dass er, sobald die Extension hinlänglich zu sein scheint, von Innen nach Aussen rotirt werde, da diese Stellung des Schenkels die Muskeln, welche der Extension am meisten Widerstand entgegensetzen¹⁾, möglichst erschlaft und so dem Kranken lebhaftere Schmerzen erspart, den Gelenkkopf aber auch in die günstigste Stellung bringt, um während der Extension in die Pfanne zurückzugehen, so dass bei gedachter Erschlaffung der Schenkelmuskeln eine geringe Extension für die Reposition ausreichend ist.“

Von Laugier²⁾ wird die Reposition mit gebeugter Haltung in folgender Weise beschrieben. „Ein Gehülfe fixirt das Becken des Kranken, indem er, über ihn gebeugt, ihm die Hände auf die vorderen oberen Darmbeinstachel setzt; ein zweiter an die gesunde Seite gestellter Gehülfe verstärkt die schon vorhandene Flexion des Schenkels und extendirt an demselben, indem er einen seiner Vorderarme als Hypomochlion unter die Wade stemmt und mit der anderen Hand auf den unteren Theil des im Kniegelenk gleichfalls gebeugten Unterschenkels drückt. Der Operateur, auf der luxirten Seite, fasst den Trochanter mit der vollen rechten Faust.“

¹⁾ Es handelt sich bei der hier in Rede stehenden Luxatio iliaca um die Erschlaffung nicht bloß der *Mm. ileopsoas* und *rectus*, sondern auch des *Ligamentum superius* (s. *ileo-femorale*, s. *detoides*, s. *Bertini*), welches letztere bei Oberschenkel-Verrenkungen niemals zu zerreißen scheint und durch Chloroform nicht im Geringsten, wohl aber durch die Beugung erschlaft wird. — Auf die Bedeutung dieses Bandes für die Reduction der Verrenkungen haben neuerdings wieder Bigelow in Amerika und Jonathan Hutchinson in London (*Brit. med. Journ. 1871. Decbr.*) besonders hingewiesen.

²⁾ *Oeuvres posthumes de Pouteau. Paris 1783, Tom. II. pag. 226.*

³⁾ *Dictionnaire de médecine en 30 vol. Art. Hanche.*

Fischer (in Cöln) hat das Verdienst, statt der bis dahin höchstens bis zum rechten Winkel gesteigerten Beugung des Oberschenkels die spitzwinklige Beugung desselben eingeführt zu haben¹⁾. In der That vermag ein kräftiger Wundarzt allein, selbst bei Erwachsenen, sicher aber bei Kindern, sobald Ober- und Unterschenkel vollständig gebeugt sind, durch Zug am Oberschenkel und gleich darauf folgende Rotation nach Aussen (bei Verrenkungen nach Aussen) oder nach Innen (bei Verrenkungen nach Innen) die Reduction zu bewirken. Um die Rotation mit gehöriger Kraft ausführen zu können, bedient man sich des Unterschenkels als Hebelarm, eben so wie bei Verrenkungen des Oberarms der Vorderarm diese Rolle zu spielen hat. Man fasst also das gebeugte Bein mit der einen Hand in der Kniekehle, mit der anderen am Fuss, wodurch man alle erforderlichen Bewegungen zu beherrschen im Stande ist. Nöthigen Falls extendirt ein Gehülfe an dem flecirtten Oberschenkel; die Rotation aber, der wichtigste Act, bleibt in den Händen des Wundarztes. Jedenfalls muss hierbei das Becken in derselben Weise, wie bei der Extensionsmethode (pag. 801 u. f.), sicher fixirt werden. Es ist bequemer, den Kranken nicht auf einem Tisch oder einem Bett, sondern auf einer festen Matratze am Boden liegen zu lassen.

Middeldorpf hat dies Verfahren dahin abgeändert, dass er auf die spitzwinklige Beugung zunächst eine starke Abduction und dann erst die Rotation folgen lässt.

Kompl (De violentis femoris luxationibus. Dissert. inaug., Vratislaviae, 1860) beschreibt Middeldorpf's „Methodus mochlica“ in folgender Weise. Der Kranke liegt auf einem mit einer Matratze bedeckten Tisch; ein Gehülfe fixirt das Becken, indem er mit beiden Händen auf die Spinae ant. sup. ossium ilei drückt. Besteht eine Luxation nach Hinten, so fasst man die luxirte Extremität mit einer Hand oberhalb der Knöchel, mit der andern oberhalb des Knies und beugt den Unterschenkel gegen den Oberschenkel. Sodann beugt man den Oberschenkel gegen das Becken allmählig so stark, dass die vordere Fläche des Oberschenkels den Bauch berührt. Nun wird der Oberschenkel so weit abducirt, dass er neben dem Rumpf auf der Matratze zu liegen kommt; hierauf wird das Knie nach Aussen rotirt und, während es beständig die Matratze berührt und im stumpfen Winkel gebeugt ist, im Bogen nach abwärts geführt; endlich wird der Unterschenkel gestreckt und gleichzeitig der Oberschenkel nach Aussen rotirt, wobei der Schenkelkopf mit Geräusch in die Pfanne zurückgleitet. Besteht eine Luxation nach Vorn (infra- oder supra-pubica), so wird dasselbe Verfahren eingeschlagen; nur wird der Oberschenkel, statt nach Aussen, nach Innen rotirt. — Auch bei veralteten Luxationen hat sich dieses Verfahren bewährt.

Eigenthümlich ist das, namentlich für Luxatio ischiadica, von Pitha (l. c. p. 169)

¹⁾ Zeitschr. v. Verein für Heilkunde in Preussen 1845, No. 43. — Reid in New-York scheint diese Methode gleichfalls selbstständig, aber später erfunden zu haben. Vgl. mein Referat in Canstatt's Jahresbericht pro 1856, Bd. IV. pag. 84 u. f.

empfohlene Verfahren von Collin, den Kranken mit dem Bruch auf eine schmale hohe Bank zu legen, so dass die Beine „reitend“ herabhängen und nöthigen Falls an das verrenkte Bein noch ein Gewicht zu binden. Es erinnert allerdings etwas an die alte „Leiter“, Fig. 120, pag. 801.

W. Busch¹⁾ empfiehlt, auf Grund von Experimenten an Leichen und Erfahrungen an Lebenden, welche auch von Anderen bestätigt worden sind, bei der Luxation nach Hinten die Beugung mit Adduction und Auswärtsrollung zu combiniren, wie dies in ähnlicher Weise bereits von Després geschehen war.

Ausser den schon von Pouteau aufgeführten Vorzügen der Beugung ist besonders zu erwägen, dass sie das Hinübertreten des Gelenkkopfes über den Pfannenrand dadurch befördert, dass bei derselben der Trochanter sich an den oberen Rand der Pfanne anstemmt und der Schenkelkopf selbst daher durch Hebelwirkung von dem unteren Pfannenrande desto mehr abgehoben werden muss, je stärker die Beugung ist, im unteren Umfange der Gelenkkapsel aber desto leichter in dieselbe zurückgleiten kann, als sie in den meisten Fällen gerade dort abgerissen ist.

Wahl der Einrenkungs-Methode. Wenn auch fast alle neueren Erfahrungen zu Gunsten der spitzwinkligen Beugung sprechen, so kann es, nach unseren jetzigen Kenntnissen von dem verschiedenen Sitze des Kapselrisses und dessen Bedeutung für die Reduction, doch nicht zulässig erscheinen, die Flexionsmethode deshalb auch ohne weiteres für alle Fälle zu empfehlen. Wir werden vielmehr dahin trachten müssen, dass der Schenkelkopf jedes Mal in eine dem Kapselriss möglichst vollkommen entsprechende Stellung gebracht werde. Diese wird nun freilich für die Mehrzahl der Fälle von Luxation nach Hinten und somit überhaupt für die Mehrzahl der Schenkelverrenkungen die Beugung sein, da die Luxation nach Hinten meist aus einem am unteren Umfange der Kapsel befindlichen Längsriss hervorgeht. Wäre sie aber aus einem Querriss im hinteren Umfange dicht am Pfannenrande entstanden (was, wie wir sahen, sehr selten ist), so würde durch Beugung der Gelenkkopf nach Unten verschoben und von der Stelle des Kapselrisses entfernt werden, während Rotation nach Aussen oder auch Abduction ihn in die Kapsel zurückführen²⁾. Die Flexionsmethode passt anderer Seits für diejenigen Fälle von Luxation nach Vorn, welche aus einem Riss im unteren Umfange der Kapsel hervorgetreten sind (vgl. pag. 794, 2. a. und c.), während die übrigen Verrenkungen nach Vorn (pag. 795, 2. d.) durch

¹⁾ Beitr. zur Lehre von den Luxationen. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. IV.

²⁾ In Betreff der voraussichtlich nicht reducibaren Fälle vgl. pag. 795.

leichte Hebelbewegungen und Rotation nach Innen, oder aber bei weiterer Verschiebung auf den Ramus horizontalis (pag. 790) bald durch Hyperextension und Rotation nach Innen (Roser), bald durch Hyperextension und Adduction (Busch), bald durch Flexion und Abduction (Gellé) leichter reducirt werden. Die Luxation nach Oben wird voraussichtlich durch allmälige Beugung des Oberschenkels bis über den rechten Winkel hinaus mit nachfolgender grader Streckung des Beins am Besten reducirt (Pitha). Bei der Luxation nach Unten kommt es darauf an, ob der Schenkelkopf an der vorderen oder an der hinteren Seite des absteigenden Sitzbein-Astes hinabgeglitten ist. Leider lässt sich dies nur aus der Entstehungsweise (Hyperextension im ersten, Hyperflexion im zweiten Falle) erschliessen. Dieselbe Art der Bewegung, welche zur Luxation führte, muss bei der Reduction gemacht werden, wobei im ersten Falle zunächst eine Luxatio obturatoria, im zweiten eine Lux. ischiadica entsteht, welche man dann in der oben erläuterten Weise reducirt. Dies gelingt aber nicht, wenn man die Richtung verfehlt, z. B. eine Verrenkung nach Unten, welche durch Hyperextension entstanden war, in eine Lux. ischiadica umwandelt. Für zweifelhafte Fälle empfiehlt Pitha die „merotropische Methode“ von Colombat, d. h. das Herumführen des rechtwinklig gebeugten Schenkelbeins im Kreise, wobei der Gelenkkopf auf die richtige Stelle (oder gar in die Pfanne) von selbst hinübergleiten soll.

Dass eine Form der Schenkelverrenkung während der Reductionsversuche in die andere übergeht, ist schon früher (namentlich auch von A. Cooper, vgl. pag. 802) beobachtet worden. Jedoch scheint bei Anwendung der Flexionsmethode diese Möglichkeit besonders nahe zu liegen. So beobachtete Middeldorpf (vgl. pag. 805), dass bei einer 59jährigen Frau die Luxatio suprapubica (die einzige, die er in 10 Jahren unter 10 Schenkelverrenkungen sah) sich in eine L. obturatoria und dann in eine L. ischiadica verwandelte, welche schliesslich durch die Flexionsmethode leicht reponirt wurde. Den Uebergang einer L. obturatoria in eine L. ischiadica hat Rigaud (Clinique chirurgicale de Strasbourg, 1858), denjenigen einer Luxatio iliaca in die L. obturatoria haben Guttenberg (Aerztl. Mitth. aus Baden, 1865, No. 15) und ich selbst (in Gitschin an einem sächsischen Reiter bei einer seit 6 Wochen veralteten Verrenkung) beobachtet. Guttenberg erzielte die Einrenkung „durch Flexion, starke Adduction nebst Hebelwirkung und Einwärtsdrehung, während ein Gebülfe an Garnsträngen den Oberschenkel aufwärts zog.“ Mir gelang die Reduction, nach wiederholten Versuchen, bei denen beide Formen der Verrenkung mit einander abwechselten, durch kräftiges Emporheben des flectirten Schenkels. — Neuerdings habe ich auch den Uebergang einer Luxatio suprapubica in eine obturatoria beobachtet.

Für die Nachbehandlung genügt meist ruhige Lage, in welcher der Verletzte 2—3 Wochen (nöthigen Falls mit zusammengebundenen

Beinen) verbleibt; in schlimmeren Fällen wird ein Gypsverband angelegt, wie bei *Fractura colli femoris*.

Reposition veralteter Luxationen. Wie bei allen Verrenkungen grösserer Gliedmassen, hat man auch bei dieser die Frage erhoben, bis zu welchem Zeitpunkte die Reduction noch versucht werden dürfe. Die grossen Schwierigkeiten einer Beantwortung liegen auf der Hand, wenn man bedenkt, dass die Unmöglichkeit der Reduction nicht bloss von den neuen Verbindungen abhängt, in welche der Schenkelkopf eingetreten ist, sondern auch von den Veränderungen, welche inzwischen das Kapselband und die Pfanne erlitten haben. Sucht man nach Thatsachen, so findet man Repositionen nach zwei Jahren eben so gut, als nach zwei Wochen, und doch dürfte man schwerlich daraus folgern, dass zu allen zwischen diesen beiden Extremen liegenden Zeitpunkten Repositionsversuche gemacht werden müssten, und nur nicht über dieselben hinaus; denn es giebt Fälle, wo nach sechs Monaten Repositionsversuche schon wirklich gefährlich sind¹⁾, während A. Cooper noch nach fünf Jahren (bei einer Verrenkung nach Oben und Aussen) eine Reposition mit glücklichem Erfolge gemacht hat. Wenn genaue Untersuchung (in der Chloroformnarkose) ergibt, dass der Schenkelkopf durch starke Verwachsungen befestigt und die Pfanne schon im Obliterations-Process begriffen ist, dass ferner das luxirte Glied länger als das gesunde und die Constitution des Kranken schwach ist, so ist jeder Reductionsversuch verwerflich. Ist dagegen sowohl durch Bewegungen des Schenkels, als auch durch directe Einwirkung auf den Schenkelkopf eine Beweglichkeit des letzteren deutlich erkennbar, oder gestattet seine Lage wenigstens, diese Beweglichkeit durch einige subcutane Incisionen zu ermöglichen, kann man deutlich erkennen, dass die Pfanne leer, das verrenkte Glied kürzer ist, als das andere und die Constitution des Menschen ungeschwächt, so sind Repositionsversuche noch zulässig. Endlich kommt es nicht immer gerade darauf an, den Schenkelkopf in die Pfanne zurück zu bringen; man kann sich oft begnügen, die Form der Luxation in eine weniger beschwerliche und schmerzhaft umzuwandeln, z. B. die *Luxatio suprapubica* in eine *Luxatio infrapubica*.


Man beginne auch bei veralteten Schenkel-Luxationen stets mit den, dem wahrscheinlichen Sitze des Kapselrisses entsprechenden Me-

¹⁾ Besondere Gefahren scheint die Reduction einer veralteten *Luxatio suprapubica* zu bedingen. In dem von Zeis beschriebenen Falle (vgl. dessen Beobachtungen, Heft I. 1852) erfolgte der Tod plötzlich während des Reductionsversuches. Vgl. auch Roser „zur Revision der Verrenkungslehre“, *Wunderlich's Archiv*, 1857, und Zeis „über den Paletta'schen Handgriff etc.“, *Deutsche Klinik*, 1857. No. 18.

thoden. Sorgfältig überlegte, der Individualität des Falles genau angepasste und oft wiederholte Reductionsversuche leisten viel mehr, als eine plötzlich entwickelte grosse Gewalt. — Mit noch viel grösserer Genauigkeit als nach der Reduction einer frischen Schenkelverrenkung hat man in veralteten Fällen für die Retention zu sorgen.

Zur Erklärung der Anwendung des, nach den vorstehenden Bemerkungen, auf die seltensten Fälle zu beschränkenden Flaschenzuges dient die Beschreibung A. Cooper's, welche sich auf die Luxation nach Hinten bezieht (Fig. 122). Der Kranke wird auf

Fig. 122.



einen Tisch von angemessener Höhe gelagert und ein starker gefütterter Riemen so um die Hüfte gelegt, dass er den luxirten Schenkel umfasst und einer Seits auf das Perineum, anderer Seits auf den Kamm des Darmbeins drückt. Die Enden dieses Riemen werden an der Seite des Tisches sicher befestigt, und zwar in der Richtung des luxirten Schenkels. Durch diese Vorrichtung wird das Becken fixirt, mithin die Contra-Extension ausgeübt. Eine angefeuchtete Leinwandbinde wird um den Schenkel über dem Knie angelegt und darüber eine Art von Knieband, mit Schnallen versehen, an welchem zwei kleine Lederriemen unter einem rechten Winkel befestigt sind. Das Knie wird ein wenig, jedoch nach Cooper nicht rechtwinklig gebeugt und etwas vor das andere Bein gezogen. Dann wird der Flaschenzug einer Seits an den beiden Riemen des Kniegurts, anderer Seits an dem gegenüber in der Wand befestigten eisernen Ringe eingefügt. Während nun der Kranke so gelagert ist, dass Extension und Contra-Extension in der Richtung einer der Achse des luxirten Gliedes entsprechenden Linie gemacht werden, zieht der Chirurg den Flaschenzug an, um den ganzen Apparat zu spannen. Sobald der Kranke über sehr heftige Schmerzen klagt¹⁾, setzt man die Extension ein wenig aus, fährt jedoch wieder fort, bis allmählig die Muskeln nachgeben und der Schenkelkopf in die Nähe der Pfanne kommt. Steht er auf dem Rande der Pfanne, so übergibt der Chirurg den Flaschenzug einem Gehülfen zur Fortsetzung der Extension, während er selbst den Schenkel nach Innen rotirt, wodurch der Schenkelkopf gewöhnlich in die Pfanne einspringt²⁾. — Hiernach lassen sich die für anderweitige Repositionsmethoden erforderlichen Modificationen leicht ermessen.

¹⁾ Dieser Maassstab fällt bei der Anwendung von Chloroform natürlich weg.

²⁾ A. Cooper, On dislocations and fractures in the vicinity of the joints, pag. 39.

2. Verrenkungen der Kniescheibe. Luxationes patellae.

Luxationen der Kniescheibe wurden früher für äusserst selten gehalten, da so erfahrene Männer wie Boyer und Cooper nur einen, Dupuytren nur drei Fälle beobachtet hatten. Malgaigne hat mit vieler Mühe ein halbes Hundert zuverlässiger Beobachtungen sammeln können. Jetzt können wir die Zahl verdreifachen¹⁾.

Die Neigung der Kniescheibe zu Verrenkungen ist wegen ihres innigen Zusammenhanges mit der, sie rings umfassenden Gelenkkapsel und mit dem an ihr inserirten Quadriceps im Allgemeinen sehr gering; sie ist verschieden gross, je nachdem das Bein gebeugt oder gestreckt ist. Im ersteren Falle macht die Kniescheibe, in die durch die beiden Condylen des Oberschenkels gebildete Grube gelagert, nur einen geringen Vorsprung, während sie in der Streckung, auf den Condylen liegend, sehr hervortritt; im ersten Falle liegt sie fest, im zweiten ist sie nach den Seiten beweglich. In beiden Fällen tritt der innere Rand der Kniescheibe stärker hervor, weil er selbst dicker ist als der äussere, und weil der entsprechende Rand des Condylus internus weniger vorspringt als der äussere. Deshalb findet ein von Innen nach Aussen wirkender Stoss mehr Widerstand an der Patella. Aus diesen Verhältnissen erklärt es sich: 1) dass die Verrenkung der Kniescheibe bei gestrecktem Schenkel leichter und 2) dass die Luxation nach Aussen bei Weitem häufiger ist, als die nach Innen (40:6, Malgaigne).

Aetiologie, Mechanismus, Arten. Die Luxation nach Aussen entsteht gewöhnlich, wenn bei schneller Bewegung zu Fuss oder zu Pferde das Knie heftig gegen einen harten eckigen Körper stösst. Dieser Stoss wirft die Kniescheibe, wenn er ihren inneren Rand trifft, nach Aussen und dreht sie ein wenig, so dass der innere Rand sich nach Hinten, der äussere nach Vorn wendet und die vordere Fläche mehr nach Innen, die hintere überknorpelte Fläche mehr nach Aussen sieht. Von den beiden, durch einen von der Basis zur Spitze laufenden Vorsprung gegeneinander abgegrenzten Hälften der hinteren Fläche der Kniescheibe berührt die innere noch die Gelenkfläche des Condylus externus, die äussere überragt ihn und kann durch die Haut hindurch gefühlt werden. Die Verrenkung nach Aussen kann auch durch Muskelzug entstehen. Dafür besteht in gewissem Grade eine physiologische Prädisposition, da die Sehne des Quadriceps und ihre Fortsetzung, das Ligamentum patellae, in einem nach Aussen offenen stumpfen Winkel zusammenstossen. In den

¹⁾ Vgl. Streubel's Referat in Schmidt's Jahrbüchern, 1862. Bd. 115. pag. 60.

Fällen jedoch, in denen die Verrenkung durch Muskelzug entstand, hat immer zugleich eine das Kniegelenk seitlich umbiegende Gewalt eingewirkt, welche voraussetzen lässt, dass jener Winkel im Moment der Verrenkung vorübergehend vergrössert war¹⁾. — Die Luxation nach Innen wird nur durch eine auf den äusseren Rand der Kniescheibe wirkende Gewalt hervorgerufen, welche derselben eine der vorigen entgegengesetzte Abweichung ertheilt; ihr äusserer Rand steht in der Fossa intercondylica, der innere überragt den entsprechenden Condylus, ihre vordere Fläche ist nach Aussen, die überknorpelte hintere Fläche nach Innen gewendet. — Man nennt diese Luxationen unvollkommene; jedoch können selbst diese nur bei starker Zerrung und theilweiser Zerreiſung oder bei sehr grosser Schläffheit der Kniegelenk-Kapsel, welche sich rings herum an den Rand der Kniescheibe inserirt, Statt finden. — Aber es kommt eine noch bedeutendere Drehung der Kniescheibe vor, so dass sie bei halber Achsendrehung, ohne ihre Stelle zu verlassen (*de champ*), sich auf die hohe Kante stellt; in diesem Falle tritt der eine Rand ganz nach Vorn, der andere nach Hinten, und die beiden Flächen wenden sich, die eine nach Aussen, die andere nach Innen. Man hat diese Drehverrenkung mit Unrecht geleugnet; Payen hat sogar 19 Fälle der Art gesammelt²⁾. Allerdings bestand aber fast immer ein hoher Grad von Erschlaffung der fibrösen Gelenkbänder³⁾. Letztere, so wie eine Abflachung der vorspringenden Ränder der Condylen prädisponiren zu Luxationen der Kniescheibe überhaupt ganz besonders. Die Einwärtsstellung der Condylen des Femur und der Tibia (*Genu valgum*, Bd. IV.) begünstigt die Luxation nach Aussen; je mehr beide Knochen in einem, nach Aussen offenen, stumpfen Winkel zu einander stehen, desto mehr muss die Kniescheibe, wenn sie gerade nach Oben gezogen wird, aus der schiefgestellten Gelenk-Rinne, in welcher sie eigentlich auf- und absteigen soll, sich nach Aussen entfernen. — Bei solchem Verhalten der Bänder und Knochen sind die vollkommenen Verrenkungen der Kniescheibe, d. h. diejenigen, bei

¹⁾ So z. B. in den Fällen von Foucart und von Grasnik, über welche Streubel l. c. berichtet.

²⁾ Vgl. Canstatt's Jahresbericht pro 1856, Bd. IV. pag. 87 u. f., ferner pro 1862, Bd. IV. pag. 343.

³⁾ So heisst es in der Gazette médicale, 1831, pag. 206, die Patientin habe durch Umdrehen im Bette sich eine vollkommene Verrenkung der Kniescheibe zugezogen. Eine solche Dislocation nach solcher Ursache setzt ein abnormes Verhalten sowohl der Knochen als auch der Bänder des Kniegelenks nothwendig voraus. — In allen zu meiner Kenntniss gekommenen Fällen hatten *Genu valgum*, schloſſe Gelenkbänder, Hydrops des Kniegelenks schon vor der Luxation bestanden.

denen ihre überknorpelte Fläche auf der Tuberosität eines der Condylen des Oberschenkels steht, begreiflich, auch ohne dass grosse Zerreibungen Statt finden. — Endlich kann, als eine weitere Steigerung der oben erwähnten *Luxation de champ* auch eine Luxation der Kniescheibe mit vollkommener Achsüdrehung derselben (*par renversement*), zu Stande kommen, so dass ihre vordere Fläche nach Hinten und die hintere nach Vorn gerichtet ist, — freilich nur unter Voraussetzung einer besonders starken Entwicklung der eben aufgeführten prädisponirenden Momente¹⁾.

Die sogen. Luxationen nach Oben und nach Unten sind nur Symptome der Zerreibung des *Ligamentum patellae* oder des *Tendo extensorius communis*. Jedoch kann, wie der von Pitha (l. c. pag. 266) erzählte Fall zeigt, auch ohne Zerreibung des *Tendo extensorius* eine Luxation der Kniescheibe nach Unten erfolgen, wenn bei Zerreibung der vorderen Kapselwand der *Condylus externus* femoris sammt dem äusseren *Meniscus* über der Kniescheibe hervortreten und dieselbe abwärts drängen. Dabei wird die Zerreibung mindestens eines Seitenbandes vorausgesetzt und die ganze Verletzung gehört mehr zur *Luxatio genui*, als zur *Luxatio patellae*.

Symptome. Die relativ häufigste Form, die unvollkommene Luxation nach Aussen, bietet folgende Symptome dar. Der äussere Rand der Kniescheibe und der innere Rand des *Condylus internus* springen hervor; zwischen beiden zeigt sich die, durch die leere



Fossa intercondylica gebildete Vertiefung (Fig. 123); der nach Aussen abgewichene gespannte *Tendo extensorius*, sowie das *Ligamentum patellae* sind deutlich vernehmbar; das in Streckung befindliche Bein kann nicht gebeugt werden.

Die äusserst seltene Luxation nach Innen bietet dieselben Erscheinungen dar, nur in umgekehrter Richtung: der innere Rand der Kniescheibe und der Rand des *Condylus externus* (Fig. 124) bilden hier die Vorsprünge u. s. f.

Ist die Patella auf die Kante gestellt, so fühlt man nicht nur einen ihrer Ränder viel deutlicher hervorragen, sondern die Ränder der beiden Condylen treten auch noch besonders stark hervor.

¹⁾ Vgl. Streubel's Referat über die Fälle von Wragg und von Castara, in Schmidt's Jahrbüchern, 1856, Bd. 91, pag. 362, — E. Watson in Glasgow med. journal, 1870, Novbr.

Ist die Kniescheibe völlig auf eine Seite gedrängt (complete Seiten-Verrenkung), so fühlt man ebenfalls die Ränder der Condylen und zwischen ihnen eine merkliche Vertiefung, in welche man die Weichtheile hineindrücken kann. Der spitze Vorsprung, welchen das Knie sonst bildet, liegt dann auf der Seite, wo die Kniescheibe sich jetzt befindet und wohin ihr die Sehne der Streckmuskeln und das Ligamentum patellae gefolgt sind.

Gewöhnlich wird angegeben, das Kniegelenk sei auch bei der vollständigen Verrenkung der Kniescheibe gestreckt. Dies ist, wie ich aus eigener Erfahrung versichern kann, nicht für alle Fälle richtig. Auch ergibt es sich bei genauer Betrachtung der anatomischen Verhältnisse gar nicht als nothwendig, dass die Extremität gestreckt stehen sollte; denn mit der Kniescheibe zugleich ist die Strecksehne an die äussere Seite des Condylus externus bei der Verrenkung nach Aussen, oder an die innere Seite des Condylus internus bei der Verrenkung nach Innen getreten; die Streckmuskeln wirken also nicht mehr in ihrer normalen Richtung und folglich auch nicht mehr vollständig als Strecker des Unterschenkels, so dass die Flexoren ein gewisses Uebergewicht erhalten. Vgl. Mittmann, De luxatione patellae, Gryphae, 1850. In diesem Falle konnte die Biegung nur mit erheblicher Gewalt, und unter gleichzeitiger Reposition der Patella überwunden werden.

Prognose. Die unvollkommenen Luxationen der Kniescheibe sind weniger gefährlich als die vollkommenen, weil bei ersteren die Zerreiſung des Kapselbandes meist fehlt. Luxationen durch äussere Gewalt sind schlimmer, als die durch Muskelzug, weil bei jenen bedeutendere Quetschungen und Zerreiſungen zu erwarten sind. Recidive kommen bei letzteren häufiger vor.

Behandlung. Die Grundsätze, nach welchen die Reposition gemacht werden muss, hat schon Valentin (Ende des vorig. Jahrh.) entwickelt. Vor Allem ist Erschlaffung des Tendo extensorius nothwendig; denn in den meisten Fällen liegt das Repositionshinderniss nur in seiner Spannung. Zu diesem Zweck wird (abgesehen von der für solche Fälle besonders werthvollen Chloroform-Betäubung) das völlig extendirte Bein von Gehülfen stark erhoben, um es zugleich im Hüftgelenk zu beugen; der Wundarzt aber sucht, durch Druck auf den vorspringenden Rand der Kniescheibe, dieselbe an ihre Stelle zu schieben. Lässt sich der Rand der Patella nicht fassen, so könnte man auch in der, von Malgaigne für die Daumenluxation vorgeschlagenen Weise einen Pfriem oder einen Doppelhaken (Duplay) in sie einbohren, um sie mit dessen Hülfe zu bewegen. Bei der vollkommenen Luxation der Kniescheibe, wo dieselbe an der Seite eines Condylus steht, so wie bei den Drehverrenkungen kommt die Spannung der eingerissenen und gedrehten Kapsel als Repositionshinderniss hinzu. Im ersteren Falle muss man die Patella Anfangs

von Hinten nach Vorn schieben und erst wenn sie über den Condylus hinweg ist, gegen die Fossa patellaris umwenden. Bei den Drehverrenkungen ist das Niederdrücken des prominirenden Patellar-Bandes das einzig zweckmässige Verfahren. Auch ohne Gehülfen kann ein Chirurg die Reposition der Kniescheibe unternehmen, indem er den kranken Fuss auf seine Schulter legt und so die Hände frei behält, um in der angegebenen Weise auf die Kniescheibe direct einzuwirken.

In Betreff der Ausnahmefälle, in denen die Einrenkung durch Flexion gelingt, vgl. pag. 813 und Southam, Brit. med. Journ. 1872, Dechr.

3. Verrenkungen des Unterschenkels (der Tibia).

Vorkommen. Arten. Die Gelenkflächen, mit denen Femur und Tibia einander berühren, sind so gross und die Gelenkbänder so stark, dass man Verrenkungen zwischen ihnen für unmöglich halten sollte. Dennoch kommen sie vor und zwar nicht blos nach Vorn und Hinten, nach Innen und Aussen, sondern auch durch Drehung um die Längsachse. Die Verrenkungen nach Vorn und nach Hinten können sogar vollkommene sein, so dass die ganze breite Gelenkfläche der Tibia ausser Berührung mit den Condylen des Femur tritt.

Freilich haben manche Autoritäten diese Luxationen gelehrt; Duverney hält die Verrenkung nach Vorn für unmöglich, während Boyer dasselbe von der nach Hinten behauptet. Velpeau (Archives de médecine, 2. Série, 1835) hat aber bereits 21 Beobachtungen vollkommener Verrenkungen gesammelt, darunter acht nach Hinten und dreizehn nach Vorn. Für die, noch von Velpeau gelehnten, complete Seitenluxationen finden sich bei Pitha (l. c. pag. 256 und 258 ff.) Beispiele aufgeführt.

Aetiologie und Mechanismus. Im Allgemeinen werden besonders junge, kräftige Menschen von Luxationen des Kniegelenks betroffen. Flexion oder Extension des Unterschenkels an sich, wenn sie auch auf den höchsten Grad getrieben werden, vermag nie eine solche Luxation zu erzeugen; vielmehr bedarf es hierzu einer bedeutenden äusseren Gewalt. Ein heftiger Stoss oder Schlag, welcher, während die eine Hälfte der unteren Extremität fixirt ist, auf die andere einwirkt¹⁾, ein Sprung oder Fall von bedeutender Höhe (namentlich mit eng aneinandergelegten oder stark gespreizten Beinen), Dorsalflexion im Kniegelenk, oder zwei einander entgegenwirkende Kräfte, welche auf Ober- und Unterschenkel zugleich wirken²⁾, waren die gewöhnliche Veranlassung.

¹⁾ In der Lamotte'schen Beobachtung handelte es sich um einen Mann, welcher verschüttet wurde. Seine Beine waren auseinandergespreizt, „und da die Stelle, auf welcher der linke Oberschenkel lag, höher war, als die unter dem Unterschenkel, so wurde dieser luxirt.“ (Chirurgie de Lamotte, II. pag. 643 u. 644.)

²⁾ In dieser Weise wurde z. B. die von Boyer beobachtete Luxation hervorgerufen. Der davon betroffene Mann drehte das Rad eines Krahnes, und zwar, indem er

Auf die bei destructiver Kniegelenks-Entzündung überaus häufigen „Spontan-Luxationen“ kommen wir bei den Krankheiten des Knies im IV. Band zurück.

Symptome. Bei vollkommenen Luxationen des Unterschenkels ist die Extremität verkürzt — bis zu 12 Centimeter. Die Richtung des Unterschenkels ist weniger abweichend, als man glauben sollte; er ist meist steif und unbeweglich, oft jedoch auch abnorm beweglich, je nach der Ausdehnung, in welcher die Kapsel zerrissen ist. Die Difformität des Knies ist sehr auffallend, in einer nach der Art der Verrenkung verschiedenen Weise.

1. **Luxation nach Vorn¹⁾.** Der Kopf der Tibia springt bedeutend hervor; über ihm sitzt die etwas zur Seite geschobene, ihre subcutane Fläche nach Oben richtende Kniescheibe; das Ligamentum patellae ist über den vorderen Rand des Tibia-Kopfes hinweggespannt. An dem vorderen unteren Ende des Oberschenkels findet sich eine bedeutende Vertiefung, welche durch den *Musc. quadriceps* verdeckt wird. Die Condylen des Femur scheinen wie in die Wade hinabgedrückt, sie treten nach Hinten hervor, spannen die Haut auf's Aeusserste und comprimiren die Gefässe und Nerven der Kniekehle. Zuweilen kann man die Pulsation der nach Hinten verschobenen *Arteria poplitea* fühlen. Die Bewegung der Ferse nach Hinten ist leichter, als die nach Vorn. Häufig findet man eine mehrere Zoll betragende Verkürzung des Beins. Der Unterschenkel hat, von Vorn gesehen, an seiner Länge nicht verloren, dagegen erscheint er von Hinten verkürzt, weil sein oberes Ende durch das untere Ende des Oberschenkels verdeckt wird. Von Vorn hingegen erscheint der Oberschenkel verkürzt. (Fig. 125: Luxation nach Vorn, im Begriff eine vollkommene zu werden.)

Fig. 125.



abwechselnd mit den Füßen auf die Speichen trat, mit welchen dasselbe versehen war. Indem der rechte Fuss ausglitt, blieb der Unterschenkel zwischen zwei Speichen eingeklemmt hängen und wurde durch die nun rückgängige Bewegung des Rades nach Innen getrieben, während das Gewicht des Körpers den Oberschenkel nach Aussen riss. (Boyer, *Maladies chirurgicales*, Tom. IV. pag. 80.)

¹⁾ Vgl. E. Lambelin, de la luxation complète et traumatique du tibia en avant. Thèse. Paris, 1867. — Unter den 29 aufgeführten Fällen von completer Luxation nach Vorn sind 23, in denen die Einrenkung gelang.

Fig. 126.



befindet sich unter den Condylen des Femur, zwischen denen man die Fossa patellaris fühlen kann. Das untere Ende des Unterschenkels ist leichter nach Vorn als nach Hinten zu bringen, und die Verkürzung ist weniger beträchtlich als bei der Luxation nach Vorn.

3. Die seitlichen Luxationen sind fast immer unvollkommen; sie sind im Ganzen noch seltener, als diejenigen nach Vorn und nach

Fig. 127.



Hinten. — Bei der Luxation nach Innen verlässt der innere Condylus der Tibia den inneren Condylus des Oberschenkels und tritt an dessen innerer Seite hervor, während der letztere auf den Condylus externus der Tibia tritt; der Condylus externus des Oberschenkels ragt nach Aussen hervor (Fig. 127). Es sind demnach zwei Gelenkflächen frei geworden: die innere der Tibia, welche nach Innen steht und über sich eine starke Vertiefung lässt, und die äussere des Femur, unter welcher die entsprechende Vertiefung sich befindet. Die Patella steht auf dem Condylus internus tibiae. — Die Luxation nach Aussen (Fig. 128) zeigt dieselben Erscheinungen, nur in umgekehrter Richtung, so dass die Tibia nach Aussen und das Femur nach Innen vorspringt.

Zuweilen macht die Tibia bei der Verrenkung zugleich eine Achsendrehung, so dass sie von einem Condylus femoris abgleitet, während sie auf dem anderen stehen bleibt. So kann z. B. durch eine heftige Umdrehung des Unterschenkels der Condylus externus

tibiae den entsprechenden Condylus des Oberschenkels verlassen und nach Vorn sich drehen, während die inneren Condylen auf einander stehen bleiben. Diese Verrenkungen durch Rotation können in sehr verschiedenem Grade Statt haben. Sehr selten wird die Tibia um ein volles Viertel eines Kreises rotirt.

Dubreuil und Martellière (Recherches sur les luxations du genou par rotation. Archives générales 1853. Oct. et Nov.) beschreiben den von ihnen beobachteten Fall, wie folgt. Eine ältere Frau ging auf der Strasse, während neben ihr ein kleiner Wagen, auf dem eine Leiter lag, durch einen Mann gezogen wurde. Ein durchgehendes Pferd wirft Mann und Wagen in der Weise zur Seite, dass das Ende der Leiter über die Strasse hinfegt, die Frau umwirft, und, indem sie mit dem linken Bein zwischen den Sprossen hängen bleibt, mehrere Schritte weit fortschleudert. Bei der alsbald angestellten Untersuchung fand sich, dass der linke Unterschenkel in vollständiger Extension und dergestalt nach Aussen gedreht war, dass der ganze äussere Fussrand auf dem Bett auflag. Diese Verdrehung glaubte man Anfangs von einer sogleich in die Augen fallenden, mit Wunde complicirten Fractur der beiden Unterschenkelknochen, welche sich in der Mitte des Unterschenkels vorfand, ableiten zu müssen. Allein bei genauerer Untersuchung ergab sich, dass auch das obere Bruch-Ende verdreht war, und dass an dem ungemein geschwellenen Kniegelenk der Condylus internus tibiae nach Vorn, das Capitulum fibulae nach Hinten gerichtet war. Die Kniescheibe fand sich sammt dem unverletzten Ligamentum patellae in einer Furche der Kniegeschwulst an der vorderen äusseren Seite auf dem Condylus externus femoris. Die Knochenvorsprünge des Femur wurden an ihren normalen Stellen gefühlt.

Diagnose. Gleich nach ihrer Entstehung sind Luxationen der Tibia leicht zu erkennen. Sobald Anschwellung eintritt, beginnt auch die Unsicherheit; Verwechslungen mit Fracturen der Gelenk-Enden der Tibia und des Femur kommen dann leicht vor.

In einen solchen Irrthum wäre Velpeau beinahe gerathen, in einem Falle, wo ein schräg von Vorn, Unten und Aussen, nach Hinten, Oben und Innen verlaufender Bruch ein Fragment vom Femur abgesprengt hatte, dessen Höhe Vorn und Aussen nur 7, Hinten und Innen aber 40 Millimeter betrug. Die nach letzterer Richtung (Hinten und Innen) bestehende Dislocation des Fragments erzeugte den Schein einer Luxation der Tibia nach Hinten. Indess klärten die Crepitation, die Leichtigkeit der Reduction und die Wiederkehr der Verkürzung, so oft man mit der Extension nachliess, den Irrthum auf. Vgl. Dictionnaire de médecine en 30 vol.

Prognose. Ein von Cloquet berichteter Fall beweist, dass eine nicht reponirte Luxation des Unterschenkels den Gebrauch des Gliedes zulässt; es wird ankylotisch. Velpeau hat anderer Seits Gangrän fast sämmtlicher Zehen, der Ferse und einzelner Stellen des Unterschenkels danach beobachtet; der Kranke wurde erhalten, konnte

Fig. 128.



aber nur auf Krücken einhergehen und behielt eine furchtbare Difformität. Bei bedeutenderer Compression der Vasa poplitea kann Brand des Unterschenkels folgen. Manche Chirurgen haben deshalb sogar in jeder complicirten Luxation der Tibia eine Indication zur Amputation des Oberschenkels gesehen; Percy z. B. behauptete, jede andere Methode tödte 100 Kranke, bevor einer gerettet würde¹⁾. Dies ist eine Uebertreibung, welche durch zahlreiche Thatsachen widerlegt wird; man hat von 21 derartigen Luxationen 15 erfolgreich reponirt (einige dieser Kranken konnten sogar sehr bald ihr Bein gebrauchen); bei den übrigen 6 wurde die Amputation auch nur durch besondere Complicationen geboten, wie offene Wunde des Gelenkes, Zerreiſung der grossen Gefäſſe (welche aber selbst gewaltigen Einwirkungen meist ausweichen), oder blutige Infiltration von solcher Mächtigkeit, dass Brand zu erwarten war (was auch ohne Verletzung der Art. poplitea der Fall sein kann).

Behandlung. Vor Allem ist schleunige Ausführung der ohnehin gewöhnlich leichten Reposition nothwendig. Der Kranke befindet sich in sitzender oder liegender Stellung. Das Becken wird mit den Händen oder mit einem Riemen (wie bei Luxation des Hüftgelenks) fixirt. Ein Gehülfe zieht am Unterschenkel, mit einer leichten Richtung nach Vorn bei Luxationen nach Hinten²⁾ und etwas nach Hinten bei Luxationen nach Vorn. Sind durch diese Tractionen die Gelenk-Enden einander genähert, so umfasst sie der Chirurg mit beiden Händen und schiebt sie gegen einander. Im Augenblick der Coaptation entsteht ein Geräusch und sogar eine Erschütterung, welche oft nicht bloß dem Kranken, sondern allen Umstehenden wahrnehmbar ist. — Auch bei seitlichen Verrenkungen sind Extension und Contraextension nothwendig; der Wundarzt bewirkt die Coaptation durch directen Druck. Bei Verrenkungen mit Achsendrehung muss man den Unterschenkel, während durch Gehülfen an demselben extendirt wird, in der Richtung drehen, welche jener, in der die Gewalt gewirkt hat, entgegengesetzt ist. — Durch Complicationen kann die Amputation oder doch die Resection³⁾ erforderlich werden.

¹⁾ Bulletin de la Faculté de médecine de Paris, 1817, Tom. V. pag. 408.

²⁾ In dem Fall von Thompson (British med. Journ. 1858, No. 61) gelang die Einrenkung und die Retention der nach Hinten dislocirten Tibia nur in gehengter Stellung des Kniegelenks.

³⁾ Vgl. Dautrelepont, Berl. klin. Wochenschrift, 1866, No. 9 u. f.

Unvollkommene Verrenkung des halbmondförmigen Zwischengelenk-Knorpels.

Unter dieser Benennung beschrieb A. Cooper eine Verschiebung, welche im Innern des Kniegelenks (daher auch als „*Internal derangement*“ schlechtweg bezeichnet), namentlich bei Individuen mit sehr erschlafenen Gelenkbändern, vorkommt. Der innere halbmondförmige Knorpel (Meniscus) soll, nach Cooper, so weit aus seiner Lage treten, dass die Condylus des Femur und der Tibia sich unmittelbar berühren. Diese Luxation tritt schnell, sei es in aufrechter oder liegender Stellung, ein, und zwar in Folge einer Achsendrehung des Unterschenkels. Entsteht die Verschiebung in dem Augenblick, wo Jemand aus der hockenden Stellung sich erhebt, so muss angenommen werden, dass der Unterschenkel ursprünglich (bei der hockenden Stellung) nach Aussen rotirt war, so dass im Moment des Erhebens eine Drehung im Kniegelenk eintrat. Recidive sind durch die geringfügigste Veranlassung möglich. — Ein sofort eintretender lebhafter Schmerz, welcher bei jedem Versuche des Kranken, das Knie zu beugen oder vollständig zu strecken, sich steigert, bei ruhigem Verhalten aber wieder verschwindet, bildet das Hauptsymptom. Schmerz entsteht aber nicht bloß durch den Versuch activer Bewegungen, sondern auch durch passive Bewegungen und durch Druck auf den Meniscus vor dem Ligamentum laterale internum; das übrige Gelenk kann unempfindlich sein. Empfindlichkeit gegen Druck kommt an der angegebenen Stelle auch bei manchen Gelenkentzündungen vor; hier aber fühlt man (mit seltenen Ausnahmen) an der empfindlichen Stelle einen festen unbeweglichen Körper, den verschobenen Meniscus¹⁾.

Nach den Experimenten von Dubreuil und Martellière²⁾ wären die vermeintlichen Verschiebungen der halbmondförmigen Knorpel als unvollständige Dreh-Verrenkungen zu betrachten, wobei der eine Condylus des Femur mit dem entsprechenden Condylus der Tibia in Berührung bleibt. Nach ihren Untersuchungen ist dies immer der Condylus externus. Der Condylus internus tibiae gleitet nach Vorn, so dass der Fuss nach Aussen fällt. Hierbei wird der innere halbmondförmige Knorpel durch den in den hinteren Raum der Gelenkhöhle hinabtretenden Condylus femoris nach Vorn gedrängt. Daher befinde sich das Bein nothwendig in einer leichten Beugung

¹⁾ Vgl. Alix, Effets de la torsion du genou de dedans en dehors. Entorse du genou. Subluxation du tibia par rotation et subluxation du fibrocartilage semi-lunaire interne. Moniteur des sciences médicales etc. 1862. No. 8.

²⁾ Archives générales de médecine, 1852, l. c. — Vgl. auch Poppe, Ueber die Luxation der halbmondförmigen Knorpel im Kniegelenk. Dissert. Leipzig 1862.

und könne vom Kranken nicht gestreckt werden. Alix dagegen glaubt an der Verrenkung des Meniscus festhalten zu dürfen. Man soll es sich so vorstellen, dass der Meniscus nicht ganz aus seinen, allerdings sehr festen Verbindungen gelöst, sondern nur verschoben und gleichsam gestreckt wird, so dass seine Biegung mehr in die Länge gezogen und sein am meisten convexer Theil vor dem inneren Seitenbände hervorgedrängt wird. Zugleich werde der Meniscus gewissermaassen aufgerichtet, so dass seine obere Fläche zur inneren, sein scharfer Rand nach Oben und seine untere Fläche nach Aussen gewandt wird. So erkläre es sich denn auch, dass der Vorsprung, welchen man fühlt, doppelt so hoch ist, als der Rand des Meniscus. Bei Kindern ist er, der geringeren Consistenz wegen, wahrscheinlich gar nicht zu fühlen.

Als die beste Art der Reposition bezeichnen die meisten Autoren eine gewaltsame vollständige Streckung; dagegen empfehlen Londe¹⁾ und Alix eine gewaltsame Beugung. —

Vielleicht hat man zuweilen auch Erscheinungen, welche sogenannten Gelenkmäuse erregen, auf derartige Luxationen bezogen.

4. Verrenkungen des Wadenbeins.

Dislocationen der Fibula sind sehr selten, theils wegen der festen Verbindung derselben mit der Tibia, durch die obere und untere Articulation und das Ligamentum interosseum, theils weil dieser Knochen der Einwirkung äusserer Gewalt wenig Fläche bietet. Natürlich sprechen wir hier aber nicht von der Trennung des unteren Endes des Wadenbeins aus seiner Gelenkverbindung mit der Tibia, welche die Verrenkungen im Fussgelenke begleitet (vgl. pag. 821 u. f.).

Was besonders die Luxationen des Capitulum fibulae betrifft, so müssen sie wohl sehr selten sein, da sie fast nur in Folge einer direct auf das Köpfchen wirkenden Gewalt entstehen können und dieses bekanntlich äusserst wenig Fläche darbietet.

Boyer fand bei einem Individuum, welches sich den Fuss nach Aussen verrenkt hatte, das Wadenbein durch den Astragalus ganz nach Oben gedrängt; dadurch war nicht blos der äussere Knöchel aufwärts geschoben, sondern auch das Capitulum fibulae aus der Gelenkgrube an der Tibia hinaufgedrängt. Meist wird aber eine solche Dislocation des Fusses das Wadenbein eher zerbrechen als luxiren. — Der von Sanson beobachtete Fall könnte auch als Distorsion bezeichnet werden. Ein Wagenrad ging in schräger Richtung über das Gelenk des Wadenbeins. Die Gelenkbänder zerrissen und das Köpfchen gewann eine solche Beweglichkeit, dass man es mit Leichtigkeit nach beiden Seiten aus der Gelenkgrube schieben konnte, wohin es jedoch, sich selbst überlassen, sofort zurückkehrte. „Es ist mehr als wahrscheinlich, dass im Moment des Ueberfahrens das Köpfchen des Wadenbeins vollkommen luxirt war, dass jedoch

¹⁾ Vgl. Canstatt's Jahresbericht pro 1855, Bd. IV. pag. 101.

die Reposition sofort von selbst eintrat, zweifelsohne, weil die an das Wadenbein sich anhaftenden Aponeurosen und Muskeln der luxirenden Bewegung Widerstand leisteten.“ (Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Paris, 1834. T. XI., Luxation.) — In dem Falle Nélaton's (der aber erst nach 39 Tagen zur Beobachtung kam) ging ein Wagenrad schräg über den unteren Theil des Unterschenkels bei einem jungen Manne, so dass der äussere Knöchel gerade nach Hinten verschoben wurde und fast den äusseren Rand der Achillessehne berührte; die äussere Gelenkfläche des Astragalus, welche das Wadenbein verlassen hatte, war in ihrem ganzen Umfange leicht durchzufühlen. Der Fuss hatte jedoch seine gerade Stellung behalten, was Nélaton der Integrität des Ligamentum laterale externum zuschreibt. — Foucher (Gaz. d. hôp. 1866. No. 49) beschreibt eine Luxation des oberen Endes der Fibula mit gleichzeitiger Fractur.

5. Verrenkungen des Fusses, — im Sprunggelenk, — der Fusswurzel vom Unterschenkel, — des Unterschenkels gegen den Fuss, Bruchverrenkungen im Fussgelenk¹⁾.

Arten und Benennungen. Durch die verschiedenen Benennungen dieser Dislocationen sind zahlreiche Missverständnisse entstanden. Für die Einen bestimmte die fehlerhafte Stellung der Unterschenkelknochen den Namen der Luxation, für die Anderen diejenige der Fusswurzel. Wir werden, um jedes Missverständniss zu vermeiden, unserem Principe (pag. 668) getreu, die veränderte Stellung der oberen Gelenkfläche des Talus (Astragalus) als bestimmend für die Benennung der Luxation ansehen, weil dieser Knochen unter den bei der Verrenkung beteiligten am Weitesten vom Schädel entfernt ist. Demnach besteht Luxation nach Innen, wenn der Talus mit seiner oberen Fläche unter den inneren Knöchel ausweicht, nach Hinten, wenn dieselbe nach der Achilles-Sehne hin vorspringt, u. s. f.

Aetiologie. Diese Luxationen entstehen gewöhnlich durch einen Fall, dessen nächste Wirkung eine Erweiterung der Gelenkgrube für den Talus ist; deshalb ist auch in allen, oder doch in fast allen Fällen gleichzeitig Bruch eines Knöchels, meist des äusseren, nicht selten sogar beider vorhanden²⁾. Diese Complication ist meist keine Verschlimmerung, vermindert im Gegentheil oft die

¹⁾ Da Luxationen des Fusses fast immer mit Fracturen der Knöchel verbunden sind, muss auf deren Beschreibung (pag. 504—510) verwiesen werden. — In Betreff der Nomenclatur ist zu beachten, dass von Manchen das Tibiotarsalgelenk „Sprunggelenk“, das Gelenk zwischen Talus und Calcaneus aber schlechtweg „Fussgelenk“ genannt wird. Vgl. Henke, die Luxationen der Fusswurzel, Henle u. Pfeuffer's Zeitschrift, 1858.

²⁾ Die Mémoires de la Société méd. d'émulation de Lyon. 1842. Tom. I. pag. 252, enthalten eine Beobachtung von Keisser, wo bei einer Verrenkung nach Aussen beide Malleolen unversehrt blieben. — Auch Contagne (Gaz. méd. de Lyon, 1865, No. 3) beobachtete einen solchen Fall mit glücklicher Heilung.

Gefahr: indem der Knochenbruch die Wirkung der Gewalt bricht, wird die Erschütterung des Gelenks und die Zerreiſſung der Ligamente geringer; die Seitenbänder können, wenn der Malleolus abbricht, ſogar ganz unversehrt bleiben.

1. Die Luxation nach Innen ist die häufigste, was sich theils daraus erklärt, dass der Sturz am Häufigsten den inneren Fussrand trifft, theils daraus, dass der innere Knöchel weniger tief hinabreichet und dass die Peronaei, während sie den äusseren Fussrand heben, den inneren hinabdrücken. Beim Sturze auf den inneren Rand des Fusses wirkt das Gewicht des Körpers unmittelbar auf einen Theil des Astragalus, von welchem diese Wirkung nur theilweise auf den Calcaneus und die übrigen Fusswurzelknochen abgeleitet werden kann. Daher hat fast die ganze Gewalt die Tendenz, den Astragalus zu dislociren. Die obere Fläche dieses Knochens drängt sich unter dem Malleolus internus hervor und kann, sobald sie die Grenze desselben überschritten hat, nicht wieder an ihren Platz zurückkehren. Eine solche Verschiebung ist jedoch nur möglich, wenn der innere Umfang der Gelenkkapsel sammt den Seitenbändern zerrissen, oder der innere Knöchel zerbrochen ist. Häufig wird auch der Malleolus externus zerschmettert, oder das Wadenbein bricht etwas höher durch einen der bei den Fracturen dieses Knochens angegebenen Mechanismen. Da die obere Fläche des Talus nach Innen gedrängt ist, so bildet dieser Knochen einen Vorsprung unter dem Malleolus internus, der Fussrücken ist nach Innen, die Fusssohle nach Aussen, der innere Rand nach Unten, der äussere nach Oben gewendet; der Fuss ist folglich um seine Längsachse gedreht.

Fig. 129.



Fig. 129: Luxation nach Innen mit gleichzeitigem Bruch des Wadenbeins und Abtrennung der Spitze des Malleolus internus.

2. Die Luxation nach Aussen entsteht gleichfalls durch Umdrehung des Fusses um seine Längsachse, nur in umgekehrter Richtung. Mit dieser Luxation ist entweder Zerreiſſung des drei-

zipflichen Bandes, welches vom Wadenbein ausgeht, oder Bruch wenigstens eines Malleolus verbunden. Ihre Symptome sind: Vorsprung des Astragalus unter dem äusseren Knöchel, Umdrehung des

Fussrückens nach Aussen und der Fusssohle nach Innen, Richtung des äusseren Fussrandes abwärts und des inneren aufwärts.

3. Luxation nach Hinten. Eine, wenn auch noch so starke, Beugung des Fusses (Erhebung der Fussspitze) würde schwerlich eine Luxation nach Hinten hervorrufen können, da der Hals des Astragalus durch seine Berührung mit dem vorderen Rande der Gelenkfläche der Tibia dieser Bewegung bald Schranken setzt. Diese Verrenkung scheint vielmehr immer in Folge eines Sturzes auf eine nach Vorn geneigte Fläche, auf welche die ganze Fusssohle aufstösst, mithin im Moment einer übermässigen Streckung (Plantarflexion) des Fusses, zu entstehen, namentlich wenn dabei ein Fuss allein die Körperlast zu tragen hat, und Ober- und Unterschenkel gestreckt bleiben. Die durch die Tibia gebildete grade Linie steht dann schräg auf dem Talus, und die in dem Gewichte des Körpers liegende Gewalt drängt das Gelenk-Ende der Tibia über die Rolle, welche der Astragalus darstellt, und lässt es gegen die Zehen hin vorstürzen, so dass der Talus nach Hinten zurückbleibt.

Durch diesen, auch durch die von Henke an Leichen angestellten Experimente erwiesenen Mechanismus entstand die einzige Luxation nach Hinten, welche Boyer beobachtet hat. Sanson hat zwei unvollkommene Verrenkungen nach Hinten gesehen, welche beide entstanden waren, indem das Gesäss bei einem Fall auf die hintere Seite des unteren Theils des Unterschenkels aufschlug, während der Fuss so gestreckt war, dass seine Rückenfläche den Boden berührte. Dupuytren und Cooper erwähnen bei den von ihnen beobachteten Luxationen nach Hinten einen Bruch des Wadenbeins (Fig. 130), woraus hervorgeht, dass der Fuss nicht blos gestreckt war, sondern auch nach Innen oder Aussen abwich.

Symptome der Luxation nach Hinten: Verlängerung der Ferse, wobei das untere Ende der Achilles-Sehne nach Hinten gedrängt ist; Verkürzung des Fussrückens, auf welchem das untere Ende der Tibia einen Vorsprung bildet, so dass die Weichtheile davor in eine quere Falte erhoben sind. Ein anderer Vorsprung, vom Talus gebildet, liegt zwischen der Achilles-Sehne und der Tibia; doch ist dieser bei beträchtlicher Anschwellung nicht wahrnehmbar. Der Fuss ist meist unbeweglich, jedoch nicht immer, zumal bei gleichzeitigem Bruch eines Knöchels.

4. Die Luxation nach Vorn kommt äusserst selten vor; unter den zu ihrer Entstehung erforderlichen Bedingungen kommt viel leichter Verrenkung des Talus allein zu Stande oder Luxation „unter dem

Fig. 130.



Talus“, oder noch häufiger ein Bruch quer durch die Malleolen. Auch finden sich überhaupt selten die für Entstehung dieser Luxation erforderlichen Bedingungen, nämlich: übermäßige Dorsalflexion des Fusses (Henke) oder gewaltsame Verschiebung der Unterschenkelknochen nach Hinten, während der Fuss fixirt ist.

Auf letzteren Mechanismus macht B. W. Smith (Dublin quarterly Journal, 1852, Mai) aufmerksam, nachdem er ihn in einem Falle beobachtet. Die Luxation war, 8 Monate bevor Smith den Patienten zu sehen bekam, durch das Auffallen einer 13 Centner schweren Kiste aus einer Höhe von $1\frac{1}{2}$ Fuss auf den stark gebeugten Oberschenkel des Kranken veranlasst worden. Derselbe hatte jene Kiste, welche an einem Strick aus dem unteren Schiffsraum emporgezogen wurde, mit aller Kraft in die gehörige Richtung schieben wollen und dazu das eine Bein mit flectirtem und vorwärts geneigtem Knie angestemmt. Der Fuss glitt, unter der erwähnten Last, plötzlich nach Hinten, wo die Ferse aber einen Widerstand fand, während der Druck, den die Kiste noch ferner ausübte, den Unterschenkel weiter nach Hinten drängte.

Symptome der Luxation nach Vorn. Der Fussrücken ist verlängert, die Sehnen der Zehenstrecker sind vor dem Gelenk durch eine von der oberen Gelenkfläche des Talus gebildete Geschwulst in die Höhe gehoben; die Ferse erscheint auffallend kurz, die Malleolen stehen weiter nach Hinten als der Talus, die Fussspitze ist abwärts gerichtet, der Fuss (bei frischen Verrenkungen) unbeweglich.

Huguier (Gaz. de hôpit. 1855. No. 118) beobachtete eine Verrenkung des Fusses nach Vorn ohne Fractur der Malleolen bei einem Manne, dem der Fuss während der Drehung einer Eisenbahn-Drehscheibe zwischen den Speichen derselben stecken geblieben war, somit in Folge eines directen Zuges. Die Verlängerung des Fussrückens betrug 2 Centim. Der Talus bildete einen deutlichen Vorsprung vor dem unteren Ende der Tibia. Beide Malleolen waren hinter dem Astragalus zu sehen und zu fühlen. Die Fussspitze stand etwas tiefer, aber nicht seitlich abgelenkt. Die Reduction gelang sehr leicht in der Chloroformnarkose, indem man, während die hintere Fläche des Unterschenkels auf einer festen Unterlage sich befand, einen kräftigen Druck auf den Fuss in der Richtung nach Hinten ausübte. Nach einigen Tagen konnte der Kranke schon wieder gehen.

Malgaigne führt nur 5 Fälle an, unter diesen nur einen ohne alle Fractur.

Ich habe einen Fall von Verrenkung des Fusses nach Vorn, ohne irgend welche Fractur beobachtet, jedoch, da der Verletzte (ein 14jähriger Knabe) erst in der 11. Woche nach der durch einen Sprung über einen Graben veranlassten Verrenkung sich in der Klinik einfand und bereits ohne alle Unterstützung zu gehen vermochte, Reductionsversuche nicht mehr gemacht.

Fig. 62 u. 63 auf pag. 495 zeigen neben Bruch beider Malleolen Luxation des Fusses nach Vorn, welche offenbar mit sehr erheblichen Zerstörungen der Weichteile complicirt sein mussten.

5. Als Luxation nach Oben wird die bei den Fracturen der Unterschenkelknochen (pag. 496) erwähnte Verschiebung des Fusses in den Raum zwischen Tibia und Fibula beschrieben. Ohne Bruch der Unterschenkelknochen kann eine solche Dislocation nicht Statt finden.

Complicationen. Prognose. Streng genommen kann man fast jede Luxation des Fusses eine complicirte und daher bedenkliche nennen; denn regelmässig sind zugleich entweder die Unterschenkelknochen gebrochen, oder die Weichtheile in grosser Ausdehnung zerrissen; es ist noch als ein glückliches Ereigniss zu betrachten, wenn nicht ein Knöchel oder der Talus die letzteren zugleich durchbohrt. Alle Gefahren der Gelenkentzündung, namentlich verderbliche Eiterungen, Pyämie, Brand, auch Tetanus hat man, zumal bei gleichzeitiger Durchbohrung der Haut beobachtet. — Die häufigste, aber auch die wenigst üble Complication aller Verrenkungen des Fussgelenkes ist das sehr erhebliche Blutextravasat, welches die das Gelenk umspinnenden Gefässnetze liefern. Zu den selteneren Complicationen gehören gleichzeitige Verrenkungen in der Fusswurzel (*Luxatio sub talo*, vgl. 7).

Die Grade der Luxationen des Fussgelenkes sind sehr verschieden, von der einfachen, mit jedem Bruche eines Knöchels verbundenen Abweichung bis zum völligen Austritt des Talus. Die Prognose richtet sich aber hauptsächlich nach dem Grade der Verschiebung, sowohl in Hinsicht auf primäre Zufälle, als auf die weiteren Folgen; vollkommene Luxationen hinterlassen meist Steifigkeit des Gelenkes, seltener ein Schlottergelenk.

In den meisten Fällen vollkommener seitlicher Luxation des Fusses ist die Reposition ziemlich leicht. Auf mehr Hindernisse trifft man bei manchen unvollkommenen Luxationen, namentlich bei denen nach Vorn und nach Hinten.

Vidal hat entgegengesetzte Erfahrungen gemacht, indem er zwei Luxationen des Fusses nach Hinten mit der grössten Leichtigkeit reponirte, während es schwer war, die Wiederkehr der Dislocation zu verhindern, wegen der Contraction des *Triceps surae*. In beiden Fällen war der innere Knöchel abgebrochen.

Behandlung. Zum Zwecke der Reposition befindet der Kranke sich in liegender Stellung, Unter- und Oberschenkel in starker Beugung; ein kräftiger Gehülfe umfasst das obere Ende des Unterschenkels, der Arzt selbst (oder ein zweiter Gehülfe) ergreift den Fuss und zieht an ihm in der Richtung der Dislocation; fühlt er einen Widerstand überwunden, so sucht er die *Planta pedis* bei der Luxation nach Innen auf die innere, bei der nach Aussen auf die äussere Seite zu führen; bei der Luxation nach Hinten schiebt er den Fuss nach Vorn und umgekehrt, wobei im ersten Fall der Fuss ein wenig gebeugt, im zweiten etwas gestreckt wird. — Zum Behuf der Retention wird der Verband wie für Brüche der Malleolen, nöthigen Falles mit der Dupuytren'schen Modification,

angelegt. Ragt einer der Malleolen oder gar das ganze untere Ende der Tibia aus einer Wunde hervor, so ist ein gefensterter Verband und sorgfältige antiseptische Behandlung zu empfehlen. Lässt bei stark gequetschten Weichtheilen die Schwellung der Gelenkkapsel eine Compression der ersteren bis zur Sistirung des Kreislaufs befürchten, so muss man sogleich die Resection ausführen. Andre Falls wartet man lieber den Eintritt der Eiterung ab, weil die Resection alsdann ein günstigeres Resultat in Betreff der künftigen Brauchbarkeit des Fusses verspricht. Die Amputation ist auf die verzweifeltsten Fälle zu beschränken, wo weder durch die hintere noch durch die vordere Tibialarterie mehr Blutzufuhr zu erwarten ist. Vgl. pag. 501.

6. Verrenkungen des Talus (Astragalus).

Bei den eben abgehandelten Verrenkungen war der Talus aus seiner Verbindung mit dem Unterschenkel luxirt, hatte aber seine Verbindung mit den übrigen Fusswurzel-Knochen behalten. Bei der jetzt zu betrachtenden Luxation ist er nicht blos aus seiner Gelenkgrube am Unterschenkel, sondern auch aus der Ausbuchtung des Kahnbeins und von der oberen Fläche des Fersenbeins abgewichen, so dass der ganze Knochen die normale Stellung verlassen hat.

Man nimmt 5 Arten der Luxation des Talus an, von denen jedoch die drei ersten, sowie die 5. innig zusammenhängen. 1) Nach Vorn. Die obere Gelenkfläche und der Kopf des Knochens bilden auf dem Fussrücken einen Vorsprung. 2) Nach Innen. Der Kopf dringt am inneren Fussrande hervor. 3) Nach Aussen. Der Kopf erscheint am äusseren Fussrande. 4) Nach Hinten, wie es scheint, meist mit gleichzeitigem Bruch des Talus¹⁾. 5) Umdrehung. Der Talus hat eine Achsendrehung (meist um die Querachse) erfahren²⁾.

Die Entstehung der Verrenkungen des Talus setzt entweder einen heftigen Sturz auf den Fuss, oder die Einwirkung einer Gewalt voraus, welche den Rumpf und den Unterschenkel mit grosser Macht nach Hinten drängt, während der Fuss fixirt ist und in solchem Grade gestreckt steht, dass die Längsachse des Unterschenkels mit

¹⁾ Brüche des Talus ohne Verrenkung desselben scheinen äusserst selten zu sein und werden von Verstauchung des Fussgelenks nur dann unterschieden werden, wenn Dislocation besteht, oder, bei unzweifelhafter Unversehrtheit der Unterschenkelknochen, deutliche Crepitation vernommen wird. Eine erhebliche Dislocation findet sich nur beim Abbrechen des Kopfes des Talus, welches nicht blos durch directe Gewalt, sondern auch durch übermässige Rotation des Fusses zu Stande kommen kann.

²⁾ Rognetta's Luxation en sens dessus dessous.

der Längsachse des Fussrückens fast in derselben Linie liegt. Man findet diese Luxation namentlich nach einem Sturze von bedeutender Höhe, seltener nach dem Aufschlagen sehr schwerer Körper auf den Fuss, zuweilen, wenn der Fuss zwischen zwei Speichen eines sich bewegenden Rades oder bei einem Falle von der Treppe zwischen zwei Stäbe des Geländers geräth, oder wenn er beim Sturz vom Pferde im Steigbügel hängen bleibt.

Wir erläutern nachstehend die Entstehungsweise der Verrenkung nach Vorn; bei der viel selteneren Verrenkung nach Hinten verhält sich Alles umgekehrt.

Bei übermässiger Streckung des Fusses (Senkung der Fussspitze) zerreißt das Ligamentum anterius und lässt die Gelenkfläche des Talus nach Vorn über den entsprechenden Rand der Tibia hinweggleiten; dadurch stösst der äussere Knöchel auf das Fersenbein, zerbricht und erleichtert dadurch noch den Austritt des Talus nach Vorn; endlich wird der Talus durch den vom hinteren Rande der Tibia auf seinen hinteren Rand ausgeübten Druck stark nach Vorn und zugleich von Unten nach Oben getrieben, so dass dadurch sein Kopf in die Höhe gedrängt wird, das Ligamentum talo-naviculare zerreißt und aus der Gelenkhöhle des Kahnbeins austritt. So entsteht die Luxation nach Vorn, deren Bestehen eine nothwendige Bedingung für die Entstehung der Seiten-Luxationen und der gänzlichen Umdrehung des Talus ist.

Sobald nämlich der Talus vor die Gelenkhöhle des Unterschenkels getrieben ist, ändert der von letzterem gebildete Hebel seine Richtung und wirkt schräg nach Aussen oder nach Innen, so dass der luxirte Knochen nochmals nach einer dieser Richtungen ausweicht, und sein Kopf also auf einer oder der anderen Seite des Fusses hervortritt. Man kann sich einen Begriff von der Grösse der einwirkenden Gewalt machen, wenn man bedenkt, dass die Unterschenkelknochen dem Talus sogar eine Drehung ertheilen können, so zwar, dass er entweder um die Querachse, seine obere Fläche also nach Unten oder (viel seltener) um die verticale Achse, sein hinterer Rand also nach Aussen¹⁾ gedreht wird. Wenn nämlich die Tibia als Hebel den Astragalus nach Vorn treibt, so erhebt sich der Kopf dieses Knochens, indem er die Haut vor sich spannt. Die Weichtheile aber, namentlich die Sehnen, widerstehen durch ihre eigenthümliche Elasticität in der Art, dass, während der Kopf des Talus emporsteigt, sein Körper nach Vorn getrieben wird. Der Widerstand wird desto stärker,

¹⁾ Vgl. Foucher, Sur une variété de luxation de l'astragale. *Revue méd.-chirurg.* Avril, 1855.

je weiter gegen die Zehen der Talus verdrängt wird; dadurch wird sein aufwärts gerichteter Kopf endlich rückwärts geschoben, und so ist es möglich, dass der ganze Knochen umgekehrt werden kann.

Aus der eben gegebenen Beschreibung geht hervor, dass die complete Luxationen des Talus im engsten Zusammenhange mit den früher beschriebenen Luxationen des ganzen Fusses stehen, — eigentlich als Complicationen derselben anzusehen sind. Eine complete Luxation des Talus kann nicht bestehen, ohne dass die Unterschenkelknochen abwärts (bei der gewöhnlichen Form, der Verrenkung nach Vorn, — auf das Fersenbein) rücken. Es giebt aber auch in complete Luxationen des Talus, bei denen nur ein Theil seiner Gelenkfläche, oder ein Theil des Kopfes nach Oben oder seitlich am Fusse hervortritt. Bei diesen wird die Stellung der Unterschenkelknochen zum übrigen Fuss wenig geändert.

Symptome. Bei den Verrenkungen nach Vorn bildet der Kopf des Talus, auf dem Kahnbein oder einem der keilförmigen Beine stehend, eine harte Geschwulst, welche den Fussrücken emporwölbt. Bei seitlichen Luxationen erscheint eine solche Geschwulst vor einem der Knöchel, je nachdem die Luxation eine äussere oder innere ist. Bei der äusseren ist ein wenig hinter der Geschwulst Crepitation fühlbar, welche von dem zerbrochenen Wadenbein-Knöchel herrührt. Gewöhnlich findet man beträchtliche Sugillationen auf dem Fussrücken mit oder ohne gleichzeitige Zerreiſung der Integumente; manchmal sind sämmtliche, den vorderen Theil des Talus bedeckende Weichtheile zerrissen, und ein Theil desselben tritt nach Aussen hervor. — Der dislocirte Talus kann in seiner abnormen Stellung fest eingeklemt werden, bis zu dem Grade, dass die Reduction unmöglich wird oder nur durch gefährliche Eingriffe bewirkt werden kann. So hat man z. B. den Kopf oder eigentlich den Hals in der Aushöhlung zwischen Kahn- und Fersenbein gefunden. Dupuytren fand den hinteren Rand der oberen Gelenkfläche des Talus an die Gelenkfläche des Schienbeins fest angestemmt. In anderen Fällen wird der nach Aussen gedrehte Hals durch den äusseren Rand der oberen Gelenkfläche des Fersenbeins festgehalten.

Fig. 131 giebt ein Bild der bei einer Luxation des Talus nach Aussen (mit Bruch des Malleolus internus) eintretenden Formveränderungen des Fusses. In diesem Falle war die Reposition unmöglich. Die Extension wurde sofort nach der Entstehung durch fünf Personen wiederholt vergeblich versucht. Die übertriebenen Repositionsversuche riefen eine Ulceration hervor, welche erst nach langer Zeit heilte. Sowohl im Knöchelgelenk (Geschwulst α), als auch zwischen dem luxirten Talus (Geschwulst näher an den Zehen) und den übrigen Fusswurzelknochen blieb eine geringe Beweglichkeit zurück. Vgl. A. Cooper, On dislocations and fractures etc. pag. 322.

Für die besonders seltene und, wie es scheint, immer mit Bruch des Talus complicirte Verrenkung nach Hinten giebt nachstehende Beobachtung von Williams (Monthly Journal of med. 1855. Mai) ein Beispiel. Der Talus war, in Folge gewaltsamen Umknickens und Rotirens des Fusses bei einer Verschiütung, nach Hinten und einwärts verrenkt. Von Vorn gesehen erschien der Fuss ein wenig kürzer; die Zehen waren vollkommen beweglich, Bewegungen im Fussgelenk möglich, aber schmerzhaft. Der Talus ragte als ein harter, unregelmässiger Körper zwischen der Tibia, der Achillessehne und dem Fersenbeine hervor. Ein Reductionsversuch wurde nicht gemacht. Es entstand heftige Eiterung und am 14. Tage wurde der Astragalus nach Ablösung einiger ligamentöser Befestigungen ausgezogen, wobei sich zeigte, dass er zugleich zerbrochen war. Das Fussgelenk wurde wieder ziemlich beweglich. 10 Monate später kam der Mann mit einem ausgeprägten Pferdefuss wieder. Diese Deformität wurde mittelst Durchschneidung der Achillessehne geheilt.

Fig. 131.



Die **Prognose** ist immer bedenklich und wird durch gleichzeitige Verletzungen der benachbarten Weichtheile erheblich verschlechtert. Die Reposition ist oft schwierig; gelingt sie nicht, so zieht diese Luxation nicht bloß alle übeln Folgen schwerer Gelenks-Contusionen nach sich, sondern hinterläßt auch oft eine Difformität, durch welche der Gang sehr behindert, oder doch schmerzhaft wird.

Behandlung. Die Reposition muss möglichst früh ausgeführt werden. Dabei verfährt man, nach Rognetta, in folgender Weise. Hüft- und Kniegelenk werden gebeugt, um die Muskeln des Unterschenkels zu erschaffen. Diese doppelte Flexion kann durch einen Verband erhalten werden, indem man ein zusammengelegtes Bettuch unterhalb der Wadengegend um das Schienbein legt und mit den beiden Enden durch einen an der Mauer befestigten eisernen Ring zieht (Dupuytren); aber es genügen auch die Hände zweier Gehülfen, welche, an dem Bette des Kranken stehend, das Knie möglichst emporhalten. Andere Gehülfen umfassen den unteren Theil des Unterschenkels oberhalb der Knöchel Behufs der Contra-Extension, welche übrigens auch durch ein als Binde zusammengelegtes und oberhalb der Knöchel befestigtes Tuch ausgeführt werden kann, dessen beide Enden von den Seiten her nach Hinten gezogen werden. Die Extension muss auf das Fersenbein und den Mittelfuss wirken, zu welchem Zweck ein zusammengelegtes Tuch von der Ferse aus auf den Fussrücken geführt wird, woselbst man die Enden kreuzt und

mit einer Binde befestigt; an diesen Enden werden Gehülfen zum Ziehen angestellt. Bei dieser Kreuzung der Extensjons-Binde ist aber darauf zu sehen, dass sie nicht auf die von dem luxirten Talus gebildete Geschwulst gelegt werde, welche ganz frei bleiben muss. Ist der Talus nicht eingekeilt, so reicht für die Extension ein Gehülfe aus, der den Fuss mit der einen Hand hinter der Ferse, mit der anderen vorn auf dem Tarsus und Metatarsus ergreift. Immer muss die Extension allmählig, ungefähr in der Art wie beim Ausziehen der Stiefeln wirken und lange fortgesetzt werden. Um die Coaptation auszuführen, umfasst der Chirurg den luxirten Fuss mit beiden Händen, so dass die Daumen vor die vom Talus gebildete Geschwulst, die übrigen Finger unter die Fusssohle zu liegen kommen. Auf diese Weise sucht er während der von den Gehülfen ausgeführten Extension den Talus an seinen Platz zu drücken. Wenn diese Art der Reposition erfolglos bleibt, so setzt der Chirurg bei fortgesetzter Extension die Fläche seiner Handwurzel auf die Geschwulst und drückt mit aller Kraft den Talus zurück. Noch kräftiger wirkt man mit dem Knie. Der Kranke wird zu diesem Behuf auf den Fussboden gelegt, Extension und Contra-Extension in obiger Weise ausgeführt; der Chirurg umfasst mit der einen Hand die Zehen, mit der anderen den unteren Theil des Unterschenkels, setzt nun sein Knie auf den luxirten Talus und drückt ihn an seine Stelle (Petroniti). — Bei seitlichen Verrenkungen müssen alle Repositions-Bestrebungen dahin gehen, dieselben in eine vordere zu verwandeln, welche letztere sich viel leichter reponiren lässt. Dies ist einleuchtend, wenn man bedenkt, dass alle seitlichen Luxationen des Talus secundäre Formen der Luxation nach Vorn sind ¹⁾).

Die bereits (pag. 827 u. f.) erwähnten Complicationen können die Amputation oder die Exstirpation des Talus nothwendig machen. Die Amputation wird im Allgemeinen verworfen, — von einigen Aerzten sogar in solchen Fällen, wo andere Fusswurzelknochen mit dem Talus zugleich entblösst sind, wo bedeutende Zerreißung der Sehnen und selbst da, wo brandige Stellen am Fuss bereits bestehen ²⁾. Man wird nur in solchen Fällen amputiren, wo sonst das Leben direct gefährdet wäre; auch wird man statt der gewöhnlichen Amputation des Unterschenkels die Pirogoff'sche oder bei Zertrümmerung des Calcaneus die Syme'sche Operation wählen (vgl. Bd. IV.),

Dagegen fragt es sich, ob nicht auch in den weniger schlimmen

¹⁾ Rognetta, Archives de médecine, 2. Série, Paris 1833, Tom. III. pag. 485.

²⁾ Vgl. Bérard, im Dictionn. en trente volumes, nouv. édit. Tom. XIV. pag. 471.

Fällen, wenn die Reposition nämlich zwar nicht gelingt, der Knochen aber auch nicht gänzlich aus seinen Verbindungen gelöst und namentlich nicht durch eine Wunde blossgelegt ist, -- die Exstirpation des Talus sofort angezeigt ist, oder ob man besser thut, expectativ zu verfahren. Obgleich nach dieser Operation der Fuss einen hohen Grad von Brauchbarkeit wieder erlangt, so ist, nach den vorliegenden Erfahrungen, doch die expectative Behandlung zu bevorzugen, da sich gezeigt hat, dass der Talus unter solchen Verhältnissen an seiner abnormen Stelle liegen bleiben kann, ohne die Function des Gliedes wesentlich zu stören, und dass er anderen Falls nachträglich mit viel geringerer Gefahr extirpirt wird, als unmittelbar nach der Verletzung. Wenn aber bei penetrirenden Wunden, bei Zerreißung von Bändern und Sehnen die Schwierigkeiten der Reposition augenfällig und überdies die Verbindungen des Talus so zerstört sind, dass er nur noch als fremder Körper zu betrachten ist; dann ist die Exstirpation sofort vorzunehmen, denn unter solchen Verhältnissen vereinfacht sie die Verletzung.

Broca hat in dieser Beziehung lehrreiche Untersuchungen angestellt (Gaz. des hôpit. 1852, Canstatt's Jahresbericht pro 1852, Bd. IV. pag. 75). Unter 68 Fällen von Verrenkung des Astragalus mit Wunde fand er nur 12, in denen die Reduction gelang. Daher sollte man auf die von Desault empfohlene Eröffnung des Gelenkes, um direct auf den luxirten Talus einwirken zu können, von vorn herein kein Gewicht legen. Dieselbe ist übrigens nur 2 Mal (mit Glück) ausgeführt worden; denn der „französische Wundarzt Landrin“, welchem Letenneur einen dritten Fall der Art zuschreibt (Revue méd.-chir., 1852, Juli) steht zu der Sache nur in passivem Verhältniss; er war nicht Wundarzt, sondern Postillon und zwar derjenige, an welchem Desault jene Operation ausführte. Die Eröffnung des Gelenkes mit nachfolgender Exstirpation des Talus (nach Dupuytren) ist auch nur 2 Mal ausgeführt worden, ohne dass schon eine Wunde bestand, und der Eine der Operirten starb (Fall von Norris). Nach Abzug dieser 4 sogleich operativ behandelten Fälle bleiben, nach Broca, noch 57 Beobachtungen von Verrenkung des Talus ohne Verletzung der Haut übrig; darunter 2 Fälle mit schnell folgendem Tode, 2 in denen amputirt werden musste, 30 in denen nachträglich wegen Heftigkeit der Entzündung oder Brand die Exstirpation nothwendig wurde (alle bis auf 1 mit glücklichem Erfolge, während unter 36 Kranken, bei denen die Exstirpation wegen einer bestehenden Wunde sogleich gemacht wurde, 9 starben); in 23 Fällen endlich traten gar keine üblen Erscheinungen hinzu, die Kranken behielten ein deformes Bein, aber sie konnten damit gehen. Nach diesen Resultaten einer Zusammenstellung von 130 Beobachtungen empfiehlt Broca bei allen irreponiblen Luxationen des Talus ein expectatives Verfahren, da die Exstirpation, wenn sie nothwendig werde, bei nachträglicher Ausführung eine bessere Prognose darbiete, als in der ersten Zeit nach der Verletzung. Gegen die Beweisführung von Broca wäre jedoch einzuwenden, dass er die Fälle von Verrenkung ohne und mit Wunde ohne Weiteres in Parallele stellt, während doch letztere an und für sich, weil sie die Einwirkung einer bedeutenderen Gewalt voraussetzen, eine schlechtere Prognose darbieten.

Barral hat in seiner Thèse, sur les luxations de l'astragale, Montpellier, 1868, die Arbeit Broca's durch Hinzunahme der neueren Fälle wesentlich ergänzt.

Als Beispiel, wie die Verbindungen des Unterschenkels mit dem Fusse nach Extirpation des Talus sich wieder herstellen, diene folgende Beobachtung. Eine Frau fiel 10 Fuss hoch herab und verrenkte den Talus nach Innen, ohne Bruch der Tibia oder Fibula. Thierry nahm den Körper des Talus (Fig. 132 b) weg, liess

Fig. 132.



aber Kopf und Hals dieses Knochens zurück. Die Tibia senkte sich auf den Fuss hinab, füllte den ehemals vom Körper des Talus eingenommenen Raum aus, und die Functionen des Fusses stellten sich wieder her. Aber ein Allgemeinleiden führte bei der 60 Jahre alten Kranken den Tod herbei. — Das Resultat der anatomischen Untersuchung soll an Fig. 132 erläutert werden. Diese Ansicht ist mittelst eines Sägeschnittes gewonnen, welcher zwischen dem ersten und zweiten Mittelfussknochen durch das Os cuneiforme II, das Os naviculare, das zurückgebliebene Stück des Talus, den Processus lateralis calcanei und die untere Portion der Tibia hindurchging. Die rauhe Gelenkfläche der Tibia ruht auf der abgesägten Fläche des Talus, mit welcher sie durch Bindegewebs-Stränge verbunden war. Die beiden Oberflächen haben sich genau eine nach der andern geformt. Die Höhe des zurückgebliebenen Stückes vom Talus beträgt nach Hinten 20, nach Vorn 8 Millimeter, so dass die Fussspitze ein wenig gehoben ist. Die Länge des Fusses ist unverändert. Vorder- und Hintertheil des Fusses haben sich nicht wesentlich verändert, aber die Knöchel stehen 20 Millimeter tiefer. Es war demnach der Unterschenkel gerade auf den Fuss herabgesunken und hatte sich dort sehr symmetrisch festgestellt. (Aus einer Abhandlung Thierry's, in L'expérience, 1840, T. VI. pag. 17.)

A. Cooper (l. c. pag. 323) beobachtete eine Luxation des Talus nach Innen mit Bruch der Fibula (in Folge eines Sturzes vom Pferde) deren Reposition nicht möglich war, und bei welcher die Ausstossung des Knochens spontan erfolgte. A. Cooper sah den Kranken am Tage nach der Verletzung. Eine Wundarzt hatte die Reposition sofort versucht. Der Talus spannte die Haut in dem Maasse, dass eine seichte Incision ihn entblöst hätte, und da die Reposition unmöglich war, so

dachte man Anfangs an die sofortige Exstirpation. Cooper machte darauf aufmerksam, dass die den Knochen bedeckende Haut wahrscheinlich von selbst ulceriren würde, wodurch alsdann die Exstirpation gerechtfertigt wäre. Die Ulceration trat am 16. August auf der Spitze des Talus ein und hatte sich bis zum 20. so ausgedehnt, dass der Talus blosslag. Am 25. Octbr. fand Cooper den Knochen vollkommen frei liegend (Fig. 133), so dass es nur noch der Trennung weniger ligamentöser Fasern bedurfte, um ihn mit der Kornzange fortzunehmen. Im December erfolgte noch etwas Exfoliation, aber am Ende dieses Monats konnte der Kranke schon gehen. Im Octbr. des folgenden Jahres war schon Beweglichkeit im Gelenk wiedergekehrt. — Vgl. auch die neueren Fälle von Argento (Gaz. clin. d. Palermo 1871. No. 10) und von Guéniot (Gaz. des hôp. 1871. No. 94).

Fig. 133.



7. Verrenkungen des Fersenbeins, Verrenkungen zwischen dem Talus und dem übrigen Fuss, Luxationes sub talo¹⁾.

Bei der Verrenkung des Calcaneus ist das Wesentliche die Abweichung der oberen Fläche des Calcaneus von der unteren Fläche des Astragalus. Dabei kann zugleich eine Abweichung des Calcaneus vom Os cuboideum und Os naviculare Statt finden; oder letztere bleiben mit dem Calcaneus in ihrer normalen Verbindung. Broca bezeichnet beide Fälle als „*Luxation sous-astragalienne*“, ersteren als partielle, letzteren als totale.

1) Die Verrenkung des Calcaneus allein (*Luxatio sub talo partialis*) erscheint bei Betrachtung der anatomischen Verhältnisse unmöglich. Was man bis auf Paré so genannt hat, sind auch wohl Verrenkungen des ganzen Fusses gewesen; denn Broca fand (1853) überhaupt nur drei Fälle von Verrenkung des Calcaneus beschrieben, — und keiner dieser Fälle hat volle Beweiskraft.

Der eine wird nur im Vorübergehen von Chelius erwähnt, der zweite, von Rognetta beschrieben, ermangelt der anatomischen Untersuchung, in dem dritten

¹⁾ Diese seltene Dislocation ist zuerst von Rognetta (Archives générales, 1833) ausführlich beschrieben worden. Genauere Untersuchungen verdanken wir Broca (Archives génér. de méd., 1853) und, namentlich in experimenteller Beziehung, Henke (die Luxationen der Fusswurzel, Henke und Pfeufer's Zeitschrift f. rat. Med., 1858). — Vgl. auch Mac Cormac in St. Thomas Hospit. reports, Neue Serie, Vol. III.

(von Hancock) handelt es sich um ein getrocknetes Präparat, über welches alle weiteren Notizen fehlen.

2) Die Verrenkung des übrigen Fusses sammt dem Calcaneus vom Talus, *Luxatio sub talo totalis*, nach Broca, *Luxation des Fussgelenks*, nach Henke, ist nicht so selten, aber vor Broca nicht gehörig beschrieben, meist als „*Luxatio tali*“ aufgeführt.

a) *Luxation nach Hinten*, mit voller Bestimmtheit von Dubliner Chirurgen an einem berühmten Patienten (Prof. Carmichael) beobachtet. Die Ferse sprang stärker nach Hinten hervor, der Fussrücken war verkürzt, der Talus ruhte auf der Rückenseite des Kahnbeines und der beiden keilförmigen Beine; sein Kopf bildete hier eine leicht zu erkennende, rundliche, knochenharte Geschwulst.

Die Gewalt, durch welche eine solche *Luxation* entstehen soll, muss die hinteren Ränder der Gelenkflächen des Talus und Calcaneus mächtig gegen einander pressen, ohne eine seitliche Abweichung zu gestatten.

b) *Seitliche Verrenkung*, viel häufiger, entsteht nach Aussen, bei übermässiger *Abduction* des Fusses, nach Innen bei übermässiger *Adduction*. Die gewöhnliche Veranlassung ist ein Fall auf die Füsse; es kann aber auch directe Gewalt die Verrenkung herbeiführen. Das Ligam. talo-calcaneum interosseum zerreisst hierbei immer, bei der *Luxation* nach Aussen auch noch das Ligam. fibulare calcanei, bei derjenigen nach Innen der zum Calcaneus hinabsteigende Theil des Ligam. laterale internum, oft beide zugleich. Häufig kommen auch Zerreibungen der Gefässe, Nerven, Sehnen und der Haut vor. Bei der Verrenkung nach Innen hat der Fuss einige Aehnlichkeit mit einem *Pes varus*. Der Kopf des Talus springt nach Aussen hervor; wenn eine Wunde zugleich besteht, so findet sie sich stets an dieser Stelle. Bei der relativ häufigeren Verrenkung nach Aussen ragt der Talus an der inneren Seite hervor; sein Kopf ist eingeschnürt zwischen der Sehne des *Tibialis posticus* und dem Ligam. calcaneo-naviculare plantare, so dass die *Tenotomie* zu seiner Befreiung nothwendig werden kann. Besteht eine Wunde, so liegt sie meist unter und vor dem inneren Knöchel. Oft ist die *Art. tibialis postica* zerissen. Der Fuss steht in *Abduction* oder ganz quer, der innere Fussrand berührt den Boden, der äussere ist stark erhoben.

Bei jeder *Luxatio sub talo* sind die Verhältnisse des Talus zu den Knöcheln durchaus die normalen. Hierauf stützt sich wesentlich die Diagnose. Es kommt aber auch *Complication* mit Verrenkung im Sprunggelenk vor (*Luxation de l'astragale double*), namentlich in

der Art, dass die Luxatio pedis nach Vorn, die Luxatio sub talo seitlich erfolgt (Henke).

Behandlung. Behufs der Reposition werden die Muskeln erschlaft, die Ferse, das Sprungbein und der untere Theil des Unterschenkels fixirt, dann längere Zeit Tractionen am vorderen Theile des Fusses ausgeübt. Zu letzteren bedarf es kräftiger Hände, die mit den vier letzten Fingern die Fusssohle, mit den Daumen den Fussrücken umfassen müssen. Behufs der Coaptation lässt der Chirurg, bei seitlichen Verrenkungen, die Fusswurzel eine Rotationsbewegung nach der, der Dislocation entgegengesetzten Richtung machen. Ist die Luxation nach Oben oder Unten erfolgt, so muss mit der Extension ein directer Druck in entsprechender Richtung verbunden werden. In schwierigen Fällen lässt man die Fussspitze nach Vorn, die Ferse nach Hinten ziehen (Monteggia). Gelingt die Reposition nicht, so muss man zur Verbesserung der Stellung des Fusses frühzeitig Maschinen anwenden, wie sie für die Behandlung der Klumpfüsse gebräuchlich sind (vgl. Bd. IV.). Besteht eine penetrirende Wunde, so empfiehlt Broca die Exstirpation des Talus (vgl. pag. 830 u. f.).

In einem von A. Cooper (On dislocations, pag. 334) angeführten Falle wurde der Unterschenkel an den Oberschenkel gedrückt und dieser im rechten Winkel zum Becken gebeugt; darauf wurde mit einer Hand der Mittelfuss und mit der anderen die dislocirte Ferse ergriffen und beide in der Richtung des Unterschenkels langsam angezogen. Während dessen drückte der behandelnde Chirurg (Cline) mit seinem Knie gegen den dislocirten Knochen, — und alle Theile gingen an ihre gehörige Stelle zurück, so dass der Fuss wieder in seinen normalen Zustand kam. Einen ähnlichen Fall mit eben so leichter Reposition berichtet Green.

8. Verrenkungen der übrigen Fusswurzelknochen.

Luxationen im Chopart'schen Gelenk können seitlich, nach dem Rücken, oder nach der Sohle des Fusses Statt finden. Die seitlichen Abweichungen sind die häufigsten: wenn der vordere Theil des Fusses feststeht und der Körper seitlich oder hintenüber geworfen wird, so weicht die zweite Reihe der Fusswurzelknochen leichter seitlich aus, als nach Oben oder nach Unten. Charakteristisch ist, namentlich im Vergleich zu Verrenkungen im Sprunggelenk, dass Fersen- und Sprungbein in ihrer normalen Verbindung mit und in ihrer normalen Stellung zu den beiden Knöcheln geblieben sind.

Sonstige Verrenkungen der Fusswurzelknochen sind einer Seits selten (viele Fälle zweifelhaft), anderer Seits in diagnostischer und therapeutischer Beziehung so klar, dass wir eine specielle Beschreibung unterlassen. Zur Erläuterung können die in meinem Referat in Canstatt's Jahresbericht Bd. IV. pro 1851 pag. 46 und pro 1857 pag. 80 aufgeführten Fälle dienen.

9. Verrenkungen des Mittelfusses von der Fusswurzel.

Obgleich die Möglichkeit dieser Verrenkungen wegen der Festigkeit und Unbeweglichkeit der Gelenkverbindung und wegen der Stärke der Bänder noch von A. Cooper und von Boyer bezweifelt wurde, sind jetzt doch schon mehr als 30 ganz unzweifelhafte Fälle bekannt¹⁾. Es kommen sowohl Verrenkungen einzelner Metatarsalknochen vor, als auch Dislocationen des ganzen Mittelfusses gegen den Tarsus, und zwar in verschiedenen Richtungen.

Die ersten genaueren Beschreibungen hat Sanson (Dictionnaire de méd. et de chirurgie pratiques, Paris 1834, Art. „Luxation“) nach Beobachtungen von Dupuytren geliefert.

Der 1. Fall betrifft eine Frau, welche, mit einer schweren Last beladen, so vornüber fiel, dass die ganze Last des Körpers auf dem Fusse ruhte; in dem Momente als sie, um dem Falle vorzubeugen, den vorderen Theil des Fusses stützte, trat die Verrenkung ein. Der Unterschenkel stand in Beugung, die Ferse stark gehoben, durch die Contraction der *Musc. gastrocnemii* und *soleni* in dieser Stellung festgehalten; der Fuss konnte nur mit seiner vorderen Hälfte den Boden berühren. — In dem 2. Falle sprang ein 25jähriger Mann trunken in einen 12 Fuss tiefen Graben auf die Fussspitzen; die Luxation betraf beide Füße.

Der von Mazet der anatomischen Gesellschaft in Paris (1837, Oct.) mitgetheilte Fall betraf einen jungen, kräftigen Mann, welchem das Rad eines schwer beladenen Karren über den vorderen Theil des Fusses ging; er stürzte sofort hin, ohne sich wieder aufrichten zu können. Da der vordere Theil des Fusses durch das Rad hirt war und der Mann rücklings über stürzte, so bewirkte die Schwere des Körpers eine übermässige Extension des Fusses, wodurch der Mittelfuss aus seiner Verbindung mit der Fusswurzel gelöst wurde. Der Mann starb, und die Section erwies, ausser den Zerstörungen der Weichtheile, eine Luxation sämmtlicher Mittelfussknochen in ihrem Fusswurzelgelenke, wobei dieselben jedoch weder insgesamt nach derselben Richtung dislocirt waren, noch ihre normalen Verbindungen unter einander behalten hatten. Diese bestanden nur zwischen dem 2., 3. u. 4. Metatarsalknochen, welche miteinander auf die Fusswurzel und zwar auf die keilförmigen Beine getreten waren. Von den beiden übrigen Mittelfussknochen war der 1. nach der innern Seite des 1. keilförmigen Beins verschoben, und der 5. war um seine Achse gedreht und zu seinem hinteren Ende gebrochen.

Schrauth (Deutsche Klinik, 1854, No. 50) beobachtete 1847 eine Luxation des Metatarsus nach Oben mit einiger Verschiebung nach Aussen. Die Gelenkflächen des 2. und 3. Os metatarsi hatten diejenigen des 2. und 3. Os cuneiforme gänzlich verlassen, während die Bases des 4. und 5., sowie des 1. Os metatarsi nur gehoben und nach Aussen gedrängt waren. Dennoch standen die Bases der ersten 3 Osa metatarsi gleich hoch, was sich aus dem sehr bedeutenden Verticaldurchmesser der

¹⁾ Hitzig hat in seiner sehr gründlichen Abhandlung „Ueber die Luxationen im Tarso-Metatarsal-Gelenk“ (Berliner klin. Wochenschrift, 1866, pag. 393 u. L.) bereits 29 Fälle zusammengestellt. — Ich habe Verrenkungen einzelner und mehrerer Mittelfussknochen wiederholt gesehen, aber (mit Ausnahme eines veralteten Falles) immer mit so bedeutenden Verletzungen der Weichtheile, dass sie als Nebensache erschienen.

Basis ossis metatarsi primi erklärt. Der Vorfuss erschien kürzer und wie in sich hineingeschoben, einem Pes equinus ähnlich. Auf dem Fussrücken war eine Erhöhung von $\frac{1}{2}$ Linie, welche gegen den Unterschenkel hin steil abfiel, „nach Vorn sich allmählig abflachte.“ Einrichtung auf frischer That, Retention durch einen Kleisterverband. Die Brauchbarkeit des Fusses war nach 6 Wochen hergestellt.

Eine unvollständige Verrenkung des Mittelfusses nach Aussen beschreibt Laugier (Archives génér. Janvier, 1852). Symptom: 1. Hervorspringen des Os cuneiforme primum nach Innen, ohne dass seine Lage im Verhältniss zum Os naviculare geändert ist. 2. Uebermässiges Hervorspringen der Tuberositas ossis metatarsi quinti nach Aussen. 3. Abnorme Beweglichkeit im Tarso-Metatarsal-Gelenk. Diese Verrenkung kann ohne Fractur des hinteren Endes des Os metat. II. (wegen der eigenthümlichen Einkeilung desselben zwischen dem ersten und dritten Keilbein) nicht zu Stande kommen. Die Veranlassung war ein Sturz auf den rechten Fuss aus einer Höhe von $\frac{1}{4}$ Fuss. Eine genaue Diagnose war wegen der grossen Schmerzhaftigkeit erst nach Anwendung des Chloroforms möglich. Die Einrichtung gelang leicht während der Betäubung.

Eine incomplete Luxation aller Metatarsalknochen nach Oben beschrieb Gutenberg (Aerztl. Mitth. aus Baden 1865, No. 16 u. 17).

Der von Hitzig (l. c.) beschriebene Fall betrifft einen Gefangenen, welcher durch Sprung aus dem zweiten Stockwerk zu entkommen versuchte. Am 7. Tage nach der Verletzung fand H. mässiges Oedem, starke alte Sugillationen, eine, trotz des Oedems, deutliche, quere Erhöhung in der Gegend des Tarso-Metatarsal-Gelenks, Stellung des Fusses, ähnlich wie bei Spitzfuss, die Bases oss. metatars. I—IV. deutlich fühlbar, auf den entsprechenden Fusswurzelknochen. Die Einrenkung gelang durch Extension am Vorfuss und directen Druck mit der Hand; jedoch blieb der erste Metatarsalknochen, welcher nur um etwa die Hälfte seiner Gelenkfläche aufwärts verschoben war, etwas prominent, was sich nach 6 Wochen aber verloren hatte, während jetzt an dem sonst normalen Fuss die Basis oss. metat. II. ein Wenig nach Oben hervorstand.

Ueber die Entstehung der Luxationen des Os metatars. hallucis hat Ch. Hardy (Journal du progrès, 1860, No. 6 u. 8) Versuche an Leichen gemacht. Wegen der Festigkeit der durch Sehnen-Insertionen verstärkten Bänder und der eigenthümlichen Richtung der Gelenkflächen gelingt es sehr schwer solche Verrenkungen zu Stande zu bringen und zwar immer nur in der Richtung nach Oben. — Verrenkungen des Os metatarsi hallucis aus seinen beiden Gelenken (sowohl dem tarsalen, als dem phalangealen) sind nicht unerhört selten. Blanquinque und Lassalas (Gaz. hebdom. 1869, No. 13) haben 14 Fälle der Art gesammelt, Demarquay (Gaz. d. hôp. 1869, No. 28) einen solchen beschrieben, in welchem der Knochen wegen Unmöglichkeit der Reduction extirpirt wurde.

Die Diagnose ist in frischen Fällen leicht. Man findet bei der vollständigen Verrenkung sämtlicher Metatarsalknochen, wie Sanson zuerst angegeben hat, folgende, anatomisch leicht zu deducirende Veränderungen.

1) Verkürzung des Fusses um mehrere Linien, herrührend theils von dem Austreten der Knochen aus ihrer Richtung, theils von der schrägen Stellung der Mittelfussknochen und Zehen. 2) Auf dem Fussrücken ein Vorsprung von der Höhe eines halben Zolls und

Laugier¹⁾ hat auf die Verrenkung der grossen Zehe mit Durchbruch des Kopfes des ersten Mittelfussknochens durch die Haut besonders aufmerksam gemacht. Veranlasst wird diese Verrenkung durch Fall des Körpers auf die Fussspitze, oder durch Fall eines schweren Körpers auf die grosse Zehe. Letztere ist nach Aussen gerichtet, während der entsprechende Mittelfussknochen nach Innen vorspringt. Die Streck- und Beuge-Sehnen der grossen Zehe, stark nach Aussen gedrängt, entfernen sich vom ersten Mittelfussknochen, so dass ein mit Extravasat gefüllter Zwischenraum entsteht. Von sechs Luxationen dieser Art führten drei Phlegmone und Abscesse auf dem Fussrücken herbei; bei einem dieser Kranken entstand Gangrän, bei einem anderen Pyämie. Die Resection des Kopfes des Mittelfussknochens verdient in solchen Fällen gewiss allgemeine Empfehlung, obgleich Laugier die Reposition vorzieht und die sicher danach folgende Entzündung mittelst frühzeitiger Incisionen auf dem Fussrücken in Schranken halten will, durch welche auch dem ergossenen Blut und dem etwa sich bildenden Eiter freier Abfluss verschafft werden soll.

¹⁾ Bulletin chirurg. 1840, Tom. I. Vgl. den Fall von Larrey, Gaz. d. hôp. 1857, No. 99.

dass eine sehr grosse Gewalt erforderlich ist, um die Phalangen der Zehen zu verrenken und dass durch die blosser Elasticität der Theile, sobald man sie sich selbst überlässt, die Einrenkung erfolgt. Hieraus erklärt sich die grosse Seltenheit von Verrenkungen der Zehen.

Broca (De la luxation des phalanges des orteils, Rev. méd.-chir. 1853, Septbr.) widerspricht der gewöhnlichen Angabe, dass sie sich gerade wie die Finger-Verrenkungen verhalten, und beschreibt folgenden instructiven Fall. Ein Mann, der sehr leichte Schuhe trug, versetzte seinem Hunde einen Fusstritt, traf ihn aber nur mit der Fusspitze und bemerkte gleich darauf unter Schmerzen, dass der vordere Theil seines Schubes in die Höhe stand. Es gelang ihm, durch Druck mit der Hand diese Difformität zu beseitigen. Die Schmerzen liessen etwas nach und er konnte weiter gehen. Anderen Tags fand Broca die dritte Zehe in der Mitte angeschwollen, aber von normaler Länge und Stellung. Druck auf die zweite Phalanx erregte heftige Schmerzen. Fixirt man die erste Phalanx und bewegt den vorderen Theil der Zehe, so wird der Schmerz noch heftiger. Genauere Untersuchung ergab, dass die Basis der zweiten Phalanx an der Dorsalseite der Zehe etwas hervorsprang. An der Plantarseite war das Capitulum der ersten Phalanx etwas hervorgeschoben. Die verticale Dicke der Zehe war im Vergleich zur gesunden vermehrt. Hieraus ergab sich eine unvollkommene Verrenkung der zweiten Phalanx nach Oben. Dieselbe wurde abwärts, das Capitulum der ersten Phalanx dagegen aufwärts gedrückt und mit einer plötzlichen Bewegung, welche den Eindruck des Hervorspringens eines Kirschkerns machte, gelang die Reposition. Der Kranke selbst rief sogleich: „Die Knochen sind jetzt wieder am richtigen Platz“. Verband mit Pappschienen und Heftpflasterstreifen. Am siebenten Tage stand der Kranke auf. Die Heilung gelang vollkommen. In Betreff der Erklärung des Zustandekommens einer solchen Verrenkung ist Broca in Verlegenheit: die isolirte Wirkung eines Stosses auf die dritte Zehe erscheint ihm unerklärlich; auch wäre eine Dislocation in der *Articulatio metatarso-phalangea* noch immer wahrscheinlicher gewesen; endlich ist das dauernde Bestehen einer unvollkommenen Verrenkung in einem Phalangengelenk auffallend. — Man darf aber wohl fragen: waren nicht ursprünglich mehrere Zehen verrenkt? vielleicht sogar vollständig? Der Verletzte hat ja auf frischer That instinctmässig reponirt und fühlte sich dadurch sehr erleichtert. Dass an der zweiten Zehe nach 8 Tagen die bekannten Sugillationsfarben zum Vorscheine kamen, erwähnt Broca selbst.

A. Cooper führt einen Fall an, dessen Reposition, da er Anfangs verkannt war, nach drei Monaten nicht mehr möglich wurde.

Einen analogen Fall habe ich im veralteten Zustande am Metatarso-Phalangen-Gelenk der zweiten Zehe bei einem jungen Mädchen gesehen, die ihn von einem Fall auf der Treppe herleitete. Sie litt bei jedem Tritt heftige Schmerzen und verlangte dringend Abhülfe. Man fühlte hinter der Zehe eine Vertiefung; die Zehe war abnorm beweglich, das Capitulum ossis metat. in der Planta nicht zu fühlen, dort aber jeder Druck höchst schmerzhaft. Ich glaubte eher eine Pseudarthrose des Os metatars., als eine Luxation zu finden und entschloss mich zur Resection des Capitulum (der Exstirpation des vermeintlichen vorderen Bruchstückes). Sobald der Knochen entblösst war, klärte sich die Sache auf. Das Capitulum stand tief in der Planta, die Basis phalangis darauf; aber der Gelenkkopf war so abgeschliffen, dass die Richtung der verrenkten Zehe gar nicht verändert war. Die Resection des Capit. oss. metat. beseitigte die Schmerzen und stellte die Brauchbarkeit des Fusses wieder her. Das Capitulum war sklerotisch und erheblich verdickt.

Phlegmonen an der Hand eine schnell über die ganze Ausdehnung der entsprechenden Sehnenscheiden bis zum oberen Drittheil des Vorderarms sich ausbreitende Entzündung gesellen. Auch bei Pyämischen findet man bisweilen die eine oder die andere Sehnenscheide mit Eiter gefüllt. Die eitrige Sehnenscheidenentzündung ist in ihren Folgen durchaus nicht unbedenklich. Die von Eiter vollständig umspülten Sehnen werden in der Regel nekrotisch und nach einer Reihe von Wochen in langen Fetzen aus den für den Austritt des Eiters entstandenen Oeffnungen ausgestossen. Ausserdem geht die Eiterung gewöhnlich auf das die Sehnenscheide umgebende Bindegewebe über, und breitet sich dann in den tieferen Bindegewebsschichten des betreffenden Theiles aus, sodass bedeutende Zerstörungen durch die Eiterung hervorgebracht werden. Auch die zwischen einer Sehnenscheide und dem benachbarten Gelenk bestehende Scheidewand kann von dem Eiter durchbrochen, und dadurch eine Gelenkeiterung hervorgerufen werden. Ebenso sind die von der Sehnenscheide nur durch das Periost geschiedenen Knochen gefährdet, sie werden, soweit sie von dem Eiter umspült sind, leicht von Caries oder Necrose befallen. In Folge der bezeichneten Complicationen kann die eitrige Sehnenscheidenentzündung zu einer sehr copiösen und lang dauernden Eiterung Anlass geben, welche alle Gefahren ausgedehnter Suppurationen mit sich führt. In den schlimmsten Fällen ist es bisweilen nöthig geworden, das betreffende Glied abzusetzen, um dem Patienten das Leben zu erhalten. Auch in den weniger schlimmen Fällen bleiben nach der Heilung oft wegen Verlust der Sehnen oder Verwachsung derselben mit ihren Scheiden Functionsstörungen zurück.

Die Symptome der eitrigen Sehnenscheidenentzündung sind sehr ähnlich denen der Phlegmone. Der Sitz und die Ausbreitung der Entzündungsgeschwulst, sowie später der Eiterung lassen auf den Ausgang der Entzündung von der Sehnenscheide schliessen. Dringen aus den Eitergängen erst die Fetzen der mortificirten Sehne hervor, so kann über den Ursprung der Eiterung kein Zweifel mehr sein.

Die Behandlung der eitrigen Sehnenscheidenentzündung muss die der Phlegmone sein; namentlich sind in allen Fällen frühzeitige ausgiebige Einschnitte dringend zu empfehlen. Durch gehörige Entleerung des Eiters kann man am ehesten der Zerstörung der Sehnen vorbeugen.

Die selteneren serös-eitrigen Sehnenscheidenentzündungen treten mit geringerer Heftigkeit auf. Meist kommt es bald zum Durchbruch der fluctuirenden Entzündungsgeschwulst; es entleert sich ein eitrig getrübbtes Serum. Obgleich die Sehne nicht necrotisirt,

und die Eiterung in der Regel nicht auf die umgebenden Bindegewebsschichten übergeht, hat die Entzündung Neigung sich in die Länge zu ziehen. Dann wandeln sich die Durchbruchstellen in mehr oder weniger getriebtes Serum absondernde Fistelgänge um. Nach der Heilung ist die Sehne meist der Art an ihre Scheide angelöthet, dass sie erst nach langer Zeit ihre Beweglichkeit wieder bekommt; oft bleibt die Beweglichkeit der Sehne dauernd beschränkt. — Bei der Behandlung darf man es nicht versäumen, die Theile, welche von der Sehne bewegt werden, durch einen geeigneten Apparat zu immobilisiren. Wo sich oberflächliche Fluctuation zeigt, ist zu incidiren. Die Incisionswunden brauchen nicht so ausgiebig zu sein, wie bei der eitrigen Entzündung. Der Abfluss der Secrete ist durch feuchte Umschläge zu befördern. Nach Ablauf der Entzündung ist zur Wiederherstellung der Beweglichkeit die Faradisirung des betreffenden Muskels von wesentlichem Nutzen.

Auch acute oder subacute Entzündungen mit serösem Erguss in die Sehnenscheide werden bisweilen beobachtet. Derartige Entzündungen kommen nicht selten in den ersten Stadien der constitutionellen Syphilis vor und pflegen dann einer antisiphilitischen Behandlung zu weichen.¹⁾

Eine ausführlichere Besprechung verdient wegen ihres häufigen Vorkommens noch die Sehnenscheidenentzündung mit spärlichem zähem Exsudat. Dieselbe tritt fast immer primär auf; sie wird als schmerzhaftes Crepitation, Tenosinitis crepitans, Unguinocele (besser: Onkinocèle) tendinosa²⁾ bezeichnet und ist im Volke sehr wohl bekannt; die Bauern der Gascogne nennen sie „Lai“³⁾, die Pommern „Knirrband“. Sie kann überall vorkommen, wo Sehnen in einer serösen Scheide sich bewegen. Am Stärksten entwickelt sie sich an demjenigen Ende der Sehnenscheide, welches dem Muskel zugewandt ist, am Häufigsten beobachtet man sie an der Rückseite des Vorderarms, dicht über dem Handgelenk, wo das eigenthümlich knirrende Geräusch, welches in ihrem Gefolge auftritt, zuweilen für Knochen-Crepitation gehalten worden ist.

Boyer sagt deshalb bei Gelegenheit der Vorderarmbrüche ausdrücklich: „Man darf in Betreff der Crepitation nicht vergessen, dass Personen, welche viel und an-

¹⁾ Verneuil, Gaz. hebdom. 1868. No. 39. pag. 609; Fournier, ibidem 1868. No. 41. pag. 645.

²⁾ Vgl. Boyer, Maladies chirurgicales, Tom. III. pag. 222; Velpeau, Traité complet d'anatomie chirurgicale, Paris 1837, Tom. II. pag. 621; und Leçons cliniques chirurgicales, Tom. II. pag. 94; Rognetta, Gazette medicale 1834, pag. 395; Marchal, Theses de Paris 1839, pag. 64; Poulain, Theses de Paris 1835.

³⁾ Michon (Des tumeurs synoviales etc., Paris 1851) schreibt „l'Al“.

gestrengt mit ihren Händen arbeiten, einer eigenthümlichen Affection des Zellgewebes, welches den *Abductor longus* und den *Extensor brevis pollicis* umgibt, unterworfen sind, wobei die genannten Muskeln hervorspringen und, wenn man sie drückt, ein eigenthümliches Geräusch vernehmen lassen, welches am Besten mit dem durch Kneten von trockenem Stärkemehl entstehenden Geräusche verglichen werden kann.“

Velpeau hat dieselben Erscheinungen in der Nähe des Fingergelenks beobachtet, an welcher Stelle* jedoch wegen der tieferen Lage der Sehnen die Symptome weniger deutlich sind. Von Lisfranc wurde auf die Möglichkeit der Wechselung einer Tenosynitis crepitans in der Sehnscheide des langen Kopfes des *Biceps* mit einer *Fractura colli humeri* (nach Beobachtung eines solchen Falles) aufmerksam gemacht.

Aetiologie. Fast immer waren sehr angestrengte und ungewohnte Muskelbewegungen die Ursache der Entzündung. Jedoch können, nach meinen Beobachtungen, auch Quetschungen die Veranlassung geben.

Die **Diagnose** ist sehr leicht, sobald man nur einmal das eigenthümliche Gefühl, welches unter dem aufgelegten Finger, und das ebenso charakteristische Geräusch, welches mit dem aufgesetzten Hörrohr bei Bewegung der Sehnen an der leidenden Stelle entsteht, wahrgenommen hat. Der Vergleich mit Stärkemehlknirschen ist vollkommen zutreffend. Die Schmerzhaftigkeit ist sehr gering, tritt sowohl bei Druck auf die leidende Stelle, als bei passiven und activen Bewegungen auf, und hat namentlich ihren Sitz am Muskelrande der Scheide. Die gewöhnlich unbedeutende und immer farblose Geschwulst rührt theils von der stärkeren Ausdehnung der Sehnscheide, theils von der Anschwellung des Muskelbauchs her. Durch active Bewegungen kann zuweilen das Knirschen besonders stark hervorgerufen werden.

Die **Behandlung** erheischt vor Allem Ruhe für den leidenden Theil, den man deshalb durch einen Schienenapparat immobilisirt; oft reicht dies allein aus. Fügt man noch einen feuchten Verband hinzu, so schwinden fast immer alle Beschwerden innerhalb 10, 15 bis 20 Tagen. Schneller erfolgt die Heilung, wenn man ein grosses Vesicans auf die betreffende Stelle legt und nach Eröffnung der Blase mit Watte verbindet. Minder wirksam, obschon gleichfalls empfohlen, sind Einpinselungen von Jodtinctur so wie reizende und sogenannte zertheilende Salben. Wird die anstrengende Muskelarbeit, welche die Entzündung hervorgerufen hatte, wieder aufgenommen, so stellen sich leicht Recidive ein. Wiederholte Recidive können zu dauernder Erweiterung der Sehnscheide führen.

Boyer (*Traité des malad. chirorg.*, 5. édit. Tom. II. pag. 605) erzählt von einem Kranken, bei dem eine convulsivische Spannung des *Extensor pollicis* der rechten Hand zurückblieb, so dass er mit der linken schreiben lernen musste. Hier handelte es sich wohl nicht um Tenosynitis, sondern um Schreibekrampf.

**3. Chronische Ausdehnung der Sehnenscheiden, Ueberlein:
Hygroma, Ganglien¹⁾.**

Aus den Sehnenscheiden gehen nicht selten circumscriphte, mehr oder weniger kuglige, fluctuirende Geschwülste hervor, welche selten eine bedeutende Grösse erreichen, bei Druck schmerzlos, und mit unveränderter Haut überspannt sind. Dieselben erscheinen bisweilen weniger gespannt und kleiner, oder verschwinden sogar gänzlich, wenn die die kranke Scheide durchsetzende Sehne erschlafft. Ihr Wachstum schreitet in der Regel sehr langsam fort; jedoch kommen einzelne Fälle vor (wie Vidal einen solchen erzählt), wo sie nach grossen Anstrengungen schnell bis zu der Grösse einer Nuss sich entwickeln. Am Häufigsten werden sie in der Umgegend des Handgelenks, seltener in der des Fussgelenks beobachtet. Haben sie ihren Sitz am Fussrücken, so werden sie beim Gehen, oft auch durch den blossen Druck der Fussbekleidung schmerzhaft und sehr hinderlich. Die Schmerzhaftigkeit verschwindet jedoch schnell, sobald der Fuss Ruhe hat. An anderen Stellen des Körpers, namentlich an der Hand, haben sie oft ausser der durch sie bedingten Difförmität keine Nachteile. In anderen Fällen bedingen sie auch hier Schmerzhaftigkeit und Functionsstörung, namentlich Veränderung der Kraft in den betreffenden Bewegungen der Hand und der Finger. Hat eine solche Geschwulst ihren Sitz in der Hohlhand, so beeinträchtigt sie die Functionen der Fingerbeuger erheblich. Nach J. Cloquet wird die Beugung der Finger unmöglich, nach Cooper dagegen stehen die Finger, wegen Aufhebung der Beugesehen durch die Geschwulst, in permanenter Beugung. Beides ist möglich.

Die Beschwerden dieser Geschwülste pflegen bedeutender zu sein, wenn sie zahlreiche feste Körperchen (s. unten) enthalten, als wenn sie blos mit Flüssigkeit gefüllt sind.

Der wesentliche Inhalt dieser Geschwülste ist nämlich bald blos eine der Synovia und somit auch dem Inhalt der Sehnenscheiden ähnliche, meist aber dickere und oft selbst gallertige Flüssigkeit, bald aber kommen in ihnen ausserdem freie und gestielte Körperchen vor, welche man wegen ihrer Aehnlichkeit mit gekochtem Reis (Or-

¹⁾ Der Name „Ganglion“ ist von den Chirurgen leider in sehr vielfacher Bedeutung gebraucht worden. Zunächst bezeichnet man damit, wie in der Anatomie, die bekannten Nervenknöten, dann gewisse Arten der Neurome (accidentelle Ganglien), fernerhin aber, nach dem Vorgange der Franzosen, auch die Lymphdrüsen (*Ganglion lymphatique*) im normalen und pathologischen Zustande, endlich die hier zu erläuternden Geschwülste mit synovialen Inhalt, sofern sie mit einer Sehnenscheide oder mit einem Gelenk zusammenhängen.

pora oryzoidea genannt hat. Letztere sind am häufigsten in den Geschwülsten beobachtet, welche von den Sehnscheiden unter dem *Lig. carpi volare proprium* ausgehen. Dupuytren hielt die reisartigen Körperchen für hydatidenartige belebte Wesen und gab diesen Geschwülsten deshalb den Namen *Cystes hydatiformes*. Bosc und Dumeril sahen sie für Fetzen von Fettgewebe, Andere für Fibringerinnsel an. Wenn sie frei beweglich und ohne Stiel vorkommen, so können sie die Grösse eines Reiskornes und darüber, höchstens jedoch diejenige einer Bohne erreichen. Sie sind weisslich, glänzend, oder halb durchscheinend, oval, plattgedrückt, besitzen eine bedeutende Elasticität (ähnlich halb gar gekochten Reiskörnern) und sind oft in grösserer Anzahl mit einander verklebt. Sie enthalten eine mit Flüssigkeit oder Fett gefüllte Höhle. Die mikroskopische Untersuchung lässt in ihnen nur homogenes, geschichtetes Gewebe erkennen. — In der Regel liegen die reisartigen Körperchen ganz frei in dem Sack der Geschwulst. Bisweilen sind sie jedoch durch mehr oder weniger breite Stiele an die Synovialis der Scheide angeheftet. In manchen Fällen sind neben den freien Körpern gestielte vorhanden. Mehrmals hat man alle Uebergangsstufen von den freien Körperchen bis zu den allerkleinsten zottenförmigen Auswüchsen auf der Innenfläche der Sehnscheide beobachten können. Wenn es danach nicht zweifelhaft erscheint, dass die reisartigen Körperchen mitunter aus Wucherungen der Synovialis hervorgehen, so möchten die meisten dieser Körperchen doch wohl Gerinnungen des zähflüssigen Inhalts der Sehnscheidengeschwülste ihren Ursprung verdanken. Oft findet man neben den reisartigen Körperchen noch eine beträchtliche Menge Serum in der Geschwulst; in anderen Fällen ist die Geschwulst ganz und gar mit den Körperchen ausgestopft. Die in Rede stehenden Geschwülste werden durch eine Exsudation in die Sehnscheide erzeugt, welche zur Ansammlung einer serösen, sich bald zu einer leimartigen Gallerte eindickenden und mitunter auch fibrinöse Gerinnsel absetzenden Flüssigkeit führt; sie sind also als Hydropsien der Sehnscheiden anzusehen. Da die Sehnscheiden in dem grössten Theile ihres Verlaufs von straffen fibrösen Bändern überspannt sind, so können sie von der in ihnen angesammelten Flüssigkeit nicht gleichmässig ausgedehnt werden. Nur solche Theile der Sehnscheiden, welche nicht von straffen Bändern gedeckt sind, können sich unter dem Druck der angesammelten Flüssigkeit erweitern, und somit geschwulstförmige Ausbuchtungen der Sehnscheiden bilden. Diejenigen Stellen der Sehnscheiden, welche nicht von straffen Bändern überspannt sind, sind also gleichsam die Pforten, aus wel-

chen die durch Hydropsie der Sehnenscheiden entstehenden Geschwülste hervortreten. Gewöhnlich liegen diese Pforten an den Enden der Sehnenscheiden. Je kleiner die Pforten sind, desto mehr erscheinen die aus ihnen hervortretenden Geschwülste gestielt und kuglig. Die aus grossen Pforten hervortretenden Sehnenscheidengeschwülste entsprechen oft noch in ihrer Gestalt der Richtung und Form der Sehnenscheide. Geschwülste der letzteren Art sind leicht bei der Untersuchung als Sehnenscheidenausdehnungen zu erkennen; sie führen den Namen der „Sehnenscheiden-Hygrome“, während die kugligen und gestielten Sehnenscheidengeschwülste, die wie selbstständige Cysten erscheinen, als Ganglien bezeichnet werden.

Unter dem Namen Ganglion fasst man aber gewöhnlich alle cystischen Geschwülste in der Nähe der Gelenke zusammen. Es kommen aber in der Umgebung der Gelenke noch 2 Arten von cystischen Geschwülsten vor: 1) vollkommen geschlossene, und 2) mit dem Gelenk communicirende Cysten. Die vollkommen geschlossenen Cysten sind einestheils hydropisch erweiterte Schleimbeutel (siehe den nächsten Abschnitt, anderentheils Cysten selbstständiger Bildung, aus den von Henle und Teichmann beschriebenen, nicht selten an der äussern Fläche der Sehnenscheiden und Gelenkkapseln sich findenden kleinen Colloidcysten¹⁾ hervorgegangen, deshalb am Besten als Cystenganglien zu bezeichnen. Die mit dem Gelenk communicirenden Cysten sind Hydropsien von solchen Schleimbeuteln, welche mit dem Gelenk zusammenhängen, oder hydropische Kapselausbuchtungen (Synovialtaschen).

Eine Sehnenscheide hat in der Regel mehrere Pforten, aus denen sich hydropische Geschwülste hervordrängen können, es ist deshalb auch nicht selten, dass von einer Sehnenscheide mehrere Ganglien oder Hygrome ausgehen. Dass diese Geschwülste vermittelt der Sehnenscheide mit einander communiciren, kann man bisweilen dadurch nachweisen, dass man durch abwechselnden Druck auf die eine und andere Geschwulst den Inhalt aus einer in die andere zu dislociren vermag. Bestand der Inhalt aus freien Körperchen, so nimmt man dabei in der Regel ein schnurrendes Geräusch wahr. Bei den Sehnenscheidenganglien pflegt die Scheide ausser der gestielten Ausbuchtung keine weitere Veränderung zu zeigen. Bei den Sehnenscheidenhygromen ist meist in geringerem Grade auch die übrige Scheide ausgedehnt und mit einer spärlichen Gallerte oder einigen festen Körpern gefüllt. Die Hygrome veranlassen deshalb immer bedeutendere Functionstörungen als die Ganglien²⁾.

¹⁾ Henle, rationale Pathologie, Bd. II. pag. 823. L. Teichmann, zur Lehre von den Ganglien. Inauguraldissertation, Göttingen 1856. Diese Colloidcysten sind wahrscheinlich identisch mit den von Gosselin beschriebenen, und von ihm als Ursache der Ganglienbildung angesehenen *Follicules synoviales*.

²⁾ Die klarsten Erläuterungen über die Entstehungsgeschichte und die Varietäten der Ganglien giebt Virchow in seinen Vorlesungen über „die krankhaften Geschwülste“, Berlin, 1863, Bd. I. pag. 194 u. f.

Aetiologie. Nicht selten entstehen die Ganglien ziemlich plötzlich nach Verstauchungen, welche allem Anschein nach eine partielle Zerreiſung der Haltbänder der Scheide herbeiführten. Viele Ganglien und alle Hygrome der Sehnenscheiden entwickeln sich jedoch allmählig. In manchen Fällen kann man wiederholte, namentlich crepitirende Entzündungen, oder andauernde und im Verhältniss zur Muskelkraft des Individuums zu bedeutende Anstrengungen als Ursache nachweisen. In anderen Fällen scheint ein chronischer Rheumatismus der Entstehung dieser Geschwülste zu Grunde zu liegen; wenigstens beobachtet man sie, und gewöhnlich in mehrfacher Anzahl, bisweilen bei Individuen, welche an rheumatischem Gliederreiſsen, oder an chronischen Gelenkrheumatismen leiden. Auch bei constitutioneller Syphilis kommen Sehnenscheidenhydropsien vor¹⁾. Oft lässt sich aber eine Entstehungsursache dieser Geschwülste gar nicht auffinden. Bei Weibern hat man bisweilen beobachtet, dass die Sehnenscheidengeschwülste zur Zeit der Menstruation sich stärker füllen.²⁾

Die **Diagnose** dieser Geschwülste gelingt häufig dem Kranken selbst, wengleich durch den Namen „Ueberbein“ die entschiedenste Unwissenheit über den Sitz und die wahre Natur derselben bewiesen wird. Die Localität, in welcher sie vorkommen, ihre Verkleinerung oder selbst vorübergehende Beseitigung bei Erschlaffung der Sehne und gleichzeitiger Compression der Geschwulst, die schnelle Wiederkehr bei Nachlass der letzteren und bei Auspannung des Muskels sichern die Diagnose. Die Anwesenheit der Dupuytren'schen Körperchen erschliesst man aus dem schon oben erwähnten, theils mit der Hand zu fühlenden, theils mittelst des Stethoskops zu hörenden Reibegeräusch, welches jedoch in derselben Geschwulst an dem einen Tage fehlen und an dem nächsten vorhanden sein kann, je nachdem die Erweiterung der Sehnenscheide, durch eine mehr oder weniger reichliche flüssige Exsudation, noch stärker ausgedehnt wird oder nicht. Besonders auffallend ist dies Geräusch in den Hygromen der unter dem Ligam. carpi volare proprium gelegenen Sehnenscheide. Diese lässt in der Regel oberhalb und unterhalb des genannten Ligaments eine Geschwulst hervortreten, so dass die ganze hygromatöse Sehnenscheide die Gestalt eines Quersacks erhält, in welchem man den ganzen Inhalt (so auch namentlich die erwähnten Körperchen) aus der einen Geschwulst unter dem Ligamentum carpi volare proprium hindurch in die andere mit jenem charakteristischen Geräusch hinüber treiben kann. Ob man eine Sehnenscheidengeschwulst ab

¹⁾ Fournier, Gaz. hebdom. 1868. No. 41. pag. 645.

²⁾ Albert, Wien. med. Presse. XII. 27, 28. 1871.

Hygroma oder als Ganglion ansehen soll, das ist nach ihrer mehr oder weniger weiten Communication mit der Sehnenscheide zu beurtheilen. Uebrigens ist der Unterschied zwischen Hygrom und Ganglion einer Sehnenscheide nur ein gradueller.

Die differentielle Diagnose zwischen einer Sehnenscheidengeschwulst und einer andern in der Gelenksgegend liegenden Cyste kann schwierig sein. Hauptsächlich hat man sich dabei durch die anatomische Lage und Richtung der Sehnenscheiden sowie durch die Lage der von den fibrösen Haltbändern der Sehnen freigelassenen Pforten leiten zu lassen. Die Schleimbeutelgeschwülste treten an Stellen hervor, welche als constanter oder häufigerer Sitz von Schleimbeuteln bekannt sind. Am leichtesten ist eine Verwechslung mit Cystenganglien möglich, welche nicht selten in nächster Nähe einer Sehnenscheide gelegen sind. Bei den mit dem Gelenk communicirenden Cysten lässt sich häufig, jedoch nicht immer durch das Zurückweichen des Inhaltes in das Gelenk bei Druck auf die Geschwulst und das prallere Hervortreten bei Compression des Gelenkes der Beweis liefern, dass ein Zusammenhang mit der Gelenkhöhle besteht.

Die **Behandlung** dieser Geschwülste mit den verschiedensten pharmaceutischen Mitteln hat gar keinen oder doch keinen dauernden Erfolg. Die allmälige Compression mittelst verschiedener Verbände, Bleiplatten etc. hat gleichfalls geringen Nutzen. Dagegen bewirkt die plötzliche und gewaltsame Compression, die Zermalmung, das Zerdrücken, Zerschmettern etc. in der Regel wenigstens bei den Ganglien Heilung, wenn die Wandungen nicht sehr stark verdickt sind. Wer kräftige Finger hat, wird mit diesen allein gewöhnlich ausreichen. Der kranke Theil wird auf eine feste Unterlage gelegt und der Operateur fasst die Geschwulst zwischen seine beiden Daumen, mit denen er möglichst kräftig gegen sie drückt. Gelingt dies nicht, so sucht man sie mittelst eines vorher mit Leinwand unwickelten Petschafts oder dgl. zu zerdrücken. Endlich führt sehr oft, wenn diese Versuche misslingen, die Zerschmetterung mittelst eines hölzernen Hammers sicher und gefahrlos zum Ziele; nur muss man, um durch den kräftig zu führenden Schlag nicht einen Knochenbruch zu veranlassen, für eine hinreichend elastische Unterlage sorgen. Ist durch eins dieser Verfahren die Wandung der ausgedehnten Sehnenscheide zersprengt, so tritt die der Synovia ähnliche Flüssigkeit in das umliegende Bindegewebe, woselbst sie leicht resorbirt wird. Sind Corpora oryzoidea in dem Ueberbeine enthalten, so ist deren Resorption allerdings unwahrscheinlich; die gestielten Körperchen bleiben jedenfalls immer zurück und werden dann voraussichtlich zu

Recidiven Veranlassung geben. Lässt sich in keiner der angegebenen Weisen die Zerspaltung der Geschwulst ausführen, so verrichtet man die subcutane Incision¹⁾, wie sie Goyrand für die Operation der Gelenkmäuse angegeben hat, verschliesst die kleine Wunde sorgfältig, und sucht durch einen immobilisirenden und comprimirenden Verband und Kälte die Entzündung zu verhüten und die Resorption der hierbei gleichfalls in das Bindegewebe sich ergiessenden Flüssigkeit zu befördern. Eine solche Nachbehandlung wird auch, wenn die Zerschmetterung vorausging, angemessen sein. Gegen Recidive stellt die subcutane Incision nicht mehr sicher, als die Zerschmetterung. Um einer radicalen Heilung sicher zu sein, bleibt schliesslich nichts übrig, als dieselbe Behandlung, wie bei anderen Cysten, einzuleiten. Die einfache Incision mit darauf folgenden andauernden kalten Irrigationen, in der Absicht durch prima intentio zu heilen, hat Bérard häufig mit Glück angewandt. Man rät auch die ganze Geschwulst zu spalten, bei sehr bedeutender Dicke ihrer Wandungen einen Theil derselben abzutragen und die Wunde dann durch Eiterung heilen zu lassen, — freilich auf die Gefahr hin, dass die nachfolgende, sich oft weit ausbreitende Entzündung sich bis zu heftiger Eiterung steigern, und dadurch Sehnennekrose herbeiführen, ja selbst das Leben gefährden kann. Von der Exstirpation kann nur bei gestielten Sehnscheidengeschwülsten die Rede sein; bei diesen ist die Exstirpation nicht bedenklicher, gewährt jedoch einen sichereren Erfolg als die Incision. Die Exstirpation eignet sich besonders zur Beseitigung der Cystenganglien, doch möchten diese kaum mit völliger Sicherheit zu diagnosticiren sein. — Auch die Jodinjektion verdient zur Heilung der Sehnscheidengeschwülste empfohlen zu werden; es wurde durch dieselbe schon manch günstiger Erfolg erzielt, obgleich sie auch Anlass zu heftigerer Entzündung und Eiterung geben kann. Die eingreifenderen Kurmethoden, die Incision, Exstirpation und Jodinjektion darf man natürlich nur dann in Anwendung ziehen, wenn die Sehnscheidengeschwulst sehr erhebliche Beschwerden und Functionstörungen hervorrufft²⁾.

¹⁾ Von Bégis zuerst beschrieben (*Nouveaux élémens de chirurgie et de médecine opératoire*, Paris 1838, Tom. II.). — Dupuytren hat einige Kranke nach dieser Operation verloren und bei mehreren sehr bedenkliche Zufälle zu bekämpfen gehabt (vgl. *Leçons orales*, T. III.). Man darf überdies nicht vergessen, dass die durch eine solche Operation absichtlich erregte Entzündung zu einer solchen Festheftung der Sehne führen kann, dass die Brauchbarkeit der Hand schliesslich keine viel grössere sein könnte, als vor der Operation.

²⁾ Vgl. Virchow, *l. c.* pag. 197 u. f.

3. Fungus der Sehnenscheiden.

Mit dem Namen des Sehnenscheidenfungus hat man eine eigenthümliche, sehr selten vorkommende Entartung der Sehnenscheiden bezeichnet, bei welcher dieselben zum Theil oder ganz von einer aus Granulationsgewebe bestehenden Masse erfüllt werden. Im Beginne ähnelt das Leiden der Hygrom- und Ganglienbildung so vollkommen, dass man es bei äusserer Untersuchung nicht von diesen Geschwülsten zu unterscheiden vermag. Erst wenn man den Tumor punktiert und durch Druck seinen Inhalt zu entleeren sucht, zeigt sich, dass er weder eine Flüssigkeit noch eine Gallerte enthält, sondern aus einer solideren Masse besteht, aus der man nur ein wenig Blut auspressen kann. In dem weiteren Verlauf des durch Jahre sich hinziehenden Leidens treten in der fungösen Masse der Sehnenscheidengeschwulst Erweichungsheerde auf, die bald zur Eiterung und Ulceration führen. Während die Ulceration fortschreitet, kann auch die fungöse Wucherung sich weiter verbreiten. Sie dringt nun, während sie vorher von der Membran der Sehnenscheide umschlossen, und dadurch vollständig abgekapselt war, auch in die die Scheide umgebenden Organe ein, namentlich in benachbarte Sehnenscheiden und Gelenke, und veranlasst, da ihr die Ulceration auf dem Fusse folgt, nicht selten bedeutende Zerstörungen. Ist die fungöse Geschwulst der Sehnenscheide noch ganz circumscripirt, so lässt sich das Uebel durch die Exstirpation des Tumors beseitigen. Da die Scheide, soweit der Fungus sich erstreckt, obliterirt ist, so öffnet man dieselbe bei der Exstirpation in der Regel nicht. Es sind deshalb die Chancen der Operation günstiger als bei der Exstirpation eines Ganglion. Jedoch treten bisweilen Recidive ein¹⁾. Hat die fungöse Wucherung schon sehr weit um sich gegriffen, namentlich Gelenke und Knochen in Mitleidenschaft gezogen, so bleibt oft weiter nichts übrig, als die Absetzung des Gliedes vorzunehmen²⁾.

Ueber dem Wesen des Fungus der Sehnenscheiden liegt noch ein ziemliches Dunkel. Manche derartige Fälle sind jedenfalls als chronische fungöse Entzündungen aufzufassen, die sich hinsichtlich ihrer Entstehung und ihres Verlaufes ganz analog den fungösen Entzündungen der Gelenke verhalten. Andere Fälle von Fungus der

¹⁾ Ich habe diese Recidive in einem Falle erlebt, welcher, aufs Sorgfältigste behandelt, schliesslich (nach Jahresfrist) doch der Amputation unterworfen werden musste. Bardeleben.

²⁾ Vgl. Bidard, de la synovite tendineuse chronique ou fungus des gaines synoviales. Thèse, Paris 1858. Notta, Gaz. des hôp. 1860, 184. Foucher, Gaz. des hôp. 1862, 156. Cazanou, tumeurs blanches des synoviales tendineuses ou tumeurs fongueuses de ces synoviales. Thèse, Paris 1866.

Sehnscheiden sind wohl als von der Synovialis der Scheide ausgegangene Sarcome zu deuten. Aechte Sarcome der Sehnscheiden sind schon wiederholt, namentlich von Billroth¹⁾, beobachtet.

Zweites Capitel.

Krankheiten der Schleimbeutel.

I. Verletzungen der Schleimbeutel.

Alle Verletzungen der Schleimbeutel rufen eine Exsudation von Seiten der die Bursa umschliessenden Membran hervor. Bei geringeren Verletzungen ist die Ausschwitzung nur eine mässige und rein seröse, nach stärkeren Insulten tritt zugleich Eiterung ein, so dass das Exsudat eine mehr oder weniger starke eitrige Beimischung erhält.

Reine mit schneidenden und stechenden Werkzeugen beigebrachte Wunden geben meist nur zu einer mässigen Exsudation Anlass; doch kann diese die Heilung durch prima intentio hindern. Beginnt die Wunde zu eitern, so stellt sich auch eine Eiterung in dem Schleimbeutel ein; diese kann sogar so heftig werden, dass man zur Dilatation der Wunde genöthigt ist. Gequetschte und gerissene Wunden der Schleimbeutel rufen fast jedesmal eine heftige und sich leicht in den umgebenden Bindegewebsschichten weiter verbreitende Eiterung hervor. Quetschungen verursachen eine plötzliche Anfüllung des Schleimbeutels theils mit Blut theils mit frisch exsudirtem Serum. Man bezeichnet die Geschwulst, welche von einem durch Bluterguss ausgedehnten gequetschten Schleimbeutel gebildet wird, als Hämatom desselben. Verharrt der Theil in Ruhe, und wird durch Anwendung kalter Umschläge das Auftreten einer Entzündung verhütet, so wird der Erguss meist im Laufe von circa 8 Tagen vollständig resorbiert. Findet nicht die nöthige Schonung statt, so kann die Resorption ausbleiben, und aus dem Hämatom ein Hygrom (siehe weiter unten) hervorgehen. Bisweilen tritt Eiterung in dem gequetschten Schleimbeutel ein, welche unter lebhaften Entzündungserscheinungen zum Aufbruch desselben führt.

Den Verletzungen sind selbstverständlich viel mehr die oberflächlichen, als die tiefer gelegenen Schleimbeutel ausgesetzt. Quetschungen werden allein an den oberflächlich gelegenen, namentlich an denen über der Patella und dem Olecranon, beobachtet.

¹⁾ Czerny, Arch. f. kl. Chirurgie Bd. X. pag. 901. Billroth, Chirurg. Klinik. Wien 1869—70 pag. 265.

2. Entzündungen der Schleimbeutel und deren Folgen.

Die Entzündung der Schleimbeutel wird fast immer durch äussere Insulte (Quetschungen oder Reibungen, Einwirkungen der Nässe und Kälte), sehr selten durch innere, übrigens nicht sicher bekannte, Ursachen veranlasst; sie kann primär auftreten (und zwar aus äusseren oder inneren Ursachen) oder secundär (durch Uebertragung aus der Nachbarschaft, z. B. bei Lymphangitis und Erysipelas); sie kommt viel häufiger in den oberflächlichen als in den tiefen Schleimbeuteln vor.

Durch drückende Fussbekleidung entstehen Leichdorne an den Stellen der Haut, an denen die Schleimbeutel an den Füssen gelegen sind. Indem diese Leichdorne an Dicke und Härte zunehmen, sind sie eine fortdauernde Ursache der Entzündung des darunter liegenden Schleimbeutels. Eine unzweckmässige Extirpation derselben kann leicht eine ausgebreitete und bedenkliche Entzündung veranlassen, besonders wenn keine gehörige Ruhe nach der Operation beobachtet wurde. Man hat auch heftige Zufälle in Folge der Punction des grossen Schleimbeutels, welcher bisweilen an der dem unteren Winkel des Schulterblattes entsprechenden Stelle des Latissimus dorsi liegt, auftreten sehen.

Die acute Entzündung der Schleimbeutel kann mit grosser Intensität auftreten; dann gewährt sie das Bild einer heftigen Phlegmone, bei der jedoch sehr frühzeitig, da der Eiter sich in einer präformirten Höhle ansammeln kann, Fluctuation auftritt. Wird dem Eiter nicht bald durch Spontandurchbruch oder durch Incision Austritt verschafft, so können weithin sich erstreckende Eitersenkungen entstehen. Die Behandlung ist wie bei der Phlegmone. — Häufiger noch als die eitrige oder phlegmonöse Entzündung der Schleimbeutel, ist die Entzündung mit serös-eitrigem Erguss. Bei diesen sind die Entzündungserscheinungen im Allgemeinen weniger heftig; der Schleimbeutel bildet ziemlich schnell eine deutlich fluctuirende Geschwulst, welche sehr schmerzhaft und heiss ist, bei oberflächlicher Lage des Schleimbeutels auch etwas geröthet; in der Umgebung besteht ein wenig Oedem. In der Regel bricht die Geschwulst nach einiger Zeit nach Aussen durch, es entleert sich ein mehr oder weniger stark eitrig getrübtes Serum, danach pflegt bald Heilung einzutreten; indess kann auch der Durchbruch ausbleiben, dann verkleinert sich die Geschwulst allmähig mit Nachlass der Entzündungserscheinungen, doch bleibt in der Regel eine geringe Anfüllung der Bursa und Verdickung ihrer Wand zurück, ein Zustand, welcher später zu einer chronischen Ausdehnung des Schleimbeutels Anlass geben kann. — Die Behandlung der serös-eitrigen Entzündung, die man häufig auch als acutes Hygrom bezeichnet hat, besteht in der Punction mit nachfolgenden feuchtwarmen Umschlägen. — Sehr selten kommen Schleimbeutel-Entzündungen mit spärlichem zähem Erguss vor, welche sich dadurch charakterisiren,

dass bei Bewegungen und Verschiebungen der Wände des Schleimbeutels gegen einander, wie bei der Tenosinitis crepitans, ein knirschendes Geräusch auftritt. Dies eigenthümliche Geräusch entsteht übrigens, obgleich viel schwächer, auch im normalen Zustande an manchen Stellen; wo Sehnen über Knochenvorsprünge hinweglaufen. So findet es sich z. B., nach Marchal, durch das Hin- und Hergleiten des Glutaeus maximus über den Trochanter major. — Bei Pyämischen findet man mitunter einen oder mehrere Schleimbeutel mit Eiter gefüllt, ohne dass eine heftige Entzündung vorher gegangen wäre.

Die chronische Entzündung der Schleimbeutel kommt wohl ebenso häufig vor als die acute; sie erzeugt eine Ansammlung seröser Flüssigkeit, die zuweilen ganz klar und hell ist (das gewöhnliche Hygroma). Manchmal folgt die chronische Entzündung auf eine anfänglich acute, welche schon zur Bildung von Pseudomembranen an der inneren Fläche des Sackes (wie bei Pleuritis) geführt hat; die Wände sind dann verdickt und fahren gewöhnlich fort sich zu verdicken. Auf diese Weise entstehen sehr harte Geschwülste, deren flüssiger Inhalt alsdann viel schwieriger zu erkennen ist. Durch heftige Insulte kann ein durch chronische Entzündung ausgedehnter und verdickter Schleimbeutel in acute Entzündung und Eiterung versetzt werden. Die Suppuration zieht sich dann meistens in die Länge und veranlasst das Zurückbleiben eines sehr hartnäckigen sinuösen Geschwüres. — Die Behandlung der chronischen Entzündungen richtet sich nach den allgemeinen Regeln.

Hygroma ¹⁾.

Man bezeichnet als Hygroma im Allgemeinen eine chronische Anfüllung der Schleimbeutel mit einem mehr oder weniger veränderten Secret. Der Umfang der Geschwulst erreicht oft die Grösse einer Nuss oder gar einer Orange. Aus dem Schleimbeutel vor der Patella bildet sich häufig eine umfangreiche Geschwulst dieser Art. P. Camper sah eine von der Grösse eines Kindskopfes. Die in diesen Höhlen enthaltene Flüssigkeit verhält sich in der Regel wie die in serösen Cysten enthaltene. Wenn die Absonderung schnell und reichlich erfolgt, so besteht sie aus Blutserum. Unter entgegengesetzten Verhältnissen ist sie schmierig, fadenziehend und von citrongelber Farbe; bisweilen hat sie auch durch Beimengung von Blut eine kaffeebraune Farbe erhalten; auch kann sie eitrig getrübt sein. Ausser der Flüssigkeit findet man in den Hygromen häufig lockere fibrinöse

¹⁾ Vgl. Virchow, l. c.

Flocken, feste Fibringerinnsel, Blutgerinnsel, und die schon pag. 845 als Inhalt der Sehnenscheidengeschwulst beschriebenen Körperchen. Bei Gichtischen sind die ausgedehnten Schleimbeutel nicht selten mit einem Kalkbrei erfüllt. Die Wand der hygromatösen Schleimbeutel ist oft sehr bedeutend verdickt, bisweilen an der Innenfläche mit zottigen oder Reiskörperchen ähnlichen Wucherungen besetzt. Der Sack ist nicht selten in mehrere bald mehr bald weniger vollständig mit einander communicirende Kammern getheilt. — Die Hygrome der tiefer liegenden Schleimbeutel sind fast immer dünnwandig und mit einer gelblichen gallertigen Flüssigkeit gefüllt. Sie können, da die tiefer liegenden Bursae auch im normalen Zustande oft mit einem Gelenk in Zusammenhang stehen, mit dem benachbarten Gelenk communiciren, welches dann mitunter gleichfalls hydropisch gefüllt ist. Keineswegs lässt sich in allen Fällen ein vorhandener Zusammenhang mit dem Gelenk durch die Untersuchung nachweisen.

Ursachen. Die Mehrzahl der Beobachtungen spricht für die Ansicht, dass Hygrome in Folge von Quetschung oder anderweitiger mechanischer Reizung entstehen; es kommen jedoch Fälle genug vor, in denen sich solche Ursachen nicht nachweisen lassen.

Im Allgemeinen erlangt das Hygrom erst nach einer Reihe von Jahren einen bedeutenderen Umfang, auf welchem es dann verharret.

Manche Autoren beschreiben ein Hygrom aus innerer Ursache, das plötzlich zum Vorschein kommt, sich rasch entwickeln, aber nur ausnahmsweise einen ebenso bedeutenden Umfang wie das erstere erlangen soll. Dieses Hygrom aus innerer Ursache soll von selbst wieder verschwinden können, und zwar in manchen Fällen ebenso schnell, als es entstand; es soll sich versetzen können, bald in eine Sehnenscheide, bald in einen anderen, mehr oder weniger in der Nähe gelegenen Schleimbeutel, oder aber in ein Gelenk. — In einigen Fällen wechselte es ab mit spontanem Erbrechen. Fälle der Art werden von Cloquet, Anselin und Ollivier angeführt.

Symptome. Das Hygrom bildet sich in der Regel sehr langsam aus, doch hat man es in seltenen Fällen auch ziemlich schnell entstehen sehen. Es veranlasst meist nur sehr geringe Störungen. Die oberflächlicheren Hygrome, welche am häufigsten vor der Kniescheibe beobachtet werden, werden nur lästig durch den Druck, dem sie bei gewissen Körperstellen ausgesetzt sind, und durch die Difformität, welche sie bedingen. Oberflächliche Hygrome am Fuss werden leicht durch den Druck und die Reibung, welche sie von Seiten der Fussbekleidung erleiden, in schmerzhaftes Entzündung versetzt. Tiefer liegende Hygrome können die Bewegungen der Theile erheblich behindern. — Das Hygrom ist übrigens leicht zu erkennen, da es ganz circumscriphte prall-elastische Geschwülste bildet, deren Gestalt und Sitz bei Abwesenheit aller Entzündungserscheinungen uns über die

wahre Natur des Uebels Aufschluss giebt. Zuweilen ist die Geschwulst sogar durchscheinend, was jeden Zweifel auch in Betreff der Beschaffenheit des Inhalts hebt. Dieses letzte Merkmal fehlt, wenn der Inhalt undurchsichtig oder die Wandungen des Hygroms sehr dick sind; alsdann wird auch (was jedoch sehr selten ist) keine Fluctuation wahrgenommen.

Ausgänge. Das Hygrom besteht, sich selbst überlassen, in der Regel das ganze Leben fort; denn meist ist es, seines Sitzes wegen, unaufhörlichen Reizungen durch Reibung und Druck ausgesetzt und wird dadurch unterhalten. In seltenen Fällen wird es in Folge einer zufälligen Quetschung subcutan zersprengt; dann ergiesst sich sein Inhalt in das umliegende Bindegewebe und wird resorbirt. Aber häufig vernarbt der Sack und die Flüssigkeit sammelt sich von Neuem an.

Die **Behandlung** richtet sich beim Hygrom, sofern es nicht gelingt, die Resorption durch Auflegen von Blasenpflaster, Aufpinseln von Jodtinctur u. dgl. m. zu bewirken, nach denselben Grundsätzen, welche in Betreff der Cysten im Allgemeinen angegeben sind. Man muss nicht allein den Inhalt entleeren, sondern auch den Sack entfernen oder zerstören. Selbst dann ist man noch nicht absolut sicher, dass der Sack sich nicht wieder bildet, da Schleimbeutel bekanntlich an geeigneten Stellen leicht accidentell entstehen.

Zuweilen reicht eine Punction hin, um ein Hygrom radical zu beseitigen; doch ist dies selten und jedenfalls nur in denjenigen Fällen möglich, wo das Hygrom nur eine einzige Höhle enthält. Mitunter aber sind diese Geschwülste vielfächerig, so dass eine einfache Punction nicht einmal eine vollständige Entleerung der in dem Sacke enthaltenen Flüssigkeit bewirken kann. Ueberdies sind ganz gewöhnlich ausser der Flüssigkeit noch Gerinnsel oder *Corpora oryzoidea* in ihnen enthalten, welche aus einer kleinen Oeffnung nicht heraustreten können. Deshalb muss man zum Bistouri greifen, auch dann, wenn man beabsichtigt, nachher eine reizende Flüssigkeit einzuspritzen; denn, vor jeder weiteren Behandlung, ist vollständige Entleerung nothwendig.

Die von Velpeau empfohlene Einspritzung von Jodlösung durch dieselbe Troicart-Canüle, mit welcher man die Entleerung bewirkt hat, — mit allen den Vorsichtsmaassregeln, welche für die analoge Operation beim Wasserbruch (Bd. IV.) angegeben werden — ist nur bei dünnwandigen Hygromen mit rein serösem Inhalt anwendbar, hat aber auch bei diesen nicht immer einen vollkommenen Erfolg.

Die beste Behandlung ist, bei nicht allzu erheblicher Dicke des Sackes, die Incision; sie gestattet eine vollständige Entleerung des

Inhaltes, und nöthigen Falls die Einführung solcher Mittel in den Sack, welche geeignet sind, ihn zum Einschrumpfen zu bringen oder ihn auf einmal zu zerstören. — Die Exstirpation des Sackes ist namentlich dann leicht und auch dann nur indicirt, wenn die Geschwulst durch Verdickung des Sackes eine grosse Festigkeit gewonnen hat. — Die Ausschneidung der vorderen Hälfte des Sackes ist auch versucht worden (geschieht entweder nach vorgängiger Incision oder indem man die Hälfte des Sackes zugleich mit der bedeckenden Haut wegnimmt), bedingt aber ebenso sehr wie die Exstirpation die Gefahr weit verbreiteter Eiterung¹⁾ und gewährt nicht denselben Grad von Sicherheit in Betreff des radicalen Erfolges.

Besondere Gefahren entstehen bei allen diesen Operationen aus der, bei den tieferen Schleimbeuteln nicht selten vorkommenden, directen Communication mit einer Gelenkhöhle, oder dem noch häufigeren Zusammenhange mit Schnenscheiden, die ihrer Seits wiederum mit Gelenkhöhlen communiciren könnten. Leider sind alle diese Communicationen höchst inconstant. Vgl. Bd. IV.

Das aus inneren Ursachen hervorgegangene acute Hygrom soll unter einer blos localen Behandlung nicht immer verschwinden. Es soll selbst vortheilhaft sein, es wenigstens eine Zeit lang zu dulden, wenn es mit Erscheinungen auftrat, welche eine heilsame Krise andeuteten. Stünde es im Zusammenhange mit Rheumatismus, so soll man seine Bemühungen zunächst gegen diese ursächliche Bedingung richten, und dann erst die örtliche Behandlung folgen lassen.

¹⁾ Velpeau, Archives de médecine, Paris 1826, Tom. XI. pag. 563.

Zehnter Abschnitt.
**Von den Krankheiten der Muskeln
und Sehnen¹⁾.**

Erstes Capitel.

Von den Verletzungen der Muskeln und Sehnen.

I. Wunden der Muskeln und Sehnen.

A. Stichwunden. Seit man die Sehnen nicht mehr mit den Nerven verwechselt, hat man auch aufgehört, ihren Verletzungen durch stechende Instrumente eine besondere Bedeutung beizulegen. Treten nach einer Sehnenverletzung bedenkliche Zufälle auf, so hängen sie entweder von der Verletzung der Sehnenscheide (auch wohl eines benachbarten Nerven) ab, oder es handelt sich um eine durch die umgebenden Aponeurosen eingeklemmte Entzündung. Wichtig ist zu unterscheiden, ob das stechende Instrument einfach seine ursprüngliche Richtung verfolgt, oder dieselbe unter der Haut in der Weise ändert, dass der Sehne eine Schnitt-, vielleicht auch Risswunde beigebracht wird. Diese subcutanen Schnittwunden haben mit den Stichwunden gar nichts gemein. Befangen in der irrthümlichen Verwechslung von Nerven und Sehnen, lehrte man früher, dass die unvollständige Trennung einer Sehne durch einen Schnitt zu einer vollständigen gemacht werden müsse, während doch die unverletzt gebliebenen Sehnenfasern höchst nützlich sind, indem sie das weitere Klaffen der Sehnenwunde verhindern und daher schnelle Vernarbung begünstigen. Jedoch scheint in einigen Fällen, namentlich bei Stichwunden der Achillessehne, in der That eine Dilatation der Wunde

¹⁾ Mit Ausnahme des I. Capitels, ist dieser Abschnitt von Herrn Prof. Dr. v. Ziemssen in München bearbeitet.

nothwendig geworden zu sein, — wegen Einklemmung der Entzündungsgeschwulst durch die ungetrennt gebliebenen Sehnenfasern.

B. Schnittwunden. Bei Querwunden der Sehnen ist die Blutung, wenn nicht zufällig ein benachbartes Gefäss mit verletzt ist, sehr gering, der Schmerz unbedeutend, wenn nicht nebenbei ein Nervenast getroffen ist. Vorzugsweise deutlich zeigen diese Wunden das Klaffen der Wundränder. Ist mit einem Muskel zugleich die bedeckende Haut durchschnitten, so sieht man die von einander weichenden Ränder des Muskelschnitts. Blieb die Haut unverletzt, so kann man dieselbe an der Stelle der Muskelwunde in die Tiefe der Wunde, und zwar bei vollständiger Durchschneidung der Dicke des Muskels entsprechend tief eindrücken. Bald aber füllt sich dieser Raum mit Blut, so dass er in der nächsten Zeit nicht mehr bestimmt erkannt werden kann. Muskelwunden klaffen, *ceteris paribus*, stärker als Sehnenwunden, weil die an den Wundflächen Statt findende Reizung die Muskelbündel und die um sie herum verlaufenden Nervenfibrillen direct trifft. Bei gänzlicher querer Trennung eines Muskels zieht sich das längere Ende desselben stärker zurück als das kürzere. In gleicher Weise klaffen die Wunden lang gestreckter Muskeln stärker, als diejenigen kurzer. Ist eine Sehne ganz durchschnitten, so wird derjenige Theil, welcher mit dem Muskelbauche zusammenhängt, durch die Contraction des letzteren stark zurückgezogen. Das andere Ende erleidet keine Verkürzung, kann aber indirect durch die Wirkung der Antagonisten des zugehörigen Muskels zurückgezogen werden. So z. B. das untere Ende der Achillessehne durch die Wirkung des *Tibialis anticus* und der Extensoren der Zehen.

Der Heilungsprocess ist verschieden, je nachdem diese Wunden *subcutan* oder mit Trennung der Haut complicirt sind.

a) Bei *subcutanen* Durchschneidungen der Muskeln und Sehnen erfolgt die Heilung wiederum in verschiedener Weise, je nachdem die Wundränder sich berühren oder nicht. Im ersteren Falle erfolgt die Heilung durch *prima intentio*, im zweiten dagegen wird der Raum zwischen beiden Anfangs durch Exsudat ausgefüllt, welches späterhin von den neuen Sehnenfasern, welche von den beiden Enden der getrennten Sehnen oder Muskeln einander entgegen wachsen, verdrängt wird. Im Verlauf einiger Monate schrumpft die Narbe, welche in der Muskel-, wie in der Sehnenwunde aus fibrösem Gewebe besteht, durch Narbenverkürzung allmähig immer mehr zusammen, und Muskel sowohl als Sehne können schliesslich beinahe zu derselben Form und Länge zurückkehren, welche sie vor der Verletzung hatten. Von grosser Bedeutung für die vollständige Wiederherstellung einer durch-

schnittenen Sehne ist die Integrität der Sehnenscheide; je weniger sie zerstört ist, desto sicherer hat man die Wiederherstellung der Continuität der Sehne zu erwarten. Das neugebildete Stück Sehne hat schliesslich, mit Ausnahme der Farbe, welche weniger glänzend ist, alle Eigenschaften des Sehnengewebes. Die Störung in der Function des Muskels beruht fernerhin nur auf der durch die Interposition dieses Narbenstücks bedingten Verlängerung und der Festheftung des letzteren entweder an die Sehnenscheide oder an andere Nachbargebilde. Ist der Zwischenraum zwischen den getrennten Enden eines Muskels oder einer Sehne sehr bedeutend, oder wird die Haut auf irgend eine Weise in die oben beschriebene Vertiefung zwischen den Wundflächen eingepresst, so vernarbt jedes Ende für sich, es tritt keine Vereinigung ein und die Function des entsprechenden Muskels ist vernichtet. Ebenso verhält es sich meist, wenn mit einer Sehne zugleich ein benachbarter Schleimbeutel oder eine Gelenkkapsel verletzt ist, indem die aus den gedachten Höhlen hervorquellende Flüssigkeit die Heilung stört.

Ueber die Wiederherstellung der subcutan durchschnittenen Sehnen und Muskeln hat man, besonders seit Einführung der Tenotomie, ähnlich wie für die Callusbildung, eine grosse Anzahl von Theorien aufgestellt. Die Sache verhält sich hier wie dort: es wirken mehrere Factoren zugleich. Den ersten Platz behauptet jedenfalls die von dem Muskel und der Sehne selbst ausgehende Neubildung.

b) Ist die Wunde eine offene, so ist der Vorgang verschieden, je nachdem ein Muskel oder eine Sehne durchschnitten ist. Bei einem Muskel kann unter sonst günstigen Verhältnissen, wenn die Muskel-Enden sich nicht allzusehr zurückgezogen haben, durch zweckmässige Behandlung noch oft Heilung per primam intentionem erzielt werden; bei offenen Sehnenwunden selten. Man sieht die Sehnen vielmehr lange Zeit bloss und ohne Lebenszeichen in der Wunde liegen; endlich zeigen sich Gefässe in ihnen, sie werden roth, Fleischwärtchen wachsen auf den Schnittflächen und verschmelzen allmählig mit den von den benachbarten Theilen aus hervorsprossenden. Endlich wird der ganze Zwischenraum durch letztere ausgefüllt und die Narbenverkürzung beginnt, so dass schliesslich die Continuität der Sehne vollständig wieder hergestellt wird, mit dem einzigen Unterschiede, dass bei diesem Heilungsvorgange die Sehnennarbe nothwendig mit den umgebenden Theilen verwächst. Hieraus entsteht immer eine Störung in der Function des betreffenden Muskels, durch dessen Zusammenziehungen die Sehne nicht frei und daher auch nicht vollständig bewegt werden kann. Die Haut wird im Augenblicke der

Contraction des Muskels mit der Sehne zugleich bewegt, folgt derselben, so weit es ihre Dehnbarkeit gestattet, und bildet deshalb bei jeder Anspannung durch den Muskel an der Stelle der Verwachsung eine trichterförmige Vertiefung. In ganz ähnlicher Weise erfolgt die Heilung, wenn durch Verschwärung oder Brand ein Substanzverlust in der Continuität einer Sehne herbeigeführt worden ist. Ein ähnlicher Vorgang und Erfolg wird auch beobachtet, wenn bei subcutanen Sehnenwunden eine irgend beträchtliche Eiterung eintritt.

Behandlung. Möglichst genaue Vereinigung der verwundeten Sehnen- oder Muskel-Enden und Abhaltung jeder Irritation sind die zu erfüllenden Aufgaben. Eine tief angelegte Naht würde der ersteren Indication vorzüglich entsprechen; jedoch wird sie von vielen Autoren wegen der mit ihr verbundenen Reizung bei Sehnenwunden gefürchtet. In der Mehrzahl der Fälle ist auch eine zweckmässige Lagerung ausreichend. Für die Ausführung der Sehnennaht bedarf man sehr scharfer Nadeln; die Schwierigkeit, das Sehnengewebe ohne beträchtliche Zerrung zu durchstechen, ist weniger gross, wenn man Nadeln anwendet, welche zweischneidig sind, so dass ihre Flächen den zu durchstechenden Sehnenfasern parallel laufen, und letztere nicht quer durchschnitten werden. Besteht keine Hautwunde, so kann auch von der Sehnennaht keine Rede sein; dagegen wird man, auch wenn letztere nicht in Anwendung gezogen werden soll, die mit Sehnenverletzung complicirte Hautwunde doch durch die Naht oder die Anlegung von Serres-fines in die zur Erzielung von prima intentio geeignetsten Verhältnisse zu bringen suchen, da die Aussicht auf eine günstige Vereinigung der Sehnen-Enden desto grösser ist, je weniger lange sie der Luft ausgesetzt bleiben. Nächst zweckmässiger Lagerung muss ein angemessener Verband die Sehnen-Enden einander nähern. Oft ist hierzu eine Rollbinde ausreichend, in manchen Fällen aber muss man, um die Theile in der gehörigen Lage unbeweglich zu erhalten, Schienen oder complicirte Verbände zu Hülfe nehmen, so z. B. bei Durchschneidung der Achillessehne oder des Ligamentum patellae, welches auch in dieser Beziehung als die Fortsetzung der Strecksehnen zu betrachten ist.

Wenn die Enden einer durchschnittenen Sehne, ohne sich zu vereinigen, vernarbt sind, so muss man dieselben, um die Function des Muskels wieder herzustellen, durch einen Längsschnitt bloss legen, anfrischen und nach gehöriger Annäherung durch zweckmässige Lagerung, nöthigenfalls auch Ausschälung aus den mit ihnen verwachsenen Theilen, durch die Naht vereinigen. Für eine Sehne von 5 Millimeter Breite reicht eine Naht aus; bei breiteren legt man eine

entsprechend grössere Zahl an. Die Nadeln müssen 5—7 Millim. von dem angefrischten Ende entfernt durch die ganze Dicke der Sehne geführt werden. Nachdem die Fäden geknotet sind, verfährt man mit ihnen wie mit Ligaturfäden; die Hautwunde wird möglichst genau vereinigt. Die Nähte in der Sehne lösen sich, wenn man Seidenfäden angewandt hat, durch Verschwärung des von ihnen umfassten Stückchens der Sehne sehr langsam, dürfen aber niemals mit Gewalt, sondern immer erst, wenn sie sich vollständig gelöst haben, durch leisen Zug entfernt werden. Näht man mit carbolisirten Darmsaiten, so ist eine solche Lösung nicht erforderlich und wahrscheinlich ein besserer Erfolg zu erwarten. Vgl. pag. 118.

C. Zerreibungen der Muskeln und Sehnen haben in Betreff des Mechanismus der Verletzung und Heilung grosse Aehnlichkeit mit Knochenbrüchen. Gewöhnlich ist eine übermässige Dehnung entweder durch äussere Gewalt oder durch Muskelzusammenziehung die Ursache. So beruht z. B. die Zerreibung der Achillessehne auf übermässiger oder doch sehr plötzlicher Zusammenziehung der Wadenmuskeln, wie sie in dem Augenblick, wo man einen Fall zu vermeiden sucht, oder von einer Treppenstufe abgeleitet, zu Stande kommt. Sehnen zerreiben im Allgemeinen leichter als Muskeln, besonders sind Zerreibungen eines Muskels durch seine eigene Contraction überaus selten. Sédillot¹⁾ fand, dass unter 28 Fällen, in denen die Stelle der Zerreibung genau bemerkt war, 13 Mal die Verbindungsstelle zwischen den Muskel- und Sehnenfasern und nur 8 Mal der Muskelbauch selbst zerrissen war. Die anatomischen Verhältnisse lassen diese Thatsache leicht erklärlich erscheinen.

Jede Muskelzerreibung liefert eine unebene Wunde, indem die einzelnen Muskelbündel in verschiedenem Grade nachgeben und an verschiedenen Stellen reissen. Dagegen zeigt eine zerrissene Sehne glatte Trennungsflächen, so dass es schwer sein kann, den Unterschied von einer Durchschneidung zu erkennen.

Fascien, welche Muskelscheiden bilden oder die Muskeln in gewissen Richtungen festhalten, können durch die Anschwellung eines Muskelbauchs während heftiger Zusammenziehung desselben zersprengt werden. Solche Zerreibungen, welche jedoch nur selten mit Sicherheit nachgewiesen werden können, sollen sehr schmerzhaft sein. Sie geben zu dem Hervorquellen des Muskelbauchs, einer Art von Dislocation desselben, Veranlassung, die man als Muskelhernie beschrieben und zum Unterschiede von analogen Dislocationen, welche

¹⁾ Mémoire sur la rupture musculaire. Mémoires et prix de la Soc. de méd. de Paris. Paris 1817, pag. 155 et suiv.

durch vorausgegangene Verwundung der Fascie entstanden sind, auch „spontane Muskelhernien“ genannt hat¹⁾). Sollten sie Beschwerden erregen, so kann man bis auf den Muskel incidiren, die Wunde durch Eiterung heilen lassen, worauf dann voraussichtlich durch die festere Narbe die Hernie zurückgehalten wird.

Im Augenblick der Zerreiſſung einer Sehne hört der Kranke zuweilen ein deutliches Geräusch und hat eine plötzlich erschütternde Schmerzempfindung, als wäre er durch einen Steinwurf oder einen Peitschenhieb getroffen; daher der Name „*coup de fouet*“, den man insbesondere der Zerreiſſung der Achillessehne in Frankreich giebt. Der Schmerz geht bald vorüber, spätestens nach einigen Tagen, aber es bleibt ein Gefühl von Schwere und Steifigkeit, und der Muskel, dessen Sehne zerrissen ist, kann nicht bewegt werden. An der Stelle der Zerreiſſung fühlt man, wenn der Muskel oder die Sehne oberflächlich liegt, eine, je nach der Länge und Dicke des Muskels verschiedene starke Vertiefung, welche durch absichtliche Bewegung der Antagonisten vergrößert wird. Bei Zerreiſſung des Muskels wird diese Vertiefung schneller als bei derjenigen einer Sehne durch einen Blut-Erguss ausgefüllt, was sich leicht aus dem grösseren Gefässreichthum des ersteren erklärt.

Die Bedeutung dieser Zerreiſſung ist vorzüglich von der Gegend, in welcher der zerrissene Muskel seine Lage hat, abhängig. Daher sind namentlich Zerreiſſungen der Muskeln des Rumpfes als schwere Verletzungen zu betrachten²⁾). Bei den Muskeln und Sehnen der Extremitäten kommt es auf die Wichtigkeit ihrer Function an. Für das Leben sind Muskelzerreiſſungen im Allgemeinen gefährlicher als Zerreiſſungen der Sehnen, hauptsächlich wegen der bei ersteren auftretenden Blut-Ergüsse.

In Betreff des Heilungsvorganges und der Behandlung verhalten sich diese Zerreiſſungen, sofern nur die Haut unversehrt geblieben ist, vollständig wie subcutane Wunden.

D. Quetschungen der Muskeln sind nicht so selten, als man nach der geringen Rücksicht, die man ihnen gewöhnlich zuwendet,

¹⁾ Vgl. Mourlon, *Essai sur les hernies musculaires, précédé de quelques considérations sur les autres déplacements des muscles.* — *Mém. de méd., chir. et pharm. milit.* 1861.

²⁾ Boyer erwähnt zwei Fälle der Art, welche zum Tode führten; der eine betraf den *Rectus abdominis*, der andere den *Psoas*. Ob diesen Muskelrupturen vielleicht auch schwere Allgemeinleiden zu Grunde lagen, die an sich tödtlich waren, wie in den von Virchow beobachteten Fällen (vgl. pag. 867), lässt sich nicht entscheiden.

glauben sollte¹⁾. Zuweilen findet sich blos eine Art von Betäubung des Muskels, analog der Gehirn-Erschütterung; hierbei kann der Muskel erschlaft oder in andauernde Contraction versetzt sein. Wurde der Muskel von einer Quetschung betroffen, während er sich stark zusammenzog, so bleibt er oft starr, in anderen Fällen aber auch vollkommen schlaff, so lange der Kranke ihn nicht zu bewegen versucht. Sobald dies aber geschieht, geräth er in ein krampfhaftes Zittern, welches mit heftigen Schmerzen verbunden ist. Wahrscheinlich sind diese noch dunklen Erscheinungen an den gequetschten Muskeln aus verschiedenen anatomischen Veränderungen abzuleiten, da es sich bei jeder Muskelquetschung zugleich um eine Erschütterung, und in bedeutenden Fällen auch gleichzeitige Quetschung der in dem Muskel verlaufenden Nervenzweige, ausserdem aber um die Veränderungen der Muskelsubstanz selbst handeln muss, welche in partiellen Zerreibungen, mehr oder weniger bedeutendem Blut-Erguss und späterhin in Verdrängung der Muskelfasern durch ein entzündliches Exsudat bestehen können. Hieraus ergiebt sich denn auch die mögliche Gefahr der Muskelquetschung: bald Lähmung wegen aufgehobenen Nerven-Einflusses, bald Atrophie durch Entzündung (vgl. d. flgd. Cap.). In der Mehrzahl der Fälle aber, sofern nämlich die Muskelquetschung durch eine geringfügige Gewalt veranlasst war, kehren die erschütterten Nerven zu ihrer normalen Thätigkeit zurück und die Blut-Ergüsse werden, ohne weitere Nachtheile zu hinterlassen, resorbirt.

E. Gequetschte Wunden der Muskeln und Sehnen führen immer zur Eiterung. Zwischen dem Heilungsvorgange nach einer solchen Verletzung und demjenigen einer subcutanen Zerreibung, wenn sie auch noch so bedeutend ist, findet sich ein sehr grosser Unterschied zum Nachtheil der ersteren. Glücklicher Weise weichen die Sehnen solchen Verletzungen durch ihre Festigkeit, Elasticität und Beweglichkeit, so wie durch ihre glatte, rundliche Oberfläche sehr häufig aus. Dies gilt namentlich für Schussverletzungen. Ist eine Sehne nicht sehr breit, so wird sie von der Kugel nur in dem Falle durchbohrt, wenn sie durch jene gegen einen Knochen angepresst wird, und letzterer also gleichsam als Stützpunkt ihr Ausweichen verhindert. Wird eine Sehne durch eine noch sehr kräftige Kugel getroffen, so reisst sie dennoch oft nicht an der getroffenen Stelle, sondern die Trennung erfolgt weiter oben an der Verbindungsstelle zwischen Sehne und Muskel oder auch noch weiter aufwärts im Muskelbauch selbst, welcher alsdann unter der Haut hervorgezogen und weit hinaus

¹⁾ Vgl. Allison, Gazette médic. 1842, pag. 696.

geschleudert werden kann. Alsdann findet man da, wo der Muskelbauch liegen sollte, eine nach und nach mit Blut sich ausfüllende Vertiefung, welche nur langsam durch Granulationen ausgefüllt wird. Verletzungen der Art machen einen erschreckenden Eindruck. Man hat sie vorzugsweise am Vorderarm und Unterschenkel und zwar nicht bloß in Folge von Schussverletzungen, sondern auch durch andere stumpf wirkende Gewalten, namentlich Maschinen, entstehen sehen.

Ich habe Verletzungen der Art mehrmals an dem *Tibialis anticus* bei complicirten Fracturen, welche durch Dreschmaschinen bewirkt waren, und zwei Mal an dem *Extensor pollicis longus* beobachtet. In einem der letzteren Fälle hatte ein Ochs dem ihn führenden Fleischergesellen, der den Strick um seine Hand gewickelt hielt, durch dessen Vermittelung die letzte Daumenphalanx ab- und mit ihr zugleich die lange Strecksehne sammt wenigem Muskelfleisch herausgerissen.

Muskeln werden von Geschossen sehr leicht durchdrungen. Der Schusseanal ist selten cylindrisch, weil nicht alle Fasern in dem Augenblicke, wo sie getroffen werden, in gleicher Spannung sich befinden, auch nach der Trennung sich nicht alle gleichmässig zurückziehen. — Die Behandlung weicht von den allgemeinen Principien nicht ab.

II. Verrenkungen der Muskeln und Sehnen.

Muskelverrenkungen werden im Munde des Volkes viel häufiger erwähnt als in den Schriften der Aerzte. Was die Laien aber als Verrenkung eines Muskels bezeichnen, ist gewöhnlich eine Verstauchung oder eine Gelenk-Entzündung, zuweilen auch eine partielle Muskelzerreißung durch übermäßige Anstrengung. Es kommen jedoch wirkliche Verrenkungen einzelner Muskeln und Sehnen, unabhängig von Verrenkungen der benachbarten Knochen, d. h. subcutane Ortsveränderungen, in der That vor.

Hippokrates sagt bei Gelegenheit der Verrenkungen des Unterkiefers: „Der Unterkiefer wird selten verrenkt, aber erfährt beim Gähnen häufig eine Verschiebung, wie sie auch andere Verschiebungen der Muskeln und Sehnen herbeiführen.“ Diese Stelle ist, wie Littré¹⁾ mit Recht bemerkt hat, sehr dunkel. Nach Littré's genauen Untersuchungen erwähnt erst 1694 W. Cooper einen Fall von Muskelverrenkung und zwar am langen Kopf des *Biceps brachii*. Diese Beobachtung haben auch Manget und Petit-Radel²⁾ erwähnt. Pouteau spricht von solchen Verletzungen, führt aber keinen einzigen Fall auf. Dagegen bemerkt Portal, dass er bei der Section eines von bedeutender Höhe herabgestürzten Menschen unter der *Fascia lata* einen grossen Blut-Erguss und den *Musc. rectus femoris* aus seiner Scheide (d. h. aus den ihn umfassenden Fortsätzen der *Fascia lata*) herausgetreten gefunden habe. Die vollständigste Zusammenstellung verdanken wir dem Prof. d. Naturgeschichte Ch. Martins

¹⁾ Vgl. *Oeuvres d'Hippocrate*, édit. de M. Littré; Paris 1844, T. IV. pag. 22.

²⁾ *Encyclop. méthodique. Chirurgie*, T. II. pag. 212.

in Montpellier, welcher eine Ausrenkung der Sehne des Tibialis posticus bei Gelegenheit einer Luftschiffahrt in seinem 67 Jahre an sich selbst erlebte (Note sur un cas de luxat. du m. tibial post etc., Paris 1874).

Die einzige anatomische Untersuchung, welche in der Literatur als Beweisstück für das Vorkommen einer wirklichen Muskel- oder Sehnenverrenkung aufgeführt wird, ist die von J. Soden beschriebene Dislocation des langen Kopfes des *Musc. biceps brachii*.¹⁾ Wenn Soden ausdrücklich sagt, dass hierbei jede Complication gefehlt habe, so muss dies auf Grund der von ihm selbst gegebenen Beschreibung in Zweifel gezogen werden, da aus derselben hervorgeht, dass bei der Section Spuren vorausgegangener, sehr beträchtlicher Entzündung des ganzen Schultergelenks gefunden wurden. Vgl. pag. 719.

Ist somit auch der anatomische Nachweis der Muskelverrenkungen noch zu liefern, so soll an ihrer Möglichkeit deshalb nicht gezweifelt werden. Dass sie mit Knochen-Verrenkungen zugleich vorkommen, wurde namentlich bei den Schulter-Verrenkungen erwähnt. Ohne Betheiligung eines Gelenkes werden am Häufigsten die *Mm. peron. long. und brevis* verrenkt, vom *Tibial. postic.* und von Finger-Sehnen liegen nur ganz vereinzelte Beobachtungen vor.

Das Wesentliche an diesen Verletzungen ist die Zerreiſsung der Sehnenscheide, die durch übermässige Muskelspannung bei einem Fall zu Stande kommt. Gegen diese ist auch die Therapie zu richten. Man muss die Sehne so lange mechanisch (durch erstarrende Verbände und absolute Ruhe) in der zerrissenen Scheide zurückhalten bis diese geheilt ist. Darüber vergehen mehrere Monate.

Zweites Capitel.

Von der Entzündung der Muskeln und Sehnen.

Die Entzündung der Muskeln, *Myositis* s. *Myitis*, ist, wenn wir von Verletzungen und von der Uebertragung der Entzündung von anderen benachbarten Geweben her absehen, eine verhältnissmässig seltene Krankheit. Jedoch geht man entschieden zu weit, wenn man eine nicht traumatische primäre Muskel-Entzündung überhaupt in Zweifel zieht. Die Veränderungen betreffen allerdings die eigentliche Muskelsubstanz, d. h. die Muskelprimitivbündel nur secundär, indem die Exsudation in dem gefässreichen Bindegewebe, welches jene um-

¹⁾ Medico-Chirurgie. Transactions of London, 1811. T. XXIV. pag. 212. Vgl. auch Gurtt, l. c. pag. 281. Nach der ganzen Beschreibung von Soden muss man schliesslich sagen: Non liquet.

hüllt, Statt findet. Durch die entzündliche Wucherung entsteht entweder unter Verdrängung und Atrophie der Primitivbündel Bindegewebsneubildung (Narbensubstanz), oder Eiterung. Ob auch eine wirkliche Hypertrophie der Muskeln in Folge von Entzündung Statt finden kann, lässt sich zur Zeit noch nicht mit Bestimmtheit entscheiden¹⁾, ist aber nach den Beobachtungen, welche Engel an organischen Muskeln, Bruch am Pylorus und A. Bardeleben²⁾ an den Intracostalmuskeln gemacht haben, als sehr wahrscheinlich anzusehen.

Die Veränderungen der Primitivbündel in Folge von Entzündung bestehen darin, dass die Querstreifung zunächst unendlich wird, eine körnige Infiltration oft mit Dickenzunahme der Faser auftritt, das ganze Bündel mehr homogen und gallertig erscheint, an einzelnen Stellen wulstartig aufquillt und im Ganzen weicher und blasser wird. Diese Veränderungen, welche Virchow als „entzündliche Erweichung“ zusammengefasst hat, führen entweder zu einer wirklichen Auflösung des Muskelprimitivbündels, nachdem auch das Sarkolemma erweicht und zerflossen ist, oder zur fettigen Entartung, bei welcher das Sarkolemma erhalten bleiben kann, während die von ihm umschlossenen Fibrillen aufgelöst, und die aus ihrer Auflösung entstandene Gallerte in der anderweitig geschilderten Weise zu Fett umgewandelt wird. Neuerdings ist die Vermehrung und Wucherung der Muskelkerne (Muskelkörperchen) als eine constante Veränderung bei der Muskel-Entzündung von Waldeyer³⁾ nachgewiesen.

Bei höherem Grade und acutem Charakter der Entzündung entstehen zwischen den Muskelfasern reichliche junge Zellen, welche die Muskel-Eiterung und durch Zusammenfliessen nach dem Zerfalle der Primitivbündel den Muskel-Abscess bilden.

Muskel-Abscesse können unter gänzlicher Zerstörung der Primitivbündel eine solche Ausdehnung erreichen, dass sie einen grossen mit Eiter gefüllten Sack darstellen, dessen Hülle das Perimysium ist. Fälle der Art sind namentlich am Psoas beobachtet. Kleinere Abscesse findet man in Amputationsstümpfen und auch in sonst unversehrten Muskeln bei Pyämie. Verknöcherung tritt in chronisch entzündeten Muskeln, namentlich in der Nähe ihrer Insertion am Knochen, nicht ganz selten auf. Hier entsteht dann die in pathogenetischer Beziehung interessante Frage, ob in solchen Fällen die Entzündung der Muskeln, oder diejenige der Knochen als das primäre Uebel anzusehen sei.

¹⁾ Vgl. Carl Wedl, Grundzüge der patholog. Histologie, Wien 1853, pag. 227 u. 282.

²⁾ Virchow's u. Reinhardt's Archiv f. path. Anat. Bd. I. Hft. 3.

³⁾ Ueber die Veränderungen der quergestreiften Muskeln bei Entzündung etc. Virchow's Archiv Bd. XXXIV. pag. 473 ff.

Ohne gleichzeitige Entzündung benachbarter Knochen findet man Verknöcherung der Muskeln und Sehnen sehr selten (vgl. pag. 869).

Ursachen der primären Muskel-Entzündung sind: Verletzungen und fremde Körper, Erkältungen, secundäre Syphilis, embolische und thrombotische Verstopfung der Gefäße.

Die Entzündung der Muskeln verläuft bald acut, bald chronisch. Erstere entsteht namentlich durch Verletzungen oder heftige Erkältungen (besonders mit Durchnässung) — sogenannter acuter Muskel-Rheumatismus. Letztere ist oft ein Ausgang der ersteren, entsteht aber auch in Folge oft wiederholter und anhaltender Reizungs-Hyperämie (rheumatischer, mechanischer), sowie der Verbreitung der chronischen Entzündung eines Knochens oder Gelenkes auf den Muskel.

Die localen Symptome der acuten Muskel-Entzündung sind: Schmerz, Anschwellung, Hitze (zumal bei oberflächlichen Muskeln), mehr oder weniger heftige Krämpfe, die bei jedem Versuch einer Bewegung hervortreten. Auch die Schmerzen werden vorzugsweise durch Bewegungen veranlasst und immer hauptsächlich an den Enden des Muskels, dem Ursprunge und der Insertion, empfunden. Die Anfangs absichtlich vermiedenen Bewegungen werden späterhin unmöglich; der Muskel verliert allmähig an Dicke, wird hart, starr, andauernd zusammengezogen, ohne dass der Wille mehr Einfluss auf ihn hätte; die Contraction wird zur Contractur. Hieraus ergeben sich die verschiedenen Difformitäten, welche durch Muskel-Entzündung bedingt werden; hieraus erklärt sich ferner, weshalb hohle Organe mit muskulösen Wandungen, wenn letztere entzündet sind, weder hinreichend ausgedehnt, noch vollständig entleert werden können (Herz, Harnblase, Mastdarm). Oft findet sich Fieber bei der acuten Muskel-Entzündung.

Bei der chronischen Entzündung, mag sie aus der acuten oder anderweitig entstanden sein, sind die Schmerzen geringer und treten nur bei passiven Bewegungen des Muskels auf. Zu activen Bewegungen wird der allmähig in Contractur verfallene Muskel bald unfähig.

Selten, — mit Ausnahme der rheumatischen — nimmt die Muskel-Entzündung ihren Ausgang in Zertheilung. Häufig bleibt, zumal wenn die Krankheit einen chronischen Verlauf angenommen hat, Verhärtung (Contractur) und Schwielenbildung, zuweilen Verknöcherung zurück. Dies beruht auf der oben erörterten Verdrängung der Primitivbündel durch das neugebildete, allmähig schrumpfende Bindegewebe. Eine eigenthümliche Form der chronischen Myositis ist die ossificirende. Die Knochenneubildung im Muskel ist entweder auf gewisse Körperstellen beschränkt, welche oft wiederholten Traumen

ausgesetzt sind, oder tritt ohne nähere Veranlassung in vielen Muskeln, besonders in den Rückenmuskeln, auf. Der erstere Fall ist der häufigere, und zwar wurde die Bildung einzelner Knochen vorzüglich bei Soldaten im M. deltoïdes (Exercierknochen) und den Adductores der Schenkel (Reiterknochen) gefunden. Ruptur ist ein nicht seltener Ausgang der Muskel-Entzündung, während bei sonst gesunden Muskeln eine Zerreiſung selbst bei der Einwirkung bedeutender Gewalt höchst selten zu Stande kommt¹⁾. Eiterung, Verschwärung und Brand sind seltenere Ausgänge; brandig werden die Muskeln nur bei gleichzeitiger Zerstörung ihrer Umgebungen; Eiterbildung in ihnen kommt, ausser bei Pyämie, nur bei dyskrasischen, namentlich bei scrophulösen Subjecten vor. Erfolgt der Aufbruch eines Muskel-Abscesses, so tritt fast immer Verjauchung ein, welche gewöhnlich zum Tode führt.

Die **Behandlung** der Muskel-Entzündung muss in einer energischen Antiphlogose bestehen, um wo möglich Zertheilung herbeizuführen. Von Wichtigkeit ist es, den Theil, an welchem die Muskel-Entzündung ihren Sitz hat, in der Art zu lagern, dass der kranke Muskel möglichst erschläft ist, um dadurch der schmerzhaften Spannung und den Krämpfen entgegen zu wirken. Mit Rücksicht auf letztere und auf den Schmerz wendet man ausserdem Narcotica, besonders Morphium, an, welche subcutan injicirt am promptesten wirken. Auch Chloralhydrat kann hier von grossem palliativen Nutzen sein. Die Behandlung der Contractur (d. h. der Verkürzung) kann, so lange Entzündung besteht, nicht begonnen werden.

Die Entzündung der Sehnen ist vielfach gelegnet worden²⁾. Nach den jetzt bekannten Thatsachen über den Wiederersatz und die Neubildung von Sehnen kann an ihrer Betheiligung an der Entzündung nicht gezweifelt werden. Ueberdies sieht man von den blossliegenden Sehnen aus deutlich Granulationen aufwachsen. Allerdings stösst sich aber, wenn die Sehne vollständig entblösst ist, die oberflächliche Schicht derselben brandig ab, und erst aus der Tiefe wachsen demnächst (wie am entzündeten Knochen um einen exfolirten Sequester) die Granulationen empor. In Betreff der Behandlung der Sehnen-

¹⁾ Rupturen worden am häufigsten am M. rectus abdominis im Verlauf schweren Allgemeinlebens, vor Allem bei Typhus beobachtet, und von den meisten Autoren (Virchow, Buttcher, Leubuscher, Waldeyer u. A.) die entzündliche Natur der die Ruptur bedingenden Primärveränderungen festgehalten, während Zenker die letztere auf die sogenannte „wachsartige“ Degeneration zurückführt. (Ueber die Veränderungen der willkürlichen Muskeln im Typhus abdom. etc. Leipzig 1864. pag. 87.)

²⁾ Vgl. Richet, Annales de la chirurgie, Tom. XI.

Entzündung sind nur die bei den Sehnen-Wunden angegebenen Momente zu berücksichtigen. Ist die Entzündung nicht traumatischen Ursprungs, so kann sie nur von den umgebenden Gebilden her auf die Sehne übertragen sein, in welchem Falle die Behandlung sich auch lediglich nach dem Zustande jener richtet.

Drittes Capitel.

Von der Verkürzung der Muskeln, Contractura.

Aetiologie. Bei der allgemeinen Besprechung der Verkrümmungen (Bd. I. pag. 770 u. flg.) haben wir bereits hervorgehoben, in welcher Weise andauernde Verkürzung der Muskeln von Krankheiten des Nervensystems abhängig sein kann. Man kann in dieser Beziehung primäre (irritative oder spastische) und secundäre (paralytische) Contracturen unterscheiden.

Bei der paralytischen Contractur verleiht der permanente Lähmungszustand gewisser Muskelgruppen ihren Antagonisten ein Uebergewicht, welches sich zunächst als Verkürzung äussert. Diese Contraction geht in der Folge in Contractur über.

Die primären (spastischen oder irritativen) Contracturen entstehen entweder durch einen direct auf motorische Nerven ausgeübten Reiz — mag derselbe nun central (apoplektische Narbe, entzündliche Erweichung, Hirntumor) oder peripherisch (Druck durch Geschwülste, Narben etc.) gelegen sein; oder sie beruhen auf einer Reizung sensibler Nerven, welche, auf motorische Nerven reflectirt, sich als Contraction und Contractur äussert (Reflexcontractur). Letztere werden am Häufigsten vorübergehend bei sehr schmerzhaften chirurgischen Affectionen beobachtet¹⁾, wie bei Fracturen, wo die scharfen Bruch-Enden als Reiz wirken, bei Luxationen, bei Muskel-Entzündungen, Gelenk-Entzündungen, Schusswunden. Hierher ist auch zu zählen die Contractur des Sphincter ani bei Affectionen der Mastdarmschleimhaut, Fissura ani etc., des Sphincter vesicae bei Entzündung der Schleimhaut des Blasenhalses, sowie die äusserst schmerzhaften Contracturen nach der Einwanderung von Trichinen in das Muskelsystem.

Eine genauere Erwähnung verdienen diejenigen Reflexcontracturen, welche durch Entzündung des Muskelfleisches selbst gesetzt werden, nämlich die rheumatische und die syphilitische Contractur.

¹⁾ Vgl. Blasius, Ueber Stabilitäts-Neurosen. Archiv für physiol. Heilkunde, 1851.

Der acute Muskelrheumatismus wurde schon von Lobstein¹⁾ als Muskel-Entzündung angesehen. Später haben Froriep²⁾ und Virchow³⁾ es höchst wahrscheinlich gemacht, dass es sich beim Muskelrheumatismus stets um entzündliche Vorgänge in den Muskeln handle, als deren häufiges Produkt Bindegewebsneubildung (die „rheumatische Schwiele“ Froriep's) anzusehen sei.

Die rheumatische Contractur tritt als eine Aeusserung des acuten Muskelrheumatismus am Häufigsten an den grossen Muskeln des Halses, besonders am Cucullaris und Sternocleidomastoideus (Torticollis rheumatica), an der Schulter, sowie endlich an den Rückenmuskeln (Lumbago) zu Tage. Duchenne⁴⁾, Erdmann⁵⁾, Meyer⁶⁾ u. A. beobachteten häufig die Contractur der Gesichtsmuskeln als Ausgang rheumatischer Faciallähmung. — Die betroffenen Muskeln stehen in bedeutender Verkürzung; jede Action ihrer Antagonisten ist äusserst schmerzhaft, wenn nicht unmöglich.

Die rheumatische Contractur ist im Allgemeinen leicht zu beseitigen, wenn sie früh zur Behandlung kommt; schlecht dagegen ist die Prognose, wenn die Contractur veraltet ist, wenn Bindegewebsneubildung in den Interstitien die Verlängerung des Muskels unmöglich macht, wenn endlich die Antagonisten atrophirt oder gar fettig entartet sind.

Die syphilitische Contractur, eine der spätesten Erscheinungen in der Reihe der secundär-syphilitischen Leiden, hat mit der rheumatischen die grösste Aehnlichkeit⁷⁾. Sie geht, wie es scheint, stets aus einer Entzündung des Muskels hervor⁸⁾, welche unter heftigen, reissenden Schmerzen verläuft, und zu schwieriger Entartung des Muskelfleisches führt, wodurch dasselbe für immer functionsunfähig wird. Nach Virchow⁹⁾ entwickelt sich auch hier aus dem interstitiellen Gewebe ein sclerosirendes Bindegewebe, während die Muskelprimitivbündel atrophisch zu Grunde gehen.

Anders verhält es sich, wie es scheint, mit den durch Intoxication entstehenden Contracturen, von denen wir als die verhältnissmässig häufigste die saturnine Contractur hervorheben. Das mit Blei

¹⁾ Pathologische Anatomie. Tom. II. pag. 310.

²⁾ Beobachtungen über die Heilwirkungen der Electricität. Weimar 1813.

³⁾ Dessen Archiv. Bd. V. pag. 269.

⁴⁾ Traité de l'électrisation localisée, Paris 1856, pag. 788 sq. Edit. II. pag. 672 sq.

⁵⁾ Die örtliche Anwendung der Electricität etc. III. Aufl. 1860.

⁶⁾ Die Electricität in ihrer Anwendung auf prakt. Medicin. II. Aufl. 1861.

⁷⁾ Bouisson, Gazette médic. de Paris 1846, Juli, August.

⁸⁾ Vgl. Virchow, dessen Archiv Bd. IV. pag. 271.

⁹⁾ Dessen Archiv Bd. XV. pag. 282.

geschwängerte Blut scheint hier eine Veränderung sowohl in den Nervencentren als in den peripherischen Nervenbahnen zu setzen; die Alteration in den Muskeln ist somit mehr eine functionelle, als eine nutritive. Die Contractur betrifft nur die Flexoren, entwickelt sich allmählig, unabhängig von einem Lähmungszustande der Antagonisten (vgl. Bleilähmung) und bedingt Verunstaltungen der Extremitäten, welche nach jahrelangem Bestehen durch Formveränderungen der Gelenke zu bleibenden Difformitäten werden. Brockmann¹⁾ unterscheidet partielle Contracturen, d. h. solche, welche sich nur auf eine (besonders obere) Extremität beschränken und als einfache Lokalaffectio leicht heilbar sind, und allgemeine, welche sich nicht bloß auf die Flexoren aller Extremitäten, sondern auch auf die Beuger des Kopfes und des Rumpfes erstrecken, und als Symptom schwerer Bleikachexie anzusehen sind. Brockmann will die partiellen Contracturen bei denjenigen Arbeitern der Fabriken und Hüttenwerke beobachtet haben, welche, mit Bleistaub beschäftigt, einem häufigen Wechsel der Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse ausgesetzt waren. Ueber die diesen Contracturen zu Grunde liegenden Veränderungen sind wir ganz im Dunkeln.

Unabhängig von Erkrankungen des Nerven- und Muskel-Systems entstehen Contracturen, wenn durch fehlerhafte Stellung einzelner Theile des Skelets (gleichgültig, ob dieselbe angeboren oder erworben ist) die Bewegung gewisser Muskeln innerhalb zu enger Grenzen erhalten wird. In letzterem Falle kann der Muskel ebenso, wie bei Paralyse seiner Antagonisten, niemals eine Ausdehnung auf seine normale Länge erfahren, er ist zur Ruhe in der Stellung der Contraction verdammt, die Gewohnheit macht aus der Contraction eine Contractur. So werden z. B., wenn der Unterschenkel gegen den Oberschenkel durch knöcherne Ankylose unter einem rechten Winkel feststeht, die Flexoren des Unterschenkels von Contractur befallen. Aehnlich wirkt die häufige Wiederholung derselben Bewegung, indem nach und nach die ursprünglich nur durch den Willen, aber vorzugsweise häufig zur Contraction veranlassenden Muskeln nicht bloß andauernd das Uebergewicht über ihre Antagonisten gewinnen, sondern auch die Fähigkeit sich wieder auf ihre volle Länge auszudehnen einbüßen. Dies bemerkt man z. B. an den Händen der Kutscher, deren Fingerflexoren in Folge des andauernden Haltens der Peitsche und der Zügel beim Fahren in Contractur verfallen. Bei diesen Entstehungsweisen ist eine qualitative Veränderung in der Structur

¹⁾ Die metallurgischen Krankheiten des Oberharzes. Osterode 1851, pag. 227.

des Muskels nur höchst selten und nur bei sehr langer Dauer des Uebels wahrzunehmen¹⁾); er bleibt nach wie vor Muskel, die mikroskopische Untersuchung weist in ihm die normalen Primitivbündel nach, und Contracturen dieser Art sind daher auch heilbar, sobald wir nur durch die geeigneten Mittel die Verlängerung oder Ausdehnung des Muskels herbeiführen können.

Die französischen Schriftsteller, welche als „*Contracture*“ die Verkürzung der Muskeln ohne wesentliche Abänderung der Structur bezeichnen wollen, die Verkürzung mit Abänderung der letzteren, namentlich durch Entwicklung von fibrösem Gewebe, „*Rétraction*“ nennen, müssten letztere Bezeichnung eigentlich auf die oben erwähnte aus Entzündung entsprungene Verkürzung beschränken. Bei allen anderen Formen beruht die Veränderung des Gewebes nur darauf, dass die ausser Thätigkeit gesetzten Muskelbündel atrophisch werden, während das in die Zusammensetzung des Muskels eingehende fibröse Gewebe, dessen Ernährung und Entwicklung in dem ruhenden Muskel ganz ebenso erfolgt, wie in dem thätigen, scheinbar vermehrt wird. Durch Entzündung dagegen gehen wirklich Muskel-Elemente zu Grunde und es erfolgt Neubildung und mithin absolute Vermehrung des fibrösen Gewebes. Daher gewährt der durch Entzündung verkürzte Muskel viel weniger Aussicht auf Wiederherstellung seiner Function.

Verkürzungen der Sehnen und Bänder entstehen auch unabhängig von Muskelcontractur durch Gewohnheit, so z. B. bei angeborenen Klumpfüßen und durch Entzündung, welche mit ihrer Verdickung wegen der nachfolgenden Narbencontraction zugleich ihre Verkürzung bedingt. Solche Entzündungen sind oft schleichend und beruhen nicht selten auf einem andauernden Drucke. In welcher Weise sonst noch durch den Druck solche Contracturen veranlasst werden könnten, lässt sich nicht einsehen.

Symptome. Die Difformität des Theiles, an welchem der verkürzte Muskel sitzt, ist gewöhnlich das auffallendste und erste Symptom. Schmerzen finden sich einerseits bei den auf Muskel-Entzündung beruhenden Contracturen, andererseits mittelbar bei den oben als Reflexcontracturen bezeichneten Zuständen, wo die, durch die ursprüngliche Läsion gesetzten Schmerzen durch die Muskelcontractur noch erheblich gesteigert werden, z. B. bei Fracturen, Luxationen, Schusswunden u. s. w. — Der verkürzte Muskel fühlt sich hart an und springt als ein straffer Strang hervor, sofern nicht die Dicke der

¹⁾ In Muskeln, welche Jahrzehnte lang in Contractor sich befanden, kommt die in paralytischen Muskeln so häufige und oft so vollständige Fettmetamorphose dennoch selten und verhältnissmässig schwach ausgeprägt vor.

darüber liegenden Weichtheile denselben verhüllt oder anderweitige locale Verhältnisse ihn unseren Augen und Fingern entziehen. Die Wirkung des Muskels auf sein Punctum mobile ist stets deutlich, aus ihr entspringt die Difformität. Die Bewegung der Antagonisten wird beschränkt oder unmöglich. In der Regel werden die Flexoren an den Extremitäten von Contractur befallen und zwar gewöhnlich in der Art, dass diejenigen Gruppen von Muskeln, welche gleichzeitig bewegt zu werden pflegen, auch zugleich der Contractur unterliegen (Gerdy), wahrscheinlich immer in solcher Ausdehnung, als sie von demselben grösseren Nervenaste versorgt werden (Bonnet). Die verschiedensten Grade der Contractur werden hier beobachtet, von der beginnenden Beugung der Finger bis zu dem Einkrallen der Nägel in die unter ihrem Druck verschwärende Haut der Hohlhand; von der einfachen Erhebung der Ferse mit stärkerer Wölbung des Fussrückens bis zu der gänzlichen Umdrehung des Fusses, so dass statt der Fusssohle der Fussrücken den Boden berührt; von der halbgebeugten Stellung des Knies bis zur festen Berührung zwischen Ferse und Hinterbacke u. s. w.

Consecutive Veränderungen. Die Atrophie, welche sich zunächst an dem verkürzten Muskel entwickelt, erstreckt sich allmählig über den ganzen Abschnitt des Gliedes, welchem der erkrankte Muskel angehört. Auch seine Antagonisten werden allmählig atrophisch und verfallen bei fortdauernder Immobilität endlich der fettigen Degeneration. Der verkürzte Muskel selbst wird allmählig dünner, strangartig, während seine Sehne ihr altes Volumen behält und somit endlich relativ dicker wird als der Muskel. Daher konnte man von den stockähnlichen Unterschenkeln der Klumpfüssigen (vgl. Bd. I. pag. 774. Fig. 159) sagen, die Wade sei ihnen gegen die Ferse hinabgerutscht. Die Arterien, Venen und Nerven erfahren mannigfaltige Verschiebungen, aber, sofern sie nicht durch Narben festgeheftet werden, keine Verkürzungen, was in therapeutischer Beziehung sehr wichtig ist. Die Knochen unterliegen bald Verschiebungen in ihren Gelenken, bald Verkrümmungen in ihrer Continuität. Hieraus erklären sich die consecutiven Subluxationen und Luxationen. Jedoch hat man offenbar früher Vieles als consecutive Verrenkung und Verbiegung, namentlich bei Klumpfüssen, zu erklären gesucht, was ursprüngliche Missbildung ist (vgl. Bd. I. pag. 772).

Die **Diagnose** einer Contractur ist selten schwierig. Die Differential-Diagnose zwischen Contractur und Ankylose ist schon oben (pag. 631) besprochen. Eine auf Entzündung des Gehirns oder Rückenmarks oder deren Folgezuständen beruhende Contractur wird

nicht leicht verwechselt werden können, wenn man die Anamnese und namentlich das ursprüngliche Leiden (traumatische Läsion des Gehirns oder Rückenmarks, Meningitis, Hämorrhagie etc.) genügend berücksichtigt¹⁾.

Die rheumatische und syphilitische Contractur wird hinreichend durch ihre grosse Schmerzhaftigkeit charakterisirt; ausserdem giebt die Anamnese genügende Anhaltspunkte für die Diagnose. Die Unterscheidung beider unter einander kann nur durch die Berücksichtigung der vorangegangenen Affectionen, insbesondere durch das Vorhandensein oder Fehlen anderer secundär-syphilitischer Processe ermöglicht werden. Die Diagnose der Bleicontractur kann ebenfalls nur aus den übrigen Zeichen der Bleivergiftung festgestellt werden.

Die Verkürzung der Aponeurosen erkennt man an dem Hervorspringen von Strängen in einer Richtung, in welcher keine Muskeln verlaufen. Beide Richtungen können aber zufällig zusammenfallen. Dann ist, da aus der Aetiologie, der Art der Spannung und anderen Symptomen sich auch kein Aufschluss ergibt, die Entscheidung sehr schwierig, wenn man ohne Anwendung des Chloroforms zum Ziele kommen will. Unter dem Einfluss des letzteren aber werden die verkürzten Muskeln nachgeben, während die verkürzten aponeurotischen Stränge unverändert Widerstand leisten, oder durch eine grössere Gewalt unter deutlichem Geräusch zerrissen werden.

Die Prognose der Muskelcontracturen ist bei der erfreulichen Wirksamkeit der gegen sie einzuleitenden Behandlung im Allgemeinen als günstig zu bezeichnen; jedoch ist sie für den einzelnen Fall immer unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ursachen, des Grades, der Dauer, der Complicationen und des Sitzes zu stellen. Die Contracturen, welche von Entzündung des Muskels selbst herrühren, sind, je nach den Veränderungen, welche derselbe erlitten hat, mehr oder weniger schwer zu beseitigen. War dagegen nur eine Entzündung in der Nachbarschaft des Muskels oder ein gezwungenes Still-Liegen die Ursache der Contractur, so ist sie leicht, oft ohne ein eingreifendes Verfahren, zu beseitigen. — Wenn Paralyse der Antagonisten des verkürzten Muskels besteht (in Folge von Erkrankungen des Nervensystems, Durchschneidung von Nerven etc.), so sind die Aussichten nur in sofern günstig, als die Paralyse oder doch ihre Wirkung auf den verkrümmten Theil (letzteres durch mechanische Vorrichtungen) be-

¹⁾ In Betreff dieser aus Affection der Nervecentren entspringenden Contracturen vgl. Todd's Lectures on Paralysis by certain diseases of the brain and other affections of the nervous system, London 1856, pag 217 u. f.

seitigt werden kann. Je mehr nachträgliche Veränderungen, namentlich der Knochen, Statt gefunden haben, desto geringer die Hoffnung, daher im Allgemeinen auch, je älter die Contractur. Der nachtheilige Einfluss anderweitiger Complicationen, sowie die Bedeutung des Sitzes der Contractur ergibt sich von selbst.

Behandlung. Dem verkürzten Muskel muss seine normale Länge und seine Zusammenziehungsfähigkeit wiedergegeben werden. Gelingt Ersteres, so ist der zweite Theil der Aufgabe in der Regel nicht schwer zu lösen.

In manchen, besonders noch nicht sehr veralteten Fällen kann durch allmälige permanente Extension, welche mit passenden und möglichst wenig drückenden Maschinen ausgeführt werden muss, oder durch oft wiederholten Zug und Druck mit der Hand die Verlängerung des Muskels erreicht werden. In schwierigeren Fällen aber, wo dieses Verfahren gar nicht oder nur mit Aufwand von vieler Zeit, mit Verlust von vielen Kräften und unter grossen Schmerzen zum Ziele führen würde, wenden wir, nach dem Vorgange von B. v. Langenbeck, die gewaltsame Ausdehnung des verkürzten Muskels in der Chloroformnarkose (in der bei der Ankylose schon im Allgemeinen geschilderten Weise) an. Die Betäubung muss sehr tief sein, und wegen der damit verknüpften Gefahr sehr sorgfältig überwacht werden. Die Ausdehnung der Muskeln erfolgt zwar im Vergleich zu der allmäligen Extension durch Maschinen plötzlich, aber doch nicht mit einem Ruck und mit roher Gewalt, sondern durch Anfangs sanftes, allmälig zu steigernes Hin- und Herbewegen des Theiles, an welchem die verkürzten Muskeln inserirt sind. Es soll dabei niemals eine Zerreiſung, sondern allmälige Dehnung des Muskels, dessen Contractur durch das Chloroform gleichsam gelöst wird, erfolgen. Wo diese Methode nicht zum Ziele führt oder wegen der Individualität des Kranken, oder auch wegen der Localität des Uebels (sofern diese für den nachher anzulegenden Verband nicht geeignet ist) nicht angewandt werden kann, da besitzen wir in der subcutanen Durchschneidung das sichere Mittel, um die Verlängerung der Muskeln und Sehnen und damit auch ihre Function wieder herzustellen¹⁾. Die Ausführung dieser Operation (Myotomia, Tenotomia) ist bereits Bd. I. pag. 81 ff. geschildert worden. Die grosse Verschiedenheit zwischen der Durchschneidung in offener Wunde und der subcutanen Methode, sowie das Verdienst L. Stromeyer's um die Einführung der letzteren, wurden bereits bei der Lehre „von den

¹⁾ Ueber die Tenotomie ist in jeder Beziehung zu vergleichen: Dieffenbach, Ueber die Durchschneidung der Muskeln und Sehnen, Berlin, 1841.

Verletzungen im Allgemeinen“ (Bd. I. pag. 623 ff.) hervorgehoben. Immerhin aber bleibt die Durchschneidung des Muskels oder der Sehne nur eine vorbereitende Operation in Betreff der zu erzielenden Verlängerung. Das Narbengewebe, welches zwischen den durchschnittenen Theilen sich entwickelt, muss, so lange es noch dehnbar ist — am Besten schon vom dritten oder fünften Tage ab —, durch geeignete Verbände und Maschinen ausgedehnt werden, um dem Muskel wieder seine ursprüngliche Länge zu verschaffen. Jedenfalls sind also besondere Verbände und Apparate — mögen sie allein wirken, oder nach der gewaltsamen Streckung in der Chloroformnarkose das Glied in der gewünschten Stellung sicher erhalten, oder endlich diese Stellung durch allmälige Dehnung der jungen Sehnennarbe erst herbeiführen sollen — für die Heilung der Contracturen erforderlich. Diese orthopädischen Verbände können bald durch Zug, bald durch Druck oder durch beide zugleich wirken (vgl. Bd. I. pag. 777); immer aber wird ein gewisser Druck bei ihnen nicht zu vermeiden sein. Durch ihn entstehen zahlreiche Uebelstände. Abgesehen davon, dass durch Compression des Thorax und des Bauches, wenn die Difformität am Rumpf sitzt, die ganze Ernährung wesentlich leiden kann, stellen sich auch an den Extremitäten als üble Folge desselben beträchtliches Oedem des peripherischen Theils und (was bei Weitem übler ist) Gangrän an der gedrückten Stelle ein (vgl. Bd. I. pag. 302 ff.). Zur Vermeidung des Oedems wickelt man die ganze Extremität gleichmässig mit einer Flanellbinde ein und lässt die Venenstämme von Druck frei. Zur Verhütung des gerade an atrophischen Gliedern ungemein leicht entstehenden Brandes vertheilt man den Druck auf möglichst viele Punkte, wechselt häufig die Stellen, auf welche er vorzugsweise einwirken soll, vermeidet solche gänzlich, wo die Haut dicht auf dem Knochen aufliegt und legt überall, so viel als thunlich, elastische Polster unter. Von Zeit zu Zeit wird die Extremität ganz frei gelassen und die Haut durch kalte Douchen und spirituöse Einreibungen belebt. Mangelhafte Contractilität des in seiner Länge wiederhergestellten Muskels würde mit faradischer oder galvanischer Reizung zu behandeln sein. Gewöhnlich reichen gymnastische Uebungen der Muskeln unter Anleitung des Arztes aus.

In den Fällen, wo der Contractur Muskelentzündung zu Grunde liegt, muss diese zunächst bekämpft werden. Neben der örtlichen Behandlung mit Blutentziehungen, Kälte, Senfteigen, Vesicatoren, reizenden Einreibungen ist sowohl gegen das rheumatische, als be-

sonders gegen das syphilitische Allgemeinleiden die entsprechende innere Behandlung einzuleiten.

Duchenne¹⁾ empfiehlt gegen frische rheumatische Contracturen dringend die electrocutane Reizung mittelst trockener metallischer Poesel zur Beseitigung des Schmerzes, sowie die isolirte Faradisation²⁾ der Antagonisten, um eine Verlängerung des verkürzten Muskels zu erzielen. Duchenne's günstige Erfolge werden von Erdmann bestätigt. Dagegen sind von Remak³⁾ dem constanten galvanischen Strome hervorragendere Heilwirkungen bei Contracturen sowohl centralen als peripherischen Ursprungs vindicirt, und die neueren Beobachtungen von Benedikt, A. Eulenburg, M. Meyer u. A. bestätigen die Angaben Remak's im Allgemeinen. Das Verfahren besteht in der unmittelbaren Einleitung eines mässig starken, öfter unterbrochenen galvanischen Stromes auf den Muskel.

Bei paralytischen Contracturen werden wir weniger auf die verkürzten, als auf die gelähmten, in Extension verharrenden Muskeln Rücksicht nehmen. Gelingt es, die Function derselben auf dem bei den „Lähmungen“ angegebenen Wege wiederherzustellen, so wird damit auch die Contractur verschwinden.

Viertes Capitel.

Von dem Krampf der Muskeln, Spasmus.

Von den chirurgisch wichtigen Muskelkrämpfen ist der Starrkrampf bereits bei den Krankheiten der Nerven (pag. 258 u. f.) abgehandelt. Wir erläutern hier noch einige locale Krampf-Formen, welche nicht selten Gegenstand chirurgischer Eingriffe werden⁴⁾.

I. Mimischer Gesichtskrampf. *Spasmus facialis, Tic convulsif.*

Der Krampf der vom Nervus facialis versehenen Gesichtsmuskeln ist fast immer ein klonischer. Entweder alle oder nur einige

¹⁾ l. c. pag. 891.

²⁾ Es ist schwer von „Faraday“ ein Verbum „Faradisiren“ abzuleiten; aber es hat Bürgerrecht gewonnen.

³⁾ Galvanotherapie der Nerven- und Muskelkrankheiten. Berlin 1858.

⁴⁾ Vgl. zu den nachfolgenden Capiteln die einschlägigen Abschnitte in A. Eulenburg's Lehrbuch der functionellen Nervenkrankheiten, Berlin, 1871, Benedikt, Nervenpathologie und Elektrotherapie, II. Aufl., Leipzig 1874, und Erb, die Krankheiten der peripheren-cerebrospinalen Nerven, in v. Ziemssen's Handbuch der spec. Pathologie und Therapie, Bd. XII., Leipzig 1874.

Muskeln der einen Gesichtshälfte, selten beider, zeigen Zuckungen, welche, von einem Muskel zum andern springend, einen wunderbaren Wechsel des Mienenspiels hervorrufen. Diese Zuckungen dauern entweder ohne grössere Pause fort, oder treten nur in einzelnen Paroxysmen auf, zwischen denen alsdann ganz freie Zeiträume liegen. Psychische Affecte, Verlegenheit, das angestrengte Bestreben des Kranken, seine Gesichtszüge ruhig zu halten, reichen hin, um einen Paroxysmus hervorzurufen oder die Heftigkeit des Krampfes erheblich zu steigern. Von diesem generellen oder diffusen Gesichtsmuskelkrampf kann man ganz wohl den partiellen trennen, welcher seinen Sitz vorzüglich im M. orbicularis palpebrarum als Blepharospasmus tonicus und clonicus aufschlägt. Der Krampf zeigt sich hier als dauernde oder mit Ruhe wechselnde Verengung oder Schliessung der Lidspalte mit Faltung der Haut der Augenlider und der benachbarten Haut der Schläfe u. s. w. — A. v. Graefe hat nachgewiesen, dass Druck auf gewisse Punkte, welche meist dem oberflächlichen Verlauf von sensiblen Nerven, besonders von Trigeminasästen entsprechen (Druckpunkte), den Krampf mindert oder zum Schweigen bringt. Die Aufsuchung solcher Punkte ist deshalb für die Therapie wichtig. Schmerzen werden beim Gesichtskrampf nicht verspürt, wenn nicht der Trigeminus selbstständig leidet. Dagegen wurden nicht selten gleichzeitig Krampferscheinungen im Bereiche der motorischen Zweige des Trigeminus (masticatorischer Gesichtskrampf, Romberg), sowie im Bereiche des Accessorius und Hypoglossus beobachtet. Der tonische allgemeine Gesichtskrampf ist weit seltener, als der klonische, und erst durch Marshall Hall¹⁾ zur allgemeinen Kenntniss gekommen; der tonische partielle ist dagegen als Blepharospasmus häufig.

Actiologie. Materielle Veränderungen im Gehirn oder in den betroffenen Nerven, welche als nächste Ursache der Affection anzuschuldigen wären, sind bisher selten beobachtet. Am Häufigsten ist der Krampf reflektorischer Natur und nimmt seinen Ausgang von peripherischen Reizungen des Trigeminus oder anderer sensibler Nerven, ist Anfangs auf einzelne Muskeln beschränkt und einseitig und breitet sich allmählig auf andere Muskeln auch auf der entgegengesetzten Gesichtshälfte aus. Verletzungen der Gesichts- und Schädelknochen, besonders Quetschungen, rheumatische Periostitiden, Reizungen durch fremde Körper sind nächst Zahncaries und Augenentzündungen aller Art die gewöhnlichsten Ursachen des partiellen und generellen Ge-

¹⁾ On the diseases of the nervous system, London 1841, pag. 342.

sichtskrampfes. In manchen Fällen endlich scheint sich der Krampf aus habitueller Contraction bestimmter Gesichtsmuskeln, wie sie Beruf oder Angewöhnung mit sich bringen, im Laufe von Jahren zu entwickeln.

Die **Prognose** stellt sich im Allgemeinen sehr ungünstig, da das Uebel in den meisten Fällen ein äusserst hartnäckiges ist und allen therapeutischen Bestrebungen widersteht. Insbesondere geben die Fälle, welche veraltet zur Behandlung kommen, eine fast absolut ungünstige Prognose.

Therapie. In frischen Fällen ist auf's Sorgfältigste nach etwaigen Ausgangspunkten des Krampfes und nach den Druckpunkten v. Graefe's (Ram. supraorbitalis N. trigemini u. A.) zu forschen. Peripherische Reizungen der Trigemini Fasern, vorzüglich durch entzündliche Zustände in den Augen oder cariöse Zähne, sind zu beseitigen. Rheumatischer Anlass fordert zur Anwendung des antirheumatischen Heilapparates auf. Wo es sich gleichzeitig um Hyperästhesie im Bereich von Trigemini zweigen handelt, so besonders beim reflektirten Blepharospasmus, sind subcutane Morphiuminjectionen in die Schläfe von ausgezeichnetem Nutzen (A. v. Graefe). In extremen Fällen dieser Art ist die Durchschneidung der betreffenden Trigemini Äste hilfreich, ja schliesslich unentbehrlich, wie zwei von Romberg¹⁾ mitgetheilte Beobachtungen darthun.

Die Electricität wurde schon in Form des magneto-electrischen Inductionsstromes von Froriep in einigen Fällen mit Erfolg angewandt. Viel wirksamer ist die Anwendung des constanten galvanischen Stroms, nach Remak, wobei der positive Pol vorzugsweise auf den Druckpunkt zu appliciren ist.

In schweren Fällen, wo der gequälte Kranke um jeden Preis von seinem Krampfe befreit sein will, hat man wiederholt die Durchschneidung des N. facialis ausgeführt. Allein die nachfolgende Lähmung entstellt das Gesicht fast mehr, als der Tic convulsif, und setzt den Kranken ausserdem den Gefahren aus, welche vollständige Facial-Lähmungen bei längerem Bestande im Gefolge zu haben pflegen. Dieffenbach²⁾ hat aus diesem Grunde bei einem veralteten partiellen Gesichtskrampf die subcutane Durchschneidung der vom Krampf befallenen Muskeln und zwar mit dauerndem Erfolge ausgeführt.

¹⁾ Nervenkrankheiten, Bd. I. pag. 357.

²⁾ Dieffenbach, Ueber die Durchschneidung der Muskeln und Sehnen, Berlin 1841. pag. 314, und Romberg, Nervenkrankheiten Bd. I. pag. 374.

II. Halsmuskelkrampf.

Krampf im Muskelbereiche des N. accessorius Willisii und der obersten Cervicalnerven.

Der Halsmuskelkrampf beschränkt sich meist auf die von dem äusseren Aste des N. accessorius Willisii versorgten Mm. cucullaris und sternocleidomastoideus. Sehr häufig sind damit Hyperästhesie des Trigeminus und der sensiblen Cervicalnerven und Krämpfe im Gebiete des Facialis und der Cervical- und Dorsalnerven combinirt.

Der klonische Halsmuskelkrampf ist entweder einseitig oder doppelseitig. Bei dem einseitigen klonischen Krampfe wird der Kopf in Anfangs kurzen, später länger dauernden Paroxysmen gewaltsam in die der Action der betroffenen Muskeln entsprechende Stellung gerissen, wobei die Schulter sich hebt, häufig der Art, dass der Kopf mit der Schulter zusammenstösst. Diese Krampfbewegung wiederholt sich oft 30mal in der Minute. Während des Schlafes cessiren die Krampfanfälle, treten aber sofort mit dem Erwachen wieder ein. Schmerzen werden nicht empfunden, wenn nicht eine Neuralgie des Trigeminus oder der Occipitalnerven die Affection complicirt.

Der doppelseitige klonische Halsmuskelkrampf, *Eclampsia nutans*, *Salaam-convulsion of infancy* (Newnham), *Nutatio capitis spastica* (Ebert), hat seinen Sitz in den Mm. sternomastoideis und wurde bisher nur bei Kindern in der Zahnungsperiode beobachtet. Dieses regelmässige, pagodenartige Kopfnicken tritt in Paroxysmen auf, und zwar häufig mit gleichzeitigen Krampf-Erscheinungen in anderen Bezirken des Muskelapparates, besonders in den Gesichts- und Augenmuskeln. Bei Ebert's Kranken¹⁾ wiederholten sich die Anfälle des Tages wohl 40—50mal. Jedem Paroxysmus ging Nystagnus und Nictitatio auf beiden Augen vorher. Nach Ebert währte jeder Anfall etwa 1—3 Minuten, und Newnham zählte 150 Nickbewegungen in der Minute.

Die Dauer dieser doppelseitigen klonischen Krampfform ist meist kurz, und scheint stets mit den Zahnungsbeschwerden zu verschwinden. Dagegen zeigt sich der einseitige Halsmuskelkrampf äusserst hartnäckig, und gewährt in veralteten Fällen bei der empirisch festgestellten Unwirksamkeit jeder Therapie eine schlechte Prognose.

Aetiologie. Die ursächlichen Verhältnisse sind sehr dunkel. Während bei dem doppelseitigen Krampf die erschwerte Zahnung entschieden eine grosse Rolle spielt, werden für den einseitigen Halsmuskelkrampf

¹⁾ Charité-Annalen, 1850, pag. 756.

Kardelen, Chirurgie. 7. Aufl. II.

Erkältung, Durchnässung, psychische Affecte, heftige Muskelanstrengung als veranlassende Momente angeschuldigt. Materielle Veränderungen in den Nervencentren, sowie in den befallenen Nerven selbst sind bisher nur selten und zwar im Halstheil des Rückenmarks, in der *Medulla oblongata* und Brücke nachgewiesen.

Der tonische Halsmuskelkrampf beschränkt sich meist auf den *M. sternomastoideus* und wird beim „*Caput obstipum*“ (Bd. III.) genauer besprochen werden.

Therapie. Die Behandlung hat sich zunächst nach den etwa aufzufindenden ätiologischen Momenten zu richten; besonders sind peripherische Nervenreizungen aufzusuchen und zu beseitigen. Rheumatische Veranlassungen erfordern die Anwendung trockner oder feuchter Wärme, subcutane Morphiuminjectionen, u. s. f. Beim klonischen Krampf der zahnenden Kinder passen Ableitungen auf den Darm durch Calomel und der constante Strom. Letzterer ist vorzüglich wirksam in frischen Fällen von tonischem und klonischem Krampf; seine consequente Anwendung sollte aber auch in veralteten Fällen nicht unterbleiben. Von empirischen Heilmitteln ist in einem Falle von Bright das *Ferrum carbonicum* innerlich in Verbindung mit Moxen im Nacken, von Romberg einmal das *Zincum sulphuricum* mit gutem Erfolge angewandt. In ganz veralteten Fällen bleiben nur operative Eingriffe übrig. Die Durchschneidung des Trapezium wurde zwei Mal (von Amussat und von Stromeyer) mit dauerndem Erfolge ausgeführt. Dieffenbach durchschnitt den Kopfnicker ohne Erfolg.

III. Schreibekrampf und ähnliche Krampfformen.

Coordinatorische Beschäftigungsneurosen (Benedikt).

Der Schreibekrampf ist der Prototyp für eine Anzahl von Krampfformen, welche gewisse Muskelprovinzen in der Ausübung gewohnter, meist complicirter Bewegungen befallen. Leute, welche viel mit der Feder umgehen (Copisten, Comptoiristen), werden während des Schreibens zunächst von einem Gefühle der Ermüdung oder von einer krampfartigen Spannung in den betreffenden Muskeln ergriffen. Nach einiger Zeit tritt nun, gewöhnlich nach angestrenzter Arbeit, plötzlich ein tonischer Krampf in den Beugemuskeln der die Feder führenden Finger, besonders des Daumens, ein. Ist der Krampf geringfügig, so kann der Kranke, wenn auch nur mit Anstrengung, noch eine leserliche Handschrift herstellen; ist derselbe aber heftig, so wird das Schreiben absolut unmöglich, der Patient verliert durch-

aus die Gewalt über die betreffenden Muskeln. Die Feder entfällt entweder den Fingern oder wird krampfhaft gepackt, ruckweise hier- und dorthin geführt, ohne dass der Kranke die Kraft hat, ihre Bewegung zu regeln. Wird das Schreiben aufgegeben, so verschwindet der Krampf vollständig und die Muskeln verhalten sich bei anderen Thätigkeitsäusserungen durchaus normal. Sobald aber in der Folge, selbst nach Monate langer Pause, ein neuer Versuch zum Schreiben gemacht wird, tritt der Krampf in früherer Stärke wieder hervor. Zuweilen begleitet ein Zittern der Hand und des Vorderarms den Krampf, besonders dann, wenn der Kranke denselben zu unterdrücken sucht. Alterationen in der sensiblen Sphäre finden sich ausser dem erwähnten Gefühl von Ermüdung und Spannung in den Muskeln nicht vor. Canstatt¹⁾ unterscheidet einen Krampf der Flexoren und der Extensoren der Finger. Die Letzteren werden jedenfalls sehr selten befallen, am Häufigsten noch die Strecker des Daumens.

Dem Schreibkrampf ganz analoge Krampfformen werden auch bei Klavierspielern, Nähterinnen, Malern, Schmieden²⁾ beobachtet. Bei Schustern beschrieb Clemens³⁾ einen eigenthümlichen tonischen Krampf, welcher aus der rechten Hand ein „zugespitztes Pfüthen“ machte und sich auch auf die Vorderarme, Füsse und Schenkel erstreckte. Wir sahen dasselbe bei einem Schusterlehrling: die Hände standen gespitzt, die Arme gebeugt, die Knie aneinandergespreßt, — kurz der Patient zeigte ganz die Stellung, welche der Schuhmacher bei seiner Arbeit einzunehmen pflegt.

Die Prognose ist bei allen diesen Krampfformen wenn sie schon lange bestehen, ungünstig, insbesondere beim Schreibkrampf, welcher gewöhnlich für Jahre, wenn nicht für das ganze Leben das Schreiben unmöglich macht. Im Uebrigen übt das Leiden weder auf das Allgemeinbefinden des Kranken, noch auf die übrigen Functionen der Hand einen nachtheiligen Einfluss aus.

Die Therapie vermag nur wenig gegen diese Uebel auszurichten, weil die Wiederaufnahme der gewohnten Beschäftigung fast unfehlbar einen Rückfall zu Wege bringt. Am Meisten leistet noch der elektrische Strom, in geringer Stärke Monate lang angewendet, selbstverständlich bei gänzlicher Enthaltung von der schädlichen Beschäftigung. So vortrefflich der Heilerfolg der Electricität, besonders des Galvanismus, auch Anfangs gewöhnlich erscheint, so ist doch schliess-

¹⁾ Specielle Pathologie und Therapie, Bd. III. pag. 313.

²⁾ Romberg, l. c. pag. 398.

³⁾ Deutsche Klinik, 1851, pag. 17.

lich, wenn die gewohnte Beschäftigung in früherer Ausdehnung wieder aufgenommen wird, der Krampf gewöhnlich wieder da. Die Myotomie und Tenotomie ist an den befallenen Muskeln fast immer ohne Erfolg vorgenommen (Dieffenbach, v. Langenbeck). Nur Stromeyer will einen Kranken durch die Tenotomie am Flexor poll. long. geheilt haben¹⁾.

Um das Schreiben trotz des Krampfes zu ermöglichen, sind verschiedene Vorrichtungen empfohlen, welche entweder aus der subtilen Muskelaction eine grobe machen, oder den Daumen ganz ausser Thätigkeit setzen. Nur wenige derselben sind so einfach, dass sie Anspruch auf Zweckmässigkeit machen können. Manche Kranke können nothdürftig schreiben, wenn sie sich eines sehr dicken Federhalters bedienen. Andere befestigen die Feder an einen armdicken Holzcylinder, den sie mit den Fingern umfassen. Sehr empfehlenswerth ist ein breiter Metall- oder Guttapercha-Ring, welcher an der Seite mit einer Oese für den Federstiel versehen, auf die zweite Phalanx des Zeigefingers geschoben wird. Passt der Ring gut auf den Finger und ist der Federhalter hinreichend befestigt, so gestattet diese Vorrichtung, welche sehr leicht zu beschaffen ist, bei einiger Uebung eine ziemlich rasche und sichere Führung der Feder, ohne dass sich der Daumen betheiliget.

Fünftes Capitel.

Von den Lähmungen der Muskeln, Paralyse.

Die Muskel-Lähmungen gehören nur zum Theil in das Gebiet der Chirurgie. Wir beschränken uns hier auf die peripherischen Lähmungen mit Einschluss einer höchst eigenthümlichen Lähmungsform, welche — wahrscheinlich spinalen Ursprungs — dem kindlichen Alter ausschliesslich anzugehören scheint und wegen der Difformitäten, die sie im Gefolge hat, die Hülfe des Chirurgen vorzugsweise in Anspruch nimmt.

I. Die spinale Lähmung der Kinder (Heine).

Paralysie essentielle de l'enfance (Rilliet).

Underwood²⁾ hat zuerst, und nach ihm Shaw³⁾ die Aufmerksamkeit auf diese Lähmungsform gelenkt. Während Bad-

¹⁾ Medic. Correspondenzblatt für Bayern, 1840, pag. 118.

²⁾ Treatise on the diseases of children, London 1784.

³⁾ Nature and treatment of the distortions, to which the spine and the bones of the chest are subject, London 1822.

ham¹⁾ uns eine Reihe einschläglicher Beobachtungen mittheilte, gelang es Heine in einer anerkannt vortrefflichen Monographie²⁾, einiges Licht über diesen dunklen Gegenstand zu verbreiten, und insbesondere die therapeutischen Erfolge einer rationellen Orthopädie nachzuweisen.

In der Folge sind von Bedeutung die Arbeiten von Richard (Bulletin de Thérapie. Févr. 1849, pag. 120); Kennedy (Dublin quart. Journ. of medic. Febr. 1850); Billiet (Gazette médic. 1851); Billiet und Barthez (Traité clinique des maladies des enfants, Tom. II. pag. 335); Vogt (Schweizerische Monatsschrift für prakt. Heilkunde 1858); Duchenne (De l'électrisation localisée, Paris 1861. II. Edit. p. 275 u. f.); R. Volkmann (Ueber Kinderlähmung und paralytische Contracturen. Sammlung klinischer Vorträge von Volkmann. I. Leipzig 1870); Eulenburg (l. c. pag. 607 ff.). Erb (l. c.).

Symptome und Verlauf. Man bezeichnet als spinale, essentielle oder idiopathische Lähmungen der Kinder solche Paralysen, welche ohne bekannte Ursache plötzlich auftreten, und ihren Sitz fast ausschliesslich in den Extremitäten und zwar vorzugsweise in den unteren aufschlagen. Die Lähmung tritt in verschiedener Weise auf. Ein gesundes und kräftiges Kind wird plötzlich ohne vorhergehendes Unwohlsein von einer Paralyse befallen, welche die Angehörigen häufig erst dann bemerken, wenn das Kind vergebliche Versuche macht, sich der Extremität zu bedienen. Allgemein-Erscheinungen werden entweder ganz vermisst oder von den Eltern nicht genügend beachtet. Zuweilen werden vorübergehendes Schielen, heftiges Zähneknirschen im Schlafe, auch Fieber angeführt, — Erscheinungen, die um so leichter übersehen werden, da das Uebel meist zur Zeit des Zahnens auftritt.

Diese Paralysen sind meist partiell, selten paraplegisch, betreffen entweder einen Arm oder ein Bein, und treten bald mit normaler, bald mit herabgesetzter Sensibilität der Haut auf. Die Dauer derselben ist sehr verschieden. Manche verschwinden nach 12—24 Stunden, andere nach 6—8 Tagen, andere endlich erfordern 6—10 Monate zur Heilung. In vielen Fällen gehen einzelne der gelähmten Muskeln, wenn die Lähmung sich selbst überlassen bleibt, durch Atrophie und Fettmetamorphose zu Grunde. Kennedy hat diese Lähmungen, welche plötzlich, ohne vorhergehendes Allgemeinleiden und meist partiell auftreten, wegen ihrer oft schnellen Heilung „temporäre“ Lähmungen genannt.

In anderen Fällen geben dem Eintritte der Lähmung mehr oder weniger heftige Fiebererscheinungen voran, gewöhnlich während des beschwerlichen Durchbrechens grösserer Zähne. Fieberhafte Hitze,

¹⁾ The London medic. and surgic. Journ. 1835.

²⁾ Beobachtungen über Lähmungszustände der unteren Extremitäten und deren Behandlung, Stuttgart 1840. II. Aufl. Spinale Kinderlähmung, Stuttgart 1860.

Durst, nächtliche Unruhe mit Geschrei, Verstopfung werden von den Angehörigen aufgeführt; häufig war auch die Verdauung schon längere Zeit gestört. Es treten nun plötzlich Convulsionen unter der Form eclamptischer Anfälle auf, welche sich einige Male wiederholen. Zwischendurch wird Somnolenz und Schielen mit Dilatation der Pupille beobachtet. Diese beunruhigenden Erscheinungen verschwinden nach einigen Stunden, oft erst nach 1—2 Tagen vollständig; aber sie hinterlassen eine mehr oder weniger ausgedehnte Paralyse. Die Form derselben ist bald paraplegisch, bald partiell, viel seltner hemiplegisch. Von einigen Autoren wurde diese Paralyse als eine Folge von typhösen oder remittirenden Fiebern, auch nach acuten Exanthemen und nach Chorea beobachtet.

Die Lähmung ist meist von vornherein eine complete. Das Glied hängt schlaff herab, ist gänzlich dem Willen entzogen. Passive Bewegungen lassen sich nach allen Richtungen und durchaus schmerzlos ausführen. Die Temperatur ist meist sofort herabgesetzt, seltner die Empfindlichkeit der Haut.

In einigen Fällen erstreckte sich die Lähmung Anfangs auf sämtliche Extremitäten, sowie auch theilweise auf den Rumpf (Blase, Mastdarm). Diese Totalparalyse verschwindet aber bald und hinterlässt die permanente Lähmung einer oder zweier Extremitäten. West beobachtete einige Male gleichzeitig eine Paralyse des N. facialis auf der entsprechenden Seite.

Ist von Anfang an Paraplegie vorhanden, so zeigt sich doch bald, dass eine der unteren Extremitäten vorwiegend afficirt ist. Während in dieser die Lähmung permanent bleibt, stellt sich in der anderen von selbst — wenn auch sehr langsam — die Motilität wieder her.

Von besonderem Werthe sind die Resultate der faradischen Exploration, welche von Duchenne als diagnostisches und prognostisches Hilfsmittel in die Praxis eingeführt ist. Duchenne fand bei den partiellen, schnell verschwindenden Lähmungen (*Paralysie temporaire*, Kennedy) die Muskeln der gelähmten Extremität auf den localisirten faradischen Reiz normal reagirend. Dagegen zeigte die zweite Form, für welche Duchenne die Bezeichnung *Paralysie atrophique graisseuse de l'enfance* vorschlägt, von vornherein bedeutende Störungen in der electro-musculären Contractilität. Während sämtliche Muskeln der Extremität für den Willenseinfluss gleichmässig unzugänglich sind, zeigt die faradische Exploration, dass einzelne Muskeln fast normal reagiren, dass andere zum Theil, andere dagegen völlig ihre farado-musculäre Contractilität eingebüsst haben. Die galvanische Erregbarkeit der Muskeln bleibt, nach unserer Beob-

achtung, selbst in den schwersten Fällen erhalten und kann oft nach jahrelangem Bestande der Lähmung in den atrophischen Muskeln noch constatirt werden.

Wird die Lähmung innerhalb einiger Wochen oder Monate nicht spontan rückgängig, so treten die Erscheinungen allgemeiner Atrophie des gelähmten Gliedes zu Tage (Stadium der Atrophie, nach Heine). Indem zunächst Fettpolster und Muskelgewebe von der Atrophie betroffen werden, magert die Extremität rasch ab, die Knochenvorsprünge treten überall an die Oberfläche vor, die Haut ist welk und schlotternd. Dem mangelhaften Innervationszustande entsprechend, ist die Circulation in dem gelähmten Gliede gestört: die Haut ist livid und kühl, die Arterien sind eng, der Puls klein, schwirrend, oft kaum zu fühlen. Die Erniedrigung der Temperatur, welche zuerst von Heine thermometrisch nachgewiesen wurde, nimmt zu im geraden Verhältnisse zu den Fortschritten der Atrophie. Messungen in der Kniekehle ergaben Heine an dem gelähmten Beine zuweilen nur eine Temperatur von 14° R. An den oberen Extremitäten liess sich keine so bedeutende Temperaturerniedrigung nachweisen.

Folgezustände. Nach Verlauf eines Jahres und darüber ist in schweren Fällen an der gelähmten Extremität ein entschiedenes Zurückbleiben in der Entwicklung gegen die gesunde Seite zu bemerken. Das Glied hält nicht Schritt im Wachsthum mit dem gesunden.

Nach längerem Bestehen entwickeln sich eigenthümliche Difformitäten an der befallenen Extremität. Betraf die Atrophie die Muskeln der Schulter und des Oberarms, so leisten der M. deltoideus und die übrigen von der Schulter zum Oberarm laufenden Muskeln der Schwere des Arms nicht hinreichenden Widerstand. Indem nun der Kopf des Humerus die Gelenkkapsel übermässig ausdehnt, entfernt er sich von seiner Gelenkfläche nach Unten und etwas nach Hinten (nach der Fossa infraspinata) zu. Auf den ersten Blick imponirt diese Difformität als Luxation des Humerus. Die Schulter ist bedeutend abgeflacht, der Arm steht etwas um seine Achse nach Aussen rotirt. Unter dem Acromion findet man nicht den Kopf des Humerus, sondern eine Vertiefung. Die weitere Untersuchung lässt uns aber sofort die Luxation ausschliessen. Drückt man nämlich von Unten her gegen das Olecranon, so tritt der Humeruskopf auf seine Gelenkfläche, und die Difformität ist verschwunden. Passive Bewegungen des Humerus sind nach allen Richtungen hin möglich und durchaus schmerzlos. Sobald man aber den Arm wieder seiner Schwere überlässt, so stellt sich die Difformität wieder her. Misst man bei hängendem Arme vom Acromion bis zu den Fingerspitzen,

so erlangt man hier natürlich ein grösseres Maass, als am gesunden Arme. West fand den gelähmten Arm, auf diese Weise gemessen, anscheinend $\frac{3}{4}$ Zoll länger als den gesunden. — Vgl. pag. 726.

Viel bedeutender sind die Difformitäten der unteren Extremitäten, insbesondere wenn beide gleichmässig betroffen sind. Je nach der Ausbreitung der Lähmung ist entweder nur der Fuss, oder gleichzeitig auch Unter- und Oberschenkel afficirt. Der Unterschenkel steht gewöhnlich an den Oberschenkel herangezogen, indem die Beuger das Uebergewicht über die Strecker gewannen; der Oberschenkel ist dabei dem Bauche genähert durch Wirkung des Ileopectoas, welcher fast immer von der Paralyse verschont bleibt. In schwereren Fällen ist dabei nicht bloss das Becken verschoben, sondern auch die Wirbelsäule stark verbogen. Alle diese Difformitäten treten nie von vorn herein auf, sondern bilden sich erst nach längerem Bestehen der Lähmung heraus, indem dieselbe bald der verschonten Muskelprovinz ein Uebergewicht über ihre paralytirten Antagonisten einräumt.

Je weiter in den Letzteren Atrophie und fettige Degeneration fortschreitet, um so stärker wird die Contractur der Antagonisten, besonders dann, wenn ihre Innervation sich im Verlaufe der Zeit bessert.

Die Difformitäten, welche an den Füßen beobachtet werden, pflegt man mit dem Namen der „paralytischen Pferde- und Klumpfüsse“ zu belegen.

Am Häufigsten kommt der paralytische Pes equinus zur Anschauung, da der N. peroneus der Lieblingssitz der Paralyse ist. Ist der N. peroneus total gelähmt, wie wir es am Häufigsten beobachteten, so erzeugen die vom N. tibialis versorgten Wadenmuskeln, selbst wenn sie auch nur ein Minimum von Innervation aufzuweisen haben, die reine Spitzfussstellung. Ist nur der Ram. profund. n. peronei gelähmt, so äussern die vom N. peroneus superfic. innervirten Mm. peronei ihre antagonistische Wirkung gegen den gelähmten Tibialis anticus und veranlassen die Form des Pes valgo-equinus. Am Seltensten kommt, wie es scheint, der paralytische Talipes varus oder varo-equinus, oder gar der Talipes calcaneus vor. Wir fanden wenigstens in den von uns beobachteten 11 Fällen niemals den M. tibialis anticus auf den localisirten faradischen Strom reagiren, ebensowenig wie den M. extens. halluc. long. und M. extens. digitor. communis.

Das **Allgemeinbefinden** der Kranken ist in den meisten Fällen ungetrübt. Die kleinen Patienten, welche ohnehin meist kräftig und gut genährt sind, zeigen weder zur Zeit der einfachen Lähmung, noch bei zunehmender Atrophie irgend welche Störungen, weder von Seiten der Gehirnthatigkeit, noch Seitens der Digestion, der Circulation oder

der Excretionen. Sie gewinnen vermöge der kindlichen Lebhaftigkeit durch Uebung eine grosse Gewandtheit in der Fortbewegung durch Rutschen, in dem Gebrauch der partiell gelähmten Glieder u. s. w. Nur in einigen Fällen von Rilliet und West lagen scrophulöse Affectionen vor. Wir beobachteten einige Mal Anaemie.

Die **Aetiologie** dieser eigenthümlichen Lähmungsform ist fast ganz dunkel. Gesunde Kinder von $\frac{1}{2}$ —2 Jahren werden am Häufigsten befallen. In einigen von Heine, Kennedy und West beschriebenen Fällen schwankte das Alter zwischen 3 und 5 Jahren.

Als ursächliche Momente werden angeführt: beschwerliche Zahnung, Erkältung, besonders Sitzen der Kinder auf dem Steinpflaster (West, Duchenne, Rilliet), Trauma, wie Fall, Stoss und Zerrung der Glieder. Von diesen Momenten scheint das Zahngeschäft, insbesondere das Durchbrechen der Eck- und Backzähne, den entschiedensten Einfluss auf die Entstehung des Uebels zu äussern.

Da die Affection nie zum Tode führt, so liegen nur wenige und ungenügende **anatomische Untersuchungen** vor. Zwei Sectionen von Rilliet und je eine von Fliess, Longet, Berend und Hutin angestellt, haben theils gar keine Alterationen von Bedeutung in den Nerven-Centren dargethan, theils zweifelhafte Resultate ergeben; sie sind aber um so weniger maassgebend, als die Untersuchung sich nur auf makroskopische Veränderungen beschränkte. Wir fanden bei einem 20jährigen Phthisiker, welcher seit seinem zweiten Lebensjahre eine Totallähmung des linken Arms mit hochgradiger secundärer Atrophie und eine Entwicklungshemmung mit Schwäche des linken Beines besass, einen durch sulziges Bindegewebe gedeckten Defect in der rechten Grosshirnhemisphäre, von der Peripherie bis in die hinteren Theile des Corpus striatum reichend.

Die fettige Degeneration der Muskeln, welche das Endresultat permanenter Lähmungen darstellt, wurde schon von Lobstein¹⁾ beschrieben. Volkman²⁾ fand wiederholt an ausgeschnittenen Stückchen mehrjährig gelähmter Muskeln das interstitielle Bindegewebe vermehrt, die Muskelbündel nur schmal und fein bestäubt, aber keine ausgesprochene Fettmetamorphose.

Von den aufgestellten Hypothesen über das Wesen der Krankheit ist nur die von Heine vertretene anzuführen. Nach Heine's Ansicht handelt es sich um eine active Congestion nach den Häuten und der Substanz des Gehirns und vorzugsweise des Rückenmarks, welche rasch von einer serösen oder serös-

¹⁾ *Traité d'anatomie pathologique*, Tom. II. §. 909.

²⁾ *Sammlung klinischer Vorträge*, I.

albuminösen Exsudation gefolgt sei. Die Resorption des Exsudates gehe rasch vor sich, sei aber keine vollständige. Die Residuen desselben häuften sich in den unteren Theilen des Rückgratkanals an, und wirkten hier als drückendes Moment fort.

Gegen eine materielle Veränderung in der Substanz des Gehirns und für eine Affection des Rückenmarks spricht in den meisten Fällen allerdings der Mangel andauernder Gehirnsymptome, die Integrität der Sinnesorgane, der Intelligenz, die erhebliche Erniedrigung der Wärme in den gelähmten Extremitäten, endlich das schnelle Erlöschen der electro-musculären Contractilität. Dagegen zeigt der von uns secirte Fall, dass eine rein cerebrale Veränderung der Lähmung zu Grunde liegen kann. Uebrigens zwingt uns für manche Fälle, so besonders für die hemiplegischen unter Convulsionen eingetretenen, auch der klinische Verlauf zur Annahme eines cerebralen Ausgangspunktes.

Auf der anderen Seite ist Duchenne's Ansicht zu berücksichtigen, dass es sich bei der Mehrzahl von temporären Lähmungen (Kennedy) um peripherische Paralysen aus rheumatischer Ursache handle. Wir glauben ferner wenn wir die ganz analogen partiellen Lähmungszustände bei Erwachsenen in Betracht ziehen, zu der Annahme berechtigt zu sein, dass ausser rheumatischen Einflüssen auch Traumen, besonders anhaltender Druck, Zerrung, welche bestimmte Nervenstämme treffen, sehr hartnäckige partielle Paralysen bedingen, welche man mit Unrecht den sogenannten essentiellen Paralysen subsumirt. Gerade bei Kindern aber ist durch ihr häufiges Fallen, durch Zerrung der Extremitäten, unzweckmässige Lagerung der Glieder während des Schlafes die Gelegenheit zur Entstehung traumatischer Lähmungen viel häufiger, als bei Erwachsenen (vgl. „traumatische Lähmungen“).

Die **Diagnose** ist im Beginne meist schwierig. Am Leichtesten ist die essentielle Lähmung zu erkennen, wenn sie plötzlich, ohne Vorboten oder Störungen des Allgemeinbefindens auftritt, und als Paraplegie oder doch als Totallähmung eines Gliedes sich darstellt. In diesem Falle ist sie mit einer rheumatischen oder traumatischen Lähmung nicht zu verwechseln. Die localisirte Faradisirung der Muskeln wird hier in der Folge festzustellen haben, welche Muskeln ihre normale electricische Contractilität bewahrt, und welche dieselbe — ganz oder nur zum Theil — verloren haben.

Betrifft die Lähmung bloß einen Nervenstamm, z. B. den Ischiadicus oder Peroneus, so ist die Unterscheidung von einer traumatischen oder rheumatischen Lähmung nur dann möglich, wenn entweder die Anamnese Anhaltspunkte giebt, oder die faradische Exploration zeigt,

dass von den gelähmten Muskeln nur einzelne ihre electricische Contractilität verloren haben, während die letztere bei den rheumatischen Lähmungen meist normal bleibt, bei der traumatischen aber in allen Muskeln gleichmässig verloren geht.

Eine Verwechslung der Lähmung einer Unterextremität mit einer beginnenden Hüftgelenks-Entzündung, vor welcher Kennedy warnt, dürfte einem Chirurgen wohl schwerlich zustossen, wenn er die allseitige Beweglichkeit des Femur in der Pfanne, die Schmerzlosigkeit des Druckes auf den Trochanter und den plötzlichen Eintritt berücksichtigt. Ebensowenig dürfte die paralytische Dislocation des Humeruskopfes nach Unten für eine Luxation gehalten werden, wenn die Möglichkeit vorhanden ist, mit dem Arme nach allen Seiten hin und ganz schmerzlos passive Bewegungen auszuführen, und die Dislocation durch Heraufschieben des Arms auszugleichen.

In Betreff der, allerdings nur sehr entfernt möglichen Verwechslung mit *Malum Pottii* vgl. Bd. IV.

Die **Prognose** ist insofern günstig zu nennen, als keine Gefahr für das Leben besteht. Von grösster Wichtigkeit ist es aber, von vornherein bestimmen zu können, ob eine temporäre Lähmung vorliege, oder eine permanente Paralyse, welche unaufhaltsam ihrem Ziele — der Atrophie und fettigen Degeneration — entgegenziele. Die Behauptung von Kennedy, dass momentaner Eintritt ohne Vorboten bei sonst gesunden Kindern auf eine temporäre Lähmung schliessen lasse, hat die Erfahrung nicht bestätigt. Solche Paralysen zeigen oft ganz dieselbe Intensität und Hartnäckigkeit, als diejenigen, welche von Gehirn-Erscheinungen eingeleitet werden. — Paraplegie und Hemiplegie geben eine ungünstigere Prognose, als die partiellen Lähmungen, da alle von den Autoren beobachteten temporären Paralysen partielle waren. — Die angeborenen Lähmungen sind fast ohne Ausnahme unheilbar.

Für die specielle Prognostik ist die isolirte faradische Exploration der gelähmten Muskeln das wichtigste Agens¹⁾.

Nach Duchenne können wir schon kurze Zeit nach dem Eintritte der Lähmung, also zu einer Zeit, wo noch die ganze Extremität dem Willenseinflusse entzogen ist, mit ziemlicher Sicherheit bestimmen, ob die Lähmung eine temporäre sei und bald wieder verschwinden

¹⁾ Ueber die Methode der isolirten Faradisirung vgl. Duchenne, *De l'électrisation localisée*. II. Ed. Paris 1861. Erdmann-Duchenne, *Die örtliche Anwendung der Electricität*. Leipzig, III. Aufl. 1860. Remak, *Ueber methodische Electricisirung gelähmter Muskeln*. Berlin 1857. Ziemssen, *Die Electricität in der Medicin*. IV. Aufl. Berlin 1872.

werde — in diesem Falle ist nämlich die farado-musculäre Contractilität überall normal —, oder ob eine permanente Lähmung vorliege. In letzterem Falle ist die faradische Contractilität der gelähmten Muskeln in verschiedenem Grade herabgesetzt. Diejenigen Muskeln nun, deren faradische Contractilität nur wenig geschwächt ist, kehren gewöhnlich rasch zur Normalität zurück; — längere Zeit (Monate) erfordern diejenigen zur Heilung, deren faradische Contractilität bedeutend gelitten hat; diejenigen endlich, welche auf den faradischen Reiz nicht einmal mehr mit einer partiellen (fibrillären) Zuckung antworten, scheinen fast immer dem Untergange verfallen zu sein. In dem letzteren Falle rath Duchenne indessen zur Vorsicht in der Prognose, da er in einigen Fällen durch ausdauernde Behandlung mit Electricität und Gymnastik gute Erfolge erzielte. Nach seiner Meinung ist man erst, wenn 6—12 Monate der Behandlung ohne Spuren zurückkehrender Irritabilität verflossen sind, berechtigt, totale Degeneration des Muskels anzunehmen.

Hiermit stimmt unsere Erfahrung überein. Wir können noch hinzufügen, dass die Wiederkehr der faradischen Erregbarkeit der Muskeln zwar ein sehr günstiges Symptom, aber für die Besserung der Prognose nicht absolut nöthig ist, wie die neueren Beobachtungen über peripherische Paralysen lehren. Die Wiederkehr des Tonus und des Willenseinflusses sowie die Aufbesserung der Ernährung der gelähmten Muskeln und Glieder giebt viel sicherere prognostische Anhaltspunkte.

Therapie. Es liegt auf der Hand, dass bei einer Affection, deren Wesen so dunkel ist, die Ansichten der Schriftsteller über die zweckmässigste Behandlung sehr verschieden sein werden. Dies gilt besonders von dem Eintritt der Lähmung und ihren Begleit-Erscheinungen. Von etwaigen ursächlichen Momenten wird besonders die erschwerte Zahnung in's Auge gefasst, und dagegen von den Meisten Scarificiren des Zahnfleisches empfohlen. Kennedy schuldigt besonders die Digestionsstörungen an und empfiehlt dringend die alterirenden und purgirenden Metallsalze, vorzüglich das Quecksilber. Bei Schmerzen oder Contracturen in den Muskeln der Extremitäten wandte Kennedy warme Bäder an. Rilliet stimmt damit überein, rath aber mit West zur baldigen Anwendung der Tonica, wenn die Constitution eine schwächliche sei. Andere, wie Heine und Fliess, welche die active Congestion nach dem Rückenmark und den grossen Nervenplexus als die Hauptsache ansehen, empfehlen locale Blut-Entziehungen, besonders durch Schröpfköpfe, ferner Vesicantien u. s. w. an der Wirbelsäule.

* Wir sehen, dass es sich hier nur um vage Indicationen handelt.

Die meisten Autoren sind ehrlich genug, die gänzliche Wirkungslosigkeit ihrer Therapie einzugestehen.

Anders verhält es sich mit der Behandlung der Folgezustände des centralen Processes, nämlich mit der Behandlung der Lähmungen, der Muskelatrophie und der consecutiven Difformitäten. In Bezug auf den letzten Punkt hat Heine zuerst Bahn gebrochen, indem er zeigte, wie glänzende Resultate sich selbst bei unheilbaren Lähmungen erzielen lassen. Duchenne hat sich ebenfalls ein grosses Verdienst erworben, indem er die isolirte Faradisirung der gelähmten Muskeln als das wirksamste Agens zur Verbesserung ihrer Ernährung und zur Herstellung ihrer Function in die Praxis einführte. Duchenne rath in Betreff der Faradisirung ganz kleiner Kinder nicht ängstlich zu sein, und nicht nachtheilige Folgen für das Nervensystem u. s. w. zu fürchten. Er faradisirte Kinder von 3—6 Monaten regelmässig 3 Mal wöchentlich, ohne dass die Kinder aufgeregt wurden, oder viel Schmerz zu empfinden schienen. Um die Schmerzhaftigkeit zu vermindern, wurden die Unterbrechungen des Stroms möglichst langsam hergestellt. Duchenne rath die Behandlung so früh als möglich zu beginnen, um in den gelähmten und ihrer electricischen Contractilität beraubten Muskeln die Atrophie und fettige Degeneration aufzuhalten. In späteren Stadien ist die Faradisirung dringend angezeigt, weil es sich hier darum handelt, der fettigen Degeneration Einhalt zu thun. Selbst da, wo der totale Verlust der electricischen Contractilität auf vollständige Entartung schliessen lässt, hofft Duchenne, dass es noch gelingen werde, einige Muskelbündel wieder zu beleben und zu stärkerer Entwicklung anzuregen. Mit der faradischen Behandlung verbindet er die Anwendung gymnastischer Uebungen und zweckmässiger Apparate, an denen dicke Kautschukstreifen die Stelle der atrophischen Muskeln vertreten, damit den Antagonisten Widerstand geboten werde.

Der constante galvanische Strom dürfte in solchen Fällen, in denen die Muskeln auf den faradischen Reiz nicht mit Zuckung antworten, den Vorzug vor dem Inductionsstrom verdienen, nachdem die Beobachtungen von Baierlacher, Schulz, Meyer, Neumann, Ziemssen u. A., wenn auch nicht bei der in Rede stehenden Paralyse, so doch bei verschiedenen peripherischen Lähmungen, besonders solchen des N. facialis gezeigt haben, dass die Muskeln und motorische Nerven, welche auf den Inductionsstrom nicht mehr reagiren, häufig noch dem Batteriestrome gehorchen und von demselben in therapeutischer Hinsicht oft auffallend günstig beeinflusst werden.

Die Tenotomie ist in der Mehrzahl der Fälle ein unschätzbare Eingriff, wenn die Antagonisten der gelähmten Muskeln in Contractur

stehen. Erst die Beseitigung der Contractur giebt den gelähmten Muskeln die Möglichkeit zur Aeusserung ihrer Energie, falls ihnen überhaupt noch eine solche innewohnt. Eine Besserung derselben ist ohne vorherige Beseitigung der Contractur unmöglich. Selbst in den Fällen, wo bereits fettige Degeneration in den gelähmten Muskeln eingetreten ist, gewährt die Tenotomie insofern Nutzen, als sie die durch die Contractur gesetzte Difformität ausgleicht und die Application von Stütz- und Gehmaschinen möglich macht. Die Wichtigkeit der Letzteren liegt zu sehr auf der Hand, um nicht von allen Seiten anerkannt zu werden. Gelingt es, den Patienten „auf die Beine zu bringen“, ohne dass er Krücken gebraucht¹⁾, so ist für die ganze Zukunft des Kranken unendlich viel gewonnen. Wer sich die nöthige Geduld und Erfahrung in orthopädischen Dingen nicht zutraut, der bestimme die Eltern, das Kind in eine gute Anstalt zu bringen. (Ueber die zweckmässigsten orthopädischen Vorrichtungen vgl. „Klumpfüsse“ Bd. IV.)

Als wichtige Unterstützungsmittel für die Cur des atrophischen Stadiums empfehlen sich: methodische Frottirungen und die kalte Douche, welche täglich mehrmals auf die betreffende Parthie geleitet wird. — Das Strychnin ist innerlich und endermatisch zu versuchen, wengleich es nach Heine's Erfahrung keinen Einfluss auf die Paralyse übt, wohl aber die Wärme in der Extremität erhöht und die Transpiration wieder hervorruft.

Bei schwächlichen Kindern sind, ausser den die Verdauung und Blutbildung befördernden Tonicis (Ferrum, Amara), Malzbäder, Soolbäder, Seebäder, die Thermen von Teplitz, Wildbad, Wiesbaden u. s. w. anzurathen.

II. Peripherische Lähmungen

nennen wir diejenigen Muskellähmungen, deren Ursache entweder in den innervirenden motorischen (oder gemischten) Nerven (neuropathische Lähmung) oder in den ernährenden Blutgefässen zu suchen ist, oder denen eine Erkrankung des Muskels selbst zu Grunde liegt (myopathische Lähmung).

I. Lähmungen durch mechanische Behinderungen der Muskelthätigkeit.

Diese Lähmungszustände, welche lediglich durch längere Immobilität der Muskeln hervorgerufen werden, begegnen dem Chirurgen

¹⁾ Volkmann widerräth (l. c.) den Gebrauch der Krücken auf's Entschiedenste. Den übrigen Stützen und Gehvorrichtungen wird in der angezogenen Abhandlung grosse Aufmerksamkeit und eingehende Besprechung gewidmet.

oft nach schweren Affectionen der Knochen (Fracturen, Caries), nach Luxationen, Gelenk-Entzündungen u. s. w., also nach Affectionen, welche zu ihrer Heilung eine längere Immobilität der Extremität und somit der ganzen Muskulatur erfordern. Meist handelt es sich hier um einfache Atrophie der Muskelprimitivbündel, welche um so schneller und ausgedehnter zu Stande kommt, je mehr die Ernährung des Muskels durch anhaltenden Druck Seitens fester Verbände beeinträchtigt wird, je schlechter ferner der Ernährungszustand des ganzen Körpers ist. Eine solche Functionsbehinderung und die daraus resultirende Atrophie kann lange bestehen, ohne dass degenerative Processe auftreten, da der Muskelfaser, deren Gefässe und Nerven gesund sind, eine grosse Resistenz innewohnt. Ein solcher Muskel kann innerhalb eines Jahres durch die mechanische Functionsstörung ausserordentlich atrophiren, ohne doch der regressiven Metamorphose anheimzufallen. Besteht aber die Immobilität Jahre lang, so folgt der einfachen Atrophie fettige Metamorphose der Muskelfasern und ihrer Nerven, welche, einmal eingetreten, rasche Fortschritte macht. Wir sehen solche degenerative Atrophien bei veralteten Luxationen, beim Tumor albus, an alten Amputationsstümpfen. Statt der Muskelbäuche findet man Fettgewebe.

Symptome. Die Abmagerung der betreffenden Muskelparthie fällt zunächst am Meisten ins Auge. In späteren Stadien, wenn sich zu der degenerativen Atrophie Neubildung von Fettgewebe gesellt hat, ist die Volumsabnahme nicht mehr so sehr ausgesprochen. Die objective Untersuchung constatirt ferner ausser dem Functionshindernisse, ausser der Unmöglichkeit activer (resp. auch passiver) Bewegungen eine mehr weniger bedeutende Abschwächung der electro-musculären Contractilität. Ein bestimmter Zeitpunkt, von welchem an die letztere leidet, ist nicht festzustellen; nach unseren Erfahrungen scheint es schon früh zu geschehen.

Die **Diagnose** ergibt sich leicht aus der Anamnese und der objectiven Untersuchung.

Die **Prognose** ist durchaus günstig, wenn die Beseitigung des Functionshindernisses möglich ist, und die atrophischen Muskeln noch nicht fettig entartet sind. — Aber auch selbst in den Fällen, wo nach der Einrenkung einer alten Luxation u. s. w. die gelähmten Muskeln der electricischen Contractilität ganz beraubt sind, ist die Hoffnung auf Wiederherstellung ihrer Function nicht ganz aufzugeben.

Therapie. Vom Standpunkte der Prophylaxe hat man bei solchen Affectionen, welche eine längere Immobilität erfordern, sorgfältig darauf zu achten, dass frühzeitig, sobald es der Zustand der Primär-

affection überhaupt gestattet, passive, und wenn möglich auch active Bewegungen ausgeführt werden.

Ist Atrophie eingetreten, so ist, nach der Beseitigung des Functionshindernisses, die Erzeugung von Contractionen in den gelähmten Muskeln ein nothwendiges Postulat für die Heilung. Da die Kranken willkürliche Bewegungen entweder nicht ausführen können, oder dieselben wegen der damit verbundenen Schmerzen scheuen, so ist neben zweckmässigen passiven Bewegungen der Extremität die localisirte Faradisirung das beste Mittel, um die Ernährung des Muskels und damit seine Leistungsfähigkeit zu bessern. Energische Contractionen des Muskels, sie mögen nun durch den Willen oder durch den faradischen Reiz erzeugt werden, vermehren den Zufluss arteriellen Blutes, und beschleunigen den Abfluss des Venen- und Lymphstromes. Die Volumszunahme des andauernd tetanisirten Muskels ist centimetrisch, die Steigerung der Wärme ist thermometrisch messbar. Nach jeder Faradisirung ist die willkürliche Beweglichkeit erheblich gebessert, wenn auch nur für eine gewisse Zeit.

Wo die faradische Contractilität verloren gegangen ist, da ist der constante galvanische Strom oft noch im Stande Zuckungen auszulösen und damit der Motilität und der Ernährung des Muskels Vorschub zu leisten.

Ausser diesen Agentien, welche fast immer zur vollständigen Heilung ausreichen, sind die kalte Douche, die eisenhaltigen Moor- und Schlammäder von Franzensbad, die Thermen von Teplitz, Wildbad und Gastein zu empfehlen.

3. Traumatische Lähmungen

beruhen entweder auf einer Verletzung des innervirenden motorischen Nerven oder des Muskels selbst.

Die Continuitätstrennung eines motorischen Nerven gewährt das reinste Bild der traumatischen Muskellähmung. Die Resultate der physiologischen Versuche von Waller, Nasse, Schön, Budge u. A. stimmen mit den pathologischen Beobachtungen am Menschen auf's Genaueste überein ¹⁾.

Sofort nach der Durchschneidung eines motorischen Nerven ist der Muskel für den Willen gelähmt, die electriche Erregbarkeit des Nerven bleibt aber in den ersten Tagen normal, und erst am 6. bis

¹⁾ Vgl. die Experimental-pathologischen Untersuchungen von Ziemssen u. Weiss, D. Arch. f. klin. Medicin. Bd. IV. p. 579 ff. und Erb, Zur Pathologie und patholog. Anatomie peripherischer Paralysen, D. Archiv f. kl. Med. Bd. IV. p. 535 u. Bd. V. p. 42 ff.

9. Tage macht sich eine Abnahme derselben beim Menschen (bei Thieren, z. B. beim Kaninchen, schon nach 24—36 Stunden) bemerklich. In der zweiten, spätestens in der dritten Woche ist sie ganz erloschen, während die galvanische Erregbarkeit des Muskels nicht nur erhalten bleibt, sondern sich sogar in hohem Grade steigert. Mit der Wiederherstellung der Leitungsfähigkeit des Nerven kehrt allmählig die willkürliche Contractilität zurück und damit häufig auch die faradische Irritabilität des Nerven und Muskels, während die galvanische Uebererregbarkeit des Muskels allmählig sinkt. In manchen Fällen bleibt der Nerv dagegen noch lange Zeit, nachdem er für den Willen wieder leitungsfähig geworden ist, für beide Stromesarten unerregbar. Unter günstigen Umständen, d. h. wenn die durchschnittenen Nerven-Enden mit einander in Berührung bleiben oder doch nur durch eine geringe Lücke getrennt werden, erfolgt die Wiederherstellung der Leitung schnell und vollständig, etwa in 6—8 Wochen (vgl. „Krankheiten der Nerven“ pag. 284 u. f.). War der Substanzverlust ein bedeutender, oder trat durch Quetschung eine Zerstörung des Nervenstammes in grosser Ausdehnung ein, so degenerirt das ganze peripherische Nervenstück bis in die Endverzweigungen (Waller, Schiff, Hertz), und die Reproduction desselben erfordert eine ungleich längere Zeit, als die Ergänzung kleiner Substanzverluste (6—12 Monate und darüber). Die Muskeln magern in diesem Falle beträchtlich ab, bewahren aber ihre galvanische Erregbarkeit und zeigen mikroskopisch eine auffallende Kern- und Bindegewebswucherung im Sarcolemma neben beträchtlicher Verdünnung der Fasern (Erb). Unter ungünstigen Verhältnissen, und diese herrschen bei Durchschneidungen von Nerven am Menschen leider fast immer vor, bleibt der Nerv für immer leitungsunfähig, und in Folge dessen tritt Atrophie und regressive Metamorphose in den von ihm abhängigen Muskeln ein.

Die traumatische Muskellähmung ist gewöhnlich auch von Anästhesie der Haut und des Muskels begleitet, wenn die Läsion einen gemischten Nerven betraf. Die Anästhesie ist aber nie so vollständig, als die motorische Paralyse, weil die Ausbreitungen der sensiblen Nerven nicht auf so bestimmte Territorien angewiesen sind, als die motorischen, sondern so in einander übergreifen und mit einander anastomosiren, dass der eine Nerv den andern (gelähmten) an der Oberfläche gewissermassen vertreten kann. Dasselbe gilt von der electro-musculären Sensibilität, d. h. von derjenigen Empfindung, welche durch die Muskelcontraction erregt, über die Stärke und Energie derselben Rechenschaft giebt. — Betraf die Läsion einen

rein motorischen Nerven, z. B. den N. facialis, hypoglossus, so treten natürlich Störungen in der Sensibilität nicht zu Tage.

Die Wirkung von Quetschung, anhaltendem Druck, Zerrung ist eine der Continuitätstrennung des Nerven ganz analoge. Entweder sofort durch die Verletzung oder durch den nachfolgenden Entzündungsprocess wird die Leitungsfähigkeit des Nerven aufgehoben und stellt sich, je nach dem Grade und der Ausdehnung der Verletzung, früher oder später oder endlich gar nicht wieder her. Schon ein mässiger Druck, wenn er nur anhaltend auf einen Nervenstamm einwirkt, reicht hin, die hartnäckigsten Lähmungen zu erzeugen, so der Druck unzweckmässiger Verbände bei Fracturen, der Druck anhaltend und energisch contrahirter Muskelparthien bei Lastträgern, Athleten, abnorme Lagerung der Extremität beim Schlafen.

Instructive Fälle der Art sind angeführt bei: Todd, *Clinical lectures on paralysis etc.* London 1856. pag. 15. Hasse, *Krankheiten des Nervenapparates (Virchow's specielle Pathologie und Therapie)*, pag. 323. Romberg, *Nervenkrankheiten* Bd. I. pag. 868 u. f. Duchenne l. c. pag. 632 sqq.

Ausser dem Verluste der willkürlichen und electricischen Contractilität findet man einige Wochen nach dem Beginne die Temperatur in den gelähmten Muskeln um mehrere Grade erniedrigt. War die Läsion des Nerven nur eine leichte, so bleibt die electricische Contractilität trotz der totalen Lähmung normal. In diesem Falle kehrt die Leitungsfähigkeit, und damit die willkürliche Bewegung bald zurück. Bei Neugeborenen, deren Facialis bei schwerer Entbindung durch Druck Seitens der Zange oder des Beckens gelähmt wurde, stellt sich die Motilität meist in 3—14 Tagen wieder her.

Mit der Wiederherstellung der Leitung im Nerven bessert sich der Ernährungszustand der Muskeln. Das Eintreten dieses Zeitpunktes bemerkt man zunächst an der Zunahme des Muskelvolumens und an dem Verhalten der gelähmten Muskeln zu ihren Antagonisten. Letztere zeigen in der Ruhe nicht mehr das entschiedene Uebergewicht, wie früher, während dasselbe bei jeder Muskelaction noch sehr deutlich zu Tage tritt. Mit der wiederkehrenden faradischen Contractilität macht sich ferner anstatt der früheren Muskelanästhesie eine Hyperästhesie bei der faradischen Contraction bemerklich. Diese farado-musculäre Hyperästhesie ist ein fast sicherer Vorbote der wiederkehrenden Motilität (Duchenne). Endlich erlangen bei traumatischen Paralyseu ganzer Extremitäten die dem Centrum zunächst gelegenen Muskeln ihre Erregbarkeit am Frühesten, die entferntesten am Spätesten wieder.

Die **Diagnose** ergibt sich leicht aus der Anamnese und der electricischen Exploration. Die letztere ist jedoch allein zur Feststellung

der Diagnose nicht ausreichend in den Fällen, wo das veranlassende Moment (tief liegender Tumor, Bluterguss an der Schädelbasis u. s. w.) unbekannt ist. Von den cerebralen, hysterischen und rheumatischen Lähmungen, von denen die beiden ersteren stets, die letztere meistens oder doch längere Zeit eine normale electro-musculäre Contractilität bewahren, kann man die traumatische Lähmung in der zweiten Woche in der Regel durch das Schwinden der electricischen Contractilität unterscheiden. Dieses Kriterium ist jedoch nicht in allen Fällen so stichhaltig, wie Duchenne behauptet. Man findet traumatische Lähmungen leichteren Grades, bei denen die Irritabilität sich normal erhält, andererseits aber auch rheumatische Paralysen mit völligem Verluste der electricischen Erregbarkeit der Nerven.

Die idiopathischen Lähmungen der Kinder unterscheiden sich meist durch ihren eigenthümlichen Verlauf von den traumatischen. Wo jene aber plötzlich, partiell und ohne Allgemeinleiden auftreten, da ist eine Unterscheidung derselben von einer traumatischen Lähmung meist unmöglich, da der weitere Verlauf und die Resultate der electricischen Exploration bei beiden gleich sind.

Die Bleilähmung, welche ihren Sitz fast immer zuerst im Bereiche des N. radialis aufschlägt, könnte für eine traumatische Paralyse dieses Nerven gehalten werden. Allein selbst wenn das Allgemeinleiden (Bleikachexie mit den specifischen Organleiden) unserer Beobachtung entgehen sollte, würde doch die eigenthümlich ungleichmässige Verbreitungsweise der Lähmung in den vom Radialis abhängigen Streckmuskeln, die von Tanquerel des Planches entdeckte charakteristische Reihenfolge der paralytischen Anfälle, welche Duchenne's Untersuchungen durchaus bestätigt haben, die Diagnose der saturninen Lähmung sichern, da die traumatische Radialisparalyse fast immer die sämtlichen Streckmuskeln in gleichem Grade afficirt.

Die **Prognose** der traumatischen Lähmung richtet sich nach der Bedeutung der ursprünglichen Verletzung, und nach der Aussicht auf Wiederherstellung der Nervenleitung. Bei frischen Fällen kann man in der zweiten Woche aus dem Resultate der faradischen Exploration eine ziemlich genaue Prognose stellen. Ist die electro-musculäre Erregbarkeit der gelähmten Nerven und Muskeln dann normal oder doch nur wenig herabgesetzt, so kann die Herstellung der Motilität in 3—6 Wochen erwartet werden. Diejenigen Muskeln aber, welche jener Eigenschaften durchaus beraubt sind, gehen unabänderlich der Atrophie entgegen, und können erst nach vielen Monaten auf Herstellung der Nervenleitung hoffen, wenn es nicht gelingt, durch Anwendung des constanten galvanischen Stromes den Verlauf abzukürzen.

Ungünstig gestaltet sich die Prognose stets bei Nervendurchschneidungen und Wunden mit Substanzverlust, welche durch Eiterung heilen; hier gelingt die Wiedervereinigung der Nerven-Enden selten; der Muskel bleibt für immer gelähmt.

Absolut ungünstig ist endlich die Prognose bei solchen Paralyse, welche durch Vereiterung eines Nerven entstehen, wie z. B. die Lähmung des N. facialis durch Caries des Felsenbeins. Hier wird durch die Eiterung der Nerv im Canalis Fallopii zerstört und seine Regeneration verhindert.

Als günstige Momente sind während des Verlaufs und der Behandlung einer traumatischen Lähmung anzusehen: die Wiederkehr der normalen Temperatur, die Zunahme des Muskelvolumens, die Abnahme der galvanischen und die Wiederkehr der faradischen Contractilität des Muskels, die electro-musculäre Hyperästhesie, die Herstellung des Muskeltonus (Ausgleichung des Uebergewichts der Antagonisten). Das letzte Phänomen ist um so wichtiger, als es gewöhnlich eintritt, ehe der Kranke noch die geringste willkürliche Bewegung ausführen kann. Wir sehen dasselbe am Besten an Faciallähmungen, wo nach einer gewissen Zeit die Entstellung der Gesichtszüge, welche Anfangs sehr stark war, in der Ruhe nicht mehr zu bemerken ist, während sie bei der geringsten Muskelthätigkeit sofort wieder sehr auffallend hervortritt.

Therapie. Bei der Behandlung der traumatischen Lähmungen kommt es zunächst auf die Beseitigung des verletzenden Momentes an. Die Lähmung an sich erfordert in leichten Fällen keine Behandlung. Die Erfahrung lehrt, dass leichte Paralyse spontan in einigen Wochen heilen, wenn die electro-musculäre Contractilität und Sensibilität normal blieb. Nach Duchenne kann in diesen Fällen die Heilung durch frühzeitig begonnene Faradisierung beschleunigt werden. Diese Meinung wird heutzutage von den meisten Autoren getheilt. Wo die faradische Contractilität verloren ging, da ist nach Duchenne u. A. von dem faradischen Strome in den ersten 6—10 Monaten Nichts zu erwarten, und nur der galvanische Strom bietet hier noch einige Aussicht auf Beschleunigung der Heilung, d. h. auf Förderung des Regenerationsprocesses im Nerven und Conservirung der normalen Ernährung des Muskels, sofern dieselbe überhaupt möglich ist.

Ausser der electrischen Reizung wendet man auch reizende Einreibungen, Frottiren mit nasskalten Tüchern, die kalte oder heisse Douche mit starkem Strahle, versuchsweise auch das Strychnin an, ferner die Moor- und Schlamm-bäder in Franzensbad, die kohlensauren

Gashäder und Gasdouchen in Kissingen oder Meinberg, endlich die Thermen von Teplitz.

3. Lähmungen durch Unterbrechung der Circulation.

Die Beobachtungen von motorischen Lähmungen nach vollständiger Aufhebung der Circulation in einer Extremität stimmen mit den Resultaten der physiologischen Versuche von Stannius¹⁾ und Brown-Séguard²⁾ durchaus überein. Ist die Unterbrechung der Circulation eine vollkommene, so erlischt die Motilität und Sensibilität in dem Stromgebiete der obturirten Arterie sofort. Ist sie dagegen eine unvollständige, oder geht die Herstellung eines Collateralkreislaufes sehr rasch von Statten, so tritt nur eine Abnahme der motorischen Thätigkeit und ein Gefühl von Taubheit und Formication ein. Mit der vollständigen Herstellung der Circulation kehren auch die Muskeln zu ihrer normalen Function zurück. Dies wird constant nach längerer Compression, wie nach Unterbindung grösserer Arterien beobachtet (vgl. pag. 126). Bedenklicher sind die Vorgänge bei der Verstopfung grösserer Arterien durch eingeschleppte Pfröpfe (Emboli). Diese schliessen unter ungünstigen Verhältnissen die Blutbewegung ganz ab, und führen, da sie keine Ortsveränderung eingehen können, zu Gangrän des ganzen Stromgebietes, vorausgesetzt, dass ein ausreichender Collateralkreislauf nicht schnell genug zu Stande kommt³⁾.

Der Eintritt einer embolischen Paralyse ist ein ganz plötzlicher, und wird, nach Virchow⁴⁾, bisweilen von höchst schmerzhaften Krampfständen in der ganzen Muskulatur der Extremität begleitet. Die Anästhesie, welche sehr rasch eintritt, wird oft wegen der heftigen Neuralgien, welche dem Insulte auf dem Fusse folgen und sich häufig mit Hyperästhesie in denjenigen Theilen der Haut combiniren, welche Sitz collateralen Fluxion sind, — ganz übersehen. Die motorische Paralyse ist, nach Virchow, regelmässig geringer entwickelt, als die Anästhesie, was zum Theil darauf beruht, dass die Muskeln oft noch innerhalb des freien Theiles des Stromgebietes liegen, und nur die Sehnen in das ischämische hineinreichen, zum Theil auch wohl darauf, dass die motorischen Nerven vom Centrum zur Peripherie, die sensitiven umgekehrt absterben (Ritter). Bei Obturation der Hirnarterien ist umgekehrt die Sensibilität oft ungestört, während die Muskellähmung vollständig ist.

¹⁾ Archiv für phys. Heilkunde, Jahrg. 11. Heft 1.

²⁾ Comptes rendus 1851. Tom. XXXII. pag. 853.

³⁾ Einen solchen Fall beschreibt Romberg, l. c. Bd. I. pag. 722 u. f.

⁴⁾ Virchow, Specielle Pathologie und Therapie. Bd. I. pag. 175.

Die **Therapie** dieser Lähmungen fällt mit der Behandlung der Circulationsstörung zusammen.

4. Rheumatische Lähmungen

sind diejenigen, welche durch sogenannte „Erkältung“, d. h. durch plötzliche Abkühlung einer sehr warmen und transspirirenden Hautfläche vermöge eines kalten scharfen Luftstromes entstehen und wahrscheinlich auf entzündliche Vorgänge in den Muskeln und Nerven, insbesondere in deren bindegewebigen Hüllen, zurückzuführen sind. Es ist für die acuten Muskelrheumatismen wahrscheinlich (wenn auch der directe Nachweis bisher nicht geführt werden konnte), dass es schnell zu Exsudationen in das Sarcolemma und Neurilemma komme, welche einerseits die Contractilität der Muskelbündel durch seröse Durchtränkung desselben wesentlich beschränken und ihre Action schmerzhaft machen, andererseits durch Druck in den motorischen Nerven die Leitung unterbrechen und in den sensiblen Nerven zu Reizungen, den gefürchteten „rheumatischen Neuralgien“, Anlass geben. Für chronische Muskelrheumatismen ist es gelungen, in manchen Fällen Verdickung der Muskel- und Nervenscheiden und narbige Constriction der Nerven nachzuweisen (Froriep, Vogel).

In welchem von beiden Factoren — der Muskel- oder der Nerven-Affection — wir im speciellen Falle die Ursache der rheumatischen Paralyse vorzugsweise zu suchen haben, lässt sich meistens nicht feststellen. Jedenfalls aber werden wir in dem Falle eine Affection der Nerven anzunehmen haben, wo sich die Paralyse gleichzeitig und gleichmässig in einer grösseren, von einem und demselben Nerven versorgten Muskelgruppe manifestirt (N. facialis, radialis). Andererseits wird eine vorwiegende Affection des Muskels anzunehmen sein, wenn sich die oben geschilderten Erscheinungen der Muskelentzündung (Schmerz, Contractur u. s. w.) entwickeln.

Symptome und Verlauf. Die acute rheumatische Lähmung tritt meist ganz plötzlich ein. Nach Einwirkung von Zugluft auf die erhitzten Hautstellen erscheint sie oft schon innerhalb der nächsten Stunden auf ihrer vollen Höhe.

Wir behandelten einen Postboten, welcher bei scharfem Ostwinde, auf einem Marsch begriffen, ein Dorf erhitzt verliess, und eine halbe Stunde später, nachdem er unterwegs von heftigen Schmerzen in der rechten Kopfhälfte befallen war, in dem nächsten Dorfe mit complet gelähmtem Facialis anlangte.

Die rheumatische Lähmung ist, wenigstens im Beginn, immer mit erheblichen Schmerzen verbunden. Die electro-musculäre Contractilität ist Anfangs durchaus normal, die electro-musculäre Sensibilität

erhöht. In der Folge gestalten sich die Resultate der faradischen Exploration nach unserer Erfahrung anders. Es bleibt — wie es scheint — die electriche Contractilität auch in der Folge normal in den Fällen, wo die Muskeln allein Sitz der rheumatischen Affection sind. War dagegen die Neuritis vorzugsweise Grund der Lähmung, so verhält sich die letztere ganz wie eine traumatische, d. h. die electriche Erregbarkeit des Nerven wird in der zweiten Woche herabgesetzt gefunden, später ganz vermisst, während die galvano-musculäre Erregbarkeit gesteigert ist. Erst spät, oft erst nach 6 bis 10 Monaten, kehrt die Motilität zurück, und zwar meistentheils in etwas ungleichmässiger Weise.

Die von einer rheumatischen Lähmung befallenen Muskeln atrophiren im weiteren Verlaufe nicht unerheblich. Sie erlangen indessen nach der Beseitigung des rheumatischen Primärleidens ihr normales Volumen und ihre frühere Leistungsfähigkeit rasch wieder. Zuweilen geht die rheumatische Lähmung in Contractur über (vgl. „Contractur“ pag. 871).

Sitz. Die rheumatische Paralyse findet man vorzugsweise im Gesicht, an der Schulter, am Vorderarm, im Nacken, am Rücken und an der Hüfte. — Ganze Extremitäten werden höchst selten befallen.

Die **Diagnose** ergibt sich aus den veranlassenden Momenten, sowie aus der Schmerzhaftigkeit des Leidens und aus dem Resultate der electriche Exploration. Während sich zu Anfang die rheumatische Paralyse durch die normale electriche Contractilität neben gesteigerter Sensibilität charakterisirt, ist später in schweren Fällen, wo beide herabgesetzt oder verschwunden sind, die Unterscheidung von einer traumatischen Lähmung schwierig und oft nur durch genaue Berücksichtigung der anamnestiche Momente möglich.

Die **Prognose** ist fast immer günstig zu nennen. Selbst in veralteten Fällen gelingt die Heilung gewöhnlich, wenn die electriche Reizung überhaupt noch wirkt. Eine bedeutende Atrophie der Muskeln spricht von vornherein für grosse Hartnäckigkeit des Uebels.

Therapie. So ohnmächtig die Therapie bei den traumatischen Lähmungen ist, so glänzend sind unter Umständen die therapeutischen Erfolge bei der rheumatischen Lähmung.

Bei frischen rheumatischen Paralysen sind zunächst die gegen rheumatische Erkrankungen überhaupt bewährten Agentien in Anwendung zu bringen, insbesondere die Dampfbäder und die Dampfdouchen. Neben dem diaphoretischen Verfahren erfreut sich das Extr. Aconiti mit Vin. sem. Colehici, oder Vinum stibiat. eines besonderen Rufes. Gegen die heftigen neuralgischen Schmerzen erweisen sich fliegende

Vesicatores, besonders aber die electrocutane Faradisirung mittel trockener, metallischer Electroden (Drahtpinzel), sowie schwache galvanische Ströme höchst wirksam. Specieell gegen die Lähmung empfiehlt sich die Dampfdouche, das Frottiren und Kneten der Muskeln, vor Allem aber die localisirte Faradisirung. Die letztere ist zwar gerade hier sehr schmerzhaft, allein oft von überraschendem Erfolge in den Fällen, wo sich die Muskel-Irritabilität normal erhebt. Sofort nach den ersten Sitzungen fühlen sich die Kranken wesentlich erleichtert und vermögen — wenn auch oft nur vorübergehend — Bewegungen mit den gelähmten Theilen auszuführen. Oft reichen 5—10 Sitzungen zur Heilung aus. Möglich, dass die forcirte Contraction durch Druck die gesetzten Exsudate zur Resorption bringt, während sie anderer Seits durch die erhöhte Blutzufuhr den Stoffwechsel beschleunigt.

Bei veralteten rheumatischen Paralysen, zumal wenn sie mit Verlust der electricen Contractilität und mit erheblicher Atrophie zur Behandlung kommen, wird man schnelle Erfolge sehr selten erreichen. Hier muss die localisirte Faradisirung nebst gymnastischen Übungen mit Geduld und Consequenz Monate, selbst Jahre lang fortgesetzt werden. In den Fällen, welche vollständigen Verlust der Reaction gegen den faradischen Strom aufweisen, scheint nach den bisher vorliegenden Beobachtungen¹⁾, welche vorzüglich den Facialis betreffen, dem constanten galvanischen Strome entschieden der Vorzug vor dem inducirten zuzukommen. Der erstere scheint die Erregbarkeit der Muskeln und Nerven zu heben, eine Annahme, welche durch das physiologische Experiment gestützt wird.

Sehr zweckmässig erscheint es, bei längerer Behandlung in Zwischen Pausen von 4—6 Wochen eintreten zu lassen, in denen man die Kranken entweder ganz in Ruhe lässt, oder ins Bad schickt. Teplitz genießt bei den rheumatischen Lähmungen mit Recht einen ausgezeichneten Ruf; es ist insbesondere dann wirksam, wenn gleichzeitig auch andere Gewebe des Körpers Sitz hartnäckiger Rheumatismen sind. Wirksam ist übrigens auch Wiesbaden, sowie Wildbad, Gastein, Pläffers.

In schweren veralteten Fällen bringt zuweilen ein Nordseebad oder eine energische Kaltwasserkur noch Hülfe.

5. Bleilähmungen.

Die Bleilähmung ist eine der mannigfachen Aeusserungen der Bleivergiftung, und zwar eine der späteren, da ihr die bekannten

¹⁾ Vgl. pag. 893.

Zeichen der Intoxication, nämlich der livide Rand des Zahnfleisches, der Tremor, die Koliken und andere Neuralgien stets vorangehen. Die Lähmung wird meistentheils durch eine allmählig zunehmende Schwäche, durch eine Abnahme der Leistungsfähigkeit eingeleitet, seltener tritt sie plötzlich auf. Der Kranke verspürt längere Zeit bei jeder Anstrengung ein Gefühl der Ermüdung in den betreffenden Muskeln, bis sie endlich ganz den Dienst versagen. Von den Muskeln der oberen Extremitäten, welche vorwiegend Sitz der saturninen Lähmung sind, betheiligen sich zunächst immer nur die Streckmuskeln. Eigenthümlich und für die Bleilähmung durchaus charakteristisch ist die constante Reihenfolge der Muskeln bei progressiver Lähmung, — ein Phänomen, welches zuerst von Tanquerel des Planches¹⁾, später des Genaueren von Duchenne²⁾ festgestellt worden ist. Fast immer wird nämlich zuerst der *M. extens. digitor. commun.* ergriffen, sodann der *Extens. digiti min.*, *indicis* und *Extens. pollic. long.*, alsdann die *Extensores carpi*, endlich der *Extens. pollic. brevis* und *Abductor pollicis longus*. — Die Grades-Unterschiede in der Lähmung der einzelnen Muskeln lassen sich durch die früheren Untersuchungsmethoden nur unvollkommen, um so genauer aber durch die localisirte Faradisirung feststellen, und zwar selbst dann noch, wenn schon die ganze Extremität ihrer willkürlichen Bewegung beraubt ist. Die gelähmten Muskeln büssen nämlich nach einer gewissen Zeit ihre faradische Contractilität ein, und dieser Verlust schreitet in derselben Reihenfolge, in der die Muskeln von der Lähmung befallen wurden, vorwärts. Die galvanische Erregbarkeit der Muskeln ist entweder gleich der faradischen herabgesetzt oder über die Norm gesteigert (A. Eulenburg). — Nächst den Streckern am Vorderarm betheiligen sich der *M. deltoides* und *Triceps*, während der *Supinator long.*, *Anconaeus quartus* und *Biceps* intact bleiben. Auch an den unteren Extremitäten sind zunächst und vorwiegend die Strecker afficirt.

Die gelähmten Muskeln atrophiren bald, und zwar um so rascher und stärker, je ausgesprochener der Verlust der electricen Contractilität war. Die Sensibilität der Haut erhält sich fast immer normal.

Die Diagnose ist nicht schwer, wenn anamnestiche Momente und die gewöhnlichen früheren Symptome der saturninen Dyskrasie vorliegen. In manchen Fällen aber, wo Personen ohne ihr Wissen längere Zeit einer Blei-Intoxication unterworfen waren, kann bei der Unkenntniss des veranlassenden Momentes die Diagnose sehr schwierig

¹⁾ Traite des maladies de plomb. Paris 1839.

²⁾ l. c. pag. 312.

werden. So beobachteten M. Meyer¹⁾ und Ziemssen²⁾ mehrere Fälle von Bleivergiftung durch langjährigen Gebrauch von Schnupftaback, welcher in Blei verpackt war. In diesen Fällen war aber das Verhalten der gelähmten Muskeln gegen den faradischen Strom so charakteristisch, dass gerade dieses zunächst auf das Grundleiden aufmerksam machte. Die ganz eigenthümliche Reihenfolge der Muskeln beim Fortschreiten der Lähmung, sowie die Verschiedenheit in der Abschwächung der electricischen Contractilität lässt, auch bei Abwesenheit aller übrigen saturninen Erscheinungen, die Affection von einer traumatischen sowohl, wie auch von einer rheumatischen Lähmung der im Bereich des Radialis liegenden Strecker unterscheiden, da bei diesen Formen die Irritabilität entweder gleichmässig erhalten ist, oder gleichzeitig in allen Muskeln verloren geht.

Die **Prognose** ist im Allgemeinen günstig, da die Affection nur äusserst langsame Fortschritte macht und unter günstigen Bedingungen leicht zum Stillstand gebracht wird. Ungünstig wird die Prognose nur in den Fällen, wo die Muskeln bereits zu dünnen Strängen zusammengeschrumpft sind, oder da, wo der Patient dem schädlichen Einflusse des Bleies sich nicht entziehen kann. In Betreff der einzelnen Muskeln hat Duchenne für die Prognose folgenden Grundsatz aufgestellt: je weniger ein Muskel von faradischer Contractilität eingeüsst hat, um so schneller kehrt er zur normalen Function zurück. — Dies bezieht sich auch auf die dem Willen durchaus entzogenen Muskeln. — Indessen auch da, wo die faradische Contractilität ganz verloren ging, ist die Prognose nicht absolut ungünstig, da ein zweckmässiges therapeutisches Verfahren ihre Thätigkeit wieder herstellen kann, wenn die Atrophie nicht zu weit vorgeschritten ist.

Die **Therapie** hat zunächst jede Beziehung des Organismus zu dem schädlichen Metalle für immer aufzubeheben. Auch nach vollständiger Heilung führt die Rückkehr zu der früheren Beschäftigung unfehlbar Recidive herbei.

Die für die Behandlung der Blei-Intoxication überhaupt in Ruf stehenden Schwefelbäder, insbesondere die natürlichen (Aachen, Nenndorf, Baden bei Wien) erweisen sich auch bei den Bleilähmungen wirksam. Das Strychnin verdient nach Tanquerel's reicher Erfahrung, sowohl innerlich, als endermatisch angewandt, grosses Vertrauen. Sehr wirksam erweist sich die isolirte Erregung der gelähmten Muskeln durch den faradischen Strom. Bei consequenter Behandlung bessert sich die Ernährung der atrophische

¹⁾ Virchow's Archiv Bd. XI. pag. 209.

²⁾ Greifswalder med. Beiträge Bd. II. pag. 234.

Muskeln sehr bald, insbesondere in den Fällen, wo die electriche Contractilität nicht ganz verloren ging. Ist dieselbe ganz erloschen, dann sind wenigstens einige Monate zur Heilung erforderlich. Die Wirkung des constanten Stromes wird bei Bleilähmungen ebenfalls sehr gerühmt. — Man verbindet sehr zweckmässig mit der faradischen Behandlung Frottirungen und gymnastische Uebungen.

6. Hysterische Lähmungen.

Bei hysterischen Weibern treten nicht selten Lähmungszustände der mannigfaltigsten Art auf, deren Wesen bisher vollkommen dunkel geblieben ist. Die Lähmung ist oft partiell, betrifft z. B. die Muskeln des Vorderarms, die Beuger und Strecker der Finger, die Muskeln des Larynx oder des Pharynx; in anderen Fällen tritt sie unter der Form der Hemiplegie oder der Paraplegie auf. Sie beginnt entweder ganz unscheinbar, allmählig von den niederen Graden zu den höheren aufsteigend, oder tritt plötzlich und in voller Ausdehnung auf, z. B. in Folge eines Schreckes. Fast immer ist die befallene Extremität in allen Muskeln (Streckern und Beugern) gleichmässig gelähmt und vollkommen functionsunfähig, während die Reflexaction unverändert fortbesteht. — Die Sensibilität ist herabgesetzt oder ganz erloschen, und zwar nicht blos in der Haut, sondern durch die ganze Dicke des Gliedes, so dass z. B. die energischsten Muskelactionen, angeregt durch sehr starke faradische Ströme, nicht empfunden werden. Die electromusculäre Contractilität bleibt normal. — Nicht selten werden die gelähmten Muskeln während des hysterischen Anfalles von Convulsionen oder Rigidität befallen. Stets fand aber Todd in diesen Anfällen das Bewusstsein ungetrübt.

Charakteristisch ist der Wechsel in den Lähmungserscheinungen. Die Paralyse wandert nicht selten von einem Muskel zum anderen, geht von einer Extremität auf die andere über und verschwindet oft ganz plötzlich unter dem Einflusse grosser psychischer Affecte oder heftiger z. B. electriccher Erregung der sensiblen Nerven. Auch der Anfang der Lähmung lässt sich meist auf heftige psychische Erregungen zurückführen. Zuweilen gehen der Lähmung bei allmähligem Eintritte Schmerzen, Tremor, Gefühl von Taubheit und Ameisenkriechen in dem betreffenden Gliede voran.

Todd¹⁾ fand bei den hysterischen Hemiplegien den Gang der Kranken eigenthümlich, und von anderen Lähmungen, besonders cerebralen, ganz verschieden. Die Kranken schleppen das gelähmte Bein

¹⁾ Lectures on paralysis, pag 267.

wie leblos nach, während Cerebral-Hemiplegische das Bein durch eine Rotationsbewegung des ganzen Körpers mit Hebung des Becken nach Vorn zu werfen pflegen.

Aetiologie. Materielle Veränderungen konnten bisher weder im Nervensystem, noch in den Muskeln nachgewiesen werden.

Hasse¹⁾ nimmt als Ursache der Bewegungsunfähigkeit einen „Mangel an Willenseinfluss“ an — eine Anschauung, die wesentlich gestützt wird sowohl durch den Effect psychischer Einflüsse und durch den Wechsel der Lähmungserscheinungen, als auch durch das Verhalten der gelähmten Muskeln gegen den faradischen Strom, welches mit demjenigen bei cerebralen Paralysen, wo ebenfalls das Gehirn als Organ des Willens leidet, völlig übereinstimmt. Landouzy²⁾ nimmt eine Veränderung des Nervenfluidums an; dagegen glaubt Valentiner³⁾ feinere Ernährungsstörungen in den Nervenfasern statuiren zu müssen — Hypothesen, welche genügender Begründung ermangeln. Todd konnte fast in allen Fällen Leiden der Sexualorgane (Amenorrhoe, Fluor albus etc.) nachweisen und will durch deren Beseitigung einen günstigen Einfluss auf die Lähmung ausgeübt haben.

Die **Diagnose** der hysterischen Lähmungen ist meistens schwer, und kann oft erst nach längerer Beobachtung durch Ausschliessung der übrigen Lähmungsformen gewonnen werden. Die Anamnese aus dem Munde solcher Kranken ist meist unbrauchbar; ebenso unzuverlässig sind die Angaben in Betreff subjectiver Empfindungen. Wir sehen uns daher meist auf die objective Untersuchung und die Beobachtung der Kranken beschränkt. Die Anwesenheit exquisiter hysterischer Erscheinungen ist allerdings von grossem Werthe, allein mit Recht warnt Todd⁴⁾, auf Grund derselben allzu schnell mit der Diagnose einer „hysterischen Lähmung“ bei der Hand zu sein, da durch die hysterischen Erscheinungen häufig Affectionen der Centralorgane des Nervensystems verdeckt werden.

Todd führt einen, durch diagnostische Schwierigkeiten ausgezeichneten Fall an, in welchem unter heftigen hysterischen Anfällen eine Lähmung eintrat, welche als hysterischen Ursprungs angesehen werden konnte, während die Section ausgedehnte Tuberculose im Gehirn nachwies.

Von grossem Werth für die Ausschliessung peripherischer Lähmungen ist das faradische Verhalten der Muskeln, welche selbst nach

¹⁾ l. c. pag. 203.

²⁾ Traité complet de l'hysterie, Paris 1846.

³⁾ Die Hysterie und ihre Heilung, Erlangen, 1852.

⁴⁾ l. c. pag. 273.

längerem Bestehen vollkommen normal reagiren, und sich somit ganz wie bei cerebralen Lähmungen verhalten, während anderer Seits alle Zeichen einer Gehirnläsion, insbesondere Paralysen des Facialis und Hypoglossus fehlen, worauf Todd das grösste Gewicht legt.

Ueber das Verhalten der cutanen Sensibilität wird man mittelst des faradischen Reizes, nach unserer Erfahrung, weit sicherere Resultate erlangen, als durch Romberg's Nadelstiche. Indem man nämlich vermittelt einer trockenen metallischen Electrode auf die sensiblen Nerven der Haut einwirkt, kann man ohne Nachtheil für die Kranken den Strom zu einer Intensität steigern, welche die Widerstandskraft der raffinirtesten Simulantin bricht. Während eine Hysterische Nadelstiche oder andere Hautreize lautlos und selbst mit einem gewissen Wohlbehagen erträgt, ist der Eindruck einer energischen cutanen Faradisirung so mächtig, dass dieselbe in dieser Beziehung dem Ferrum candens an die Seite gesetzt werden kann. Bei wirklicher Anästhesie ist man im Stande, mittelst des faradischen Stromes die Grenzen derselben aufs Genaueste zu bestimmen. Indem man bei starkem Strome die Electrode langsam vom Centrum zur Peripherie der anästhetischen Hautpartie führt, giebt die plötzliche Reaction der Kranken genau die Stelle an, wo die Sensibilität wieder normal wird, und so kann man durch eine Anzahl von Radien das anästhetische Gebiet genau begrenzen.

Von Wichtigkeit für die Diagnose ist ferner, dass die Kranken unter heftiger psychischer Erregung die gelähmte Extremität bewegen können, sowie dass hemiplektische Hysterische bei dem Versuche zu gehen das Bein wie leblos nachschleifen.

Die **Prognose** stellt sich im Allgemeinen ziemlich günstig. Oft verschwinden die Paralysen von selbst; anderer Seits ist bei hartnäckigeren Fällen eine consequente Therapie meist von Erfolg gekrönt. In einzelnen Fällen freilich trotz die Lähmung auf das Hartnäckigste allen therapeutischen Bestrebungen, ohne dass sich dafür ein Grund finden liesse. Duchenne heilte von den ihm vorgekommenen Fällen von hysterischer Lähmung ungefähr die Hälfte mittelst der Electricität, hält jedoch dieses Resultat für im Allgemeinen zu ungünstig, da ihm nur schwere und anderen therapeutischen Eingriffen widerstehende Fälle zugeführt wurden.

Therapie. Bei der völligen Unkenntniss des Wesens dieser Lähmungsform wird die Behandlung zunächst die Aufgabe haben, die Function der einzelnen Organe, insbesondere der Sexualorgane, auf das Sorgfältigste zu regeln. Erkrankungen des Uterus, der Ovarien und der Scheide, welche wir als die breite Basis der Hysterie be-

trachten dürfen, müssen, soweit es möglich ist, beseitigt werden. Die Ernährung des Körpers ist durch zweckmässige Diät und Tonica, besonders Eisen, zu heben. Gegen die Lähmung im Speciellen empfiehlt sich, nach Duchenne's, Todd's, Hasse's u. A. Erfahrungen vor Allem die Faradisation, vorzugsweise in Form der electro-cutanen Reizung, um auf dem Wege des Reflexes auf die motorische Sphäre einzuwirken. Nur wenn dies Verfahren nicht ertragen wird, wenn jede Application hysterische Anfälle hervorruft (Duchenne), ist die localisirte Faradisirung der grösseren motorischen Nervenstämme und der Muskeln selbst in Anwendung zu ziehen. Unter allen Umständen vermeide man Anfangs zu energische Reizungen, da dieselben mehr Schaden als Nutzen bringen. Hier empfehlen sich schwache Ströme und kurze Sitzungen, und erst allmählig darf man mit der Intensität des Stromes und der Dauer der Sitzungen steigen. Gleichzeitig bestehende Neuralgien weichen der electro-cutanen Reizung fast augenblicklich, eine Thatsache, von der wir uns selbst oft überzeugen konnten. Die Erfolge der Faradisirung in Betreff der Lähmung (s. Duchenne¹⁾) in vielen Fällen höchst überraschend. In einigen Fällen reichte eine einmalige Application zur Heilung aus. Dennoch erklärt sich Duchenne, dessen Erfahrung offenbar die bedeutendste ist, ausser Stande, im einzelnen Falle eine bestimmte Prognose stellen zu können, da manche Fälle eine unbegreifliche Hartnäckigkeit zeigten. Von den verschiedenen Formen der hysterischen Lähmung scheint ihm die parapletische am wenigsten Aussicht auf schnellen Erfolg zu bieten. Immer setzte Duchenne die faradische Behandlung auch nach vollendeter Heilung noch eine Zeit lang fort, um Recidive zu verhüten, welche er früher, als er die Kur sofort nach Beseitigung der Lähmung zu schliessen pflegte, oft beobachtet haben will.

Neben dem faradischen Strome ist eine zweckmässige Gymnastik der gelähmten Glieder dringend zu empfehlen. Todd liess seine Kranken, selbst wenn eine Unterextremität vollständig oder beide unvollständig gelähmt sind, mehrmals täglich durch Wärterinnen herumführen, und zwar so lange es irgend ertragen wird.

Auch Frottirungen der gelähmten Extremitäten, spirituöse Einreibungen und die Douche sind in Anwendung zu ziehen, da die Erfahrung die Wirksamkeit energischer Hautreize gegen die motorische Lähmung (durch Reflexwirkung?) unzweifelhaft darthut.

Von den Bädern sind in den Fällen, wo pathologische Processe in den Sexualorganen (chron. Metritis, Oophoritis, Erosionen und Geschwüre an der Port. vaginal., chron. Katarrh der Uterinal- und

¹⁾ *Electrisation localisée*, pag. 740, Edt. II. pag. 386.

Scheidenschleimhaut) nachweisbar zu Grunde liegen, die Thermen von Ems und Landeck, sowie die Quellen von Krankheit bei Tölz und die Adelheidsquelle bei Heilsbrunn, meist von günstiger Wirkung¹⁾.

Wo Leiden der Geschlechtsorgane nicht vorliegen, dürften mehr die Thermen von Wildbach, Gastein, Pfäfers zu empfehlen sein, da hier die Gebirgsluft, die grossartigen Umgebungen und das ruhige Leben einen höchst günstigen Einfluss auf die Kranken haben. Die wunderbaren Heilungen langjähriger Lähmungen, welche in diesen Bädern erzielt werden, beziehen sich meist auf hysterische Paralysen.

Sechstes Capitel.

Von der progressiven fettigen Muskelatrophie.

Natur der Krankheit. Die Mehrzahl der früheren Beobachter sehen in den Veränderungen, welche das Rückenmark selbst (Leubuscher u. A.)²⁾ oder die vorderen Wurzeln der Spinalnerven (Cruveilhier u. A.)³⁾ betroffen hatten, die Primäraffection und betrachten die Lähmungszustände sowie die Atrophie und fettige Degeneration der Muskeln als Folgezustände der Affection des centralen und peripherischen Nervensystems. Dagegen haben sich die meisten der späteren Beobachter für Aran's Anschauung ausgesprochen, und zwar mit besonderer Berechtigung diejenigen, welche bei einschläglichen Sectionen das Rückenmark allein oder auch die vorderen Wurzeln normal fanden⁴⁾. Sie erklären die Atrophie der motorischen Wur-

¹⁾ Cf. Romberg, l. c. Bd. I. pag. 793, und Bannerth, Die Thermen von Landeck, 1853.

²⁾ Leubuscher und Frommann, Deutsche Klinik 1857, 33 u. 34. Donnezan, Gaz. hebdom. 1864. 2 Ser. I., 19. —

³⁾ Cruveilhier, Archiv génér. 1853, p. 601 u. 1856 Janvier. — Schneevogt, Niederland. Lancet 1854, 3 u. 4. — Valentiner, Prager Vierteljahresschrift 1856. Bd. II.

⁴⁾ Aran, Archiv. génér. de med. 1850. Tom. XXIV. E. Meryon, Med. and surg. Transact. London 1851. V. 35; Gazette des hôpitaux 1854. No. 127. — Oppenheimer, Ueber progr. fett. Muskelartung. Heidelberg 1855. — Petters, Prager Vierteljahresschrift. Bd. 49. pag. 190. — Legatt, A case of progressive fatty degeneration and atrophy of the voluntary muscles, Med. Times. March 21. — Landry, Gaz. méd. de Paris. 1853. No. 17. — Wachsmuth, in Henle u. Pfeuffer's Zeitschrift 1858. Bd. VII. Heft 1—2. — Friedberg, Pathologie und Therapie der Muskellähmung. II. Auflage 1862. pag. 93 u. fgl. — Friedreich, Virchow's Archiv. Bd. XXVII. pag. 25, 1863. — L. Meyer, ibidem Bd. XXVII. pag. 414. — Sappey, Gaz. méd. de Paris 1863, 2. — v. Bamberger, Wiener med. Presse 1869. No. 27 u. 28. — Friedreich,

zeln der Spinalnerven und der peripherischen Nerven, sowie auch die Erweichung des Rückenmarks für etwas Secundäres, für eine Folge der nutritiven Störung in den Muskeln und ihrer Functionshemmung. Ja, Friedreich steht nicht an, die ursprüngliche krankhafte Störung als eine chronische interstitielle Myositis zu bezeichnen. In der neuesten Zeit neigt man sich wieder der Leubuscher-Cruveilhier'schen Ansicht zu, dass eine spinale oder vielmehr bulbäre Erkrankung das Primäre sei. Frühere eifrige Verfechter der myopathischen Theorie, wie Duchenne¹⁾ u. A. haben sich auf die andere Seite gewandt, insbesondere bestimmt durch den immer häufiger beobachteten Connex der progressiven Muskelatrophie mit anderen exquisit spinalen oder bulbären Erkrankungen (Paralysis-glossopharyngolabialis, Sclerosis cerebros spinalis disseminata etc.). Auch der Sympathicus und seine trophischen Fasern werden von manchen Autoren (Schneevogt) als Ausgangspunkt der Krankheit betrachtet. Andere endlich halten unsere Affection nicht für eine Krankheit sui generis, sondern betrachten sie als einen Secundärprocess, der sich aus verschiedenen Affectionen des centralen Nervenapparates entwickeln könne²⁾. Die Frage ist offenbar noch nicht spruchreif.

Die Veränderungen in den Muskeln werden von allen Autoren ziemlich übereinstimmend beschrieben. Die Muskelbündel haben erheblich an Volumen abgenommen, sind entweder blass oder (besonders in späteren Stadien) gelbweiss, elastisch anzufühlen. Mikroskopisch bestehen die Veränderungen zunächst in einem Erblässen der Muskelfasern, während die Querstreifung noch deutlich ist. Im späteren Stadium wird die Querstreifung undeutlicher, im Centrum verschwindend, während hier eine feinkörnige Einlagerung Platz greift. Weiterhin finden sich leere Schläuche, hie und da rosenkranzförmig eingeschnürt, oder mit grossen Fetttropfen. Virchow beobachtete eine Entwicklung von Fettzellen aus Bindegewebskörperchen. Die Wandungen der Blutgefässe, namentlich der kleineren Arterien, in den degenerirten Muskeln, sind ebenfalls von feinkörnigem Fette durchsetzt.

Symptome. Als das erste Symptom zeigt sich in allen Fällen eine verminderte Leistungsfähigkeit einzelner Muskeln der oberen Extremitäten, besonders der Hände, am Daumenballen, der Schulter, seltener der Beine. Der Kranke klagt über ein Gefühl von

Ueber progressive Muskelatrophie, über wahre und falsche Muskelhypertrophie. Berlin 1873.

¹⁾ Duchenne et Goffroy, Arch. de Physiolog. 1870, 4, pag. 499 ff.

²⁾ Vgl. Leyden, Ueber progressive Bulbärparalyse. Arch. f. Psychiatrie 1870, pag. 29.

Schwäche und Ermüdung nach jeder Anstrengung. Bald zeigt sich auch Abmagerung der betroffenen Muskeln. Mit der sichtbaren Muskelatrophie erscheint ein Symptom, welches nach den bisherigen Beobachtungen als pathognomonisch bezeichnet werden kann, nämlich fibrilläre Contractionen, welche die afficirten Muskeln blitzschnell überfahren, ohne dass durch sie eine Bewegung am Skelet bewirkt würde. Diese zuckenden oder springenden Fibrillärcontractionen treten am Deutlichsten auf, wenn die Temperatur der Haut plötzlich erniedrigt wird, z. B. durch Anblasen oder Ueberfahren mit einem kalten Gegenstande, und lassen sich auf diese Weise jeden Augenblick hervorrufen. Sie verschwinden erst mit dem völligen Untergange der Muskelbündel. — In der sensitiven Sphäre zeigen sich keine Abweichungen von der Norm, vielleicht die Schmerzen ausgenommen, welche von manchen Kranken Anfangs empfunden und als „rheumatische“ bezeichnet werden. — Ebenso wenig wurden Störungen der Intelligenz oder der Psyche beobachtet. Die vegetativen Functionen gehen stets normal vor sich; die Action der Herz-, Darm- und Blasenmuskulatur bewahrt selbst in den extremsten Fällen, wo fast das ganze animale Muskelsystem untergegangen ist, bis zum Tode die normale Energie.

In Hinsicht des Verlaufes ist man genöthigt, zwei Formen zu unterscheiden, nämlich: a) progressive Atrophien, welche sich mehr local verhalten, und sich nach einer kürzeren oder längeren Dauer des Fortschreitens begrenzen; b) Atrophien, welche die Tendenz haben sich zu verallgemeinern, und das ganze animale Muskelsystem in den Process zu ziehen.

Die erstere Form betrifft einen oder mehrere Extremitätenmuskeln; dieselben werden atrophisch und gehen fettig zu Grunde. Entweder ist damit der Process beendet, oder es werden allmählig noch einige benachbarte Muskeln mitergriffen. Aber auch in diesem Falle begrenzt sich die Lähmung bald und wird stationär, oder lässt sich mit Hilfe der Kunst bessern, vielleicht sogar heilen. Diese mehr locale Form entwickelt sich meistens in Folge habitueller Uebermüdung gewisser Muskelprovinzen durch angestrenzte Arbeit, in Folge von Verletzungen etc.¹⁾

Die allgemeine progressive Muskelatrophie beginnt entweder ohne nachweisbare Gelegenheitsursache, oder in Folge von Erkältungen, befällt gleichmässig alle Schichten der menschlichen Gesellschaft, und lässt merkwürdiger Weise in einer grossen Reihe von Fällen Erblichkeit nachweisen (Duchenne, Meryon, Oppenheimer u. A.). Die Affection schreitet langsam, aber unaufhaltsam von einem Muskel

¹⁾ Vgl. Betz, Prager Vierteljahrsschrift, 1854, 3. Bd. 43.

zum andern fort, auch die von Gehirnnerven innervirten willkürlichen Muskeln nicht verschonend; ein Glied nach dem andern wird immobil, bis endlich der ganze Körper, zum Skelet abgemagert, jeder Bewegung baar, bei durchaus ungeschwächten geistigen Kräften und Sinnesfunctionen einem langsamen Tode entgegengeht. Die Behinderung der Respiration durch die Entartung der Athemmuskeln, besonders des Zwerchfells, vor Allem aber die durch die Atrophie der Bauchmuskeln gesetzte Schwierigkeit der Expectoration bei intercurrenten Lungen- oder Bronchial-Affectionen führt gewöhnlich das Ende herbei.

Beide Formen stimmen überein in dem eigenthümlichen Verhalten der Muskeln gegen den inducirten electricischen Strom¹⁾. Die Muskelbündel behalten neben der willkürlichen auch die electricische Contractilität unverändert, so lange sie existiren. Wo einzelne Bündel eines grösseren Muskels, z. B. des Pectoralis major, nachweisbar schon gänzlich entartet sind, und keine Spur einer Reaction gegen den faradischen Reiz zeigen, lassen sich in anderen Bündeln noch leidlich kräftige Contractionen hervorrufen. Die electro-musculäre Sensibilität dagegen geht frühzeitig verloren.

Die **Dauer** der allgemeinen progressiven Muskelatrophie beträgt gewöhnlich mehrere Jahre; auch kann sie unter günstigen Verhältnissen längere Pausen machen.

Die **Diagnose** ist bei hinreichender Würdigung der einzelnen Erscheinungen nicht schwierig. Der unmerkliche Beginn, die sichtbare Atrophie, das fibrilläre Zucken, das Verhalten der Muskeln gegen den faradischen Strom, das Unregelmässige der Ausbreitung, der langsame Fortschritt, das normale Verhalten des Gehirns und der Sinnesorgane — Alles das sind hinreichend charakteristische Momente, um eine Verwechselung mit anderen Lähmungen unmöglich zu machen.

Die **Prognose** stellt sich, nach den bisherigen Erfahrungen, ungünstig, ja für die allgemeine Atrophie, besonders bei nachweisbarer Heredität, fast absolut letal heraus. Locale Formen bleiben, nachdem die betroffenen Muskeln untergegangen sind, stationär; in seltneren Fällen werden sie gebessert, selbst geheilt (Duchenne). Bei der allgemeinen Form dagegen ist selbst im günstigsten Falle nur auf einen kürzeren oder längeren Stillstand der Affection zu rechnen.

Therapie. Die Ernährung des ganzen Körpers und damit des Nervensystems ist durch eine zweckmässige Regulirung der Diät und der ganzen Lebensweise in möglichst gutem Zustande zu erhalten; andererseits ist die Ernährung des einzelnen Muskels, welcher von

¹⁾ Vgl. Duchenne, l. c. pag. 581. Edit. II. pag. 446 sq. — Eulenburg, Deutsche Klinik 1863, 3. — Benedict, Wien. Medic.-Halle IV. 16—41.

der Atrophie befallen wird, zu bessern. Unbedenklich nimmt hier **die** localisirte Faradisirung der einzelnen Muskeln, mit Einleitung **constanter** Ströme abwechselnd, die erste Stelle ein. Wir haben oben **des** Weiteren ausgeführt, in welcher Weise die oft wiederholte, **faradische** Contraction eines atrophischen Muskels auf seine Ernährung **influit**. Auch in Betreff der vorliegenden Affection hat die Erfahrung **aller** Beobachter gezeigt, dass von allen zur Verbesserung der Muskel-**ernährung** angewandten Agentien allein die localisirte Faradisirung im **Stande** war, dem Leiden — wenigstens für einige Zeit — **Einhalt zu thun**. Dass die Behandlung mit der grössten Ausdauer Seitens **des** Kranken und des Arztes durch Jahre fortgeführt werden müsse, **um** dauernde Erfolge zu schaffen, hat die Erfahrung hinreichend **bewiesen**. Locale Atrophien werden durch zweckmässige Electricisirung **gewöhnlich** bald sistirt. Bei der allgemeinen progressiven Muskel-**atrophie** dagegen ist bisher in keinem hinreichend verbürgten Falle **Heilung**, sondern höchstens ein Stillstand erzielt.

Bäder aller Art, Douchen, Einreibungen, Nervina, Strychnin, **Veränderungen** des Clima's und der Lebensweise haben sich bisher **als** durchaus wirkungslos erwiesen.

Siebentes Capitel.

Von den Neubildungen in den Muskeln.

Die Muskeln sind im Allgemeinen selten der Sitz von Pseudoplasmen; besonders entwickeln sich dieselben fast niemals primär in ihnen.

Alle Arten des Krebses können in den Muskeln vorkommen, gewöhnlich jedoch nur, indem er sich von Nachbargebilden, z. B. von der Brustdrüse aus, auf die Muskeln fortsetzt. Daher wird er auch selten Gegenstand einer besonderen Diagnose. Ebenso verhält es sich mit den Tuberkeln, welche noch viel seltner als der Krebs in den Muskeln auftreten. Sie sind immer an die Nachbarschaft eines in der Erweichung begriffenen Käse-Herdes gebunden und entgehen als Theilerscheinung allgemeiner acuter Miliartuberculose der Wahrnehmung.

Nicht ganz selten bilden Blasenwürmer prominirende Geschwülste in einem Muskel. Ihre Unterscheidung von anderen Cysten wird immer erst nach der Operation möglich sein. — Die in neuester Zeit so oft in den Muskeln beobachtete *Trichina spiralis*, bietet für den Chirurgen insofern Interesse dar, als ihre Diagnose wieder-

hott mit Hilfe von kleinen Excisionen oder Punctionen mit dem Middeldorpf'schen Harpunen-Froctart gefangen usw. — Anderweitige Cysten als die durch die genannten Entozoen bedingten gehören übrigens in den Muskeln zu den grössten Seitenherten.

Zu erwähnen sind endlich die Teleangiectasien, welche (nach Bokitan-sky) als mehr oder weniger umfängliche Gefäss-Convolute, welche die Muskelsubstanz verdrängen und durch Druck atrophiren, mit Beibehaltung der dem Muskelbauche eigenthümlichen Umrisse, — jedoch gleichfalls sehr selten vorkommen.

Die Umwandlung der Muskeln in Fett, so wie die fibroide Entartung sind bereits in den vorhergehenden Caputeln erläutert worden.

Die sogen. (falsche) Muskelhypertrophie (fettige Verdickung der Muskeln) übergehen wir, da dieselbe ein eigentlich chirurgisches Interesse nicht darbietet.



To avoid fine, this book should be returned on
or before the date last stamped below.

--	--	--

